

**MICHAELIS
ETTMULLERI, ...
OPERA MEDICA
THEORETICO-
PRACTICA, ...**

Michael Ernst Ettmüller,
Timbro non identificato





E 671

17.3 d. 6

MICHAELIS
ET TMULLERI,
PHILOS. ET MED. D.
OPERUM
TOMI II. PARS II.





MICHAELIS ET MULLERI
Philosophiæ & Medicinæ Doctoris, Hujusque in Illustri
Academia Lipsiensi Professoris Publici & Practici, olim per omnem
Europam Celeberrimi

COLLEGIUM
MEDICO-CHIRURGICUM.

P R O O E M I U M.



Affectus huic Medicinæ parti subiecti quinario numero commode comprehenduntur, suntque Tumores, Vulnere, Ulcera, Luxationes & Fracturæ: quorum priores tres partibus mollibus; posteriores vero duo partibus duris sunt proprii.

Artifex Chirurgiæ dicitur Chirurgus, cujus descriptionem exactam præ cæteris docet *Celsus in Proœmio in 7. sue Medicinæ Partem.*

Jam harum partium affectuum, nempe aut durarum aut mollium exacta notitia pernecessaria est, & in durioribus scienda est

1. Earum Conformatio, Situs & Connexio.
2. Earundem Usus; &
3. Quod omnia mucida, omnia unctuosa & pingua, ac oleosa vulgaria, maxime nociva sint iisdem, nisi antea artificiose volatilisata & destillata fuerint. Est enim in omnibus istis occultum acidum, quod pertinaciter adhærendo ossibus, facile etiam carnem corrodit, *sielauffen an* / hinc potius sicca & amariuscula, item remedia sale paulo acriori alcalino prædita, in ossium affectibus sunt convenientissima.

In partibus mollioribus præ cæteris accuratè
Tom. II. Pars 2.

te notanda est differentia inter partes sanguineas, & spermaticas seu nervosas: quæ utramque paginam facit, tam propter prognosin in affectibus chirurgicis ferendam, quam etiam propter curam & medicamentorum convenientium electionem & applicationem. Nam

1. Sanguinearum partium affectus Chirurgici, Tumores, Vulnere & Ulcera sunt longe tutiores, quam nervosarum, nec tantis symptomatis, in specie gangrænæ & morbis convulsivis adeo obnoxii, neque etiam adeo sensibiles nec adeo facile irritabiles.

2. Affectiones hæ in partibus sanguineis curatu sunt longe faciliores, quam in partibus nerveis.

3. Non sunt adeo dolorificæ, sanguineas si occupaverint partes, quam si affligerint nervosas.

4. Etiam si in partibus sanguineis superveniat aliquod fermentum præter naturale corruptivum, ut in vulneribus & ulceribus ordinario fieri solet, hoc non adeo acre & vitiosum, non adeo malignum, sed mitius longe & correctu facilius, quam in partibus nervosis est: Unde in gangrænosa ulcera promptius longe abeunt in nerveis partibus, quam in sanguineis.

5. Sanguineæ partes ablatae aut detruncatae facilius restituntur, aut saltem quodam ana-

[A] logo



logo refarciuntur; secus ac fit in nerveis, quorum jactura solet esse immedicabilis.

6. Sanguineæ partes læsæ debilioribus etiam medicamentis facilius auscultant, & imprimis temperata balsamica seu sale volatili oleoso temperato prædita, naturæ amica postulant. Ex errore vero applicata forsitan paulo acriora melius perferunt: nervosis vero, utut his balsamica temperata sint acceptissima, tamen eadem debilia subinde conducunt; acriora vero & fortiora easdem irritant, earumque affectus longe deteriores reddunt.

7. Denique quomocumque curatæ læsiones dictarum partium sanguinearum, nec læsionem nec deformitatem tantam in corporis actionibus, neque etiam tantam membrorum deformitatem afferunt, quam fit in partibus nervosis læsis.

Juxta partes has, tanquam primario subjectas læsionibus & curationibus Chirurgicis, etiam qui eas abluunt exacte considerandi sunt liquores; primario quidem sanguis, hinc etiam chylus nutritivus, cujus vehiculum separatum ex parte constituit lympham.

Sanguis salinus volatilis oleosus & balsamicus, spiritu salino similiter volatili balsamico turgidus, partium conservationi dicatus, ubi corruptionem incurrit, acorem quidem facile contrahit, sed hunc aut arte facile corrigibilem aut sponte effervescente sale volatili oleoso in pus salum temperatum transmutatur.

Chylus vero latice aquoso dilutus, & hinc postmodum lymphæ, vitiatæ insigniter accescunt, & in mucilagines varias sæpius, in specie in locis glandulosis in liquamen corrosivum corrumpuntur.

Jam vero in dictarum partium externa læsione, & earundem Curatione Chirurgica, 3. imprimis observanda in genere:

1. Naturale conservandum.
2. Præternaturale tollendum.
3. Symptomata mulcenda.

Nam primum si absit, corporis totius, in specie partis læsæ, œconomiam naturalem turbat; secundum læsionem morbosam sustentat & auget; tertium corpus partemque debilitat & 1000. accidentia advocat: Ethoc ipsum tertium ex primis duobus primario dependet. Nam dolor tensivus ex impedito motu liquoris transeuntis indeque partis dilatione oritur, uti fit in tumoribus; corrosivus vero & pungens dolor ex acido habet originem præter naturam rodente & vellicante.

Auxilia ergo in genere, quæ his conveniunt affectibus, ex tribus petuntur fontibus, imprimis Diætæ, Pharmacia & Chirurgia in specie sic dicta.

Manus artificiosa Chirurgi debet esse activa, partim removendo impedimenta seu impedientia, partim applicando conducentia re-

media. Quæ applicanda sunt, ex Pharmacia desumuntur, imprimis ex regno vegetabili, remedia nempe, quæ sale volatili balsamico constant, ut sunt dicta vulneraria resinosa & similia, quæ utramque paginam faciunt in Chirurgia. Nam hæc non tantummodo tribus superius monitis requisitis, quocumque usu interno & externo optime satisfaciunt, sed etiam pro aliis scopis hinc inde intervenientibus optime unà succurrunt.

Imprimis autem, dum impedimenta removet Chirurgus, ea scilicet, quæ naturam tanquam primariam Medicatricem in suis actionibus morantur, vere artificiosum se exhibet, dum nempe

1. Separata jungit.
2. A situ naturali dilapsa reponit.
3. Id quod inutile aut vitiosum est, à toto separat.
4. Deficiens, quantum possibile, restituit; &
5. Solvendo continuum & meatus aperiendo promptè succurrit.

Hæ sunt operationes primariæ, quæ Chirurgus incumbunt in operatione manuali, quæ optime descripta videbitis tanquam in synopsi in Microtechnæ Hornii, in Armamentario Chirurg. Sculteti: in efficaci Medicina Marci Aurelii Severini Medici Neapolitani, quæ tamen vix melius, quam per avtopsiam ocularem, addisci, & per Praxin deduci possunt.

Jam ergo pro remediorum varietate Chirurgia est duplex, vel Medica, vel Manualis. Medica consistit in recta cognitione affectuum præternaturalium per manum chirurgicam tractandorum, & legitima inventione remediorum ex Pharmacia & Diætâ convenientium; Manualis vero versatur saltem circa operationes chirurgicas, quæ nos non tangunt.

Hæc in genere de Chirurgia monuisse sufficiant. Circa Therapiam affectuum & inventionem remediorum ex fonte diætetico & pharmaceutico considerandi sunt Autores: Inter omnes optimi sunt, & quidem in Chirurgia Rationali 1. Agricola in Chirurg. Parva, 2. Barbette in Chirurg. & Anatom. Præctica. 3. Felix Wurz, qui recte ab Helmontio Chirurgorum Antesignanus vocatus in *seiner Wund-Argney*; In Chirurgia vero Mechanica vid. Fabricius ab Aqua-pendente, Paræus, Scultetus & Guillemeau.

CAPUT I. DE TUMORIBUS IN GENERE.

Nomine Tumoris in genere intelligitur Magnitudo partis p. n. in longitudine, latitudine, & profunditate aucta sive sit conjuncta

juncta cum materia purulenta, ut abscessus, si venon: Convenit cum abscessu in conceptu generali, qui interne differunt, ut genus & species.

Excreſcentiæ ergo præternaturales, in quibus non tam major fit pars, quam nova moles quasi adnascitur ipsi, proprie non sunt tumores, ut ut respective harum pertractatio ad Tumores pertineat, & etiam pertractentur simul.

CAUSÆ.

Causa in genere omnium Tumorum est (1) pars quædam ex naturali situ dilapsa, & in proximam partem propulsa seu dislocata, aliam partem expellens; & est nunc mollis, uti in Herniis; nunc dura, ut in Luxationibus; (2) Humor quidam replens, indeque partis magnitudinem augens; (3) Flatus distendens; unde etiam non raro sunt Tumores flatuosi, qui interdum antequam aperiantur, abscessum mentiuntur.

Ex quibus causis tamen causa media, nempe Humor, solet esse frequentissima: Nam licet interdum etiam lapides, it. vermiculi, pediculi, copiosa parva quasi ovula, it. crines, & similia varia, in Tumoribus & inde natis abscessibus reperta fuerint, eaque in ipsis Tumoribus genita (unde excludo hic ea, quæ extrorsum per Incantationem intenduntur) tamen cum hæc sint rariora, ad insolita naturæ opera merito referuntur, quæ isti, quod sit ut plurimum, nil derogare possunt. Humor ergo, qui partem replendo Tumorem producit, in eadem colligitur de novo, qui antea non aderat: & quidem vel ob motum humoris cujusdam trans partem impeditum, unde oritur humoris stagnatio; vel propter novam humoris in parte generationem.

Stagnatione fiunt Tumores, si humorum motus per partium meatus & vasa subtilia impeditur, & est hæc humorum stagnatio, & inde natus tumor, vel simpliciter vel paulatina congestio: Illa fit in Tumoribus alias vulgo notis; hæc fit etiam imprimis in Tumoribus criticis, hisque aliis analogis tumoribus: Ibi promiscue hæret humor transiens; hic vero, quasi secretionem quadam factâ, partes quædam adherent quibusdam adhuc transmissis. Hinc illa stagnatio proprie dicta; hæc Congestio dici potest.

Jam in specie ex stagnatione morbosa simpliciter dicta fiunt omnes Inflammationes, Contusiones, Erysipelata & similes tumores, & hæc quidem omnes ex sanguine; ex lymphâ vero stagnante fiunt Tumores oedematosi & serosi quicunque, it. hydrops, tam universalis quam particularis. Pertinet huc lac in mammis concretum, lochia circa uterum contenta, &c.

Congestione vero paulatina seu successiva
Tom. II. Pars 2.

Tumores Critici & Abscessus, hisque similes, Excrementis scilicet febrilibus, ob crassitiem aut coagulationem seu coacervationem resistantibus, ipso sanguine aut lymphâ tenuiori sensim tranſeunte. Huc pertinent Bubones pestilenciales, furunculi, phygetla, Parotides, Carbunculi, & his similes Tumores. Pro illustratione talium Tumorum consideremus saltem filtrum chymicum, quod per præcipitationem ex liquore continente separata retinet, reliqua transmittit. Par ratio est in Tumoribus per digestionem obortis. Faciunt huc etiam viscerum scirrhi & strumæ circa glandulas enatæ. Hic enim Tumores sensim generantur ex viscidior humore, sanguine & lymphâ relicto, tenuiore tranſeunte. Hoc modo fiunt Tumores per stagnationem.

Per novi humoris in parte generationem & collectionem fiunt Tumores reliqui, quando alimentum partis proximum coacervatur & colligitur in parte præternaturaliter: idque vel corruptum, vel plus minus alteratum.

Corruptum quidem, quando fermentum vitiosum quoddam in parte adhuc latens alimentum affluens degenerare facit in varios vitiatos succos, qui successive collecti dant Tumores, continuo in ulcera denuo degenerantes. Hinc enim fit, ut abscessus aut ulcera non rite mundificata dent Tumores & abscessus recidivantes, qui vulgo male fluxionibus corporis; ad certam partem decumbentibus, adscribuntur: Hinc caries ossium non rite curata post ulceris consolidationem denuo novum infert Tumorem, novumque exinde natum abscessum. Pertinet huc Bubo veneris ex contactu scorti successive in inguine enatus: it. Tophi, Cancer mammarum ac gummatâ Gallica ex acido maligno, nutrimentum ossium corrumpente.

Ex alimento vero ulterius affluente, minus vero in parte alterato, oriuntur Tumores istis partibus quoddammodo similes: quales sunt Tumores ossium fractorum callosi, it. carnis in ulceribus mundificatis luxuria & excreſcentia, auctæ viscerum insignes magnitudines, nodi it., & ganglia. Ex alimento vero congesto, sed magis alterato & coacervato, nascuntur Tumores, partibus quibus adherent non nihil dissimiles; quo quidem pertinent omnes excreſcentiæ, ut sunt Verrucæ, Polypi, it. Cornua quæ ipsa commode ad verrucas, quale in superiori parte pedis enatum memorant M. A. N. C. *Ann.* 4. & 5. *Obs.* 180. it. *Fungi*, & omnes isti tumores, qui in propria tunica observantur contineri, quales sunt Melicerides, Atheromata, Steatomata.

Quoad Causas remotas: Stagnatio humorum quæcunque contingit vitio viarum transmissiõni repugnantium, aut ob earundem

[A] 2

angu-

angustiam, aut propter humoris ipsius ad transeundum ineptitudinem, vel propter sui crassitiam, vel propter ineptitudinem particularum ejus respectu figurationis ad poros partium.

Via porique sunt angusti

(1) Propter compressionem ab incumbentibus quibuscunque.

(2) Propter constrictionem à vinculis.

(3) Propter obstructionem à materia viscida mucilaginosa efficiente frigido imprimis inspissata, aut ab acido condensata.

(4) Propter fibrarum partis contractionem ac crispationem, indeque natam porulorum partis angustiam, quæ oritur imprimis ex dolore seu dolorosa partis affectione.

Humorum vero crassities, & inde ejus orta stagnatio, accidit vel propter pituitam, quam vocant, chylum crudiores & viscidiores, in prima vel secunda vel tertia digestionem non rite subactum, vel propter frigus humores inspissans, aut propter acidum humores coagulans, aut denique propter remedium externum male adhibitum.

Denique Humoribus particulæ male figuratæ per poros transire nequeunt, quin hæc per præcipitationem separatæ ex massa sanguinea, & hinc densius agglomeratæ, in liquore fluctuant, quo vehiculo seu liquore vehente transeunte, per poros ipsæ resistant, ut in abscessibus Criticis usu venire solet.

Ex alimento coacervato & collecto præternaturaliter, aut etiam alterato oriuntur Tumores, quando fermentum quoddam corruptum, ut plurimum vitiose acidum, in parte latet, quod ipsum alimentum partis proximum effluens degenerare facit, istudque transmutat in varios vitiosos succos, qui collecti sensim dant novos tumores atque abscessus, ut v. g. in abscessu, carie ossium, ulceribus non rite mundificatis, &c.

Alimentum vero minus alteratum dat tumorem, quando ut plurimum ex causa externa subinde propter labores ob poros partium dilatatos, fibrasque nonnihil laceratas, ita propter membranas distinctas, alimentum copiosius recipitur, & ita uberius colligitur; Quæ ratione ex tendinis cujusdam in manu ex labore distensione circa articulos supervenit successive Ganglion: aut quando ex compressione fibrarum ejus ex calce supervenit in pede Clavus, & similes tumores pro partis læsæ constitutione.

Alimentum denique plus minus alteratum à statu naturali, non tamen corruptum, dat excrecentias membranarum propriis inclusas & pro alimentum alteratione ex varia in membrana colligente transcolatione, nunc serum, nunc pulvem, nunc aliam similem materiam, cum radice tamen, ex qua enascitur, aliqualem

analogiam obrinente referentes tumores: Quin & Polypi, Verruæ, & similes hujusmodi nascuntur, adeo ut raro citra externam quandam violentiam, aut citra imperum quandam externum vel si absit hæc externa violentia, raro citra levem ab acido vitioso præcedentem corrosionem, subnascatur talis Tumor: Sic enim v. g. ex ulcusculis narium subinde propullulant Polypi.

C U R A.

Utergo curentur Tumores in genere, necesse est, ut evacuetur continens eorum Causa, quacunque id fiat ratione, ut remota materia fibrarum partium porique distenti de novo se contrahant, & ita naturalis parti redeat figura, & hanc postmodum insequens actio & functio naturalis antea in parte læsa.

A stagnantibus humoribus pars liberatur

1. Restituendo ipsis motum naturalem.

2. Evacuando ipsos immediate ex parte, aut insensibiliter discutiendo, aut viam novam aperiendo, secando, vel urendo: Illud (nempe discussio) stagnantibus humoribus simpliciter; hoc vero (nempe apertio) humoribus congestis magis convenit.

Ut his duobus satis fiat, Morus stagnantibus restituitur, vel vias angustas dilatando

(1.) Removendo impedimenta externa angustantia, ut sunt vincula, ligamenta.

(2) Humoribus coagulationem solvendo.

(3) Dolorem tensivum mulcendo.

(4) Vel denique crassitiam ipsius humoris tollendo.

Tollitur hæc Stagnatio

1. Removendo externa incrassantia.

2. Temperando frigus inspissans; &

3. Corrigendo acidum coagulans.

Discutiuntur stagnantes humores vel insensibiliter; quod fit vel acidum coagulans temperando, & humores per medicamenta, partibus subtilibus constantia & penetrantibus prædita, sensim sensimque attenuatione dissipando; vel apertione novi foraminis evacuando humores, aut demulcitos & temperatos per suppurationem, si nempe mutationis in pus sunt capaces; aut saltem à cruditate sua nonnihil mitigatos aut quasi alteratos, si suppurationis perfectæ sint incapaces.

Illud (suppuratio nempe) sanguineis aut cum sanguine permixtis liquoribus tantummodo convenit: Hoc vero reliquis saltem humoribus & tumoribus ex aliis occasionibus est proprium. Terenda tamen ubi vis vestigia à natura præmonstrata.

Suppuratio fit, quando in sanguine stagnante & congesto evanescunt & dissipantur partes ejus spirituosæ subtiles ac tenues; unde id, quod remanet, spissescit sensim & grumescit

mescit, & ex corruptione successive acorem contrahit putredinalem, à quo acido fit effervescentia acris cum salibus volatilibus oleosis ipsius sanguinis, ex qua non tantum calor in parte affecta sentitur major, & ipsa tumoris magnitudo successive in medio sui turgescendo augetur: **Es bekömmet eine Blüthe;** Unde dolor & tensivus (ratione partium distensarum) & pullatorius (ratione arteriarum in motu impeditarum) intenditur, & tandem sanguis in pus corrumpitur, acido adhuc nonnihil prædominante, unde pus album apparet: omnia enim alcalia oleosa vel sulphurea ab acido præcipitantur in album colorem, uti in Chymicis ex lacte Φ is patet.

In hoc suppurationis negotio acidum imprimis est considerandum: Nam hoc nimis excedente nulla fit suppuratio, sed aut partis in ulcus corrosio, aut tumoris in scirrhum induratio; deficiente vero acido non opus est suppuratione, cum liquor fluxilis tunc temporis alia ratione facile removeri possit, aut tunc exacta temperatura opus non habeat. Ex dictis facile patet, qualia medicamenta in genere sint applicanda? nam motum naturalem humoribus restitunt omnia ea, quæ resolvunt, attenuant & alcali seu sale volatili plus minus temperato factum coagulum tollunt ac meabile reddunt.

Per diaphoresin vero Tumores discutunt primario, quæ participant de sale volatili seu alcali nunc acris, nunc fixo, tam minus quam magis temperato, acidum fixum temperante, & absorbente, atque ipsa occasionali causam stagnationis tollente.

Suppurationem vero, si sit legitimo modo, adjuvet Chirurgus, non applicando diaphoretica alcali acris constantia: quia horum operatio dissiparet quasi tenuia & volatilia, reliqua vero spissiora induraret in scirrhum: nec applicet etiam his contraria acida, quia acida suppurationem impediunt, & facile occasionem grumescentiæ dant, & sic ulcus inducerent. Applicet ergo Chirurgus remedia temperata, humectantia, & blande laxantia, occulto tamen alcali, ut vocat Helmontius, & temperato constantia, plus tamen minus acriora, pro ratione nempe materiæ suppurandæ. Imprimis tamen suppurantia debent esse nonnihil mucilaginosæ, & suaviter humore quasi rosido laxantia: nam talia acrimoniam humoris suppurandi, imprimis acidi, suaviter temperant, unde acido temperato salia in liquore suppurando minus impetuose effervescent, & per consequens cum minore dolore & ardore inter se concurrunt, & blande se in pus salum uniunt & convertunt, dum interea per ista remedia applicata simul laxantur tensæ antea fibræ, unde

dolor successive mitigatur, & pus facilius exteriora versus viam invenire potest. Temperata ergo non nihil mucilaginosæ dixi suppurantia esse.

Quod si vero Tumor suppurandus constet materia crassiore & viscidiora & acidiora, qualis v.g. sit lac in mammis coagulatum ad suppurationem tendens, qui Tumor ob id minus fermentationi sese accinget, sed potius ad scirrhum degenerare velit, tunc cum ordinariis suppurantibus applicanda sunt paulo acriora, sale volatili magis acris imprægnata: qualia sunt cepacea, alliata & similia:

Aperitio Tumoris aut suppurati, aut aliquantisper alterati, fit vel sponte naturæ, dum supertensa cutis ob acrimoniam contenti humoris successive eroditur, vel arte, idque nunc ferro, qui modus est optimus Gallis usitatus, vel igne, qui modus fere est Italarum, & hoc aut actuali per ferra ignita, quod tamen rarius fit; vel potentiali caustico, quod constat ex sale quodam acerrimo, nunc quidem ex alcali fixo acris, idque usitatissime: hinc parantur Cauteria ex lixivio saponario, inspissato, vel ex Ψ cum cinere fraxini, vel ex $\Theta\Phi$ & cineribus clavellatis, nunc vero constant cauteria ex acido, nempe butyro antimoni, quod singularissimum est cauterium pro parandis v.g. Fontanellis, it. quod bubones vel carbunculos quoscunque optime aperit; it. parantur talia ex magnete arsenicali, vel parantur ex lapide infernali, ex spiritu nitri concentrato cum luna (quod usitatum est Italis) vel fiunt talia ex opio in spiritu nitri dissoluto, quod tamen singulare est.

His viis, vel ferro vel igne potentiali, aperit tumor, ubi materia contenta jam erit evacuata, tunc cavum restitans vocatur abscessus, qui ubi per occultos quasi cuniculos hinc inde serpit, alio nomine vocatur sinus, **ein hohl Geschwür.**

A materia per novam generationem introducta, liberatur pars tumens, aut materiam collectam insensibiliter discutiendo, aut per factam aperturam materiam evacuando, materiam ipsam evacuandam emollientibus aut suppurantibus plus minus antea alterando & mitigando; cavendo recidivam tumoris per fermenti ulcerosi & peregrini in loco affecto totalem destructionem. Nam aliàs v.g. si in mammarum ex lacte coagulato suppuratione non ritè curetur abscessus, & mundificetur per fermenti peregrini extinctionem, demum, licet consolidata fuerit mamma, recurrit tumor, & novus fit abscessus.

Excrescentiæ verò tolluntur ut plurimum, imprimis insigniores, omnimodâ earum ferro aut igne extirpatione; igne imprimis potentiali, rarius actuali, præcavendo hic recidivam

divam talium excrefcentiarum per radicis membranofæ omnimodam deletionem.

Hifce manuali artificio externè applicatis remediis commodè etiam fimul adduntur medicamenta interna: nunc quæ laxando primas purificant vias, aut quæ maffam fanguineam quacunque ratione expurgant, imprimis quidem fudorifera; nunc quæ acidum vitiofum tam in primis viis quam in toto corpore oberrans, fubinde abforbent & deftruunt; nunc quæ labem maffæ fanguineæ peculiarem corrigunt, v.g. cachecticam, & venream, fcorbuticam, aut fimilem: nunc verò, quæ blandum fudorem per remedia de natura alcalium provocando, omnes liquorum ftagnationes & coagulationes fucceffive folvendo, æqualem humoribus motum reftituunt, & reftitantes infenfibiliter refolvunt, & talia funt v.g. antimonium diaphoreticum, lapilli cancrorum, qui Chirurgorum debent effe arcanum, quoad internum ufum, myrrha, caftoreum, viperina quæque, & hinc fuccinata balfamica internè ufurpata.

Quod fi febricula aut æftus adfit, nitrata funt ufitata, ut nitrum antimoniatum, nitrum per alcali purificatum, & lapis prænellæ, ficuti milites ordinariò ufurpant pulverem pyrium, cujus internus ufus ratione nitri, fuphuris, & alcali fixi in carbonibus tilia in chirurgicis cafibus effe debet frequentiffimus.

Quod attinet ergo remedia Tumoribus in genere applicanda, funt ea in triplici claffe, vel refolvunt, vel difcutiunt, vel fuppurant.

I. Refolventia funt ea, quæ imprimis ftagnationi humorum funt oppofita, utpote quos refolutos in naturalem motum revocare debent. Sub hunc titulum revocanda funt omnia ea, quæ externè applicanda craffum attenuant, coagulata folvunt, grumos & vifciditates incidunt & rarefaciunt, & concreta fundunt, exque his ortas durities varias emolliunt. Omnia hæc fub nomine attenuantium & refolventium comprehenduntur.

In corpore humano dixi humores ftagnare, incraffari & indurari, vel ob frigus externum coagulans, vel ob propriam vifciditatem & craffitiam: Qui coagulantur humores, funt vel fanguis folus, qui imprimis ab acre con-grumatus hæret; vel eft pituita feu chylus craffior & crudior, nondum in fanguinem perfectum affimilatus, tam in fanguine quàm in lymphæ, tam ob frigus externum, quàm ob acidum internum in fuppuratus: nunc verò concurrunt fimul uterque humor, fanguis nempe craffus & vifcidus, ob chyli portiones crudas ipfi permiftas ex cacochylia natas: qui tertius modus eft communiffimus; & dat Tumores obftinatiffimos, ad fcirrhum nempe & fcrophularum naturam inclinantes.

Medicamenta ergò, quæ has humorum

affectiones curare valent, Emollientia ratione duritiei, & Attenuantia & Refolventia ratione craffi & coaguli dicta, hanc habent virtutem, ut acidum temperent, partes coagulatas penetrent, easque attenuent, & ita humores de-nuo molles, tractabiles ac mobiles reddant. Nam quæ à frigore fit coagulatio, admoto externo calore poteft refolvi.

Medicamenta quæ huc valent, funt

1. Pinguia & nonnihil mucilaginofa, quæ acidum temperant & quafi obtundunt, fibras & membranas laxant & emolliunt, vulgò Emollientia in fpecie fic dicta.

2. Deinde valent huc etiam paulo acriora, de fale volatili penetrantiori participantia, quæ & acidum omnino abfumunt, & partibus volatilibus in poros penetrant, & coagulo ifto abfumpto humores tenues, mobiles ac fluidos reddunt: & hæc funt propriè Attenuantia dicta.

Et quidem, prout nunc coagulum, & inde orta ftagnatio, eft magis vel minus fortis & contumax, ratione aut acidi in fuppurantis, vel humoris craffi & vifcidi fubfiftentis, etiam remedia varianda, & nunc acriora, nunc temperatiora, adhibenda funt. Unde 3. funt gradus Emollientium & Attenuantium, nempe funt lenia, mediocria, & fortiora, diaphoreticis feu difcutientibus cognata. Obijciat quis: Reperiuntur etiam acida, quæ attenuant & refolvunt: fed hæc, quatenus funt acida, hoc non præftant, fed falinarum partium volatilitate; unde vix folà ufurpantur, fed pro vehiculo aliis adduntur.

Primi gradus Emollientia & Refolventia funt fequentia: Radix & herba malvæ, altheæ, atriplicis, Mercurialis, brancæ urfinæ, violariæ, liliorum alborum, parietariæ; flores meliloti, malvæ; femem fœnu græci, lini, althææ, lupinorum, & ex his paratæ mucilagines atque farinæ; item caricæ pingues affatæ & calide impofitæ, uvæ paffæ & fimilia; adipēs & axungia caponis, vaccina, porcina, humana. Pinguedines recentes magis emolliunt, veteres attenuant, & illud magis, fi funt pinguedines ex fœmellis, quàm ex maribus; medullæ animalium recentes, lac, butyrum, & amygdalarum dulcium, violarum, liliorum alborum, unguentum de mucilaginibus, dialthææ, quod fingulare eft cum unguento refumptivo, & fimilia.

Attenuantia & Emollientia fecundi gradus funt: Radix & herba apii, pulegii, helenii, imprimis cepæ coctæ, ebuli, hyperici, chærefolii, betonica, verbaſci, ſambuci, rutæ, menthæ, artemifiæ, ſaturejæ, ſcabiola; flores hyperici, croci, ſambuci, ſcabiola, chamomillæ; item adipēs, v.g. anferina, urſina, cervina; ſevum hircinum; medulla cervina, gummi tacamahaca, ſtyrax liquidus,

dus, resina terebinthinæ, cera, mumia; farina fabarum cum aceto applicata, sperma ceti, spiritus φ ri; oxymel scilliticum; oleum chamomillæ, amygdalarum amararum, hyperici, nucum, anethinum, laurinum & nicotianæ; unguenta & emplastra de cicuta, de betonica, diachylon simplex, de spermate ceti Myntichti, de meliloto, &c.

In tertio gradu Emollientia & Attenuantia sunt: Radix & herba bryoniæ, cucumeris agrestis, raphanus, cepæ crudæ, vincetoxici, cyclaminis, sigilli Salomonis, asari, squilla, sabina, absinthium, centaur. minus, nicotiana; semen sinapi, crucæ, cumini cum aceto coctum; gummi ammoniacum, vel cum emplastro de cicuta, galbanum, bdellium, sagapenum, opopanax, myrrha, elemi, ladanum, resina pini; stercora & urinæ animalium; nidus hyrundinum cum excrementis; spiritus urinæ, Θ *ci, vini spiritus crocatus, acetum scilliticum, fermentum; oleum irinum, laterinum, terebinthinæ, ceræ, lumbricorum, petroleum, φ ri destillatum, oleum nicotianæ, balsamus sulphuris; unguentum Martiatum; emplastrum diachylon cum gummis, oxycroceum, dia-sulphuris, de cicuta, de amoniaco, & Vigonis de raniscum Mercurio; & lamina plumbeæ illitus & applicatus.

Ex his modò dictis simplicibus varia possunt fieri remedia composita:

1. Fomenta,
2. Cataplasmata,
3. Linimenta & Unguenta,
4. Emplastra.

Fomenta Emollientia fiunt hoc modo

\mathcal{R} . Rad. alth.

Lil. alb. aa. \mathfrak{z} ss.

Herb. & fl. malvæ,

Melilot.

Sambuc. vel chamomill. aa. M. j.

Caric. ping. No. vj.

Coqu. in l. q. feri lactis vel in lacte caprillo:
Colatura D. S.

Erweichender Umschlag.

Applicetur calidè cum linteis duplicatis, idque sæpius repetendo.

Vel loco lactis coqu. in l. q. ∇ simplicis.

Colat. fbiß. adde.

Succ. cepar. rec. l. \mathfrak{z} chamom. aut lil. alb. \mathfrak{z} ij. M. D.

Cataplasmata emollientia & resolventia fiunt hoc modo:

\mathcal{R} . Rad. alth. \mathfrak{z} ij.

Cucum. asin. l. loco hujus Jreos
rec. \mathfrak{z} i.

Fol. brass.

Malvæ

Herb. absinth. aa. M. j.

Flor. chamom.

Melilot. aa. M. \mathfrak{B} .

Sem. lini \mathfrak{z} ss.

Contusa coq. in l. q. ∇ simpl. vel lactis, vel feri lactis pro lubitu:

Traice per setaceum, pulpæ trajectæ adde
Stere. caball. \mathfrak{z} ij.

\mathfrak{z} chamom. \mathfrak{z} ss.

Cepar. subcineribus coct. \mathfrak{z} ss. vel ij.
M. D. S.

Erweichender Brey.

Vid. Wedelius de Med. Facult. libr. 1. Sect.

2. c. 1. pag. 31. & Tr. de Comp. Med. p. 159.

Cataplasma resolutivum Foresti egregiè convenit in Tumoribus duris: non secus cuporiston quoque est insigniter emolliens & maturans Tumores, quod paratur ex sapone communi in lacte calido dissoluto.

Aliud & quidem sub forma Linimenti:

\mathcal{R} . Mucilag. sem. alth.

Fœnu gr. cum decocto ficuum
extr. aa. \mathfrak{z} i.

Adip. anser. \mathfrak{z} vj.

\mathfrak{z} chamom.

Lil. alb. aa. \mathfrak{z} ij. vel \mathfrak{z} ss.

M. super ignem ad consistentiam Linimenti: sub finem verò adde

\mathfrak{z} destillat. terebinth. \mathfrak{z} i.

φ ri fœt. \mathfrak{z} i.

M. pro Linimento: S.

Erweichendes Gälblein.

Denique sub forma Emplastri:

\mathcal{R} . Empl. de melilot.

Gum. amm. in \dagger sol. & inspiss. vel
lento igne liquat. aa. \mathfrak{z} ss.

Liquefacta malax. c. l. q. \mathfrak{z} irini & nicotianæ; induc. super alutam in forma debita: S. Auflösen d Pflaster.

Conveniens est in Tumoribus duris ad scirrhos quodammodo inclinantibus. Item.

\mathcal{R} . Empl. de hyosc. \mathfrak{z} ij.

G. Θ *ci lento igne liquat. vel cum
 \dagger sol. & inspiss. \mathfrak{z} i. M.

II. Post Resolventia seu Emollientia proxima sunt remedia Discutientia, ea scilicet, quæ insensibiliter materiam ex parte expellunt: aliàs etiam Diaphoretica appellantur, quæ si sint leniora, dicuntur Rarefacientia. Pertinent huc ea, quæ alias interno usu Carminativa & Aperientia appellantur, quod poros partium aperiant, humores penetrent & discutiant, id est, pori partis cujusdam, dum sunt oppilati humore retento, non possunt liberari, nisi resolutus humor iste vaporis aut halitus specie dissipetur, & insensibiliter evacuetur.

Ad hoc ipsum requiritur, ut humor sit fluidus & tenuis, resolubilis in halitus, expers ob id omnis crassitie aut coagulationis; quæ si adsint, prius corrigendæ. Quæ ergò talem humorem ita resolvere debent, necesse est, ut habea-

habeant partes subtiles, tenuiores & facile penetrantes, simulque valeant in parte producere quendam calorem, quo ipso liquefacti & resoluti humores partim in meatus ordinarios remeant, partim verò per poros cutis exhalent.

Vitanda ergo frigida quæcunque, quæ pororum occlusioni occasionem præbent. Vitanda quoque quælibet acida, quæ coagulando humorem magis inspissant, & partinnoxiam inducunt, nisi sint acida, quæ habent partes admodum subtiles & penetrantes, quales in vino, item in aceto, sunt conspicuæ.

Medicamenta ergo, quæ huc conveniunt, erunt imprimis penetrantia aromatica, sale volatili oleoso prædita, & uti omnem humoris crassitiam, ita omnem ab acido inductam coagulationem tollunt, ac simul partis calorem suaviter foveant, nervisque amica sunt. Post hæc etiam salia alcalia, nunc volatilia, nunc fixa, lixivii forma applicata. Sic ~⊖ *ci ex Ψ cum oleis in consistentiam unguenti redactum adhibuit Burrhus ex relatione Bartholini.

Vicina ergo admodum sunt Diaphoretica Resolventibus seu Attenuantibus gradu auctiori tantummodo distando. Nam quæ resolvunt continuato usu, tandem etiam discutunt, & quæ in corpore densiore seu in duriori materiæ compage sunt Attenuantia & Resolventia, ea in corpore molliori, & in leviori materiæ concretione, erunt Diaphoretica.

Dum autem Diaphoretica semper præsupponunt humorem facile resolubilem, eo ipso etiam postulant aut præcedentem aut conjunctum Attenuantium & Resolventium usum, ne, dum pars humoris incretata diaphoresi resistat, ita subtilioribus & tenuioribus partibus dissipatis reliquæ crassiores magisque coagulatae, & hinc contumaciores remaneant. Ob id Diaphoreticis commodissime semper simul Attenuantia permisceantur.

Externis hisce commodissime simul adduntur interna Diaphoretica ex alcalium republica desumpta; hæc enim attenuando & liquefaciendo succos, naturalem eorum motum concitatiorem reddunt, & præternaturalem eorundem stagnationem resolvunt. Unde liquefacti humores partim per poros discutuntur, partim cum aliis in vasa resorbentur.

Remedia ergo Tumores discutientia sunt sequentia, Radix fœniculi, calami aromatici, Ireos, helenii, aristolochiæ rotundæ, sigilli Salomonis, cucumeris asinini, pyrethri, zingiberis; fol. & herbæ anethi, sambuci, ebuli, lauri, plantæque cæteræ aromaticæ, ut origanum, pulegium, cherefolium, thymus, calamintha, majorana, rosmarinus, absinthium, centaurium minus, salvia, ru-

ta, sabina, lavendula, hyssopus, abrotanum, chamæpitys, Satureja, & similia, flores chamomillæ, imprimis Romanæ, meliloti, sambuci, lavendulæ, anethi, salviæ, anthos, croci, baccæ juniperi, lauri; nux moschata, macis, ac alia aromata; semen anethi, cumini, carvi, anisi, fœniculi, rutæ, sinapi, petroselinii; farina fabarum cum aceto applicata; castoreum, benzoe; storax calamita, camphora; spiritus vini camphoratus, essentia plantarum cephalicarum & aromaticarum; oleum lumbricorum terrestrium, chamomillæ Romanæ, anethinum, cumini, carvi, fœniculi, anisi, laurinum, juniperi, nardinum, laterinum, menthæ, irinum, costinum, spicæ, petroleum, oleum ceræ, terebinthinæ, tartari, succini, quæ inter primatum obtinent olea destillata; adipēs & pinguedines animalium sylvestrium, canis, vulpis, ursi, cervi; etiam stercora & urinæ animalium, imprimis caprillum, hinc equinum; balsamus sulphuris, decoctum sulphuris cum stercoribus; sarmentorum vitis, ∇ calcis vivæ, lixivium suffitus +ti super silicem candentem; emplastrum diachylon ireatum, Martiatum, dia⁺is, Augustanorum ad hydropem, & similia.

Modus applicandi hæc Diaphoretica est

1. in Suffitu.
2. in Fotu.
3. in Cataplasmate.
4. in Linimento vel Unguento.
5. in Emplastro.

Emplastra tamen nimis unctuosa & emplastica, quæ poros oblinunt & infarciunt, semper sunt vitanda.

Exemplum Fomenti aut Suffitus discutientis.

R. Rad. enul.

ebul.

Bacc. junip. aa. ℥j.

Herb. orig.

Calaminth.

Puleg.

Roris mar.

Fol. laur.

Samb. aa. M. j.

Sem. anisi

Fœnic.

Cumin. aa. ℥ss.

Sterc. caprill. ℥i ss.

Coqu. modicè in f. q. ∇æ simpl.

sub finem adde

Vini Rhenan. ℥iv.

Colatura D. S.

Zeitheilende Bähung.

Decoctum hoc pro Fotu cum linteis multiplicatis vel spongiis novis repetitis vicibus applicandum; aut ex Decocto suffitus excipitur membro tumente.

Exem-

Exemplum Cataplasmatis discutientis:

℞. *Fol. lauri*

Rorifmar.

Rutæ, aa. M. j.

Flor. chamom. Rom.

Sambuc.

Sumit. anethi aa. M. ℞.

Bulliant in f. q. ∇ & vini ad mollitiem:

Pulpa trajectæ per setaceum adde

Far. fabar.

Furfur.

Sterc. vaccin. aa. ℞iij.

Mellis opt. ℞iv.

M. pro Cataplasmate: S.

Bertheilender Umschlag.

Exemplum Linimenti Diaphoretici.

℞. *Bals. Δ is terebinth.* ℞iij.

Peruv. ℞℞.

℞o *destill. fenic.*

Cumin. aa. ℞℞.

Camph. gr. vj.

M. pro Linimento, cum l. sine Cera. S.

Bertheilender Balsam.

Denique Emplastrum Diaphoreticum:

℞. *Empl. dial Δ is Ruland.* ℞ij.

Diachyl. c. G. ℞i.

Malax. c. f. q. ℞o destill. chamomillæ:

Inducatur super *alut.* pro Emplastro,
irrorando cum ℞o *destill. succini.*

D. S. **Bertheilend Pflaster.**

III. Remedia Tumorum in genere sunt suppurantia. Dicuntur ea, quæ pus generant; alio nomine Maturantia, & ob sanguinis in pus alterationem, quam à calore fieri existimant Veteres, quibusdam dicuntur Concoquentia. Et hæc habent locum in Tumouribus vel sanguineis simplicibus, vel cum sanguine complicatis; nempe dum sanguinis pars coagulata alique, sanguini tamen permisti, humores, aut cui sanguinis suffusio tandem supernit, ex acido præternaturali incipit effervesce, tunc ex acido isto in sanguine congruato, orto cum sale volatili massæ sanguinæ concurrente & effervescente, fit sanguinis totalis mutatio in aliam planè substantiam, quæ vocatur Pus: Salsum hoc est, natum scilicet ex concursu acidi peregrini & urinosi sanguinis, præponderare tamen in pure factò adhuc videtur acidum, ob quod albedo, cum acida oleosa & Δ eo Θ ina in colorem album cogere soleant, & hinc ulcera remanent mundificata.

Medicamenta ergo Suppurantia ad id adhibenda.

I. Ut Suppurationem reddant promptiorem, faciliorem; ut jucunde aut brevi tempore absolvatur, & cum minori ægri incommodo seu molestia. Facilitant Suppurationem omnia ea, quæ leviter & blande humectando salia ista duo resolvunt, ut resoluta promptius & citius in se invicem agant.

Tom. II. Pars 2.

2. Quæ acidum modice temperando, æquabilem cum urinoso fermentationem adjuvant.

3. Quæ penetrando coagulatum sanguinem nonnihil resolvunt, & ita suppurationem promovent.

Monstrant ergo hæc, quod medicamenta Suppurationem facilitantia debeant esse leniter humectantia, & alcali occulto & blando prædominante prædita pro acido temperando, simulque nonnihil emollientia & solventia, nunc magis nunc minus talia, pro acidi & humoris coagulati ratione varia. Ubi enim fortius est acidum, aciora; ubi contumacius est coagulum, magis solventia requiruntur remedia.

Jucundiores seu minus molestam Suppurationem reddunt:

1. Quæ salium acrimoniam temperant; sic enim majori impetu inter se agunt: unde & acor & punctiones tolluntur, atque salium mutua actio cohibetur, ne adeo impetuosè effervescent.

2. Quæ partem adstrictam laxant, & ita fibrarum contractionem dolorosam tollunt: unde dolor tensivus sensim longè redditur mitior, & præterea eruptio & apertio apostematis facilitatur.

Quæ huc faciunt medicamenta, sunt mucilaginosæ, & oleosæ substantiæ: nam hæc ambo salia (1) temperant (2) partem tumorem laxant: & hæc inter lac primum locum merito habere dicitur.

Suppurantia autem remedia ferè sunt sequentia: Rad. althææ, liliorum alborum, tusilaginis, bryoniæ recentis, cucumeris sylvestris, cepæ coctæ, cyclaminis, sigilli Salomonis, allium sub prunis coctum, &c. folia & herbæ althææ, malvæ, brancæ ursinæ, parietariæ, meliloti, chamomillæ, sambuci, ebuli, tusilaginis, Mercurialis; flores horum simplicium, violarum, crocus; semen lini, fœnugræci, hordei, tritici, orobi; mica panis albi cum lacte, caricæ pingues, passulæ, dactyli pingues, gummi ammoniacum, imprimis ubi opus est simul tumoris duri resolutione; terebinthina, thus, pix; adeps gallinarum, anserum, axungia porcina, medulla vituli, butyrum, pinguedo humana, sebum cervinum; vitellum ovi, cera flava, propolis, mel, lac, ℞o dulce, amygdalarum dulcium, liliorum alborum, chamomillæ, vulpinum, & similia; ∇ calida, hydroleum, ∇ non adeò rectificata, unguentum althææ, resumptivum, basiliconis, arregon. Agrippæ; emplastrum diachylon simplex & cum gummis; de meliloto, de mucilagibus, basilicon; fermentum, sapo Venetus; sterco bubulum, nidus hirundinum, lumbrici, & cum his parata externa.

[E]

Forma

Forma utendi est:

1. In forma Cataplasmatidis,
2. Unguenti,
3. Emplastri,
4. Fomenti.

Cataplasma suppurans sit hoc,

℞. *Rad. althææ*

Lil. alb. aa. ℥ij.

Fol. malvæ,

Violar.

Senecion.

Gal. aa. M. j.

nid. hirund. cum excr. No. j.

Mistacoqu. inf. q. ∇ *simpl. vel lactis*:

Pulpæ tractæ per setac. adde

Axung. procin.

Butyr. recent. non Cit. aa. ℥ij.

℞. *Lil. albor.*

Violar. aa. ℥i℥.

Farin. sem. lini ℥j.

Vitell. ovor. No. ij.

M. f. Cataplasma: S.

Maturirender Umschlag.

℞. *Cepar. subciner. coct.* ℥ij. ad iij.

Ficuum ping. No. vj.

Contund. in mortario calido, adde

Axung. anser. vel anat. ℥j.

Ungu. basilic. ℥vj.

Mell. Virgin.

Far. sem. lini aa. q. f. pro consistentia

Cataplasmatidis:

D. S. ut ante. Emplastrum maturans:

℞. *Empl. de Melilot.* ℥ij.

diachyl. c. gumm. ℥j.

Malax. c. Lil. alb. vel bals. ℥is,

Inducatur super alutam: D. S.

Maturirendes Pflaster.

ARTICULUS I.

DE TUMORIBUS SANGUINEIS.

MEMBRUM I.

DE INFLAMMATIONE.

QUoad Tumores sanguineos in specie, communissimus est Inflammatio. Loquor de Inflammationibus partium externarum; nam de internis superius actum fuit. Inflammationes scilicet Phlegmones omnes fiunt per motum sanguinis impeditum, & inde ortam sanguinis stagnationem, unde fit, ut oriatur Tumor, ex tumore Tensio, ex tensione partisque repletionem ad tactum renitentia, propter sanguinem stagnantem Rubor, propter sanguinis in arteriis impeditum motum Dolor pulsatorius, & tandem propter sanguinem calidum effervescentia insignis, & Ardor. Jam verò prout variat sanguinis crasis & constitutio, catenus etiam varia est inflammatio; nunc quidem genuina ex sanguine puro; nunc

vero spuria, ad erysipelata, vel oedematofos tumores, vel scirrhus propius accedens.

CAUSÆ.

Causæ Inflammationum externarum sunt vel læsiones externæ, vel spina quædam interna: Læsiones externæ sunt interdum sola transpiratio insensibilis, à frigore externo impedita. Interdum ab ictu, casu, contusionibus, facturis, vulneribus, ulceribus, & reliquis rebus extraneis violentis oriuntur. Imprimis autem simul cum rebus lædentibus fordes & aliæ quiescentiæ partibus intruduntur. Per spinam verò internam, ejusmodi parti infixam, intelligitur similitudo, quia, sicut spina extrinsecus digito infixæ infert inflammationem, ita in partibus internis heterogeneum, in vel sub digestionem prima enatum, vel digestionem publica obortum inflammationes infert.

PROGNOSIS.

Omnes Inflammationes vel insensibiliter discutiuntur vel suppurantur, vel malè tractatæ in gangrænam transmigrant.

CURA.

Pro Cura ergò ritè instituenda usurpentur externa & interna. Interna sunt sudorifera moderata de natura alcalium, tam fixa, quàm salibus volatilibus constantia, quæ sanguinem coagulatum resolvunt, & stagnationem tollendo eum in debitum motum revocant. Unde omnia ea, quæ aliàs in pleuritide sunt usitata, in quacunque inflammatione internè commodè possunt usurpari; v.g. sperma ceti cum antimonio diaphoretico, additis quibusdam salibus volatilibus, item spiritus nitri probè dulcificatus; nam hic sudorem movet. Ratione febris, in omni ferè inflammatione adjunctæ, si acuta magis eadem fuerit, interne conducunt nitrata, primariò nitrum antimoniatum, hinc trochisci de nitro Mynsichti, &c. Externè verò applicantur in principio post venæ sectionem revulsoriam, quæ sanguinem stagnantem resolvunt, denuò fluxilem reddunt: quæ inter primariò sunt Decoctum sulphuris cum urina, decantatum à Paracelsio, item stercus vaccinum, caprinum, equinum, album græcum, &c. impositum. Convenit etiam succus cancerorum fluviatilium recens calidè applicatus & renovatus, emplastrum de spermate ceti, balsamus sulphuris, emplastrum diaphoreticis, Rulandi, item fomenta & foci ex vegetabilibus blandis diaphoreticis & aromaticis, una cum vini spiritu camphorato extrinsecus applicati, item spiritus vini mixtus cum rob sambuci, imprimis ubi aliquid erysipelacei subest, flores sambuci sicce vel in forma Decocti aut cataplasmatidis impositi; in inflam-

inflammationibus malignis herba Paris sub forma decocti vel cataplasmatidis cum fuligine, conveniunt. Decoctum quoque calcis vivæ in forma Epithematis applicetur, vel solum, vel cum saccharo Saturni: v. g.

℞. $\nabla\psi\alpha$ lb. i.

Sacch. hni 3ij. M.

Vel cerussa cum oleo rosarum in mortario plumbeo in linimentum redigatur; loco cuius etiam Epithema convenit ad discutiendos Tumores inflammatorios:

℞. Lixiv. Ciner. sarment. vitis lb. j,

Di 3ib.

Θ 3j.

+ vini optimi 3i. M.

Confert non solum ad simplices Inflammationes crisipelaceas, vel œdematolas nothas, sed etiam imminens gangranam & sphacelum præservat: Vel

℞. Vini spiritus camphor. 3iij.

~Θ li volat 3b. M.

Quibus, ubi adhuc persistat Tumor inflammatorius, nec possit discuti, maturantia & suppurantia sunt subjungenda, temperata quidem, ubi est inflammatio legitima; quibus addantur acriora paulò ex cepis & similibus, ubi inflammatio est notha, seu, uti vocant, pituitosa, ubi nempe sanguis inflammatus pruriens chylo crudo & viscido est permixtus.

In æstu Inflammationis & ardore magno vitanda sunt pinguis & oleosa, fiantque fotus & cataplasmata emollientia, in sero lactis bene depurato cocta, & applicata; vel ubi deest ardor, in lacte ipso.

℞. Empl. de Melilot. q. f.

Mulax. c. 8. lil. alb. D.

℞. Empl. de Melilot. 3j.

Diachyl. compos. 3b.

Mulax. c. ungu. dialthææ. D.

Præ reliquis egregium est suppurans lac, in quo coctus sapo Venetus, plus minus, prout magis vel minus genuina est Inflammatio, appositum cum linteis multiplicatis, si his suppurata fuerit Inflammatio, tumor aperiendus, nisi spontè fiat, scalpello vel cauterio potenciali; hinc apertus abscessus purificandus & consolidandus: pro quo scopo vel balsamus sulphuris terebinthinatus vel balsamus Peruvianus cum melle & vitello ovi permixtus instillatus est optimus: e. g.

℞. Terebintb. clar. 3j.

Mell. rosat. 3vj.

Bals. Perv. c. vitello ovi sol. 3b. M.

Hæc enim omnibus satisfaciunt indicationibus, resolvunt, maturant, & factum jam abscessum purificant & consolidant. Sin sinuosi sint abscessus, pro mundificatione meliore conveniunt injectiones ex Decocto nicotianæ & plantaginis cum aloë & myrrha, vel ex

Tom. II. Pars 2.

$\nabla\psi\alpha$ cum spiritu theriacali temperata; quibus, si contumacior & malignior sit pro maiore mundificatione unguentum Ægyptiacum similiaque addenda sunt.

Facta mundificatione consolidatio spontè sequitur, pro qua facilitanda ommissis mundificantibus unguentum de tutia vel betonica vel emplastrum diapalmæ, aliaque similia desuper imponuntur. Vulgò in usû est in principio Inflammationum admove Interceptientia & Repellentia, Cataplasmata adstringentia ex bolo Armena, terra sigillata, sanguine Draconis, albumine ovi, mastiche cum aceto vini & similibus, qui eum in finem faciunt, ut hisce humoribus affluentibus, interceptiatur via, & qui jam effluxerint, retrò in sua vasa pellantur, & ita factus tumor atque inflammatio mox in prima radice curetur. Sed omnibus patet, quod hæc sententia cum circulatione sanguinis sit incompatibilis, quoniam interceptientia motui & regressui sanguinis per arterias sunt contraria; adeoque impossibiliter possunt conciliari cum sanguinis circulatione. Potius quæ adstringendo vias angustant porosque occludunt, aut quæ humores hac ratione & sanguinem inspissant, stagnationem sanguinis indeque ortam inflammationem augebunt periculosè, & ita malum deterius reddent. Propterea etiam hæc & similia Repellentia & Interceptientia (vulgò vocantur Defensiva) ex adstringentibus parata ferè in desuetudinem abierunt, qui in metu Inflammationis Refrigerantia dicta, uti ∇a spermatis ranarum, succus sempervivi majoris, plantaginis, aqua ψ , & ∇ solutionis h sacchari, & similia, commodius applicantur, non quod repellant talia, sed potius quod hæc & similia alcali occulto sint instructa, ratione cuius acorem occultum in incipiente inflammatione delent, & ita radicem inflammationis extirpant. Pertinet huc Decoctum ζ is in aqua simplici commendatum à Poterio, aut Decoctum sulphuris cum $\nabla\psi\alpha$. Hoc enim in principio impositum non repellendo, sed resolvendo acidum, inflammationem curabit. Plura de Curatione inflammationum in genere videbitis in Barbette Chirurgia.

MEMBRUM II.

DE ECCHYMOIMATE ET SUFFUSIONIBUS SANGUINIS.

Præter inflammationes subindè etiam ex sanguine oriuntur Tumores post confusione partium violentam, dum nempe ex contusione ruptis vasculis & poris transformatis naturalis sanguinis circulus inhibetur & stagnare incipit.

CAUSÆ.

Oriuntur ex Causa externa & ferè eandem

[B] 2

dem cum inflammationibus genuinis naturam habent. Nempe in suffusionibus stagnat in loco tumente sanguis ob poros vel vasa compressa aut lacerata; quæ enim contundunt, ea occasione faciunt dislocationem pororum & meatuum in parte contusa, & conterunt vasa capillaria loci contusi, hinc non potest non ob poros distortos impediri sanguinis motus, & consequitur suffusio sanguinis & ejus extravasatio, hinc extravasatus & stagnans subito corrumpitur, vita privatur, unde ex colore primitus quidem rubeo successive contusiones carulescunt, livefcunt, & tandem flavescent. Hinc in cadaverisato sanguine mox emergit acor peregrinus, qui sanguinem in grumos coagulat. Sanguis corruptus vel insensibiliter discutitur, vel si hoc fieri nequeat, fermentando in pus mutatur, apertoque abscessu evacuat, vel putrefactus gangrænam infert. Prius fit in contusione leviori, posteriùs in graviore, ultimum in gravissima, cum laceratione partium carnosarum & nervosarum.

C U R A.

Factâ jam contusione, & hinc nata sanguinis suffusione, imprimis opera danda est, ut sanguis extravasatus congruatus & acore inquinatus successive resolvatur, isque insensibiliter absorbeat, & per meatus seu poros corporis eliminetur. Conveniunt ergo remedia interna, acidum absorbentia, sanguinem congruatum resolvablentia, simul blandè nonnihil diaphoretica, ut simul cum sudore M. S. dissoluta, in meatibus partis contusæ impedita, faciliùs eos penetrare, & in debitum circulum remeare possit; Observando simul, ut imprimis, si sit suffusio partis cujusdam internæ læsæ, propinentur vel blandè laxantia, vel blanda diaphoretica. Si verò in locis externis hæreat, sufficiunt sudorifera. Eminent sperma ceti cum lapillis cancerorum, item cum succino albo præparato, cum coralliis rubris, in aceto vini dissolutis; vel etiam carbones tiliæ in vino hauriantur; sicut & salia volatilia in debita dosi sunt egregia. Cerefolium, & omnia ex eo parata liquida, etiam conducunt internè.

Externè simul imprimis Resolventia, & sanguinem congruatum insensibiliter dissipantia, sunt usurpanda. Communiter vinum calefactum applicant, quo adhuc potentior est vini spiritus probè rectificatus & flatu externè illitus, vel cum linteis applicatus, nunc simplex nunc camphoratus, nunc crocatus, acorem sanguinis temperans, sanguinemque fluidum reddens; cui insuper applicetur mel cum spiritu vini subactum: Efficacius erit, si vini spiritus societur cum theriaca, à qua dissolutione aromatica sanguis gru-

mosus arcetur ab ulteriori corruptione. Convenit etiam cum vino factum lixivium, spiritus salis ammoniaci cum vini spiritu paratus, sanguinem congruatum in gravioribus suffusionibus potenter discutiens, & in specie balsamus Peruvianus dissolutus in vitello ovi & spiritu vini est egregium remedium, in contusionibus partium nervosarum. Fodus ex decocto radicis bryoniæ cum vino, item chelidonium majus recens contusum, etiam egregiè conducit.

In Ecchymomate non adeo ingenti applicatio carnis crudæ, præsertim bubulæ in tenues lamellas sectæ, optimè conducit, Emplastrum de spermate ceti est admodum egregium, item unguentum Mynsichti ad livorem faciei est expertum. Insigniter etiam conducit emplastrum in Ecchymomate à casu factum ex theriaca & rob sambuci, cui parum salis absinthii, vel saccharum hni, fuerit additum: si fortiora requirantur, melius non habetur remedium, quàm radix sigilli Salomonis, contusa, in aqua vel vino cocta, & sub forma fodus aut cataplasmatibus applicata, Melius adhuc est, si addatur simul radix symphyti majoris,

℞. Rad. consol. maj. ʒiβ.

Sigill. Salom. ʒj.

Coqu. in vino ad consistent. Cataplasmatibus.

℞. Rad. symph. maj. ʒvj.

Sigill. Salom. ʒiij.

Herb. agrimon.

Cherefol.

Meliss. c. fl. vel summit. hyoscyami.

Flor. sambuc.

Chamomill. aa. M. j.

Sem. lini

Fœnu græc. aa. ʒβ.

Coqu. in f. q. Vini alb vel v simpl. ad consistentiam Cataplasmatibus: cui adde

Croci ʒi. M.

℞. Rad. symph. maj. ʒij.

Sigill. Salom. ʒj.

Summ. hyperic. M. j.

Albi Græci ʒvj.

Coqu. in f. q. Vini ad putrilag.

Trajectantur per setaceum & f. Cataplasma, cui adde

℞ hyper. ʒj.

Ungu. rub. potab. ʒβ. M.

℞. Rad. consol. maj.

Minor. aa. lbβ.

Sigill. Salom. ʒiv.

Herb. chamom. cum. flor.

Melilot. cum fl. aa. ʒij.

Farin. fabar.

Fœnu Græc. aa. ʒiv.

Croci

Croci ʒß.

Butyri non salit ʒv.

Coqu. radices usque ad consistentiam temperatam, deinde reliqua addantur pro Cataplasmate.

Probatissimum est in gravioribus contusionibus post prægressam cum spiritu vini camphorato inunctionem. Quod si partes nervosæ sint contusæ & Ecchymomate affectæ, id quod imprimis patet ex loco affecto circa articulos, item ex intensissimo dolore, tunc opera danda est, ut omne id, quod ex contusione fuit extravasatum, maturè discutatur & resolvatur, quia periculum est aliàs, ne materia corrumpatur, putrescat, & ita tendines partesque nervosæ similiter putrescant, & in gangranam abeant. Hoc ut præcaveatur, pro resolutione materiæ extravasatæ inungatur locus cum balsamo Peruviano & vini spiritu, item cum oleo castorei, lumbricorum terrestrium, chamomillæ & roris marini, vel foveatur pars sequenti Decocto.

ʒ. Rad. Ireos nostr. ʒiß.

Fol. rorismar.

Menth.

Major. aa. M. ʒ.

Coqu. in l. q. vini alb. D.

Interne in tali casu optimè propinantur aliquot guttæ olei destillati lavendulæ, imprimis ubi simul tensiones nervorum observantur:

De Cura magnetica mediante perficaria videbitis in Paracelsi Herbario. Refert non nemo, se in Gallia vidisse puellam, in tota facie per casum ab alto miserrimè contusam: huic, cum antè multa, sed in cassum adhibita fuissent, tandem muliercula suasit usum huius herbæ, ut trahatur per aquam frigidam: post loco contuso imponatur, donec incalescat, plantaque adhuc tepida postmodum sepeliatur post finem vel alium locum, ubi cito putrescere potest, & altero die statim sanata est.

Quod si his & similibus nequeat dissipari Ecchymoma, vel si suffusio sit grandior, & ad suppurationem tendat, tunc opera danda est, ut sanguis iste extravasatus maturetur, ut tandem facto abscessu aperiatur, & ulcus restitans convenienti modo consolidetur eadem ratione ac inflammatio. Verum non semper æque tutum est, ut discutatur suffusus sanguis & resolvatur; non minus quàm expectare semper maturationem. Nam interdum imprimis in partibus carnosissimis contusio adeò magna est, ut pars brevi post livorem contrahat, atque gangranam minuetur.

In tali casu, mox pars contusa profundè scarificetur, & sanguis extravasatus, congruatus, quantum fieri potest, extrahatur: hinc Decocta aromatica cum vino applicentur, vel aqua calcis vivæ, acuata cum spiritu

vini & xio dulci imponatur, ut ita gangræna scens pars conservetur. Item præter dictum casum non tutum est expectare maturationem, quando contusiones non sunt præcisè in partibus intercutaneis, sed paulo profundius, ita ut periculum sit, ne facta maturatione, antequam pus per partes superjacentes egressum inveniatur, quandam partem vicinam, v. g. os, corrumpat vel corrodat, vel, ne partes vicinas perforando, in cavitatem corporis nobilorem irrumpat: In his casibus non expectanda perfecta maturatio, sed maturè aperiendus est tumor mollefactus scalpello, & materia hærens extrahenda, hinc immittendum unguentum Ægyptiacum, cum Digestivo vel simili mixtum illitum, & factum ita ulcus solito modo consolidantibus & mundificantibus curandum.

Plura de Sugillationibus quibuscunque habent Forestus, Hildanus, Rulandus, Riverius, Scultetus, Barbette, & Job van Mekern.

MEMBRUM III.

DE ERYSIPELATE.

Porrò quod si fiat, ut subito cum gravioribus symptomatibus, nempe cum præcedente rigore, & subsequente gravi ardore, erumpat Tumor inflammatorius non adeò insigniter protuberans, intensè tamen coloratus & quasi igneus, latè diffusus, ac subinde latius serpens, cum intenso partis ardore & æstu ac sensu acutarum punctiōum, appellatur Erysipelas seu Rosa.

CAUSÆ.

Non oritur à bile, ut vulgò existimant, seu sale volatili oleoso simpliciter, sed potius occasionaliter à subtili ac volatili acido, quod cum sale volatili massæ sanguineæ febriliter effervesceat, & in parte quadam cutanea diffusum ibidem sanguinem in vasculis extimis coagulat, & ad stagnationem disponit; unde scorbutici levi de causâ laborant Erysipelate, hinc magis circa nervosa sanguinea loca simul, non circa sanguinem solum, oritur Erysipelas.

Subinde magis malignitas subest, ita ut in vitæ periculum conjiciat ægrum, imprimis quando erysipelas erraticum est, & per totum corpus vagatur, unde tunc ignis facer, interdum etiam Herpes erysipelaceus, à serpendo, vocatur. Interdum perlocicè & tunc plerumque singulis mensibus affligit.

DIAGNOSIS.

Signa interim ejus diagnostica cum signis inflammationis eadem sunt, Calor scilicet, Rubedo, Dolor & Febris, sub aliis paulò saltem circumstantiis observabilia. Nempe

1. Calor in erysipelate acrior & mordicans magis est.

[B] 3

2. Ru-

2. Rubedo magis purpurea & splendens, quæ quidem ad levissimam compressionem cedit, & maculam albicantem, mox denuò rubescentem, relinquit; quod non fit in inflammatione, nisi pars inflammata fortius prematur.

3. Dolor exilis est, nontensus, & saltem pungens.

4. Febris in erysipellate semper primaria seu comitata est, imò vehementior, tam ratione horroris quàm caloris.

Quibus omnibus accedit, quod erysipelas mox latius se extendat, & ad vicinas partes progrediatur.

PROGNOSIS.

Erysipelas à causâ interna præcipuè plethora, ac in adfueris, item in parte externa, pronatum, sine singulari periculo est; secus causâ externa, v.g. fractura, vulnere, &c.

Erysipelas in brachiis non ita frequens est, ac in pedibus; & quod in brachiis, diuturnius est quàm in pedibus, quia plerumque vel inflammationem aliquam conjunctam habet, vel bubonem sub alis, vel alium tumorem inflammatorium judicat.

Erysipelas mammarum puerperis ac lactantibus familiaris est, & plerumque ulcera post se trahit. Erysipelas malignum, sæpius lethale est, imprimis si vel in os, vel in anum per intestina, vel aliam corporis cavitatem, serpat. Erysipelas scorbuticum si inconcinne, aut per repellentia tractetur, periculosum est, cum facillimè exulceretur, & interdum aut in gangrænam, aut in ulcera cacoëthea maligna, chronica, aut facillè recrudescencia, ac sæpius longè latèque serpentina, (qualia in Italia sunt frequentissima) degeneret, & quibus vix, nisi generosioribus remediis occurrì potest: Conf. Hippocrates *Sec. 7. Aphorism. 20.* Præ cæteris periculosum est Erysipelas in parte nobiliori, ut in capite, si partes capitis externas, faciem imprimis, occupat.

Malum quoque est, quando erysipelas ab exterioribus ad interiora vertitur juxta Hippocratem *Sec. 6. Aphor. 25.* quod aut naturæ imbecillitate in erysipellate maligno, aut ab aère frigidiore, aut repellentibus applicatis, facillè fieri potest.

CURA.

Curatur aliàs facillimè, modo scilicet acidum istud vitiosum internis sudoriferis cum rob & remediis aliis ex baccis *sambuci* paratis jungendis, *infringatur*, & internis etiam temperatis alcalibus volatilibus, acidum subtile discutientibus, aut metallicis Saturninis, istud promptè absorbentibus, corrigatur.

Purgatio omnis est summè vitanda. Venæ sectio est periculosissima, nisi erysipelas à

contusione, fractura ac vulnere, ortum fuerit; in quo casu V. S. revulsiore institui debet. Sennertus quidem in *Praxi*, Wierus in *Obs. l. 1. cap. de Erysip.* multique alii, in plethoricis mox à primo principio purgationem & venæ sectionem commendant: cum autem erysipelas mox ad habitum corporis vergat, & sæpius cum malignitate complicatum sit, experientia quoque testetur, quod omnes cutaneæ excretiones purgantibus & venæ sectione facillimè retrocedant, econtra solis diaphoreticis & sudoriferis facillè expelli, ac per cutis spiracula efflorescere possint, ab illis omninò abstinendum.

Internè ergò solis diaphoreticis Cura inchoanda & absolvenda: pro quo scopo convenit imprimis rob *sambuci*, quibusvis formulis additum, aut pro vehiculo pulverum usurpandum, præsertim quando motus naturæ excretorius deficit, nec debite erysipelas efflorescere potest, tunc loco stimuli usurpatum rob *sambuci*, ad ʒi. cum aqua florum *sambuci* dissolutum, cum gr. xv. vel ʒi. Ois volatilis C. C. optimum est: si aliquantulum de camphora adderetur, esset eo potentius sudoriferum. Conveniunt quoque flores *sambuci* in lacte cocti, videatur Sennertus de Febribus, & Simon Pauli in *Quadrupart. Botan.* item essentia rob *sambuci* à ʒss. ad ʒij. propinata. Præterea antimonium diaphoreticum cum bezoartico minerali & cum cornu cervi sine igne, & similibus, & omnia illa, quæ de Inflammatione laudavi, per sudorem curant Erysipelas. Alias ubi faciem ac caput occupaverit erysipelas, ex cinabari antimonii parata remedia, & hinc specificum cephalicum, sunt optima: e. g.

R. *cinnab.* ʒi gr. xxvj.

Θ *volat. C. C.* ʒss.

succin. gr. vj.

laud. opiat.

camph. aa. gr. ij.

M. f. pulvis pro 2. Dosibus

R. *C. C. f.* Δe ʒss.

ʒij. *diaphor.* ʒi.

cinnab. ʒij. ʒss.

M. pro 2. Dosibus.

In declinatione demum lenè purgans superaddendum.

Externè omnia unctuosâ, mucilaginosâ, pinguiâ, & quæ sunt actu frigida, it. omnia adstringentia, magis quam ipsum malum sunt fugienda: Hæc enim oblinendo poros ex Erysipellate aut ulcus depascens faciunt, aut erysipelas in gangrænam tranſmutant: vid. Hildanus. Potius applicetur cortex *sambuci* medianus succulentus, vel folia raphani sylvestris contrita leniter; nam horum tal volatile optime corrigit acidum erysipelatis: it. optima est ∇ spermatis ranarum imposita, it. aqua sterco-

Arcoris bubuli mense Maio collecti & destillati. Convenit etiam Decoctum ex myrrha, thure seu olibano, in vino paratum, cui aliquantulum camphoræ & croci simul in fine additur.

℞. *myrrhe*,
olibani, aa. ʒʒ.
coqu. in *vino*:
colaturæ adde
camph. ʒi. vel ʒij.
croc. ʒʒ. M. pro cataplasmate.

℞. *flor. sambuc.* M. ij.
lithargyr. ʒv.
olibani
Myrrh. aa. ʒij.
croc. ʒʒ.
Pulverisata coqu. in
vini part. ij.
+ i part. j.
Colaturæ adde
camph. ʒj.

Applicetur calide cum linteis.

Convenit etiam Decoctum florum samb. cum vino, addito sapone Veneto & theriaca, vid. *Loffius lib. 1. Obs. 25.* Etiam vini spiritus solus, aut camphoratus, aut crocatus, vel etiam spiritus theriacalis camphoratus, erysipelati illitus, hinc sperma ranarum, & lintea hoc spermate probe imprægnata, & pannus linteus crocatus Mynsichti, optime resolvunt tumorem.

Ubi intensus est ardor, & dolor, opii nonnihil huic Decocto addendum erit, v. g.

℞. *myrrh.* ʒij.
sacch. Saturni ʒʒ. vel ʒij.
camph. ʒj.
opii gr. xv.
vini alb. ʒvj.

quæ invicem mista leviter bulliant, hinc confusa cum linteis duplicatis applicantur.

Nobile etiam *Epithema Zuvelfert in Pharm. Reg. p. 91.* est, quod cum linteis multiplicatis crebrius in die applicetur. In usu aliàs sunt pulveres, qualis Mynsichti ad Erysipelas. Fieri etiam possunt ex floribus sambuci, saccharo Saturni, thure, minio, myrrha, creta, cerussa, croco & camphora, & similibus: quæ invicem pulverisata inspergantur tumori, vel cum papyro griseo melle illito, vel imprægnato spiritu vini crocato;

℞. *flor. sambuc.*
chamom. Rom.
fol. hyoscyami aa. M. j.
myrrhe ʒij.
creta ʒij.
oliban. ʒj. M.

Pulvis spemiolæ compositus Crollii, cum spiritu vini vel vino calente subactus, egregium erit remedium propter camphoram, myr-

ham & crocum. Singularissimum est linteam tinctum cruore leporino, ex lepore quidem in venatione interempto, cui lintea immerguntur postmodum exsiccanda. Vid. *Helmontius Imag. Ferm. §. 13.*

Non minoris est efficacia, linteam sanguine primo menstruo virginis tinctum, & exsiccatum citra loturam applicatum erysipelati, Fel carpiorum applicatum specificum est, cum alcali temperatum ejus destruat acidum erysipelatis, it. lintea cum solutione saponis in aqua appropriata imbuta & exsiccata tepide admota: vid. *Solenander Sect. 5. Consil. 12. & 13.* atque *VVierus Observ. l. 2. cap. de Erysip.* Unum etiam ex optimis remediis est theriaca linteo illita. Melius est remedium, si ipsi addatur parum salis absinthii, tubigatur & in forma unguenti erysipelati imponatur: e. g.

℞. *pulv. fl. samb.* ʒij.
ceruss. ʒij.

Θ *is absinth.*

theriac. aa. q. s. Misc.

Sicuti etiam emplastrum seu unguentum ex rob. sambuci cum saccharo saturni impostum probe calide, est optimum.

Si facies & caput erysipelate laboret, suffumigetur mastiche & thure quinquies vel sexies de die.

Quodsi fiat, ut nihilominus erysipelas vel sponte vel male curatum exulceretur, ad curam hujus optima est aqua calcis vivæ cum ʒ fl. sambuci parata, linteis duplicatis calide, vel solum vel cum saccharo Saturni apposita, it. succus nasturtii inspissatus, cui saccharum saturni vel cerussa, lithargyrium, lac lunæ, crocus & is per præcipitationem, sit additum, imponatur erysipelati exulcerato, aut fiat saltem tale unguentum saturninum, euporiston Foresti:

℞. *lithargyr.* ʒij.

ungu. popul.

de cerussa.

Infrigid. Gal. aa. ʒij.

Θ *rosat. camph.* ʒj.

M. & ducantur probe in mortario plumbeo. Quia tamen hic morbus frequentius nonnullos ex quacunque causa externa, præprimis ira facile affligit, ejus præcavendi gratia commendantur primo Evacuationes circa æquinoctium verum atque autumnale, tam per venæ sectionem, quam purgationem instituendæ, pro diversa corporum constitutione: Deinde laudantur illa, quæ sanguinis æstus & acrimoniam temperant, v. g. lac cum floribus sambuci decoctum singulis decrescantibus lunis ter vel quater vel per totum annum, bis de die ad ʒviij. haustum: vid. *Solenander Sect. 5. Consil. 12. & 13.* Nec inutiles quoque sunt acidulæ sanguinis fervorem mitigantes.

ARTI-

ARTICULUS II.
DE TUMORIBUS & ABSCESSIBUS CRITICIS.

Porro ad hos Tumores sanguineos pertinent etiam Tumores & Abscessus Critici, vel, qui his similes, interdum symptomati. In morbis acutis & febribus, tam benignis quam malignis, oriuntur & fiunt per congestionem, nunc celerius, nunc tardius, dum nempe fermentum morbosum malignum unà cum partibus M. S. heterogeneis & corruptis beneficio fermentationis præcipitatum & correctum in locis extremis circa vasa capillaria in quodam loco hæret, sensimque coærvatur & stagnat, unde sanguini transitu præcluso tandem supervenit phlegmone & inflammatio suppuranda. Oriuntur tales Tumores nunc promiscue in partibus carnosis, nunc & primario in locis glandulosis: Et isti, qui in locis glandulosis emergunt, si in inguinibus aut sub axillis se manifestant, ordinario Bubones appellantur: sin vero prope aures appareant, Parotides vocari solent; aliis in locis, ubi glandulæ sunt minores, si propullulent, speciali nomine carent.

MEMBRUM I.
DE BUBONIBUS.

Bubonis vox utut propriè certam corporis partem, quæ posita est in flexura femoris circa inguina in utroque latere, tantum significet, tamen etiam tumori, huic parti, in hærenti, propter similitudinem partis affectæ & ipsius affectus sub axillis tumoribus enatis tribuitur.

Fiunt Bubones, quatenus vasa cubitalia & cruralia majora glandulas has transeunt, & sanguinem pro feri segregatione effundunt, qui propter crassitiem & visciditatem stagnans tumorem producit.

Bubones hi sunt nunc critici in statu morbi cum levamine ægri, nunc symptomati in principio cum virium dejectione: nunc tuti, quando circumscripti, prominuli, & quasi in acumen desinentes; nunc minus tuti vel infidi, depressi, oculi seu in profundo siti, & eadem est natura in hoc casu ac carbunculorum, nisi quod sint mitiores. Porro Bubones hi aut benigni sunt, aut maligni; Benigni, qui in febribus ardentibus in statu & declinatione superveniunt, ubi per *expiationem* heterogeneum cum lymphâ vitiosâ in dictas glandulas protruditur, illisque stagnando ac suppurando tumorem inflammatorium suscitât; Maligni, qui etiam contagiosi sunt, & imprimis in pestilentialibus febribus solent esse frequentes.

CURA.

Benignus Bubo, ut aliæ inflammationes,

præmissis sudorifero est discutiendus, & quidem iisdem remediis, quibus aliæ inflammationes solent suppurari: v. g. illinatur balsamus sulphuris, & applicetur desuper emplastrum de meliloto cum unguento dialthææ, & similibus.

In Bubone vero maligno pro malignitatis ratione Cura variat. Nempe sunt vel in febribus malignis vel in lue Venerea. In Bubonibus febrium malignarum, & pestilentialibus, omni studio cavendum, ne vel purgantibus vel venæ sectione naturæ motus turberetur, & in bubonum retrocessione lymphæ hujus ferocientis & miasmatis maligni excretio impediatur. In primo ergo principio interne danda sunt diaphoretica & alexipharmaca, imprimis sulphurea antimonialia, post sudorem julepi moderate aciduli propinandi, ut malignum fermentum, de natura alcalium acrium participans, his ipsis corrigatur & emendetur, simultamen corpus, in diaphoresi blanda conservetur & retineatur.

Præterea malignus Bubo ita tractandus, ut cataplasmatibus emollientibus sæpius impositis quamprimum maturetur & aperiatur, aut si profundus sit, foras quasi attrahatur, ne subito iterum dispareat: Nam quando retrocedunt tales Bubones, factum est de vita. Ad hoc ergo, applicandæ cepæ & allium sub cineribus coctæ, quibus permiscetur theriaca & fuligo furni, cum succo chelidonii: aut etiam buso, exsiccat & in vino maceratus, calide imponitur buboni; vel ex busone paratur cataplasma. Alias etiam cataplasma ex scabiosa cum fermento & sapone Veneto applicatum, tumorem maturat. Vel fiat Emplastrum vel Cataplasma ex foliis sambuci contulis, cum pulvere sinapi contuso subactis.

Optimum tamen est, ut nempe mox in principio, imprimis in cute densiori, vel bubone profundius latente, applicetur vesicatorium: hinc facta vesica prompte incidatur per transversum, quo facto applicetur emplastrum, quod vocant, tractivum.

*Rx. empl. diachyl. c. gummi.
de mucilag. aa. ℥ss.
ungu. basil. ℥iv.
sem. sinapi cont. ℥iij.*

Mista sub forma Empl. imponantur vesicæ apertæ; Loco hujus emplastri melius longe est emplastrum ex magnete arsenicali Ang. Salæ, aut Friderici Hoffmanni, vesicæ apertæ superimpositum; hoc namque mox malignitatem ita elicit, ut densa crusta oriatur, quæ facile & sponte fere separari potest.

Crusta separata & bubone aperto, ubi non fuerit sufficienter malignitas extracta denuo imponendum erit idem emplastrum, & hinc denuo facta crusta removenda, postmodum, ubi ulcus factum, cum balsamo sulphuris

phuris & unguento basilico & theriaca mundificandum, aut cum emplastro diapompholygos cum oleo nicotianæ digerendum, & cum emplastro diäsulphuris Rulandi consolidandum. Confer. Barbette Chirurgia, Diemerbroeck de Peste, & Nicolaus de Blegny de Lue Venerea.

Præter Bubones autem pestilenciales etiam observandi sunt Bubones Venerei, qui non sine malignitate existunt. Oriuntur ex acido viscido maligno in dicto loco successive coäcervato, idque laudabili naturæ conatu; nam sic præservantur à lue Venerea, ut non eadem corripiantur. Unde de his dicit Cardilucius in *Offic. Sanitat. p. 856. Apparent vero crebrius in sanguineis, aliquin raro vel nunquam, nisi gravissima lue Venereæ obnoxiiis, occultante scilicet elegante habitu corporis hostem inquilinum, eumque ad inguina protrudente.*

In Cura opera danda est, ut mature aperiatur & virulentia eliciatur. Pro hoc scopo imponatur emplastrum Vigonis cum Mercurio, malaxatum cum oleo destillato ligni quajaci, vel emplastrum diachylon compositum, malaxatum cum oleo destillato ligni sancti, vel emplastrum diachylon simplex, malaxatum cum oleo Philosophorum vel Qri volatili, quod Cardilucius tanquam discutiens præstantissimum commendat, ut hoc remedio emolliatur bubo; perfecta enim suppuratio hoc in loco raro aut nunquam accidit. Maturatus aperiatur apertione largâ, & materia evacuetur, mundificetur ulcus cum balsamo hyperici, mixto cum oleo destillato ligni sancti & Qri , vel cum unguento de apio, cui additum sit parum de Mercurio præcipitato vel arcano corallino, supponatur dictum emplastrum exterius.

Interne usurpentur primo lignorum Decocta, postea purgantia, in fine Θ & \sim viperarum.

Accidit sæpius, ut Bubones Venerei nullo modo maturentur, etiam legitime instituta diætâ sudoriferâ & salivatoria: in hisce tamen casibus, præter impositionem emplastri magnetici vel de cicuta, oleo Philosophorum vel saponis malaxati, vix quicquam applicandum, cum sensim sensimque tandem viscidissima hæc lymphæ in glandulis hisce quasi congelata resolvatur.

MEMBRUM II.

DE PAROTIDIBUS.

Parotides, die Ohrengeschwühe/ oriuntur plerumq; post male judicatas febres, quando nempe ægroti aut non, aut non sufficienter, sudarunt, unde post cephalalgiam in glandulas pone aures fausto naturæ conatu

Tom. II. Pars 2.

ex massa sanguinea præcipitatur heterogeneum, & protruditur.

C U R A.

Si sint benigni, maturationi opera danda, & tractantur sicut bubones benigni, & aliæ inflammationes ad suppurationem vergentes. Si vero ipsæ oriantur in febribus malignis aliisque morbis, semper fere sunt suspectæ, vid. in M. A. N. C. *Ann. 4. & 5. obs. 4. p. 6.* Unde sudoriferis naturæ conatus erit adjuvandus, ærem externum caute arcendo, & caput linteis, suffumigio quodam infectis, involvendo. Et si à natura sponte resolvantur, quod rarius fit, resolventia blanda usurpanda.

Consultissimum porius erit maturatione succurrere, eidem imponendo cepam sub cineribus coctam, cui oleum scorpionum fuerit additum: emplastrum etiam diachylon commode imponitur. Quodsi durior & pertinacior fuerit Parotis, emplastrum diachylon ireatum cum gummi ammoniaco in aceto dissoluto imponendum, quibus omnibus si olei destillati fœtidi, quajaci aut Qri parum addatur, multo promptius facilitatur suppuratio: post maturationem prompte aperiendus abscessus, & instar ulceris simplicis curandus.

Empyema à Parotide videbitis in M. A. N. C. *Ann. 3. Observ. 50.*

MEMBRUM III.

DE CARBUNCULIS.

AD hos ipsos Tumores malignos primario etiam pertinet Carbunculus Græcis *ἀνθράξ*, Germanis *Ein Carfunkel oder Pest-Geschwür*. Eadem enim est natura horum atque Bubonum malignorum, cum non raro in febribus malignis & pestilentialibus, ipsæque peste, & bubones & carbunculi simul oriantur, atque etiam ex eadem proveniant Causa.

Malignitas ista videtur consistere in fermento salino acri volatili & quasi caustico instar cauteriorum potentialium, quando effervescentia febrili præcipitatum & nonnihil separatum ex M. S. in extima cute & carne hæret, ibique causticâ suâ acrimonia & dolorissimum ardorem & subitam partis mortificationem, etiam livorem, hinc omnimodam nigredinem infert: propter talem enim partis in nigrum livorem corruptionem vocatur Carbo, item Carbunculus, cum inferat crustam in parte corrupta nigram instar carbonis; unde quibusdam etiam Pruna appellatur: Græcis verò eadem ratione vocatur *ἀνθράξ*.

Corruptio ista in Carbunculo obvia, dico, quod oriatur ex sale acri & caustico maligno. Nam acida corrosiva non inducunt nigredinem morficantem, sed primo intensam

[C] rube-

rubedinem, hinc consequentem albedinem infensilem, acria vero lixivialia omnimodam partis mortificationem & nigredinem inducunt, quæ subinde ulterius proserpit cum dolore ardente: id quod similiter fit in Carbunculis, ubi etiam talis subitanea nigredo, livor & mortificatio cum diffusionem in longum & latum mox sub primo conspectu se manifestat.

Carbunculus quidem, quando in febre vel morbo maligno oritur (in specie in peste) manifestat se primò exigua quadam pustulâ, aut albicante aut livescente, interdum simul plures tales exsurgunt pustulæ, à quibus brevi mora subsequente ardore & dolore acerbo excitatur ulcus crustosum, simile ipsi, quod ferro ignito vel candente solet excitari: interdum citra ullam præcedentem pustulam mox talis crusta in carbunculo incipere solet, excitaturque ulcus crustosum in crusta modò livida, modò cinerea, modò omnino nigricante. Crusta tandem emortuâ decedente ulcus putridum in carne profundum, & hinc inde putrescendo latius serpens, subsequitur, carnem circum circa depascens & mortificans. Caro adhuc sana in confiniis carbunculi inflammatur cum intensâ phlogosi & ardore, unde circa omnem anthracem simul adest circulus ex inflammatione admodum dolorosus, rubeus quidem instar erysipelatis, interdum coeruleus, in Carbunculis malignis aut lividus, aut nigricans.

P R O G N O S I S.

Quo magis hic circulus est rubeus, eo salubrior est Carbunculus; quo vero lividus magis fuerit, aut magis nigricans, eo periculosior est anthrax: sicuti etiam, quo magis rubet aut minus livet carbo, eo etiam securior est; quo verò magis livescit aut nigrescit, eo periculosior: sicuti etiam periculosus est, qui in locis nobilioribus erumpit, cum optimus sit, qui in artubus carnosus se manifestat.

C U R A.

Malignitas ergo Carbunculi caustica & acris, de lixivialium acerrimorum natura, optime mortificatur & curatur per suum contrarium, nempe per acidum: hinc enim est, quod nihil magis resistat Carbunculo, aut quod potentius enecet ejus malignitatem, quam butyrum istud Antimonii acidissimum: si scilicet in centro carbunculi, *in der Mitten auf der Spitze* cum pluma illinatur butyrum ʒij. ad quantitatem nummi, vel, quod melius est, ducatur circulus beneficio plumæ huic butyro intinctæ circa mortificatum anthracem, in confinio nempe cum parte sana; sic namque his modis optime virulentia carbunculi caustica extinguitur, & ulterior mortificans progressus potenter inhibetur: & hinc separatur pars ægrota & mortua carbunculi à

parte vicina sana, ut ulterius serpere nequeat, quin intra circulum contenta pars à carbunculo mortificata sponte excidat, & postmodum ulcus mundificandum, ac more consueto consolidandum relinquitur. Notum est aliàs, quod sympathetico modo circulus circa anthracem ductus à saphiro, annulo incluso, etiam inhibeatur progressus ulterior carbunculi, quin carbunculus excidat, & ulcus cavum relinquat.

Commode etiam potest adhiberi nobile emplastrum magneticum arsenicale Angeli Salæ, quod ipsum applicatum etiam brevi inducit crustam, qua separata illinatur unguento lene maturante, crustam suppurante. Si adhuc malignitatis carbunculi quædam subest suspicio, denuo applicandum est emplastrum, donec virulentia ejus fuerit extincta; hoc factò, ulcus mundificandum, diu apertum servandum, ac tandem consolidandum. Hoc ipsum tamen emplastrum, ut in corpore robusto cuteque densiori melius & promptius operetur, commodissime carbunculo prius imponitur vesicatorium.

Vel loco vesicatorii scarificetur Carbunculus, & post scarificationem dictum emplastrum applicandum. In defectu hujus emplastri post discissam vesicam, vel post factam scarificationem, communiter unguentum Ægyptiacum illinunt.

Notum alias est, quod in vulgari Carbunculos curandi ratione soleant post factas scarificationes imponi Cataplasmata ex scabiosa, succisa, uva inversa, calendula, cum cepis sub cineribus coctis, cum sicibus, cum fuligine, cum fermento, busonibus pulverisatis & similibus: it. imponi solet post scarificationem emplastrum de fuligine, emplastrum diachylon cum gummis, & similia. Valeriola insigniter commendat in suis Observationibus *Cas.* 6. duo remedia, post scarificationem tam carbunculis, quam etiam bubonibus pestilentialibus, applicanda.

Alias quoque balsamus ʒis ad mundificandos & curandos bubones & carbunculos optimus est.

Cum his externis etiam internè conveniunt alexipharmaca sudorifera, in specie antimonialia fixa: quibus Julepi blandè aciduli temperati ex citro, cydoniis, spiritu salis, spiritu vitrioli, & similibus adhibenda sunt.

M E M B R U M I V. DE FURUNCULIS.

Furunculi sunt inflammationes parvæ in locis extimis, tamen glandulosis, conspicuæ, in acutum tuberculum tendentes, ovum columbinum magnitudine non excedens cum rubore & dolore, interdum atrocissimo cum ardore, ac si carbo ingneus admotus esset.

Dicun-

Dicuntur ita à Furore , Germanis *die Blut-Schwähre*.

C U R A.

In Cura applicandum est emplastrum citrinum, vel alia maturantia ac malactica, ut maturetur & suppuretur Furunculus. Repellentia quàm maxime nocent, cum materia vitiosa repulsa longe deteriora excitet symptomata; sicut ex levi Furunculo sæpissime anthraces satis malignos evasisse *Cardulucius in Officin. Sanit. pag. 856.* observavit.

Furunculus apertus sponte coalescit: si hoc non fiat, tantillo balsami Peruviani consolidari solet, vel imponatur emplastrum de meliloto.

M E M B R U M V.
DE PHYMATIS

Phyma est tumor glandularum rotundus, acuminatus instar plantæ seu arboris, quæ in parte inferiore est plana, in superiori acuminata, plus minus rubens ac dolens, qui statim augetur, & suppuratur. Dicitur ita à Græco *φύμα*, nascor, Germanis *ein hysige Beule*. Hippocrates *Aphorismo 26. Sect. 3.* ad morbos pueriles refert, quia hos maxime affligit.

C U R A.

In Cura à Repellentibus cavendum. Maturatio per emplastrum citrinum, imo solam inunctam salivam promoveri potest; cum natura potissimum in hujus suppuratione occupata sit.

M E M B R U M V I.
DE PHYGETLIS.

Phygetlon, Latinis Panus, est Tumor durus Phymate major magisque rubens ac dolens, expansus instar pani seu fungi arbori adnascens, in locis glandulosis emergens.

C U R A.

Curatur Discutientibus, pro quo scopo convenit *Œri foetidum* vel ligni quajaci. His interdum & Emollientia cum anodynis junctis adduntur, unde laudatur cataplasma ex foliis & radice atriplicis, malvæ, althææ, farina triticea, &c.

Pus statim evacuandum, & vulnus consolidandum.

M E M B R U M V I I.
DE PARONYCHIA

Paronychia Germanis dicitur *der Wurm* oder *das Ungenandte*/cujus appellationis rationem videbitis in Sennerto *l. 5. Prax. P. I. cap. 14. p. 78.* Hanc quod attinet, est tumor ordinario obveniens in extremitatibus digitorum, ita tamen, ut non excludantur reliqui articuli. Quandoque est erraticus, &

Tom. II. Pars 2.

ex uno digito in alium transit, ita ut uno persanato mox vicinus inquinetur, donec omnes successive infestaverit: tantus est dolor, ut subinde universum brachium consensu afficiatur.

C A U S A.

Oritur ex humore acri admodum corrosivo, circa unguium radices effuso, immediate periostium & ipsi adhærentes tendines occupante. Supervenit inflammatio, eaque in Apostema vergit, imo interdum, nisi rite tractetur, ante factam apostemationem ad gangrænam vergit: nam brevi ossiculum articuli extremum fit cariosum, nec curatur, nisi illo ablato, quod facile fit, modo volsella mature extrahatur. Illustratur hoc à Boneto in *Anat. Praë. l. 4. Sect. 2. p. 1544.*

Occasio hujus acidi est ut plurimum ex læsione ossis, articulos constituentis; tunc enim ex osse transsudat nutrimentum proximum, unde acorem contrahit, & partes afficit, unde dolor.

C U R A.

Pro dolore hoc sistendo, præmissa purgatione Mercuriali, nil melius est remediis ex lumbricis: nempe lumbricis sub cataplasmatibus forma contusis, vel lumbrico vivo imposito, vel liquore lumbricorum in clibano facto, spiritu lumbricorum, & similibus, digitis illitis: quod etiam facit balsamus sulphuris & emplastrum diachylon cum gummis. Dolorem quoque & tumorem discutit, atque, si fieri potest, mature ad suppurationem perducit linimentum ex aurum sordibus cum saccharo saturni, commixtum cum paucis oleo avellanarum expresso. Certum experimentum dicitur, si ovo recenter excluso & calido digitus imponatur: vid. Sorbait *Med. Praë. Tr. 5. cap. 24. p. 634.*

Convenit etiam, si digitus intrudatur in sterquilinum; vel recipiatur linteam, quod humectetur cum sterquilinio, & calide digito dolenti applicetur. Interdum tamen lanceola vel forfice aperiendus tumor, interdum fissura in ipso ungue cultello facienda, quo ichor illuc effluere possit: quo citius enim ichor maturatur, eo minus periculum est ossis cariei. Ubi autem Paronychia altiores egerit radices, opus est incisione, per longitudinem & latitudinem fibrarum usque ad ipsum os, ut recte monet cum allegato Boneto Sorbait *l. a.* vid. Hildanus *cent. 1. obs. 97.* Forestus *observ. 26.* Glandorpius de *Paronychia*, & Rulandus in *observ.* Facta incisione ad Boneti imitationem theriaca cum vini spiritu soluta digito applicanda; toti vero manui defensivum; quæ inter non inelegans est, quod Sorbait loco allegato commendat.

[C] 2

Huc

Huc quoque pertinet affectus perniciosissimus, qui pollices pedum cum doloribus atrocissimis infestat, & nihil aliud est, quam Paronychia pedis digitorum, cui gangræna & sphacelus, & tandem mors, subsequitur.

Febris plerumque conjuncta est, nunc continua, nunc sola ephemera, per longiora intervalla rediens.

Causa est eadem, ac de Paronychia jam dixi.

In Cura cavendum à Repellentibus, cum horum usu pars affecta in gangrænam & sphacelum abeat: potius unà cum internis diaphoreticis, & acrimoniam temperantibus, emplastrum diachylon cum gummis aliaque emollientia & suppurantia anodynis juncta applicanda, quibus si ichor circa ungues stagnans in pus laudabile suppuretur, res salva erit: Ulcusculo instilletur vel balsamum vulnerarium Prævotii, vel de copaibe.

His nihil proficientibus, ipsa digiti resectio tentanda, de qua vid. Hildanus, & Job van Meckern. Cum autem sola inflammatio partes vicinas occupet, ad præcavendam gangrænam vini spiritus, vel spiritus theriacalis camphoratus, applicetur; sublata enim inflammatione gangræna latius serpere non potest, modo portiuncula sphacelata ad vivum usque resecetur.

MEMBRUM VIII. DE PERNIONIBUS.

His subinde inflammationes superveniunt, affligunt imprimis partes extimas nerveas; tales enim tument, & ex albedine ad aliquam coerulescentiam inclinant, dolent, ita ut nunc cum, nunc sine exulceratione evanescant, & semper, quoties inclementia aëris & frigus instat, dolor increseat.

CURA.

Ut præserventur perniones, nil melius est, quam petroleum illitum, quod & præservat, & factos jam curat. Pinguedo etiam anserina vel cati sylvestris contra frigus externum præservat, si membra eo illinantur. Item terebinthina loco refrigerato, dum imminet frigus, denuo cum vesica bubula imposita. Juxta hoc oleum pini destillatum nobile est præservativum & curativum. Vel

℞. *o. terebinth.*

petræ aa. ʒiʒ.

salv. ʒʒ.

spicæ ʒi.

camph. ʒʒ. M.

℞. *o. express. rapar. ʒj.*

destillat. terebinth. ʒʒ. M.

℞. *o. expr. rapar. ʒʒ.*

petræ alb. ʒij.

destillat. succin. ʒi.

terebinth. ʒʒ.

c. f. q. *Corp. pro Balsam f. Balsamus.*

Crocus cum spiritu vini, imprimis camphorato, membris applicandus. *Borellus C. 3. Obs. 32.* frequentem manuum ac pedum frictionem cum fragis recentibus commendat; unde & loco spiritus vini ~ fragorum, l. vini spiritus rectificatus, cui fraga recentia infusa, sæpius applicari potest. Si vero gravius læsa sint partes à frigore, tunc optimum est cataplasma liquidum ex fermento, aceto destillato, & sulphure ʒij. calide applicatum; Alias notum est, quod contra hos nil melius sit præ nive gelidissima, si partes mane & vesperi hac vel glaciei frustulo probe fricentur; vel rapæ frigore congelatae, in specie exliccatae, frigide applicentur; sicut & horum decoctum est egregium; unde etiam unguentum de rapis Mynsichti est elegans ad perniones curandas. Vel

℞. *Unguent Hin. Zwelff. l. Balf. Hi simpl. ʒiʒ. ad ʒij.*

o. petræ l. Philosoph. ʒʒ. M.

quo partes affectæ mane & vesperi fricandæ, sic tumor imminuitur, & prompte tollitur.

Prodest etiam serum cervinum, pernionibus mane & vesperi illitum.

Ruptis pernionibus imponi potest emplastrum spermatis ranarum camphoratum, si vero jam exulceratae sint perniones, præter unguentum de rapis Mynsichti recipiatur rapa, & mediocriter excavetur, infundatur oleum rosarum vel hyperici, & assetur sub cineribus calidis: quo facto si post expressionem linimentum applicatur pernionibus, easdem solet restituere & consolidare.

Parari potest linimentum simplex ex rapis gelidis cum butyro. Aut perniones eluantur cum decocto raparum, & post imponatur unguentum tutiæ.

Alias expertum est linimentum Sculteti in Observationibus, constans ex baccar. recent. juniperi M. j. butyri cocti ʒiv. Ante applicationem pernionibus exulceratis inspergatur pulvis ex stercore humano combusto, vel spongia cynosbati calcinata & pulverisata. Tachenius *Tr. Morb. Princ. p. 129.* typham aquaticam inspersam mirabiliter sanare asserit.

Item mucilago seminis cydoniorum cum aqua solani extracta, addendo parum tutiæ præparata, convenit, si cum linteis multiplicatis applicetur pernionibus exulceratis. Modum, quo Boreales perniones, imo ipsam gangrænam à frigore oriundam, curare solent, videbitis apud Bartholinum *Tr. de Nive.* Plura de Pernionibus legere potestis apud Forestum, Schenkium, & Severinum.

ARTI-

ARTICULUS III.
DE TUMORIBUS EX
LYMPHÆ VITIO.

SI fit, ut ex impedito lymphæ motu, propter vasâ lymphaticâ, aut obstructâ aut ruptâ, aut aliter affectâ, lymphæ sit præternaturalis collectio & stagnatio in parte quadam, oriuntur Tumores, qui vocantur serosi seu aquosi, molles nempe ad tactum, laxi, indolentes, & qui interdum ad lucem vel candelam lateraliter considerati fere pellucidi apparent. Nam hæc ipsa lymphâ in cavitate quadam corporis collecta dat hydropes, uti notum est, particulares, quæ in totius corporis peripheria congesta, dat Anasarcam.

PROGNOSIS.

Tumores hi serosi sine ingenti sunt periculo, saltem, quia subinde sunt comites aliorum affectuum.

CURA.

Scopus pro cura horum tumorum est, ut potenter discutatur & resolvatur lymphâ stagnans, quibus ipsis simul imprimis obstructentes humores in vasâ lymphaticis liquefiunt & resolvuntur.

Conveniunt ergo imprimis ∇ calcis vivæ, vel per se vel cum vini spiritu ebria, sæpius calide cum spongiis vel linteis applicata, & subinde renovata. Conveniunt imprimis stercore animalium, primario quidem caprillum, hinc stercus bubulum; scilicet fiat Cataplasma ex stercore bubulo, cui permisceatur semen cumini pulverisatum: hæc duo excipiantur linteo vel spongia lixivio acri humectata, & imponantur ita (præmissis internis universalibus,) parti, in qua est tumor serosus. Vel convenit emplastrum paratum ex baccis lauri, vel hydropicum Augustanorum, imprimis tamen de baccis lauri mixtum cum ana stercoreis caprilli, quæ cum melle rediguntur in Emplastrum.

℞. Empl. hujus ℥ij.

de Melilot. 3vj. M.

Convenit etiam, ubi fortius agendum est tale Cataplasma:

℞. sterc. vacc. ℥℔.

columb. ℥ij.

Δ vivi ℥℔.

Os ℥ij.

mellis

℞i aa. ℥℔.

farin. fabar.

bacc. lauri.

sem. cumini aa. ℥℔.

o. anethin.

nardin. aa. ℥j.

vini alb. Gallic. q. s. pro cataplas.

Cum his externis jungantur interna, tam diuretica, quam in specie diaphoretica, inter quæ Decocta sudorifera, in specie ex ligno juniperino & sassafras parata.

MEMBRUM I.

DE OEDEMA.

EAdem lymphâ, sed vitiata, imprimis crassâ nimis, ex pituita, ut vocant, viscida h. e. ex chylo crudo, massæ sanguineæ permisto, & hinc inde distributo, si stagnet: id quod fit imprimis in extremitate manuum & pedum, dat Tumorem, qui vocatur Oedema.

Oedemata sunt tumores molles, laxi, & qui prompte cedunt digito prementi, pressio- nis etiam hujus vestigia diutius retinent, imprimis foveam, & successive denuo protuberant, indolentes sunt & albicantes, sæpius in cruribus, rarius in brachiis, se manifestant, & oriuntur à materia crassiori in partibus hærente. In Leucophlegmatia totum corpus oedemate laborare videtur. Rarum est, quod hæc oedemata per se oriantur, frequen- tius aliis superveniunt morbis, imprimis chro- nicis, ut phthisi, asthmatis, &c. & fere in- choamentum habent hydropis; interdum succedunt affectibus soporosis ac convulsivis, similibusque, febribus intermittentibus; & quidem his in declinatione superveniunt, in specie febribus acutis, & tunc fieri solent im- primis, quando præmature ægri lautiori diæ- ta utuntur. Gravidis etiam familiaria sunt.

PROGNOSIS.

Si per se apparent, malum signum est, quia metus est, ne morbi chronici superveniant.

In genere in junioribus minus periculi ha- bent oedemata, quæ in senibus debent esse suspectissima, cum sæpius mortem imminen- tem portendant; sicuti etiam in phthisi con- rumaci seu confirmata oedemata pedum mor- tem fores pullare indubitato innuunt.


CURA.

In Cura præmissis internis, imprimis sto- machicis & aromaticis, elixyr proprietatis an- tiscorbuticum, remedia ex roremarino, li- gno sassafras, & Essentiæ, catarrhalis, con- veniunt: item remedia ex seminibus calidis majoribus, anisi, foeniculi, & similibus, etiam noduli laxantes & alterantes vino infun- dendi, in genere omnia ea, quæ alias ad ca- chexias usurpari solent, & intermistis inter- dum etiam simul sudoriferis & diureticis, im- primis in oedemate post febres intermittentes.

Externe optime applicantur diaphoreti- ca & potenter resolventia, nunc salinis alcali- bus, acrioribus, nunc vero aromaticis tempe- ratoribus, constantia, nam resolvendo &

[C] 3

discu-



discutiendo curantur œdemata, rarissime aut nunquam suppurantur. Conveniunt ergo omnia aromatica, in specie Cataplasmata & Fomenta ex absinthio, roremarino, chamomilla, pulegio, salvia, ruta, floribus sambuci, juniperi, radice cucumeris asinini & similibus, in lixivio communi vel vino decocta, in forma nunc fomenti mediantibus sili-
cibus ferventibus excipiendi, nunc cata-
plasmatis applicandi. His convenientissime stercora animalium adduntur, v.g.

R. fol. tamarisci

rorisinar.

rutæ aa. M. j.

Bulliant in ∇ vel vino ad mollitiem: adde

farin. cicer.

furfur. frum. aa. \mathfrak{z} ij. vel iij.

sterc. vaccin. \mathfrak{z} ij. vel jv.

axung. anat. \mathfrak{z} ib.

mellis opt. \mathfrak{z} iv. M.

Applicatur mane & vesperi œdemati & partibus œdemate tumentibus, donec detumuerint.

R. herb. rorisinar.

bacc. junip. aa. q. v.

ebulliant in ∇ simpl. & lixiv. q. f. fiat Pediluvium, quod in pedibus œdematosi est egregium.

Lixivia in dictis casibus sunt optima: vid. Hartmannus & Platerus. Convenit etiam emplastrum de baccis lauri, malaxatum cum petroleo, vel oleo destillato succini, quotidie bis repetitum. Vel etiam præparetur suffitus aceti super lapides candefactos.

R. succini pulveris. \mathfrak{z} viii.

acetivini lbj.

Infund. lapidibus candefactis, & excipiat fumus pedibus aut partibus œdematosi, postmodum applicetur dictum emplastrum.

Juxta hæc, si acia desiderentur, eminet aqua benedicta Chirurgorum, seu aqua calcis vivæ, & lixivium ex cineribus sarmentorum vitis; applicetur cum spongia nova, ubi pars prius fuerit illita cum adipe porcina. Meliorem successum habet hæc aqua applicata, si cum eadem bulliat sulphur commune aut bac-
cæ lauri contusæ: Tale lixivium est, quod discutit dicta œdemata, sicuti & thermarum usus commendandus.

Ubi durius ac pertinacius sit œdema, recipiendum est stercus caprillum, & hoc bene subigendum cum urina humana, vel ipsius ægri: Coquuntur invicem ad crassitiem pul-
tis seu cataplasmatibus, quod calide imponen-
dum: Vel firmus equinus misceatur cum farina hordei & aceto.

Emplastrum hydropicum Augustano-
rum notum est in vulgus: it. inunctio cum
oleo Philosophorum, hyperici, in specie

cum petroleo aut cum oleo tartari fortido re-
ctificato aliquoties à C. C. usto, quod etiam
per se illitum mirum est. Non inferius est
oleum quajaci destillarum.

Si hujusmodi œdemata in declinatione
febrium & morborum, vel acutorum vel
chronicorum, dum ægri denuo strenue
edunt, oriuntur, imprimis vespertino (nam
matutino tempore solent cessare & evanesce-
re) optime applicatur Geranium Rupertia-
num cum absinthio contusum instar cata-
plasmatis. Eiusdem efficaciz est quoque che-
lidonium majus recens contusum, & plantis
pedum impositum. Laudatur etiam pedilu-
vium ex cinere sarmentorum vitis cum cala-
mintha, origano, malva & chamomilla.

In tumoribus pedum œdematosi hec-
ticorum ac phthysicorum omnia sunt frustranea,
nisi quis ægris blandiri velit, ut aliquid agere
videatur.

MEMBRUM II.

DE SCROPHULIS.

Similis lymphæ viscida & vitiosa, simulque
sapore non nihil adstringente & austero
prædita, ac acido occulto imprægnata, si in
poris & meatibus glandularum colligatur,
coaguletur, & ab acido proprio sensim inspif-
setur, ac ibidem indurefcatur, dat tumores
glandularum, quas vocant Strumas seu Scro-
phulas *Kröpfen*/ quæ frequentius equidem
collum, utpote quod ubique glandulis obfec-
sum, rarius alias partes occupant, ut ut sub-
inde mesenterium his repertum observatum
fuerit.

Ipsæ Scrophulæ & Strumæ, imprimis in
collo, sub duplici sunt differentia: vel sunt
mobiles & pendulæ foras prominentes, vel
immobiles seu fixæ, quæ aliarum partium vi-
cinarum musculis profundius intertextæ sunt.
Porro ad tactum strumæ sunt vel duræ, vel
molles, colore albicantes, vicinis partibus
colore similes, suntque vel dolentes vel indo-
lentes, & tales sunt strumæ legitimæ: dolen-
tes vero sponte & punctiõibus spontaneis in-
terdum molestæ, aut quæ colorem subcæru-
leum vel sublividum repræsentant, sunt no-
thæ, sed ex acidi vitiosi & corrupti abundan-
tia cancroræ, unde non facile curandæ. Le-
gitimæ sunt benignæ; illegitimæ vero ma-
lignæ.

CURA.

In Cura ergo emolliendæ sunt strumæ &
resolvendæ successive, per remedia potenter
resolventia emollientia ac discutientia, visci-
da liquefacientia, & acidum viscidum corri-
gentia: quæ inter est gummi ammoniacum ac
reliqua gummata in ∇ to soluta, inspissata,
emplastri forma loco strumoso imposita. Lo-
co hujus emplastrum Mynsichti de Galbano
croca-

crocatur, de ammoniaco, de cicuta Hildani, vel solitarie, vel cum g. ammoniaco in ϕ o soluto, commode imponuntur. Pinguedo viperarum in strumis incipientibus egregia medicina est, earumque progressum & incrementum præcavet. It. forus cum spongia & calcis vivæ ebria, est convenientissimus. Cataplasma etiam resolutivum Foresti, uti & ex foliis & radice cucumeris asinini paratum, emollit & resolvit glandulas strumosas, quod potentius est adhuc, si cum stercore caprillo fuerit subactum.

Hæc si non suffecerint, ad potentiora accedendum est, quæ inter præceteris eminent Mercurialia, sub viva forma addita. Hinc expertum est emplastrum de ranis Vigonis cum ϕ io, vel ex gummi carannæ cum Mercurio & terebinthina subacta, fiat emplastrum ad imitationem Barbette: Habetur sic amalgama Mercuriale; ex quo & cum quo emplastra parata sunt egregia. Vel *emplastro diachylon cum gummiis*, v. g. \mathfrak{z} j. addi potest \mathfrak{z} ii \mathfrak{v} iii \mathfrak{z} j. Vel

R. *Ungu. Martial.* \mathfrak{z} j.

ϕ o *myrtin.*

laurin. aa. \mathfrak{z} ß.

\mathfrak{z} ij. *viv. flor.* Δ *extinct.* \mathfrak{z} ij. M.

Hoc Strumis imponendum, & quotidie renovandum.

In quibus tamen ϕ ialibus semper inspicendæ sunt fauces & gingivæ, an forsan ex earum usu immineat salivatio.

Gruelingius lib. 5. *Medicine Practicæ*

P. 3. c. 19. omnia linimenta & emplastra corio canino densò illinit.

Oleum destillatum Helmontii, in *Scriptis*, in *Tr. Tartarus Non Est in Potu* §. 15. quod invenitur jam olim descriptum in *Epistolis Medicinalibus* Langii *Epist.* 4. lib. 3. illud potenter resolvit & insensibiliter discutit Strumas, quod etiam facit oleum Philosophorum & iridis nostratis per infusionem paratum.

Quod si emolliri aut resolvi nequeant scrophulæ, usurpanda sunt successive ad quandam suppurationem ducentia, ad quam scrophulæ legitimæ interdum sponte tendunt. Ad suppurationem præstat imprimis emplastrum de meliloto cum oleo amygdalarum dulcium & pinguedine serpentum subactum, aut unguentum diachylon cum gummatibus commodè maturat scrophulas, vel cataplasma ex cucumere asinino, emplastrum magneticum Angelis Salæ, cum emplastro diaphilphuris mixtum, ad imitationem Fabri in *Cura Canceri* Curat. 97. Vel applicetur emplastr. de nicot. Plateri, C. 1. *Obs.* 28.

Scrophulæ dum suppuratæ sunt, non statim aperiendæ, sed quam diu fieri potest, clausus linquendus est abscessus, propterea,

ut eo major glandulæ strumosæ pars per maturationem in pus abeat; Aperto ergò abscessu, imprimis tota strumosa glandula absumatur, sufficit vel solum commune digestivum ex terebinthina, vitello ovi & melle illitum vel quod melius est, permisceatur cum tali digestivo \mathfrak{z} probe ablutus; Absumptâ in totum strumâ, ulcus glandularum relictum mundificandum, & solito modo consolidandum erit. Pro mundificando sufficit balsamus Δ is.

Si verò glandulæ sint pendulæ, commodè filo seu seta equinâ pedetentim constringendæ sunt, ut sensim marcidæ spontè separentur; si verò propriis tunicis sint inclusæ, subinde necesse est, ut, cum discutientia & suppurantia sint frustranea, Chirurgi manucurentur, prospiciendo ut membrana tota tollatur, quod saltem fieri potest, ubi non magna vasâ aut nervi ad glandulas tendunt.

Hicce externis commodè subjungenda sunt interna ut plurimum fixa acidum istud vitiosum lympham scrophularum inquinans, absorbentia, qualia sunt ex spongiis combustis, earum lapidibus calcinatis, ossè sepia, pumice cum zingibere, pipere, & similibus, remedia viperina, arcanum duplicatum, pumex præparatus, præmissâ tamen internâ purgatione ex helleboro nigro & ϕ io dulci. Facit quoque huc pulvis Helmontii contra strumas, qui vid. in c. l. item pulvis Arnoldi Villanouvani contra strumas, dosi \mathfrak{z} ß. Vel fiat talis pulvis.

R. *Spong. marin. comb.* \mathfrak{z} iiij.

oss. sepia.

maxill. lucij pisc.

lap. Sr. præp.

pip. long.

zingib. albi

rad. pyrethri

gallarum

test. ovar. calcin. aa. \mathfrak{z} j. M. F. Pulvis.

quotidie decrecente luna dosi \mathfrak{z} ß. usurpatur.

Magis appropriati redduntur pulveres, si cujusdam p. ij. vel iij. miscentur cum p. 1. arcanni duplicati Mynlichti, dosi \mathfrak{z} j. ad \mathfrak{z} ß.

In potu commodè infunduntur vel decoquuntur rad. scrophulariæ, filipendulæ, & harum herbæ, genista & similia. Vincetoxicum decoctum & exhibitum scrophularum Antidotus vocatur in M. A. N. C. *Ann.* 1. *Obs.* 57. Lacertarum cum aceto præparatarum pulvis nobilis est, qui etiam redigitur in Electuarium.

Huc quoque facit manus & sudoris mortui affricatio: Conf. Wedelius *Physiolog. Sect.* 3. c. 27. p. 189. Denique haustus potus ordinarius ex cranio hominis sepulti ad tempus continuatus singulariter conducit ad strumas, in specie colli.

MEM.

MEMBRUM III.
DE SCIRRHO.

Scirrus vocatur Tumor durus tactui renitens, qui sensim ut plurimum generatur in partibus mollioribus, & indolens est, & loco immobilis, & præter glandulas occupat alias partes imprimis carnosas, sive internas, nempe viscera, sive externas quascunque.

CUR A.

Nascitur ex coagulatione aut sanguinis, aut chyli crudioris, aut utriusque simul: Ex sanguine coagulato, quando inflammationibus male tractatis, imprimis per Repellentia adstringentia, supervenit; Ex chlyo crudo & viscido, cum sanguine hinc inde distributo, vel etiam cum alieno vehiculo, qua ratione oedemata epithematis nimis valide discutientibus tractata in scirrhum degenerare solent: quo pertinet etiam Tumor mammarum ex lacte coagulato, qui & ipse interdum scirrhefcit, & tandem tam durum scirrhum, quam scrophulam generat: Interdum simul & sanguis & talis chylus viscidus per poros partium in specie viscerum transeundo successive hæret, congeritur & coacervatur, idque coagulatur in talem scirrhum autore acido præternaturali, aut nimio, aut fixo, aut austero, aut alio simili modo vitiato, dictam materiam coagulante. Causa remota & occasionalis, præter febres chronicas, mensium aut hæmorrhoidum suppressionem, sæpe sunt fracturæ: vid. Wisemannus *Chir. l. I. cap. 19.* Item contusiones, vid. Hildanus *cap. 3. Observ. 79.* & Wisemannus. l. a.

In his scirrhis probe observanda est differentia & distinctio: Scirrus vel indolens est & legitimus, vel dolens & præterea nonnihil livefcens & nothus, qui subinde est concrosus, unde si curatur, periculum est, ne in cancrum degeneret.

PROGNOSIS.

Scirrus imprimis inveteratus, difficulter curatur, cum nec resolvi, nec commodè suppurari possit, & causa ejus sæpe maligna, & scirrus facile in cancrum degeneret: vid. Hildanus *C. 3. Obs. 79.* & *C. 6. Obs. 75.*

CUR A.

Curantur imprimis mature, aut, insensibiliter resoluti, aut, quod rarius & etiam periculosius, si tandem suppurentur & degenerent in abscessum. Acidum ergo coagulans temperandum est, & durities facta emollienda.

Faciunt huc Resolventia fortiora, discutientibus moderatis nec adeò acribus permitta. Id quod faciunt imprimis remedia ex nasturtio, erysimo, cholearia, cruce, cicuta, mandragora, nicotiana, scrophularia,

cucumere asinino, ac similibus, imprimis sub forma emplastri succulenti vel cataplasmatibus applicata, donec tumor scirrhus emollescat. Stercus bubulum aceto incoctum & applicatum scirrho, tumores quam plurimos mirifice dissipat. Oleum lumbricorum terrestrium, olei tartari destillati paucum, & vini spiritu dilutum & illitum, optime curat scirrhum: Nam certum est, quod oleum ζ ri rectificatum, fortidum licet, mire resolvat, & tumores duros potenter discutiat & emolliat, quod etiam facit oleum Philosophorum, vel saponis.

Cataplasmata ex radice bryoniae cum stercore caprillo imposita similiter egregia sunt, vel applicetur Cataplasma resolutivum Foresti, aut fiat Cataplasma Thoneri:

Præcæteris tamen gummata potentissimè resolvunt, nempe bdellium, galbanum, opopanax, & ammoniacum, si scilicet vel solum gummi ammoniacum in aceto solutum inducatur alutæ & applicetur sub forma emplastri, melius adhuc est, si emplastrum de cicuta vulgare misceatur cum gummi ammoniaci in aceto; Hinc emplastrum spleneticum Aquapendentis, paratum ex gummi ammoniaci & succo cicutæ; Item emplastrum diachylon, vel de meliloto, cum duabus partibus gummi ammoniaci mixtum, scirrhum emollire solet.

\mathcal{R} . *Succ. cicutæ expr.*

mandrag. aa. ζ iv.

Coqu. in tigillo assiduè movendo ad extracti liquidioris consistentiam: adde

Galb.

Gumm. ammon. cum \mathcal{R} o sol. aa. ζ iii.

Empl. de melilot.

diachyl. simpl.

Terebinth. aa. ζ ij.

Croci Orient. ζ ij.

*Θ *ci ζ j.*

*\mathcal{O} * ζ i fact. ζ ib.*

Ceræ q. l. M.

Hoc applicatum dolorem equidem primitus movet: sed tertia quaque die novum est reiterandum.

Aliàs etiam emplastrum Hildani laudatur ab Autoribus, cujus descriptionem videbit. in *C. 6. Observ. 75.* emplastrum dia-sulphuris Rulandi, item emplastrum diachylon cum gummis, commodè etiam applicantur.

His non satisficientibus, & Mercurialia ex \mathcal{R} io vivo parata commodè etiam scirrho legitimo imponuntur. Hinc emplastrum de ranis Vigonis cum duplo \mathcal{R} ii applicari potest: Vel sequens:

\mathcal{R} . *Empl. diachyl. c. gumm. ζ ib.*

\mathcal{R} ij. vivi ζ ib. ad ζ ij. M.

Vel pinguedo suilla cum oleo laurino & Mercurio vivo in mortario lapideo cum pistillo

stillo ligneo subigatur, donec fiat unguentum. Convenit etiam solum lamina plumbea hydrargyro illita & imposita, vel etiam ad scirrhos Clostri, vel emplastrum Magistrale, quod habet Agricola in *Chirurgia Parva* p. 689. sufficit ad tollendum & percurandum scirrhum.

Quodsi his ipsis & similibus, & imprimis Gummi ammoniaco, non possit legitime discuti aut resolvi Scirrhus, tunc necessitate urgente ad maturationem in pus, quantum possibile, deducendus est, temperatis tamen, sed nonnihil acrioribus, quam in inflammationibus fieri solet, non tamen nimis oleosis nec mucilaginosi remediis: talia nempe imponenda sunt, quæ alcali quidem, sed temperato, constant. Nam nimis suppurantia periculosa sunt, quia scirrhus quicunque sub maturatione facillime abit in Cancrum, cumque exulceratum: quod observetur imprimis in scirrho dolente, & colore nonnihil livefcente. Hildanus *cap. 6. Observ.* 75. habet unguentum in tumore scirrhoso ad Cancrum inclinante, quod etiam in scirrho mammae mulieris, ubi metus suberat Cancris, optimum fuit.

Dolens ergo Scirrhus puncturis occultis molestus, ad tactum dolens, colore livefcentis, in subiecto vel jam ad senectutem vergente, vel cui ordinarius aliàs hæmorrhoidum aut mensium fluxus est suppressus, si non potest sensim resolvi & successive absumi insensibiliter & citra suppurationem, aut in tactus omnino est relinquendus, aut applicatione nitri in aceto dissoluti in lapideam duritiem indurandus.

Quidam tumoribus scirrhosis, præmissis universalibus, cauteria potentialia applicanda commendant, vid. Hildanus *Cent.* 3. *Obs.* 79. quæ tamen vitanda, præsertim quando scirrui in Cancrum degenerare volunt, vid. Hildanus *Cent.* 6. *Hist.* 75. Pergo igitur ad

MEMBRUM IV. DE CANCRO.

Cancer est tumor planè singularis, ac omnino sui generis. Primò quidem vix ciceris ac pisi aut fabæ magnitudinem adæquat, successive modò citius modò tardius incrementum capit, & sub isto parvo initio tuberculum istud durum, nigricans, interdum lividum, punctationibus quibusdam molestum esse solet: Ubi Cancer augmentum accepit, apparet tumor durus, coloris plumbei aut lividi, dolens in principio moderate, in augmento vehementius; Ubi verò est exulceratus jam, ardor est acerbissimus, instar aquæ fortis corrodens & depascens partes vicinas molliores, cum insigni in ulcere putridine ac fœtore: adest in incremento Cancris,

Tom. II. Pars 2.

aut ubi jam ad exulcerationem vergere incipit, fervidus ardor, pulsatio punctoria molesta, & ambiunt tumorem venæ hinc inde turgidæ, & nigro sanguine distentæ, tanquam pedes cancrini hinc inde extensi, donec exulceratus tandem Cancer, nisi ferro aut igne deleatur, miserâ morte ægros occidat.

Qui tamen per se rariùs inchoat, nisi forsan in mammis; cum sæpius alios tumores, in specie scirrhos, & strumas subsequi soleat, si malè tractentur; Nam Cancer creberrime occupat mammæ, & loca glandulosa alia; sic namque in locis glandulosi ulcera deteriora fiunt, quæ subinde ad cancri malignitatem accedunt.

Post has glandulas occupat Cancer frequentius, si per se incipiat, faciei partes externas, nempe os, nasum, labia, & similia. Si nasum, os vel labia occupat, dicitur Noli me tangere; item Lupus. Pariter etiam genitalia, tam virilia quàm muliebria, sicut sæpius & ipse uterus ex partu difficili, aut impuro coitu, cum annexis Cancro afficiuntur.

CAUSÆ.

Occasio hujus interdum est causa externa, nempe contusio, contrectatio inclementior, vel alia læsio mammae, aut aliarum partium glandulosarum, qua tunc in parte læsa colligitur tale fermentum malignum, quod sub feri vehiculo unâ cum acido corrosivo sensim sensimque circa casâ capillaria varices efficit, dum illic stagnat, ac corrodingo latius serpit; ubi tamen simul vasa capillaria propter vim quasi illatam constringuntur, adeoque, dum sic toti massæ sanguineæ transitus præpeditur, Cancer oritur. Ubi principium ejus diu latere potest, donec sua sub dierum maturitate supervenientibus causis internis, in specie in scorbuticis quibusdam, hypochondriacis, melancholicis, hysteris, lue venerea affectis, &c. mensium fluxu suppresso, aut hæmorrhoidibus deficientibus, ut fere in ætate evenire solet, tandem se manifestet & augmentum capiat. Interdum etiam retentio viscidioris lymphæ in ipsis glandulis, accedente acido corrosivo, causa antecedens hujus affectus est. Cum ergo varia hæc ad Cancris generationem concurrant, hinc ejus productionem ad unam saltem causam remotam vix referre possumus, excepto illo, qui à certis & jam dictis subiectis prædispositis contagio propagatur.

Causa proxima Cancris communiter statuitur humor melancholicus adustus, seu, ut alio nomine venit, atra bilis, id est, si intelligibili sensu explicetur, acidum volatile insigniter corrosivum, de natura quasi arsenicali, in quo ipso, in specie si exuberat, duplex

[D]

plex venenum esse, non inepte asserit Hildanus, nempe putrefactivum & corrosivum.

Hoc ipsum acidum est occultum in Cancro incipiente, crescente & nondum exulcerato; manifestum verò in Cancro exulcerato.

Latet autem istud acidum, quamdiu à novo acido vitioso nullum augmentum capit, aut quamdiu per applicata externa non irritatur seu in effervescentias cogitur, aliàs enim levi irritatione effervescit, unde acor malignus sic se explicans ulcus constituit cancerosum, seu cancerum exulceratum, qui Veteribus, Hippocrati & Galeno, citra totalem partis extirpationem ferro & igne fuit incurabilis. Modernis autem, licet paucissimis, per certum quoddam alcali Aereum citra partis jacturam curabilis.

Occultum fieri manifestum seu exulcerari ferè, patet ex superveniente dolore, repulsatione punctoria molestiore, ardore, & canceri insolita intumescencia, donec perfectum prodeat ulcus.

PROGNOSIS.

Cancer est affectus gravissimus, quo plures moriuntur, quàm restituuntur, vid. Franciscus de Roma Consult. 21. utut non absolutè lethalis sit, ille præprimis, qui à causa externa oritur, vid. Wisemannus *Chirurg. p. 20.* & quia non, nisi generosis remediis curari potest, periculosà etiam applicatione malum fit difficilius.

Cancer, qui totam M. S. & viscera interna inquinat, periculosus est, vid. Avicenna de Cura Canceri, Forestus. l. 4. *Obs. 5.* & Franciscus de Roma Consult. 22. in Append. & experientia testatur, una mamma concrofa rescissa alteram mox cancro affici.

Cancer, qui immediatè sub cute hæret, facilius curatur, quàm qui profundius latet; unde cancer oris, vaginæ uterinæ facile quidem exstirpatur, commodè tamen non cicatrifari potest.

Qui vasis majoribus propinquius, aut in mamma costis arctius cohæret, difficilius curatur.

Cancer cum dolore & hæmorrhagiis frequentioribus grave malum est.

Cancer exulceratus periculosior est Cancro non exulcerato.

CURA.

De modo curandi per remedia, vid. discurs. Alliot in *P. 1. Act. Hassn. p. 158.*

Cancros ergo hos occultos non attingere melius est, monente Hippocrate l. 6. *Aphor. 38.* cum per medicamenta discutientia, suppurantia & erodentia attracti facilius exasperentur & alterentur; unde postmodum ægri citius intereunt: aut si attingi debent, palliative

saltem tractentur, incrementum eorum præcavendo, & excessivum gradum acidi temperando & quasi edulcorando, per medicamenta imprimis Saturnina, acidum quodcunque, quale nempe est in aceto & ~u nitri, edulcorantia, aut per vegetabilia temperata, alcali fixo & ferè insensibili prædita, vulgò refrigerantia dicta, nempe plantaginem, solanum, cicutam, quibus Canceri fluviales, stercus humanum, ranæ, bufones, & similia animalia accedunt; quædam internè, quædam externè conveniunt; internè remedia ex Cancris, acidum nimium in corpore absorbentia, ejusque proventum impediunt.

Inter externa ergo, ex vegetabilibus est cataplasma ex cicuta recenter impositum; Hinc omnes species intyborum, atque Decoctum solani, aut succi horum vegetabilium, item scabiosæ, geranii Robertiani, herniariæ, plantaginis, mitigant Cancrum incipientem. Solani nempe folia teruntur in mortario heo & imponuntur locis, vel subigitur succus in mortario plumbeo. Solo succo onopordi contusi quidam apud Borellum *Cent. 2. Obs. 51.* à Cancro narium curatus fuit, ubi plantago, si mammarum Cancris applicatur, laudatur: Vid. *Cent. 2. Obs. 67.* Vid. pariter Agricola. Præ cæteris poma putrida applicata, aut aqua pomorum putridorum, & cum hac parata ∇ calcis vivæ, est optima, quin & Canceri fluviales contusi in mortario plumbeo, & succus eorundem in simili mortario probè agitatus, optimè applicatur partibus.

Fiunt etiam unguenta ex Cancris fluvialibus huic usui destinata. Hinc stercus humanum impositum, aut oleum & aqua stercoreis humani destillata applicata, optimè conducunt. Ranæ etiam virides dant unguentum & oleum, quod describit Sennertus.

Saturnina imprimis dixi esse utilia & his cognata, hinc Saturnus calcinatus, lithargyrium, cerussa, saccharum Saturni, unde usurpetur emplastrum de Saturno, nempe ex oleo rosarum, diutius in mortario plumbeo cum Saturno calcinato terendo tamdiu, donec fiat Linimentum crassum & lividum. Unde etiam unguenta, & liquida Cancro occulto applicanda, omnia subigenda sunt in mortariis seu vasis plumbeis; sicut etiam unguentum ex plumbo usto, plantaginis, solani succis, &c. habet Amatus Lusitanus l. a. quo etiam pertinet unguentum de tutia, diapompholygos, &c. imprimis si his oleum & cineres ranarum admisceantur. Vel

Rx. *hni usti* ʒi.

o. *rosar.* ʒiib.

Croci ʒvi.

Mista ducantur in mortario plumbeo calidè cum pistillo plumbeo.

Hinc

Hinc emplastrum Saturninum Mynsichii, item emplastrum de carne bubula ejusdem, optime conveniunt, oleum ranarum ducatur diu in mortario plumbeo, addendo C. C. utri & huius calcatum q. l.

Constat etiam lamina plumbea, primo simplex, postmodum gio incrustata, cancroso minori artius applicanda: Vid. Amatus *Libellus Cent. 3. Cur. 32. & Praxis lib. 7. cap. 1.* Amalgama huius cum Hno, *Elapsum lib. 1. Obs. cap. 47. & lib. 6. cap. 51.* etiam habet Ceratum de Saturno.

Vid. Wedelius *Tr. de Comp. Medicamentorum p. 185.*

Nec negligendi etiam sunt Fonticuli, e. g. brachii in cancro mammarum intuli, quos commendat Claudius in *Respons. Med. 25.* Hildanus *cap. 6. Obs. 22.* & Ludovicus Mercatus *Chir. l. 2. c. 7.*

Interne his ipsis succurrendum est appropriatis, unde præmissis absorbentibus, & acidum causticum invententibus, v. g. antimonio diaphoretico Joviali, saccharo ac magisterio Saturni, & similibus, vel seorsim vel junctim, quotidie bis vel ter assumptis, imprimis usurpanda purgantia ex helleboro nigro, cum Mercurio dulci propinanda. Item conveniunt etiam in specie remedia ex fumaris, borragine, baglossa, portulaca, &c. quæcumque hinc hinc, saccharum Saturni, &c. R. huiusmodi, spiritus tartari volatilis per fermentationem parandus, &c. Conveniunt etiam lac, cui canceri fluviales incocti, quod commendat Claudius *l. a.* & pro acido diluendo serum lactis, decoctum theæ à Kypetro olim laudatum, decoctum radicis chinæ, fassaparillæ, ligni sassafras, herniarie, de quibus vid. Riverius *Pr. lib. 15. c. 10.* Præteris pulvis millepedum præparatorum, à H. ad 36. usurpatus, singularem habet virtutem, in specie si manus occupaverint: propinatur cum omni illorum cancerorum. Cum his legitima intermissione, quæ solâ etiam multi cancerosi per plures annos sine incommodo vixerunt: Conf. Amatus *lib. 3. Cur. 32.* Vitetur vinum, utpote minus volatile corrosivum augens.

De Cura Canceri exulcerati interius *Artic. 6. Cap. 3.* habebimus, ubi de leucis cancerosis, quæ vix nisi arsenico cedunt, in talem Cancerum exulceratum, gingivæ in Cancer occultus, scirrhi & scrophulæ dolentes, etiam ejusmodi quædam livida dolentes, v. g. polypus narium, quædam v. g. & similes, facile degenerant, si scilicet crescunt, vel livescant, vel sint dolorosa tractentur.

Primum inter nimis est dolor eorum punctorum lancinans, qui oritur ex eo, quod acidum et volatile corrosivum inest.

Tomei Pars 2.

obscure fibrillas quasdam nerveas & vicinas partes, vel ob sui excessum, dum non satis habet, à quo imbibatur, vel in specie, quia infestat partes sensiles nerveas & fibrillas facile irritabiles, vel sit dolor ob occultam, quam istud acidum jam concipit, effervescentiam ad exulcerationem dispositivam, cum qua semper simul ardor quasi & æstus in loco dolente concurrere solet, si tantillum ergo acidi in effervescentiam concitetur, etiam porro in exulcerationem promovetur.

Scrophulæ ergo & scirrhi, & similes tumores dolentes, aut non sunt attingendi, aut tentandum ut iis, quibus canceri occulti ad tempus palliantur, successive discutiat removeri possint: id quod tamen, nisi appropriatis internis succurramus, vix fit citra metum recidivæ, aut orientis canceri occulti in alia corporis parte.

Hæc de Tumoribus ex congestione & stagnatione enatis. Sequitur

MEMBRUM V.

DE GUMMATIS GALLICIS.

Quod attinet alteram Tumorum speciem, ex alimento partis proprio corrupto aut alterato, paulatimque coacervato oriundum: pertinent ad hos imprimis Gummata Gallica, de quibus supra, ubi de Lue Venerea.

MEMBRUM VI.

DE TUMORIBUS RECIDIVANTIBUS.

Pertinent huc Tumores post curatos abscessus & ulcera sæpius recidivantes: Nempe sæpius post abscessum induratum non rite mundificatum, & nimis maturè consolidatum, aut post ulcera partium, imprimis nervosarum, alcalibus balsamicis non rite mundificata, aliquid de fermento ulceris corruptivo, tantillo licet, remanet, aut si post ulcera occulta ossis subinde caries, etiam carie non rite sublata consolidata, recidunt tumores insignes, qui pederentem de novo suppurati novos abscessus & ulcera faciunt, de quibus inferius.

In his & similibus casibus alimentum partis proximum attahitur, & in materiam acrem subacidam mutatur, & in novum tumorem collectioni ansam præbet. Unde successive dolor oritur, his enim ex causis tumor & inflammatio & irritatio supervenit, & tandem per suppurationem abscessus renovatio, idque toties quoties occulta caries in osse non fuerit perfecte curata.

CURA.

Cura est eadem, quæ ulcerum, propinando interne potiones vulnerarias, in specie

[D] 2 cie

cic tamen opera danda est, ut salibus volatilibus M. S. purificetur, & fermentum stomachale in naturali vigore conservetur, & acidi proventus prohibeatur, externè verò probè mundificando ulcus vel abscessum de novo factum, & diutius apertum conservando. Mundificatur vel communibus digestivis cum balsamo Δ ris rite preparato, vel balsamo Peruviano cum oleo nicotianæ, aut simili. Quodsi pertinacius fuerit malum, imprimis quando suspicio est latentis forsân malignitatis Veneræ, præter interna dictis mundificantibus semper de Mercurio, aut dulci aut ω ato, parum addendum erit.

MEMBRUM VII. DE CALLIS, GANGLIIS, ET SARCOMATIS.

AD hos Tumores pertinent etiam Calli, Ganglia, & Sarcomata, quando nempe pars quæcunque, tam carnosâ quàm nervea, ex quacunque causa, imprimis externa, ita lædatur, ut ejus nimia extensio, staminum fibroforum nerveorum laceratio, pororum & meatuum ex naturali figuratione confusio & inordinatio fiat; tunc enim fibrillis partium lætis alimentum proximum partis uberius recipitur, diutius retinetur, & magis, quàm pars requirit, assimilatur. Atque his occasionibus fiunt Tumores congeneres, seu ejusdem naturæ cum partibus, quibus adherent; v.g. circa ossâ fractâ Calli, in tendinibus Nodi seu Ganglia, *die Ober-Beine* / in partibus variis carnosis Sarcomata seu Excrecentiæ. Unde Ganglia admodum familiaria sunt Religiosis Romanentibus, quibus oriuntur à frequenti genuum prostratione in tabulas lapideas, imprimis hyberno tempore, quâ sensim circa genua partes membrinosæ & tendinosæ unâ cum carnosis concutiuntur, simili modo ac pueri vesicas bubulas aut suillas concutiendo ampliores faciunt, adeoque successu temporis uberiori alimenti proximi receptione & assimilatione majus incrementum capiunt.

CURÆ.

Curantur facile vel emolliendo & resolvendo eadem insensibiliter: id quod locum habet in Callo nimis excrecente in ossè fracto, cujus curationem videbitis in Schenkii & Hildani Obs. Idem locum habet in Gangliis & Nodis: vel curantur Tumores aperiendo & radicitus excindendo, id quod imprimis in Sarcomatis seu Excrecentiis carnosis faciendum. Vel Ganglia & Nodi resolvuntur per folium sempervivi majoris detractâ pellicula internâ arctè ligatum, & quotidie, mane & vespere, renovando. Item Nodus & Ganglia in principio discutit vel resolvit lamina plum-

bea, vel sola, vel cum gïo vivo illita, & superimposita, aut loco gïi lamina plumbea oleo destillato juniperino illita imponenda; hujus loco etiam ω Pri foetidum, item saponis Veneti, expertum depradicatur remedium. Conveniens etiam est, si applicetur gummi ammoniacum in aceto solutum, ac postmodum emplastrum figens; ein *Hefst-Pflaster* / superimponitur. Vel

*12. Emplastr. diaphoret. Myns.
de ammon. For. aa. ʒj.*

ω Prifatid. ʒj. M.

Vid. M. A. N. C. *Anno. 3. Obs. 326. & Ann. 6. & 7. Observ. 101.* Curantur denique etiam Ganglia, si illinantur cum Ψ temperato, cum succo rutæ; Vid. Borellus *Cent. 1. Observ. 15.* Interdum solum gummi ammoniacum in forma emplastri impositum satisfacit. Pertinaci malo convenit emplastrum de ranis Vigonis cum Mercurio: Vellamina plumbea, infusa spiritu vini & aceto destillato, & adperso euphorbio applicata Gangliis, successivè illa evanescere cogit.

Sarcomata verò abscindenda & excidenda sunt, in casu, quando nempe non adherent nervis, vel quando sarcomata non conspirant cum vasis insignioribus arteriosis & intalem excreverunt magnitudinem, ut manibus commodè ea ad radices usque prehendi & excindi possint. Sectio autem decussatim facienda, cutisque incisa crucis formâ à cystide avellenda, cystisque ad radieem sarcomatis liganda ac stringenda, trajecta prius acu sub ejus radice; hac probè constricta ac ligata sarcoma cultro vel novacula sub filo abscindatur. Sedata hæmorrhagia heterogenea substantia membranosa vel fibrosa crystallis lunaribus fricetur, vel pauxillo butyri ʒij. attingatur, & blandè exedatur, ut radix emoriatur, nec novus denuo tumor excreseat: postmodum radicaliter est tollenda per suppurantia: Suppurationi sufficit unguentum *Ægyptiacum*, vel suppurantia communia; postmodum per emplastrum quoddam glutinans, vel alia consolidantia vulneraria adstringentibus mista, pars læsa consolidetur. Sic in M. A. N. C. *Ann. 2. Observ. 255. p. 379.* verruca linguæ, & excrecentia ex loco dentis evulsi, per chordam resecta & curata refertur.

MEMBRUM VIII. DE EXCRESCENTIIS.

Simili ratione ferè generantur & alii Tumores suis propriis folliculis inclusi, qui omnes ex eo, quod foras adnasci soleant, Excrecentiæ vocantur, & in membranis propriis peculiarem & singularem humorem retinent. Germanis dicuntur *die Gewächse* / pro cujus humoris varietate & varia ac distincta

Et hi Tumores acquirunt nomina, ita ut nunc Melicerides, nunc Atheromata, nunc Steatomata, appellari ſoleant.

Meliceris equidem dicitur, quando materia contenta eſt ſimilis quodammodo melli vel piſis coctis: Atheroma, ſi materia contenta eſt inſtar ſevi, vel adipis, vel ſaponis.

Reperiuntur etiam alia contenta varia, dum interdum ſub forma farinæ contineri ſoleant, interdum etiam unâ lapides in iſdem continentur, interdum filamenta oblonga ex iſdem extrahuntur. Oriuntur hæ excreſcentiæ ex nutrimento partis cuſdam nerveæ, in ſpecie membranæ aut tendinis, ut plurimum membranæ copioſiori retento, ſed nonnihil alterato, & hinc in aliam ſubſtantiam, quàm præciſè eſt pars alenda, tranſmutato.

CAUſA.

Cauſa autem, quod uberius colligatur tale nutrimentum & alteretur, eſt, quod membranæ & partes membranofæ aut à cauſa violenta diſtendantur, dilatentur & dilacerentur, quod ut plurimum fit, vel quando à cauſa interna, levi tamen, nonnihil eroduntur. Unde fibris, quarum textura membranæ conſtituuntur, à ſe invicem ſeparatis, & poris dilatatis & ampliatis, alimentum earum proximum diſtributum uberius, recipitur, & ita ſenſim extrorſum verſus protuberans, tumor generatur: nam introrſum non patet ſpatium, ut eo vergere poſſit. Ut plurimum dixi, præcedere cauſam externam: hinc enim eſt, quod Moniales & Monachi ex crebrioribus genuflexibus, adeoque dilatatione membranarum iſtius loci, ſapius patiantur tales tumores, in ſpecie Melicerides, in genubus: Sic enim ex equitatione violenta & concuſſione, ingens Steatoma cuidam militi ſucceſſivè in perinæo fuit enatum, de quo ſcripſit Elsholz in quadam Epiftola.

Quod verò attinet folliculum proprium, videtur fieri ita: nempe fibrillæ iſtæ membranarum eroſæ aut laceratæ, aut à ſe invicem ſeparatæ, cum ſponte non amplius redeant in naturalem ſitum & unionem, à nutrimento collecto & coacervato diſtendente ſucceſſivè & ipſæ longius prætenduntur, & hinc inde alias emittentes fibrillas tandem ſe uniunt, & mutuo concurrunt in perfectam talem membranam, talem tumoris materiam ex parvo initio propullulantem comprehendentem, eſtque ipſa membrana, aliarum membranarum inſtar, & cum incremento tumoris & ipſa accreſcit ſenſimque augetur. Quoniam verò ſuccus alimentitius per membranas læſas ſucceſſivè tranſudans, non naturali ritu & ſitu diſponitur & ordinatur, ſed ſaltim conglomeratus coacervatur ſimpliciter, ob id nudam materiam, aut ſevi aut pultis aut mellis, re-

preſentat, prout ſimul ſub iſta tranſudatione & collectione plus minus alteratur.

Obſervatum etiam fuit, quod hi tumores, ſubinde lunæ phaſes imitentur, quod videtur commune quibuſdam tumoribus in partibus nerveis radicatis; item quod hi tumores ſæpè & frequentius circa caput, collum, nucham & ſimilia reperiuntur, rarius in aliis locis, etiam carneis, ſarcomata protuberent.

P R O G N O S I S.

Tumores tales cſtici per ſe præter moleſtiam ſerè nihil habent periculi: attamen, quia interdum enormem excreſcentiam, interdum deformitatem important, curandi ſunt.

C U R A.

In Cura ergo obſervandum eſt, ut materia contenta, omnimode tollatur; ſive inſenſibiliter reſolvatur & diſcutiatur, quod fit rarius, & ſaltem in hiſ tumoribus incipientibus, aut minus inveteratis, quorum cſtis nondum tam firmiter coaluit, aut nondum adeo tenax fuit reddita; ſive ſenſibiliter evacuetur, dum alteratur & quodammodo in materiam puri ſimilem tranſmutatur, & hinc aperto cum lanceola tumore exhaustur, quod fieri poteſt tantummodo in Meliceride: nam alii tumores alterationem quæcunque reſpuunt. Interdum ſponte aperiuntur tumores, & materiam contentam largiter eſfundunt; interdum inſtituta ſectiōe integra membrana penitus extirpanda eſt, qui modus eſt optimus. Verùm ſi tumor eſt confirmatus, & ejus membranæ firmiter coaluerint, ſine ſectiōe Chirurgica vix tolli ſolet: unde obſervandum in omnibus curandi modis, ut dicta cſtis radicitus tollatur, quod fit vel cultro ſucceſſivè ſeparando, vel inunctione butyriantimonii, aut frictione cum cauterio lunari, vel ſimilibus unguentis erodentibus, ne tantillum ejus ſuperſit; alias namque à paucis ejus fibrillis relictis novi tumoris regeneratio ſupervenit: Vid. M. A. N. C. Ann. 2. Obſerv. 93. p. 167. & Ann. 4. & 5. App. p. 72.

Reſolvunt hos Tumores baſſamus Peruvianus, baſſamus ☿is, vel gummi ammoniacum, item lamina Hea gio illita ſuperimpoſita, item emplaſtrum oxycroceum applicatum, item emplaſtrum de ranis Vigonis cum gio: Vel

℞. Picis naval. ꝑij.

G. ammoniac.

☿is aa. ꝑß. M. pro emplaſtro.

Facit hoc etiam emplaſtrum diaſinapios, deſcriptum à Sculteto in Tab. ultima, Obſerv. 66.

Quod ſi reſolvi nequeat Tumor, & ſuppurari

purari possit, suppurandus venit per suppurantia paulò fortiora & aciora imposita; id quod tamen raro fit. Pro hoc scopo Barbette *in Chir.* parat emplastrum utile ex gummi ammoniaco, pyethro, & oleo succini.

Tumor suppuratus aperiendus est vel medicamentis, vel sectione Chirurgica; & hinc evacuatâ materiâ membrana exedentibus est absumenda. Id quod faciendum est, quando talis tumor sponte rumpitur, tunc enim & materia tumoris & membrana continens blandis corrosivis est tollenda; quia aliàs aut recidivam parit, aut relicto tantillo membranae in fistulam abit, aut ulcus diuturnum ac foetidum constituit. Absument materiam & folliculum unguentum Ægyptiacum, vel unguenta cum Mercurio ϖ ato edulcorato applicata, aut

\mathfrak{z} . *Unguent. Ægypt.* \mathfrak{z} ß.

ϖ . *Gliopt. edulc.* \mathfrak{z} j.

Θ is. \mathfrak{z} j. M. pro unguento.

Optimus tamen curandi hos Tumores modus est per excissionem sive abscissionem: in specie si inveteratus & contumacior fuerit.

Fit sectio cutis per crucem, quæ ita facienda est, ne lædatur folliculus, hinc cutis separanda à folliculo, & ipse folliculus ac cum eodem tumor juxta radicem (quæ semper est parva & angusta) abscindendus, & si quæ superveniat hæmorrhagia, sistenda: hinc exemplo folliculo factum ulcus mundificantibus, est curandum, sic abscessu mundificato caro succrescens tumorem denuò replet.

MEMBRUM IX.

DE TESTUDINE, TALPA / LUPIA.

Talis Tumor excrefcit subinde in pericranio, qui ob densam capitis cutim, firmiter cranio circumtensam, non tam extrorsum prominet, quàm quod latius expandatur, & ob id Testudo, item Talpa, seu Lupia, vocari solet. In hac Talpa, si materia proprio folliculo contenta (similis esse solet materiæ in modo dictis excrefcenciis contentæ) diutius retenta fuerit acior, tunc ipsum cranium cariosum reddere incipit.

CURA.

Talis Talpa si fuerit immediatè super suturas cerebri, ita ut ex fibris membranae cerebri duræ per suturas transmissis oriri videatur, serè relinquendus est, propter periculum inflammationis duræ meningis, aut alios affectus capitis lethales: sin verò alio in loco sit, aut insensibiliter resolvenda est materia, aut cataplasmate emolliente aliquàlter suppuranda, aut ipse tumor lanceola aperiendus & membrana tollenda, facta capitis caries probè radenda, hinc pulvis contra cariem ossium

ex rad. Jreos Flor. cum pauco euphorbio cranio affecto inspergendus, & cutis aperta cum emplastro diachylon simplici vel cum gummatibus denuò consolidanda.

MEMBRUM X.

DE VERRUCIS, CLAVIS ET CORNIBUS.

Quod si fibrillæ nerveæ, quæ copiosius extremitatibus vasorum capillarium intertextæ, cutis rete constituunt, nunc solitarie, nunc cum fibris subjacentibus aut laceratæ, aut nonnihil erosæ, nutrimentum suum foras emittant, hoc successivè coagulatur in Verrucas: quæ si ex attritione, hinc laceratione fibrillarum ex calceis fiant in digitis pedum, vocantur Clavi, qui interdum profundius radicati sunt & ex ipsis tendinibus, articulos digitorum pedum moventibus, attritis instar gangliorum oriri solent. Verrucæ verò pro ratione radicum, quibus inhaerent, nunc sunt penfiles, & ex angusto collo capite ampliore prominentes; quæ priores in specie vocantur Myrmeciae; hæ verò Acrochordones; sicuti tales Verrucæ, si ulterius proveniant, & latius se expandant, & singularem habeant duritiem, in hominibus Cornua appellantur, quæ sæpissimè pro fundamento habent os, à cujus alimento, simul in Verrucam transfundante, structuram peculiarem singularemque duritiem obtinere videntur.

CURA.

Observandum autem est in Cura harum Verrucarum, an simpliciter ex fibris nerveis cutis originem ducant? an verò simul in subjectis tendinibus sint radicatæ? si prius, nihil habent periculi, & faciliè curantur; si posterius, vix radicitus extirpari possunt, citra ingentia pericula, dolorem, inflammationem, convulsionem, & cancerum aut gangranam. Id quod imprimis observandum est in Verrucis faciei, & Clavis pedum profundius radicatis.

Verrucæ autem hæ, consideratis his circumstantiis curantur eas absummentibus, iisque variis. In genere Verrucas delet succus chelidonii majoris recens sæpius illitus, qui successivè absumit verrucam, donec in totum dispareat & evanescat, quod probatum est imprimis, si prius nonnihil incidantur verrucæ duriores, ut leviter sanguinem fundant. Item est planta, quæ vocatur Cieporum, verrucis similis propter figuram, quæ contusa verrucis imposita eas evanescere facit. Lac esulæ verrucis illitum easdem exedit: si densior & tenacior sit, leniter vulneranda est, ut melius pateat introitus lactis esulæ; succus lacteus dentis leonis etiam applicatus; folia sempervivi detractâ pelliculâ tenui internâ applicata,

cata, sæpiusque repetita, successivè verrucas tollunt. Cineres bryoniæ, cum succo ejusdem misti, Vid. Velschii *Mischom. Cent. 2. Obs. 94.* succum pomorum Borsdortianorum, & alia cetera nota, taceo; ▽, quæ supernatat truncis quercus ex pluviis, collecta, probatum est remedium; ▽, in qua solutum est Θ*, si aliquoties ea tangantur verrucæ, certissimum est experimentum Borelli *C. 2. Obs. 46.* Convenit etiam egregiè unguentum ex melle cum tantillo ~Δis aut olei vitrioli. Experimentum est Timæi. Limaces abitergendæ sunt Θe communi, sic produnt salivalem humorem, quo illæ verrucæ crebrius, insensibiliter evanescent; quod etiam harum pinguedo præstat. It. fiat unguentum ex unguenti albi camphorati ʒij, & ʒij p. d. ʒi. aut loco hujus Θ ʒij. Emplastrum oxycroceum, cui parum arsenici albi fuit admixtum, exedit verrucas, quod etiam facit emplastrum ex cera cum tantillo ʒij dulcis. Omnium optimè cauterio actuali eradicari solent; vel quibus ferrum ignitum non placeat, aut aliæ circumstantiæ prohibeant, attingantur butyro antimonii vel aqua forti, partes vicinas muniendo simul emplastro aliquo defensivo. Verrucæ autem si sint pensiles, facilè tolluntur constrictione cum seta equina aut filo serico, quia inde marcescunt, intercepto illorum nutrimento.

Præ cæteris tamen istæ Verrucæ merentur considerationem, quæ in locis pudendorum ex congressu Venereo sunt natæ, ad quas Itali utuntur aqua forti: sed melius est Mercurius sublimatus solutus in aqua plantaginis cum alumine.

Vel si racematim sint confixæ ad modum thymi & condylomatum in pudendis, curantur si recipiatur aqua Ψæ, misceatur cum ʒio sublimato.

Quoad Cornua: Curantur cornua abscissione radicali, nisi immediate ex suturis cranii emergant, tunc enim abscindi equidem possunt, ita tamen, ut radix maneat, ex qua radice denuo cornu novum crescit ferè singulis mensibus aut singulo bimestri spatio denuo abscindendum, quale cornu vidi Parisiis.

Clavos pedum quod attinet: Interdum post sola pediluvia radicitus tolluntur, si prominentiores extiterint, ita ut ipsis unguibus evellantur: Si verò latiores & in ipsis tendinibus radicati fuerint, pediluvia non sufficiunt. Potius his præmissis cutis carnea detrahenda, aut cultello rescecanda, & postmodum resina abiegna aut picea, item cera viridis, pauxillo olei Philosophorum, saponis vel ceræ malaxata, Clavo imponenda, emolliendi, & excidendi sine. Præ cæteris expertum est emplastrum Mynsichti de galbano crocatum cum sale ammoniaco, quod prædicant Timæus &

Sennertus; sic etiam pars emollita semper potest abscindi; nam solum galbanum aut gummi ammoniacum in aceto dissolutum & inspissatum, linteo extensum & impositum, optime curat verrucas pedum, quod pariter cum guttula una vel altera prædictorum oleorum malaxari potest; sicuti & ipsum oleum ipso clavo per cultellum leviter vulnerato, instillari poterit. Succus it. tithymali pluma illitus eisdem delet, & emplastrum de ranis Vigonis cum Mercurio admodum emollit, vel emplastrum de cicuta cum Mercurio dulci permixtum est illinendum. Item recipiatur caro bubula recens, & ejus frustulum tantum, quanta est magnitudo Clavorum, instar emplastri his alligetur, & sæpius renovetur; Laudatur quoque allium recens cum sapone ratio contusum, ac instar cataplasmatibus impositum. Platerus à pediluvio & crassioris cutis remotione senecionem affricatum imposuit cum successu, vid. Velschius *Misch. C. 2. Obs. 61.*

Sunt etiam, qui cauterium lunare, aquam fortem, butyrum antimonii, spiritum Δis, &c. commendant, in specie si cum melle in unguenti formam redigantur, & post detractionem cuticulam duriores applicentur, aut solo cauterio lunari saliva madido, clavi fricentur; unde eschara subsequitur, absque omni dolore postea decidens. Ut verò hæc eschara eò citius maturetur, imponatur emplastrum diachylon cum gummiis; vulnus autem post escharam delapsam consolidetur. In horum tamen cauteriorum applicatione hæc conditiones sunt observandæ: ut circa clavum imponatur emplastrum quodcunque fortius adhærens, quod præmuniat partes vicinas, ne linimentum easdem corrodere possit, in medio sit perforatum, ut emineat Verruca seu clavus. Hinc si radices habeat Clavus intendine, seu ex tendine oriatur, cavendum est, ne corrosio ad tendinem usque perveniat, ne dolorem, inflammationem, ulcus & similia excitemus.

A sectione quoque aut eradicatione per cultrum abstinendum est, si infixi sint circa articulos, profundioresque radices egerint; facile enim unà cum Clavis vicina vasa, tendines ac ligamenta, simul læderentur.

MEMBRUM XI.

DE FUNGO.

FIt subinde, ut circa articulos, ex dilatatis aut laceratis membranis & tendinibus ibidem expansis, aut similibus partibus nervosis, ex casu vel contusione, vel violenta luxatione in saltu, &c. læsis, excreseat tumor mollis, successivè incrementum capiens, qui si aperta cute amplius spatium nanciscatur, subito incrementum capit enorme, & instar fungorum velociter excreseat in substantiam carno-

carnosam, mollem, pallidam & indolentem, quæ ob id Fungus articuli, *ein Glied-Schwamm*/ appellatur. Rarissimum est, quod præter articulos etiam alia loca infestare soleat, semper tamen membranæ aut tendinibus, similibusque partibus adhærere & affigi observatur, unde etiam membranæ cerebri post vulnerationem capitis læsæ, ubi non bene præservantur ab aëre ambiente, in tales fungos, qui tamen quasdam proprietates adhuc speciales habent, erumpere solent. Historias aliquot notatu dignissimas refert Sennetus *l. 5. Prax. P. 1. cap. 39.* it. Hildanus *Centur. 2. Obs. 19. & C. 3. Obs. 1. Centur. 5. Obs. 62.* M. A. N. C. *Ann. 7. Obs. 63.*

C A U S Æ.

Causa autem horum fungorum est humor nutritivus retentus & collectus, cui cum se jungat synovia seu axungia illa glutinosa, quæ naturaliter oblinat articulos pro facilitando motu, exinde substantia mollis, rara, ac insigniter luxurians, generatur, interdum tamen corruptionem quandam, & hinc occultam accrescentiam concipit materia, ex qua fungus generatur: unde facillime, si male tractetur Fungus, malignitatem cancrösam acquirit.

C U R A.

Cura est difficilis, sæpissime nulla, nisi pars affecta extirpetur & radicitus tollatur, quandoquidem successive ad tabem perducitur corpus ægri, omni nutrimento in fungo deperdito; eoque difficilior est Cura, quo magis in profundo originem trahant Fungi. Quando igitur circa genua aut cubitum fungus sese prodat, neque emollientia neque sectio per cultrum locum habet, cum mox ab aëre ambiente labia in cancrum exitiosum degenerare, eademque symptomata, quæ in Cancro nondum exulcerato, sequi soleant. Nam auferendus est totus fungus ex toto, si scilicet radix ejus sit manifesta, quod si non fiat, exedentibus & absumentibus blandis erit tollendus, aut nimium saltem incrementum impediendum; quæ ipsa tamen exedentia cum sæpius sint periculosa, & istis fungus malignus sæpius in cancrum exacerbetur, ob id omittis omnibus linimentis nervinis ac unctuosius emollientibus, malum contumacius reddentibus, valida exsiccantia, & acidum occultum temperantia & mitigantia fungo sunt inspergenda & applicanda, v. g. ex radice aristolochiæ rotundæ veræ, Ircos Florent. ari, foliis sabinae, roris marini, tutia, myrrha, thure, lapide calaminari, φ lii dulci, lapillis cancrorum calcinatis, cineribus cancrorum fluviatilium, Saccharo Saturni, vitriolo, calce viva, & similibus.

Fungus mox in principio suppressendus est: Ergo mox adspargatur C. C. ustum præ-

paratum, myrrha, pompholyx & similia. Marchette in *Observ. Medico Chirurg. 6.* utitur pulvere ex spica & schœnantho: M. A. N. C. *Ann. 9. & 10. Obs. 124.* Si nec hæc succederint, mature usurpetur & præcipitatus: si & hic non succederit, lethale est malum. Videatur Hildanus in *Cent. 1. Observ. & Scultetus Obs. Chirurg. Obs. 17.*

Quod si vero vel ferro vel arcta ligatura abscindi possit Fungus, post abscissionem similes pulveres inspersi locum adstringendo laudantur, & recidivam prohibent.

In vulneribus & ulceribus exorientes omnium optime per pulverem prædictorum insersionem tolluntur, imponendo simul emplastrum dia φ is Rulandi. Vitanda tamen acria & corrodentia, ne convulsiones accersantur, aut ulcus in cancrum degeneret.

A R T I C Ū L U S IV. DE TUMORIBUS VASORUM SANGUIFLUORUM.

M E M B R U M I. DE ANEURISMATE.

Sequuntur singulares quidam & quasi anomali Tumores, qui sanguiflua vasa interdum occupant, & Aneurismatis & Varicis nomine vulgo noti sunt.

Aneurisma fit, dum arteria aut exesa, aut laxata nimis, aut rupta ex quacunque violentia, aut vulnerata ex inepta ejus loco venæ sectione, aut in arteriæ per venam pertusam vulneratione, sanguinem spirituosum, in loco læsionis colligit, & hinc ex ista sanguinis collectione in talem tumorem successive attollitur.

Exesam dixi arteriam interdum, dum nempe ab interna successive oritur causa; hinc enim interiore arteriæ tunica exesa aut erosa, externa ambiens successive dilatatur & ampliatur; etiam ulterius interdum exeditur, simulque vicina loca hinc affliguntur, quale exemplum videatur in Praxi Barbette. Frequentia etiam sunt Aneurismata à vehementi cordis palpitatione, ita ut ramus arteriæ descendens intumescat. Sed hæc ad Chirurgum non pertinent.

Laxata sæpius reperitur arteria aut rupta ex nimio conatu in artuum violenta commotione, vociferatione, in partu, in firma spiritus retentione. Ex his enim causis Aneurismata in collo sunt frequentia.

D I A G N O S I S.

Affectus hic facile cognoscitur ex impetuosa floridi sanguinis ejaculatione, qui pro ratione rythmorum in pulsū subsultum magis floridus ac dilutior prodit, unde mox tumor cum dolore successive assurgit, colore partibus

bus vicinis similis, interdum ubi immediate sub cute est, ut à venæ sectione nonnihil rubicundior pulsabilis est, & tactui recedens: dum nisi nimis inveteratum sit Aneurisma, digito compressus tumor successive subsidet, & omnino intromeat; digitis vero remotis denuo redit: augetur successive ad magnitudinem interdum ovi anserini. Sanguis in eo est ut plurimum corruptus, nonnihil tamen spissior & paulo obscurior reliquo sanguine, atque hæc magis locum habent in Aneurismate non adeo ingenti aut inveterato; & quo magis inveteratum est Aneurisma, eo magis talis conspicitur contentus sanguis, uti etiam minus pulsans minusque tactui cedens tumor, & sanguis semigrumosus, esse solet, unde non tam subito in arterias potest propelli.

In partibus externis facile patent, in partibus vero internis subinde imperscrutabilia sunt, & rupto aneurismate ad mortem perducitur æger. Horstius in *Observ. Anatomicis*, dicit, quod interdum Aneurismata oriuntur in partibus internis lethalia in iis, qui morbo Gallico curari volunt.

PROGNOSIS.

Tumor hic Aneurismaticus externus nihil periculi habet, nisi quod interdum ab imperitis Chirurgis habeatur pro abscessu suppurato; unde si aperiatur tunc temporis tumor, subito sub manibus ægri cum sanguine animam emittunt.

Rarius est ut in gangrænam ex sanguine corrupto detento Tumor abeat: Vid. Borellus & Horstius de eodem.

CURA.

Cum frequentissima causa sit pertusio arteriæ loco venæ, mox forti ligatura ligetur pars læsa, vel moneta minor aut lamina plumbea, superimposito emplastro de chalcitide, applicetur, & fortiter ligata pars læsa firmetur; in opposita verò parte mox secetur vena. Hoc neglecto sit Aneurisma, quod, dum est in principio, fortiter adstringentibus applicatis ex ☿ sigillata, bolo Armena, ☿ Olii dulci, colophonia, thure, sanguine draconis, sperniola Crollii & similibus, cum laudano opiato mixtis, sub forma emplastri forti ligatura applicatis, tumoris progressus tolli, & ipse tumor tunc facile curari potest. Quies simul severe imperanda, nec emplastrum nimis cito removendum, quin mox recens ligetur; alias autem corporis motu frequentiori tumor facile incretceret, & tandem lipothymia, subsequerentur.

Curiosum est, quod observat Horstius, & ex eo Hoëferus, quando arteriæ applicaverit laudanum opiatum, & mox hæmorrhagia steterit. Quibusdam expertum est hoc emplastrum Sanchez in *Obs. Medicis*:

Tom. II. Pars 2.

℞. *pulv. sumach. hypocist. acaciæ, sangu. Drac. aloës. thuris.* aa. ʒj.

Ex his cum albumine ovi subactis fiat Emplastrum, addito, loco ceræ, emplastro contra rupturas.

Applicandum hoc est statim in principio, ut tangere fere possit arteriam, forti ligatura subjecta, & sic consolidetur locus læsus: ubi grumus sanguinis in loco est collectus, frustra applicatur.

Alias notum est emplastrum Galeni ex thure, aloë, pilis leporinis, & albumine ovi. Etiam lamina plumbea, vel sola applicata, vel cum succo plantaginis prius illita, cum forti ligatura Aneurisma tollit; aut ex toto istud curat, si mox in principio applicetur, v. g. post ineptam venæ sectionem; vel etiam istud palliative ad multos annos sustentat, si continuo alligata loco arteriæ læsæ circumgestetur.

Quod si verò jam factum sit Aneurisma, & sanguis contentus in tumore jam spissior non nihil fuerit, ad imitationem Hildani in *C. 3. Observ. 44.* corrigendus est prius sanguis imposito emplastro de calcithide, hinc sanguine retropulso, addendo laminam plumbeam aut ferream, super hanc iterum emplastrum fortiter adstringens est imponendum: huic pulvilli & demum fasciæ fortiter adducendæ.

Quod si vero his irritis nihilominus Aneurisma persistat, aut his remediis cedere nolit, similibus adstringentibus ulterior progressus præcavendus, evacuetur sanguis contentus, & super locum læsionis arteriæ injicienda est fortis ligatura, & infra ligaturam per transversum diffecandus ramus arteriosus, quod tamen periculosum, hinc vulnus factum digestivis ac consolidantibus consolidetur.

Galli moderni Aneurismata post ineptas Venæ sectiones vitriolicis blande erodentibus optime curant, ut labia crassa successive coalescant & coeant, postmodum locum ipsum & foramen consolidantibus restituunt. Hæc methodus est nova, & reperitur apud Dekers, quale exemplum ipsemet vidi Parisiis.

Chirurgi incauti, simul ac errorem hunc commiserint, statim confugiunt ad unguentum de althæa, populeum, nervinum, aliaque unctuosa, quibus tamen Tumor hic maxime augetur. Vitanda ergo sunt omnia pingua emollientia, balnea pariter ac exercitia omnia vehementiora, nec non aromatica spirituosâ pulsum accelerantia, & purgantia, M. Seam magis exagitantia.

MEMBRUM II.

DE VARICIBUS.

Varices sunt nihil aliud, quam venæ laxatæ tunica, ut fibræ ejus molliores

[E] valde

valde distendantur, & postmodum in loco venæ distento hæreat sanguis, & stagnando tumorem inferat. Malum hoc frequens est mulieribus in ultimis à partu mensibus, uti & post partum difficilem.

CAUSÆ.

Causa interna sæpius est sanguis crassior, qualis Melancholicus dicitur, id est, qui ab acido nimio crassiorem nonnihil habet consistentiam. Talis ergo sanguis in motu suo in quodam venæ ramo insigniter impeditus, in specie circa venarum valvulas non nihil vas continens ex succedente sanguine novo ita distendit, ut atoniam ejus nimiamque laxationem tunicæ venosæ inferat, ut postmodum in isto loco laxato sanguis uberius collectus & tanquam alveo ampliori contentus, talem tumorem inferat. Præter hanc tamen causam internam etiam ipse sanguis, naturaliter licet constitutus, in trunco tamen venoso ex hujus compressione vel simili causa in motu suo impeditus, in istius trunci ramis patentioribus extrorsum, adeoque minus à partibus vicinis angustatus hærens Varicem inferre potest: qua ratione ultimis gestationis mensibus, propter vasa iliaca venosa in mulieribus ab utero tumido compressa, varices crurum gravidi familiares esse solent.

DIAGNOSIS.

Sequuntur hi tumores venarum ductum, & tanquam venæ ampliores & insigniter turgidæ, colore ex cæruleo livescente aut nigrescente, conspiciuntur, idque imprimis in cruribus circa genua.

Tumor hic pressus quidem retrocedit nonnihil, qui tamen mox redire solet.

PROGNOSIS.

Malum hoc cum minus sit molestum, quin potius quibusdam non parum proficuum ad conservandam corporis sanitatem, in specie in Melancholia hypochondriaca, minus curationi subjicitur, nisi aut nimis distenta vasa tandem rumpantur, aut sanguine accrescente corrupto, & hinc inflammationis modo suppurando effervescente ulcus parvum inducat, aut etiam partis gangranam minetur, aut insignis earum valdeque molestus dolor adfit.

De Varicum apertione spontanea, ita propter hæmorrhagiam incoercibilem lethali, vid. M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 54. & 204. it. Ann. 6. & 7. Obs. 26. p. 59.

CURA.

Si nimius fuerit tumor, varix acu aurea vel argentea pungatur, sanguisque crassior exprimatur; quo facto applicanda remedia adstringentia & lamella plumbea desuper alliganda pro tumoris incremento coercendo; Aut etiam citra talem puncturam

℞. alum.

Θis comm.

fruct. acac.

Hæc coqu. in ♣to acerrimo.

Spongia hoc aceto ebria pro fomento applicetur mane & vespere loco varicoso, & hinc arctissime deligetur, & hoc continuandum per mensem integrum: postmodum ubi exsiccata apparent Varices, removenda est spongia, & solum stricte per 5. vel 6. menses locus varicosus est ligandus, donec omnino dispareat. Expertum fuit in Varicibus costarum à Ferrara. Vel in tumoribus varicosis levioribus fiat Unguentum ex butyro Majali cum duplo succi cancrorum fluviatilium expresso, quæ invicem mista leni ebullitione coquantur ad consistentiam unguenti. Laudatur ab Hartmanno in *Praxi Chymiat.* ad curandas Varices pro illitu. Vel

℞. farin. lupinor. ℥ij.

sterc. capr. exsicc. ℥iij.

♣i non valde fortis, in quo ferrum ignitum quinquies sit extinctum, q. s. Et vel in forma emplastri spissi applicetur; vel fortiter ligetur, aliquandiu continuando.

Quodsi varices apertæ sanguinem copiosius funderent, hic cauterio actuali mox sistendus erit.

Optimum cyporiston ad sanguinem sistendum est stercus suillum, pulveris forma adpersum: Vel lintea solutioni vitrioli Martis & aluminis immergantur, & varicibus apertis applicentur; ita tamen involvendo & ligando, ne refluxus sanguinis ejusque motus omnino intercipiatur, alias periculum est disruptionis varicum sub ipsa ligatura, sanguinis enim circulus magis promovendus, quam impediendus est.

Denique pro Varicibus dolentibus & tumulentibus:

℞. Ungu. popul. ℥ij.

mucilag. sem. psyll. lini.

fœnugræc. aa. ℥iij.

℞o chamomill. farin. fabar. aa. ℥ij. cere, q. s. M. F. Ceratum seu Emplastrum.

Interdum Varices, præcipue in pedibus, propter lympham acriorem exulcerantur, unde pruritus intolerabilis. In his elegans est emplastrum de spermate ranarum, vel griseum, inspergendo simul acidum absorbentia, e.g. C. C. ustum &c. cum mastiche & thure, quibus aliquid Mercurii dulcis addi potest.

His interne subveniendum est appropriatis sanguinis dyscrasiam corrigentibus. In communi usu Decocta lignorum, quajaci, radicis chinæ & sarsaparillæ cum herbis appropriatis usurpari solent, uti apparet ex Foresto l. 29. Obs. 25.

CAPUT II. DE VULNERIBUS IN GENERE.

Vulnus est divisio unionis naturalis in parte molli, facta ab impetu & vi externa, secante, pungente, mordente, rumpente, aut fortiter contundente.

Inestat promiscue nunc partes nervosas, nunc sanguineas, quarum tamen diversitas vel maxime observanda est in Cura.

Differentiæ Vulnerum accidentales sunt variæ atque diversæ pro ratione Vulneris; dum nunc est simplex, nunc complicatum ad junctionem aliorum affectuum, imprimis aut cum inflammatione, aut contusione, aut virulentia, aut aliis similibus; nunc ratione subjecti aut partis affectæ Vulnerus dicitur partium nervearum, sanguinearum, thoracis, capitis, &c.

Quoad Vulnera in genere: In omnibus corrumpitur ab aëre ambiente nutrimentum partis proximum, & sanguis effusus propter spiritus vitalis dissipationem successivè putrescit; unde nascitur acor vitiosus, qui subito omnem ludit Tragœdiam, infert dolorem, rodendo partes fibrosas nerveas, tumorem erysipelaecum, &c. totusque spiritui vitali balsamico partis præservativo prorsus hostilis, instar fermenti peregrini partem affectam ejusque alimentum proximum, multifarie alterat, illudque in pus falsum de natura alcalina, saniem & ichores transmutat. Unde tandem, nisi acor mature temperetur, facile ulcera depascentia emergunt.

DIAGNOSIS.

Quoad signa diagnostica: his in vulneribus externis, qua talibus, opus non est. Quæ autem partibus profundius latentibus inflicta fuerint, cognoscuntur

1. Ex Vulneris externi situ: cujus ratione in hypochondrio dextro epatis, in sinistro vero lienis colligi potest.

2. Ratione doloris: unde dolor acutus partium nervosarum & membranarum; obtusus vero carnosarum Vulnera indicat.

3. Ratione loci: sic vulnera v.g. sub hypogastrio vesicæ, uteri, &c. læsionem innuunt.

4. Ex partis vulneratæ actione læsa: sic e.g. ex facultatis animalis læsione aut perturbatione, cerebri, ex dyspnœcia & asthmate, pulmonum & diaphragmatis; ex vomitu, ventriculi; ex ☐æ proiluvio involuntario, sphincteris vesicæ, &c. vulnera colligi possunt.

5. Ex Excretis; partim qua talibus, quando e.g. in læsionibus abdominis chylus effluens ventriculi & intestinorum crassiorum; sicut & urina per abdomen effluxus renum, ureterum

Tom. II. Pars 2.

& vesicæ, vulnera indicat: partim excretionis modo, quando e.g. sanguis effluit cum pulsu; tunc enim arteriam esse vulneratam patet.

PROGNOSIS.

Primario requiritur Medici judicium, an vulnus sit lethale? an vero non lethale? quod non confundendum cum eo, an vulnus sit sanabile? an insanabile? multa enim vulnera sunt insanabilia, & perfecte sanari nequeunt per longum tempus, quæ tamen non sunt lethalia. v.g. vulnus penetrans per pulmones, nisi majora vasa fuerint læsa, est sanabile, aut ab ita in abscessum; si vero vasa majora læsa sunt, est lethale; sicuti lue Venerea affectis, si infligantur Vulnera, hæc difficulter sunt sanabilia, sæpius insanabilia, quia degenerant in ulcera contumacia maligna, quæ tamen vulnera, in se non sunt lethalia.

Jam vero fundamentum legitimæ Prognoscis vulnerum consistit in his tribus:

(1) In functione seu usu partis læsæ, plus minus ad vitam necessariæ.

(2) In modo læsionis.

(3) In curandi ratione possibili & impossibili; & hæc est talis vel simpliciter, vel secundum quid, in tali vel tali subjecto.

Adeoque Vulnerus istud est lethale, quod necessario & ex summa ac inevitabili necessitate, seu simpliciter & absolute, mortem infert, ut nulla arte dignosci, nullisque remediis curari, nec ager conservari possit, quin semper & ut plurimum intra paucos dies moriatur: id quod fit, vel quatenus spirituum & sanguinis atque feri nimius partim & incoercibilis oritur effluxus, partim jam dicti & alii succi vitales extravasati in certa corporis aut visceris cavitate, ex qua arte educi nequeunt, colliguntur, & ibi aut corrumpendo aut comprimendo viscerum nobiliorum functiones lædunt; vel quando viscus tale, quod ad vitam simpliciter necessarium est, enormiter læditur. Hinc ratione prioris, Vulnera ventriculorum cordis, vasorum internorum insignium, &c. sunt lethalia, unde illa punctura gladii, qua læditur ramus iliaceus cruralis est vulnus lethale: quia hæmorrhagia ista est incoercibilis: hac ratione etiam vulnera hepatis profundiora sunt lethalia. Ratione secundi, vulnera cerebri profunda, & substantiam ejus graviter lædentia, sunt lethalia; superficialia vero minus. Ratione tertii, v.g. substantia diaphragmatis nervea læsa est lethalis, quia ipsi succurri nequit.

Verum quoad secundum requisitum: observetur etiam, quod non semper sufficiat, quod pars graviter læsa sit, sed quod cum alia parte habeat consensum, v.g. si ex vulnere apparenter levi, nervo tamen læso, superveniat

[E] 2

Con-

Convulsio lethalis, tale vulnus lethale est. Ingenere ergo in vulnere lethali necesse est, ut vel spirituum animalium motus vel distributio deleatur; sin hoc enim fit, animal interit.

Vulnera cordis non semper sunt lethalia, nisi sint maiora, ac penetrent usque in ejus sinus, in specie in ventriculum sinistrum usque: superficiales cordis læsiones, quæ saltim tangunt parenchyma musculosum, non sunt lethales, utut forsitan propter læsa maiora pulmonum vasa in transitu instrumenti lædentis sequatur mors. Vidi ego Romæ apud egregium Chirurgum cor canis, in cuius parenchymate tres globuli ferrei erant, & ita quidem, ut isti globuli omnino coaluerint in parenchymate cordis; nam canis erat mortuus sub cultro anatomico: sic etiam in Schenckio, Paræo, Schneidero, &c. habentur Observationes talium vulnerum cordis superficialium non lethaliū.

Pulmonum Vulnera propter nimium & incoercibilem sanguinis effluxum, huiusque in thoracis cavitatem collectionem, lethalia sunt; nisi leviora & superficialia sint, utpote quæ interdum curantur, testante Glandorpio *spicil. Chirurg. Obs.* 24.

Asperæ arteriæ intra pulmones latentium bronchiarum Vulnera lethalia sunt, propter profusionem aëris inspirati in thoracem. Ventriculi vulnera, quæ lædunt vasa maiora & orificia, primario sinistram, hinc dextram, ordinario sunt lethalia, propter alimentorum & chyli effluxum: minus, quæ reliquas lædunt partes, imprimis superiores; non vero circa fundum.

Vulnera diaphragmatis semper fere sunt lethalia, sive carnosæ, sive nervæ ejus parti inflicta fuerint; nam suffocati intereunt ægri: minora tamen, tam carnosæ parti, quam tendini diaphragmatis secundum fibrarum tractum inflicta, curari possunt, quod videbitis in Glandorpio *l. a. Obs.* 27. Hollerio *in Hippocrat. sect. 6. aphor.* 18. Sennerto *l. 2. Prax. p.* 224. & *l. 5. p.* 366. Diemerbroec. *Anat. p.* 422. Mirabile est in diaphragmatis vulneribus, quod scilicet per vulnus factum stomachus, intestina, &c. ex abdomine penetrent in cavum thoracis, quale exemplum, præter Pareum *l. 9. cap.* 30. ipse vidi Wittebergæ cum D. Schneidero in rustico, cui ab alio cum cultro diaphragma erat perforatum, ita ut ventriculus in thoracem retractus continuos vomitus, singultus, & tertia die mortem, inferret. Vid. etiam Sennertus *l. a. Henricus ab Heer Observ.* 25. & Glandorpius *l. a. c.* 28.

Oesophagi vulnera, præprimis in parte interna, lethalia sunt; cum non solum per hæc assumpta in thoracis cavitatem effluant,

sed & propter dolorem ac inflammationem ipsa alimentorum deglutitio ac respiratio impediatur: in parte tamen exteriori interdum sanari possunt, Vid. Schenckius *in Observat. pag.* 316. & Pigræus *Epit. Med. & Chir. p.* 376.

Intestinorum vulnera semper sunt lethalia, imprimis transversalia, qualia exempla videbitis in Schenckii *Observationib. pag.* 385. Timæo von Gilden-Rlee *Resp. Med.* 17. Salmuth *Cent. 1. Obs.* 18. & Welschio *de Lethalit. Vulnerum p.* 103. nec non diversis in locis inflicta, vid. Valeriola *l. 11. Obs.* 9. & Salzmannus *in Observ. Anatom. p.* 10. quia non solum chylus & stercora in abdominis cavitatem effluunt, ex qua evacuari nequeunt, unde putrescendo & rodendo intestina reliqua & abdominis integumenta afficiunt, sicque mortem inferunt, conf. Fallopius *de Vulneribus cap.* 57. sed & ipsa intestina vulnerata brevi gangrænescunt, vid. Würzius *in Chirurg. P. 1. c.* 13. *p.* 704. Contrarium observatur in intestini recti extremitate vulnerata, cum remedia externa commode applicari possint, nec excrementorum ab abdominis cavitatem effluxus metendus.

Mesenterii Vulnera, nisi vasis ejus majoribus inflicta fuerint, lethalia non sunt.

Vulnera autem omenti, propter nimiam & incoercibilem hæmorrhagiam, per se lethalia sunt.

Idem etiam judicandum de Pancreatis vulneribus.

Vulnera hepatis juxta Glyssonium *in Anat. hepatis* lethalia sunt, cum ipsius substantiæ, tum vasorum læsiones, propter enormem sanguinis effusionem. Contra Glandorpium *in spicil. Chirurg. Obs.* 38. & Hildanum *c. 2. Obs.* 34. & *Cent. 4. Obs.* 2. aliosque, qui vulnera hujus vasorum tantum notabilium lethalia, substantiæ vero hepatis inflicta minus lethalia dicunt.

Vulnera vesiculæ felleæ, nec non ramorum ductus epatici, & ductus cholodochi, per se lethalia sunt, propter bilis, ad corporis conservationem adeo necessariæ, profusionem, & in abdominis cavo collectionem.

Huc etiam pertinet ligamenti umbilicalis ruptura vel præcisio, quam Spigelius *Anat. l. 8. cap.* 5. Laurentius *in Histor. Anat. l. 6. cap.* 9. Hildanus *Cent. 1. Obs.* 52. & 53. item Moëbius *in Fund. Med. Physiol. cap.* 1. & 20. lethalem pronunciant.

Receptaculi lumbaris & Ductus Thoracici Vulnerum lethaliatatem confirmat experimentum Loweri *Tr. de Corde*, Cum non solum chylus

chylus & lymphæ in cavitatem quandam corporis effluant, & ibidem coacerventur, sed etiam sanguinis circulatio turbetur, & corporis nutritio impediatur. Contrarium quidem exemplum refert Langelottus in Bartholini *Epist. Med. C. 3. Epist. 37.* de quodam Equitum Magistro Brandenburgico, circa mediam dorsi vertebram sclopeto vulnerato, cui similis liquor chylosus effluerit, qui non tam lintea quintuplicia, indusium & lodes imbuere, quam etiam lumbos inundaverit, sine vitæ periculo. Verum potius credendum, in hoc ergo non ipsum ductus thoracici truncum, sed hujus saltem ramum, laceratum fuisse.

Lienis Vulnera profundiora, siue vasa simul, siue non lacerantur, lethalia sunt, ut plurimi de lienis substantiæ vulneribus contrarium defendant: Verum cum ex Vesalio, Highmore, Wepfero & Malpighio notum sit, quod tota lienis structura, præter vasa, ex cellulis membranosis & fibrosis contexta sit, ad quas sanguis arteriosus, à venis resorbendus, omnis deponitur, non mirum, quin cellulis his lætis hæmorrhagia incoercibilis oriatur.

Renum pariter vulnera, imprimis majora, & ubi majores tubuli Cisternæ lacerati, siue etiam vasorum emulgentium, aut horum insigniorum ramorum læsione, lethalia sunt; cum non solum per hæc serum Cisternæ ad cavitatem abdominis effluat, sed etiam mox inflammationes & dolores ingentes superveniant: ut taceam, Renum substantiam siue vasorum hujus sanguiferorum notabiliorum læsione, profundius vulnerari vix posse.

Vesicæ vulnera cervici inflicta, præsertim quando simul vasa majora lacerata, propter inflammationem, gangranam, convulsiones, & sphacelum, sæpiissime lethalia sunt: ut ut contrarium per calculi vesicalis excissionem plurimi defendere soleant, conf. Salmuth *Cent. 2. Obs. 44.* quæ ipsa tamen operatio circumspecte & prudentis artificis manu instituta cum Vulneribus fortuitis & casualibus non confundenda: ut taceam; ipsam etiam vesicæ lithotomiam propter dicta symptomata frequentius observata periculo plenissimam esse. Fundi autem vesicæ vulnera propter tunicam carneam exteriorem, hujusque cum peritoneo & abdominis musculis contiguitatem, & faciliorem cum his coalescentiam ac consolidationem, sanari possunt, quod etiam contra Glandorpium in *spec. Chirurg. cap. 38.* aliosque quamplurimos, Bauhinus in *Append. ad Russæum p. 192.* Felix Wurz in *Chir. P. 2. c. 13. p. 205.* Platerus *Observat. 4.3. p. 831. & 832.* & Simon Pauli *Flor. Dan. P. 2. p. 53.* testantur.

Uteri vulnera per se lethalia non sunt,

nisi majora, & cum vasorum læsione, & inde orta hæmorrhagia copiosiori, in gravidis autem propter hæmorrhagiam incoercibilem, sanguinis in abdominis cavitatem collectionem, & foetus extra uterum, & cum sanguine ibidem putrescentis, prolapsum, per se lethalia pronuncianda.

Cerebri vulnera sunt varia: si cortex solum laceratur, & recte tractetur, imprimis si sanguis extravasatus & conglumatus extra cranium evacuari possit, nec gravis contusio adsit, minus solent habere periculi; sin vero medulla profundius & corpus callosum vulneretur, nec sanguis in cerebro collectus evacuari possit, lethalia esse solent. Tamen uti sunt interdum miracula in Medicina, observationem quandam habet Schenckius de vulnere cerebri ad ventriculum usque sanato.

Pertinet huc Cerebri compressio, tam à cranii subsidencia; quam sanguinis extravasati & conglumati copia: dum enim cerebri meatus angustantur, & sanguinis in vasis cerebri circulatio, simulque spirituum animalium dispensatio, impeditur aut saltem turbatur, nec cranium relevari, nec sanguis extravasatus & conglumatus, aut etiam non mature satis evacuari potest, lethalis est. Similiter cranii fracturæ & fissuræ, quarum fragmenta cerebro aut huius involucris ita compacta, ut eximi non possint, lethales pronunciandæ; ut ut sæpe per aliquot septimanas, imo menses, vulnerati ex improvviso quasi & nihil mali metuentes demum intereant, qualia exempla, præter quotidianam experientiam, referunt Paw in Hippocratem de *vuln. cran. p. 82.* Salmuth. *C. 1. Observ. 12.* & Wepferus de *Apopl. p. 336.* quæ lethalitas magis promovetur, ubi sanguis simul supra cerebrum effusus, & vascula intra cranii duplicaturam læsa fuerint.

Lethalia etiam sunt omnia Cerebelli, nec non quadam medullæ spinalis, vulnera, superiori nempe intra colli & dorsi vertebrae parti inflicta, & inferioris transversim disseci, de quo vid. Tulpus *l. 3. Obs. 27.* sic quoque hac in parte, ubi nervus intercostalis paris vagi dissecus & laceratus, respirationem impediendo, pulsus intercipiendo, &c. lethalis esse solet.

Vulnera musculi temporalis vulgo lethalia dicuntur: verum non per se & semper lethalia esse, experientia testatur, v.g. Chat-tier *Observ. 4.* qui in contusione hujus musculi, it. Voorde *Chir. pag. 481.* Job van Meeckern *Observ. 1.* Riverius in *Obs. comm. p. 333. & 361.* & Paw in Hippoc. de vulneribus cranii *p. 174.* qui in fractura cranii musculi temporalis incisionem feliciter factam perhibent: imo Paw *l. a.* & Glandorpius *Spicil. Chirurg. Observ. 12.* Vulnera hujus

[E] 3

muscu-

musculi casu illata, sine notabilibus symptomatis curata testantur. Testatur etiam inspectio Anatomica, quod nihil in musculi hujus conformatione observetur, cujus læsione actio quædam nobilis & ad vitam simpliciter necessaria turbetur, aut cui non quavis remedium genera ampliacari possint.

Specialia plura de vulnerum Prognosi videb. in Sebizio de vulnerum lethalitate, Welſchio de Rationali Vulnerum Judicio, & Medicina Crit. Ammanni: In specie etiam videri potest Sennertus. Nunquam enim potest generaliter Prognosis institui propter varietatem subjectorum & circumstantiarum.

C U R A.

Cura vulnerum consistit in unionem partium separatarum, earumque conglutinatione, quod opus est solius naturæ, quæ beneficio succi nutritii ad omnes partes distributi, appositi & agglutinati, tanquam balsamo quodam salino oleoso temperato, sensim sensimque easdem reunit & reducit: cui cum vix reperiatur adæquate simile quoddam remedium in rerum natura, sequitur hoc esse solius naturæ opus ac laborem. Chirurgi autem hic opus est adjuvare eam in hoc bono opere, sequendo ejusdem ductum, removendo imprimis impedimenta externa, quæ sunt alimenti partis roridi & sanguinis effusi superinductæ alterationes, & successivæ corruptiones & putredines; quas inseparabiliter comitatur acor vitiosus, ex ista corruptione natus; adducendo divisa labia, applicandoque medicamenta, succum partis nutritium, quæ conservent, ejusdem corruptionem impediant, factam jam denuo emendent, adeoque parti familiaria ac amica sint, quæ alias Vulneraria, Agglutinantia, item balsamica, vocantur.

Pro his à Chirurgo scopis melius attingendis notandum est, quod alimentum partis proximum, dum consideretur ut conservans partem læsam, sit in naturaliter constitutis salinis volatilibus oleosis seu humor rosicidus tenuis, imprægnatus sale volatili oleoso temperato, investito substantia humida, non nihil glutinosa & pinguiuscula: variat tamen insigniter pro constitutione ætatum, sexuum, vitæ generis; & in specie pro varietate ipsarum partium varia, prout hæ ipsæ nunc sanguineæ sunt, nunc nervosæ, prout etiam variant subjecta in latitudine sanitatis, etiam sic balsamus variat: *daher sagt man / Er hat eine heilsame Haut / Er hat eine unheilsame Haut*; & quo vitiatæ magis sunt corporis digestiones, indeque plus minus alterata M. Snea, eò etiam vitiosior & magis degener est hic balsamus; unde etiam nunc facilius nunc difficilius consolidabit partem læsam. Nam & hinc mulieribus inflata vul-

nera semper deteriorantur, & in pejus ruunt sub tempore menstrualis; & qui vel scorbuto vel lue venerea sunt inquinati, iis leves, in specie in nervosis partibus, acceptæ læsiones & vulnerationes in gravia subinde ac periculosa abeunt ulcera & symptomata.

Et quidem alteratio & mutatio balsami naturalis partis læsæ dependet à causis internis, vel externis: Ab internis dispositio nutrimenti balsamici corruptibilis, uti de se ipso vulnus difficulter glutinat; ita facillime quasvis externas impressiones recipit, quæ leves licet, in male tamen constitutis gravem inferunt noxam, cum in bene constitutis, graviores licet, impressiones facile corrigantur & eluantur.

Ab internis causis & morbis oriundas balsami naturalis corruptiones Medicus curet tollendo earum radices, rectificando digestiones & fermentationes, & corrigendo partium noxam; unde consequenter balsamus facile naturalem reinduit statum: quod eò facilius fiet, si præmissis aut purgantibus temperationibus, aut sudoriferis salinis volatilibus blandis remediis balsamum naturalem confortantibus, seu sale volatili oleoso temperato & spiritu volatili mediocri imprægnatis, ipsi succurratur; nempe vulnerariis internis dictis, & balsamicis, alcali temperato & oleoso constantibus, quod confirmat Helmontius, & post eum Tachenius in Hippoc. chim. quia horum succus revivificat Mercurium; myrrha, trochiscis & essentia myrrhæ, viperinis, antimonialibus paratis remediis.

Externa autem ab injuria, præprimis ab aëris impressione illatos defectus succi nutritii, omnibus fere Vulneribus communes, & qui in sanissimis etiam contingit subjectis, Chirurgus applicatis debitis remediis externis emendare debet: Nam vulnera sponte coeunt, nisi impediuntur. Hujusmodi defectus à Medico & Chirurgo emendandi alii non sunt, quam balsami naturalis partis vulneratæ, & sanguinis unà in labiis vulnerum hærentis corruptio & putredinalis alteratio, hujus corruptionis putredinalis indivisibilis comes est acor vitiosus & peregrinus, qui uti alias excessivus omnibus partibus vulneratis est autor omnium symptomatum supervenientium. Nam tanquam vitiosum fermentum labia vulneris inquinat, nutrimentum balsamicum & sanguinem affluentem inficit, corrumpit, & fermentando in pus mutat, nisi violentior majorque corrupta aciditas loco puris ichorem aut saniem manare cogat. Unde si vulnus recens apto balsamo à corruptione & acore putredinali defendatur, citra puris generationem facile istud conglutinabitur. Et hoc est, quod quasi per transennam observarunt Majatus & Septalius in Nova Ratio-

Ratione Curandi Vulnera; unde & ordinariam vulnera medendi methodum nonnihil immutarunt. Nam eleganter Majatus improbat Galeno, quod solummodo fuerit occupatus circa sordes vulnere & ulcerum, circa pus, saniem & ichores abstergendas, non vero consideraverit causam, à qua istae sordes producantur: hac in parte accuratè respondet cum Helmontio, qui & ipse scholis & Medicorum & Chirurgorum, in specie hoc in loco Chirurgorum, exprobrat, eas magis esse sollicitas circa producta morbosa, quam circa eorundem causas radicales; unde fermenta ista vitiosa, à quibus producuntur per fermentationem istae sordes, pensanda esse sedulo & studiose inculcat. Id quod etiam Septalius & Majatus monuerunt, nempe in vulnerata parte temperamentum partis esse conservandum, quoniam hoc, ab aëre ambiente laeso, generantur excrementa: unde Vulnera raro religanda sudent, iisque sola medicamenta balsamica applicanda, quae ex horum hypothese temperamentum partis vulneratae, ejusque calorem nativum conservent. Ex principiis vero Helmontianis applicanda sunt balsamica, quae corruptionem balsami naturalis in acorem vitiosum inhibeant, ulterioremque progressum coërceant; his enim observatis studiose vel sponte coire vulnera.

Acor ergo vitiosus, qui in vulnere enatus, consolidationem ejus à natura instituentem impedit, qui sapissime inducitur ab alteratione per contactum aëris ambientis; nam & in culinis si carnes corrumpi incipiant, earum juscula acescunt, & ex simili ratione vulnera degenerant facile in ulcera ex acore isto magis intenso, magisque rosivo & corruptivo, depascente partes vicinas. Hinc etiam est, quod Chirurghi & mulierculae omnia acida, adeo etiam, & recte quidem, vini usum interdiciunt vulneratis, perperam tamen assignantes causam, quod vinum calefacit, adeoque sanationem impediat; quae tamen vini aciditas, ubi mitigata fuerit ab alcali lapillorum cancrorum, ut in saporem lixiviale abeat, utile potius & conveniens vulneratis est remedium; sicuti etiam hac ratione lapfos alto restituit, aut si ad ʒss. lapillorum cancrorum praeparatorum vel coralliorum, vel eadem soluta in aceto succove limonum, quotidie bis ad cochlear Vulneratis propinentur, etiamsi moderate tunc vinum biberint, vulnus nihilominus cito, tuto & jucunde, etiam absque febre, cicatrizabitur; non quod hi lapilli vel in pulvere, vel soluti, materiam ad vulnera à primis viis remota properent, sed quia dicta concreta absorbeant acidum vini vel aceti, & fiat mixtura saporis falsi de alcalina natura: vid. Tachenius in Princ.

Morborum pag. 124. Et hoc ipsum in remediis aliis vulnerariis, tam internis sub potionum forma usurpatis, quam externis sub balsamorum ratione applicatis, est obvium, quorum balsamica vis, ratione cujus conducunt ad curanda vulnera, fundatur primario in alcali volatili temperato plus minus oleoso, prout ipsa variant vulneraria: sicuti postmodum nata ulcera ex vulneribus Saturnus & Saturnina remedia curant, non quatenus refrigerant, exsiccant, detergunt, sed quatenus acidum unum absorbent; sicuti alias acida quaecunque Saturni attractu transmutantur in dulcedinem aluminosam adstringentem: id quod patet omnibus in aceto destillato; hoc sane minio seu Saturno calcinato affusum dulcescit manifeste instar sacchari; unde & exinde paratum sal sapore dulci saccharum Saturni appellari consuevit.

Acorem hunc vulneratis partibus & vulneribus adeo nocivum ex corruptione & putredine oriri dixi, nutrimenti puta & balsami naturalis in parte haerentis, quae inducitur primario ab aëre externo ambiente, aliave quadam concurrente causa externa: v. g. halitus Chirurghi si attingat labia vulneris, est nocivus. Unde acor semper est intensior in partibus nervosis quam sanguineis: alteratus etiam sanguis circa labia vulneris effusus congruatur haeret, & similiter acescit; corrumpuntur hi succi plus minus, prout aut externa impressio aut alteratio plus minus intensa fuerit, aut ii ipsi facilius vel difficilius corruptibiles existunt. Hic acor peregrinus omnium fere accidentium & symptomatum vulneribus supervenientium, eorumque curationem & consolidationem remorantium, primarius est auctor: nam proximum alimentum & sanguinem salum volatilem fermentando calorem, ruborem & dolorem infert, hinc vicinos succos coagulando tumorem & inflammationem excitat, fermentando hinc se ipsum multiplicat & ulcus generat, cum falso volatili alimentario concurrente sub effervescencia istud in pus transmutat.

Hae vitiosa aciditas putredinalis in vulnere nunc simplex est corruptiva, tantum per fermentationem, nunc vero combinata est cum aliis extraneis qualitatibus, aut à causa laedente, aut ab aëre ambiente, aut à sanguine & humoribus affluentibus oriunda.

Ratione causae laedentis quidem combinatus est hic acor cum aliis qualitatibus, si instrumentum veneno tinctum sit, & sic plagae inferantur venenatae; ad quod & animalium morsus pertinent; nam omnis fere morsus, ut recte loquitur Celsus, habet quoddam virus, adeo ut etiam hominis irati morsus sub irae fervore impressus vel inflictus non minus periculosus sit, quam alias cujusdam bestiae

bestiæ virulenta mortificatio; cum hominis irati morsum, si non graviora symptomata, sæpissime gangræna partis mortæ, putredo ac corruptio, sequatur. Observandum etiam est, quod instrumentum lædens aut vulnerans nunc solum secando, vel pungendo, interdum etiam imprimis contundendo, partem lædat, ut in pessimis sclopetorum vulneribus usu venit.

Ratione aëris ambientis etiam variat acidum vulnorum peregrinum pro quibus diversa constitutione, quæ temperata faciliorem, minus temperata difficiliorem promittit Curam; ita ut tempore vernali vulnera ac contusiones quævis facilius sanentur, quam æstate aut hyeme. Pariter prout aër pro climatum ratione variat, etiam in uno loco facilius, in alio difficilius vulnera curari solent: sic in uno loco capitis, ut Bononiæ, in alio loco crurum vulnera, ut Romæ, citius curantur: sic Guido de Cauliaco vulnera capitis Lutetiæ difficiliora quam Avenioni; crurum autem vulnera Avenioni difficiliora quam Lutetiæ, esse observavit: sicut etiam Pareus in *Chir. p. 55.* testatur, omnia fere vulnera sclopeto inflicta in præliis obsidionis Rotomagensis, in agro Dionysiaco confertis, lethalia fuisse. Item variat vulnorum cura, si aer frigidus, nebulosus, temperatus, aut abdita ratione loci Endemica inquinatus, aut adstantium halitibus & occultis aporrhæis infectus fuerit: hinc enim est, quod Chirurghi non promiscue omnes admittant, ut inspiciant ligationes vulnorum, in specie in nervosis partibus, ut mulieres propter menstrua, it. potui deditos & inebriatos. Pertinent huc etiam lunares radii vulnera illustrantes, sed simul deteriorantes, quod qua ratione fiat, illustrari potest Observatione Medici Galli, qui vocatur Guido de la Brosse, Tr. de natura Planetarum. Hic observavit, quod radii lunares, luna existente plena, si concentrentur in materiam lacteam seu albicantem, efficiant illam intensissime frigidam; sicuti alias radii Solares collecti dant flammulam seu ignem, &c.

Denique ratione succi nutritii & sanguinis affluentis combinatus est acor fermentativus vulnorum, si magis vel minus balsamus nutritivus à statu naturali declinaverit; v. g. si sanguis affluens veneno venereo aut cruditate cachectica inquinatus fuerit, it. si hæmorrhoidibus suppressis & mensibus stagnantibus fuerit repletus; qualium vulnera difficillime sanantur, quia sæpius in ulcera cacoëthea degenerant. Nam hæc omnia modo dicta acidum vulnorum corruptivum pejus plus minus reddendo, variorum symptomatum vulnori supervenientium sunt causa.

Hanc ergo balsami nutritivi & quasi glutinosi vulnorum naturalis corruptionem aci-

dam impedire, aut jam factam leviolem corrigere, & balsamum naturalem per sibi amica & familiaria conservare, debet Chirurgus; idque per medicamenta dicta balsamica mox in principio adhibenda, quæ debent esse salina volatilia temperata oleosa ad instar balsami istius naturalis; nam talia & acidum corrigunt, & naturale balsamicum conservant, sicque ulteriorem corruptionem ejus præcavendo, brevi sanitas sperata & desiderata succedit. Talia v. g. sunt balsamus Peruvianus, de capibe, terebinthina Cyprina, mastix, olibanum, oleum momordicæ, hyperici, liquor folliculorum ulmi, theriaca in vini spiritu soluta, oleum terebinthinæ cum balsamo Peruviano temperatum, balsamus sulphuris, aliaque balsama & unguenta infinita, quorum apex est balsamus sâmech Paracelsi.

Dixi quod debeant esse applicanda salia volatilia temperata, dicta alias balsamica, non vero salia excessiva seu acria; nam acria, tam acida quam salia, sunt nociva: acida quidem malum augerent, & omnem balsamum naturalem destruerent; ut nil dicam de horrendo dolore, quem inferrent, cum partibus sint inimica. Hinc & olea communia solâ expressione facta, citra aliqualem præparationem tuto adhiberi non possunt seu applicari nequeunt vulneribus, non tam ob unctuositatem viscidam, ratione cujus vulneribus & partibus nerveis sunt inimica, sed præterea etiam, quia in se habent acidum occultum satis potens, quod argentum & ferrum corrodit, & corruptionem balsami naturalis insigniter promoveret, & vulnus pejus redderet.

Observandum tamen etiam est, ne applicentur nimis acria urinosa volatilia, seu sale volatili acriori constantia, alias deterfiva abstergentia, seu mundificantia dicta; quia hæc experientia teste vulnus diu nimis apertum detinent, ejusque coagulationem impediunt: quia colliquefaciunt, fundunt, & consumunt nutrimentum balsamicum partis, carnem ejus, & sanguinem: Ergo acrimonia sua & facultate deterfiva fluxiones, dolores aliaque symptomata inferunt.

Talia ergo acriora solis ulceribus conveniunt, non vulneribus, quia vulnus diu apertum retinent; Talia enim colliquefaciunt & consumunt funditus nutrimentum partis balsamicum, acrimonia sua fluxum, dolores, & alia inferunt. Ulceribus ergo conferunt, ubi potentius acidum potentiora postulat corrigentia, & ubi productæ in labiis ulceris sordes potentiora urgent deterfiva. Applicanda esse alcalina oleosa seu temperata balsamica, notandum & observandum est tam in vulneribus partium sanguinearum, quam nervosarum seu articularum vulneribus.

Licet

Licet enim partes nervæ balsamica requirant paulo fortiora, quibus nempe levia corrosiva sint simul admista, dum in partibus nervosis semper reperiatur acor magis intentius subtilior & penetrantior, quam in sanguineis & præterea copiosior sordium in vulneribus partium nervearum fiat generatio, tamen aciora vix ferunt, quin potius exinde irritatæ dolorem & multa alia symptomata inferant. Temperata ergo acriuscula & amaricantia conducunt.

His ipsis tamen externis admotis, simul administranda sunt interna, & quidem vulneraria, quæ alcali occulto Mercurii revivificativo, tamen temperato, constant, & aciditatem qualemcunque, aut in stomacho aut primis viis, aut etiam consequenter in ipsa vulnerata parte, enatam aut unctam mitigant & corrigunt. Observavit enim Felix Wurzius, quod si simul Chirurghi adhibeant vulneraria interne, non opus sit tanta copia balsamorum externorum. Talia interna sunt plantæ vulnerariæ. potionum forma usurpatæ, quales sunt ex alchimilla, hederæ terrestri, sânicula, plantagine, pyrola, veronica, hyperico, consolida saracenica, epatica stellata, geranio Rupertiano, perfoliata, pulmonaria maculosa, scabiosa, vinca pervinca, floribus hyperici & similibus; quibus & Album Græcum merito annumerandum est, non minus quam ex lumbricis parata remedia, partibus nervosis læsis appropriata interno & externo usu, uti & sanguis hirci. Huc pertinent lapilli cancerorum in vino bulliti, sicuti ustus totus cancer fluviatilis interno pariter & externo usu est insigniter vulnerarius.

Dixi, quod hæc remedia vulneraria etiam contineant in se occultum alcali, ratione cujus revivificentur, tam ætatum quam ætatum; transfiguratur enim & in varias larvas, beneficio nempe salium & spirituum acidorum. Reviviscatur autem denuo ex istis variis, quas assumpsit, formis beneficio succi plantarum vulnerariarum, si in his bullierit: quia acidum, quod antea induerat in forma ætati aut ætati, destruitur in Vulnerariis, unde destructo acido denuo sub nativa forma emergit. Unde vero destruitur acidum? nihil aliud est, quod magis vel potentius & à priori quasi acidum destruat, quam alcali: necessario ergo hoc erit in vulnerariis: Jam vero temperatum est, & minus acriter linguam ferit, unde occultum vocatur ab Helmontio, vel blandum & minus apertum.

Per talia ergo interna, & balsamica dicta externa vulneraria, curanda sunt mox in principio vulnera recentia. Non enim imitanda est vulgaris Chirurgorum consuetudo, qui neglectis vulnerariis balsamicis, vulneribus etiam

recentibus imponunt primo digestiva & suppurantia, hinc, dum genitum est pus, Mundificantia, & denique Sarcotica & conglutinantia. Hæc methodus est frustranea, imprimis in vulneribus recentibus, curam in longum protrahens, partem inflammans, & succum nutritium alterans, ut exinde interdum facta plaga levis degeneret in ulcus sordidum: sed potius, ubi oppressa est hæmorrhagia, & nil extranei in vulnera transierit, quod eximendum sit: aut nulla conjuncta sit contusio, ut sit in sclopetorum vulneribus, vel in quibus necessario expectanda sit suppuratio, optime vulneribus talibus recentibus applicatur unicus balsamus Peruvianus, in specie vulnerarius, qui sale acri præditus vulnere si instillatur, cum paucis, interdum nullo (quod aliquoties vidi etiam in periculosis vulneribus) puris & sine symptomatis proventu cito vulnus conglutinat, nisi aliquid de partis substantia secando ablatum fuerit: unde in hoc postremo casu cum vulnerariis blande adstringentia, & humiditates superfluas imbibentia, vulgo Sarcotica, simul admisceantur. Interdum tamen necesse est, ut, neglectis balsamicis, digestiva applicentur methodo vulgari, nempe eo in casu, ubi vulnus studio ad aliquod tempus apertum servandum sit, in vulneribus v. g. capitis, aut ubi conjuncta est cum vulneribus contusio, uti in specie in sclopetorum vulneribus evenit: aut ubi vulnus jam degenerare incipit in ulcus, aut nimis ab aëre alteratum fuerit, ita ut balsamica sola his noxis corrigendis non sufficiant, aut etiam, si quid heterogenei continetur in vulnere, quod eximendum & separandum est, & quæ sunt similes circumstantiæ.

In his necesse est ex methodo communi prius applicare Digestiva seu suppurativa, quæ pus in vulnere producant, & hinc post suppurationem Mundificantia, & tandem sarcotica. Nam ista digestiva successiva suppuratione, aut id, quod contulatum aut extravasatum & corruptum fuerit, removeant, aut id, quod contentum est peregrinum, tandem excludunt, aut lenta sanatione aliis circa vulnus agendis occasionem subministrant.

Digestiva seu suppurantia talia ordinario constant ex terebinthina & vitello ovi tanquam basi, quibus pro re nata nunc mellis parum cum myrrha aut balsamo Peruviano, aut gummi elemi, aut simile quid addendum est; imprimis si circa partes nerveas, quæ alias facile putrescunt, suppuratio expectanda: v. g.

℞. terebinth. opt. ℥vi.

sevi cerv. ℥iij.

cere alb. mastich.

oliban. aa. ℥ss.

[F]

Tom. II. Pars 2.

2090-

℞ rosar. ʒiʒ.

campb. ʒi. M. pro Unguento.

Vid. Wedelius *de Compos. Medic. Sect. 3. cap. 3. p. 181.* Borellus *C. 1. Observ. 96.*

Talia oleosa temperata, vulnerariis balsamicis cognata, acidum vitiosum in vulnere inveterato etiam mitigant, ne à mundificativis veris tanquam paulò acrioribus in principio irritatum effervescente ulcus pejus reddat, quia à digestivis alteratum facilius mundificantibus cedit: deinde & talia ulteriorem acoris in vulnere progressum inhibent, & interea, quod vitiosum est, effervescente suppuratum sponte naturæ separari & excludi possit. Ubi per digestiva pus genitum laudabile profluit, tanquam ulcus quoddam benignum per mundificantia, hinc incarnantia, & cicatrisantia, tractandum erit.

Ex his patet, omnia balsamica vulneribus recentibus dicata, mundificantia & digestiva, cognata esse naturæ inter se, quatenus alcali constant, & acidum destruunt vulnere & ulcerum, si nempe temperata sunt balsamica; sin minus, sed acriora, digerentia sunt & mundificativa ulcerum; si vero nimis oleosa sunt temperata, sunt digestiva seu pus promoventia: Unde unum idemque horum medicamentorum v. g. terebinthina, pro ratione subjecti nunc mundificativi, nunc digestivi, nunc consolidativi, nomen habet. Hisce tamen alia alcalia subinde addenda erunt, qualia metallica fixa, quæ successivè absorbendo omnia acida vitiosa privata vulnere & ulcerum conducunt, ut creta, terra vitrioli dulcis, remedia saturnina, item quæ ex Venere adhibentur. Naturæ conatui ergo in consolidando vulnere succurrit Chirurgus, primariò quidem per modo dicta remedia applicando balsamica, secundario tamen etiam mechanicè succurrit naturæ, non removendo tantùm ex vulnere omnia heterogenea, quacunque etiam ratione illa extrahere aut eximere possit, sed etiam conjungendo vulneris labia, ut interveniente naturali balsamo, tanquam glutine, promptius cohereant: id quod fasciis communibus labia vulneris ad se invicem adducendo, nunc futuris eadem fortius uniendo, sic quæcunque recentes læsiones ac vulnera citra suppurationem omnem, inflammationem & tumorem facile & tutò coeunt, & omnia istis optimè mundificata, novâ carne replentur.

Heterogenea extrahenda monui: cum certum sit, omne peregrinum & non vitale naturæ esse inimicum, idque eò plus, quo facilius & ipsum heterogeneum est alterabile aut corruptibile. Hinc namque globuli sclopetorum præ aliis externis commodius relinquì possunt in corpore, si ossi hæreant in-

fixi, seu saltem in partibus musculosis, lateant: quoniam nullam alterationem inferunt parti, nisi quod pondere ipsam gravent: aliàs verò ipsi globuli nec alterantur, nec ullo modo corrumpuntur, ut tandem proprio pondere successivè deorsum & extrorsum ferantur, atque ita à provida natura excludantur. Res quoque extraneæ in vulneribus hærentes, ordinariò sunt grumi sanguinis, &c. qui tamen non penitus in principio removendi sunt, sed crusta sanguinis grumosi circa labia vulneris relinquenda est; hæc enim defendit labia vulneris ab impressione aeris externi, defendit balsamum nativum, quo minus alteretur, item promovet suppurationem. Alia vero heterogenea, v. g. frustula vitri, festucæ, ossium frustula, surculi lignorum & similia, nunc arte extrahuntur, vel variis instrumentis, rostro corvino, gruino, ciconiæ, & similibus, vel eadem obscure & profunde situata beneficio suppurationis successivè foras ejiciuntur cum pure.

In specie autem ad extrahenda heterogenea ex vulneribus optimè conducit pinguedo leporis, si vel sola illinatur, vel cum ana aut duplo unguenti seu emplastri ex betonica applicetur vulnere, vel etiam ex pinguedine leporina cum gummi Arabico fiat emplastrum vulnere imponendum. Alii pro extrahendis vitiosis infixis commendant admodum picem sutoriam.

Vel

℞. Ferment.

mellis opt. aa. ℥ss.

visci quercin. quartar. j.

quæ invicem combinantur in formam Emplastri.

Quin & raphanum fortiter cum axungia subactum, & vulnere impositum, peregrina fortiter elicere affirmant. Dietsamnus Creticus cum pinguedine leporina etiam applicatur. Non inconsultum est, dum recipiunt alii caneros vivos, eosque contusos miscere cum pinguedine leporina.

Juxta hæc nonnullis in maximo secreto est lingua vulpis: evellitur nempe Mense Martio ex vulpe viva vel violenter mortua, exsiccatur & usurpatur suo tempore in vino.

Hisce externis succurrendum est per interna vulneraria, in specie quidem per sabinam, vincam pervincam & lapillos cancrorum, qui primariò tunc debent ingredi potiones vulnerarias, ubi extrudenda sunt heterogenea infixa, videatur Felix Wurtz: Sic Wedelius *de Med. Facultatib. lib. 1. Sect. 2. cap. 6.* refert studiosum, qui ictus erat globulo plumbeo in pede, quem instrumentis exui renuerat, decocto vulnerario ex radice dietsamni

dictamni extractum & curatum. Pertinet huc experimentum Arculani, qui ibidem videatur.

Juxta hanc extractionem etiam fasciis succurrat Chirurgus. Fasciarum variae sunt & species & modi. In vulneribus præ cæteris in usu est fascia seu ligatura incarnativa seu agglutinativa dicta, quæ fit cum fascia duorum capitum: Applicatur ita, ut medium ejus imponatur in membro læso in parte plagæ opposita, & ducatur hinc supra plagam ipsam cruciatim, repetendo hanc viam aliquoties, ut labia plagæ ita ad se invicem adducantur. Et hæc fasciatio vel sola sufficit in vulneribus non adeo insignioribus, vel iniis, quæ secundum longitudinem membri, vel secundum fibrarum protensarum ductum, inflicta fuerunt: sed in vulneribus & sectionibus, quando partes quædam ferro abscissæ sunt, ut in narium, aurium & digitorum tali separatione; ut tamen adhuc pendeant; aut etiam quando in articulis graviores infliguntur plagæ; aut quando ampla vulnera, per transversum membri aut fibrarum musculosarum sunt illata; aut quando frusta integra carnosæ ferè sunt decissa, non sufficit fasciatio sola, sed suturæ labiorum vulneris (*das heften*) sunt instituendæ. Sutura hæc sunt nunc per acus, & fila illarum medio traducta; nunc per glutem utrinque vulnere applicatum (*durch ein Heft-Pflaster.*) Illud convenit in subjectis durioribus & fortioribus in partibus à visu remotis minusque sensibilibus: hoc vero, in partibus contrariis. Modus per glutem est hic: Applicentur utrinque labiis vulneris lintea suis ansulis seu filamentis, instructa (*mit Bändern*) ut horum medio ipsa emplastra, & per consequens vulneris labia, ad se invicem adduci possint, postquam ipsa lintea hoc linimento, tanquam glutine, prius fuerint illita:

R. Gum. tragacanth.

Arabic.

mastic.

thuris.

sarcocoll. aa. ʒi.

Pulverisata subigantur probè cum ovi albumine, agitato optimè cum spatula, donec in spumam, hinc in liquorem, resolutum fuerit.

Interim utrinque futura diversimodè instituitur pro ratione partis vulneratæ, observando in ambabus, tam quæ fiunt cum acu quam cum glutine

(1.) ne applicetur, nisi necessitas urgeat in supra dictis casibus.

(2.) ne nimis arctè adducantur labia vulneris, quia in omni vulnere hæc ipsa aliquantulum intumescunt.

(3.) ne nimis prope sint ad se invicem adducta, ne puri & sordibus è vulnere egressus,

Tom. II. Pars 2.

balsamis verò & unguentis applicandis ingressus, inhibeat.

Turundarum usus est quoad vulnera, ut nempe per has vulnus tamdiu in superficie apertum servetur, donec ex fundo probè purificato succrescens caro summitatem labiorum successivè attigerit, cum aliàs in superficie citius caro ipsa ipsaque cutis promptè coalescens pus & sordes in fundo occludant, unde necessario aut dolores, aut inflammationes, aut abscessus recidivi, aut fistulæ, aut sinus profundi, similiaque superveniunt mala: cum econtra ipsæ turundæ rectè fabricatæ si illitæ fuerint unguento & balsamo convenienti, vehiculum sunt, ut ubique unguentum aptius distribuatur, & ad fundum vulneris usque derivetur vis medica balsami vulnerarii.

Parantur autem turundæ aut ex lino contorto, aut ex linteo teneriori convoluto & filo alligato in forma quasi pyramidalis, ita ut basis turundæ dividatur in quatuor lacinias, quæ impediunt, ne nimis profunde turunda in vulnus intrudatur; aliàs enim hoc esset dolorosum, idque observetur

(1) Si partes nervosæ aut in vicinia, aut in fundo vulneris reperiantur: nam in talibus longiores aut crassiores turundæ magnum dolorem excitant, qui partium nervolarum læsiones insigniter exasperat, ad convulsiones ægros disponit, & synoviam & consequenter partis ariduram tandem producit.

(2) Ne nimis sint crassæ, nempe circa medium sui sint crassissimæ, ita quidem, ut modice repleant vulnus, cum ordinariò turundæ non nihil intumescere soleant, in apice sint turundæ teneræ & molles, ne durior apex & acutus partes sensiles lædat & irritet, nec carnem teneram ex fundo succrescentem lædat, ejusque augmentum impediat; quin potius ipsæ turundæ non nimis crassæ facillè cedant genito puri, nec hujus retentionem indeque ortam majorem acrimoniam inferant; quin & crassæ nimis turundæ hoc habent periculi, ut labia vasorum sanguifluorum coalescentia, & à sanguine grumoso non nihil constipata, denuò referent novasque hæmorrhagias inducant.

(3) Ne turundæ frequenter nimis, aut ubi minus necessarium est, applicentur; in specie, ubi partes nervosæ fuerint simul læsæ: nam nimis frequenter aut diu usurpatæ consolidationem impediunt, item partes cutaneas circa labia ad occalescentiam disponere solent. Sufficit per turundam vulnus in quodam loco servare apertum, ut vel sanies vel simile possit excerni.

[F] 2

His

His ita probè observatis coalescunt tandem vulneris labia, & nutriuntur denuò partes antea separatae; nihilominus tamen inaequalitas, asperitas, duritiesque in loco consolidato remanere solent, id quod cicatricem appellant. Nam dum balsamus nutritius successivè denuò unit labia, tamen fibrae cutaneae nervae antea separatae vix adeò exactè sibi denuò circa extremitates junguntur, pori quoque & meatus in aequali tractu alias juxta se invicem situati pervertuntur, & minus apta serie collocati ita inter se confunduntur, unde glutinans succus nutritius in istis locis detentus & implicatus in ossibus callum, in partibus mollioribus cutaneis cicatricem talem constituit: idque eo magis, quo adstringentia magis & exsiccantia, cicatrifiantia fuerint: nam hæc poros angustando, fibrasque duriores & minus tractabiles reddendo, tandem insigniori cicatrici occasionem præbent, & quidem eo magis, quo asperior minusque roscidus fuerit nutritius balsamus: nam propter hanc ultimam causam in adultis majores magisque deformes cicatrices nascuntur, quæ in junioribus minus tales existunt, quin potius hi ipsi rectè tractati vix cicatricis vestigium relinquere solent. Pinguedo a scia piscis vulneribus, dum coeunt, instillata, consolidat citra cicatricem.

Remedia ergo vulnerum in genere Glutinantia seu vulneraria appellata, sunt ista, quæ partes molles naturaliter quidem unitas, præternaturaliter verò divisas, denuò conjungere juvant, ut quasi conglutinatae videantur. Pertinent huc ea, quæ tam ad vulnera recentia consolidanda adhibentur, vulneraria, unde balsami vulnerarii præparantur, tam ad ulcera cavata replenda, ut Sarcotica dicta, tam ad cicatricem inducendam, ut Epulotica.

Prout autem jam alimentum partis balsamicum alterationem quandam & corruptionem acidam suscipit, majorem aut minorem, eligenda etiam sunt medicamenta, quorum sal volatile nunc magis nunc minus erit acre, aut addenda erunt temperatis metallica, imprimis fæna, acidum quodcunque absorbentia. Dum autem semper cum succo partis nutritio tenuis quidam & serosus humor, istius scilicet vehiculum in partem læsam transfudat, quod aut impedit partis reunionem & alimenti agglutinationem, aut saltem partem regenitam humectando nimis laxam, flaccidam & mollem reddit, indeque nimiae carnis luxuriei & excrecentiæ occasionem præbet: ob id interdum sunt addenda remedia, vel exsiccantia dicta, quæ nempe nimiam humiditatem in se absorbent, vel adstringentia moderata, quæ laxitatem corrigunt, & debitum tonum ac consistentiam carni regenitæ tribu-

unt: quod imprimis observandum est, ubi simul vel pars carnis, vel cutis, vel alia quæcunque ablata, regenerari debet; tunc enim modo dicta remedia, pro necessitate partis regenerandæ, vel augenda vel minuenda sunt: nam talia si sunt debilia, sarcotica: si fortiora, epulotica dicuntur, quoniam in partis solâ per vulnus divisione non tanta imminet necessitas, atque in partis ab ulcere erosionem.

Remedia ergo vulneraria sunt multifaria, v. g. herbae & folia agrimoniae, geranii, ianiculæ, pyrolæ, pilosellæ, herniariæ, cynoglossi, plantaginis, hyperici, equiseti, verbenæ, scabiosæ, chamæpityos, centarii minoris, millefolii, quod recens contusum vulneribus recentibus impositum, vel ejus succus recens instillatus ea citra suppurationem consolidat; betonicæ, bugulæ, prunellæ, nicotianæ, pimpinellæ, myrti, nummulariæ, vincæ pervincæ, bellidis minoris, cherefolii, telephii, veronicæ, scabiosæ, sabinæ, caprifolii, virgæ aureæ, eorumque succi: radix aristolochiæ utriusque, tormentillæ, symphyti majoris, cyperi, Jreos Florentinæ, galangæ, valerianæ, vincetoxici, sigilli Salomonis: cortices granatorum: flores rosarum, balaustrorum, hyperici, bellidis, verbasci, crocus: fructus momordicæ, nux moschata, caryophylli, nuces cupressi, gallæ immaturæ, glandes quercinæ, sarcocolla, sanguis draconis, tacamahaca, tragacanthum, gummi elemi, hederæ, galbanum, olibanum, benzoë, succinum, bdellium, gummi juniperi, resina pini & omnium arborum resiniferarum, terebinthina, colophonium, myrrha, quæ imprimis est conservativum mumiae, & per centum & plures annos homines à corruptione arcere potest, beneficio spiritus vini myrrhati conditos, unde elixir proprietatis omnes corporis nostri putredines arcet; pix, mastix; Ex succis inspissatis sunt hypocistidis, acaciæ veræ, aloë, liquor vesicularius ulmi, saccharum cum spiritu vini temperatum: farina hordei, fabarum, orobi, fœnu Græci, &c. Ex animalibus mumia, omnia lumbricalia, cerumina aurium, cera, mel, cornu cervi ustum, os sepiæ, ebustus, cancri fluviales, lapilli cancerorum, & omnia ex cancris desumpta, exuviae serpentum, telæ araneorum, pinguedo canis, usnea cranii humani, &c. Ex mineralibus colcothar Olli, quod commendatur ab Helmontio, & omnem vulnere corruptionem tollit, ex quo Felix Wurz suum unguentum fuscum parat. Idem etiam præstat Saturnus & Saturnina, ut lithargyrium, plumbum calcinatum, cerussa, minium, cadmia, lapis calaminaris, tutia, bolus Armena, terra sigillata, pompholyx, creta alba, lac lunæ, lapis hamatites, gypsum, alumen, sulphur, calx viva lota, terra vitrioli dulcis

dulcis balsamica, crocus Martis, &c. Hinc vini spiritus, oleum hyperici, oleum momordicæ, nucistræ expressum, mastichis, nicotianæ, lumbricorum terrestrium, & in vulneribus non adeo magnis oleum liliorum alborum, balsamum Peruvianum, de Capaibe, sulphuris, balsamum sulphuris antimonii cum oleo succini aut terebinthinæ, balsamum Saturni terebinthinatum, theriaca. Sic solum oleum seminis hyperici expressum cum floribus sulphuris blandissime emolliendo dat balsamum sulphuris nobilissimum: unguentum de lithargyrio, aureum, de betonica, de pompholyge, de nicotiana, de cerussa, unguentum Wurzii fuscum, album Rhasis, de tutia, de minio: emplastrum diasulphuris Rulandi, sticticum Crollii, Oppoteldoch Paracelsi, diapalmæ, de betonica, de gratia DEI, &c. quæ recentia vulnera subito ad consolidationem perducunt.

Ufus horum simplicium & compositorum est multiplex: Uturpantur enim

- (1.) Vel internè in Potionibus vulnerariis.
- (2.) Vel externè in Injectionibus.
- (3.) Tanquam olea & balsama.
- (4.) Tanquam Unguenta.
- (5.) Tanquam emplastra.

I. Porio vulneraria.

Rx. Efflariat. No. xij.

Rad. symph. maj. ʒi.

Flor. bugloss. alchymill. heder. ʒestr.

Summit. hyper. an Mj.

Concisa & contusa bulliant in f. q. ∇ & vini Colaturæ adde

Syr. capill. Vener. heder. ʒestr. aa.
q. f. M. D. S.

Wund-Trans auf etl. mal.

Sin sitis urgeat, etiam de syrupo è succo citri, &c. addatur, bis in die hauriendo semper ʒiv. ad vj. tribus vel quatuor horis antepastum, in utroque haustu aliquot guttæ balsami sulphuris terebinthinati, vel succinati in nervorum affectibus, assummi possunt:

In forma sicca:

Rx. Mumie ʒß.

Sperm. ceti ʒij.

Lapill. ʒr. præp. ʒiij.

Rhabarb. el. ʒi. vel ij.

Cinam. ʒß. M. f. Pulvis. S.

Heilend Wund-Pflaster.

II. Injectio in vulnera profunda, sinus, item ulcera cavernosa, &c.

Rx. Herb. veron.

Pyrol. sanic.

Fol. nicot. aa. Mij.

Alb. Græc. ʒiij. vel iv.

Coq. in f. q. ∇ simpl.

Colat. q. f. adde

sp. vini vel *mell.* pro lubitu M. D. S.

Wasser zum einzuspritzen.

Hoc externè vulnera & ulcera eluuntur, vel etiam plagulæ in eo madefactæ imponuntur.

III. Oleosa seu balsama vulneraria, quæ, utut simplicia, sunt tamen optima: v. g. sufficiat balsamus Peruvianus vel Tolutanus, item balsamus sulphuris cum oleo hyperici. Quibus tamen placent composita,

Rx. Bals. Peruv.

ʒ. hyperic. momord. ritè par. aa. ʒij.

Bals. ʒis ʒi. ad ʒiß.

g. elemi q. f. pro consistentia balsami liquidioris vulnerarii. Misceantur blando calore, asservetur usui: instilletur vulnere.

Plures compositiones videbitis in Poterii Pharm. Spagy. Wurzio, Hildano, Barbetre, &c.

IV. Unguentum Vulnerarium.

Rx. Summ. hyper. flor. centaur. min. veron. Sanic. aa. ʒi.

Concisa & contusa infunde in. f. q. *ʒ. Oliv.* puri & butyri non saliti v. g. ad ʒiv.

Digere in MB per octiduum, hinc fortiori igne ad exhalationem humiditatis inspissa probe agitando, post per linteum exprime: Materiæ tractæ adde

Terebinth. ʒvj. vel ʒi.

Bals. Peruv. ʒiij.

Pulv. mastich. myrrh. oliban.

Flor. ʒis aa. ʒvj. vel ʒi.

M. pro consistentia Unguenti: D. S.

Wund-Salbe.

V. Emplastrum vulnerarium, imminutione olei, & auctione ceræ & reliquorum siccorum ingredientium ex unguentis parari potest. Vel

Rx. Cere. refinæ. sevirhirc.

Terebinth. aa. lbß.

supra Δ e liquefactis & colatis adde

pulv. rad. consol. maj.

ulmar. aa. ʒi.

ʒ. e. ʒ. dulc. ʒij. M. f. emplastr. S.

Wund-Pflaster.

Cæterum in selectu remediorum internorum & externorum iudicium nonnihil adhibendum est, cum interna præstantiora, & simplicia sint optima: unde ex internis paucædam vulneraria suprâ dicta, it. lapilli cancrorum & antimonium diaphoreticum, sufficiunt; interdum tamen spiritus vel liquor C. C. succinatus in partium nervosarum læsione usurpatur.

Internè in æstu aut phogosi febrili nitrum antimoniatum imprimis sub largiori dosi concedendum est, quibus semper lapilli cancrorum esusque cancrorum fluviatilium addenda erunt: e. g.

Rx. Lapill. ʒ. præp. ʒj.

cinab. ʒij. ʒß.

laud. opiat g. j. M.

In forma Misturæ.

[F] 3

Rx. ʒ. plan-

℞. ʒ. plantag. vel hed. ʒ. estr. ʒ. iij.

Aceti destill. ʒ. β.

extr. succos. plant. vel vulner.

Mich. ʒ. iij.

lapill. ʒ. r. præp. ʒ. i.

laud. opiat. gr. ij. ad iij.

*fyr. corall. vel de symph. Fer-
nel. ʒ. β. M.*

Qui volunt habere selectum Potionum vulnerariarum, adeant Felicem Wurcium.

Cujusdam Chirurgi Neapolitani singulare experimentum in omnibus vulneribus, fuit sequens: Recepit scilicet spiritum vini phlegmaticum, vel etiam in ejus defectu spiritum vini rectificatum, cum aqua communi diluit, calefecit & imposuit vulneribus cum linteis, vel iniecit in sinus, aut fistulas vel profunda vulnera, per siphonem, semper tamen calidè, & hoc effectum edit planè mirabilem; impedit non tantummodò supervenientem inflammationem, sed quancunque etiam ex vulnere arceat corruptionem.

Alii ad vulnera biduo curanda commendat seq.

Recipitur vini spiritus rectificatissimus, quo eluuntur vulnera recenter inflicta; deinde imponitur pulvis subtilissimus aloës hepaticæ cum gossypio, oleo hyperici imprægnato, ligatura comprimitur, & superimponitur emplastrum diasulphuris Rulandi.

Helmontius alias præ cæteris commendat ad curam vulnerum vitriolacea, non tantummodo pulverem sympateticum ex vitriolo Veneris ad solem calcinato, qui curat vulnera in distans, si cruor ex vulnere effluens aut linteum cruore tinctum & madidum, hoc ipso certo modo imbuatur vel ejus virtute imprægnetur, de quo vid. Dygby in Oratione; sed vel maxime colcothar vitrioli probe elotum, sive inspersum, sive dissolutum in liquore & infusum, nempe vino coctum, seu alia ratione applicatum. Sic etiam pro Cura sympathetica Persicaria recens trahitur per aquam frigidam, postea loco contuso imponitur, donec nonnihil incaleseat: postea planta adhuc tepida sepelitur sub finum vel alium locum, ut citò putrescat. In gravioribus vulneribus usus ejus repetendus est, & experimentum est haud contemnendum. Videatur Paracelsus in Herbario, qui primus hujus vires pro Cura magnetica eleganter scrutatus est, vocans eam *Blut-Kraut*.

Aliàs quoque potiones vulnerarias, notanda est earundem varietas, ita ut pro partium vulneratarum ratione etiam delectus subinde habendus sit, v. g. ubi opus est, ut sordes mucilaginosæ, pus, ossicula fracta & similia ex vulnere ejiciantur, egregie conducit in potione vulneraria sanicula, artemisia rubra,

veronica, consolida saracenica, agrimonia, cujus succum Riverius ad vulnera verminosa commendat; hederæ terrestris, chamæpitys, pyrola, sabina, &c. Ex his parata potio fortificatur additione singulis haustibus spermatis ceti aut lapillorum cancerorum.

Præ cæteris autem sabina fortiter adjuvat excretionem heterogeneorum ex vulneribus, si scilicet ejus p. i. cum partibus vj. ingredientium reliquorum, combinetur in potionibus vulnerariis, non omittendo pulverem lapillorum cancerorum præparatorum.

Et quidem potiones hæ, aut dicta vulneraria non usurpanda, nisi quando vitium est insignius in vulnere; subito enim atque vulnus probè mundatum denuò coire incipit, abstinendum est ab his. Hinc etiam quando propinantur potiones vulnerariæ, non opus est tot unguenta & balsama applicare vulnere, quoniam ipsa potio succurrit naturæ in medendo vulnere.

Facit huc imprimis, quod refert Forestus l. 6. *Chirurgiæ Observ.* 17. scilicet de vulnere thoracis utramque partem perforantem, quod nempe omnes, cum vulnera ejus tractarent, persuasi fuerint, per vulnera aperta odorem decocti vulnerarii transudare & quasi roridum quid illius per vulnera transmitti, quod ipsum etiam aliquoties se observasse mihi affirmavit Patavii Marchettis Junior.

De Vulnerum Cura Magnetica videbitis in Helmontio, Digby in Theatro sympatetico, Maxvelli Medicina Magnetica, & Bartholino de Transplantatione Morborum.

ARTICULUS I. DE VULNERIBUS cum CONTUSIONE.

INter Vulnera autem in specie consideratio- nem subeunt primò Vulnera cum contusione facta, in quibus istud quod contusum est facile mortificatur, putrescit, & consolidationem vulneris impedit. Itaque in hoc casu istud, quod contusum est & mortificatum, reparetur & per turundas foras excernatur. Equidem quæritur; an suppuratio expectanda sit? & an non potius pars scarificanda & profundius incidenda sit & sanguis extrahendus secundum Wurcium, quia sanguis tardius in pus muratus in gangranam abit? Respondeo cum distinctione: Contusio cum vulnere vel est levior, ut spes sit per suppurationem eam posse curari pedetentim; in tali casu sufficiunt digestiva & suppurantia; si vero cum vulnere graviore conjuncta sit contusio, & metus sit, ne gangraena superveniat ante suppurationem abscessus, præter vulneraria mox scarificando aut incidendo contusionis locus aperiendus erit, & sanguinis exitus promovendus, hinc digestivis, quod reliquum est, sub forma puris

puris promovendum; digestivis tamen aliquid de unguento Ægyptiaco addendum est, ut præcaveatur gangræna.

Cum his etiam applicanda externa, inspecie in principio morbi corruptionem ulterius præcaventia: eminet oleum ceræ illitum, de-
 si. *Rad. consol. maj.* ʒiʒ.
figill. Salom. ʒi.
 Coqu. in vino, vel solo, vel cum ʒmisto,
 pro Fotu D. S.

Eusserliche Bähung.

MEMBRUM UNICUM.
 DE SCLOPETORUM VULNERIBUS.

Sclopetorum Vulnera propter istam contusionem sunt omnium pessima, adeoque periculosa; cum in omni sclopetorum vulnere semper insignis contusio & partium dilaceratio conjuncta sit; nam globulus, quousque penetrat, omne secum contundendo & dilacerando absumit.

Quæstio est: an etiam ardor adsit: vix probabile est, quod calor cum globo communicetur parti, nisi propius fuerit læsus patiens. In tali casu, globulus intenso ardore seu calore fervens partem quasi nonnihil amburit, de quo vid. imprimis Horstius in *Obs. lib. 1. de Casibus Chirurgicis*.

Hoc certum est, quod globi majores tormentorum bellicorum, *die Eisen-Kugeln* / si infixi hæreant in pariete, & brevi post attingantur, intensè calidi semper soleant percipi.

CURA.

Ut ergo curentur sclopetorum vulnera præter internas potiones vulnerarias hic imprimis proficuas, & præter usum nitri, nunc solummodo depurati, nunc cum antimonio fixati; item præter usum pulveris pyrii externe omne contusum in pus est maturandum, idque fit tardè: nam vulnera sclopetorum vix ante tertium vel quartum diem suppurari solent, ob id etiam sufficit, si inter hoc tempus singulis 24. horis semel tantum deligentur.

Facta autem suppuratione, & inde nato abscessu, & eo, quod contusum est, sub forma puris separato, mundificantibus & incarnantibus debitis denuò vulnus est curandum, modò omne extraneum ex vulnere prius fuerit exemptum: Globi enim non semper extrahi possunt, & etiam tuto remanere possunt.

Jam ergo pro scopo suppurationis substantiæ contusæ, optimum est, ut applicen-

tur ante omnia digestiva & maturantia, quibus semper spiritus vini, item balsamus Peruvianus in minori dosi est addendus, ne hæc ipsa digestiva nervosis partibus noceant, nec labia vulneris contusa ad gangrenam ruant, cum & ipse spiritus vini in ambustionibus egregiè conducat: hinc turundæ, quibus illinuntur unguenta digestiva & suppurantia, optimo consilio prius immerguntur in vini spiritum, & deinceps digestivo illinuntur, præprimis etiam, quoniam sola digestiva partibus nervosis non semper æque conveniunt: propterea optimè additur vini spiritus, qui omnem metuendam noxam corrigit, & quidem ita applicantur, ut utrinque puri pateat exitus.

Loco digestivi communis optimè applicatur balsamum Parei, quod describitur à Sennerto & Barbette.

Applicantur hæc digestiva cum turundis iisque nunc una, si scilicet vulnus non penetrat; nunc vero applicantur cum turunda duplici, si sc. vulnus sit penetrans.

Ubi ergo per hæc & similia suppuratum est vulnus, & omne contusum separatum, applicandum est mundificativum Vigierii, vel quodcunque aliud pro purulentis abstergendis & ulceribus detergendis:

Hoc ipso mundificandum est vulnus suppuratum, donec spontè caro nova succescat.

Quod si verò aut in suppuratione, aut subsequente mundificatione, putredo ac corruptio adsit insignior, in specie in loco non nimis nervoso, supra dictis remediis nonnihil de Mercurio præcipit. quantum fieri potest, dulcificato commodè addi potest, idque imprimis, ubi partes nervosæ minus fuerint læsæ.

Interdum in sclopetorum vulneribus superveniunt dolores ossium in profundo, imprimis si vulnera non bene fuerint curata; in his singulare est ʒ. terebinthinæ, in specie si adsit suspicio *von einem Rlect- oder Schlig-Bruch*; hoc enim oleum illitum mirè emollit & lenit partem consolidatam, & promovet in fissuris ossium, ut coeant, & si osculum est abscissum, hujus separationem promovet, adeo ut quicquid præternaturale relictum sit, extrudatur foras.

Sufficit hæc vulnerum sclopetorum Curatio: placet tamen quibusdam autoribus in prima horum vulnerum deligatione ad ardorem à globulo inductum corrigendum, linimentum ex cremore ʒ. cum melle mixto, ad imitationem Agricola in Chirurgia Parva applicare: quo tamen, ut antea monui, non semper opus est.

Loco hujus quoque convenit ipsa aqua calcis vivæ cum succo cancerorum fluvatilium cum phlegmate aluminis expresso.

ARTI-

ARTICULUS II.

DE VULNERIBUS MALIGNIS
& VENENATIS.

FIt interdum, ut læsionem simpliciter inductam, ipsa causa lædens malignitate venenosâ sit tincta, sive armis venenatis, sive morfu animalium iratorum aut venenosorum infligantur, unde etiam dantur vulnera maligna & venenata.

D I A G N O S I S.

Morsu animalium vulnera inflicta facile patent; semper enim suspicio est, in omni animalium morfu latere venenum.

Sed si arma, aut globuli, aut alia instrumenta veneno sint infecta, hoc ipsum à priori cognosci nequit. Cognoscitur autem ferè à posteriori, scilicet ex supervenientibus gravioribus symptomatis, dum nempe partem vulneratam urget dolor atrocior, quàm naturaliter fieri potest; item si brevi post læsionem partis vulneratæ color nativus seu naturalis mutetur, & cœruleus, lividus ac nigricans fiat, adeoque ipsa gangræna immineat; item si non tantum in parte vulnerata, sed in ipso toto corpore atrociora superveniant symptomata, in specie angustia præcordiorum, sudores symptomatici, frigidi & glutinosi, syncope, ardores, cephalalgia horrenda, ac similia pessima symptomata.

P R O G N O S I S.

Vulnera hæc, sive ab animalibus venenosis, sive ab armis veneno tinctis, inflicta fuerint, ut plurimum lethalem eventum habere solent, quorum venenositas consistit in hoc, quod idea furoris & rabiei corpori nostro communicetur.

C U R A.

Animalia ergo venenata si læserint, aut mordendo aut pungendo, observetur diversitas animalium lædentium, ut læsus locus nunc scarificatione, nunc sine scarificatione, appropriatis curetur. Scarificandum est, quando vulnus profundius, ac metus est, ne venenum, quod penitus immissum est, & elicere volumus, mediante sanguine ad cor deferatur; aut sine scarificatione, ubi minus virulentia communicatum fuerit. Theriaca sola cum spiritu vini applicata, item pulvis bufonum, viperarum & scorpionum, decantata sunt remedia & optima. Stercus humanum cum allii capitibus impositum certum levamen affert. Conducit quoque succus cydoniorum recens instillatus, si vulnera venenata à telis infectis, vel sclopetis, inflicta fuerint. Sic in vesparum puncturis sufficit oleum scorpionum vetus, item emplastrum de ranis Vigonis cum Mercurio. In araneorum punctura allium & cepæ contusæ, iterum folia

salviæ: vid. M. A. N. C. *Ann.* 8. *Observ.* 35. commodè imponuntur.

Sin Viperæ momorderint, præmissa scarificatione bufo vivus contusus & applicatus optimè conducit: aut si desit vivus, sufficit bufo aridus, vel nude, vel, prius in aceto vel vino maceratus, & applicatus, vel pulverisatus & inspersus; aut saltem ferrum probe candefactum prius loco morsuræ est applicandum, citra tamen ambustionem, uti hoc propriâ experientiâ recenset Boyle in *Philos. Experimental.* Succus foliorum fraxini etiam commendatur, vulnere applicatus, & haustus urinæ.

Quodsi verò Canes aliæve animalia rabiosa mordendo vulneraverint, optimum est applicare lapidem serpentinum, qui in serpentibus pileatis Indiæ Orientalis reperitur, aut etiam ex iisdem fabricatur: de quo præter experimenta alia imprimis videndus est Kircherus in *Tr. Regn. Nat. Magneticum.* conf. M. A. N. C. *Ann.* 4. & 5. *Observ.* 2. In hujus defectu sufficit, ut morsui canis rabidi vel alius animalis post factam scarificationem imponatur emplastrum magneticum Angeli Salæ, cui pulvis cancerorum fluviatilium, vel per se, vel calcinatorum, addi debet.

Quodsi inflammationem vel dolorem inferre velit, illinitur locus vicinus oleo scorpionum cum paucis saccharo saturni.

Est aliàs hoc emplastrum magneticum catholicum ad quoscunque morsus animalium venenatorum, modò additione vel pulveris cancerorum, vel bufonum, vel viperarum, pro varietate bestia lædentis, approprietur plagæ inflictæ. Communiter expertum remedium est cataplasma paratum ex

Cepa acris, cap. allii aa. No. i.

Theriac. opt. Ferm. vulg. aa. ʒʒ.

quæ omnia invicem pistata applicantur loco morsuræ.

His ita applicatis, correcto & elcito sic veneno, postmodum ipsum vulnusculum sæpius leve vel sponte, vel leni applicato balsamo vel digestivo, si in morsu contusio quædam facta sit, curari potest, cui digestivo semper aliquid unguenti Ægyptiaci, vel communis, vel ab Hildano correcti, addendum erit.

Internè interea non cessandum, sed appropriatis remediis, imprimis sale volatili & spiritu viperino, it. spiritu & decocto cancerum fluviatilium, in rabiosis simul progressus veneni, ejusque activitas est cohibenda.

Quodsi verò venenatis armis inflictum sit vulnus, tunc imprimis, ut extrahatur virulentia, opera danda est applicando scilicet Cataplasma sequens:

R. Cepar. coct. ʒiij. sterc. capr. ʒi. Theriac. ʒʒ.

Ol.

Ol. scorpion. ʒiβ. Mellis, Cera, aa. q. f.

f. Emplastrum vel Cataplasma.

Vel etiam Emplastr. magnet. Angeli Salæ imponendum, aut usurpandum est emplastrum singulariter expertum Guidonis.

Internè appropriatis sudoriferis alexipharmacis, in specie aceto destillato cum theriaca aut electuario diascordii Fracastorii, tinctura bezoardica, spiritu theriacali camphorato, antimonio diaphoretico, & similibus antimonialibus fixis cum nitro preparatis, virulentia maturè est occurrendum. Elegans est observatio Foresti, qui *lib. 12. Chirurgia Obs. 10.* refert, cum in bello Turcico plures vulnerati ex telis venenatis subito morerentur, supervenisse tandem Medicum senem, qui vulneribus poma cydonia, dentibus contrita, & ita saliva jejuna permista, apposuit, nullis remediis antea juvantibus.

Extracto veneno ex vulnere, vulnus ad sui consolidationem perducendum est.

ARTICULUS III.

DE VENARUM & ARTERIARUM VULNERIBUS.

CÆterum imprimis consideranda sunt Vulnere vasorum sanguifluorum, nempe Venarum & Arteriarum, propter gravissimam supervenientem hæmorrhagiam, sæpius lethalem: minus quidem periculosam, si fuerit læsa vena; nam & facilius sistitur: magis periculosam, ubi arteria fuerit læsa; Et quidem vix erit vulnus, quod non habeat comitem hæmorrhagiam,

PROGNOSIS.

Imprimis tamen hæc est periculosa, ubi majora læsa sunt vasa, adeoque primum, quod urget Chirurgum, est, ut hæmorrhagia nimia sedetur.

CURA.

Vulgò ad sanguinem sistendum utilissimus est crepitus lupi, probe exsiccatus & compressus, vasi læso applicatus arcte, ut ex sanguine eo magis turgescat, & turgescendo orificia vasorum læsa obturet. Si hic solus non suffecerit, immergatur solutioni vitrioli Martis non adeo forti. Ad hæc convenit liquor stipticus modernorum, qui fit ex solutione vitrioli Martis, cui additur dimidium aluminis soluti in decocto quodam vegetabili blando & adstringente, quæ frigida cum bombace vel stuppis cannabinis applicentur vulnere. Vel, si vulnera fiant profunda, conveniens est, ut immittatur pulvis ex lunæ lacte, bolo Armena, & capite mortuo vitrioli probe cloto. Pulvis Galeni compositus ex aloë, thure, sanguine Draconis & bolo Armena invicem mistis, & stuppis albumine ovi madefactis insper-

Tom. II. Pars 2.

sis & applicatis, confert. Melius adhuc est, si terra vitrioli dulcis, nunc sola, nunc cum parum terræ sigillatæ mista, cum albumine ovi subacta, cum stuppis intrudatur vel applicetur arcte vasi læso; quin & tinctura sulphuris vitrioli cum stappa applicata, in specie arteriæ, optime confert. Fuligo furni cum albumine ovi subacta: vel Bursa pastoris contusa imponatur vulneribus recentibus, succus foliorum fraxini vulneribus infunditur, vel ipsa folia vulneribus illis & locis, per quæ hæmorrhagiæ contingunt, applicantur. Muscus quercinus pulverisatus, aut medulla sambuci pulverisata inspersa, etiam compescit hæmorrhagiam: quibus tamen longe præferenda est usnea cranii humani vera. Conducit etiam stercus asini recens, aut pulverisatum, aut succus ex eodem expressus, aut cum sanguine effluente exsiccato permixtus. Spertiola Crollii in aqua spermatis ranarum soluta in hæmorrhagia arteriæ ex inepta venæ sectione, utilis est, & citra aneurisma curat. Linteum etiam alumine & spermate ranarum probe imprægnatum, exsiccatum, atque iterum imprægnatum, atque impositum vulnere, multum conducit. Huc facit pulvis stipticus expertissimus ex alumine & lacca pictoria, qui describitur in M. A. N. C. *Ann. 1. obs. 24. pag. 89. Ann. 2. pag. 403. & Ann. 9. & 10. Obs. 151. pag. 326.*

In arteriarum puncturis minoribus applicata pilula ex laudano opiato, est experimentum ab Horstio recensitum *lib. 9. obs. 12.*

R. Acet. vin. fortiss. ʒi.

Crocis ʒi.

Colcothar. f. ʒa. Oli. dulc. ʒβ.

His probe invicem subactis madefiant vel lintea vel stuppæ, conspergantur pulvere lumbricorum terrestrium.

De pulvere sympathetico & similibus, tanquam vulgo notis, nihil addo.

Quod si his nequeat compesci hæmorrhagia, ligatura interdum vasorum applicanda est, imprimis quidem in membris abscissis, ceteroquin autem locum non habet. Sunt qui cauteria admovent, nunc actualia, nunc potentialia, in specie vitriolacea, uti de aneurismate monui. Actualia sunt periculosissima propter gravia supervenientia symptomata, item quoniam decedente crusta seu eschara nihilominus sæpius nova supervenit hæmorrhagia. Tutiora sunt caustica potentialia; non quidem spiritus acidi, sed vitriolum ad albedinem calcinatum, vel cum bombace applicatum, vel cum crepitu lupi permixtum, modo, quod sedulo cavendum, non pateat nervus vel tendo insignior in vulnere, ad quem scilicet vis vitrioli corrosiva perveniat, & ita periculosissima symptomata inducat.

De remediis internis pauca monenda sunt, quia hoc loco non adeo conveniunt.

[G]

Inte-

Interim tamen, quia observatur quotidie, quod vel iracundia ægri, vel ebrietas, vel incallescencia à vino, &c. agitent massam sanguineam, & hæmorrhagiam atrociorē reddant, hinc pro sanguinis impetū compescendo nitrum & omnia nitrata, item omnia sterora, ex porco vel asino desumpta, sunt optima, hinc nitrum antimoniatum, tinctura sulphuris, vitrioli, mixtura acidulæ cum tinctura antiphthifica seu saturni composita, tinctura Martis adstringens, & similia aliàs nota: observando, ut affectus graviores, imprimis iræ, hinc amoris, sedulo vitentur: item quodcunque corporis exercitium, uti etiam paroxysmi morboſi, sub quibus interdum recrudescunt hæmorrhagiæ, studiosè præcavendi.

ARTICULUS IV. DE NERVORUM VULNERIBUS.

Vulnera nervorum imprimis, & partium nervosarum læsiones, cautissimè sunt tractandæ

1. Propter dolorem inflammatorium & convulsiones.
2. Propter facilem partium nervosarum alterationem ab aère externo, hinc corruptionem ac gangranam.
3. Propter synoviae fluxum, qui sæpissime vulnerum consolidationem impedit, & periculosam partis atrophiam, interdum totius corporis tabem post se trahit.

PROGNOSIS.

Vulnera hæc sunt periculosissima, ut etiam punctura insectorum adeo sit periculosa, quia ut plurimum læditur nervus ac tendo.

CURA.

In genere ergo, totum membrum usque ad principium nervorum, ad membrum derivatorum, inungendum est oleo lumbricorum, acuato cum oleo destillato lavendulæ; aut cum oleo salviæ, aut succini, aut similibus. Vel *℞. Ol. lumbricor.*

Vulpin.

Axung. hum. vel viperar. aa. ʒj.

succ. lumbr. ʒss.

M. probe & illinantur membro.

Cataplasma etiam ex radice consolidæ majoris, & sigilli Salomonis cum vino & aqua coctis convenit. Vel

℞. Fol. beton. rec. p. i.

rad. symph. rec. p. ij.

Contusa applica in forma cataplasmaris.

Vel si recens haberi nequit, symphytum pulverisatum cum vino calido in cataplasma redigatur & apponatur.

In specie omnia unctuosa, mucilaginosa, & expressa oleosa aut pingua, sunt admodum

nociva; sæpe enim dolores, gangrænas & inflammationes inducunt, inde etiam oriuntur vermiculi innumeri. Quin potius volatiliora paulo penetrantiora, & quæ vulgo dicuntur calidiora, usurpanda: qua ratione balsamus Peruvianus, oleum ceræ, oleum destillatum lavendulæ, oleum Philosophorum, oleum lauri destillatum, succini, mistum cum terebinthina & saccharo saturni, balsamum hyperici, spiritus vini, gummi elemi, tacamahacæ & caranhæ, imprimis conducunt.

Si vero Nervus per transversum læsus sit, vel tendo vel ligamentum, inter remedia usitata semper simul dicta balsama vulneraria acenda sunt cum aliquot guttis olei destillati cujusdam. Præceteris oleum terebinthinæ, salviæ, succini, &c. conveniunt. Specialissime lumbricalia optima læsorum nervorum sunt solamina, qua ratione Oleum hyperici carpis compositum optime confert.

Alias aurium cerumina sunt specificum Helmontii; sicuti Galenus usurpavit Euphorbium, quod & hoc tempore adhuc ad nervos punctim læsos ex inepta venæsectione est optimū,

℞. Euphorb. ʒj.

Terebinth. ʒss.

Ceræ parum.

quæ mista extendantur super linteum, & applicantur per quam calide, id quod non tantummodo est experimentum Sculteti *in Obs. 64.* sed præterea Helidæi Paduani *in Obs. pag. 310.*

Si hætenus dicta non sufficiant, Moderni per suturas conjungunt tendines dissectos. Res prima fronte videtur paradoxa & periculosa, si scilicet punctura tendinis minatur concussionem, quomodo possint acubus consui? Nihilominus hujus experimentum factum esse Parisi ipse observavi, cum cuidam juveni in carpo manus omnes tendines per transversum erant dissecti: Huic Chirurgus per acum valde latam, sed admodum subtilem, intra fibras, ex quibus constant tendines, tam artificiosè intrusam, denuo per subsequens filum consuebat, & hinc balsamo vulnerario efficaci vulnus & suturas illinebat; sic enim postmodum brevi consolidabantur iterum tendines, & dissecti denuo uniebantur, citra hoc, ut motum digitorum perderet æger.

Hoc tamen post curam supervenit incommodi, ut toties, quoties tempestatum mutationes ingruerent, æger in loco antiqui vulneris perciperet dolorem quodammodo similem podagræ. Postmodum etiam inveni hujusmodi suturam tendinum per filum in Veslingii *Epistolis & Observ.* à Bartholino editis *p. m. 90. & 91.*

Alias tendines, ligamenta, & per consequens articulorum vulnera, uti hæc sunt frequentissima, per Balsama vulneraria apparenter calidiora debent curari, omissis imprimis, nisi
summa

summa urgeat necessitas, turundis, utpote à quibus propter dolorem sæpius exasperantur hæc vulnera.

ARTICULUS V.
DE PECTORIS VULNERIBUS.

IN Vulneribus pectus penetrantibus, vel pulmones lædentibus, observandum est:

I. Ut semper habeatur respectus & metus pleuritidis imminentiæ & peripneumoniæ, unde internis remediis, hos affectus curantibus, tam præservative, quam curative, semper insistendum est.

II. Quod etiam subinde necesse sit, applicare turundas, ut sanguini & saniei pateat liberior exitus, ne superveniat empyema. Hæ parandæ sunt, ut habeant extrinsecus anfulas, ne possint intrudi, unde etiam applicandæ sunt sub expiratione.

III. Observandum etiam, quod semper sint seligenda talia remedia, quæ simul habeant vim diureticam, aut potionibus vulnerariis diuretica addenda sunt: observatum enim est, quod optime, subinde sponte, subinde arte, tam sanguinis grumi, quam pus & sanies, evacuata sint à natura per copiosum urinæ fluxum.

IV. Quod ea vulnera, quæ inferiores costas penetrant, infra septimam costam, sint simpliciter vulnera abdominis, non pectoris, quia non penetrant diaphragma: unde etiam nullum signum læsi pectoris ex respiratione læsa potest haberi; sed potius abdominis pathemata investiganda erunt.

ARTICULUS VI.
DE CAPITIS VULNERIBUS.

DE his videatur Petri Paw, *Anatom. succenturiat. seu Commentar. in Hippocr. de Vulner. capitis*: item Marchettin *in Obs. Chirurg. & Scultetus in Armam. Chirurg.*

Vulnera Capiti inflata sunt vel cæsim vel contusim. Illa lædunt vel saltem partes extimas supra cranium, vel simul cranium, ut tamen non penetrent universum, vel dividant etiam cranium & meninges, vel etiam ipsum cerebrum.

CUR A.

In omnibus capitis affectibus alvus sit aperta. In specie vero, si vulnera saltim sint superficialia, facillime curantur vel cum betonica contusa & succulenta imposita, vel oleo hyperici, vel balsamo Peruviano, imponendo desuper emplastrum de betonica malaxatum cum balsamo Peruviano, Vel

¶. *Empl. de beton.*

G. *Tacamahac.* aa. q. f.

Malax. c. Bals. Peruviano.

Loco hujus sit emplastrum de gummi hede-
TOM. II. Pars 2.

ra Alexandri Benedicti: Videatur Henricus ab Heer. Vel emplastrum Arcæi contra vulnerationes capitis:

Sin vero vulnus cranium lædat, non tamen penitus perforet, inspergatur cranium pulvis ex radice iridis, aloë, myrrha, cum spiritu vini imprægnatus; vel pulvis ex bolo Armena, Iride Florentina, Aristolochia rotunda, & similibus, tantillo olei destillati terebinthinæ imprægnatus, ut impediatur ejus corruptio aut caries; desuper vero imponantur filamenta sicca. Caveamus etiam in cranium læso à quocunque unctuofo, aut viscido, aut pingui; disponit enim cranium ad cariem. Si vulnera autem penetrant, & cranium divisum, & meninges læsæ, hæmorrhagia interna mature sistatur, quod fit pulvere Galeni ex aloë, thure, & albumine ovi conquassato: quibus parum boli Armenæ addendum. Hæmorrhagiâ sedata, immittantur intra cranium linteola, imprægnata tantillo olei ex terebinthina, vel balsami Peruviani, vel de copaibe, ut quasi odoratenus afficiatur cerebrum ejusque membrana. Ipsi cranium læso supra dicti pulveres applicentur & foveatur linteis siccis: Vulnera vero curantur externe per balsamum vulnerarium. In usu est, ut cerebro læso applicetur oleum rosarum, sed male, quia talia membranam lædunt. Mel etiam applicatur, sed convenit saltem, ubi cerebrum corrumpitur, & membrana incipiunt putrescere, tunc mel imprægnandum est aliquot guttis olei destillati terebinth.

Vulnera contusim facta sunt vel superficialia, vel graviora. Superficialia parum habent in recessu. Illinitur loco contuso oleum hyperici imprægnatum cum oleo destillato anisi. Si vero sint graviora, ut magnus tumor immineat, considerandum est, an insensiliter possit discuti, si non, aperiatur in principio, ut contusio suppurata quantocyus evacuetur, ne pus ex retentione acrius factum pericranium & cranium erodat, & cariosum reddere incipiat. Si vero contusio fuerit gravior, est vel sine vulnere, & tunc modo dicto curetur; vel cum vulnere, & tunc est vel sine cranii læsione, vel cum læsione. Contusio gravior cum vulnere sine cranii læsione curatur more reliquorum vulnerum contusorum, nempe digestivis & suppurantibus: pro quo casu præ reliquis commendatur gummi elemi, aut unguentum Arcæi.

Convenit etiam gummi elemi cum terebinthina mistum in forma emplastri.

Si vero cranium simul fuerit læsum, interdum fit, ut cranium ex contusione deprimatur, & nunc cum, nunc sine fractura; sine fractura in capite infantum, quorum ossa sunt mollia, & possunt cedere; cum fractura, in adultis.

Porro gravior contusio capitis, quæ cranium lædit, istud interdum findit, vel in loco contuso, vel in loco opposito, quod vocatur

[G] 2

contra-

contrafissura. Fissura nunc penetrat utramque laminam, nunc ex una illâ internâ, nunc internam externâ sana. Signa desumuntur

1. Ex symptomatibus.
2. Ex causis lædentibus.
3. Ex ipsis sensibus.

I. Symptomata sunt multiplicia; in specie vomitus biliosi, vertigo, sanguinis per os, nares, aures, & simil. effluxus, subitanea obmutescencia, & brevi superveniens delirium, convulsiones, paralytis. Symptomata hæc superveniunt nunc mox in principio, ubi gravior fuerit læsio, nunc quarto vel septimo die, ubi levior. Origo horum symptomatum est, quod festuca pungat cerebri membranas, vel quod sanies destillet in membranas cerebri, & acrior facta easdem vellit, & sanguis grumofus intra cranium ex læsis meningibus collectus, inferat hæc symptomata.

II. Suspicio etiam desumitur à majoribus instrumentis.

III. Visus ipse; Præter apertionem cranii, nempe præter specillum & ocularem inspectionem, ad fissuras cognoscendas est experimentum Cataplasma ex farina fabarum capiti raso applicatum: hoc, ubi non sunt fracturæ, exsiccat; secundum ductum vero fissuræ non exsiccat: Vid. Borellus *Cent. 2. Obs. 20.* Ubi de fissuris inscii sunt Chirurgi, jubent, ut ægri accipiant funiculum, firmiter teneant inter maxillas, quem fortiter Chirurgus post se trahat, si ita æger habeat fissuram in cranio, in loco fisso percipit dolorem: quod etiam fit, si fortiter contineat mandibulas, aut nucleum cerasi frangat; quod si fissura adsit, in loco quodam dolorem insigniorem percipiunt. Quo in casu ut plurimum necesse est, ut perforetur cranium, ut sanguini effuso & saniei pateat exitus, ubi etiam festucæ, si quæ sint, removeantur & tollantur. Unum adhuc observandum, quod observavit Glandorpheus in *Speculo Chirurg. Observ. 4.* Nempe fieri interdum, ut in graviore capitis contusione & læsione, ex sanguine collecto intra meninges, etiam integras, generetur pus, quod graviora infert symptomata, ubi aperiendum cranium, & dura mater scalpello, ut sanies educatur. Ad hæc observandum, quod nempe vulnera interdum capitis simplicia post quartum vel septimum diem contrahant dolores, hinc rigorem & febrim. Hæc si superveniant in graviore capitis læsione & contusione, suspicio est fracturæ cranii & fissuræ, adeoque necessum est, ut cranium aperiatur trepano: si non appareant, non statim debent perforari, quia dicta symptomata etiam interdum ex alia causa superveniunt. Nisi ergo adsint alia sympto-

mata, quæ cranii fracti vel fissi suspicionem inferant, non statim ad trepanationem accedendum est. Præcipitur etiam, ut in trepanatione vitetur musculus temporalis: interdum tamen quidam Chirurgi etiam hunc musculum per transversum secant, vid. Rive-rius *Observat. Communicat. & Borellus Cent. 2. Obs. 20.*

ARTICULUS VII. DE VULNERUM SYMPTOMATIS.

Circa vulnera subinde urgent quædam symptomata, quæ specialem merentur considerationem. Hæc sunt vel generalia, vel specialia. Illa sunt, quæ vulneribus quibuscunq; solent evenire: Hæc vero, quæ saltem superveniunt vulneribus in hac vel ista persona, idque ex peculiari conditione ægri, qualia sunt v.g. quæ superveniunt viro vulnerato, cui hæmorrhoides suppressæ sunt. In his casibus causis symptomatum prospiciendum est, fluxus tamen promovendus, non tam internis, quam externis. Interna quidem humoribus motum largiuntur, sed, omnis impetus transfertur in locum læsum, & sic exasperantur symptomata.

MEMBRUM I. DE VULNERUM INFLAMMATIONE.

Inter symptomata ergo est Inflammatio, quam præ reliquis sistit aqua calcis vivæ, vel crude applicata, vel cum saccharo saturni aut cerussa imprægnata; Item imprægnetur cum camphora. Hinc remedia cancrina, aqua nempe cancrorum putrefactorum nonnihil destillata, applicata vulnere & inflammationem sistit, & sanguinis fluxum in vulneribus articularum & partium nervosarum solet præcavere & sistere. Canceri fluviatiles etiam contusi fundunt succum, qui expressus, & cum multiplicatis linteis applicatus, est conveniens. Interne convenit succus plantaginis, qui etiam externe non inelegans est. Vel

℞. *Lapill. Sr. præp.* ʒi.

Mum. patib.

Sangu. hirc. aa. ʒʒ. M. pro r. dosi.

MEMBRUM II. DE VULNERUM ERYSIPELATE.

SI Erysipelas affligit vulnera, illinatur erysipelas cum spiritu vini, in quo dissoluta sit theriaca, & additum parum salis absinthii; vel inspergantur pulveres erysipelacei ex floribus sambuci, creta, farina, cerussa, & similibus.

MEM-

MEMBRUM III.
DE CARNE IN VULNERIBUS
LUXURIANTE.

SI in vulnerum consolidatione observatur Caro luxurians, *wild Fleisch* / non debitis epuloticis curandum vulnus; tunc enim fibræ aut stamina nervea laxata partem reddunt spongiosam, unde pars ista recrudescit. Curatur autem adspargendo alumen ustum, vel crocum metallorum, aut illinatur caro luxurians cum unguento Ægyptiaco. Præ reliquis corveniunt aquæ virides, inter quas excellunt Plateri, Hartmanni, & Barbette. Instar omnium sit lapis infernalis seu pulvis crystallorum lunæ in aqua forti solutæ: unde postmodum applicetur emplastrum epuloticum.

MEMBRUM IV.
DE VULNERUM DOLORIBUS.

Interdum Dolores graves urgent ægrum vulneratum, quidam tertio aut quarto die superveniunt, quando vulnus incepit suppurari: Dolor vero præternaturalis & incensus, supervenit partibus nervosis, aut circa articulos læsis, item cum quadam tensione, quæ tensio sunt incipientes spasmi partium nervosarum & tendinosarum. Hos dolores, præter interna blanda opiata, imprimis sistunt externa, & olea nervina: Quapropter

℞. *Ol. lumbr. terr.* ℥iv.
destill. lavend. vel *bacc. Lauri* ℥i℥.
succini. ℥℥. M.

Vel cum unguento dialthææ, imprægnato balsamo Peruviano, & additis aliquot guttis olei destillati lavendulæ seu spicæ.

MEMBRUM V.
DE SYNOVIA.

Hoc ipsum est nihil aliud, quam fluxus nutrimenti nervosarum partium albicans, quod accescit successu temporis, in partibus nervosis obvium potissimum.

PROGNOSIS.

Periculofum & fere funestum est symptoma, & subinde partium atrophiam relinquit.

CURA.

℞. *Pulv. testar. ostr.* ℥j.
Cicon calcin. vel *lap. calamin.*
Ossis sepie,
Maxill. lucii pisc. calc. aa. ℥ij.
Spodii præp.
℞e sigillat. vel *alum* aa. ℥i℥.
M. f. Pulvis.

qui inspergatur vulnere synoviam ploranti.

Chirurgus quidam recipit usneam cranii humani & laccampiætorum ana; aut pulverem ex ipsis ossibus humanis seu calvariarum, lintheo concepto vulneribus applicare solebat, &

pro summo habuit secreto: vid. M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 53. pag. 104. Optimum quoque est Unguentum fuscum Wurzii. Vel recipiatur loco ejus vitrioli toties calcinati simpliciter terra vitrioli dulcis, speciatim ex vitriolo Martis, & dicto modo cum hoc procedatur, atque vult Autor; Vel recipitur Unguentum simplex, & addatur Olii dulcis, in aceto dicto permixtum, quantum postulat ingredientium proportio.

Alias stercus procinum cum sanguine vulneris invicem mistum coquatur, & ita vulnere applicetur instar cataplasmati; Quin & linteam sanguine primo menstruo virginis tinctum, sive humidum sive siccum applicatum, certissimum habetur remedium. Polychrestum est; si destilletur aqua ex canceris fluvialibus contusis: hæc enim cum linteis duplicatis imposita, non tantummodo synoviam sistit, sed præterea omnes inflammationes, erysipelata, dolores, &c. partium vulneratarum.

MEMBRUM VI.
DE PARTIUM VULNERATARUM CONVULSIONE.

Si superveniat Convulsio partibus vulneratis, magnum imminet periculum ægro, ne inter has epilepsia superveniens eum interimat.

CAUSA.

Causa semper est in parte læsa.

CURA.

Præter interna spasmis resistentia, & in specie specifica cephalica succinata, & salia volatilia ex regno animali, externa investiganda est causa: & si adest punctura, læsio curatur, ut supra dictum; si incisio nervi, non tamen perfecta, per transversum discindatur nervus aut tendo; melius est enim, partem sensu privare, quam ægrum vitæ. Conveniunt Linimenta hoc in casu ex balsamo Peruviano, quibus oleum destillatum succini & similia addenda sunt.

MEMBRUM VII.
DE FEBRIBUS VULNERARIIS.

Quod si vero fiat, ut vulneribus jungantur Febres, pro varietate febrium res majoris vel minoris est periculi; sive febris hæc symptomatica sit ex nimia sanguinis commotione in vulnerato, ex iracundia, terrore, &c. sive sit ex generatione puris in vulnere, quod die quarto, septimo, nono fit; aut ex inflammatione superveniente vulnere.

DIAGNOSIS.

Tales febres procedere solet sensus ardoris in vulneribus, oculorum rubedo, phlogoses & dolores insoliti in vulneribus.

PROGNOSIS.

Facile curantur, imo interdum vel sponte

te evanescunt. Verum si sint continuæ, aut si ex læsa sanguinis crasi superveniant, periculosa sunt admodum, & quæ non parum curam vulneris, remorantur, quin subinde vulnus ipsum asperius reddunt.

C U R A.

Hæ ipsæ febres optime curantur remediis acidum in vulneribus peccans, & sanguinem inficiens, absorbentibus & corrigentibus: propterea primatum obtinent blanda diaphoretica, si scilicet propinetur ℞. antimonii diaphoretici in aqua fumaris, vel convenienti mistura cum spiritu theriacali camphorato, & lapillis cancerorum præparatis in vino vel aceto destillato propinati, vel corallia, & magisterium coralliorum cum succo citri, ☉ ammoniacum & spiritus ☉ci cum debitis Mixturis Vulnerariis.

Si ardor & litis nimis urgeant, ad ☉ accedendum est, & sumatur vel ☉ purum, vel ☉ statum, & similia, quæ convenienter in his febribus conducunt, simul etiam Julepis possunt addi: vel fiat Julepus ex ▽ fontana, cui syrupus ribium & berberum additus fuit, addito parum de spiritu nitri dulci. Continuentur simul vel ☉ina vel statia fixa; nam blandus sudor optimum est harum febrium remedium, observando simul alia tunc temporis appropriata.

CAPUT III. DE ULCERIBUS IN GENERE.

Ulceris nomine venire solet solutio unitatis, facta ab acredine corrode[n]te & absumente substantiam partis mollis pariter ac duræ; & si huiusmodi exesio & corrosio sit solum in parte molli, dicitur proprie ulcus; si verò sit in parte durâ dicitur caries.

C A U S A E.

Corrodens hoc in Ulceribus est acre acidum, quod instar fermenti corruptivi, nunc simul corrosivi, nunc virulenti, &c. labiis vulneris ejusque parietibus affixum, pervertit omne alimentum partis proprium, illudque in excrementum acre & liquamen fordium immutat, seu in saniem, cujus mitior species est pus; illudque acidum simul fibras & carnosas substantias partis sensim sensimque rodit, absumit, & depascit in abscessibus, post inflammationes imprimis oriundis, vel ex aliis causis natis, qui sunt ulcera inchoata, & in vulneribus, quæ facile in ulcera degenerant.

Acidum hoc confirmatur ulterius ex eo, quod emplastra ulceribus admota, nisi interdum proprius medicamenti odor vel foetor puris prævaleat, si removeantur, subinde

acidum spirent subtile & quod corrosio dolorosa, quæ etiam ossa absumit & exedit, vix nisi per acorem commode explicari possit, cum alcalia caustica non tam corrosionem quam mortificationem seu omnimodam putredinem cum partis nigredine & corruptione inducant. Unde etiam metallica, saturnina, aut mercurialia, venerea, caput mortuum vitrioli & similia, prompte acida aut edulcorantia aut absorbentia, & vegetabilia vulneraria etiam acriora, vi alcalina prædita, acidum corrigentia & in falsum transmutantia, ulcera optime curant.

Acidum hoc corrosivum, Ulceris causa, oritur.

I. Ab alimento partis proximo corrupto & degenerante, cujus corruptionis inseparabilis comes est aciditas, uti fit in vulneribus, quæ semper degenerant in ulcera, nisi mature curentur, in contusionibus, in ambustionibus, in ipsis ulceribus contagiosis, & externis corrosivis admotis, &c. Hinc enim v.g. lues venerea, aut scabies per contactum externum manus, est contagiosa, quæ contagia, per contactum manui sanæ adhærentia, in hac alimentum proximum pervertunt, vitiant, & ipsi acorem vitiosum imprimunt, unde per consequens ulcuscula leviora in scabie, aut majora periculosiora in lue Venerea, oriuntur.

II. Ab aciditate peregrina, quacunque de causa in sanguine aut lymphâ oborta, quæ cum subjecta materia in parte quadam, quacunque ex causa, sæpius ex paulatina congestione defixa, alimentum partis proximum pervertere, partem corrodere, & ita ulcus inferre solet: Manifestum hoc est in ulceribus sponte natis, in scorbuticis, in cachecticis, in lue Venerea laborantibus, & similibus: Et hinc talium subjectorum cachecticorum, ulcera sunt vix curabilia, nisi ipse morbus primarius prius curetur & corrigatur; quin & curentur licet, tamen sæpius, nisi primarius morbus sit solutus, in aliis locis recidivas inducunt, quale exemplum legi in Hildano, item in Sculteto, & horum Observationibus. Unde etiam est, quod interdum, palliative licet, fonticuli in talibus subjectis sint excitandi, ut ita ulceris contumacia mitigetur, & ex eodem occluso recidiva periculosior præcaveatur. Patet etiam in abscessibus ab inflammatione suppurata natis, ubi sanguis stagnans ab acido fermentativo transmutatur in pus, ita tamen, ut præponderet acidum, & alimentum partis corruptum acescit, quod labiis abscessus adhærens, sequentis ulceris proprie sic dicti autor est.

III. Ex vitio ipsius sanguinis, ipsique permixto excremento quocunque, aut alius cujuscunque humoris in corporis statu præterna-

ternaturali, à quo in parte quadam vel nutrimentum parti nutriendæ ineptum suggeritur, vel nutrimenti proximi perversioni occasio subministratur: unde vitiosus ejus acor ulceri inde nascenti primam occasionem subministrat. Patet hoc in ulceribus, quæ aliis morbis superveniunt.

Prout vero vel major vel minor est aciditas, aut etiam hæc ipsa simul variantis nonnihil saporis deprehenditur, uti ratione graduum diversitatis variat, cum aliis adjunctis proprietatibus diversis, varia est etiam alimenti exinde orta corruptio, & exinde etiam contumax plus minus solet esse ulcus, quod aut saniosum, aut verminosum, aut dysepuloticum seu phagedenicum, aut cancrum, aut corrosivum, aut dolorosum, aut malignum, aut contagiosum, aut alia speciali proprietate est distinctum.

In specie nervosarum partium ulcera ut facilius oriuntur, ita etiam omnia sunt pejora & difficilius curantur, ob acidi in his vulneribus majorem gradum: nam alimentum partium nervosarum, cum sit admodum temperatum, nec adeo imprægnatum sale volatili corruptione & alteratione acefcit, & ob defectum sufficientis correctionis fit acrius, ipso spiritu animali subtiliore in his partibus celerius aut distributo, & promotio, aut facilius exhalante.

Sanguinea vero partes abundant sale volatili acriori oleoso, unde difficilius ipsis inducitur acor, qui etiam contra facilius temperatur, fiuntque hinc ulcera benigniora; unde ulcera partium sanguinearum sunt facilia, quam nervearum. Hinc & in glandulosis locis, cum in his aliquid acidi subtilis ex sanguine secerni, & unà cum aliis lympham constituere videatur, contumaciora & magis dolorosa ac corrosiva oriuntur ulcera, & quæ facillime degenerant in fistulas, imo hæc ulcera frequentius cancerosam malignitatem solent habere conjunctam.

Lympha hæc in locis glandulosis elaborata, subtili acido sale imprægnata, cum facillime acidi corrosivi in articulis recipiat impressionem, ulcera & vulnera articularum reddit & difficiliora & periculosiora.

Acor ergo talis, aut à vicino ulcere ad os subjectum delatus, aut ex corruptione ipsius ossis, ab æris contactu orta, genitus, aut etiam ex acido peregrino ad os cum alimento distributo enatus, os ipsum corrodit, & cariosum reddit, ulcusque cum ossis carie conjunctum constituit simpliciter immedicabile, & velenties recidivans, *es bricht wieder auf*/ nisi ossis caries primo emendetur.

Quod si corrosiva sanies in ulceris labiis producta per interstitia partium latius serpat, aut molliores substantias inter stamina fibrosa

duriora exedat, & ita per cuniculos longius latiusque serpat, hinc inde ulcus sinuosum seu cavernosum constituit, *einen löcherichten Schaden*: cujus orificia aut etiam canales in locis membranosis imprimis & nervosis, ex alimenti vitii congestione & conglomeratione indurata, & in callum quasi ossium transmutata, Fistulam & ulcera fistulosa constituunt.

Occallescentia hæc & durities circa membranas, imprimis in orificiis horum ulcerum sinuosorum, oritur ex acido vitioso satis intenso, dictas partes corrugante, & pedetentim indurante: Exinde orificia fistularum semper sunt angusta.

Proximum ergo partis alimentum, prout facilius ab acido ulcerum impressionem recipit, exinde plus minus diuturna aut maligna efficit ulcera, ut in hydropicis, cachecticis, lue venerea inquinatis, aut iis, quibus aut hæmorrhoides, aut menses suppressi stagnant, luculentissime patet; & talia ulcera solent esse graviora, propter alimenti partis corrupti facilem impressionem ab acido. Hinc ulcera cum humorum affluxu esse conjuncta dicuntur.

Facilius vero corruptio hæc in alimento partium fit, imprimis ex defectu particularum spirituosarum & salino-volatilium, quæ contraria dum sunt acido fermento ulceris, ejus vim infringunt: quibus dum caret interdum præternaturaliter pars sanguinis alimentitia, aut etiam alias ex vitiosa prima aut secunda digestionem ad recipiendam corruptelam acidam magis est disposita, promptius sic corrumpitur, & ulcus ipsum sic augetur, fit manans, & difficulter curabile.

Acidum hoc ulceris fermentativum & corruptivum non rite correctum & sublatum, dum vel ejus aliqua, tantilla licet, proportio post curam ulceris relicta est, aut in labiis ejus, aut quod sæpius contingit, in ossis carioso; vel ejus aliqua portio per sanguinis vel lymphæ motum aliorum delata, perversendo alimentum loci proximum, aut recidivam antiqui, aut per metastasin, generationem novi ulceris inducit. Sic in Sculteto exemplum est ulceris præpostere curati, unde postmodum ulcus in pectore enatum fuit: sic & Fabricius Hildanus *Cent. 3. Obs. 39.* observavit ulcus inveteratum in crure sinuosum, quo intempestive curato supervenit pleuritis, ubi materia simillima per os fuerit rejecta, ac ista, quæ ex ulcere cruris emanaverat.

Ulceris ergo ordinaria adjuncta & fermenti ejus acidi producta sunt:

1. Cavitas ab acore exedente, & labia vulneris depascente plus minus, indurata.
2. In partibus carnosius pus laudabilius ex sanguine.

3. In

3. In partibus nervosis seu spermaticis ichor seu sanies tenuis aut saltem pus minus laudabile, hoc est, quod labia ulceris sicca & citra sordes inveniantur.

Rarissimum enim est, quod labia ulceris sicca & citra sordes inveniantur; id quod tamen fit interdum, quando nempe ulcera aëri aperto diu nimis fuerunt exposita, aut quando labia dura & collofa sunt; aut quando loco suppurantium & mundificantium exsiccantia aut cicatrisantia intempestive fuere applicata. Quod si citra tales causas manifestas sponte & subito sicca aut minus humida deprehendantur ulcera, malum signum est; nam vel innuit imminentem mortem totius; vel si ulcere exsucco accedat aliqualis livor vel decoloratio labiorum, imminens gangraena est indicium; omnia enim ulcera, si imminet mors solent exsiccari.

PROGNOSIS.

Fundamenta prognoseos in ulceribus desumuntur ex tribus circumstantiis:

(1) Ab ipsa conditione ulceris, an sit simplex? an complicatum? an sinuosum, fistulosum, cariosum? &c. nam hae conditiones ulcus plus minus reddunt difficile.

(2) Ab ulceris excretis, pure nempe & sanie: nam quò citius reddit pus, idque magis laudabile vel minus acre, candidum, mediocris consistentiae, eò melius est ulcus; contrarium est, si ploret saniem tenuem, ichorem acrem, flavum & foetidum, aut similia.

(3) Ab ipso subjecto ulceris, tam particulari quam universali. Ratione subjecti particularis, ab ipso loco ab ulcere affecto, an sit carneus, glandulosus; ratione subjecti universalis, an aeger sit sanus, vel non? an sit laudabilis constitutionis? &c. hae enim ulceris naturam & curam plusminus gravem ostendunt.

Ulcera antiqua maciem, febres lentas, aliaque mala, aequè excitant, ac ulcera pulmonum.

CURA.

Ex haecenus dictis facillime patet, quod Cura ulcerum chirurgica primario in huius acidi mortificatione consistat, quo tollatur alimenti depravatio, & partis ulcerosae erosio, & inhibeatur sordium proventus; reliquum, ipsa natura agente, in alimenti appositione & convenienti assimilatione carnem generando, & foramen claudendo consistit.

Ea, quae acidum hoc corrigere valent, sunt nulla alia, nisi quae vel aperte huic sunt contraria, ut alcalia omnia, praesertim volatilia, imprimis vel vegetabilia; vel fixa mineralia, imprimis naturae metallicae, aut huic cognata, quae acidum absumunt avide & absorbent. Nam ex regno animali, praeter

cancros aut fella animalium, aut urinam humanam, vix singularia contra ulcera habentur remedia.

Ex his vegetabilia imprimis agunt positive, temperando & delendo acidum per sal suum volatile seu alcalinum, quod ipsum nunc est occultum & temperatum oleosum, nunc verò manifestum & acrius. Temperatum est v.g. in betonica, veronica, plantagine, vinca pervinca, bugula, agrimonia, & similibus; acrius vero est in absinthio, mentha, chelidonio majori, sabina, nicotiana, quae in specie in expurgandis fistulis & ulceribus mundificandis valdopere conducit, & vi narcotica pollet; in aloë & myrrha, in spiritu vini, & similibus. Mineralia vero & metallica operantur ut plurimum privative, absorbendo acidum, & istud sui contactu quodammodo dulcificando, sub qua ipsa actione simul virtutem adstrictoriam aluminosam acquirere solent. Talia sunt caput mortuum vitrioli, terra vitrioli dulcis, saturnus, & saccharum saturni, ac omnia saturnina, post cerussa, minium, venerea, æs viride, pompholyx, Mercurius sublimatus, praecipitatus, dulcis, & quae huc pertinent sulphurata, & in specie ad ulcera maligna & cacoëthea usurpata arsenicalia fixa, & in alcali naturam transmutata, hinc balsamum Paracelsi ex fuligine & arsenico.

Hae medicamenta, dum destruendo acidum ulteriorem ejus activitatem inhibent, & simul excrementorum generationem seu alimenti perversionem sistunt, sicque ulcera nitida & labiorum carnem rubeam, sanam, & naturali modo dispositam reddunt, Mundificantia seu deterfiva vulgo appellari solent. Et quidem ulcera purgare, & sordes detergere, est superficialis tantummodo cura & palliativa, cum sordes, pus & sanies effectus tantum sint, & productum ulceris: modo tollatur tantum causa horum effectrix, & palma facile acquiritur: id quod superius de Vulneribus monui. Graduum autem ac similium proprietatum in his detergentibus & mundificantibus observanda est diversitas, pro ulcerum nempe varietate variandis.

In genere eorum quaedam sunt acriora, quaedam vero magis temperata. A temperatis ceu inferioribus successive inchoanda est cura, nisi forsitan ulceris prava conditio nimis progressa aliud suadeat, ne acrioris acidi vigor per acre contrarium effervescendo & irritando fiat malignior, & putredo in ulcus inducatur.

Temperata ista vulgo digestiva seu pus generantia appellari solent, quae usurpantur, ubi ulcus non nimis progressum est. Si vero ulcus jam est putridum aut alio modo male affectum, statim fortiora detergentia & acria usur-

usurpanda sunt. Temperata autem ista, temperando acidum in ulcere vitiosum, alimenti corruptionem in excrementum acre & saniosum inhibent, ut temperatus acor ulceris moderata fermentatione cum alimento partis concurrere, & excrementum similiter temperatum quasi coctum in meliori consistencia, colore & temperatura generare possit, ut id, quod ante tenue, acre, & quasi crudum esset, nunc crassius, temperatius, & quasi maturius profluat. Quod ipsum mitius excrementum pus appellatur, sicuti pejus istud acrius & tenue ichor seu sanies appellari solet. Hinc etiam hæc digestio suppuratio dicitur.

Temperata talia remedia sola ulceris simplicis possunt absolvere curam: ulceris vero, vel corrosivi, vel putridi, vel cancerosi, vel maligni, virulentia acrior & validior, ut plurimum ulceri & ejus specifico fermento appropriata, nunc Mercurialibus, nunc arsenicalibus, permixta requirit remedia. Observanda tamen simul partis affectæ erit conditio: nam partes sanguineæ temperata imprimis vegetabilia requirunt; nervosæ vero paulo acriuscula aromatica & saturnina magis postulant, & sic etiam pro varietate reliquarum partium affectarum.

Frequentius tamen fit, ut, præter simplicem ab acido corruptionem, singularis partis concurrat putredo aut corruptio in ipsa parte, ubi præter degenerationem alimenti in varias sordes putrilago simul cadaverosa, & incipiens quædam quasi gangræna, solet adesse. In hoc casu ergo fortissimis omne putridum ad partem usque sanam absumendum, & putredinis ulterius processus inhibendus, quod sæpius fit per acida, uti est unguentum Ægyptiacum, aut in perfecta gangræna per butyrum antimonii, aut similia: quibus tamen laudabiliter suo officio defungentibus aut defunctis, post operationem peractam subito removenda sunt, ne partes sanæ etiam absumantur aut afficiantur.

Facta ergo acidi fermentativi & corruptivi in ulceribus abstersione alimentum partis, ceu ejus balsamus naturalis, sensim labiis ulceris agglutinatum, partem cavam nova carne replet, dum interea fibræ & vascula curanea & ipsa successivè longius extensa inæquali tamen concursu variaque textura in cicatricem coeunt.

Ne impediatur autem hæc partis perdita seu erosæ per carnis regenerationem restauratio, quod fit dum vel ab aëre ambiente sub deligatione alterantur ulcera, vel dum ab interno vitio nova alimenti corruptio & ulceris succedit renovatio, ob id post mundificationem ulcus, dum caro nova succrescit, balsamica glutinantia vel vulneraria, farcotica tunc

appellata, tunc applicantur, quæ temperatâ suâ virtute non nihil adstringente, & balsamum naturale conservant, & omnem acorem forsân de novo subortum promptè delent, & eâ ipsa blandâ adstrictione impediunt simul, ne caro enata laxior aut nimis mollis, aut nimis superflua, luxuriet: id quod fieri solet, si citrà emplastri farcotici convenientis applicationem soli naturæ negotium committatur: Hinc etiam promptè luxuries ejus coercetur, si applicetur v. g. emplastrum vel unguentum de tutia, item emplastrum seu unguentum diapompholygos, de spermate ranarum, defensivum vulgare, de lapide calaminari, de lithargyrio, item emplastrum diasulphuris Rulandi, imprimis si malaxentur cum oleo nicotianæ.

Similia remedia glutinantia & consolidantia, sed magis adhuc adstrictiva & humidiabsumptiva, per modum exsiccationis cicatricem firmiorem generari adjuvant, si desuper applicantur; unde Epulotica seu cicatrisantia appellantur: nam vulneraria balsamica, farcotica & cicatrisantia gradualiter tantum differunt; unde in corporibus delicatis & mollioribus cicatrisantia sunt, in subjectis durioribus farcotica.

Non ergo ad pretiosiora emplastra, oppositæ doctæ & similia confugiendum, cum emplastra hic solummodò instar operculi sint, ne aër ambiens & frigidus subintret. Imò sunt, qui solo decocto calcis vivæ, in quo plantæ vulnerariæ bullierint, ulcera ope syringæ eluunt; post unguentum simplex digestivum, ex terebinthina cum vitello ovi dissoluta & oleo hyperici parant, quo mediante turunda breviori os ulceris claudunt, superimponendo emplastrum aliquod acidum absorbens seu defensivum.

Rustici, & qui Paracelsum in Chirurgia imitantur, plantam aliquam euporistam vulnerariam, vel foliatam, vel contusam, superimponunt, & sæpe magna ulcera sanant, quæ etiam meo judicio omnibus unctuosius præferenda. Verùm cum Chirurgia, ars olim præstantissima, nostris temporibus à Barbitonioribus & Balneatoribus imperitis exerceatur, qui omnia ulcera ac vulnera suis unguentis ac emplastris, à magistrorum suorum magistris commendatis, sine judicio curare audent, concinnior curandi methodus negligitur; quæ solis dictis simplicibus & euporistis sæpissimè absolvi possit.

Externis talibus applicandis, quæ vulgò quatuor capitibus comprehenduntur, sub nomine digestivorum, mundificativorum, farcoticorum & epuloticorum commodissimè simul adjungenda sunt interna, acidum tam in primis viis, quàm in ulceribus, correctiva & destructiva, & quantum possibile,

[H]

succum

succum nutritium ita alterantia, quò minus à fermento ulceris acido corrumpi possit, quæ nempe alcali plus minus acri pollent.

Talia ex vegetabilibus vulnerariis seu ulcerariis, ex canceris fluvialibus, albo Græco, pulmonaria maculosa, consolida media, summitatibus hyperici, & similibus, potiorum vulnerariarum forma parari solent, de quibus vid. Paracelsus, Felix Wurtzius, Helmontius, Barbette.

His addenda simul remedia sudorifera, tam ex lignis, qualia sunt imprimis essentia lignorum, tinctura coralliorum cum spiritu lignorum, & decocta lignorum quæcunq; , quàm ex antimonio, viperis & serpentibus parata, in specie tincturæ antimoniales genuinæ, essentia viperarum, spiritus & sal volatile viperarum. Additur his usus frequens lapillorum cancerorum cum myrrha & croco, coralliis, & lapillis cancerorum cum aceto, cum Bezoardico Joviali, anti-hestico Poterii, antimonio diaphoretico, simplici & Martiali, non omiffa, si opus sit, purgatione. Inter purgantia autem eminet Mercurius dulcis, vel turbith minerale, si crebrius usurpentur cum extracto hellebori nigri, vel panchymagogo Crollii, vel catholico.

Quod si verò deteriora fuerint ulcera, ipsa salivatio Mercurialis in auxilium est vocanda.

Quoad remedia externa, ferè sunt sequentia: digestiva quidem, oleum rosarum, mastichinum, butyrum recens non salitum, Majale, vitellum ovi, mel, gummi elemi, terebinthina, thus, mastix, farina triticea, hordei, fœnu græci, & similia. Ex his v. g. paretur unguentum digestivum hoc modo:

R. Terebinth. ʒj.
Vitell. ovi No. j.
Mell. rosar. ʒss. ad ʒvj.
Ol. hyperic. ʒj.

M. f. Linimentum.

Pus ubi genitum est, & quidem laudabile, simul mundificantia, & acidum in ulceribus peccans corrigentia, sunt admiscenda & usurpanda, eaque acriora, mitiora, positivè & negativè operantia, pro ulcerum conditione & varietate.

Talia mundificantia sunt: radix apii, Aristolochiæ utriusque, althææ, bryoniæ, cyperi, plantaginis, sigilli Salomonis, tormentillæ, aronis, cucumeris asinini, dracunculi, gentianæ, hellebori nigri: herbæ & folia cichorii, absinthii, apii, anagallidis minoris, brassicæ, origani, chamædryos, betæ, marrubii, plantaginis, sempervivi majoris, solani, scrophulariæ, betonicæ, veronicæ, vincæ pervincæ, artemisiæ, fumaris, nicotianæ, hyperici, centaurii minoris, chelidonii majoris, sabinæ, &c. folia farfaræ succulenta contusa, flores rosarum rubrarum,

hyperici, centaurii minoris; cortices pini; lignum guajacum, sassafras; semen urticæ, plantaginis, apii; bacca juniperi: farina seminis lini, fœnu græci, cicerum, lupinorum, hordei, fabarum, furfures: purgantia externo usu, imprimis scammoniata: succi absinthii, agrimonis, rosarum rubrarum, apii, chelidonii majoris. Extractum aristolochiæ rotundæ, & alia vulneraria cum V parata; item cum saccharo ex dictis succis parati syrupi, simplices & compositi vulnerarii; item saccharum, macis, aloë, & similia: vinum & V, lixivium commune, muria halecum cum passulis, animalium urinæ & fella, serum lactis, mel, mel rosarum, mumia, succus serpentum, cancerorum fluvialium, sperma ranarum & ejus aqua, stercus canis ossa rodentis; camphora & camphorata, resina, terebinthina, balsamus Peruvianus, thus, myrrha, euphorbium; item sulphur, & omnia sulphurea, farina lycopodii, ulceribus manantibus inspergenda; plumbum calcinatum, & omnia saturnina, bolus Armena, marga saxorum, crocus Martis adstringens, & crocus vitrioli Martis per præcipitationem paratus: terra vitrioli dulcis, rubrica, tutia, æs ustum, alumen crudum & calcinatum, nitrum, imprimis æs viride, arsenicum, in specie fixum, pulvis sympatheticus, decoctum scoriarum reguli antimonii, spiritus salis, sulphuris, vitrioli, aqua fortis, butyrum antimonii, Mercurius dulcis, præcipitatus, arcanum corallinum, aquæ virides Hartmanni & Plateri, aqua calcis vivæ benedicta, thermæ naturales & artificiales, quæ in ulceribus inveteratis egregiæ sunt; oleum nicotianæ, terebinthinæ, ceræ, ovorum, oleum tartari per deliquium, balsamum sulphuris tam ex sulphure communi, quàm in specie ex sulphure aurato antimonii secundum methodum Poterii paratum, &c. unguentum dialthææ: nicotianæ, iridis, fuscum officinarum, citrinum, album, album camphoratum, diapompholygos, de tutia in ulceribus crurum, Ægyptiacum, & fuscum Wurtzii, linimentum de amiantho Schroederi: Emplastrum de betonica, de gratia DEI, divinum cum emplastro diasaturni Mynsichti, diaquis Rulandi, item emplastrum de carne bubula ejusdem.

Utendi horum modus est:

1. In Injectionibus in ulcera cancrofa, sinuosa, fistulosa tam liquidis quàm siccis, in forma pulveris inspergendis.

2. In Unguentis.

3. In Emplastris.

I. Injectio in ulcera sinuosa & sordida.

R. Fol. Nicot. Mij. summ. absinth.
HB. Veron. aa. M. j.
Rad. Aristol. ʒj. bacc. juniperi ʒss.
Oniscrud. ʒvj.

Coq.

Coq. in f. q. ▽. ferrarior.

Colatura fervetur usui pro injectione in ulcus, addendo omni injectionis dosi ~ vini ℥i. plus minus, pro ratione quantitatis liquoris injiciendi, & capacitatis ulceris.

D. S. Eufferliche Reinigung.

Huc facit etiam pulvis ad ulcera maligna Marci Barchai, qui extat in Miētōmim. Velschii *Cent. 1. Obs. 3. annex. Ann. 4. & 5. M. A. N. C.*

II. Unguentum mundificans

℞. *Succ. Nicot. ℥iv. plantag. absinth. Beton. aa. ℥ij. Mellis ros. colat. ℥iv.*
vel v.

Coq. & subigantur probe lento Δc: adde
☞ Oli dulc. ℥℔.

Pulv. aloës, myrrhæ, fl. Δis aa. ℥j.

Misc. probe, addendo simul

Terebinth. Venet. ℥iij. pro consistentia

Unguenti plus minus spissi: in fine etiam non-nihil

Balsami Peruv. est intermiscendum:

D. S. Reinigende Salbe.

III. Unguentum Sarcoticum, ex quo facile fieri potest emplastrum:

℞. *Ungu. diapomphol. de Tut. aa. p. j.*
dia Δis Rub. p. ij.

c. f. q. ol. Nicot. f. Unguentum, applicandum cum petiis. **D. S. Heilende Salbe.**

Vel additione pauca Cera fiat Emplastrum, quod inducatur linteo.

Inter hæc autem remedia pauca sufficiunt, & secundum Helmontium ad ulcera benigna terra vitrioli dulcis, ad maligna verò arsenicum. Eminent etiam balsamus sulphuris terebinthinatus, balsamus sulphuris, vel communis, vel antimonialis, cum oleo lini aut nucum juglandium expresso paratus, vid. de hoc Polemannus *de Sulph. Philosophor.* qui habet simul egregium emplastrum; ubi tamen loco vitrioli Veneris dulcis potest substitui vel caput mortuum vitrioli elixiviatum solum, vel addito tantillo æris viridis. Convenit etiam balsamum Peruvianum. Habeatur tamen delectus, an pingua convenient, an non? Si possunt ferre, conveniunt dicta balsama; si non, sufficit mel cum succo vulnerario. In rebellibus ulceribus respiciendum est ad Mercurium vivum, à quo spiritus nitri fuerit abstractus. In ulceribus putridis æs viride cum aceto destillato est optimum; unde unguentum Ægyptiacum, Apostolorum, fuscum Wurzii, &c. conveniunt. Sic ex vitello ovi & melle fit unguentum utile in quibuscunque vulneribus:

℞. *Vitell. ovor. ad durit. coct. No. iii.*
Mellis. ℥i℔.

M. c. haustu vini, in unguentum. **D. S.**

Reinigend Sälblein.

Quod optime purgat ulcera, & à gan-
Tom. II. Pars 2.

græna præservat. Si ulterius progrediatur malignitas, addatur Mercurii præcipitati ℥℔. vel ℥j. plus minus, pro ratione circumstantiarum.

Emplastrum polychrestum cicatrizans est seq.

℞. *Mastich. ℥j. Tereb. ℥iij. Cera flav. ℥iv.*

Hiscæ liquefactis adde Mastichen, & redigantur in Emplastrum.

Non cedit huic ad consolidanda ulcera seq.

℞. *Æbis vel ter lotæ & parum exsic. q. pl. Misc. c. ol. lini q. f.* Tingatur cum bolo Armena vel bolo rubra ad carnem quasi colorem; f. Emplastrum egregium in ulceribus vetustis.

Fit interdum, ut ulcera quædam omninò arida reddantur, ita ut paucam vel nullam suppeditent materiam seu excrementa. In tali casu optimum est unguentum impositum exterebinthina, melle, succo apii, & farinis.

Quod si in ulcere purificato denuò, jam carne replendo & cicatricem inducendo, carnis regeneratæ uberius luxuriat copia, quod fit, quando applicata sunt emplastra vel nulla, vel nimis oleosa & pingua, quæ fibras reddunt laxas, sive naturalis fuerit caro, sive flaccidior & præternaturaliter laxa, tunc optimum est, ut inspergatur pulvis ex gallis, corticibus granatorum & spongiis combustis ana. Præterea pulvis ex aloë & myrrha, quibus commodè parum aluminis usti admiscetur, cum stuppis siccis imponitur; hoc enim blande carnem superfluum cohibet; non minus etiam, quàm crocus metallorum pulverisatus; hic enim si inspergatur, subito carnem nimis excrescentem mortificat, & insensibiliter absorbit.

Galli in usu habent ad coercendam carnis luxuriam applicare lapidem, quem vocant infernalem, sed in leviori malo sufficit crocus metallorum.

Unguentum etiam Ægyptiacum in casu hoc conducit, uti & omnes aquæ virides hic imprimis conducere solent.

ARTICULUS I.

DE CARIE OSSIUM.

ULcera quædam conjuncta sunt cum ossium carie, quæ interdum est manifesta oculo, interdum fit manifesta specillo: si subest, necesse est hæc auferatur; aliàs enim ulcus nunquam curabitur.

Caries autem nihil est aliud, quàm ossis corrosio, nunc major nunc minor, prout magis vel minus fuerit inveterata, & quidem si oculis pateat os denudatum, facile caries cognosci potest: primò enim oleosum quodammodo & pingue evadit os, hinc successivè flavescit, deinde successivè magis nigrescit, & hinc foraminulatum redditur, quasi teredinibus pertusum & perforatum.

[H] 2

Prius

Prius est signum imminens, sicut nigredo, perforatio & inæqualitas est signum jam perfectæ cariei. Sin verò sit absconditum os, tunc vix cognoscitur, nisi per specillum aut stylum expiscetur fundus ulceris, tunc enim os in fundo non glabrum, sed inæquale & scabrosum percipitur; quin & quæ effluunt ex ulcere sordes & excrementa, pinguis, oleosa, & acria, majorique copia effluere foras solent. Quod si ulterius lateat caries, ex eo ferè patet, quod ulcera talia nequeant ad perfectam cicatricem perducì, & etiam optimè suppurata aut subinde recidunt, aut difficillimæ sint curationis, & optimis etiam non auscultent remediis: quia sanies ex osse plorans semper novum ulcus generat, quod etsi consolidetur, caro tamen, quæ ulceri supervenit, est flaccida, mollis, & minus dolens.

PROGNOSIS.

Caries, quò magis est inveterata, eò difficilior aufertur: hinc etiam, quo magis occupat ossa circa articulos, aut ubi est copia partium nervosarum, ibi etiam difficilior tolli solet.

CURA.

Pro Cura internè conveniunt universalia cum suis pro hoc scopo externis. Ut autem cariosum ulcus melius possit tractari vel separari, congruum est, ut labia ulceris nonnihil dilatentur, vel scalpello, vel immixtis turundis intumescantibus. Tales fiunt, si volumus acrius procedere, ex radice gentianæ, si non, ex medulla sambuci compressa; hæc enim imbibit copiosam humiditatem, unde intumescit, & orificia ulceris aperta reddit. Post etiam consideratur, an caries ulceris sit talis, quæ possit remediis cedere? an verò necesse sit adhibere remedia Chirurgica?

Utergò curetur os cariosum, vitanda sunt omnia oleosa & mucilaginosa; quin potius fortiora corruptioni & putredini resistentia applicanda, quæ ratione spiritus vini rectificatus seu aqua vitæ cum petiis imposita optimè convenit. Itidem, si quid aliud, Euphorbium est singulare experimentum ad carièrem ossium, si pulvis cum plumaceolis ossi carioso immediate imponatur, de quo vid. Hildanus *Cent. 2. Obs. 76. & 92. Cent. 4. Obs. 21. & 96. & Cent. 5. Obs. 22.* item Riverius *Cent. 2. Obs. 76. & 73.* Applicatur vel solum, vel etiam permiscetur commodè cum aliis, v.g.

82. *Mumie. Sarcacoll. aa. 3ß.*

Euphorb. 3j. M. f. pulvis.

Mitius agit quàm Euphorbium pulvis radicis Ireos Florentinæ, qui fuit experimentum Heurnii, sive per se, sive cum spiritu vini irroratus, sive euphorbio adjunctus, inspergatur: quin & pumex ustus, radix aristolochiæ rotundæ, pulvis aloës & myrrhæ impositus

egregiè confert. Huc pertinet quoque pulvis catharticus pro ossibus his Clossæi, cui additur oleum destillatum caryophyllorum, vid. Schroederus *Pharmac.* Oleum ligni guajaci, caryophyllorum destillatum, cum pluma ossi carioso illitum usitatissimum est in moderna Praxi Gallis: uti etiam spiritus vini parum cum spiritu vitrioli acuat, ubi fortius agendum est, imponi potest. Quin & injectiones instituendæ, imprimis in fistulis & ulceribus sinuosis, ut succus chelidonii majoris cum spiritu vini, cum quibus aloë & myrrha probe sunt permixta: aut etiam, ubi fortius agendum est, parum vitrioli additum sit: Hæc ipsa injecta subinde solent tollere carièrem, & etiam os mundificare, ita ut interdum squamulæ ossis abscedere soleant. Melius adhuc est, Mercurius dulcis solutus in aqua plantaginis. Singulare est, quod ad os cariosum commendat Tulpus *lib. 1. cap. 39.* nempe de oleo sublimati (per quod forsitan intelligit butyrum antimonii) cum oleo lini mixto. Veteres Turbith, æs viride aliaque commendant; sicuti unguentum etiam Ægyptiacum, pulvis terebinthinæ ad duritiem costæ cum unguento fusco Wurzii profunt. Quod si profundior sit caries, ut his remediis non velit cedere, ferro aut igne corrigenda est, ita quidem, ut lima aut etiam scalpello radatur locus cariosus, si sit in superficie, aut terebrâ perforetur caries eò usque, donec os album, solidum & transsudantibus vel emanantibus hinc inde sanguineis guttulis se manifestet, postmodum dicta remedia applicentur. Quod si ratio non videatur sufficiens, vel hæc ommissa, vel post peractam rationem cum scalpello, ad carièrem funditus delendam cauterio actuali adurendum est os cariosum, ita ut ardor ab igne inductus totam carièrem penetret, vitando cautè, ne partes vicinæ nervosæ aut carnosæ tangerentur. Facta ratione vel ustione expectandum est, donec sponte naturâ fiat separatio ossis carioli ab osse sano: quod ut fiat promptius, Batavi moderni applicant spiritum vini felici cum successu: quod si hic minus videatur efficax, oleum destillatum caryophyllorum applicatum est convenientissimum: postmodum os consolidetur spiritu vini, myrrha, aloë, & similibus.

ARTICULUS II.

DE FISTULIS seu ULCERIBUS SINUOSIS.

Fistulæ seu ulcera profunda & sinuosa sunt unum idemque, nisi quod interdum in ulcere diuturniore aut male tractato superveniat Callus, qui nunc cingit simpliciter orificium ulceris ipsius, nunc verò totum sinum ulceratum ingruat & occupat.

Ulcus

Ulcus tale sinuosum seu fistulosum nunc interius est unum, utut plura habeat orificia, vel extrinsecus habet orificium unum, utut interius in plures canales sit excavatum.

DIAGNOSIS.

Per se facile patet, ex callo nempe nato: saltim observandum est, an fistula sit simplex? an vero multiplex? item observandum est, quousque pertingat? an scilicet desinat in osse? an vero in parte molli, v. g. nervea, in carne, in vena aut quadam arteria finiatur?

Simplicem aut multiplicem esse fistulam ex quantitate materiae effluentis fere colligitur, item expressione ejus, & ex situatione ægri, an in uno latere? an in altero nunc hoc nunc aliud pus effluat? item si plura orificia fuerint fistulae, ita quidem, an injectus liquor per unum orificium non effluat per alterum foras? fistulam multiplicem esse, tunc fere colligitur: item an recta an verò tortuosa sit fistula, & sinus? ex stylo colligitur, qui si recta penetret, rectam fistulam; si verò penetrare aut sine dolore immitti nequeat, tenuis candela ex cera & terebinthina intrudenda, & ex hujus curvatione figura fistulae est expiscanda, cum hæc sine dolore sinus & fistulas, etiam carnosas, possint penetrare.

Quousque terminetur fistula, ex stylo patet facile; Nam stylus in rem duram impingens os ostendit: Et quidem dum absque ullo dolore sentitur, periostio jam os denudatum innuitur: sin durum & glabrum sit cum pure non pingui seu oleoso, os adhuc integrum est; sin verò os inæquale & asperum tangatur, est cariosum. Si stylus intrusus circa fundum intensum dolorem inferat, nervum aut partem nervosam admodum sensilem in fundo subesse innuitur, si fundus mollis mihiusque dolens est, in partem carnosam terminare præsumitur, & materia effluens est similis puri laudabili. Fistulae verò partium nervosarum plorant pus acre & tenue. Si desinat in vas sanguiferum, materia est obscuri coloris propter sanguinem; si ipsum vas erosum sit, subinde sanguis ex fistula profluit vel rubicundus, vel obscurus, ratione vel venæ vel arteriæ.

Imprimis autem in locis glandulosis frequentes oboriri solent fistulae, quin & ulcera diuturna in locis glandulosis oborta, si non sunt cancrosa, sæpius fiunt fistulosa & sinuosa.

Habent & hoc vitium adjunctum fistulae, ut orificium habeant admodum angustum, quod continuo saniem acrem plorat: unde etiam dolentes sunt fistulae, nisi durior callus omnem sensum abstulerit.

PROGNOSIS.

Fistulae difficiles sunt curatu propter cal-
lum, qui, nisi auferatur, sunt incurabiles.

CURA.

Ut ergo curentur fistulae, callus est absumendus, hinc fistula probè mundificantibus, & hinc convenientibus sarcoticis, consolidanda.

Hoc ut fiat, conveniens est, ut prius ampliatur orificium callosum, quia alias ad callum aut absumendum, aut fistulam purgandam, minus commodè pertingere possunt remedia.

Amplificatur orificium fistulae collosum per penicillos ex medulla sambuci intrusos, item ex radice aristolochiae confectos & immisos. Facit etiam huc turunda ex radice gentianae sicca, vid. Hæferus in Herc. Med. quæ est optima; vel nudè intrusa, vel unguento quodam emolliente illita, immittitur: Fortius ubi agendum est, ipsa radix gentianae adspargenda est prius alumine uto. Callis ulcerum exserendis Patavii in noscomio publico succum chelidoniae cum pinguedine vitulina & cera permixtum, cum successu adhibitum vidit à Marchette Velschius in Mithom. Cent. 3. Obs. 86.

Hinc præter remedia interna, ut omnia vulneraria, speciatim ex agrimonia, gentiana, centauro minori, sabina, cum lapillis cancerorum, item præter usum millepedum, externè ad mundificandam fistulam, & exedendum callum, varia in usu sunt remedia plus minus acria. Fit ergò remotio calli, & fistulae mundificatio, vel remediis Pharmaceuticis, vel Chirurgicis. Sic per syphonem injicitur succus nicotianæ, permixtus cum spiritu vini & pulvere exuviarum serpentum, aut expurgari debet sanies cum aqua mulsa vel simili, vel injiciendum est hoc:

℞. Mell. ros. ℥iij. ~ Vini ℥ss.

℞. ti edulc. vel ℞. ti vulg. 3℔. Misc. & ita injiciantur.

Item ad purificandum injici potest aqua calcis vivæ benedicta ista Chirurgorum, vel sola, vel cum spiritu vini acuata, cui addatur Mercurius dulcis, vel sufficit sola aqua plantaginis, in qua Mercurius dulcis solutus est. Convenit etiam succus cancerorum fluviatilium, subactus probè cum succo foliorum nicotianæ, qui vel soli, vel addito Mercurio dulci injecti in fistulas, egregiè easdem admodum mundificant. Omnia Mercurialia hic palmam præripiunt, si cum vulnerariis probè mista injiciantur. Hinc etiam turundæ immitti possunt, illitæ cum unguento fusco Felicis Wurzii, item cum unguento Ægyptiaco. Balsamum sulphuris terebinthinatum, vel solum, vel cum camphora mistum, fistulas mundificat, & callum absumit, quod etiam faciunt crystalli mineræ Jovis cum melle rosato. Alii commendant unguentum, pa-

[H] 3

ratur

raturum ex melle despumato & inspissato, permistum cum thure, aloë, & asa foetida, quod turundas illiniunt, c. g.

℞. *Mell. despum.* ℥ij.

coqu. ad aliquam glutinositatem:
hinc dum incipit refrigerari, adde
Aloës, thuris minutim ℥ij. aa. ʒi.
As. foet. ℥ij. ʒi.

diu terantur in mortario. f. Unguentum.

Si vero in malo pertinaciori, aut callo graviori, non sufficiant hæc, necesse est subinde, ut addantur mercurialia aut antimonialia, v. g. flores Cheiri Paracelsi, qui in loco frigido in oleo liquefacti tanquam arcanum contra fistulas laudantur: Vel

℞. *Unguent. Egypt.* ℥℥.

℞at. ʒi. *Lixiv.* ʒiv.

℥. *rosar.* ʒi.

Plantag. ʒiv. *Arsen.* ʒi.

Coqu. ad consumptionem tertiæ partis, quod fistulis illinitur & ejus loco calloso, ut exedatur & absumatur callus.

Verum non semper propter dolorem & alias circumstantias possunt applicari, unde necesse est, ut tota fistula cultro incidatur & aperiat: factâ apertione dictis remediis callus vel exedatur, vel etiam pedetentim sectione auferatur; ablato callo ulcus tanquam simplex blandis mundificantibus & consolidantibus curari potest. Nam ubi cedere nolunt remediis fistulæ, necesse est fiat accessio aut ad sectionem, aut ad uisionem, dolorosissimam tamen; quæ ipsa cum verò admittatur ab ægris, potius palliativa cura instituenda venit.

Palliativa cura consistit in eo, ut convenientibus sudoriferis, purgantibus & diætâ subtrahatur materia affluentis saniei, quantum possibile, hinc fistula consolidetur in superficie; nam cum convenienti diætâ ad aliquod tempus interdum satis diu conservari potest clausa, utut successivè denuò soleant exulcerari denuò. Unde continuanda venit talismodi palliativa Cura.

ARTICULUS III.

DE FISTULA LACHRYMALI.

Pertinet huc etiam Fistula Lachrymalis, ad quam celebre experimentum est D. de Lort.

℞. *Tut. præp.* ʒi. *pulv. hni subtiliss.*

ʒii *crudi* aa. ʒ℥. *Cerussæ.*

Lithargyr. aa. ʒi.

M. cum *Cerato dia-Chalcit.*

Vid. Velschius *Mistomim. Cent. 1. Obs. 36.*

ARTICULUS IV.

DE ULCERIBUS SORDIDIS & PUTRIDIS.

Ulcera sordida, ita dicuntur propter copiam sordium crassarum, & mucoso-

rum excrementorum, quæ effunduntur lividi, nigricantis aut similis coloris, quod si hæc ipsa simul odorem graveolentem & quasi cadaverosum exspirant, tunc Ulcus putridum appellari solet. Quod si simul cum tali excremento peripheria ulceris in latum & longum magis magisque extendatur, & partes vicinas inquinet, dicitur ulcus corrosivum.

CAUSÆ.

Causæ horum ulcerum sunt variae, internæ & externæ, quæ ex suprâ dictis de ulceribus in genere faciliè patere possunt. Hoc saltem moneo, sordida interdum fieri ulcera ab unguentis & linimentis nimis oleosis, & nimis unctuosus aut viscidis applicatis, specialiter si sit ulcus in locis nervosis.

CURA.

Quoad Curam præter interna optimum est, ut mundificentur cum spiritu vini, vel simpliciter rectificato, vel camphorato, vel theriacali camphorato, myrrhato, &c. quod dissoluta sit Theriaca. Abluto ulcere usurpandum unguentum Egyptiacum vel Apostolorum, quæ mundificant & detergunt. Conveniens etiam est decoctum scordii cum vino paratum, succus taraxaci, nicotianæ, sabinæ cum melle mistus, vel sequens unguentum frequentis & experti usus apud Gallos:

℞. *Succ. depur. Apii. Absinth.*

Beton. aa. ʒi. *Plantag.* ʒiv.

Agrim. ʒij.

Mell. rosat. col. ʒiv.

Bulliant ad consumptionem succorum:

Remota ab Æ incorporentur hoc pulvere:

℞. *Gallar.* ʒ℥. *Myrrh. el.*

Thuris, Mast. Aloës, Sangu. Drac.

Sarcocoll. aa. ʒi.

fl. rosar. rubr. balaust.

Cin. Sarment. vitis aa. ʒi.

Hæc incorporentur cum modo dicto unguento.

Huc facit quoque efficax aqua Sennerti *lib. 1. Prax. Part. 3. Sect. 4. cap. 1.* Vid. Hildanus *Cent. 2. Obs. 23.* Quin & stercora animalium, in specie stercus canis ossa rodentis applicatum, imprimis ubi nimis unctuosâ antea sunt applicata, optimè conducant. Convenit etiam stercus bovinum cum vino veteri expressum & applicatum. Elegans hic est observatio Foresti in *L. 7. Obs. 4.* de quodam, qui ulcus desperatum habuit, ita ut à nullo curari potuerit: huic apposuit quidam stercus caprinum cum vino generoso expressum, & eo modo ulcus consolidatum fuit.

Mercurialia etiam conducunt in his ulceribus; hinc unguentum Saturni Mynsichti cum arcano corallino vulgari, vel cum Mercurio præcipitato mistum, imponendum est, vel abluantur cum decocto calcis vivæ, cui addatur Mercurius dulcis. Ut Mercurius præci-

præcipitatus tutius externè possit usurpari, optima est præparatio Amati Lusitani *Cent. 4. Curat. 51.*

Loco hujus etiam arcanum corallinum commodè potest administrari. Additur hic Mercurius præcipitatus aliis quibusdam unguentis aut balsamis, aut emplastris plus minus, pro ratione circumstantiarum.

ARTICULUS V.

DE VULNERIBUS DYSEPULOTICIS seu PHAGEDENIS.

Ulcera dysepulotica, Chironia, Telephia, Phagedena, sunt omnia Ulcera, quæ inveterata sunt, & specialiter in tibiis occurrunt, & hinc tam profunde radicata, ut vix possint denuò consolidari & curari, dicuntur Chironia, quod nempe Chirone Centauro, famoso isto Chirurgo, opus habeant. Aliàs etiam Phagedena dicuntur à *Φάγεται*, Comedo, Exedo, quod talia ulcera, subinde ad vicina serpendo, accrescant, & augmentum capiant.

CUR A.

Ad hæc ergo ulcera curanda optimum est, ut, præmissis internis, eluantur frequenter aquâ pomorum putridorum destillata, quæ vel sola, vel cum linteis multiplicatis applicanda est: Vid. Schmuck in Thef. & Agricola in Chir. Parva. Aut etiam, si volumus hanc aquam ulterius reddere medicamento-
sam, in eadem dissolvatur extractum radicis aristolochiæ rotundæ, paratum cum spiritu vini. Vel in eadem aqua destillata dissolvi potest Mercurius dulcis, vel solus, vel cum saccharo Saturni, ubi ardoris vel inflammationis adest suspicio, quæ mistura imponatur cum linteis duplicatis pro cura horum ulcerum: c. g.

Rx. ∇Ψα, vel pom. putrid. lbj.

∇rectif. vel theriacal. camph. ʒj. ad ʒiʒ.

ʒii dulc. ʒj. ad ʒij. vel solum, vel addita sacch. hni ʒʒ. M.

Unde etiam Poterius felicissimè in usu pro cura horum ulcerum habuit suum calcinatum majus, Alias Mercurius vulgari modo præcipitatus commodè etiam applicari potest ad imitationem Rulandi:

Rx. ∇Plantag. lbj. rosar. lbʒ.

ʒl. Aurant. ʒij. ʒ= pulverisat. ʒʒ.

Coqu. lento igne per horæ quadrantem, removeantur & applicentur hinc ulceribus; admodum enim exinde hæc ad consolidationem properant.

Vel applicetur Fernelii aqua benedicta.

Convenit etiam in his ulceribus, si abluantur cum aqua plantaginis, decocto nicotianæ, in quo aliquid aluminis dissolutum est. Solutio scoriarum reguli antimonii in aqua appropriata habetur experimentum singulare:

Riverius agrimoniam ad ulcera verminosa commendat. Denique experimentum militare est, si pulvis pyrius sive pulvis nitratus solvatur in vino, & linteolis imponatur ulceribus dysepuloticis, etiam malignis; hinc ulceribus sic absterfis & clotis, applicetur postmodum commodè unguentum diapompholygos, vel nudum, vel cum Mercurio præcipitato mistum; vel balsamus Saturni & sulphuris terebinthinatus. Vel

Rx. Ungu. diapomph. ʒʒ.

Sacch. hni ʒj. M. pro Linimento.

Post elutionem cum aqua calcis vivæ turundis applicetur, desuper imponendo emplastrum gryseum. Vid. M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. Observ. 10.*

Medulla quoque faxorum vel lac lunæ cum paucis granis myrrhæ, aloës, &c. inspersa, egregiè promovet consolidationem. Singulare quid later in stercore humano, quod ad ulcera phagedena corrosiva & cancrofa, etiam in mammis, exhibet specificum: nam dum destillatur stercus humanum, ultimo loco per retortam adscendit oleum admodum foetidum, aliquoties rectificandum: quod ipsum imprimis illinendum est peripheriis seu circumferentiis hujusmodi ulcerum.

Non incommoda etiam est compositio Plateri ad ulcera serpentia.

ARTICULUS VI.

DE ULCERIBUS CANCROSIS.

Mentio facta est modò Ulcerum phagedenorum exedentium, quæ propriè loquendo sunt Ulcera cancrofa, corrosione arsenicali ad canceri naturam accedentia, & imprimis occupare solent vel loca glandulosa, vel glandulis vicina. Ipsos quod attinet Cancros, de his sufficienter dictum fuit suprâ, ubi de tumoribus.

CUR A.

Hæc ipsa & similia cautè admodum specificis sunt tractanda; nam si tantillo acri exasperantur, in deterius abire solent; si vero levioribus tractentur, frustra fieri eorum curationes solent. Ut ergo citra irritationem dolorosam venenum arsenicale corrigatur & tollatur, juvat imprimis inspersio absorbentium terreorum, cadmiæ, boli, cornu cervi usti præparati, pulveris bufonum calcinatorum: scilicet bufo & lacerta calcinantur ambo in olla nova benè clausa, postmodum cancer exulceratus oblinitur aqua plantaginis, & inspergitur huic modò dictus pulvis. Quod si fortius agendum sit, recipiatur bufo in olla nova exsiccatus & pulverisatus, addatur hinc parum auripigmenti, piperis nigri, salis communis, & fuliginis siccæ, quæ invicem pulverisentur, & pulvis inspergatur ulceri cancroso, & hinc peria salivâ madida est applican-

plicanda. Singulare etiam auxilium apud quosdam commendatur stercus felis, simpliciter canceris fluviatilibus nutritæ, in pulverem redactum. Convenit etiam cremor calcis vivæ.

Hæc si parum emolumenti afferant, aut in ulceribus cancerosis malignis frustranea sint, ad arsenicum confugiendum erit, modo ita applicetur, ne nimis irritet ulcus cancerosum: sive ergo hoc sub forma pulveris cum aliis applicetur, quò pertinet pulvis benedictus ad caneros ex arsenico, radice ari, fuligine, & similibus, cujus compositio vid. in Fallopio, Hartmanni Praxi Chymiatr. item in Ep. Libavii, sive arsenicum prius ritè fuerit fixatum beneficio nitri, & hinc per deliquium resolutum in oleo sine insigni acrimonia: vid. Schrœderi Pharm. lib. 3. pag. 500. Cui simul addendum oleum myrrhæ, ut habet Schrœderus loc. all. sive etiam ipsum arsenicum fixum commodè permiscetur balsamo sulphuris Rulandi, addita simul fuligine furni.

Oleum stercoris humani in ulceribus cancerosis summum est remedium.

Kerkringius Comment. in Basilii Valentini Currum Triumphal. laudat balsamum antimonij.

Commendantur itidem Saturnina. Unde balsamus Saturni terebinthinatus cum camphora & oleo fuliginis mistus: Item saccharum saturni cum fuligine probè attemperatum, & cum succo sonchi & plantaginis illitum, si prius ducatur in mortario plumbeo, applicari possunt. Item explastrum ex saturno, quod habet Tulpus lib. 1. cap. 47. Pertinet huc etiam pulvis Tulpii ibidem descriptus ex saturno, liquefacto cum ana Mercurii vivi, aut ex hoc amalgamate possunt fieri emplastra appropriata: vid. Schrœderus cap. de Empl. & si addatur aliquid mercurii vitæ, erit mirabile. Unde etiam unguenta omnia ulceribus cancerosis applicanda, ducenda & miscenda sunt cum pistillo plumbeo in mortariis plumbeis calidis. Aut fiant etiam communi modo unguenta contra ulcera cancerosa ex succis solani, uvæ inversæ, virgæ aureæ, agrimonix, geranii Rupertiani, & similibus, subactis cum pulveribus saturninis, minio, cerussa, plumbo usto &c. in mortario plumbeo; quibus vel ex fuligine vel ex arsenico parata remedia commodè admisceri, aut horum posteriorum acrimonia suspecta illis probè edulcorari potest.

Cavendum tamen ab omnibus unctuosius, cum cancer ab his exasperetur, & latius serpat: hinc prudentiores saltem crocum Martis per reverberationem paratum, aut cornu cervi ustum subtilissimè lævigatum, inspergunt.

Ad hos ipsos tumores cancerotos & ulcera

cancerosa, ne latius serpent, commendatur à quibusdam sequens emplastrum:

℞. Ungu. diapomphol. ℥ij.

Empl. de mucil. ℥j.

Rad. scrophular.

Ari. aa. ℥ij.

C.C. usti. præp.

Cin. Er. fluo.

Ranar. aa. ℥ss.

Misc. in mortario calido: addendo

Ol. vitel. ovor. rec. expr. q. s. ad consistentiam debitam Emplastri.

Quodsi ulcus cancerosum sordidum videatur, necesse est sane, ut blande tractetur ne excitetur dolor. Hinc

℞. ∇ Erum

Ranar.

plantag.

Card. bened. aa. ℥ss.

Sem Cydon. subtiliss. pulv. ℥ij.

C.C. usti præp.

Tut. præp.

Eni usti

Ciner. ranar.

Gammar. aa. ℥j.

Theriac. ℥ss.

Et imponantur tepide cum filamentis bis in die.

Hæc ipsa si non sint sufficientia, ferro & igne aggrediendi sunt cancri: scilicet ulcus cancerosum ferro prius abscindendum, & si sit pars, quæ potest abscindi, v.g. mamma, hæc tota abscindenda: factâ abscissione ferrum candens applicandum, ut radix canceri tota extirpetur; nisi enim hoc fiat, & vel tantillum de fermento ulceris cancerosi remaneat, repullulat ulcus antiquum. Imo si ex causa interna oriatur ulcus cancerosum, metus sane erit, ne ablatum & curatum in uno loco, nihilominus tamen in alio denuò enascatur. Unde etiam Hipocrates & Galenus caneros exulceratos non nisi ferro & igne curabiles asseruerunt.

Fonticuli etiam in cancro exulcerato magnæ sunt efficacix, de quibus vid. Hildanus, & Wisemannus l.a.

ARTICULUS VII. DE AMBUSTIONE.

CAUSÆ.

INter causas ulcera inducentes externas frequens est ignis, & inde deducta ambustio, quæ ordinario ulcus grave plus minus post se relinquere solet.

Et quidem ambustio observatur trium graduum, quæ differentia probe consideranda: nempe in Primo gradu solummodo Calor & Ardor in externa epidermide excitatur, quem insequitur postmodum vesicularum aquâ acrisculâ plenarum proventus, idque successivè. Secundus gradus est, quando præter epidermidem ipsa cutis aduritur, unde in continenti

inenti vesiculæ exsurgunt, ipsaque cutis corrugari & contrahi nonnihil incipit. Tertius denique gradus est, ut præter cutim ipsa etiam caro aduratur, unde cutis ex toto emoritur, & consequenter in escharam transit, quâ separata ulcus profundum admodum relinqui solet.

Varietas hæcce graduum oritur imprimis ex diversitate rerum ignitarum, à quibus fit, & etiam ex magis plus minus diuturna mora, quares amburens partem ambustam afficit.

Levissimus ambustionis gradus est, quando aqua fervens, stramen, stipulæ, lintea, & similia partem contingunt; Majorem ambustionem inferunt olea & oleosa omnia, pix, mel, cera & similia, imprimis si diutius in parte hæserint. Maximam ambustionem, efficiunt metalliquefacta.

In omni igne acidum est, quod confirmat experientia, vid. Tacchenius: Nam ignis est actus dissolutionis corporum sulphureorum. Omne autem corpus sulphureum habet occultum acidum. Hoc præsupposito, ab omni subiecto igneo, præter motum celerimum, quam ignis infert, acidum ignis se insinuat in partem, & subito liquefacit nutrimentum partium roridum, unde emergunt pustulæ albæ, quæ nihil aliud sunt, quam nutrimentum partium roridum, ab acido ignis subtili, mediante celerrimo motu, liquefactum. Ab urinosi enim colliquefactum nutrimentum exhibet pustulas nigras.

P R O G N O S I S.

Uti aliàs notum est, quod, quo gravior sit ambustio, eò sit peior, hoc in specie observandum venit, ut quo profundior est ambustio, & quo majores venæ aut arteriæ aut etiam nervi fuerint læsi, eò etiam periculosior soleat adesse status; partim quoniam post ablatam escharam vasa ex toto non conglutinata periculosissimas inferunt hæmorrhagias; partim vero, quia in his locis ex sanguinis impedito motu in partibus vicinis gangræna oriri solet.

C U R A.

In Cura ergo removeatur hoc acidum. Interdum simul cum externis primariis usurpantur interna, eaque nitrata, quæ febrim ambustioni supervenientem interdum optime compescunt: Hinc nitrum fixum, nitrum antimoniatum, pulvis pyrius & similia, intermè sunt optima, quibus celeberrima ex lapillis cancerorum parata chirurgica, aut solum ipsi lapilli cancerorum, simul commodè subungi possunt.

Quoad Externorum usum studiosè observandi sunt ambustionis gradus: Nam in primo gradu remedia ordinaria Empyreuma, & inde orta nutrimenti in parte alterationem,

Tom. II. Pars 2.

tollentia, *die Brand-Salben* / ut vocant, applicanda sunt: qualia primariò serè fiunt ex cepis, calce viva, stercorebus animalium, succo cancerorum, & similibus: seu applicetur mox spiritus theriacalis camphoratus, aut aqua calcis vivæ, vel lixivium ejus, imprimis si paretur cum decocto raparum, recipiendonepe decoctum raparum, in quo decolato calx viva recens aliquoties extinguitur, ita ut liquor digitos, 4. vel 5. superemineat.

Sic recipienda calx aliquoties lora, eaque probè subigenda est butyro Majali non salito in mortario saturnino, ut fiat unguentum.

Loco calcis vivæ recipi potest cerussa.

Melius est Unguentum, quod fit ex

ψ p. ij. *Crem. lactis*

Mell. despum. aa. p. j. M.

Vel recipiatur aqua calcis vivæ dicto modo parata, cui infundatur oleum lini vel rosarum, quantum sufficit, ut hæc mixtura congelascat in consistentiam butyri.

Vel *ψ lotæ,*

Tut. Alex. aa. ʒij.

Album. ovor. No. ij.

c. ʒ & *ol. rosar.* f. Linimentum in mortario plumbeo.

Succus etiam allii aut cepearum illitus recenti ambustioni ratione salis volatilis acris, destruentis acidum optimus est.

Vel *ψ. Cepar. crud.* ʒiʒ.

Θis. Sapon. Venet. aa. ʒʒ.

Misc. in mortario, affundendo

Ol. rosar. q. s. pro unguento.

vid. Hildanus *Cent.* 4. *Obs.* 93.

Aut cepe cum melle contundatur.

Optimum est Linimentum, si cum aceto solvatur minium, aut lithargyrium, aut cerussa, aut plumbum ustum: solutioni filtratæ addatur oleum ovorum, vel raparum recens expressum, vel florum sambuci, vel rosarum q. s. quæ aliquamdiu ducantur in mortario plumbeo, donec fiat griseum. Addi potest camphora cum oleo appropriato soluta, ʒʒ. pro ʒbj. Linimenti.

Item cancri fluviatiles vivi contundantur in mortario, & succo inde expresso calide fomentetur pars. Vel

Contusi vivi in mortario misceantur cum butyro Majali recenti non salito, ferveant commode & probe despumentur, coquendo donec fiat unguentum subrusum, transcolandum.

Ex Cancris composita remedia conducunt insigniter, si ex pulvere pyrio orta sit ambustio, contundendo scilicet cancos fluviatiles cum aqua rosarum, aut, quod melius, cum aqua ranarum aut spermatis ranarum, mucilago crassior aquæ permista separetur. Notum alias est, quod etiam mucilagines, aut,

aut, quod melius, mucilago seminis cydoniorum, parata cum spermate ranarum, & cui parum sacchari saturni & camphoræ sit permistum, illita cum pluma parti ambustæ optime conducatur.

Rx. Mucil. sem. Cydon.

Ungu. Emul.

Album. ovor. aa. ʒß.

M. pro Linimento.

Vulgare est remedium, compositum ex p. j. olei olivarum, mista cum albuminis ovi p. ij. quæ conquassentur. Cui tamen adhuc præferendum est, quod fit ex olei lini recens parati, vel olei nucum recens expressi ʒß. vitellis ovorum No. iv. quæ probe ad albedinem usque conquassata applicantur calide parti ambustæ, vid. Agricola *Chir. Parv. Tr. 3. pag. 342.* & Borellus *Observat. Cent. 1. Obs. 50.*

Solum etiam oleum albuminis ovorum valde conducit, uti & Rob Sambuci cum spiritu vini dilutum.

In graviori verò combustione, talia etiam, sed tamen paulo fortiora, applicanda sunt remedia, nempe ubi pustulæ jam sunt exiguæ, citra hoc ut cutis subiecta sit reddita corrugata, relinquendæ hæ sunt ad diem tertium, quo tempore nisi sponte rumpantur, aperiendæ sunt, & modò dictis unguentis pars ulterius curanda.

Sin verò à graviori ambustione cum subitaneis pustulis ipsa curis sit combusta, subito pustulæ sunt aperiendæ, & statim modò dicta remedia applicanda: aut in apertis vesiculis imponendum est unguentum emolliens, quod fit ex stercore gallinæ cocto cum butyro non salito.

Rx. Fol. salv. rec. M. j.

Plantag. M. ij.

Butyr. rec. non ʒit. ʒvj.

Sterc. gall. rec. & albiss. ʒiij.

Frixentur mutuo per horæ quadrantem, & inde factâ expressione serveretur usui.

Vel Rx. Pom. dulc. No. iij. vel iv.

coqu. in ʒ sperm. ranar. vel rosar. ad molliem:

Pulpæ trajectæ addantur

Sacch. albiss. ʒiij.

Camph. gr. xv.

Croci gr. v. M.

Cataplasmata hæc etiam in oculorum ambustione usurpari possunt.

Vel applicetur mucilago seminis cydoniorum cum camphora & saccharo saturni, item albumen ovi cum frustulo aluminis agitatum.

Quodsi vero ex cute omnino combusta facta sit crusta & eschara, tunc mox apertis omnibus pustulis primo vel secundo die separatur eschara, applicando scilicet desuper Li-

nimenta, præter empyreuma corrigentia, imprimis emollientia & laxantia; quæ inter mucilago seminis cydoniorum cum spermate ranarum aut aqua ejus extracta, addito butyro non salito, oleo liliorum alborum, & vitello ovi, vel ejus oleo, non ultimum meretur locum. Quin & commode applicatur Linimentum emolliens, paratum ex butyro recenti, bene agitato in mortario plumbeo cum decocto malvæ; hoc enim tanquam linimentum illitum, applicando desuper folia brassicæ tepida, separat escharam, id quod fit primo vel secundo die.

Quodsi durior & contumacior non separatur eschara, tunc hæc ipsa ferro aliquot incisuris est incidenda, & sordes ac ichores subtilius latentes evacuandæ, ne harum acore ulcus profundum depascens & putridum generetur.

Facta humoris evacuatione modo memorata Emollientia applicanda, donec separatur eschara, qua separata convenientibus Digestivis & Mundificantibus relictum ulcus est consolidandum: in quo casu etiam unguentum ex ʒ, in ʒ frigida sexies vel septies lota, cum oleo rosarum & vitello ovi paratum, unguentum album camphoratum, alabastrinum, &c. convenienter possunt usurpari & imponi; item emplastrum ex alcalibus Tachenii & Norimberg.

CAPUT IV. DE LUXATIONIBUS.

Luxari dicuntur ossa, quando eorum capita ex situ naturali remouentur.

CAUSÆ.

Ista remotio fit duplici ex causâ: vel ob vim externam, vel ob causam internam. Luxatio, quæ fit per vim externam, satis manifesta est sensibus & notissima ægro; causâ vero interna ut plurimum solet esse occulta, & vix sensibilis à priori, sed à posteriori per effectum cognosci potest.

A vi externa fit e. g. in contusionibus, lapsu, plaga, rupturis violentis, membrorum contorsionibus, & similibus. Si fit propter causam internam, ut plurimum est obscura, fit tamen manifesta, si consideremus, quod ad hoc, ut os in suo loco naturali & receptaculo debito contineatur, duo requirantur:

I. Spatium debitum, quod in se recipiat os, & cui ossis caput commode inferi possit.

II. Funiculus, qui firmiter alligat os, ita ut motum licet, non tamen loco moveri possit. Tales funes sunt primario ligamenta, deinde tendines, & tandem muscoli: Nam hæ partes tanquam chordæ aut funes super articulos hinc inde passæ & extensæ, ossium articulationes firmant.

Quando igitur cavitas ossis, capiti alterius ossis recipiendo dicata, repletur ab alia quacun-

quacunque materia, necessario ossis caput extruditur, & ita luxatur; vel quando funiculi ossis, articulationem firmantes, vel relaxantur à causa interna, vel dissecantur à causa externa, os necessario sua sede excidit. Repletur quidem ossis cavitas, imprimis ob acidum vitiosum & præternaturale, synoviam, seu liquorem istum blande glutinosum, pro ossis humectatione ad facilitandum motum & capitis ossis in ejus receptaculo rotationem necessarium, inspissans, incrassans, & coagulans. Nam synovia ab acido vitioso incrassata successivè in gypseam & quasi tartaream coagulatur materiam.

Pejus adhuc est, si istud coagulum peregrinum caput ossis & adnatos nervos successivè jungat cum sinu, & quasi ferruminando uniat; hinc enim immobilitas ossis & membri tandem sequitur: & quidem hoc rarius fit, prius frequentius.

Luxatio à causa interna, familiaris esse solet affectibus arthriticis obnoxiiis, oriundis scilicet ex acido præternaturali, stomachi vitio in corpore coacervato: unde etiam in iis, qui ischiadico malo laborant, subinde talis luxatio supervenire solet in femore: quia & arthriticorum nodi & trophi in articulis manuum & pedum aliam non agnoscunt originem, quam talem synoviae coagulationem ab acido vitioso ortam. Unde etiam tales nullum motum in articulis habent.

Ex altera autem parte Ligamenta similesque funiculi nervei laxantur & flaccidi fiunt, & quasi enervantur, unde ossa ex sede sua dilabi patiuntur ex humiditate serosa salina, fibras nerveas istarum partium laxante, resolvente, simulque stuporem quendam insensilem inferente. Malum hoc iis, qui scorbutico laborant, aut etiam qui affectibus catarhalibus sunt obnoxii, non infrequens esse solet: nam in his à vitioso scorbutico, aut acido, aut salis orancido sale, vehiculo laticis in partes translato, funiculi nervei laxati & resoluti & fere insensiles fiunt: unde paralyti scorbuticæ talis subinde ossium in articulis luxatio supervenit.

DIAGNOSIS.

Os luxatum facile potest cognosci, si conferatur cum membro altero in longitudine, figura & situ; luxatum enim os seu membrum ut plurimum longius evadit, parte non luxata.

Deinde luxatum membrum vix aut non naturali modo moveri potest, secus atque fit in membro non luxato. Item non habet eandem figuram pars luxata cum non luxata; sæpius minus recta, minusque extensa est.

Situs denique partis cum aut introrsum, aut extrorsum, aut in alium situm differentem, detortum est os luxatum, facile monstrat, quodnam malum subsit?

Tom. II. Pars 2.

Et quidem luxatio nunc est perfecta, nunc imperfecta: Perfecta, quando articulus seu os omnino è sede sua remotum est: Imperfecta, quando non totaliter è sede sua remotum est os, quin extrusum quidem sit, adhuc tamen in margine receptaculi hæreat.

PROGNOSIS.

Differentia hæc attendenda propter Prognosin: nam quo magis perfecta est luxatio, eò difficilior curatur; quo minus perfecta, eò facilius.

Præ cæteris omnibus luxationibus luxatio ossis femoris curatu est difficillima; sicuti luxatio ossis in talo omnium periculosissima.

Difficillima est ossis femoris luxatio, quoniam non potest fieri, nisi à causa violentissima, propterea quod os ipsum femoris cum forti ligamento sit alligatum suo receptaculo in osse coxæ, & præterea ambientes muscoli insigniores, qui nates constituunt, & femora investiant, facile impediunt, quo minus os femoris nisi à violentissima & insigniori causa laxari possit.

Non potest ergo luxari os femoris, nisi ligamentum illud internum aut ruptum omnino, aut insigniter laxatum sit.

Quæcunque sit causa, difficulter corrigi potest: Nam ruptum ligamentum consolidationem respuit; laxatum vero difficulter in naturalem tonum restitui potest, cum in profundo nimis loco situm sit, ita ut applicata topica nihil fere operari possint, quin earum virtus & efficacia à musculis aut fere tota impediatur, interna vero nihil aut parum præstant.

Ergo os femoris luxatum sæpius claudicationem per vitam durantem infert, nisi in tenellis subjectis, v. g. infantibus, in quibus propter diuturniorem quietem, propter fasciationes instituendas, facilius potest curari, quam in adultis.

Periculosissimam vero dixi istam luxationem, quæ fit in pedio, ubi nempe est os tali, calcanei tria ossa innominata, os cubiculare, &c. Quoniam ibidem copiosissimi sunt tendines, & ipsa articulatio ossium est talis, ut sede sua remota vix adeo commode possint restitui, utut raro perfecte luxentur.

Jam ergo in luxatione hujus pedii in restitutione sæpissime dolor, distentis aut lacertis non nihil tendinibus convulsiones: si mitius est malum, sæpius inflammationes; si læsio tendinum sit insignior, sæpius Fungi articulares superveniunt: imprimis convulsio est metuenda.

CURA.

Hæc pro varietate causarum subinde varianda est; nam si luxatio est ob vim externam, vulnus, contusionem, lapsum, tunc

[I] 2

mem-

membro extenso mature os reponendum est, quo facto, nil aliud incumbit Chirurgo, nisi ut commodis ligaturis os firmet, apteque collocet, ac inflammationem facile superventuram & alios affectus mature arceat.

Primaria ergo cura luxationis consistit in Repositione, secundaria in Firmatione & symptomatum remotione.

Ad repositionem requiritur Extensio, ad firmationem Ligatura, ut in figura media reponatur membrum luxatum. Extensio requiritur, quia in parte luxata partes vicinæ musculosæ firmiter contrahuntur; musculi enim omnes sunt tensi, & in se contrahuntur, & breviores redduntur.

Firmatio articuli repositi fit commodis ligaturis & fasciationibus, fasciis mundis lineis, nunc latis, nunc brevioribus, pro varietate circumstantiarum instituendis.

Fasciationes factæ non sint nimis arctæ seu strictæ; ne compressis aut coarctatis valis, tam sanguifluis quam lymphaticis, oriantur Tumores; ex vitio quidem vasorum sanguifluorum inflammatio; ex vitio vero vasorum lymphaticorum œdema, tumorve serosus: ob id Repellentia dicta & Adstringentia, **Die Dörbande/** & cataplasmata ex modo dictis parata, cum sanguinis & lymphæ motum impediunt, in luxationibus sunt vitanda, utut contrarium fieri adhuc soleat in vulgari Chirurgorum Praxi.

Dixi jam fasciationes non nimis esse debere strictas; neque tamen etiam non sint nimis laxæ, ne pars semel restituta denuo elabatur ex loco, novamque luxationem inferat.

Verum cum subinde luxationi in principio, vel ante, vel post factam repositionem luxationis, superveniat inflammatio, necesse est, ut præcaveatur vel removeatur per medicamenta interna, salina alcalia, imprimis volatilia, aut alia terrea vel fixa diaphoretica, acidum enervantia, & sanguinem fluidum & mobilem reddentia, sive cum, sive sine sudoris provocatione propinentur; sic enim impeditur sanguinis stagnatio: quibus adiunguntur externa, nunc quidem in loco opposito venæ sectio; postmodum admoventur etiam medicamenta externa pro sanguine resolvendo, cumque fluidum reddendo, & moderate, si quid restiteret, discutendo.

Quod si fiat, ut jam facta sit inflammatio, antequam membrum repositum sit, nihil prius tentandum est, quam inflammatio discussa fuerit, & omnino remota; quamdiu enim inflammatio durat, tamdiu pars inepta est extensioni; sin vero violentius laxatio inflammata extendatur, supervenit ex nimio dolore convulsio interdum lethalis.

Ut ergo inflammatio imminens præcavea-

tur, vel etiam præsens discutiatur, ablucendus est articulus repositus, partesque vicinæ vino tepido, aut, vino decoctionis seu ebullitionis vegetabilium aromaticorum, florum aut summitatum hyperici, chamomillæ, verbasci, rorismarini, stachados Arabicæ, & similia: E. gr.

R. summ. hyperic. floresc. M. jß.

Hb. Betonic.

Chamomill.

Rorismar aa. M. j.

rad. Consol. maj. ℥iij.

Aristol. rotund. 3vj.

sem. 4. cal. maj. aa. ℥ß.

Coq. in f. q. 7 simpl.

Colat. tßß. adde

Vini infus. salu., vel flor. hyper. 3vj.

M. S. Eusserliche Glieder-Bebung.

Hoc ipso calide pars soveatur; & ut restituantur fibræ in debitum tonum, humectandæ sunt fasciæ vel sacculi largiter, successivè pro cura luxationis tepide circumvolvendæ; quandoque etiam fasciæ tali decocto per spongiam imbutæ, humidæ & calidæ sunt servandæ: nam tali fomento & sanguinis stagnatio & inflammatio præcavetur, & fibrarum, aut laceratarum, aut dissolutarum, aut distentarum in luxatione tonus sponte quasi & facile redibit; Ubi major adfuerit contusio, augmentanda radix symphyti; ubi verò levis, augeatur radix aristolochiæ; ubi urgent dolores, capita papaveris possunt addi.

Interim in membro luxato, nunc sub luxatione, nunc post repositionem, supervenit Tumor quandoque œdematosus. In tali tumore removendo nihil melius est, quam ut præmittantur interna sudorifera, & loca externa oleo volatili fortiter penetrante illinantur, tam in loco luxato, quam tumido, ut discutiatur tumor, & pars firmetur. Conveniunt ergo Litus cum oleo destillato tartari & ossium humanorum, oleo pinguedinis humanæ, &c. quæ, quando sunt nimis foetida, rectificentur prius cum cornu cervi usto, vel simili parte animalium, uti supra calce viva; sic fiunt admodum penetrantia & discussiva. Si suspicio sit, huiusmodi luxationes à coagulo gypseo vel tartareo excitari, illinantur partes petroleo; vel balsamum Peruvianum, cum vitello ovi dissolutum, misceatur cum spiritu baccarum juniperi temperato, & sub forma linimenti illinatur parti luxatæ; & locis vicinis imponatur vel fascia sicca calida, vel, quibus placet, emplastrum quoddam nervinum, vel fiat emplastrum ex cera flava & resina albißima, quibus liquefactis immitatur succini & gummi elemi sufficiens quantitas, ut ita coeant in massam homogeneam, quæ postmodum malaxetur cum balsamo Peruviano, & cum ab it emplastrum plus minus

minus spissum; hoc illinantur lintea & applicetur membro luxato, ita ut non exacte coëat, sed extremitates emplastri saltem se contingant, quia ordinario aliqualis tumor & intumescencia supervenit partibus luxatis; unde si emplastrum tenacius sibi superimponatur, impedit dictum tumorem.

Communiter partem, scilicet externam, & membrum totum luxatum, inungunt cum oleo rosarum, liliorum alborum, cum oleo omphacino & similibus, quæ tamen illinitiones potius sunt fugiendæ, nisi forsan oleum hyperici cum oleo destillato Terebinthinæ, temperatum, commode admitti possit. Nam ista supra dicta olea mucilaginosæ oblinendo poros insensibilem transpirationem impediunt, imprimis cum luxatio primis diebus sæpe ad aliquod tempus pro robore partis luxatæ sine repetita deligatione relinquenda sit: unde ex talibus oleosis nimius pruritus tollitur, dum pars religata fovetur, & abluatur cum decoctis plantarum nervinarum aromaticarum, in aqua coctarum, quibus tantillum lixivii communis additum sit. Item dicta olea ideo non sunt adhibenda, cum sint emollientia & laxantia, & si penetrant, nihil aliud præstant, quam ut fibras nerveas ulterius laxent, & ita humorum, ut vocant, affluxui seu stagnationi, aut saltem faciliori relaxationi, occasionem dent.

Qui non admovent olea Chirurghi, admoveere solent emplastra aut cataplasmata constipantia & adstringentia, ex bolo Armena, terra sigillata, sanguine Draconis, thure, mastiche, cum albumine ovi aut cera aut similibus. Hujusmodi tamen cataplasmata & emplastra adstringentia nullo modo adhibenda; utut enim interdum cera inviscetur, tamen nihil aliud faciunt, nisi quod poros opleant, cum eorum vis adstrictoria, quæ non nisi per corporalem contactum fit, intus penetrare nequeat: & posito, hoc fieri, si valide partes nerveæ fibrosæ à luxatione extensæ adstringantur, firmabitur equidem membrum, sed metus est, ne dum semper circa articulum luxatum aliqualis fieri soleat intumescencia, ne, arctatis porulis intimis, sanguinis motus impediatur, & inflammatio aliisque tumor exinde inducatur. Adhæc insulsum est, velle fibras læsas in tonum naturalem redigere hisce adstringentibus; genuina enim restrictio aut restauratio fibrarum nervearum fit per aromatica volatilia nervosa, vel fortum formâ, vel emplastrorum, applicanda, v.g. ex gummi elemi, succino, balsamo Peruviano, &c. & ad aliquod tempus continuanda.

Quæ vero luxatio fit propter os, ob coagulum gypseum à sua sede remotum, requirit remedia, quæ materiam istam coagulatam de-

nuo resolvere & attenuare valent, quod in incipiente facilius fieri potest; in facta vero coagulatione & firmata luxatione negotium est penitus difficile, imo ut plurimum frustraneum. Conveniunt ergo, speciatim imminente coagulatione, interna remedia, quæ acidum quodcunque destruunt, tam fixa quam volatilia, & acriora resolventia, quæ & præcavent talia coagula, & eadem jam facta imprimis resolvunt. Ex horum censu comperta partim, partim laudanda sunt remedia ex tartaro, ex quo parata volatilia utramque faciunt paginam: sive sit spiritus tartari volatilil ex fecibus vini paratus, sive sit spiritus tartari volatilil cum ana nitri per retortam tubulatam pulsus, sive, qui ex tartaro per fermentationem cum proprio alcali præparatur, spiritus insigniter penetrans. Post hæc tartarea salia volatilia quæcunque, ut sal ammoniacum, spiritus & sal volatile ossium humanorum, sunt appropriatissima remedia, præmissis tamen pro ratione circumstantiarum appropriatis laxantibus & sudoriferis ac similibus.

Externè similia acidum destruentia & coagulum resolventia applicanda sunt. Mitius remedium est petroleum, item balsamus Peruvianus cum vitello ovi dissolutus, & cum spiritu vini, vel simpliciter rectificato, vel cum spiritu juniperi temperato, subactus & illitus. Melior adhuc est spiritus lumbricorum terrestrium per putrefactionem paratus, crebrius inunctus, vel mistus cum ana spiritus salis ammoniaci; Oleum tartari foetidum destillatum horrendum est ratione odoris; nihilominus tamen nobile admodum ratione efficacitæ, vel per se, vel cum oleo ossium humanorum aliquoties destillando mixtum, & illitum. Item emplastrum sticticum Crollii cum oleo Philosophorum malaxatum & applicatum, sicut etiam convenit emplastrum de pice Poterii, quod habet *Cent. 2. Obs. 10. 13. 39. & 86.*

Uno nomine: omnia ea remedia externa, quæ alias in confirmato malo ischiadico usurpari solent, commode etiam hic in usum vocantur, cum omnia sint acidum destruentia & resolventia.

Interdum per accidens evenit, ut, nisi mature reponantur ossa luxata, tale coagulum peregrinum in ossis sinu reperiatur, à quo enato impeditur postmodum ossis repositio.

Hinc

14. *Ol. oss. hum. destill.* part. j.

Qi foet. part. ij.

Hæc mista affunduntur calci vivæ (hæc enim absorbet acidum ex oleis, ut ratione salis volatilil fiant penetrantiora) & ita per retortam destillatur oleum penetrans, extrinsecus illinendum.

Remedia etiam hætenus dicta usurpanda sunt

[1] 3

sunt in luxatione ex coagulatione synoviae incipiente & imminente; nam factam jam dissolvere difficillimum est, nisi forsitan Mercurialia aliquid faciant.

Quodsi vero funiculi laxati aut resoluti quasi occasionem subministrent luxationibus, tunc hæ ipsæ restituantur præmissis universalibus internis sudoriferis, additis nervinis, seu sale volatili oleoso constantibus: hinc conveniunt omnia ex ligno sassafras parata remedia, quin & spiritus salis ammoniaci oleosus & aromaticus crebrius usurpatus; Hinc imprimis conducit spiritus lumbricorum terrestrium per fermentationem paratus, & cum eodem parata essentia contra arthritidem vagam in specie, ubi ex radice scorbutica huiusmodi proveniat luxatio & laxatio funiculorum nervorum. Præ cæteris convenit Aurum diaphoreticum Poterii.

Hiscæ crebrius & aliquandiu expectando sudorem usurpatis & continuatis, applicanda sunt præterea externe nervina aromatica, & diaphoretica seu discutientia, quæ ipsa partem luxatam & partes nerveas laxatas in naturalem tonum denuo restituant: quibus subjungenda sunt adstringentia, nervinis temperata, ut firmeretur pars læsa in naturali tono.

Pro qua cura optima & satis accurata est methodus, præscripta ab Hildano *Cent. 6. Obs. 100.* quæ facile in quibusdam potest emendari. Ergo Lumbricalia etiam hic externè palmam obtinent; unde ex lumbricis paratus spiritus, & liquor, conducet ad huiusmodi luxationes: item essentia contra arthritidem vagam Timæi interne & externe est proficua. Convenit quoque emplastrum Hildani, aut aliud ex sola Tacamahaca & caranna, cum oleo succini destillato malaxatis. Emplastrum tale post frictionem & illinitionem cum lumbricalibus toti articulo, vel, ubi tendines sunt articulum firmantes, impositum commodè conducit; aut etiam emplastrum ficticum Crollii cum oleo tartari, vel cum oleo terræ, modernorum oleo Philosophorum, vel cum petroleo, subactum, alutæ inductum & applicatum. Oleum terræ illitum ligamentis & tendinibus artuum relaxatis, experimentum fuit Barbette; resolvit enim lympham, & firmat ligamenta, non neglecta vel omissa debita & conveniente fasciatione & deligatione.

Fit etiam interdum, ut à causa externa simul frangatur & luxetur os, malum perquam difficile, circa quod necesse est, ut simul curetur fractura & luxatio. Fiat vel sub puncto extensionis & repositionis; dum enim extenditur membrum, necesse est, ut luxata & fracta pars eadem vice reponatur, & sub ista extensione coadaptetur, quo facto ligatura debita instituenda venit.

In luxata maxilla, si est à vi externa, repositio est facilis, si ex utraque parte luxata sit; si altera vero parte maxilla luxetur, promptum remedium est alapa inflata.

Porro parvum est os, quod luxatum varia infert mala, nempe os coccygis, quod luxatur tam introrsum quam extrorsum, ut in partu difficili. Hanc utramque luxationem qui vult cognoscere, & reponendi modum considerare, vid. *Ann. 3. M. A. N. C. Observ. 135.*

CAPUT V. DE FRACTURIS.

Dicitur idem in osse Fractura, quod in parte molli vulnus, ut partes corporis duræ seu ossa à quacunque causa, sæpissime quidem ab insigni vi, tam externa quam interna, subito discontinuata, fracta dicantur.

CAUSÆ.

Utut enim causæ omnis fracturæ frequentissime sint violentiæ externæ, nihilominus tamen observatum est, quod à causa interna, nempe à nimis convulsionibus artuum, manus & pedes fracti & discontinuati fuerint: Exemplum tale refert Medicus Norimbergensis in *M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 225.*

Frangitur os vel secundum latitudinem: adeoque transversim, in quo casu interdum simul insigniter conteritur; vel secundum longitudinem adeoque saltem finditur (*gespalten/*) diciturque proprie Fissura. Chirurgi nostrates priorem fracturæ speciem vocant *einen Schlig-Bruch/* imprimis si sit fractura cum vulnere, ita ut aliquid de osse fracto foras promineat: posterior vero species, nempe fissura, vocatur iisdem *ein Klack-Bruch.*

Hæ duæ fracturarum species probe sunt discernendæ, cum differentis admodum sint naturæ, & diversissima etiam post se trahant symptomata.

Per transversum quidem factæ fracturæ etiam ab imperitis facillime cognosci possunt, idque tunc imprimis, quando ossa fracta etiam à loco suo commota fuerint, & sive externa vis lædens accesserit, sive ex solo casu ossa fracta sint, non possunt tamen non ingentes dolores molestiasque inferre partibus membranosis & fibrosis superiacentibus, qui sunt atrociores, si festuca ossis (*Splitter*) separata atrocius partes cutaneas vel membranas læserit aut punxerit. Accedit Tactus sensus, quo potest percipi fractura in osse, & eò magis, si sede sua motum fuerit. Accedit motus in osse fracto per transversum cessans vel depravatus, quatenus figura membri circa os fractum mutata est; accedit, quod

quod sæpissime membrum fractum apparet brevius aut distortum à simili figura, dum musculi ossa separata trahunt versus suum principium.

Accedunt & causæ externæ aliæ, à quibus facillime ossis fractura patet. Imprimis autem hoc consideratu dignum est, quod in fractura partium superjacentium musculosarum & nervosarum pori naturales ex contusione à fractura aut laceratione transformati, simulque ob dolorem & hinc junctam fibrarum nervearum crispationem angustati, facile cursus motusque sanguinis naturalis & lymphæ impediunt, remorentur & sistant; unde præter ordinariam aliqualem partis fractæ intumescientiam, nunc inflammationes nunc œdemata familiares fracturarum sunt comites, sæpius in principio supervenientes.

Non autem confundendi sunt hi tumores, qui in principio fracturæ superveniunt, cum inflammatione aut erysipelate (Chirurgi vocant *ein Bund- Fieber*/) quæ interdum quarto, quinto aut septimo die post fractum & repositum os supervenire solent, ita ut nunc simpliciter aliquod erysipelas in loco fracturæ efflorescat, nunc horror & rigor, & insequens æstus erysipelas tale soleat comitari.

Hujus causa est varia, in specie tamen supervenit, quando occasione fracturæ partes nerveæ, tendinosæ & membranossæ, læsæ fuerint, idque in specie in corpore cacoehymico, ubi occasione partium nervosarum læsarum, harum nutrimentum proximum alteratur, quod læsum contrahit acorem, & irritando partes nerveas erysipelas infert, qua occasione commota camarina succorum facile febrem excitare solet, ubi subinde solet esse suspicio festucarum, hinc inde ex ossæ fracto procedentium, & partes vicinas lædentium aut pungentium plus minus.

Quod attinet Fissuras: hæc etiam sæpissime in occulto latent, in specie si minores fuerint, & non nisi tarde per varia ac gravia supervenientia symptomata se manifestant, scilicet ex casu vel ex lapsu vel ex saltu fortiori, vel in contusione membri in lapidem perpendicularem, vel similibus, fit subinde, ut findatur in quodam loco os, idque pro constitutione ægri vel naturali, vel præternaturali seu morbosæ, vel facilius vel difficilius.

Hinc senes levi occasione & violentia incurunt fracturas ossium, tam transversales quam longitudinales, quia eorum ossa sunt arida & facile scissilia, facileque finduntur, & ii, quibus ex contagio luis veneræ per nutrimentum ossium corruptum ipsa ossa cariota facta sunt, facillime eorum fracturam patiuntur. Si ergo finditur os, pedetentim dolor ibidem locorum exoritur, profundus ta-

men, & in principio ostocopos, nunc major, nunc minor, pro ratione scissuræ, patiens tamen munera solida adhuc cum isto membro fere obire potest, hinc levis quidam tumor, interdum rubescens nonnihil, simul successive se manifestat: verum hicce in minoribus fissuris tardius supervenit, quia ex fissura nutrimentum ossis proximum dilapsum & quasi transsudans, intra periostium & partes vicinas successive alteratur & corrumpitur, & sensim secundum longitudinem membri defluens usque ad loca articulationi vicina congeritur, ubi tendines copiosiores & arctius tensi, progressum ulteriorem impediunt, unde ibidem tandem congestum in abscessum & ulcus transmutatur, dum interea ipsum os in loco scisso corruptionem & cariem concipit, unde infra fissuram enatum ulcus continuo quasi fomite sustentatur & conservatur.

Hæ fissuræ, quæ non sunt adeo raræ, nisi tempestivæ fuerint cognitæ, si tandem ulcera ista producant, vulgo pro abscessibus ex defluxionibus corporis habentur, *vor Leib- Glisse*/cum in loco abscessus facti omnis cura sit irrita, propterea quoniam obortus abscessus sæpius remotus est longius à loco ossis læsi, unde etiam in his casibus interna purgantia & sudorifera, externa vero balsamica quæcumque malum diu protrahunt, nunquam curant, nisi latens & abscondita fissura detegatur.

DIAGNOSIS.

Necesse ergo est, ut Chirurgus sit admodum accuratus & judiciosus in cognitione harum & similium fissurarum & fracturarum secundum longitudinem, & dolens & tumens membrum totum pertentando, & hinc inde digitis investigando, utrum per omnia sibi æquale sit, neque aliquid rimulæ vel inæqualitatis, instar fissuræ in baculo quodam fisso, vel in profundo asperitas, signum cariei, percipi queat: perquirat etiam, an in casu v.g. vel motu, sonus quidam & strepitus vel similia in morbo læso exaudita fuerint? an brevi post tumor ibidem subortus fuerit? an non perceperit successivum motum materiæ lentè descendentis quasi in abscessum? & quæ sunt similia signa, Vid. Felix Wurzius.

PROGNOSIS.

Fracturæ hæc, prout variant tam ex se, quam ratione partis fractæ, & partium in consensum tractarum, atque symptomatum, &c. variant.

In genere fissuræ seu fracturæ ossium secundum longitudinem utut ex omnibus fracturis sint facillimæ curatu, tamen difficilius cognoscuntur; hinc non rite curatæ aut neglectæ ulcus post se trahunt, imprimis si in loco fisso ossium caries superveniat, admodum

dum periculosa sunt, & sæpius ad membrorum abscissionem deducunt.

Fracturæ transversales cognitu sunt faciliores, curatu difficiliore.

Fracturæ, in quibus loca ossium fracta sunt minus retusa, ut non habeant multas prominentias acutas, pungentes, ossa fracta transversim non penitus loco suo remota, facilius curantur; quæ vero semotæ, difficilius longè.

Si vi fractum & comminutum fuerit os in frustula & fragmenta, periculosum est; omni enim conjunctum solet esse vulnus, nunc sensibile nunc occultum, quod sub cute partes membranosas lædit, adeoque abscessus imminet.

Porro si sit fractura ossium, ubi ossa duo conjuncta sunt, si alterum saltem fractum, minus periculosum est, si vero utrumque, majus est: Nam in osse uno fracto reliquum os firmat membrum, & non tam validæ extensione opus est: Postmodum os sanum etiam fulcri instar se habet, quo alterum non potest loco moveri.

Os fractum in medio sui dat fracturam levio-rem, quam circa articulum: nam hujus repositio & firmatio longe sunt difficiliore: item circa articulum sunt plures tendines, multi nervi, &c. unde periculum est, ne inferantur varia symptomata.

Item os fractum, quod tegitur multis musculis, minus periculi habet ratione symptomatum, quam quod frangitur circa loca tendinosa & fibrosa: v. g. si tibia circa suras frangitur, minus periculum est, quam in talo.

Si os fractum sit absque vulnere, & læsione partium mollium, cò levior est cura; si vero cum vulnere partium mollium & contusione, periculosa est fractura, & periculosas inflammationes, dolores, convulsionem, interdum gangrenam, infert.

Si est fractura ossium in plura frustula, subinde necessarium est, ut ossa separentur à se invicem; quod fit nunc citius in minoribus, nunc tardius in majoribus; citius, si ossa penitus fuerint separata; tardius, si ossicula adhuc hæcant cum membranis.

Ossa præter reliquas substantias, prout sunt vel majora vel minora, vel magis vel minus porosa, nunc citius nunc tardius solent consolidari, pro varietate ætatis, constitutionis ægri, vitæ generis, ac similibus circumstantiarum; ut plurimum consolidantur à die 20. ad 25. alia subinde ad 40. 50. vel 60. in majoribus, extenduntur. Minora ossa fracta intra 7. aut 14. diem ferè sanantur; ossa majora fere intra 20. ad 40. præter propter curationem recipiunt.

Præ reliquis ossa femoris fracta raro con-

solidantur in integrum, quia femur circumseptum est vastissimis musculis, mediantibus quibus fractum os vix rite reponi vel firmari potest, quin denuo elabatur, vel figuram vitiosam contrahat, adeoque instar regulæ erit, si femur fractum sit, in specie in adultis, sine claudicatione non posse restitui.

C U R A.

In Cura ergò fracturarum duo scopi incumbunt Chirurgo, ossa fracta in locum naturalem reponere, & reposita firmare: sic enim supervenit naturæ motus, ferruminans ossa fracta. Fracta ergo ossa extendantur, & extensa coaptentur in situm naturalem, tunc necesse est, firmentur, quod fit per fascias, vel per ferulas. Firmatum os fractum postmodum in figura debita est situandum, media nempe, & quæ est consuetæ ægro: media est, quando membrum est in quiete; sic enim quiescunt omnes musculi: Item consuetudo hic etiam attendatur, Facto hoc, dum ossa fracta sunt reposita, & oræ separatæ denuo ad se invicem admotæ, tunc natura eadem firmiter denuo conglutinat, proprium nempe eorum suggerendo alimentum, quo in spatiosa ossis separati infuso & indurato, reuniuntur firmiter, ac denuo conglutinantur ipsa ossa, quod fit nunc citius, nunc tardius, pro ratione (1) ætatis: in senibus enim tardius fit, propter defectum nutrimenti; (2) ratione sexus: sic imprimis notatu dignum est, quod in gravidis, si forsan frangatur os, difficillima & tardissima sit hujus fracti consolidatio, quæ tamen, si supervenit partus naturalis & legitimus, postmodum facillime ferruminari solet: Vid. M. A. N. C. *Ann. 1. Observat. 25. pag. 91.* (3) ratione habitus ægri: succulenti, *ισχυροί*, sani, &c. citius conglutinantur, quam aridi, phthisici, &c. quò magis accedit nutrimentum.

Modus ferruminandi est is: Liquor alimentosus chylosus ossium, spermatico eorum principio similis per meatus ac poros eorum secundum longitudinem fibrarum, ex quibus primitus ossa coaluerunt, rependo ea nutrit & auget, dum verò in loco fracturæ rectus & naturalis pororum ac meatuum situs est vitiatum & impeditum, quoque impeditur naturalis & legitimus alimenti cursus, unde hoc circa locum fracturæ stagnat, & per foramina aperta hinc inde uberius transsudat, successivè congeritur, & ita tandem in similem ossibus duritiem coagulatur, sicque tandem callus appellari solet, qui substantia quidem similis est ossi, conformatione vero sola ab eodem differt.

Nullum ergo aliud directè Chirurgi officium est circa Fracturas, nisi ut ossa extensa prius probè circa extremitates oris reponat, mutuoque conjungat: quorum prius in fracturis

curis per transversum factis tantum locum habet, posterius vero, etiam in fissuris probe observandum est. Postmodum ossa reposita ita in situ naturali conservet, nempe fasciarum circumligatione & ferularum adaptatione, ac denique membri apta colloca-
tione. Indirectè tamen etiam circa conglutinationem ossium fractorum mediante callo Chirurgus est occupatus, facilitando opus naturæ, præcavendo aut tollendo inflammationem, aliaque symptomata, & admo-
vendo ea, quæ balsamum naturale seu alimen-
tum proximum ossium fractorum conservent,
& ita conglutinationem & calli generationem
promoveant. Externè ergo locum fractum
consideret, an adsit inflammatio vel non? si
adeat, hanc prius curet, antequam tantil-
lum circa fracturam tentet. Curatâ hac, fra-
ctura curetur, atque reposito ossè, locum
fracturæ inungat spiritu vini calido, vel soli-
tario, vel cum infusione florum hyperici: vel
illinatur cum spiritu vini, cui tertia pars spiri-
tus lumbricorum terrestrium per putrefactio-
nem admixta sit, & se insinuet in poros, &
partes nerveas læsas restituat: vel applicetur
fotus supra in Luxatione commendatus. Si
insignis simul adsit contusio partis, illinatur
mel cum spiritu vini probe temperatum; Il-
linatur etiam locus fractus cum oleo hyperici,
aut fomentando eundem cum vino decoctio-
nis rorismarini, aut inungendo oleum lum-
bricorum terrestrium, quæ debent esse acuata
cum paucis oleo destillato terebinthinæ, &
rorismarini, aut oleo pinguedinis humanæ ab
ossibus humanis calcinatis rectificato, facto
hoc, applicetur emplastrum ex tacamahaca,
malaxatum cum oleo destillato rorismarini,
quo simplicius, eo melius; aut, quod ut plu-
rimum usu venit, applicandum emplastrum
ad rupturas seu fracturas, *ein Bruch-Pflaster* /
parandum nempe ex cera, resina, &
terebinthina, vid. Wurzius.

In loco ergo fracturæ, postquam con-
iunctum & repositum fuerit os, imponitur
tale emplastrum, ita ut non exacte extremita-
tes emplastri se contingant, non vero ibi in-
vicem superimponentur, sed ut aliquantisper
hiscant, ne superveniat intumescencia. Ce-
ratum mirabile ad concussiones & fracturas
videb. in Baptistæ Sitoni *Miscell. Med. Tract.* 23. pag. 116. Præmitti potest, inun-
ctio loci cum oleis appropriatis, imprimis
cum oleo lumbricorum terrestrium, acuato
cum oleo destillato rorismarini.

Emplastro applicato imponuntur feru-
læ, quæ postmodum coniunguntur per tria
ligamenta.

Ligationes & fasciationes sint modera-
tæ, ita, ut nec sint nimis arctæ, nec nimis
Tom. II. Pars 2.

laxæ: Nam nimis arctæ partem suffocant;
semper enim in loco fracturæ aliqualis super-
venit intumescencia, quæ impediri nec
potest nec debet; Non ergo deligationes
nimis stricte sunt adducendæ, quia alias, si
ista intumescencia impediatur, gangrena
partis supervenire assolet. A medio seu ipso
loco ossis fracti fasciarum deligatio est insti-
tuenda, & eadem nunc sursum nunc deor-
sum pro lege artis sunt ducendæ.

Quæritur, an plures fasciæ circumli-
gandæ sint? an vero saltem sufficiat empla-
strum cum ferulis? Resp. Pars fracta vel est
fracta in loco musculis destituto, & magis
tendinoso & membranoso, vel non: si
prius, musculi sunt loco multiplicium fasciæ-
rum circumvolutarum, & non opus est
multis fasciis involvendis; si posterius, ut
firmentur melius ossa, convenienter fasciis
duabus contrario situ circumductis pars est
fascianda.

Ferularum numerus nimius, earum-
que arctæ nimis collectio seu connexio est
nociva; sæpissime tres sufficiunt, rarius ul-
tra quatuor adscendendum est, eæque ad
digiti distantiam à se invicem sint remotæ,
ne comprimendo dolorem, aut etiam intum-
escenciæ impedimentum afferant.

Fugienda ergo sunt in fracturis catapla-
smata quæcunque ex pulveribus adstringenti-
bus, bolo Armena, rosis, balauistiis, thu-
re, sanguine Draconis, & similibus, cum
ovi albumine exceptis, parata; quia poros
obstruunt, partem incrustant, insensibilem
transpirationem impediunt, & nihil juvant,
quin potius nonnulla mala inducunt. Ista
etiam ex succino, mastiche, terra lemnia,
&c. quia ex illis nullus major fructus, quam
ex cera, expectari potest. Sin applicanda
sint cataplasmata, ea paranda sunt ex vulne-
rariis appropriatis, nempe ex geranio Ro-
bertiano contuso; inungatur locus fractus
oleo hyperici, hinc imponatur cataplasma
ex pulvere radicis bistortæ in vino intuso.

Non incongruum est Unguentum Bar-
tholini *C. 6. Histor.* 25. si post 3. vel 4. *ps*
fasciæ resolvantur, & consideretur locus
fractus; ibi, ubi consultum est, abluatur
vel aqua simplici, vel cum vino Decoctio-
nis plantarum nervinarum & vulnerariarum,
vel similia.

Cum his externis conjungi etiam pos-
sunt commode interna quædam, quæ pro-
movent callum & præcavent symptomata;
inter quæ eminent vulneraria, quibus sem-
per Rosmarinus addendus est; eminent etiam
herba agrimonix, consolida major, Gera-
nium Robertianum, sabina, aliaque ulcera-
ria in vulnere & ulcerum cura recensita.

[K]

Præ

Præ cæteris osteocollæ lapis, à ʒß. ad ʒi. in aqua symphyti majoris, vel vino, vel aceto, vel decocto vineæ pervincæ, reperitis vicibus usurpatus, est appropriatissimus, cujus mira est efficacia in adjuvanda consolidatione ossium fractorum, & in promovendo callo, adeo ut interdum etiam, si nimis diu usurpetur, magnum nimis callum producat: Vid. Tacchenius *Princ. morbor. pag. 140.* Hildanus *Cent. 1. Obs. 91. & Cent. 3. Obs. 90.*

Quod si in fracturis, imprimis cum contusionibus, Nervi, Ligamenta, Tendines, & similes partes nerveæ, circa fracturas sint dislocatæ & quasi contortæ, tunc ad torsiones istas partium nervosarum Ceratum Foresti est admodum commendatum, quod post diem septimum fracturæ imponit.

Fissuras quod attinet; si recentes sint, facile curantur, si loco tumenti & non nihil dolenti, ubi suspicio est fracturæ, applicetur emplastrum ad fracturas conveniens, v.g. ex resina cum radice symphyti & similibus paratum; vel etiam omillis ferulis, pro ratione circumstantiarum, membrum deligatum quietum contineatur: sic namque nutrimenti ossis corruptio impeditur, cum facta jam corrigetur, & fractura faciliè consolidabitur.

Quod si in fissura recenti tumor insignis, mollis tamen & tractabilis, adsit, quod signum est collecti circa locum affectum aut sanguinis aut alius liquoris ex osse fisso transudantis, tunc aperiendus est tumor scalpello, & liquori contento parandus est exitus: vulnusculum servetur apertum per turundam, & hinc tractetur tanquam fractura cum vulnere.

Quod si vero, aut ignorantia Chirurgi, aut ex neglectu ipsius ægri, temporis diuturnitate fissura degeneraverit in ulcus & abscessum, tunc tumor & abscessus facta aliquali maturatione aperiendus, & apertura usque ad locum fissuræ continuanda, ut ibidem os fractum sapissime simul successu temporis redditum cariosum, commode curari possit, &c. vel pulvis euphorbii, solus, vel cum ana radicis iridis Florentinæ, inspergatur; tunc enim abscessus facile mundificantibus ac consolidantibus curari in totum poterit: de quibus casibus nemo unquam melius scripsit, quàm Felix Wurz in sua Chirurgia.

Et quidem Fracturæ hæc nunc sunt simplices, nunc complicatæ cum vulnere, ita ut & os frangatur, & superstratæ partes molles musculosæ lacerentur atque punquantur.

Post extensionem ergò & repositionem ossis vulnus considerandum venit: Et ubi nihil de osse abscessurum metuitur, labia vulneris vel suture vel glutine conjungenda

sunt, & balsamo vulnerario tractanda: Emplastrum in loco vulneris perforatum seu foraminulatum fracturæ applicandum, ut ita beneficio foraminis commodè vulnus tractari possit: hinc ferulis & fasciis convenienti modo pars læsa tractanda & deliganda, & quotidie semel aut bis pro ratione circumstantiarum est medicanda vel religanda, quod in simplici fractura tertio demum die fieri solet.

Quod si verò ossis fracti particulæ insignes extra vulnus promineant, ita ut jam ab ambiente aëre alteratæ, & quod citò fit, cadaverisatæ fuerint, *wenn sie schon angelautsen synd/* tunc pars ossis eminens aut limà abradenda, aut tenacius adhærens separanda: id quod etiam fieri necesse est, si eminens os & cutim perforans, dextrè reponi nequeat; sin verò os adhuc sanum & non alteratum sit, tunc denuò in situm convenientem more solito restituendum est, vulnusque factum per unguenta digestiva imposita diutius apertum servandum. Ulcusculum, si est majus, per cutem adducatur; si parvum, relinquatur, apertum tamen servetur, idque cum in finem, ut particulæ & frustula ossium interdum in fracturis per transversum à toto separata, si forsàn coalescere cum reliquo osse nequeant, per vulnus foras extrudi aut extrahi possint.

Quod si mox in principio ossicula talia omnino separata se manifestent, vellellà saltem sunt extrahenda; sin vero tantillum adhuc cum toto aut cum periostio saltem cohæreant, naturæ integrum committendum negotium, quæ nunc talia ossa omnino separat, nunc vero denuò consolidat; hoc ipsum vero cum lentè fieri soleat, adjuvanda est ossis faciliior conglutinatio unguento parato ex

Mellis virg. ʒß.

Pulv. lumbric. ʒssr. ʒiij.

vid. Barbette in *Chirurg.*

Vel

R. Pulv. aloës, myrrhæ aa. ʒß.

rad. consol. maj.

aristol. rotund. aa. ʒiij.

Euphorb. ʒij.

Terebintb.

Ceræ aa. q. s.

M. in formam Linimenti seu unguenti, quo illitum vulnus promovet ossiculorum separationem, si denuò cum toto consolidari nequeant.

Si osse fracto denuò coalito callus nimis magnus genitus sit, corrigendus & imminuendus est, quod docet Hildanus *Cent. 1. Observ. 91.* Si non habeat debitam figuram, opus est interdum, ut corrigatur, quod facile fit, si callus nondum est firmatus; si vero est firmatus, sine noxa deformitas non

non potest curari. Si os iterum frangatur, non frangitur in callo, sed circa callum.

CAPUT VI. DE GANGRÆNA & SPHACELO.

DEnique communis omnium affectuum Chirurgorum affectio est partis omnimoda corruptio, Gangræna & Sphacelus: Gangræna significat incipientem partis mortificationem; hinc Germanis audit, *der heisse Brand*/ quia cum dolore & aliquali ardore adhuc est conjuncta: Sphacelus verò, ut propriè loquuntur, Necrosis, est perfecta mortificatio partis, & omnimoda vitalitatis carentia: Germanis *der kalte Brand*. Differunt ergo saltem gradualiter gangræna & imminens sphacelus.

CAUSÆ.

Oritur vel à Causa externa vel interna: Externæ sunt contusiones, luxationes, lacerationes, morsus animalium venenatorum, & similes: Internæ verò morbi pestilenciales, variolæ, morbi chronici cum tumoribus juncti; hujusmodi enim in morbis supervenit gangræna, in specie in pollice pedis, qui non nihil lividus sit, accipit pustulam, sub hac maculam nigricantem, subito tamen pergit, & integram tibiam occupat.

Brevibus: Causa gangrænæ & sphaceli in genere sunt ea, quæ quacunque ratione sanguinis & spirituum vitalium distributionem, & per partes circulationem, inhibere valent. Hæc enim ex parte toto in quodam loco aut membro impedita & sublata pars nativum vigorem omnem amittit: hinc est, quod vix sæpius oriantur gangrænæ & sphaceli, quam ex inflammationibus malè curatis, imprimis si parti inflammata per emplastica imprudenter admota impediatur insensibilis transpiratio; tunc enim sanguis extravasatus stagnans corrumpitur, ex toto putrescit, & partis inflammata gangrænâ post se trahit; Imprimis erysipelata per unguenta oleosa aut mucilaginosâ infulse tractata subito serpentem inducunt gangrænâ.

Quoad causas proximas; communiter & rectè dicunt, gangrænâ & sphacelum esse partis mortificationem, hujusque causam esse calidi nativi extinctionem. Calidum verò hoc consistit in acido volatili & spirituosò, quod agentis instar se habet in structura & coagulatione seu formatione partis. Hoc acidum ergo vitale conservatur & restauratur continuo à sanguine & spiritu vitali influentibus salis, & occultè acidis. Quæcunque ergo acidum istud destruunt, vel fomitem ejus impedire valent, omnia gangrænâ & hinc

Tom. II. Pars 2.

sphacelum inferunt, adeo ut exinde sequatur, quod in gangrænâ & sphacelo peccet imprimis alcali, quatenus propter acidi destructionem emergit, vel quod in se genitum acidum destruere valet. Hinc subinde post gangrænâ & sphacelum supervenit partis factor & putredo, signum alcali agentis in acidum, & dissolventis sulphur partis. Et quidem oriuntur hæ ipsæ mortificationes imprimis in partibus nervosis, minus in partibus sanguineis.

Causæ remotæ sunt, quæ illud acidum dissolvunt, & sulphuris partes destruunt. Causæ remotæ, agunt hoc loco vel immediate vel mediatè. Mediatè, quæ fomitem ejus, nempe influxum sanguinis & spiritus vitalis, impedire solent, ut ligatura fortis, contusiones, lacerationes, & similia; Immediate verò partem lædunt imprimis insensibilis transpiratio prohibita, quæ retenta acrior redditur, & acidum vitale destruendo partem mortificat, Venena & morbi maligni, morsus animalium venenatorum, quæ fermento suo maligno alcalinæ prolapia acidum destruunt, & sphacelum inferre possunt. Produciunt etiam gangrænâ ulcera maligna, inveterata quæcunque, ulcera cancerosa, refrigeratio partium nimia.

DIAGNOSIS.

Signa gangrænæ imprimis monstrat in inflammationibus, in ulceribus, item in vulneribus partium nervosarum, color floridus natus plus minus rubicundus, qui mutatur in pallidum obscurum, sublivescens aut cæruleum, qui in sphacelo exactè nigrescit. Sub his colorum mutationibus caro antea tensa mox evadit flaccida, mollis, & quasi omni tono ac vigore destituta, ita ut in factò jam sphacelo cutis spontè à partibus separetur, & aqua quædam decolor pravi odoris effluere soleat. In parte ipsa nullus arteriarum pulsus sentitur, in incipiente verò insigniter pulsât, sicuti etiam sensatio ipsa tactus successivè imminuitur, quæ ex toto aboletur in sphacelo, & pars nigrescens odorem cadaverosum spirare incipit; in imminente quidem est acerbus dolor, sed pederentim evanescit. Calor in parte imminuitur, & pars antea calida tepet, tandem friget.

Quod si ulcus evadat gangrænâsum, præter dicta signa nullas sordes generare solet, aut si quid est materiæ, est pauca, decolor ac fetida.

PROGNOSIS.

Sphacelus est incurabilis, nisi pars mortua ex toto fuerit separata.

Gangrænâ & sphacelus, quando oriuntur à causâ interna, sæpius sunt lethales:

[K] 2

Ause-

Auferatur enim licet integra pars gangrænoſa, in oppoſita tamen vel alia parte iterum regerminabit malum, quod neceſſariò mortem poſt ſe trahit.

Si ab interna cauſa gangræna exſurgat in extremitate pedum, tunc certus ſit æger de morte, quæ ſucceſſivè, dum ſerpit gangræna, neceſſariò ſupervenit, ſive manus ſive pedes amputentur: Fermentum enim iſtud inquinans ſanguinem, dum eiſdem ſulphur vitale per modum malignitatis deſtruit, ad mortem perducit.

Partes quò magis ſunt ſanguineæ vel carneæ, eò minus corripuntur gangrænâ & ſphacelo, & facilius curantur; partes vero nerveæ uti faciliùs corripuntur hiſ affectibus, ita difficiliùs curantur.

Gangræna ab externa cauſa orta curari poteſt, ſi maturè ſuccurratur; ablatâ enim parte corruptâ, reliquum corporis permanet ſanum.

Præcæteris nota eſt cautela ſervanda, ne decipiantur in cognoscenda gangræna & ſphacelo: nempe ſi fiat, ut pars ſphaceli interdum motum adhuc habeat, quatenus movetur à tendine oblongo, cujuſ muſculus ſi ſanus.

C U R A.

In Cura ergo Gangrænæ eiſmodi progreſſus eſt inhibendus; in ſphacelo verò pars jam mortificata ſeparanda, & ulterior mortificatio præcavenda ac ſiſtenda venit. Præſtamus hoc internis & externis. Interna ſunt omnia ſudorifera alexipharmaca, qualia ſunt Camphora, ſpiritus vini camphoratus, ſpiritus theriacalis camphoratus, eſſentia & ſpiritus baccarum ſambuci, ſpiritus cornu cervi proprio ſale acuatus, theriaca in ſpiritu vini camphorato propinata, elixyr proprietatis præſervativum, ſive cum ſpiritu vini camphorato, vel ſpiritu theriacali camphorato, præparatum, aqua ſcordii, cornu cervi citrata cum camphora & ſimilibus.

Externè in metu gangrænæ, aut hac ſaltem incipiente, mirè conducit ſpiritus vini vel ſimplex, vel ſpiritus vini theriacalis, vel ſpiritus theriacalis camphoratus, cum linteo calidè impoſitus; aut ſpiritus vini permiſceatur probè cum aloë, thure & myrrha, & loco ſpiritus vini ſimplicis longè præferendus eſt ſpiritus vini theriacalis vel camphoratus: Quod ſi verò in gangræna imminet mortificatio acidi, externè vel acida, vel falſo-acida primatum obtinent: Hinc muria ſeu brodium braſſicæ acidæ experimentum eſt elegans. Decoctum calcis vivæ mirabile eſt in gangræna, vel ſolitarium, vel ſi in eodem decoquatur ſulphur, vel ſi in decocto calcis vivæ diſſolvatur Mercurius dulcis, addito ſpiritu vini,

quod vocant Galli aquam phagedemicam, præmiſſa ſi opus eſt, ſcarificatione. Decoctum ſcoriarum antimonii in aceto ſiſtit gangrænâ, vid. Riverius *Cent. 4. Obſ. 50.* vel ex Minderero decoctum ſalis ammoniaci in urina ægri applicetur. In uſu etiam eſt ſcordium applicatum, ſive lixivium decocti ſolum, aut cum radice ſcorzonæ & vincetoxici, impo-
natur; ſicut & ſuccus urticæ cum linteis duplicatis applicari ſolet contra ulteriorem gangrænæ progreſſum. Vel

℞. Rad. Valerian.

Oſtrut.

Angel. aa. ʒj.

HB. Scord.

Salv.

ſumm. abſinth.

fl. Chamomill.

ſambuci,

bacc. junip. aa. M. j.

Myrrh. ʒij.

Incif. & contuſ. coq. in

Vini generoſi Menſ. ij. in vaſe clauſo:

Colaturæ adde

Camphor. ʒij.

Miſc. & calidè applicetur.

Gangræna faciei à morbillis relicta aquâ marina, cui incoctum fuit abſinthium, curata vid. in *M. A. N. C. Ann. 2. Obſ. 2. pag. 2. & Ann. 4. & 5. Obſ. 60. pag. 50.*

Quin & apud multos uſus obtinuit, ut imponatur cataplaſma ex ſcordio, ſcabioſa, alliaria, abſinthio, hyſſopo, ſalvia, agrimonia & ſimilibus, cum aqua calcis vivæ dilutione ſimul decoctis. Radix bryoniæ recens contuſa aut raſa in forma cataplaſmatis imponatur, vel cum chereſolio. Hiſ ſunt qui præferunt cataplaſma paratum ex farina lupinorum, fabarum, ac ſimilium cum lixivio dulci vel oxymelite, gangrænæ impoſitum, cum quidam aſſerant, decocto lupinorum cum vino albo & lixivio, addito parum croci, nihil requiri poſſe potentius ad coercendam gangrænâ. Item poma putrida contuſa ſine liquoris ullius affuſione cocta in gangræna adhibita, vid. in *M. A. N. C. Ann. 3. Obſerv. 321.* Pertinet huc etiam fermentum cereviſiæ, vid. Bartholinus *Cent. 5. Hiſt. 41.*

Caput mortuum aquæ fortis contuſum, & decoctum cum aqua roſarum, in qua ſummitates panni linteï ſunt intincti, & applicati aliquoties, calidè gangrænâ conducit.

In graviore gangræna, præmiſſa partis profunda ſcarificatione, conducit ſimus equinus, coctus in vino, aut aceto, aut urina humana, cum vel ſine mica panis, & inſtar cataplaſmatis applicatus, fuit remedium Sylvii atque Barbette. Vel cum eodem ſimo ſequens parari poteſt cataplaſma:

℞. Summ.

- ℞. *Summ. Absinth.*
fl. Chamomill.
samb.
H. Scord. aa. M. jß.
rut. Mß.
Micæ panis similag. (potest etiam
omitti) ℥vij.
Fimicaball. ℥iij.
coqu. ex *vmuriat.*
sub finem addendo
Atram. ℥ij.
~vini ℥iij. M.

Vel eluatur scarificata pars cum muria, vel cum decocto calcis vivæ, vel decocto Riverii in *Obferv.* 24. a Fomio communicata, acuto cum vino Hispanico, spiritu vini rectificato, camphorato, theriacali, aut cum spiritu salis ammoniaci, essentia myrrhæ, &c. in quibus aliquid unguenti lithargyrii dissolvendum. Huc etiam pertinet Lotio Hildani de Gangræna & Sphacelo; vel Riverii *l. a. Obs.* 22. ex vino, sale, melle, & aceto; Vel

- ℞. *Muria* ℥iv.
~vini camphor. ℥ij.
Ungu. Egypt. ℥ij. Misc.
℞. *∇ψ* ℥ij.
~theriac. camphor. ℥iij.
gati ℥ß.
Misc.

Scarificationibus hoc modo probè elotis imponatur vel Mercurius sublimatus solus, vel cum alumine, capite mortuo vitrioli, myrrha & aloë mixtus, item lapis medicamentosus Crollii, similiaque escharotica; aut cum plumaceolis applicetur butyrum antimonii, cuius usum Riverius *Cent.* 1. *Obs.* 84. commendat.

Quodsi gangræna sit gravior, & incipiens jam sphacelus, loco scarificato largiter inungendum est unguentum Ægyptiacum & modo dicta unguenta vel cataplasmata imponenda. Sanguis talpæ, si in papyro exsicceetur, illudque postmodum sub usu humectetur cum aqua, & imponatur, contra sphacelum & gangrænam laudatur.

Quodsi vero jam in sphacelum degeneraverit gangræna, mortuum ex toto separandum est à parte sana.

Ufus obtinuit amputare membra, quod fit vel ferro candente vel candefacto, inurendo partem tamdiu, donec ægri percipiant. De loco controvertitur, an in articulo, an prope articulum instituenda sit amputatio? v.g. an in gangræna tibiæ amputandus sit pes sphacelatus infra genu? an vero permittendus sit progressus mortificationi usque ad articulum, & ita instituenda amputatio? Experientia hac in parte ferat iudicium, quæ docet, cum minori symptomatum proventu, & cum minori ægri jam convalescentis incommodo in actionibus fieri amputationem infra arti-

culum, latitudine præterpropter unius palmæ, sic enim optimè potest curari, ac æger partem, mutilatam licet, pro actionibus usurpare.

Ulterius quæstio est: an amputatio sit facienda in parte præcisè, ubi cessat mortificatio? an in parte sana? an verò in parte mortificata? Respondeo: Si à causâ oriatur interna gangræna, necesse est semper, ut largiter in parte sana fiat amputatio, ut nempe sic possit impediri recursus gangrænae in aliam partem; periculum enim est, ne sub cute ulterius serpsit malum, quàm extrinsecus appareat. Si verò gangræna aut sphacelus simpliciter ab externa proveniat causâ, sufficit in contermino partis mortuæ cum sana instituere amputationem, & ægri cutis tam firmiter ducatur deorsum, ut sic aliquid de parte sana amputetur; vel in ipsa etiam parte mortua amputatio institui potest, modo id, quod adhuc de sphacelo restitat, admoto ferro candente removeatur.

Amputatio fit cum cultris falcatis iisque nudis, qui mos est Gallorum; vel cultris ignitis, qui mos est Italarum; (Prior est convenientior, posterior magis dolorosus, utut non tanta succedat hæmorrhagia) postmodum cum ferra pro ossibus. Borellus habet singulare instrumentum, cum quo in ictu possit separari pars ægra. Hæmorrhagia impeditur applicatione pulveris cujusdam styptici, vel solius terræ vitrioli dulcis, vel pulveris stercoreis suilli. Quidam vitriolum Martis & alumen anatica proportionem in succo plantaginis, vel aqua ejusdem destillata solvunt, quâ solutione lintea madefacta imponunt. Quidam inspersis pulveribus stypticis crepitum lupi superimponunt, & ultimo cum emplastro diachalcitidis Hildani cooperiunt.

Nostrates nimis abhorrent amputationem: hinc alius est modus separandi mortuum à sano beneficio butyri antimonii, si scilicet hoc ipso ducatur circulus ibi, ubi definit mortificatio. Hoc ipso enim, si sit sanabilis sphacelus & gangræna, promptè separatur sanum, ita ut dehiscat mortuum à sano, & progressus ulterior mortificationis impediatur, hinc postmodum instat ulceris recentis nempe suppurantibus pars sana curari possit. Vel si sphacelus non adeò profundus processerit, necesse est, ut locus scarificetur profundè, eluatur lixivio, cui addita sit farina lupinorum & aloë; vel eluatur cum aceto, mixto cum spiritu vini, postmodum applicetur unguentum Ægyptiacum, vel vulgare, vel Hildani, vel loco hujus recipiatur Mercurius præcipitatus, & misceatur cum unguento quocunque mundificativo, & illinantur scarificatæ partes; vel ad imitationem Hartmanni Mercurius præcipitatus cum oleo nucum coctus in consisten-

tiam linimenti obscuri, quo illinatur pars sana & agra. Facit huc curiosa observatio Thiermayers *Conf. lib. 1. pag. 106.* ubi scroto- tum in variolis sphacelatum per præcipitatum rubrum cum unguento rosato digestivo mix- tum, separatim & refarcitum refert.

Dum hæc fiunt, ultra talia, quæ hinc inde applicantur, ad mortificationem tollen- dam Epithema imponatur, v.g. ex scordio, aristolochia rotunda, radice hirundinariæ, absinthio, baccis juniperi, myrrha, aloë &c. coctis in aqua vel aceto, item vino vel lixi- vio, addito alumine, vitriolo, sale marino, & similibus, &c. ut impediatur ulterior pro- gressus. Instar omnium sit Epithema & Ca- taplasma Hoffmanni in Meth. Medendi *pag. 411.*

APPENDIX. PRAXIS EXTRA- ORDINARIA.

Medicina Practica vulgaris est adhuc manca in quamplurimis, & mu- tila. Causa verò, duplex est.

I. In Theoria, defectus experimentorum in macro- & microcosmo, super quæ Theo- ria Medica solet fundari. Sed quia adhuc multa experimenta deficiunt, fit, ut etiam in Theoria multi sint defectus, qui se exerunt quotidie in Praxi. Et hinc tam studiosè ex- colitur Chimia & Anatomia, nempe ex his duobus Pathologia seu morborum diagnosi & fiendi ratio petenda est.

II. Defectus genuinorum, & hinc gene- rosiorum remediorum, tam universalium quàm specificorum, id est, defectus reme- diorum, quæ in se efficacia sint, ut sine in- signi stomachi molestia vim suam exercere, & morbos statim tollere possint. Hinc qui supra ordinariam Praxin excellunt, hoc præ- stant vel ope solidioris theoriæ, & observa- tionum circa ægros, vel ope generosiorum remediorum, quibus etiam altiora præstiterunt sublimiores Chimici Valentini, Paracelsus, Poterius, & similes.

Res ut pateat, notum est, quod in Pra- xi vulgari ratione defectus sufficiat Theoria. Sæpius evenit, ut vix circa radicem morbo- rum versetur Medicus, sed saltem circa pro- ducta. (2.) Quod non rarò anus aut empiri- cus melius interdum curet, quàm Medicus. Propterea fit, ut tam sæpè affectus incurabiles habeantur, non tam propter morbum incu- rabilem, quàm propter generosiorum reme- diorum defectum.

In Praxi vulgari propter Theoriam man- cam sæpius vix circa radicem morborum ver- santur Medici, sed ut plurimum vel circa cau- sam occasionalem, vel productum morbosum;

unde etiam à posteriori, rariùs à priori, so- lent curari ægri: verb. g. spina digito infixæ, vel vitiatum fermentum spinæ instar partes læ- dens dat tumorem, inflammationem, ab- scessum, &c. sicuti vitata fermenta interna affectus chronicos & acutos inferunt. Si ve- ro in isto casu externo spina evellitur, fit ut omnia evanescant symptomata. Si verò re- licta spina saltem anodynus dolor sistitur, si di- scutitur tumor, aut ad abscessum perducitur, adjuvatur quidem naturæ motus, sed saltem à posteriori producta morbofa curando.

Par ratio est in morbis internis, v.g. in malignis, ubi fermentum exterius hauustum massam sanguineam inquinat, infert varia symptomata; quo remoto, tollitur febris; si non, à posteriori per sudorem & similia cu- rantur ægri: Sic contagium luis Venereæ le- ve est, quo destructo, omnia curantur; si non fiat, mediante diætâ sudorifera, tædiofa salivatione Mercuriali, inquinamentum istud à posteriori saltem evocatur. Sic talis spina est v.g. istud acre tantillum, quod alterat ner- vos, vellicat & totum corpus in convulsiones excitat: Si tollitur, morbus cessat; si non, per opiata & similia à posteriori occurrendum. Sic v.g. tantillum effluviū acrius, nares vellicans, statim sternutationem efficit: Curatur sternu- tatio à posteriori per opium; per sudorifera à priori temperando acre, quod nares velli- cat. Sic tantillum acidum est, quod instar spinæ radici dentis infixum est, dolorem gra- vem inferens: si evellitur, omnis dolor, he- micrania, tumor, palpitationis sensus, &c. evanescent; per externa si quis sistere velit, sal- tem à posteriori symptomata curabit, radi- ce intacta relicta. Exilis sæpè est calculus, qui universum corpus interdum cruciat: si diffingitur & expellitur, omne malum sub- latum est; si non, à posteriori anodynus, bal- neis, linimentis, opiatis, diureticis, & si- milibus succurrimus quidem ægris, radicem vero morbi non attingimus. Medicus ta- men qui attendit radicem morbi, ritè se ope- rari existimat; alius verò generosiorum re- mediorum defectum admodum deplorat, vid. Poterius.

Qui ergo ultra Praxin vulgarem excellere cupiunt, duplici hoc consequuntur medio: vel mediantibus remediis, vel mediante mo- do extraordinario medendi. Illud ii, qui vel appropriato specifico, vel universalibus in- structi sunt; posterius ii, qui magneticè aut transplantatoriè morbos quosdam chronicos curare satagunt.

Quoad prius: qui appropriato specifico particulari vel universali instructi sunt, uti ci- tiùs curant ægros, ita quamplurimis remediis commodè superfedere possunt. Sic qui in- structus est appropriato remedio, superse- dere

dere potest omni venæ sectione, scarificatione, fonticulis, hirundinibus, & similibus, quia scit per remedium appropriatum radicem morbi curare: si verò subito evenit plethora apparens ex sanguinis orgalino, & appropriato remedio mox sedat effervescentiam, hinc non opus erit venesectione. Qui instructus appropriato particulari, vel generoso universalis, non opus habet purgantibus, malignis nempe & venenatis remediis; quin, quicquid heterogenei forsân in corpore collectum fuerit, per appropriatum remedium à secundante natura sponte eliminatur vel per urinam, vel per sudorem; unde etiam nobilia remedia insensibiliter operantur.

Sola ergo blanda Vomitoria requiruntur in tali casu: nempe Medicus instructus generosis remediis saltem peccantia in primis viis evacuat, vel opus erit interdum lenissimo abstergente primas vias.

Ut reformetur ergò & exaltetur Praxis, ad hæc duo respiciat Medicus; nempe

1. Theoriam magis exaltet, & promoveat per experientiam, & observationes.
2. Remedio, vel appropriato particulari, vel generoso universalis, sedulo incumbat.

Prius non est unius hominis nec seculi; ob id quilibet industriam adhibeat, ut communicatis pluribus observationibus Theoriam exaltet; posterius potest acquiri ab artifice sedulo, qui generosis remediis incumbit.

Hæc remedia sunt vel particularia, vel universalis. Particularia dicuntur specifica, & quæ præcisè hunc vel istum morbum levibus quibusdam præmissis solent curare: Universalis sunt, quæ quemcunque morbum tollere valent. His posterioribus insistendum est in specie, quia specifica subinde à natura ægrotum solent alterari. Multis exosum, paucis cognitum est nomen remedii universalis. Possè tamen dari, ut illustrem ex Praxi vulgari, consideremus saltem opium, quæcunque symptomata ex spirituum impetu sistens, sed saltem palliativè, & quia cum opio est adjuncta quædam virulentia narcotica: Sic de absinthio res nota est in febribus intermittentibus, cachexiis, hydrope, &c. Sal volatile urinæ seu spiritus salis ammoniaci in quamplurimis affectibus est optimus: De Marte res nota est, quod in chronicis morbis sit artifex; à Marte enim omnes acidulæ efficaciam habent, quæ in chronicis morbis curant eos, quos Medici ad acidulas ablegant: Notum est de Thermis, quod varios morbos curent. Si autem ritè evolveretur natura acidularum, forsân haberi posset tale remedium efficax. Par ratio hic est atque cum remedio Drebelliano, quo vim vitalem in aëre ita concentrat, ut homines quosdam sub aqua suffocatos curave-

rit; nec deest experientia: Vid. Poterius, qui multum præstitit suo specifico stomachico: aurum ejus diaphoreticum in affectibus nervorum & similibus fuit polychrestum. De Rulando notum est, quantum præstiterit beneficio aquæ terræ sanctæ, olei Heraclini, balsamini & similibus. Quæ habet Basilus de solo antimonio, notum est.

Quæritur ergo: an verum sit, quod dari possit Panacea? Affirm. Nempe remedium universale datur, modò huc non trahantur vitia, quæ nec ab ipsa natura sunt corrigibilia, verb.g. conformationis defectus, &c.

Quales verò sunt hæc panaceæ? Remedia sunt universalis, ea, quæ sunt valida & generosa, restaurantia vires naturæ, id est, quæ vitæ radicem conservant, & eam labefactam restitunt. Nempe omnes morbi vitæ insidiantur, unde remedia vitam & ejus radicis vim conservantia, consequenter quovis morbos curabunt.

Res ut pateat, notum est, vitæ radicem consistere in sanguine, ejusque debita crasi. Crasis hæc variat, vel essentialiter vel accidentaliter: Essentialiter ratione principii seminalis, unde vita in radice vel longa vel brevis erit, & dispositivè vel sana vel ægra: Accidentaliter variat ratione rerum externarum & digestionis primæ, ratione sex rerum non-naturalium plus minus labefactata. Seminalis vis vitalis consistit in ejusdem principio sulphureo, quod est humidum radicale seu acidum pingue, quod coagulat & specificat acidum in determinatum corpus. Quicquid ergo hoc sulphur factum rectumque conservare valet, potens erit totam naturam conservare & restaurare.

Mediatè seu indirectè hoc fit ratione digestionis primæ, seu fundamenti totius œconomiae vitalis. Remedium tale vix sperandum est ex regno vegetabili: Nam hujus simplicia, si non sunt venenata aut maligna, sunt alimentitia, & à stomacho nostro subigi solent; nec ex regno animali, cum nobis maximè sint coagnata, vel, si quæ sint, sunt saltem particularia. Ergo ex regno minerali investigandum erit. Hinc imprimis in sole, hinc antimonio, cujus sulphur ex parte naturæ est solaris; hinc ex Venere & vitriolo veneris, cujus sulphur in via est ad naturam solarem, quærunt talia remedia, & tandem in Marte, ejusque genuino sulphure. Hinc tantum tribuitur tincturæ antimonii genuinæ, vitriolo veneris, & ejus igni seu oleo, sive sulphuri ex Helmontio; Tinctura lili Paracelsi nota est; Mercurius diaphoreticus Paracelsi seu Helmontii est Mercurius fixatus à sulphure Veneris, propterea etiam, quia fixus est, & sulphure auri tinctus, vocatur ab Helmontio Aurum Horizontale. Cinnabaris antimonii particu-

particulare est remedium, sed quod multum habet in recessu in febribus malignis & nervorum affectibus; sulphur ex scoriiis antimonii singulari modo præcipitatum in epilepsia & morbis infantum est mirabile, partim vomitus, partim sudorem excitans.

Alterum, in quo Praxis solet variari, est cura sympathetica & transplantatoria.

Circa has tria sunt consideranda:

1. Quid per hæc nomina sit intelligendum?

2. An dentur?

3. Quodnam sit harum curarum fundamentum?

Cura sympathetica ita dicitur, quia fit quasi per consensum, ut in distans curetur morbus à remedio absente, ut tamen fiat certo quodam consensu, quem remedium fovet cum corpore ægro aut parte ægra. Transplantatoria vocatur, quando morbus transfertur in aliud subjectum vivum, vel vegetabile, vel animale.

Hæ Curæ fiunt medio intercedente tertio, mediante quo à corpore ægro separato in distans fiunt, & istud medium vocatur Magnes. Dicuntur alias Curæ Magneticae, quasi magnes ex corpore ægro morbum eliciat, vel quod alteratus similiter alteret ipsum morbum. Equidem multa prostant exempla huiusmodi curationum, quæ tamen non omnia sunt bonæ fidei.

Quod Curam sympatheticam in specie attinet; res nota est de pulvere sympathetico, ex vitriolo Veneris per calcinationem solis, sole in leone *versante*. Usus ejus notus est pro cura hæmorrhagiarum externarum, sive forma sicca vel humida, si dissoluto in aqua simplici immergatur linteam cruentum, & applicetur. In internis affectibus subinde utiliter usurpatur, speciatim hæmoptysi, mictu cruento, &c. Sic. D. Michaelis retulit, se aliquando gravem mictum cruentum cum exulceratione vesicæ curasse, ægro excrementa in dictum pulverem excernente: Cnæsselius excretis fecibus dysentericorum super caput mortuum vitrioli, dysenterias curavit. Notus etiam natus restitutus ex Taliacotio. Multum etiam facit observatio Bartholini *Centur. 1. Observ. 41*. qui observavit in quodam viro, cui cutis cum capillis fuit decisa, unde cutim istam asservavit in scrinio, ubi eodem modo atque pili in capite ejus in colore ita etiam isti pili in cute decisa resistentes etiam mutati fuerint. Facit huc exemplum de viro picâ laborante, quoties uxor fuit gravida, quod vitium etiam fuit in filium translatum. Quidam equis contusis vel compressis Persicariam recentem in aqua frigida maceratam imponunt, donec intepuerit, quo facto sepeliunt in locum, ubi potest facile putresce-

re. Idem effectus est in hominibus graviter contusis; Meysonerius de Pulvere sympathetico. Unde etiam ad odontalgiam, & curam vulnorum & ulcerum fuit traducta, ubi usus ejus repetendus est. De unguento magnetico simplici & armario res nota est. Mulieres lacte abundantes non melius habent, quàm ut emulgeant suum lac, vel in prunas candentes, vel laminam ferream candefactam. Sic res nota est de verrucis, quod curentur per affrictionem lardi recentis, quo putrefacto verrucæ evanescent: Vir hujus rei testis est Franciscus Baco de Verulamio in *Sylv. Sylvar. Cent. 10. Hist. 997*. Videatur etiam Helmontius Tractatu: Magnum Oportet. Pertinet huc manus cadaveris lento morbo interempti, quæ attractu curat excrescentias, quod Helmontius refert: Sic quædam puella in majori oculi cantho habuit excrescentiam fragiformem, quæ pueri mortui manum mortuam applicavit huic excrescentiæ, & inde curata, quamprimum infans mortuus putresceret. Hoc etiam testatur D. Boyle in Philosophia Experimentalis, ubi refert, observasse setaie exemplum, quod mediante tali contactu excrescentiæ fuerint curatæ. Facit huc exemplum in hac civitate, ubi quædam mulier, laborans doloribus chronicis crurum, post varia remedia frustra usurpata, tandem sensim levamen habuit per curam sympatheticam: nempe empiricus quidam in urina ejusdem decoxit ovum adduritiem, quod in minutissima frustra discidit, & denuo in ejus urina de novo blande ebullivit, & sepelivit in acervum fornicarum: Sic atrophiam curavit Hartmannus in Praxi Chymiatr. per ovum in urina ægri coctum, & in acervum fornicarum sepultum: Sic Medicus quidam Anglus seipsum ex atrophia curavit, teste Boyleo.

Transplantatoriæ Curæ fiunt, quando transplantantur morbi in aliud quoddam subjectum vivum, utut transplantati in animalia sint magis præsentaneæ curæ, quàm in vegetabilia. Et quidem transplantantur solum in specie morbi chronici, & qui firmas radices egerunt in corpore ægri.

Ad huiusmodi curationes pertinet, quando vel per immediatum contactum ægri cum corpore animalis, vel mediato alio, curatur. Immediatè fit v.g. quod refert Riverius, se vidisse bis curatam paronychiam immisso digito in aurem felis, morbo in selem transplantato: vid. Riverius *Cent. 4. Obs. 19. & 63*. De catellis podagricos & colicos dolores mitigantibus, & eos dolores, sanatis ægris, sibi contrahentibus, vid. Bartholinus *Cent. 3. Hist. 66. Cent. 6. Hist. 53*. Icterus à se refert Petrus à Castro in M. S. curatum, dum ex urina ægri cum farina placentas fecit, & blandè exsiccatas obtulit feli vel cani esurienti, ictero

istero sublato: Similem historiam refert Boyle *c. l.* Sic podagra curatur, quando ungues & capilli in salicem vel radicem juglandis fodiuntur, vid. Timaus von Gildentlee / *in lib. 5. Epistol. 7. & 8.* Sic podagra curata est in hortulano Electorissæ Saxonæ, qui accepit caseos & butyrum, recentia nondum salita, & applicavit pedibus dolentibus, à quibus sensim levamen percepit; caseos abiecit, quos comedit canis, qui brevi post eodem laboravit. Idem Laurentius præstitit sanguine agri in radicem juglandis immisso. Sic odontalgia transplantari potest in sambucum vel corylum, nempe ramus insignis transversim discindatur, & colligatur ex eo festuca, quæ fricandæ & nonnihil lædendæ sunt gingivæ, ut sanguis stillet, illa festuca immitti solet in locum coryli, ex quo fuit desumpta, & loco iterum ligato, ut possit concreescere festuca cum reliquo trunco, curatur. Sic certum est de quodam, qui laboravit febre intermittente supra sex septimanas, qui accepit carnis suillæ libram unam, & maceravit in urina propria, aliquot horas ante paroxysmos emissâ, coxit, & projecit cani esurienti, fecit hoc ter, unde febris evanuit. Biennii spatio nova ingruit febris, quæ remedio hoc iterato iterum curata est.

Quoad scrutinium causarum, variant sententiæ. Quidam easdem ceu veras considerant, & nunc admirantur, nunc scrutantur. Alii easdem rejiciunt, & ubi experimentis sunt convicti, ad dæmonis opem confugiunt. Alii verò, qui rationibus has curas volunt impugnare, ut Helmontius, in hoc peccant, quod ad tribunal suæ rationis hujusmodi curas examinent, & ex præconcepta hypothese easdem malè rejiciant; multa enim latent in natura recondita, quæ non scimus, & multa, quæ scimus, sed quorum causæ latent.

Potius ergo cum sint curæ hæ confirmatæ, earum scrutinium sagaciùs instituendum est. Quod autem hujusmodi curationes sedantur suspectæ, est hoc, quod sint raræ, & non semper succedant. Quoad prius; pauci eas sciunt administrare, & à plurimis rejiciuntur; quoad posterius, hujusmodi curationibus commune cum quibusdam, etiam optimis, remediis particularibus est, quæ non in omnibus succedunt, propter idiosyncrasie diversitatem. Ratio, inter alias primaria est hæc, quod subinde lateant adhuc quædam circumstantiæ, vel ratione temporis, vel modi, vel aliarum circumstantiarum, modò

crebro instituerebuntur, ut collatis pluribus experimentis redderentur certiores, forsân magis certæ forent. Observetur autem, quod fundamentum curationum sympatheticarum & transplantatarum ferè in eo consistat, quod omnia corporis humani excreta semper participant aliquid vitale seu de spiritu vitali, nunc insito nunc influo, ratione cujus, quamdiu perstat ista spirituum vitalium portio, tam diu habent commercium ista excrementa cum ipso corpore, unde prout citiùs vel tardiùs evanescit, aut corrumpitur iste spiritus vitalis, eò diutiùs & tardiùs solet durare iste consensus excreti cum integro corpore.

Jam verò, ut diutiùs conserventur istæ portiones spirituum vitalium, necesse est habeatur medium conservans, quod vocatur Magnes.

Magnetes hi sunt in quadruplici differentia, nempe intersunt

I. Excreta alvi, de quorum præparatione ex Paracelsò videri potest Tenzelius *in Medicina diastatica.*

II. Est caro humana siccata, quæ regioni cordis applicanda venit, ut acquirat vim magneticam: imprimis convenit caro ex corpore violenter interempto assumpta.

III. Est ipse sanguis ex homine sano desumptus, qui grumefactus potest ita præparari, ut decantetur serum supernatans; grumus verò in umbra exsiccatus humectatur tamdiu, donec serum imbibitum.

IV. Si sumatur urina, sudor, sive excreta alvi, eaque omnia præparata misceantur & usurpentur.

De his optimè scripsit Samuel Boulton. Hæc spiritus vitalis portio in hoc casu vocatur Mumia vitalis, sive Mumia spiritualis microcosmi.

Istæ ergo Mumia est medium, quo peragitur hujusmodi cura magnetica, ut quamdiu hæc mumia à toto separata conservatur in suo vigore, & alteratur eo modo, quo extra corpus alteratur, etiam totum spirituum systema in corpore alterari solet, & effectus vel ad sanitatem, vel alios, exercere solet.

Unicum subest dubium; quâ ratione nempe fiat in distans actio & reactio? seu quo medio communicetur mumia vitalis extra corpus alterata cum mumia vitali in corpore residuo? quod etiam in medio relinquitur.

Tamen qui curiosi sunt, possunt videre imprimis Theatrum Sympatheticum. Conferatur cum his Joannes Marcus Marci *in Philosophia Veterum restituta*, & Meyssonnierius.

FINIS COLLEGII MEDICO - CHIRURGICI.

MICHAELIS ETTMULLERI

Philosophiæ & Medicinæ Doctoris,

DISPUTATIO

DE FERMENTATIONE.

§. 1.



Ermentatio est minutarum particularum, corpus mistum constituentium, motus intestinalis, ortus à mutua salium, alcali & acidi, in unoquoque misto existentium, sed resolutorum in se invicem actione, quâ omnes reliquæ mistum componentes particulae variè inter se invicem exagitantur, & permiscuntur, usque dum sequatur aut ultima misti resolutio, aut nova ejusdem alteratio, à salium nova unione aut saltem contemperatione dependens.

§. 2. Subjectum Fermentationis est corpus mistum, hoc est, cujus minutæ particulae, ex quibus proximè constat, & in quas proximè est divisibile, sunt diversæ naturæ. Quæ naturarum diversitas à solius magnitudinis, positionis, quoad levitatem & gravitatem, compositionis vel motus & texturæ, aliarumque hujusmodi circumstantiarum ratione, dependet.

§. 3. Causa Fermentationis proxima seu id, quod motum istum in particulis componentibus incipit sunt salia illa duo, acidum & alcali, & hoc tam volatile in operibus naturæ, quam fixum in operibus artis: Hæc duo enim generalia salia in omni existunt corpore naturali, & unum sine altero in rerum natura reperibile non est, variatâ nihilominus admodum proportionem.

§. 4. Sub alcali autem & sub acidi nomine innumerabilis salium diversitas & varietas comprehenditur, cum tam urinosa, quam acida innumerabiliter inter se differant, unde & variis modis inter se mutuo uniri & combinari possunt, indeque variæ saporum operationumque differentiarum deducendæ sunt. Indeque & falsum, ex acidi & alcali concursu obortum, multis modis variat, de quibus videatur Tachenius in Hipp. chym. & Clave Med. Hippocrat.

§. 5. Hæc salia autem, ubi debito modo vel inter se vel cum aliis juncta sunt, ne alterum nimis excedat alterum, aut ab aliis rebus contemperata, ne propter interjectum quasi medium in se invicem agere queant, quieta existunt, corpusque in eodem permanet statu.

§. 6. Quod si verò salia hæc non debito modo juncta sunt, sed disjunguntur, vel cum non debitam ad se invicem obtinent

proportionem, vel non legitimè ab aliis admixtistemperantur, immediate tunc in se invicem agunt: acidum rodit alcali, & alcali propellit acidum, unum agit contra alterum, aguntque & patiuntur mutuò, hinc mistionis solvitur vinculum, ab hisce salibus potissimum dependens, & reliquæ componentes particulae sui juris factæ, uti non semper in omnibus concordant, ita à salibus eorumque motu variè agitata, mota & commota, confusa & perturbata, debitoque, quem ante obtinebant, situ locata, hanc intestinam motionem, à salibus inchoatam, masculè promovenent augentque, & ita Fermentationis motum efficiunt.

§. 7. Confirmatur hoc exinde:

1. Quia fermentescencia omnia his duobus salibus copiosè sunt instructa, & quæ his duobus constant salibus, facillimè fermentantur, v. g. mel, saccharum, succi florum, plantarum, fructuum maturorum, urina, mustum, cerevisia, &c. alia verò corpora his destituta minimè.

2. Mutationes rei per fermentationem factæ, ut sunt in colore, sapore, consistentia, separatione partium, &c. optimè de his salibus, variaque eorum conjunctione, tum inter se, tum cum aliis, contemperatione deducuntur.

3. Affinitas Fermentationis cum Effervescencia manu nos ducit ad salium horum considerationem; cum Effervescencia accelerata videatur fermentatio. Effervescencia verò sæpissimè, licet non semper, ab acidi & alcali concursu oritur: v. g. spiritus nitri limaturæ ferri affusus, facit effervescenciam. Idem spiritus butyro antimonii affusus, etiam effervescit, cum tamen sint duo acida: Ejusmodi tamen exempla sunt rarissima. Distinguenda est Ebullitio, quæ tantum fit in aquosis & oleosis, à Fermentatione & Effervescencia.

4. Prout salia nunc plus nunc minus sunt proportionata, & ab aliis contemperata, eò nunc magis promovetur, nunc impeditur Fermentatio. Nam fit interdum Fermentatio, dum salia hæc sunt improporcionata, & alterum assurgit erga alterum, ut in vino & cerevisia acescentibus. In illis enim fermentationem impedimus, dum contemperare studemus; in his verò, dum æqualem proportionem observamus: v. g. in vino, sunt salia, quæ contemperata sunt ab aliis particulis admix-

admixtis: quod si verò vino addatur tartarus, vel fex cerevisiæ, quibus salia fiunt aciora, habemus fermentationem. Item si cerevisiæ aciescenti, ob inæqualem proportionem acidi & alcali, injiciatur creta, vel lapilli cancrorum, augetur alcali, fitque proportionatum acido, unde tollitur aciescentia.

5. Omnia ea, quæ fermentorum loco adjiciuntur, ac fermenti vices subeunt, in transmutanda re per fermentationem, ac in renovanda deficiente fermentatione, agunt, quatenus unum horum salium in iis excellit, unde simile exsuscitatur: contrarium verò subigitur in re fermentanda, vel quatenus iis ambobus egregiè pollent, unde in re fermentanda hæc salia antea quæta, de novo, ob acquisitas suppetias, partes reliquas, à quibus contemperabantur, superant, & actiones mutuas renovant: v.g. acetum vino infusum concitat fermentationem, unde vinum mutatur in acetum; Calx viva musto adjecta, ejus fermentationem promovet.

6. Omnia ea, quæ fermentationem proximè impediunt, hoc agunt, quatenus horum ejusmodi salium vim & in se mutuam actionem infringunt ac tollunt, sal excedens absumendo, vel deficiens restituendo, ex iis ambobus se permiscendo, & ea ita temperando: v.g. creta absorbet acidum, & impedit cerevisiæ aciescentiam: copia lactis vino injecta hujus effervescientiam impedit, salia dicta temperando.

§. 8. Effervescencia & Fermentatio à multis confunduntur; imò nimis rigidè, tanquam longè diversa, distinguuntur. Re verà sunt una eademque res, diversus saltem salium status & concipiendi modus est, quæ nunc sunt pura, h. e. sola, sine alterius corporis additione, aquæ tamen beneficio conjuncta & confusa, nunc verò sunt impura, hoc est, sociata aliis particulis, corpora mista componentibus: Si prius, habeo effervescientiam; si posterius, habeo fermentationem: In primo salia sunt libera, unde cum impetu validè dimicant; in secundo sunt impedita, unde remissius agunt, hinc in primo citius, in secundo tardius, suum absolunt opus; in primo unita firmiter requiescunt, in secundo verò varie se habent, dum cum aliis particulis se unientes, vel laxè tantum, modò se invicem contingunt, vel cum aliis firmitus concrescunt, prout alia atque alia salium, tum inter se, tum cum admixtis, est proportio. Nam in effervescencia strictè sic dicta uniuntur particule salinæ, ob nullius alius interventum; in fermentatione verò laxius ob aliarum particularum internexionem, unde effervescencia per se amplius effervescunt, fermentata verò denuò fermentant. Hinc videmus, quod quò magis mista

Tom. II. Pars 2.

sunt corpora, h. e. quò magis salia sunt contemperata, & ita impedita, eò magis fermentant; quò verò minus sunt mista, & salia ita sunt liberiora & puriora, eò magis effervescunt.

§. 9. Cause Occasionales Fermentationis sunt omnia ea, quæ quocunque modo salium mutuam proportionem tollere, alterum augendo, alterum verò imminuendo, vel quocunque modo mitionem particularum auferre, easque invicem à se separare possunt; unde salia aliorum consortio & contemperazione liberata, à se invicem distracta, de novo agere atque reagere incipiunt, hoc est fermentare. Distinguenda autem causa occasionalis Helmontii à vulgari: Ille enim causam occasionalem omnium ponit in humoribus; vulgò verò eadem est cum procatactica seu remotissima.

§. 10. Requisita ad Fermentationem necessaria sunt tria:

1. Humidum debitum vel liquor, qui resolvat mistum; salia enim nisi resoluta non agunt in se, nec operantur: deinde humidum locum idoneum prabet, in quo motum suum exercere valent misti particule. Sit autem debitum, & ratione quantitatis & qualitatis, vid. Kergerus de Fermentat. pag. 70.

2. Spatium liberum. Omnia enim dum fermentant, ob motum inter se invicem concitatum, & liberam particularum à se invicem separationem, multum expanduntur ac dilatantur, unde denegato spatio denegatur & motus, & per consequens etiam fermentatio.

3. Particularum corporum fermentescientium aut diminutio in minimas, si sit siccum; aut confusio, vellaxior unio, si sit humidum: v.g. fermentum in farinam contritum, & mustum crassiusculè inspissatum non fermentat. Dum enim salia nimis sunt unita, in se invicem agere, aliorumque consortio se extricare nequeunt. Præterea quoque, si firmiter remanerent misti particule unitæ, impossibile ipsis esset, se movere.

§. 11. Cause interadjuvantes sunt tres:

1. Fermentum: non quidem tam propriè dictum pistorum fermentum, sed omne id hoc loco intelligitur, quod alicui rei permixtum, cum incidendo, resolvendo & penetrando, in fermentationem movet; estque semper naturæ salinæ, nunc de natura alcali, ut dum lupulus cerevisiæ additur, dum aromata & sinapi cum saccharo permiscuntur, quibus eorum promovetur fermentatio; & ipsa vini florecentis effluvia odorata, quæ vinum de novo fermentant, sunt de natura salis volatilis; nunc de natura acidi, ut fermentum pistorum; nunc de utroque, & hæc efficacissimè fermentationem promovent, ut feces cerevisiæ, mel, saliva hominis jejunii, &c.

[L] 2

2. Ca-

2. Calor moderatus: Hujus enim natura est attenuare & resolvere, humidaque laxare, & dilatare, quæ frigus è contra adstringit; hinc promovendo motum, fermentationem promovet. Observatur interim, quod fermentescencia & ipsa ingentem calorem concipiant, ex insigni motu particularum oriundum, quæ fermentatio, ut magis magisque promovetur, ita & calor internus tantò magis excitatur & augetur.

3. Est motus externus: Hic enim agitando particulas, mutuum salium, tum inter se, tum cum aliis concursum, promovet, sicque multum ad fermentationem contribuit.

§. 12. Effectus Fermentationis est vel essentialis, vel accidentalis. Essentialis est vel frequentior vel intermedius, vel rarior & ultimus. Ille est misti insignis alteratio: Hic est misti ultima in suas particulas componentes omnimoda resolutio. Alteratio misti, quæ vere fermentationis est ordinarius effectus, contingit tum ob novam salium inter se, & cum aliis particulis mistum componentibus unionem ac contemperationem, tum ob partium non miscibilium exclusionem. Quæ partes non sunt miscibiles aut ratione ponderis, unde leviores avolant, graviores ad fundum præcipitantur; aut quod frequentius est, ratione figuræ. Ur hic effectus melius intelligatur, notandum: quod salia ob id in se invicem agant, ut se uniant, quod nunc faciunt immediatè, si sunt sola, ut in effervescentia; nunc mediatè, si aliis nempe sunt sociata, ut in fermentatione. Ex qua nova unionem ingens misti sequitur alteratio in colore, sapore, consistentia, & aliis proprietatibus; ita ut nulla ferè in rerum natura peragatur alteratio, neque generatio aut corruptio, ubi non intercedat fermentatio. Exemplum ultimæ fermentationis videmus in musto, ex quo per fermentationem alterato fit vinum & tartarus; vinum dum denuò fermentat, alteratur & degenerat in acetum per novam texturam, quatenus acidum obtundit & figit sal volatile, sic fructus maturescunt per fermentationem & semina per eandem germinant. Est ergò rerum quarundam separatio accidens quoddam necessariò consequens fermentationem, non verò primarius aut essentialis ejus effectus.

§. 13. Ultima misti resolutio rarior, & ultimus denique fermentationis effectus est, ad quem ferè non, nisi per iteratas fermentationes est accessus. Quoties namque contingit fermentatio, toties fit nova salium unio, partium volatilium avolatio, gravium verò vel crassarum præcipitatio, vel alio modo non miscibilium ad fundum exclusio: unde sensim sensimque salia arctius se uniant, aliis particulis relictis, donec tandem vel uno sale domi-

nante, altero oppresso; vel ambobus arctè inter se invicem unitis, ut à volatilitate sua evaporent, ac sub forma falsi remaneant, sicque aliarum partium consortium relinquunt, unde vinculum misionis à salibus oriundum tandem dissolvitur, & mistum in componentes se immediatè particulas tandem dirimitur, id quod Putredo vocatur. Unde acetum, cum ulterius fermentat, abit in situm, in Schimmel/ Kaan/ quod est reverà germinatio seu vegetatio quædam, beneficio microscopii jucundè oculis se sistens. Post situm fatiscit mistum, i. e. salia postmodum destructa sunt, & particulae situs non amplius sufficientes sunt ad constitutionem novi misti, adeoque in novum Esse fatiscences, abeunt in aquam. Plura qui cupit de Fermentatione, videat Kergerum, Willisium, Schookium de Fermentatione agentes, quorum hypotheses erroneæ facillè corrigi possunt.

§. 14. Unica est differentia fermentationis præ aliis notatu digna, dum fermentatio nunc est occulta, nunc manifesta. Hæc magno labore multoque strepitu peragitur; illa non nisi pedetentim suas exserit vires: Hæc salium admodum efferatorum vim sequitur; illa salium temperatorum: Hæc in artificialibus; illa in naturalibus est obvia v. gr. in fructibus maturescantibus, in fermentatione plantarum, & est fermentatio occulta: sed fermentatio musti vel panis, est manifesta.

§. 15. Fermentationes corporis humani dum naturaliter sunt constitutæ, blandè placidèque omninò peraguntur. Sunt enim in corpore humano omninò temperata, & salia aliis particulis debitis mista, sine tumultu & strepitu fermentationes obeuntia. Præternaturales autem fermentationes sunt vel nimis auctæ & impetuosæ, ut in febribus, diarrhœis, phreneticis, &c. ob salium effervescentium vim, impetuosamque potiùs effervescentiam, quam fermentationem; vel minus imminutæ & placidæ, ut in cachexia, morbo virgineo, apopleia, &c. ubi salia impedita, & ab aliis particulis quasi obruta, debito modo concurrere, & fermentationem cingere non valent.

§. 16. Fermentationes non rarò aut inchoantur, aut augmentantur per fermenta, quæ hanc vim obtinent, quatenus unum alterumve salium in iis excellit. Dumque per fermentationem & fermenta insignes admodum alterationes in rerum natura produci diximus, non est mirandum, quod fermenta licet mole minima; in alterandis tamen rebus, & immutandis corporibus naturalibus, potentiæ adeò sint eximie, ut sæpè vel occultum quoddam miasma in aëre volitans integram vini cellam perturbare valeat, & parva salivæ guttula ingentem farinæ & cerevisiæ novellæ


novellæ copiam fermentet. Inde namque miasmatum morbosorum & venenatorum potentia, dum fermentando in corpore nostro operantur, deducenda venit. Sunt namque, quod bene notandum, fermenta omnia sui multiplicativa, quæ se in materia prædisposita admodum multiplicant, eamque

in suam naturam transmutant. Nam sicut parvum fermenti pistorii frustrum ingentem farinæ massam in sui naturam transmutat & alterat, ita & morbillorum & variolarum, pestis vel luis Veneræ miasma totam massam sanguineam alterare & depravare potest.

MICHAELIS ETTMULLERI,
Philosophiæ & Medicinæ DOCTORIS,
DISSERTATIO

DE

CHIRURGIA TRANSFUSORIA.
CAPUT PRIMUM
HISTORICUM,
ORTUM, INVENTIONIS OCCASIONEM, PROGRESSUM
& EXPERIMENTA TRANSFUSIONIS
Exhibens.



Notum est, inter nova hujus seculi inventa ferè primaria recensendam esse circulationem sanguinis, cui occasionem dedit inventio valvularum seu ostiolorum in venis, præsertim artuum majoribus. Primus valvularum illarum inventor fuit ineunte anno 1579. Guilielmus Fabricius ab Aquapendente, Professor Patavinus, post quem brevi primus Salomo Albertus Wittebergæ per *autopsias* confirmavit. Horum consideratione factum dein est, ut postmodum ratiocinando de sanguinis motu mirabili Paulus Sarpæ, Frater seu Monachus Venetus, Aquapendentis familiarissimus, conjecturare primus incepit. E contra Guilielmus Harvæus, Anglus, primitus sibi inventionem sanguinis circulationis tribuit, asserens, Paulum Sarpam omnia ab ipso hausisse, & omnino fatendum, Harvæum primum fuisse, qui experimentando negotium hoc manifestavit; Sarpam verò, quod ratiocinando ejusdem vestigia nobis exhibuit; quos infecutus Walæus.

Quæri hic posset: an Veteribus motus sanguinis circularis fuerit cognitus? Resp. Omnino; nam reverà inventum est divinum, ab ipso Spiritu S. Salomoni Regum sapientissimo, inspiratum: *Eccl. XII. v. 6.* reperiuntur vestigia, Salomonem cognitionem habuisse circulationis hujus: Videatur Schneiderus *l. 3. Catarrh. c. 2.* & Joh. Schmidius in Descriptione Senectutis Regis Salomonis, ubi hoc ipsum probat. De Sinensibus dubium est, an sciverint? licet sint, qui id affirmare conentur: videatur Cleyerus, Medicus Ba-

tavus, in Epist. ad Simon. Pauli, quæ reperitur in Bartholini Actis Medic. Hassniens. *volum. 4. obs. 1. p. 4.* Verba ejus hæc sunt: *Unicam saltem rem magnæ molis, quam vix mente complecti possum, nedum facultate consequi, mirari licet, Medicis Sinensibus tot retro seculis (ultra 4000. annorum) usum circulationis sanguinis intuituisse præ Europæis, & quod caput rei est, σφαλαιων infallibilem ex pulsuum tactu, eorumque diversis ictibus exercere, morbi statum & declinationem exinde discutientes, &c.* Superiori anno de Medicina Chinesium ex pulsibus non nemo scripsit, quod tam futile scriptum est, ut mirer, quod expressum existeret. Sicut autem facile est, inventis aliquid addere; quin & luce incensa vel tantilla, plura quæ in occulto latent, manifesta fiunt; ita occasione circulationis sanguinis cogitatum fuit de remediis communicandi sanguinem immediatè; hinc Chirurgia itaque Infusoria inventa fuit. Primi, qui hanc ipsam exercere, fuerunt Angli, & inter eos primus Autor dicitur Wren, Theol. & Mathematicus in Acad. Oxoniensi P. P. insignis, Regiæ Societatis socius, qui an. 1657. primitus erga Illustrem Boyleum hujus rei mentionem fecit: Vid. Act. Societ. Reg. Angl. *Vol. 1. p. 96.* Deinde Joh. Daniel Major, Medicinæ Doctor & Anat. & Botanic. P. P. in Acad. Kiloniensi, vir perquàm eruditus, perquàm etiam vagus, meditando ad hujusmodi infusionem liquoris medicamentosi tandem devenit. Hinc anno 1664. Prodromum edidit de hac Infusoria Chirurgia.

[L] 3

Expe-

Experimenta varia Chirurgiæ hujus primo in brutis instituta fuerunt:

1. Cani infuderunt extracti liquidi opii ad $\mathfrak{z}\text{i}$, qui post mediam horam stupidus & torpidus factus, adeo dormire incepit, ut licet acicula per linguam exertam trans adigeretur, vix tamen sentiret, & cum biduum unamque noctem dormiendo consumpsisset, reconvaluit.

2. Cani infuderunt grana xvj. croci metallorum in $\mathfrak{z}\text{i}$. Infusi non filtrati, hinc aliquot vomitus consecuti, altero manè verò mors.

3. In aliis molossi arteriam infusum croci metallorum pauca quantitate immisum, nihil damni invexit; cum verò dosis ad $\mathfrak{z}\text{ij}$ aucta fuisset, & animam, & simul omnia, evomuit.

4. Hinc plura quoque facta fuerunt experimenta cum acidis: sed observatum fuit, acida coagulando sanguinem statim mortem intulisse; è contra verò urinosa injecta, v.g. oleum tartari, sanguinem floridum & rubicundum reddidisse.

5. Decoctum arsenici in aqua communi ad $\mathfrak{z}\text{i}$ infusum cani necem intulit.

6. Sic ipse experimenti gratiâ $\mathfrak{z}\beta$ Mercurii sublimati in aqua simplic. soluti in venam cruralem canis majoris injeci, qui paulò post exspiravit.

7. Cani aliquando aliquot Unciæ nitri cum aqua communi infusæ fuerunt, absque ulla alteratione.

Notabile est, quod, si cani per venam jugularem halitus infletur, moriatur: quod si verò per receptaculum commune infletur, iterum ad se redeat, & quasi reviviscat.

Progressum fuit ulterius, & quid humano valeat in corpore novum hocce inventum? similiter tentatum fuit. Sic præter alios D. FABRICIUS, Medicus Dantiscanus, militi lue Venereâ inveteratâ cum ulceribus in tibiis, tumore brachii dextri doloribus capitis horrendis, cum gummatibus seu nodis in ossibus laboranti, resinæ scammon gr. vij. dissolutæ in Essentia Guajaci ad $\mathfrak{z}\text{ij}$. infundere curavit optimo cum successu; omnibus enim his affectibus vomitus supervenit, & dein secessus.

Chirurgia hæc Infusoria est quasi mater, quæ peperit filiam, scilicet Transfusoriam, qua per venas sanguis alterius hominis aut bruti corpori humano immittitur, & locum illius occupat, qui à morbo consumptus, vel venæsectione largiore eductus erat. Primi Autores fuerunt Angli, D. Timotheus Clark, Regius Medicus, ut & Nob. Henshaus anno 1657. de sanguine infundendo & transfundendo fuerunt solliciti, donec anno 1665. sub finem Febr. D. Lowerus de Corde cap. 4. pag. 184. primitus in cane instituisset experi-

mentum. Mox in Galliis eadem Transfusoria tentata fuit, & in brutis & in hominibus; hinc bellum literarium inter Gallos & Anglos ortum, qui reverà primi dicantur Autores. Sed verum est, quod prima laus debeat Anglis respectu brutorum; non tamen negandum est, Gallos primitus tentasse in hominibus. Conf. Merclinus de Ortu & Occasu Transfus. sangu. Lamzwerde Tab. xi. & xii. Append. ad Scultet. p. 29. & 55.

Videntur proflare vestigia in Veteribus de Transfusoria hac Chirurgia. Nihil dicam de Marsilio Ficino, qui suasor existit, ut senex sanguinem arteriæ sectæ juvenis exsugât. Consilium sane crudum, sed proficuum. Sic quoque Johannes Colle, Italus Florentinus, edidit Tractatum de Inventione Remediorum novorum, jucundorum & tutorum, Auctorque fuit, ut fiat translatio sanguinis ex juvene in senem. Libavius, vir scribendo prolixus, sed insignis scoticus & scepticus, in Apendice facit singularis hujus inventi mentionem, sed addit tamen hanc epictisin: *Dentur puero jussula roborantia; Medico verò elleborus.* Mauritius Hoffmannus, Med. Doctor, & P. P. Anatomices & Botanic. Altdorfinus, mihi Altdorffum transeunti retulit, se publicè & privatim docuisse, quomodo in Melancholicis, Epilepticis, &c. sanguis ex juvene florido in ægrum immittendus sit: sicut & D. Major suprâ laudatus brevi post Infusoriam edidit librum, cui Titulus est: *Delitiæ Hybernæ.* Ex his patet per transfusionem sanguinis significari, sanguinis unius animalis in alterius animalis vasa sanguiflua per intermediòs canales derivationem, pro usu Therapeutico vel diætetico.

Differentia Transfusionis hujus est triplex: vel fit ex bruto in brutum experimentandi gratiâ; vel ex bruto in hominem, vel ex homine in hominem, medicandi gratiâ.

Modus varius est: Quisque enim ferè suum habet peculiarem modum. Alius est Loweri; sed qui non placet, ob sanguinis motum & impulsum per canales nimis longos refractum, indeque illius facilem coagulationem. Mihi placet Dionysii & Gallorum modus, quem Parisiis vidi. Vasa ex quibus fit transfusio, in genere sunt venæ & arteriæ: locus verò, ubi ex istis vasis fieri solent Transfusiones, sunt vel in brutis cruralia vel jugularia vasa, in hominibus brachialia. Optimus modus est, si ex bruto in brutum instituat Transfusio, ut ex arteria crurali aperta, vel, quod periculosius, ex arteria carotide fiat in venam cruralem vel jugularem bruti.

Ex vena in venam, v.g. jugulares, commendat Edmundus King in Act. Anglican. pag. 361. ex bruto verò in hominem, si vena cruralis vel jugularis bruti aperiatur, & in homi-

homine in medianam fiat transfusio. Quod si ex homine in hominem instituenda, eligitur pro arteria emittente illa in brachio; pro vena recipiente etiam in brachio; presentanei enim magis effectus & usus præstantioris videtur, si ex arteria in venam fiat transfusio, ob arteriosi sanguinis à venoso, in consistentia, motu, spirituositate, tardiore congruescentia, differentiam.

Finis seu scopus est vel generalis, vitæ prolongatio in senibus, & hinc morborum curatio, vel specialis sanguinis vitiosi correctio, ejusque deficientis matura restitutio, hinc in specie ad deliria Melancholica corrigenda & tabem curandam, scorbutum eradicandum, arthritidem mitigandam, epilepsiam removendam, scabiem & lepram tollendam, virium defectum restituendum, tam in juvenibus per morbos exhaustis, quàm senibus jam deficientibus, ad mores per temperamentum alteratum corrigendos, ad inimicos conciliandos, ad calculi genesin ex sanguine falso tartareo inhibendam, Chirurgia hæc adhibetur.

Rationes, quæ suadent eam, sunt sequens:

1. Desumitur ex consideratione foetus in utero, sicut mater nutrit foetum, immediate transfundendo sanguinem suum in ipsum, & vitam ejus conservando, quidni ergo in adultis id etiam fieri possit?

2. Ex compendiosissima nutriendi & sustentandi animalia via. Considerentur enim tam ambages ciborum, eorumque mora, antequam ad sanguinem deferantur, quàm variorum, quas patiuntur alterationes.

3. Ex eo, quod certum sit, sanguinem esse radicem vitæ, & simul vel agræ vel sanæ. Unde sanguine cacochymo existente, maxima exinde oriuntur mala; eodem verò euchymo floridus status ermerget. Qua ratione verò corrigi melius potest, quàm per sanguinem? per alium enim sanguinem hoc correcto malum evanescit.

4. Ex eo, quod subinde gravia patiuntur mala, qui sanguinis defectu laborant: v.g. si quis in dysenteria vel hæmorrhagia uteri multum emisit sanguinis, duplex huic imminet malum, periculum scilicet vitæ, periculumque cachexiæ, & hydropis. Ergo tutius ac citius refarciatur sanguinis insignior defectus, & malum præcaveatur, nil consultius est, quàm ut locomali bonus infundatur sanguis.

5. Ab analogia, nimirum ab insitione plantarum in plantas, quæ eo melius germinare deprehenduntur. Vid. Acta Anglic. pag. 295. & Lamzweerde *l. all.*

Hæ sunt rationes, quas Galli urgent: sed cum omnis ratio sine experimento sit nulla & cæca; & contra experientia sine ratione sit temeraria; præmissis rationibus ad experi-

menta transfusoriæ jam paratæ accedimus:

Quorum

I. Factum est ex cane in canem. Dionysius, Medicus Gallus, Mathematicus, & Philosophiæ addictissimus Professor; more Gallorum levis, & judicii præcipitis, primus omnium recepit duos Canes diversi sexus, extraxitque ex mare 3ix, donec languesceret: hinc idem cani foemina totidem indidit, nullâ tamen alteratione subsequente.

II. Lowerus canem minorem accepit, ipsique omnem ferè detraxit sanguinem; ex molosso verò sanguinem in huncce minorem transfudit, & tantum quidem sanguinis, donec molossus moreretur, minor verò optimè se haberet.

III. Graffius Cani itidem detraxit sanguinem ad instantis mortis indicia: sed cum alterius sanguinem huic intillasset, revivixit. Experimentans autem Graffius, an lac, si cani, cui sanguis detractus, infundatur, in sanguinem mutetur? expertus est mortem subsequi.

IV. Dominus Gayani, Chirurgus Celebrerrimus, meus tunc temporis Parisiis hospes, 3xviii. sanguinis cani detraxit, eidemque totidem ex alio instillavit, qui verò post quinque dies mortuus est: vid. Acta Societ. Reg. Anglican. pag. 420.

V. Sic quoque sanguinis Transfusio facta est ex cane in venas canis vetuli, & quidem ex crurali arteria bono cum successu, nam duabus post Transfusionem horis iterum saliebat & exultabat; cumque senium ipsi oculorum aciem hebetasset, & ferè ademisset, & vix antehanc operationem se movere potuisset, optimè convaluit: vid. *l. a. pag.* 385.

VI. D. Coxe, Anglus, ex cane vetulo scabioso in alium sanum fecit Transfusionem, ex vena jugulari illius in venam jugularem hujus, ab 3xjv. ad 3xvj. præter propter, hinc factum, ut scabiosus sanaretur, canisque alter, qui scabiosi sanguinem receperat, nihil exinde mali passus fuerit: Vid. *l. a. p.* 363.

VII. Bononiæ in Italia facta est Transfusio ex agni arteria carotide in venam jugularem alterius agni, ex quo antea tantum sanguinis exhaustum fuerat, quantum ex agno ejusdem magnitudinis Dominus Cassini suppleri posse speravit; adeò ut, peractâ Operatione, agnus recipiens sine ullo indicio infirmitatis circumambulaverit, & secutus fuerit eos, qui operationem fecerant, & postmodum vixerit, accreverit, &c. vid. locus allegatus pag. 705. Exempla hæc antecedentia fuerunt inter bruta speciei ejusdem: nunc sequuntur exempla inter bruta speciei diversæ.

VIII. Transfusio ex vitulo in ovem facta à Domino King: Hic enim ovi ex vena jugulari

gulari $\text{℥} \text{xlj}$. sanguinis emisit, postmodumque ex jugulari vituli tantundem immisit: sed ovis dimissa ambulavit, & tantum virium habens, quantum antea habuerat, pabulum quaesivit: Vid. *Act. Societ. Reg. Anglic. pag. 361.*

IX. Ovi ex jugulari vena $\text{℥} \text{xlv}$. sanguinis fuerunt detracta, ita ut maxime debilis redderetur; ex vena verò jugulari vituli tantundem præter propter immisum fuit, hinc ovis alacris admodum factus, cum vidisset penes se canem, magno impetu ter quaterque cum feriit, neque reliquum fuit vestigium eorum, quæ in experimento passa fuerat, vixitque pancreaticè.

X. Doctor Dionysius, Gallus, ex tribus vitulis in tres Canes transfudit sanguinem: sed hæc animalia recipientia optimè valuerunt, & uni istorum trium canum die præcedente tantum sanguinis fuit extractum, ut vix sese potuerit movere, sed recepto postmodum ejus diei à vitulo totidem sanguinis, in momento vegetus factus iterum est: Vid. *l.c. pag. 361. & Journal des sçavans pag. 677.*

XI. Udinæ, in Italia, transfusus est ex agno sanguis in venas canis Hispanioli, ætatis 13. annorum, qui per triennium penitus surdus, & debilis valde fuit, & parum ambulare potuit: sed observatum fuit, quod peractâ transfusione post aliquot horas alacrior apparuerit, heros suos quaesitum abierit, post biduum longè melius per plateas ambulaverit, intraque menstruum spacium, cum appetitus egregiè interea rediisset, & ipse benè comedisset, omninò fuerit restitutus auditus, ita ut vocatus semper audiret, sed ita tamen audivit, ut quoties vocaretur, semper retroiret, quasi vocans procul abstinisset: Vid. *Transact. Societ. Reg. Anglic. pag. 705.* Non abludivit ab hoc experimentum, quod Parisiis cum catella Hispaniensi 12. annorum fuit institutum: in hanc sanguis capri fuit transfusus, unde catella recipiens alacrior facta, ac tactu calidior, quàm antea visa, benè sese habuit.

XII. Supra laudatus Dionysius quatuor arietum (vitulorum) in equum annorum 26. transfudit sanguinem; qui cum eundem accepisset, omninò plus roboris quàm antea habuerat, intensioremque famem acquisivisse, apparuit: vid. *l.c. pag. 454.*

XIII. Primum hoc est experimentum, quod in homine tentatum fuit sano: Idem nempe Dionysius tentandi gratia bajulo cuidam sano & robusto emisit $\text{℥} \text{x}$ sanguinis ex vena mediana, postmodum verò immediatè ex crurali vena agni $\text{℥} \text{xx}$ sanguinis immisit, citra ullam agri sensibilem mutationem. Hic pecunià acceptâ latus cauponam intrans edit bibitque, sapius experimentum hoc ulterius

expetens, nihil autem conquestus est, quàm quod in transfusione ipsa summum in brachio dimidio usque ad præcordia calorem senserit.

XIV. Primum hoc est experimentum, quod tentatum fuit in homine ægrotante: Parisiis erat puer annorum decem ex febre diuturna tertiana laborans, & ob multos clysteres, nimiasque venesectiones, ex spirituum de pauperatione lethargicus quasi factus, cujus vivax aliàs ingenium hebescebat: in hoc igitur pro sanguine spissiore corrigendo, & spirituosiore reddendo, Transfusio instituta fuit. Huic verò febricitanti, ac diarrhæa symptomaticâ correpto, emissæ fuerunt $\text{℥} \text{ij}$ crassi, spissi, nigricantis sanguinis: hoc emissio, ex carotide agni $\text{℥} \text{vii}$. fuerunt ipsi instillata: hinc æger mox latior factus, cibos cepit vegetusque evasit, meridiano somno, cui antea indulgerat, relicto: sed redeunte post 24. horas diarrhæa & lethargo, mortuus est.

XV. Parisiis vir quidam melancholicus, & certis periodis melancholiâ, propius ad maniam accedente, vexabatur; huic anno 1667. Mense Decembri in paroxysmo detracta fuerunt $\text{℥} \text{ij}$. vel $\text{℥} \text{ij}$; loco harum primâ vice ex crurali vena vituli $\text{℥} \text{v}$. in venam medianam ipsius immisæ fuerunt sanguinis: Hinc de insigni calore ac anxietate cordis conquestus est, mitior tamen exinde factus, ac secundâ vice, biduo spatio interjecto, ipsi satis furioso $\text{℥} \text{ij}$ vitulini sanguinis infusa, ex quo de nihilo, quàm de æstu circa brachia & cor conquestus de novo est, brevi post lardum, crudaque ingesta alia, evomuit. Sequenti vespere optimè se habuit, nocteque bene dormivit, manè verò sanæ mentis factus confessionarium expetiit; die verò sequenti crebrius miæctus cruentus, cessatio maniae, venarum stillicidium, observatum fuit: vid. *Act. Soc. Reg. Angl. pag. 505.* Post 15. dies fatuitas rediit, paulò verò post febre acutâ ac convulsionibus correptus periit.

XVI. Tentatum etiam fuit in Anglia anno 1667. die 23. Novembris experimentum tale in homine leviter Melancholico, &, ut loquitur Lowerus, amabili insaniâ quasi detento, huic more Anglorum per canales oblongos $\text{℥} \text{ix}$. l. x. ex arteria carotide agnina in medianam transfusa sunt sanguinis. Hic primò non expertus fuit caloris sensum, ob calamorum longitudinem, nec aliquam aliam passionem, quin potius sub ipsa actione melius se habuit: post tres verò vel quatuor dies experimenti repetitionem petiit, sed non factum Vid. *Acta Soc. Reg. Anglic. pag. 454.*

XVII. Vivebat Parisiis desperatus ferè homo, utpote qui per biennium quartanâ laboraverat, huic à Dionysio sanguis vitulinus fuit immisus, unde quasi Medæ arte recoctus revixit,

revixit, & mox melius sese habuit, non tamen à febre integrè restitutus. vid. *At. Med. Haffn. vol. 3. pag. 86.*

XVIII. Factum Romæ à Dno. Guiljelmo Riva, Chirurgo experto, Anatomico dexterrimo, in tribus subjectis humanis hoc experimentum: unus erat phthificus, alter febre quotidianâ laborans, tertius tertianâ duplicatâ correptus: In hos omnes ex trium vervecum arteriis sanguinem transfusoriæ artis lege misit, sed bini priores brevi mortui sunt, solus verò tertius convaleuit.

XIX. Adolescens Lethargicus post febre contumacem ex receptis ℥viij sanguinis agni ex carotide melius habuit, sanguinis emissæ ℥iij, post 24. horas alvi fluxus reversus, renovatis symptomatibus, occubuit.

XX. Vivebat Parisiis Succus quidam Liber Baro à Bond, qui more exteris familiari corripiebatur febre continuâ lentâ cum diarrhæa colliquativa, fluxu item cruento ac quasi hepatico symptomatologico: Huic cum 32. vicibus vena secta fuisset, vires fatiscebant, morbus protrahebatur; huic vero semi quasi mortuo ex vitulo sanguis ad aliquot uncias fuit immixtus, pulsus inde mox tactu sensibilior factus, post biduum in tantum convaleuit, ut loqui denuò posset, sed tamen duabus diebus postmodum mortuus est: hinc in toto cadavere & vasis omnibus ne unicum cochleare sanguinis repertum fuit.

De invento hoc novo varia eruditorum judicia prostant; quidam enim hæc noviter reperta partim approbarunt, partim improbarunt: Qui improbant, hoc faciunt vel ob rationes & experientias oppositas, quarum collatione mutua dubii fluctuant; vel ob incertitiam, dum non intelligunt, vel intelligere nolunt Inventum, præoccupati præconceptis opinionibus, ex quarum vi per rationes ruinosi fundamenti rejiciunt nova inventa; vel ob invidiam, quâ aliis gloriolam novi Inventi, & inde honoris vel emolumenti accessum invident, nil nisi, quod ipsi faciunt, rectum putantes; & hi vel contemnunt & supprimunt, vel cavillando novum inventum despectui reddere nituntur: Qui approbant, iterum vel ob rationes & experimenta præsertim hoc faciunt, sine quibus nullum novum repertum potest firmari; vel ob novitatis incipit studium, quo prurientes ubique digitos infigunt, & ubicunque possunt, aliquod, quod novitatis specie titillat, arripiunt; vel ob judicii defectum, dum nescientes nervum ac fundamentum novi inventi ipsi quidem judicare debeant; nescii, cæco ductu ab aliis abripisse patiuntur, & vel tantillum speciosis rationibus se decipi, vel ob literariam ambitionem, quâ nihil non scire omnia facile penetrare, ubique commodè applicare, uno

nomine: speciosum suum aliis favere videntur. Varia interim de Chirurgia Infusoria judicia Fromanni, Merclini, Libavii, &c. legi possunt.

Cum primitus hæc experimenta Chirurgiæ Transfusoriæ fuerunt instituta, Parisiis varias sortes experti fuerunt illi, qui eadem fecerunt. Tandem per Parlamenti Edictum penitus prohibita in hominibus; in canibus verò concessa fuit. Romæ etiam à Pontifice Maximo peculiari Interdicto sub statuta poena ullum experimentum artis hujus edere, penitus prohibitum fuit.

CAPUT II. DOGMATICUM,

Præsupponit ea, quæ ad Transfusionis examen & applicationem, vellea, quæ noxia salubriavè sunt, prius consideranda veniunt.

INter talia ante omnia consideratur vita, & quo vitæ nostræ ratio imprimis fundata sit. Teste enim Scriptura Sacra *Cap. 17. Levitic.* certò scimus: vitam omnis carnis consistere in sanguine; hinc natum est præceptum de sanguine vetito. Posito jam, vitam consistere in sanguine, superest, ut indagetur modus, seu quo sensu dicatur, consistere vitam in sanguine? v. g. Gallus ovum reddit fœcundum, & consequenter vitale, sed sine sanguinis communicatione; nihil enim sanguinis in congressu, genitura, &c. & tamen est actio summe vitalis, constatque dependere fœcundationem illam à vitali principio; hinc animalia, quo salaciora, & quæ multum generant, eò minus vivacia videntur, vid. Verulamius *Hist. Vitæ & Mortis pag. 36.* Et quo longævum magis est animal, eò tardius se ad generationem accingit, vid. Velthusius *pag. 113.* Idem ferè in vegetabilibus obtinet: Arbor, quò fœcundior, eò magis corruptioni obnoxia est, vid. Senguerdus *pag. 275* e contra quo magis sterile est animal, eo vivacius esse solet. Hinc etiam Venus inter impedimenta vitæ longæ primaria semper relata fuit, & Avicenna haud malè asseruit, vel decuplum sanguinis amissum non tantum debilitare, quam parum genituræ emissæ. Ovum fœcundum sub incubatu, calore in fœtum abit, dum non fœcundum putrescit & corrumpitur. Illud ergo principium conservativum, Balsamicum, & sui concreti præservativum, obtrineat necesse est, quæ cum sint effectus vitales, omnino principium vitæ præsupponunt. Certè in fœtus ulteriori formatione jam motus, actiones & operationes vitales adsunt ante genitum sanguinem: v. g. in puncto saliente vigor vitalis adest, vel antequam generatur sanguis,

[M]

vel

vel dum generatur: & ita sanguis non existens pro sui genesi aliud præsupponit principium, quod vitale necesse est.

Juxta operationes genitales etiam actiones animales, quæ reverà à principio vitali proficiscuntur, difficilem reddunt nostram hanc doctrinam; præstantiores enim sunt magisque artificiosæ, quàm ut à solo sanguine perficiantur: Sic sensuum operationes, sive externas sive internas, ex sanguine nemo derivavit; nervis enim ligatis pars moveri nescit, sed iis liberis redditis, motus redit. Ergò præter sanguinem, vel simul cum illo, aliud principium vitale statuendum erit: Nempe sanguinis pars nobilior, delicatior, volatilior & subtilior est, quàm quasi Quintam Essentiam seu spiritum communiter appellant.

Hic est, qui citra genituræ materialem contactum fœcundat ova, qui actionum animalium, sæpiùs momentanearum est primarius Autor: hic alterationum quarumvis subitanearum illarum in syncope, apoplexia, vertigine caduca, est subjectum. Hujus ratione in suspensis, mox atque ligantur vasa in collo, sensus & motus perit, propter mutuum spirituum commercium interceptum, citra sanguinis ad eò nobilem alterationem.

Sed cum ex sanguine materialiter oriatur hic spiritus, & pro illius materia ipse variet (propter ætates, temperamenta, &c.) & sanguini denuo vim vitalem communicet, motum intestinum conservando, ex hæcenus dictis primum Præsuppositum formamus.

1. Vis vitalis, à qua Machine corporeæ integritas primario dependet, ut & quævis oriuntur motus, & ceteræ mutationes, formaliter & proxime in spiritu isto, vitali dicto, ex sanguine genito; fundamentaliter & remote in ipso sanguine; originaliter seu radicaliter aut dispositivè in semine parentum seu in primordiis seminalibus, consistit.

Non sufficit autem perspectum habere Principium vitæ, in quo consistat? sed ulterius considerandum est, unde vita brevis vel longa, ægra vel sana, dependeat? Nempe notum est, senes ac debiles, aut valerudinariorum parentes, non nisi debiles ac brevi caducos procreare liberos; illorum enim deficiente plus minus spiritu, & horum vis communicata debilior erit: Et ex opposito; quorumcunque animalium sanguis firmioris est texture, nec facile resolvibilis, sed particulis activis quidem, sed probè concentratis, est præditus, & consequenter quorum spiritus inde geniti, puriores, vegetiores & texture non raræ nimis, hæc sunt saniora & simul longæva.

Sed ut rectius hæc intelligamus, spiri-

tum hunc duplicem esse, sciendum est: vel influum, vel insitum. Distinctio hæc neglecta hæcenus fuit, sed pergam illam paucis explicare. Influum spiritus est is, qui cum sanguine perpetuò in circulum rapitur, & undique in sanguinis partes radiat, & postmodum pro functionum varietate citra differentiationem nunc animalis, nunc genitales, dicitur. Insitus verò spiritus est ipse influus, qui partibus solidis intimè unitus, & in iisdem quasi concentratus est.

Dicis: si spiritus sunt substantia radiofa, & sese instar Gas habent, quomodo possunt constringi? Resp. Hæc per exemplum illustrari possunt: v. g. spiritus vini summè volatilis, si misceatur sanguini recenti, in momento coagulat sanguinem, fitque massa homogenea instar hepatis parenchymatis. Unicum argumentum, quod cogit concedere spiritum insitum, est, nempe nutritio partium solidarum.

Quæritur: quodnam sit agens illud, quod ex eodem nutrimento chyloso os, tendines, cerebrum, membranas, &c. fabricet? Quod ex eadem materia parenchyma musculorum cordis, renum, hepatis, &c. paret, cur eadem materia alio modo in ossa, alio in cerebrum, efficiatur? Dicis: textura partium & spiritus influus huic negotio satisfaciunt. Resp. Materialis textura partium non sufficit, nec spiritus influus; est enim universalis, & in se indeterminatus, qui in singulis partibus suscipit officium; materialis autem textura dispositivè concurret, non effectivè aut formaliter; quin potius & rectius Hippocrates cuiusvis parti & cujusvis partis parti suum ventriculum proprium attribuit, in quo & à quo fiat nutrimenti in quavis parte specialis alteratio seu assimilatio, & hinc perfecta plus minus nutritio.

Ad Nutritionem enim tria requiruntur:

1. Nutrimenti appositio, cui textura partis solida mechanica sufficit.
2. Assimilatio.
3. Agglutinatio uniuscujusque partis.

Sic parentum spiritus genitales est eorum influus, fœtui sub ovi forma communicatus, à quo huius fœcunditas, in fœtu verò idem fit insitus. Hunc spiritum influum characteres morbofi confirmant, qui citra materialem contactum implantantur fœtui.

Hinc spiritus insitus characterem patris podagricum articulis pedum infigit, non visceribus, quia ibidem se in specie implantavit, & sub materiæ in partem solidam coagulatione & densatione unà coagulatur, & confermentando intimè unitur: Sic nephritica mater, per spiritum genitalem influum,

influum, in ovo concentratum, filiam nephriticam itidem generat; lithiaecos enim characterem imprimit renibus, dum ibidem pars illius concentratur & figitur. Notanda igitur est conspiratio & mutua subordinatio horum spirituum; dum enim ex influo fit insitus, hoc ipso ille indeterminatus ab hoc determinatur, figitur & concentratur, ut etiam pro partis sustentatione fiat insitus. Influum ergo ubique sustentat insitum, & perditiones ejus ac successiones, attenuaciones & extinctiones, radio suo continuo conservat, quo stante in debito vigore, & viscerum ac omnium partium functiones rite peraguntur, & insitus in suo flore conservatur.

Altius hoc negotium repetam, quia consistit in hoc fundamentum totius doctrinae Physiologicae. Spiritus universi vis seminali, à creatione accepta, concentratus incipit operari, ubi externè excitatur. Influit spiritus à sole, seu corde mundi, quaquaversum per radios distributus. Hic cum sit universalis, est indeterminatus. Determinatur verò in omnibus subjectis particularibus ab eorum spiritu insito, idque in specie à vi eorum seminifica, dum concentratur universalis influum sub generatione seminum, fitque sic insitus particularis, characterisatus pro speciali corpore producendo, cujus vis, quamdiu durat, & in viventibus per aërem & alimenta, (quibus mediis continuo supplementa spiritus influi pro insiti sustentatione subministrantur,) conservatur, corpus vivit: eo verò deficiente, & resolutione mediante in spiritum universalem seu antiquum chaos recedente, corpus perit, dum interea pars influi extrà communicati determinata fit, & quasi fixata, ac in corpus seminale concentrata, à quo insito speciei conservatio, & conservatur hic spiritus insitus, & multiplicatur ab influo, & influum in se generaliter vivificans, determinatur ab influo in una quavis parte, & pariter pro partis conservatione fit insitus: idem influum characterem seminali insignitus concentratur in corpus seminale pro particulari & insito per semina specialiter fit conservatio.

Nempe sol est anima mundi universalis, sed materialis, radiorum spirituosorum ope omnia animans, & spiritus universi diffundens. Solis hic lucidus spiritus cum unaquavis specie determinatur, & fit insitus, dum à præexistente insito quasi sigillatur, & ipsi unitus ab universalitate ad plures operationes determinatur, & sic influum universalis fit insitus: ab hoc vis seminum: quibus fatiscentibus idem spiritus in suum chaos redit, & antea insitus particularis fit denuò influum universalis. Conf. Tabula Smaragdina.

Idem spiritus universalis partim imme-
Tom. II. Pars 2.

diatè cum aëre inspiratus, partim mediatè cum alimentis assumptus, ab hominis spiritu insito cum insito modificatur ac determinatur, pro conservando homine, & concentratus ab utroque sexu in ovum cum appropriato subjecto fit insitus foetus seminalis; unde vis generationis & continuatio specierum dependet, & hæc est Hermetica Philosophia. Notandum verò hic est, nonnullos arbitratos fuisse, Philosophiam Hermetis dissentire à Cartesiana: sed negandum est; Corpuscularis enim Philosophia seu Cartesiana judicat ex effectibus de fiendi modo, adeoque à posteriori; Hermetica verò considerat principium patiens, materiam, & agens, Lucem. Qui plura de hac re videre cupit, adeat Boyle *de Orig. Form. & Qualitatum*, ut & Enchiridion Philosophiæ Restitutæ in Bibliotheca Albinæ Chymica; item Marcellum in Med. Magnetica.

Prout ergo viget vis spiritus genitalis parentum influi, qui in foetu fit insitus, catenus etiam totius corporis structura erit firma vel labilis; sanguinis crasis vel temperata, vel vitiosa; partium robur vitale vel debile, vel forte; vita vel longa vel brevis, sana vel ægra, erit.

Cum ergo spiritus hic conservetur, inque vigore suo plus minùs exaltetur ab influo, hic verò à sanguine dependeat, & ipse non secus ac sanguis, innumeris mutationibus fit obnoxius, hinc influi ratione vita vel sana vel ægra, insiti verò respectu, prout plus simul minus alteratur, longa vel brevis. Hinc tale secundum Præsuppositum formamus.

II. *Fundamentum vitæ longæ vel brevæ, sanæ vel ægræ, proximè in spiritu partium insito, remotè in spiritu influo, consistit, quorum omnium basis est sanguis.*

Dum igitur sanguis, tanquam basis vitæ, tantoperè consideratur, ex quo proximè & materialiter, mediante aëris inspirati concursu, fit spiritus patris influum, qui in filio per generationem communicatus fit insitus, omnino summam considerationem meretur in sanguine, quod quodlibet animal specificum habeat sanguinem, tam quoad genera quàm species & individua. Ratio diversitatis consideratur vel efficienter, à quo oriatur, vel materialiter, ex quo oriatur.

I. Efficienter consideratur vel fundamentaliter & remotè, vel formaliter & proximè. Fundamentaliter dependet illa diversitatis ratio ex principiis seminalibus; Formaliter ex rebus non naturalibus & præternaturalibus, à quibus solet sanguis mutari, quibuscunque unumquodq; individuum obnoxium est. Nam

[M] 2

quo-

quorundam sanguis facilius, quorundam difficilius, alteratur, prout crasis ejus seminalis vel melius & firmitus constructa, vel debilius contexta est.

2. Materialiter dependet illa ex varia particularum minimarum sanguinis textura, quæ admodum diversa est. Particulæ autem illæ ad triplicem possunt referri classem: quædam enim sunt aqueæ, terreæ, salinæ, acidæ. Ex his tribus corpus humanum, & omnia concreta, coaluerunt: v.g. sanguis elephanti omnium est frigidissimus: Piscium frigidus est, & tamen non coagulatur facile, contrà ac hominum: Sic sanguis testudinis, imprimis aquaticæ, est admodum frigidus: vid. *Acta Soc. Reg. Anglic. p. 404.* & contrà equi calidus: Sanguis anserum studiosè saginatorum est lacteus, vel semilacteus: hircinus sanguis pleuritidi occurrit: Barbi sanguis corrosivam vim obtinet: Ciconiæ inter alexipharmaca refertur: sanguis animalis castrati differt maximè à sanguine non castrati animalis, licèt ejusdem speciei; illa enim inde pinguescunt, & longæviora sunt; hæc minus: sanguis taurinus venenatus habetur ab omnibus, non bovinus. Quin etiam in uno quoque individuo, v. g. humano, sanguis varius est, & unicuique suus proprius ac peculiaris.

Signa pariter & argumenta, quibus specialis idiosyncrasia sanguinis confirmatur, desumi possunt à duplici loco:

1. A priori, & sensuum fide. Videmus enim quod hominis unius sanguis venæsectione emissus non sit idem cum alterius hominis, sed peculiaris sua subministret phænomena, etiam in sanis. Notum est, quod refert Helmontius in *Traët. de Febribus cap. 2. §. 25.* Cujus verba hæc annectere volui, quæ reperiuntur *p. m. 11.* *Ast declaro, sub pœna convicti mendacii, si quis velit experiri, quod ducentorum petulantium rusticorum & sanorum cruores unico die examinaverim; erantque multi illorum aspectu valde dissimiles, colore, materia & consistentia, quorum plures destillavi, & reperi mendo æquè utiles Solent namque nostrates rustici alterâ Pentecostes die mittere sanguinem, quo largius potitarent; etenim quanquam plures viderentur putridi, alii æruginosi, vel atrabillarii, imprimis tamen rustici, unde effluerant, erant sani.*

2. A posteriori & ab effectu diversitas sanguinis colligitur, imprimis vero:

1. Ex statu sano & ægro. Quis est, qui exactè sanus est?

2. Ex rebus non naturalibus, earumque varietate, diata, vitæ genere, excretis, &c. & varia sanguini introducta mutatione.

3. Ex habitu corporis. Sic unus gaudet obeso corpore, sanguinemque habet semila-

cæum: Alius est macilentus, ipsiusque sanguis est acrior & salior: Alius facie pallidus, sanguisque ipsius est grumosus.

4. Ab ætatum differentia. Ætates sunt gradus vigoris vitalis. Triplex dicitur ætas: increscens, consistens, & decrescens: quæ dependent, primariò & principaliter à primordiis seminalibus parentum, spiritu præsertim insito. Nam prout ab hoc vita, vel brevis vel longa, etiam mutationes ejus graduales secundum incrementum vigoris vitalis, ejusdem statum & decrementum, contingunt; formaliter verò & proximè à sanguinis statu & diversitate oriuntur. Hinc sanguis in infantibus, & quamdiu in ætate sumus accrescente, dicitur quasi musteus, in juvenibus & ætate consistente quasi vinosus, in senibus quasi acetosus.

5. Efficacissimè ex morum differentiis, quæ deveniunt ex temperamentis. Temperamenta autem à spiritu aut sanguinis crasi dependent. Quantum enim differant mores senum & juvenum, vid. Verulamius *pag. 179.* Verissimum igitur est effatum illud: Mores sequuntur temperamentum.

Est verò illud duplex:

1. Vitale, quod cum vita superstes est, cumque illa perit. Hoc vitale Veteribus in calido & humido consistebat.

2. Elementare, quod in cadaveribus adhuc post mortem superest, & oritur simpliciter ex particularum minimarum textura.

Temperamentum vitale proximè in spiritibus, insito & influo, horumque harmonia & symbolismo, consistit; remotè in sanguine, ex quo generantur spiritus. Temperamentum elementare dependet à vitali.

Mores ergò sequuntur Temperamentum, non elementare, sed vitale, suntque alii nativi, alii ascititii. Illi à natura implantati per principia seminalia, & hinc sanguinis ac aliarum partium producta constitutio: Sic canis natura est iracundus, ovis mitis: Sic homo alius est blandus, alius mitis, quod tamen à diversitate spiritus influi dependet. Diversitas autem hujus spiritus est ex varietate sanguinis. Certè in sanguinei temperamenti subiecto alii erunt spiritus, quàm in Melancholico morbo aut maniaco; imò in his necessariò spiritus variant ab iis, dum sani sunt: id quod robur, frigoris tolerantia, agrypnia, &c. testantur, etiam in istis Melancholicis, in quibus citra affectuum vim, ex causis humores corporis alterantibus, ut quartana, vita sedentaria, studiis, &c. oriuntur. Omnis juvenis animosior, quàm infans, vel senex; omnis fœmina præ viro magis timida. Quantum ingravidatio mores, ob temperamentum vitale alteratum, mutat! Morbi mutant temperamenta, hinc & mores. Sanè quot

quot mores, tot temperamenta, tot sanguines, tot spiritus, & eorum varii impetus. Hinc etiam à sanguine hausto, & temperamenti ac morum non vulgaris inducta observata fuit mutatio à Weinrichio: Conferatur Merclinus pag. 71. Si enim lac à nutritibus haustum mores & temperamenta mutare valet, multò magis sanguis. De lacte nutriticum res nota est: Conf. Merclinus pag. 65. l. c. Idiosyncrasia huc pertinet, duplex: vel nativa, vel adscititia. Hæc vel ratione subjecti in parte solida, idque ferè ratione spiritus insiti; vel in humore, præsertim sanguine; vel spiritu influo.

Ex hac ergò spirituum vitalium convenientia seu symbolismo, vel disconvenientia, contagiorum vis derivanda. Pestis certum quoddam animalium genus tantum afficit: contagia saltem spiritus inquinant primariò; secundariò & effectivè humores & partes solidas: & quidem vel influum, si morbus contagiosus est universalis; vel insitum, si est particularis, ut scabies, dysenteria. Certè variolæ sunt morbus universalis, unde interna pariter ac externa infecta viscera: scabies verò est particularis, dum spiritus insitus cutis afficitur; unde hæc solum deturpatur. Ex hisce itaque prolatis tertium Præsuppositum formamus:

III. Unicuique homini suus peculiaris est sanguis, ab alio sanguine, tam humano quam brutali, multum discrepans, & à quo plures ipsi propriæ, ac aliis subjectis non æquè communes, operationes, alterationes, & totius corporis dispositiones, tam sanæ quàm ægræ, oriuntur, & proba cum diversitate etiam diversi, & à se invicem distincti, generantur spiritus.

Duo hinc consideranda hinc veniunt in sanguine:

1. Interna ejus crasis vel textura particularum istarum minimarum, ex quibus concretum ejus coaluit, quæ originaliter sub fœtus formatione à spiritu genitalem in fœtu perficitur, & pro cuius primævæ craseos ratione sanguinis semper characterem seu certum texture modum in quibusdam sui partibus perpetuò retinet, per universum vitæ cursum durabilem, ratione cuius sanguis huius hominis semper sibi quoddammodo similis est, & variat etiam per ætatem vicissitudines, & hinc saltem homini appropriatus est.

2. Externæ ejus qualitates seu sensibiles proprietates, ac phænomena, quæ ex crasi illa interna, tanquam effectus producant: idque vel immediatè, vel mediatè: Talis est rubedo, coagulatio, sapor dulcis, consistentia spissior vel fluidior. Notandum verò est, internam crasin insensibilem esse, & continere nucleum vitalem massæ sanguinæ;

externas verò illas qualitates esse sensibiles, & saltim corticem massæ sanguinæ repræsentare.

Paradoxon videri potest, quod dixerim: crasin internam per totam vitam esse immutabilem, & characterem sibi proprium habere impressum. Ratio dubitandi est: quoniam sanguis in continuo est fluxu & motu restitutionis & perditionis, qui per chylum, per nutritionem & sensibilem expirationem fit, ita ut istum sanguinem, quem hodiè habeo, intra aliquot septimanas sim perditurus. Sed respondeo: licet ita sit, tamen quicquid novi generatur sanguinis, ita à sanguine pristino alteratur, ut evadat illi similis; utut enim similitudo non semper habeat locum, sanguis tamen plus minus participat de hac crasi. Exemplo rem declaro: Mustum, vinum, & acetum vini Rhenani, quantum non differt à musto, vino, & aceto vini Gallici? adeoque unum quodque crasin suam à semine impressam à musto ad acetum usque retinet: Sic etiam massa sanguinea per omnes menses quidem mutatur, regenerationis tamen operatione ista restituitur. Crasis ista sanguinis interna semel mutata difficulter aut planè non restitui potest; è contra verò qualitates externæ faciliè alterari possunt. Mutationes illæ sensibus patent, craseos verò sunt à posteriori & ex effectibus, judicandæ: v.g. sanguis pleuriticus serosus, spissus, aut certè semigrumosus, circulationi ineptus, per venæ sectionem emittitur, quæ alteratio tantum externa, & saltem textura sanguinis mutata videtur, unde faciliè salibus volatilibus resolvi, & in pristinum statum reduci potest. Ex opposito, si fermentum tinea in puero, vel scabiei in adulto, retrocedat, exinde vitatur ista interna sanguinis crasis, citra sensibilem sanguinis mutationem, & exinde aut moritur homo aut gravi febre correptus, non citra periculum evadit: Nempe par est ratio ac lac nutriticis sanæ, sed irâ excandescens aut terrore affectæ, quod emulctum nullum sensilis seu externæ alterationis subministrat vestigium; cuius tamen effectus ob internam craseos alterationem, vel in infante se produnt, cui epilepsia facile inde communicari potest: Sic lac capræ, helleboro vel elaterio pastæ, ab alio optimis plantis nutritæ, non differt; interim vis laxativa illa ab helleboro in hoc lacte, quæ in alio non est, in infante se manifestat: Sic etiam sanguis tauri, hominis, canis, vituli, &c. recens emissus, & postmodum etiam aliquandiu sepositus, ferè quoad externas proprietates conspirant, & vix ullam sensilem differentiam exhibent; quorum tamen interna crasis & vitalis nucleus toto cœlo, & tantum à se differunt, quantum hæc animalia à se invicem distincta sunt. Quoties observatum

[M] 3 est,

est, ut, teste Simone Pauli indigressi. de Febris Malignis, morboris admodum, imò breviorituris, floridus & elegans extractus fuerit sanguis, & econtrà ex sanis spissus, crassius, nigricans, & crustâ interdum pituitosâ instratus, quæ reverà nihil aliud est, quàm chylus nondum perfectè assimilatus, instar cremoris lactis sanguini supernatans: Sic anseres sani, probè & largiter saginati, sanguinem emittunt semilacteum; è contra verò, qui non adeo benè sunt saginati, rubicundum. Adeoque externa species fallit. Curiosum experimentum refert Boyle in Tentam. de productionibus saporum: accepit vinum Canariense, huic infudit radicem ireos Florentinæ, cumque potum, præviâ digestionem tinxit cum Coccionella, acquisivit hinc potum, qui omnibus proprietatibus, sapore, colore & odore vinum ex baccis rubi idæi paratum representabat. Quanta verò potus hujus differentia à vino Canariensi, tanta proprietatum quoque internarum est diversitas. Ergo crasis interna consistit in specifica massæ sanguineæ textura, sub generatione à spiritu genitali primùm constructa, hinc à spiritu vitali jugiter conservata. Ergò quartum Præsuppositum ex hisce promanat.

IV. *Merito in sanguine primario interna ejus crasis, utut minus sensibilis, secundario externæ ejus proprietates, instatu tam sano, quam ægro, sunt considerande; ita tamen, ne corticem, relicto nucleo, lambere videamur.*

Si consideramus corpus animale, ut genitum, reverà repræsentat machinam quandam hydraulico-pnevmaticam, dum secundum leges mechanicas in ea omnia fieri solent. In nostra ergò hac machina mutua reperitur conspiratio & subordinatio viscerum ac massæ sanguineæ, ita ut sine sanguine viscera marcescant, & officio suo non satisfacere queant; sicut sine viscerum ope nec sanguini sua stat integritas. Hinc enim sanguis scorbuticorum labem suam facile visceribus affricat, cum econtrà malè affecta viscera, sub sui corruptela, exulceratione, gangræna, &c. pariter vitium suum communicent sanguini. In febre acuta natura motu critico eliminat materiam è massâ sanguinea in hepar vel mesenterium, & ita à sanguine viscera afficiuntur: nati verò hinc abscessus occasione, accenditur febris, plus minus acuta vel lenta, & ita à visceribus sanguis afficitur, & insequente purulentia plus minus inquinatur. Et sic mutua est conspiratio ac subordinatio viscerum ac sanguinis.

Quæritur: quænam harum partium alteri præemineat? Resp. Sanguini videtur præeminentia deberi; siquidem abdominis & thoracis viscera saltem in sanguinis usum con-

structa videntur; quibus è contra à sanguine præ aliis partibus nil tribuitur: hinc mala sanguinis universalia sunt, & totum corpus afficiunt, ut patet ex febribus: è contra viscerum mala sunt ut plurimum particularia & specialia & vel non, nisi mediante sanguine & spiritu, universum corpus alterant: v. g. suppurata pleuritis & pleura est morbus specialis; & si quid mali exinde in massam sanguineam subnascitur, per alia viscerum colatoria eluitur, & emendatur. Ita visceribus quibusdam citra sensibile sanitatis damnum carere potest animal, sed non sanguine. Prodiit Tractatus Josephi Zanbeccarii, Florentini, de artificio viscera ex animalium corpore excindendi: Sic excissi fuerunt testes, pancreas, lien, citra vitæ periculum; item intestinum cæcum, folliculus felleus, hepatis lobi, &c. quæ tamen ad integritatem sanguinis conspirant.

Viscerum mala à causâ interna si oriuntur, uti vix citra sanguinis opem primam originem ducunt, ita vix sine ejusdem sanguinis prævia restitutione restitui possunt, utut reverà in se ad viscerum labem emendandam parum vel nihil sanguis conferat: v. g. in temperie, seu potius nutritione, si fiat vitium, formaliter à spiritu insito; objectivè & materialiter à sanguine, qui tùm passivè se habet, ejus medela dependebit: sin vitium conformationis fuerit, sanguis corrigendo hinc nihil confert, utut easdem inferre valeat; sin compositionis vitium, non unire eas sanguis, nisi materialiter nutrimentum subministrando, valet. Conspirant viscera ad sanguinis integritatem; econtrà nullo modo, nisi quatenus ex sanguine tanquam communi thesauro, nutritionis supplementa materialia recipiunt, à sanguine dependent, seu ab eo aliquid commodi percipiunt. Unde sanguis observatur primogenius respectu viscerum, post hunc demum comparent, ex sanguine tamen non constant præesse, quin vasis tanquam fungi arborum truncis successivè adnascantur, juxta experimentum Harvei de pullo in ovo, & Malpighii de structura viscerum. Horum prima stamina sunt fibræ nerveæ, ex quibus, quicquid est partium solidarum, primitus nascitur, postea pro firmiore robore fibræ coagulum nutritivum ex massâ sanguinea adnascitur nunc chylosum nerveis, nunc sanguineum sanguineis. Sic osium, membranarum, hepatis, cerebri, &c. stamina sunt fibræ simpliciter. Docet hoc hepar, viscus summe sanguineum; hoc non ex sanguine oritur, sed alia materia, & adhæret canali venæ cavæ, inque foetu naturaliter ex pallido flavet in sui primo exortu, postmodum, ubi successive crebriori sanguinis fluxu & refluxu atque procolatione particulæ sanguineæ undique circa vasa & glandulas adhærent, fit sanguineum viscus,

viscus, & rubescit, unde viridis, item alius coloris in animalibus quibusdam observatur. Cum itaque nil ad viscerum constitutionem conferat sanguis, nisi universaliter sub nutritione, & quidem passivè ad eorum integritatem aliquid, quatenus sanguis, conferet, adeoque, & cum usus viscerum circa sanguinem sit particularis, etiam non nisi determinatarum quædam alterationes, quæ ex visceris laxa functione dependent, à viscere denuo corrigi poterunt; adeoque meritò sanguini præ visceribus est concedenda præeminentia.

Sanguinis usus est multiplex:

1. Primarius, ut exaltetur in spiritum.
2. Ut sit aptum eorum vehiculum.
3. Ut sit caloris vitalis, pro promovendis quibusvis actionibus, fomes & succendiculum.
4. Ut sit partium sanguinearum conveniens nutrimentum.
5. Ut sit commune gazophilacium, è quo cætera fluida, integritati corporis interventia, elaboranda & secernenda.

Sanguinis integritas materialis à chylo dependet maximam partem, in cujus perfectione ventriculus, & intestina se habent passivè; sunt enim officinæ, in quibus alterationes, ceu actus similes, fiunt. Inter reliqua fluida, bilis, & lymphæ pancreatica, hic primatum obtinent.

Verum si sanguinis major est usus, quid fiet de Calore vitali? Respondeo: Calor, qui dicitur vitalis, non formaliter sed dispositivè, quatenus actiones animalium calidorum promovet & excitat, necessarius est, non tanquam radix vitæ, sed consequens particulare in animalibus calidis. Datur enim duplex animalium differentia: alia sunt frigida, alia calida. De calore hoc in animalibus calidis dubium est, quodnam sit subiectum caloris, nativi, an sanguis, an spiritus influus? Neutrum per se calet; si verò sociantur, calor emergit. Nimirum quando accedente fermentatione particulæ acidæ volatiles in sanguine à spiritibus moventur, & cum particulis terreis & oleosis collidunt, talem alterationem & sensum in nobis faciunt, qui dicitur Calor.

Universaliter nullus calor in fluidum spontaneus cadit, nisi acidum accedat, quod acidum subtile & volatile in nobis latitans à spiritu commotum, unà cum particulis sensum caloris in nobis exhibet: sicuti nimis commotum, indicia caloris manifesti exhibet: v.g. in inflammatione, erysipelate, febribus, gangrana, &c.

Ex his ergo hætenus prolatis oritur quoque quintum Præsuppositum: scilicet

V. *Est mutua partium fluidarum cum solidis conspiratio, imprimis massæ*

sanguinæ cum aliis visceribus, & status sani cum ægro. Neutrum tamen alterius mala perfectè restituere aut emendare valet: quin imò sanguinis præ visceribus major est præeminentia, sensusque & necessitas tam ad vitam conservandam, quam ad sanitatem tuendam.

Pergo nunc ad quintum Præsuppositum. Inter actiones enim naturales, quæ in œconomia corporis eminent, imprimis pathemata animi sunt, quorum magna est in alterando universo corpore potestas; docet enim experientia magistra & exempla, mediantibus hisce morbos fuisse inductos & curatos, imò hos violentam mortem iniecutam esse: sic e.g. ex gaudio nimio, ex terrore, mœrore subitaneo, quidam mortui sunt, adeoque ad mortis & vitæ arbitrium se hi affectus extendunt, multò magis morbi per eos, & inducuntur & curantur. Per terrorem sæpius epilepsiam introductam, imo etiam curatam, legimus: Novi puerum 14. annorum febre quartanâ laborantem, qui sub festo natalitio Christi in gaudium sub paroxysmi tempore effusus, ob dona natalitia, convaluit: Sic metus ad inducendam pestem multum valet: sic terror abortum excitat: sic etiam terror nutricis communicavit sæpius infanti epilepsiam. Effectus hi mirabiles omnes immediatè ex spiritus influi alteratione qualicunque; mediatè ex sanguinis humorumque aliorum immutatione oriuntur. Nam non oriuntur affectus nisi in animalibus, adeoque hi præsupponunt omnes & semper prægressam notitiam seu cognitionem sensualem cujusdam objecti, pro cuius habitudine, vel grata vel ingrata, in spiritibus postmodum excitantur motus, qui dicuntur affectus, à quibus & sanguis commotus aliæque partes mille alterationes & corruptiones subeunt. Et in specie spiritus se diffundunt vel contrahunt impetu elastico: v.g. in gaudio, amore felici, ira, &c. diffunduntur spiritus; in affectibus verò, qui pro objecto habent aliquod malum, e.g. terrore, timore, summa tristitia, &c. se contrahunt, & quasi condensantur; hinc & sanguinis motus, tam intestinus quàm localis, respondet, ut quasi ebulliat sanguis in ira, sed condensetur in terrore, frigidior, & spissior, ac stagnationi aptior factus. Hinc in nimio gaudio stillicidium sanguinis è naribus; è contra in terrore, syncope cardiaca ex sanguinis stagnatione in pulmonibus, in & circa cor observata fuit: Vid. Blegny *Zodiac. Gallic. Ann. 3. pag. 28.* iracundis, item gaudio nimio perfusis stillare sanguinem, ebulliente sanguine, notum est: ob id excandescunt frigidis & pituitosis conferre, notat Ballonius. Metum Panicum ad humoris Melancholici seu pituitosi acidi augmentum multum facere, ait Sylvius

c. 4. *Pr. Tr.* 7. §. 235. Ad affectus hos pertinet simul suo modo imaginatio, vel speciatim spes ista insignis, quam de remedio amico concepit patiens, vel ad promovendam, vel impediendam, vel penitus alterandam, auxilii efficaciam: Vid. Quercetanus in *Diatet. Franciscus Baco de Verulamio, Histor. Vitæ & Mortis pag. 111*. Affectus verò hi eò potentius seu efficacius alterare bruta præsumendum, quò minus rationis ope corrigi efferi spirituum motus, & in ordinem cogi possunt, quam in hominibus; unde ad hos effectus, quos animal sub Transfusionem activam patitur, in hoc negotio, multum omnino respiciendum. Ergò sextum & ultimum esto ex hisce Præsuppositum:

VI. *Affectus animi potentissimi sunt ad alterandos spiritus, & eorum medio humores, sanguinem, & hinc totum corpus animale, istudque ex statu sano in ægrotum, ejiciendo.*

CAPUT III.

PRAGMATICUM,

Chirurgiæ Transfusoriæ usum & abusum, nimirum quantum possit & noceat ventilians.

Lubet verò per distinctas procedere Conclusiones: sit ergò pro consideratione usus vel abusus Transfusionis sanguinis.

CONCLUSIO I.

Chirurgia Transfusoria est possibilis, sed simpliciter contra naturæ institutum.

Esse possibilem, docent tot instituta Experimenta & Tentamina. Præter possibilitatem verò est negotium scitu jucundum, & operatio cita: pro scopo enim debito alterandi sanguinem quid citius & commodius potest institui? molestia est pauca, nulla sub ejus operatione adest querela; æstus brachii est transitorius: mihi verò cruentus & hæmorrhagia rem faciunt suspectam. Sed dubium est: an non peccatum in quanto, & quidem in excessu fiat? an sit tuta? & an ita prosit, & non æquè vel non magis ex alia parte noceat? Interim tamen est simpliciter contra naturæ institutum. Naturæ enim institutum est, ut nihil in sanguinis intromittatur viam, quod non digestionem prævia per primas vias ipsi sit appropriatum. Lac suggerit nobis exemplum, quod ex chylo jam in animali optimè digesto, & à feculentis quibusvis secreto, constat, in proxima potentia est ad sui in sanguinem Transmutationem, & nihilo minus secundum naturæ legem seu ordinem immediatè ab animali non instillatur sanguini, sed prius suctu immittitur ventriculo, ut ibi-

dem alteratione præviâ susceptâ, vel majori vel minori homogœneum & appropriatum reddatur. Adeo naturæ leges, nihil immediatè sanguini immittendum, nisi quod appropriatum redditum fuerit, sanciunt. Si ergo lac, ex quo immediatè sui cum sanguine miscela fit sanguis, ex uno animali in alterum non instillandum venit; multò minus sanguis ex eo productus, qui similiter ac lac, ejus materia, non simpliciter cum sanguine homogœneus erit. Hinc etiam institutum naturæ est, ut sanguinem, seu vitæ thesaurum, continuo conservet, unde omnis hæmorrhagia sola, excepta menstrua, est p.n. sive per nares sive per hæmorrhoides fiat, sive periodica sive erratica: & etiam si cum levamine ægri fiat, tamen semper stimulum seu causam p.n. præsupponit, adeoque bonum signum malæ causæ existit. Ut ergo nihil sanguinis, seu vitæ thesauri, emittendum, ita nihil sanguini citra præviâ in primis viis alterationem & præparationem immittendum; sive medicamentosum sive alimentosum sit. Medicus ergò, seu naturæ minister, cautus sit in exercenda Chirurgia, tam infusoria quàm transfusoria, cum vix, nisi repugnante natura, illas exercere liceat.

Dicis de communicatione in foetu materna: Resp. Similitudo hæc cum nutritione foetus in utero maximè claudicat, nullumque in oviparis locum habet, nisi in viviparis. In viviparis verò quæritur: an nutrimentum foetus communicatum sit chylosum, vel lacteum, an sanguineum? prius est probabilius, id quod etiam statuit, & elegantissimis expressit rationibus Deusingius de Generat. Microcosmi. Posterius solum concedit Claudius de la Courvée *Tr. de Nutrit. foetus in utero*, ubi statuit, ex sanguine potius nutriri foetum. Sed intercedit foetum inter & matrem placenta, in qua alterationem subit, aut huic quid analogum sanguis.

Dubius verò est placentiæ hujus usus; ut & illud anceps est, an pulmo uterinus, an hepar uterinum, dici debeat? id est, an foetui usum pulmonis, an hepatis, præstet? Certe nihil magis in foetu feriat præter pulmones: probabilis adeoque & Courvée & Doctoris Majowii est sententia, quod foetus per umbilicum respiret; unde placenta potius pulmo, quàm hepar, uteri dicenda. Ad hæc differentia facienda inter hominem gerendum & genitum: De utroque haud valent eadem. Insitio etiam nil probat; quod enim arbori inseritur, est quasi foetus ovo inclusus, nempe gemma, quæ non crudum succum ex stirpe peregrina recipit, sed cum prius alterat plus minus, unde fructus non semper surculo insitio similis nec stirpi, utut pro stirpis natura alteratus plus minus, quin imo repug-

repugnat etiam talis observatio; quod non omnes furculi stirpi cuiusvis inseri ita possint, quin subinde pereant. Similitudo, quæ sanguinem intertransfundendum, & cui infunditur, intercedit, est propè par; externa specie & proprietatibus quibusdam similes videntur, sed internâ crasi & texturâ tantum differunt à se invicem, quantum animal, quod omne suum esse vitale habet ex sanguine, ab animali differt, juxta Præsuppositum tertium & quartum.

CONCLUSIO II.

Sanguinis Transfusio citra sanitatis dispendium, & consequenter citra vitæ periculum, applicari vix potest.

Confirmatum hoc est per experimenta. Cæterum an citra sanitatis periculum possit fieri, dubito; siquidem immediatè aliquid peregrinum & n. n. immittitur sanguini, sanguis verò qui transfunditur, est alius crascos, quam is, in quem instituitur Transfusio, quia affectibus agonis, terroris, pavoris, &c. v. g. in vitulo & agno, excandescentiæ & tantum non furoris in aliis animalibus, inquinatus, singulariter alteratus & immutatus transmittitur, quæ sine alteratione sanguinis & spirituum, & citra illius motus intestini perturbationem, fieri vel succedere non possunt, & juxta Præsuppositum tertium, quartum & sextum, necessariò notabiles & p. n. mutationes inducent. Imò si crebrior Transfusio fiat præter mutationem status sanguinis, ulterius metuendum est, ne insignis mutatio morum inducatur: Sic notum est, lac nutricis multum valere in mutatione morum infantum: Weinrichius refert in *Tr. de Monstris*, puellam sanguine felis hausto mores assumpsisse felinos.

Dicis: Exempla tamen in contrarium testantur, talia nihil nocuementi attulisse? Resp. Exempla ista ulterius examinanda veniunt, nec statim necesse est, ut sequantur effectus manifesti, & alterationes morbosæ. Dicis: ergò loco sanguinis belluini humanus recipiatur sanguis! Respondeo: scimus ex Præsupposito tertio: omnem sanguinem differre ab altero, non tantum quoad speciem, sed & individua, & quod nullus homo tam sanus sit, quin non alterationes sæpius perpatiat.

CONCLUSIO III.

Chirurgia Transfusoria ad longævitatē conciliandam, aut vires juveniles in senibus restituendas, aut vires debilitatas ex morbo in juvenibus denuo reparandas, frustra est.

I. Longævitas mediante hac Transfusionē non concilianda est; scimus enim certò, quod per vitæ terminum intelligatur, quousque vis spiritus genitalis naturaliter sese exten-

Tom. II. Pars 2.

dere valeat. Is est verò vitæ terminus naturalis, quem vis genitalis seu vis generativa feminis determinat primitus; hinc enim fit, ut quidam naturâ sint longævi, quidam brevioris ævi: sic sunt plantæ quædam, quæ omni anno post seminis proventum pereunt; quædam verò, quæ perpetua fronde virescunt; quædam externa facie marcescunt, donec novò vere regenerent. Hinc senilibus aut morbosissimis parentibus nati longævi esse nequeunt, & contrà. Hic terminus vitæ naturalis decurtari potest per rerum naturalium, & superinductarum præternaturalium abusum, & consequenter etiam vita abbreviari.

Quæritur de hac prolongatione termini vitæ, an hic possit obtineri per media naturalia? Respondeo affirmativè. Quia homo naturaliter est immortalis, i. e. potens non mori. In se homo est veluti alia creatura mortalis quoad corpus, sed tamen liberum arbitrium habebat non mori ante lapsum. Dum igitur homo naturâ ita creatus est, ut potuisset non mori; ita nullum dubium est, quin vita naturaliter prolongari possit, etiam post transgressionis terminum. Homo post lapsum potuisset vivere per mille annos, qui tamen terminus deinceps successu temporis decurtatus fuit; sed potest decurtatio hæc reparari vel in toto, vel in parte. Per prolongationem autem vitæ intelligitur extensio vitæ termini, ultra istum, quem natura cuiusvis subjecto in spiritu generantis influo, & geniti insito, determinavit: scilicet prostant Scriptores de Vita longa Rogerius Baco, Panfa, Horstius, Cornaro, Italus, &c. sed omnes unâ viâ incedentes methodum diætericam hac in re tantum observant: v. g. Vanissimum promissum est Claudii Deodati, Medici Electoralis & Episcopi Moguntinensis, in suo Pantheo Hygiastico, ubi promittit methodum ad centum annos vitam producendam. Simiam Paracelli agunt Panfa, & post hunc Johannes Jacobus Joëpferius, Bohemus in Manuductione ad vitam longam, sed diætericè solum procedentes. Pari ratione Lessius, Eruditus Jesuita, Tractatum scripsit de conservanda sana Vita ad ultimum Vitæ terminum, & prudentius reliquis omnibus meo iudicio scripsit. Per auxilia quidem diæterica vita plus minus sana potest ad vitæ terminum conservari, sed quæstio instituitur de illa extensione ultra illum terminum. Licet autem possibilis sit conservatio ad naturalem terminum, non tamen ultra eundem extendi potest per Chirurgiam Transfusoriam:

1. Quia vitæ brevis vel longæ radix non est in sanguine, uti demonstratum in Præsupposito 2. sed in genitali parentum, & inde nato spiritu insito filii, à quo radix seu vis ipsius vitæ servatrix principaliter dependet.

[N].

2. Quia

2. Quia animalia ista, ex quibus fit transfusio, brevioris sunt vitæ, quàm ipsi homines.

Dicis: humanus ergò infundatur sanguis: Respondeo: quis mihi spondebit, hominem illum, cujus sanguis alteri infunditur, esse longæviorē, quàm alterum, cui infunditur?

3. Si vita prolonganda est, sunt etiam quærenda media, radici vitæ seu spiritui insito appropriata, eundem adjuvantia, roborantia & firmantia.

Sed talia ex sanguine alieno & peregrino, & affectuum vi alterato non expectanda sunt. Influxus spiritus, à quo & conservandus, & in motum excitandus venit insitus, etiam est peregrinus, adeoque nec commodè in confortium spiritus insiti recipi facilè, nec sine hujus alteratione infundi potest, adeoque dubium, plus ne agat in hunc insitus? an patiatur ab eodem? Media itaque pro longa vita debent hoc efficere, ut radici vitæ sese communicent, eidemque implantent, & resolutionem impendant, unde hoc medium desumendum esse rectè Helmontius asserit, non ex regno animali, quia brevioris vitæ sunt, quàm homines, nec ex regno minerali, quia hoc nihil negotii nobiscum habet, sed ex vegetabili: sicuti enim pro prolongatione vitæ ex regno vegetabili in Paradiso desumpta fuit arbor vitæ; sic etiam ex hoc vitæ prolongatione Helmontius cedrum incorruptibilem eligit: Vid. *Tractatus elegans de Arbore vitæ pag. mihi 793. usque ad 800.* Ex hac cedro nititur parare medicamentum ad vitam prolongandam, si nimirum in juventute adhibeatur, atque sic spiritui sese implantet, illumque vegetum reddat; sed cum cedrus deficiat, Tackius, vir eruditus, Juniperum elegit, pariter balsamicam & continuò virentem, ex qua suo modo probabiliter medicamenta parata laudat.

Quæritur: annon saltem hac ratione magnetismus seu consensus & conspiratio mutua propter mutuum sanguinis commercium inter duo possit induci? Resp. Quod non possit. Posito vera esse exempla de partibus solidis, non tamen de fluidis: ergò dum fluxilis res est, clarum est, magnetismi nihil à transfuso sanguine communicari posse alteri. Dubium tamen est: annon hoc modo amicitia, seu ut clariùs loquar, ad modum philtri amor possit conciliari. De conciliandis amicis admodum operosus est Beguin. Tyrocin. *Chym. l. 3. cap. 1.* qui per Q. E. sanguinis inimicos duos se reconciliaffe scribit. Sed vanum hoc est.

II. Non possunt senes ad statum rejuvenescentiæ reduci. Baco de Verulamio in *Epist. de Naturæ Operibus, & Nullitate Magiæ c. 8.* dicit: *Ultimus gradus est prolongatio vitæ, sed majus opus est artifi-*

cium rejuvenescentiæ: ibi enim virium vitalium conservatio saltem in eodem gradu, ne senectutis molestias nimis attritiæ sentiant, requiritur; hic verò earundem plus minus deperditarum restitutio aliqualis, & in robore ac vigore augmentum, ita ut facultates deperditas resumant, & pristinas potentias operandi recuperent. Radix vigoris vitalis, juxta *Præsuppositum 1. & 2.* radicaliter in spiritu generali, à genitoribus communicato, sita est, pro cujus vigore & incremento successivo, statu & declinatione, ætatis limites & diversitates describuntur, hinc non viscerum constitutio, sanguinis generatio, spiritus influi productio, insiti conservatio & exuscitatio dependent. Jam verò hunc spiritum insitum balsamicum plus minus exhaustum, impossibile est restituere; conservare facilius: in hoc vita longa, in illo rejuvenescentia sita est. Adeoque rejuvenescentiam veram restituere, simpliciter impossibile videtur. Apparens restitutio est facilis, sed non legitima: v. g. si dentes & ungues regenerantur, crines cani in nigros permutantur, citra tamen vitam longam, qualia rejuvenescentiæ restitutæ exempla sunt vel spontanea, vel artificialia per medicamenta: Vid. Febure in Chymia, ubi tractat de *Quinta Ess.* aut primo Ente Chelidonii majoris & Melissæ. Superiori anno vetula quædam 70. annorum, per binos menses, sine tamen causâ manifesta, mensium fluxum recuperabat, sed brevi post est mortua.

Rejuvenescentia hæc videtur mihi similis cervorum, viperarum & cancrorum depositioni cornuum, exuviarumque, quæ mutatio tantum est superficialis, non radicalis: Licet enim bestiæ hæc cornua & exuvias deponant, non tamen sunt longioris vitæ, & cervus castratus, qui nunquam deponit cornua, sæpius tamen vivacior esse solet. Sic & arbores quotannis rejuvenescunt, & tamen sensim sensimque senescunt. Perinde hæc res est, ac si quis post morbum gravem pilorum defluxum passus, novos recuperet crines, citra rejuvenescentiam. Febricitantes, & externè contabescentes, pinguescunt, & fere convalescent: sed nihilominus tamen indies senescunt. Sicuti itaque prima partium solidarum stamina fibrosa rupta aut utcunque sublata non possunt perfectè restitui, sed concretum analogon in eorum locum subit; sic multò minus spiritus insitus utcunque deperditus aut imminutus restitui aut redintegrari potest; cum illa hujus effectus saltem & productum sint. Argumenta ergò nostra contra longævitatē allegata, etiam virium juveniliū in senibus restitutioni per Chirurgiam Transfusoriam reluctantur; vires enim ad
tempus

tempus roborantur, & vegetiores redduntur sicut arbor, quæ solo exsterili pingui implantatur, fecundior redditur, & lautius crescit, interim confenscere non negligit, utut diuturnioris sic sit ævi, quia non abbreviatur vegetationis ejus terminus, sed ad ultimum limitem accedit; ita & forsan virium quoddam incrementum ad tempus transfusio ista potest inferre. Senex dum mero incaluit, animosior redditur, & hilarior, ex livido rubescit, ac quasi juvenis evadit; ubi autem spirituum ab extrâ impressus impetus cessat, cessat etiam juvenilis ipsius status, idemque senex æquè debilis citra alterationem altius impressam remanet.

III. Vires debilitatæ in juvene non commodè possunt restitui; nam vires morbo exhaustæ, vel reparanda sunt in ægroto adhuc, vel in eodem convalescente. Naturaliter vires non nisi mediatè, idque vel diætæ & remediis possunt restitui, vel iis, quæ spiritus referant, iisque robur elasticum & luciditatem nativam restituunt. Neutrum præstare potest Transfusio sanguinis; quia

1. Sanguis, qui infunditur, non secus ac spiritus, internâ suâ crasi est distinctissimus, unde non nisi præviâ alteratione, activâ vel passivâ, aliquid conferre possunt. Prior est p. n. cum præsertim sit subitanea; posterior est inutilis; quia nil confert.

2. Paucitas sanguinis, quæ citra periculum infundi potest, respectu successivæ sui secundum minutias, in omne corpus distributionis, paucas vires exercere poterit.

3. Vires morbo sunt attritæ. Has restituere superstiti morbo, difficile aut impossibile erit, etsi Chirurgia Transfusoria morbum curet; si verò in convalescente subito sunt restituendæ, quibus & ordinariò intensior redit appetitus, & nisi nimium eum onerent, optimè digerunt.

4. Hinc etiam exempla ægrorum istorum docent, haud diuturnum, sed breve admodum esse emolumentum, quod extreme debilitatis ex Transfusionem accessit.

5. Vires per sanguinem transfusorium restaurandæ, vel sunt oppressæ, vel exhaustæ: si exhaustæ, periculum est, ne alienus sanguis & spiritus eisdem magis opprimat, ipsique majorem laborem facerent. Ut taceam affectuum vim, quæ juxta Præsuppositum textum patiuntur bruta, quæ alterationem producere possunt: si oppressæ, vix restaurari possunt, dum vix propriæ œconomiae regendæ sufficiant, nedum ut alienum sanguinem & spiritus sibi assimilare, & hujus vigoris incrementum capere possint.

CONCLUSIO IV.

Pro vitis sanguinis morbofis corrigendis sanguinis Transfusio non nisi rarius, idque emolumento non adeo insigni locum habere videtur.

Tom. II. Pars 2.

Scilicet media via incedendum, neque more Gallorum ea usque ad astra evchenda, ac panacæ loco habenda est, sed sobriè totum negotium perpendendum: Scilicet sanguis vitiatum est vel in quanto, vel in quali, &c. In quali vitiatum, quando cacochymus evadit, & à crasi sua speciali degenerat. Pro hac corrigenda quid valeat sanguinis Transfusio? considerandum.

Jam verò Cacochymia est vel superficialis, vel profundius radicata: superficialis est, quando saltem sanguis non nihil impurus redditur, istudque vitium facillè corrigibile & separabile est: Profundius autem radicata est, quando interna crasis ita vitatur, ut non corrigi queat. Sic v. g. consideremus vinum turbidum, quod vel ex agitatione vasis secibus est permixtum; vel e contra, quod vappescere & acescere incipit: Prius repræsentat Cacochymiam superficialem: posterius verò eandem profundius radicatam. Pro superficiali cacochymia non opus habemus Transfusionem sanguinis, cum ea vel spontè mutetur, vel salium volatilium urinosorum ut & diaphoreticorum usu, facillè corrigi queat. Igitur de cacochymia corrigenda jam quaritur.

In genere verò Conclusionem confirmo ex eo:

I. Quod hujusmodi vitia sanguinis cacochymici oriuntur vel à visceribus, vel à causis externis & rebus non naturalibus: si vitia sanguinis cacochymici à viscerum labe oriuntur, frustra instituitur Chirurgia Transfusoria; hæc enim viscerum labem nullo modo corrigere potest. Si verò à causis externis & rebus non naturalibus cacochymia oritur, sanguis cacochymicus ita est alterandus, ut alteratio illa à Transfusionem sanguinis inducta sit vel activa, vel passiva: Alteratio passiva est, quando ipse sanguis transfusus à sanguine recipiente alteratur & mutatur; Activa verò est, quando sanguis transfusus exierit vim activè alterandi sanguinem recipientem, ac immutandi ejus crasin. Passiva sanguinis Transfusio pro cacochymia tollenda nil valet: Nam dum vitiosè alteratur sanguis transfusus à sanguine recipiente, potius cacochymiam augebit, quia fortan illud Hippocratis locum habebit: *Corpora impura, quò plus nutriveris, eò magis lase-ris*; adeoque in insigniori cacochymia maloque inveterato nil valebit.

Dicis: Ergò sanguis in majori copia transfundendus! Resp. Mutatio hæc subitanea ex crebriori & largiori infusione foret periculosa, quod patet exinde; quod ex sanguine transfuso animalia vivacia reddita fuerint torpida, ac deinde mortua. Si verò sanguis transfusus inferat alterationem activam, utut prodesse possit, tamen multa adhuc dubia sunt, quæ negotium hoc perplexum reddunt. Nam si sanguis transfusus activè alterat

[N] 2

sani-

sanguinem recipientem, metuendum, ne activa ista alteratio futura sit perquam exigua, propter sanguinis immissi paucitatem, ejusque sub sui successivâ diffusionem in totum corpus impressionem vix sensibilem. Si verò sanguinis Transfusio sæpius repetenda, ita ut activa alteratio prædominetur, adeoque cacochymia sanguinis corrigi possit, hæc tamen adiunt difficultates: Nam quid fieret, si alteratio ista activa penitus in contrarium vergat? & v. g. Maniacus ex sanguine transfuso fiat planè quasi stupidus? item quid fiet, si animalia non semper æquè sana, vegeta, aut iidem etiam affectibus obnoxia, recipiantur? Porro metuendum, ne ante repetitionem sanguinis transfusionis prior impressa alteratio jam evanuerit, antequam novus sanguis accesserit; siquidem sanguis ceu magis connatus sanguini facilius alterabilis erit, & impressio facta minor quàm aliàs à remediis fieri consuevit. Quid? si cum salute agri sanguinis cacochymici alteratio acquisita, alia alteratio à sanguine alieno, & affectibus animalis, non minus funesta, quàm prior inducatur, ita ut periculum sit, ne homo ex copiosi sanguinis, v. g. vitulini aut agnini, infusione mores & ingenium seu animum beluinum stolidum & insipidum induat! Dicis: Tamen hoc pro morum ac temperamenti mutatione aliquid faciet, nam stupidus per sanguinem animalis generosioris infusum fiet alacrior; item Maniacus per sanguinis asinini transfusionem, qui circa aures imprimis extractus, multum in Mania à quibusdam commendatur; vel etiam per taurinum sanguinem redditur mitior. Respondeo: Res tamen adhuc est dubia, adeoque periculum, ne spiritus influus transfusus cum spiritu insito invicem colluctentur; item ne sub tali sanguinis insigniori incremento damnum, imò totius animalis interitus, sequatur.

II. Conclusio secunda confirmatur, quod cacochymia ut plurimum non tam causa quàm effectus & productum morbosum sit, ut, licet cacochymiam sanguinis emendare velis per Transfusionem sanguinis boni, stante tamen & vigente radice, ex qua cacochymia oritur, eandem tollere non poteris, sed palliativè saltem, non verò radicaliter, causam morbi tollitur: sic v. g. in lue venerea cacochymiam sanguinis, à tantillo contagio venereo per fermentum, vi sese multiplicandi pollens, inductam, stante radice morbi, corrigere non poteris.

III. Confirmatur Conclusio exinde, quia, si non tam cacochymiam ipsam, quàm exinde sequentes qualitates sanguinis vitiosas corrigere velis, hæc erunt primariae, nimirum vel nimis sanguinis æstus vel tepor, vel acrimonia: Æstum sanguinis non poterit

Chirurgia Transfusoria corrigere, quia fervidissimus sanguis ad transfundendum recipitur, qui æstum illum potius augebit, adeoque idem esset, ac si oleum igni adderetur; non teporem corrigeret, quia calor, qui in sanguine gliscit, est vitæ immediatus comes; hinc vita superstita calet sanguis, eadem imminuta tepet, tandem verò destructa vitâ, friget: hinc sanguis ex se non calet, sed ex spiritu insito, & motu intestino particularum salinarum acidarum cum terreis tandem emergit calor, juxta Præsuppositum quartum.

Cum itaque sanguis transfusus ex se non caleat, sequitur, quod & sanguinis recipientis teporem corrigere nequeat. Denique pro acrimonia sanguinis corrigenda Transfusionem sanguinis aliquid prodesse concedimus: Sic sanguinis agnini vel viculini Transfusio, imprimis repetita, utique aliquid in Maniacis proderit: Verum pro acrimonia, v. g. scorbuticorum, vel tabe correptorum, sanguinis transfusio vix aliquid conferet: sed quid hic opus est sanguinis Transfusionem, cum gelatina ac diætâ lactea, beneque nutriens ex seminibus cerealibus, idem longè tutius ac jucundius præstare valeat.

CONCLUSIO V.

Pro vitiis partium solidarum restituendis sanguinis Transfusio nil valet.

Ex Pathologicis notum est, universam corporis nostri machinam spiritus, humores ac partes solidas, morbi esse subjectas. Quod verò pro vitiis partium solidarum corrigendis Chirurgia Transfusoria nihil valeat, probatur:

I. Ex eo, quod, uti Præsupposito quinto confirmatum, sanguis activè nil conferat visceribus, nisi in quantum sub ejus mole spiritus influus undique radiat ac dispergitur, adeoque saltem passivè & per accidens visceribus minus prodest, iisdem scilicet nutrimentum suppeditando. Verum cum huic accidentali usui pro nutrimento laudabili subministrandi media diætetica longè sint tutiora, non habemus ad Chirurgiam Transfusoriam refugere.

II. Ex enumeratione morborum partium solidarum, quibus singulis nil potest conferre sanguinis Transfusio. Morbi autem viscerum & partium solidarum affligunt eas vel ratione materiæ, ex quibus partes solidæ constant, vel ratione formæ organicæ, quatenus certo usui inserviunt. Morbi isti materiæ partium solidarum dicuntur alias communiter morbi Intemperiei, nempe particularis; sicuti Morbi Formæ Organicæ aliàs dicuntur Morbi Organici. Intemperiei morbi dicuntur ita à posteriori, quatenus scilicet cognoscuntur à qualitatibus suis mutatis:

Quali-

Qualitates vero mutatae sequuntur texturam particularum minimarum mutatam, ex quibus partes, ac partis partes, constant. Hæc verò textura materiae vitatur propter vitiatam nutritionem, quæ vitatur à spiritu influo. Cum autem horum morborum, scilicet intemperiei, fundamentum sit spiritus vitæ insitus vitatus aut læsus, hunc sanguis non poterit restituere, nec immediatè per nutritionem, nec mediate per spiritum influum, quia spiritus influus insitum saltem excitat, insitus verò influum amplectitur & secum concentrat, ita ut influus, ceu universalis, se habeat tanquam subiectum patiens, insitus tanquam subiectum agens. Morbos Formæ Organicæ quod attinet: sunt vel in conformatione, vel in compositione: Sciendum enim, omnem formam organicam, quatenus illa ad integritatem corporis humani conspirat, esse vel ejusdem debitam conformationem, quæ consistit in tribus istis dimensionibus, longitudine, latitudine, & profunditate; & hæc vel concava, vel consolidata, vel ejusdem debita compositione, quæ in legitimo situ & connexione partium consistit. Quomocunque vitatur ista formæ organicæ confirmatio, nullo modo huic poterit succurrere sanguinis Transfusio: Neque enim longitudinem aut profunditatem restituet, cum sanguis nil agat in motu locali, sed tantum passivè se habeat, & perpetuò à corde moveatur; unde nec viscidum resolvere, nec impetu facto obstructions aperire, quin potius stagnare, aptus natus est: Neque etiam corriget morbos compositionis, nec in situ, v.g. in herniis, nec in unionem & connexionem, ubi nimirum continuitatis partium solutio facta, v.g. in vulneribus in quibus materiae nutritivæ respectu plus minus temperatae, consolidationem passivè seu objectivè, non efficienter promovere solet. In ulceribus insiti spiritus vitium corrigendo sanguis passivè se habet, quod à pure subinde inficitur; quæ materia vitiosa potius diutius aut lacte, quàm sanguine faciliè alterabili, emendanda venit.

III. Quia sanguis ægri proprius ac naturalis non sufficit per se corrigendis istis viscerum vitiis, quin potius ab iisdem visceribus sanguis plus minus alteratur: Ergo multò minus sanguis alienus heterogeneus corriget viscerum vitia, quin hic interdum promptius labem vitiosam recipere, & ita malum augere possit.

IV. Probatur Conclusio ex eo, quod dubium sit, an sanguis recens transfusus visceribus prosit? an magis noceat; ut in explicatione Præsuppositi tertii monitum. Nam recens transfusus alienus, ob particularum suarum minimarum aliam atque diversam rexturam non aequè cribrari per omnes & an-

gulissimos corporis poros, neque meatulos viscerum ita penetrare poterit; unde periculum, ne sanguis iste recens transfusus pororum conformationem, vel tonum fibrarum in visceribus immutet ac lædat: id quod in hominibus calidioribus post sanguinis Transfusionem narium stillicidium, ac mictus cruentus superveniens, testatur: vid. *Cap. I. Experim. 15.*

CONCLUSIO. VI.

In Februm Cura nullus sanguinis Transfusioni est locus.

Probatur:

I. Quia nulla in febribus Transfusionis sanguinis est indicatio seu usus nullus, scilicet febris est motus naturæ, & aliquod medium inter actionem naturalem & præternaturalem, adeoque est actio quasi non naturalis, sub qua natura per spiritus influi impetum, & hinc natum concitiationem contentorum fluidorum motum, tam intestinum quam localem, peregrini aliquid sanguini permixtum, sponte de se amoliri satagit, idque in sui conservationem, & sic sanguinis Transfusio nullum hic obtinebit locum. Dum igitur febris motus est naturæ, non est sistendus ipse motus, sed potius promovendus. Hinc cura februm est vel vera, vel palliativa. Vera & legitima februm cura in eo consistit, ut Medicus, tanquam naturæ minister, conatum naturæ promovendo, impedimenta removendo, inimicum istud vitiosum, quod spiritum influum ad extraordinarium, & p.n. impetum provocat, ac in specie acidum illud vitiosum, omnibus in febribus præsens, alterando, corrigendo, & correctum maturè eliminando, adjuvet.

Dico legitimam hæc esse februm Curam ad differentiam curæ palliativæ; quæ est, quando vel spirituum imperus sistitur per opiata, vel quando causâ occasionalis concentratur & figitur, ut ita ad tempus, ceu caput mortuum, febris quiescat; vel quando acidum vitiosum infringitur ex parte, nec tamen educitur, hinc levissimâ datâ occasione denuò insurgit. Sed ab his Curis palliatis plus mali quàm commodi accersitur: Nam per calcinatum Strobelbergeri, per Chinam Chinæ, electuarium dialcordii, corallia, cornu cervi ustum, item per salia fixa intempestivè adhibita figitur quidem acidum; sed, ut dixi, plus mali quàm commodi, inde resultat, cum ab hac Cura vel recidiva vel febris interdum multiplicata, aut magis acuta resurgat, vel febris antè acuta in lentam hecticam degeneret, vel loco ejus morbus chronicus anomalus, ex viscere quodam à causa occasionali malè affecto ordinariò oriatur. Quantum igitur natura prodest suis ægris per febrim excitatam & ritè

[G] 3

cura-

curatam, tantum nocet Medicus per febrim intempestivè oppressam. Omnibus igitur his naturæ & artis intentionibus, dum scilicet vel natura per motum interdum hostile extraneum eliminare satagit, vel per artem illud vitiosum evacuare studemus, nullo modo prodest vel confert sanguinis Transfusio: neque enim à sanguine alieno confuso causa occasionalis corrigi, nec spirituum ac sanguinis motus nimius compesci potest, adeoque pro februm qualiumcunque cura sanguinis Transfusio nullum habet locum.

II. Quia sanguinis Transfusio in febrium cura nociva esse videtur. In febre enim motus sanguinis, hinc & aliorum fluidorum corporis, intestinus est, p. n. turbatus, ac plus minus vitiat: id quod ex pulsu mutato, hæmorrhagiis, aliisque excretionibus symptomaticis patet abunde. Quod si jam sanguis alienus & spiritus transfundatur, nonne turbæ istæ in sanguine exinde fiunt peiores, & œconomia animalis gravior hinc læsio: sive enim activè, sive passivè alteretur sanguis transfusus, gravius tamen exinde malum febricitanti conciliabitur; si enim inferat alterationem activam, malum erit gravius; si verò passivam, absque ullo commodo instituetur.

III. Quia transfusio sanguinis nulli febrim in specie accommodata. Febrium triplex est differentia, inter quas optima est, quæ desumitur à subjecto radicationis & inhaesionis. Duplex enim est febrium subjectum: (1) radicationis, ubi causa vel sones morbosus latitat, (2) inhaesionis, in quo omnes febres conveniunt. Ex subjecto radicationis omnis febris ratio desumitur; vel enim in spiritibus relidet, vel affligit partes fluidas, vel solidas. Hisce modis tantum subjecto radicationis febres differunt. Conveniunt autem omnes febres subjecto inhaesionis, quod est spiritus influus: id quod patet ex opiatis in febribus adhibitis, quæ spiritus influos compescunt, ac febres supprimunt; partim est massa sanguinea: quod probat mutatus pulsus, & quod nunquam v. g. febricitare dicitur in febribus symptomaticis ab ulcere vel vulnere, nisi mutatio in sanguine, primario ex pulsu, hinc ex aliis accidentibus, observetur. Porro spiritus in febribus malignis primario afficiuntur; sanguis ac lymphæ, aliique humores, in febribus putridis benignis, & intermittentibus, & primariis; partes verò solidæ in febribus symptomaticis, intermittentibus & continuis secundariis.

Quod ad febres malignas attinet: in his ordinario spiritus affici exinde patet, quod ægri iisdem correpti viribus sint exhausti, & hinc sæpius pessimè se habeant, pulsus licet & urina minus, aut non adeò insigniter, mutatis, certo indicio, sanguinem minus esse

mutatum. Ergo spiritus sunt, qui primario in febribus malignis afficiuntur: Hinc etiam est quod omnes febres malignæ, & quidem solæ, sint contagiosæ. Contagium aliàs dicitur id, quod sub minima mole est maximæ efficacitæ, & unicum & determinatum affligit subjectum, quo ipso naturam suam spirituosam ac penetrantem insinuat; cujusvis enim subjectum immediatè sunt spiritus, quorum ratione contagia non omnia subjecta, sed saltem appropriata, seu cum subjecto contagioso singulariter conspirantia, h. e. in spiritu vitali symbolizantia, affligunt, sive universalis sive particularis sit morbus: ibi influus, hic insitus, affliguntur spiritus, e. g. pestis, scabies, dysenteria; & uti nullus morbus est hæreditarius, nisi qui spiritum influum & insitum fortius penetravit, ita nullus contagiosus, nisi qui alterutrum affecerit; hinc nullæ aliæ febres, nisi epidemicè grassentur, non sunt contagiosæ, nisi malignæ. Dum verò non nisi determinatum affligit subjectum patet, solum esse spiritum, qui in febribus malignis contagiosis afficitur: Sic. v. g. Pestis humana non afficit bruta; ovina non vaccas velesque, &c. quia in omni Contagio requiritur symbolismus quidam inter spiritus, ita ut spiritus in sui similem feratur.

Dicis: Prostant tamen exempla alias quoque febres fuisse contagiosas! Resp. V. g. hoc est: sic notabile est, quod Platerus pag. 94. refert de quodam, febre continuâ ardente, ac cum delirio conjuncta, laborante, qui ex compressione manus uxoris suæ eandem febricitantem ac delirantem reddidit: id quod abunde testatur, febrim hanc apparenter benignam, fuisse quoque contagiosam ac malignam. Facit huc quoque exemplum Lotichii, qui in observationibus suis pag. 36. refert, quod mulier quædam ex viâ purgatione, marito ex febre laboranti propinata, post triduum quoque purgaverit. Verum, quando ejusmodi febres benignæ, præter malignas, fiunt quoque contagiosæ, illud tum fieri per accidens, quando spiritus insitus nimis, & quidem adeo potenter, est alteratus ac affectus, quàm aliàs in febribus malignis affici solet; exinde enim factum, quod imaginatio fortis mulieris modo dicto ob sortem in spiritum suum impressionem, eandem in febrim deiecit.

Sed ut redeamus ad febres malignas, in his naturæ opus est, fermentum istud acerrimum volatile seu spirituosum, quod spiritus influos inquinat, subigere, alterare, & per peripheriam corporis expellere; hinc & observantur variolæ, morbilli, purpura, petechiæ, erysipelata, bubones & anthraces, ordinariæ febrium malignarum pedissequæ; unde & Cura febrium malignarum Medicus ad naturæ

naturæ imitationem, præmissis præmittendis, imprimis verò Vomitoriis, volatilia diaphoretica in toto febris cursu sibi habeat commendatissima, ut extraneum illud malum per diaphoresin ad peripheriam corporis deducat; si ve jam spiritus aut salia illa volatilia sint mæra, ut spiritus succini, viperarum, aut sal volatile cornu cervi, viperarum, & cardui benedicti, imprimis quando sanguinis intensior est æstuat; si ve oleosa ac plus minus aromatica, ut salia volatilia oleosa, compositiones theriacales, &c. His ergò tam naturæ conatibus, quàm altis moliminibus, nil adjuventi adfert sanguinis transfusio; neque ejusdem exclusioni aliquid conferet.

Dicis: Sanguis tamen transfusus sanguini nostro communicatus aliquid roboris addet spiritui influo, fermento febrili inquinato, ad idem fermentum expellendum: sed Respondeo:

1. Spiritus sanguinis alius est peregrinus, adeoque opus est, ut prius spiritui nostro assimiletur ac approprietur.

2. Periculum est, ne sic motus naturæ, tam secretorins quàm excretorius turbetur aut sufflaminetur ad tempus.

3. Parcior sanguinis Transfusio parum emolumenti, largior verò nunc hæmorrhagias, nunc mictum cruentum, inducit: quæ symptomata sunt mali & periculosi ominis, cum naturæ perturbatæ sint indicia.

Cum igitur hæc sequantur symptomata, reverà periculum est, ne hoc ipso plus incommodi quàm commodi ægro adferatur. Notum porrò est, quæcumque sanguinis emissionem, tam in incremento quàm statu februm malignarum, si non semper tamen ut plurimum, paucis exceptis exemplis individualibus, esse nocivam & periculosam, non quidem propter virium prostrationem, quæ ex moderata venæ sectione tam enormis esse non facillè potest, sed potissimum ex hoc, quod sanguinis alieni infusio æquè sit periculosa & nociva, quàm proprii sanguinis detractio.

Denique jam in Præsuppositis monui, bruta sub transfusionis negotio admodum alterari. Si itaque cum Transfusionem sanguis & spiritus animalis affectuum impetu alteratus, ac metus aut terroris idea insignitus transfundatur, ejusmodi sanguis alteratus plus nocebit, quàm proderit, imò magis vires hoc ipso deicientur, & quasi subigentur. Sin verò ex animali ferociore (quod quidem vix fieri possibile) fiat sanguinis Transfusio, ita ut spiritus exinde reddantur ferociiores, turbando naturæ conatus, & pervertendo spirituum impetum, quam facillè ejus motus impeditur, & ita malum plus ferè augetur, quàm natura juvatur. Ut taceam, quamvis sanguinis emissionem in incremento vel statu maligna-

rum, qua talium esse periculosissimum, quis vatem se præstiterit, an immisio tantum profutura sit? Imò cum parcior Transfusio parum beneficii præstet, largior verò nunc mictum cruentum, nunc hæmorrhagiam narium post se trahat, motusque hi motui ad extra excretorio naturæ contrarii, hinc plus nocebit Transfusio, quàm proderit.

Quod febres humorosas, & in massa sanguinea aliisque humoribus, attinet: sunt illæ vel continuæ, vel intermittentes. Non differunt hæc duæ essentialiter, sed accidentaliter tantum, quia facillè inter se invicem sunt permutabiles: Nam febres continuæ sæpius fiunt Tertianæ intermittentes, & contrà. Igitur in radice & causâ occasionali hæc duæ febres conveniunt, saltim prout majori vel minori fixitate gaudeat sanguis. Si paulò fixioris sit naturæ sanguis, febres fiunt intermittentes; si volatilioris, continuæ: sic Bierlingius in Adversar. suis pag. 17. refert exemplum cujusdam, qui ex abusu Casei Hollandici primo febre tertianâ correptus, quæ post facta quotidiana; ex hac rursus incidit in quartanam, ex hac denuo tertianam, donec tandem per biennium demum febris finiretur. Porrò continuæ febres sunt vel sanguineæ vel lymphaticæ; quam distinctionem satis utilem omnium primus Sylvius in Praxi sua introduxit; nam de febribus lymphaticis apud alios nihil, cum tamen hæc in hemitritæis lentis, &c. multum habeant in recessu. Distinguuntur verò ita febres continuæ, non exclusivè, aliis humoribus, v.g. bile, chylo, aliisque fluidis, rejectis; sed inclusivè, iisdem scilicet inclusis, utur à potiore, sanguine scilicet & lymphâ, fiat denominatio. Continuas quod attinet: in his motus naturæ est, vel ut fermentum heterogeneum, è vitio primæ digestionis genitum, seccernatur è massa sanguinea ac lymphâ, vel ut sanguis & lymphâ ex rerum non naturalium in consueto usu, & inde nata alteratione, in novam aliquam diathesin commutentur.

Duo hic consideranda sunt:

1. Ut massa sanguinea ac lymphâ depurentur.

2. Ut earundem crasis immutetur.

Exemplo rem illustrabo: si quis v.g. hodierno tempore ex mistura ista intulsa vini cerasei febrim ardentem incurrat? commistura ista fermentando aliquid heterogenei fermentati ob erratum primæ digestionis sanguini communicabit, & ita natura febrilem concipiet motum. Hoc exemplum spectat ad prius. Posterioris exemplum sit peregrinans aliquis, qui ex mutata & inordinata diætâ febrim continuam benignam incurrit. Hos verò motus in febre continua natura perficit per concitatiores particularum minimarum motum

tum intestinum, inter quas imprimis excellunt duo ista activa instrumenta communia mechanica, acidum scilicet & urinosum, quorum motu intestino partim vitiosum sanguini commistum corrigitur, separatur, vel motu fermentativo præcipitatur, partim particulæ minimæ in novam texturam coeunt, novamque constitutionem ac diathesin acquirunt. Utroque in statu, quicquid correctum fuerit, hoc natura per diaphoresin largiorem expellere solet, idque ferè motu spontaneo & quasi critico, rariùs per alias vias excretorias hoc accidit. Ad hunc motum imitandum Medici plerumque propinant, vel salia volatilia, macria diaphoretica, ut aurum cornu cervi, vel absorbentia fixa, ut coralliata, antimoniata, salia urinosa, &c. Hisce nihil confert sanguinis Transfusio:

1. Quia metuendum, ne à sanguine alieno recipiens sanguis magis turbetur, & ita naturæ conatus impediatur.

2. Ne sanguis alienus sui miscela massam sanguineam magis inquinet, ejusque depurationem plus minus impediat.

3. Metuendum, ne sanguine alieno sanguis recipiens in novam immutetur diathesin: sic v. g. cum vinum Rhenanum consueto tempore se depurat præviâ turbatione & fermentatione, post clarescit. Quod si in hoc fermentationis actu aliquid vini Hispanici infuderis, nullum dubium, quin motum illius magis perturbes, & vinum, ut sic dicam, cacochymicum reliqueris.

Quod febres intermittentes attinet: dubium est nullum,

1. Fomitem seu focum earum in primis viis seu speciatim in ventriculo, ejusque digestionem alterata, residere. Circa has natura conatur resolvere fomitem viscidum, ac corrigere fermentativum acidum; hinc omnia huc respiciunt, ut scilicet viscida incidantur, ac p. n. corrigantur. His scopis nil confert Chirurgia Transfusoria, sed potius, uti notum, quod lac cuivis febricitanti vel assumptum vel infusum, ob facilem sui alterabilitatem noceat, ita periculum est, sanguis transfusus plus noceat, quam prosit.

2. Quemvis paroxysmum febris intermittens idem esse, quod febris parva continua, per depurationem sanguinis finiens mediante sudore: unde eadem difficultates, quæ premunt sanguinis transfusionem in febribus, continuis, premunt quoque in cura febrium intermittensium. Porro, quando sanguinis Transfusio instituitur, fit illud vel tempore paroxysmi, vel post paroxysmum: Non prodest tempore paroxysmi, quia tunc frustranea foret: Ergo neque etiam post paroxysmum.

Dicis: In diuturnis febribus intermitten-

tibus, in quibus bilis fit inertior, tonus hepatis vitiatur, sanguisque fit acrior, ad diathesin acetosam declinans, in tali casu tempore remissionis utique posset Chirurgia Transfusoria institui! Respondeo: Utur tolerabile hoc esset, tamen periculum est, ne alteratio sanguinis à sanguine alieno paroxysmum febrilem exasperet, vel alium typum febri inducat. Ergo neque in Paroxysmo declinante Chirurgia Transfusoria est instituenda, quia tunc frustranea foret, vincente jam naturâ, seseque ab extraneo illo sibi commixto liberante: Neque etiam in statu paroxysmi proderit; tunc enim nihil molierendum, ne turbetur naturæ motus, sed liber ipsi concedatur: Nec in principio, quia periculum, ne per sanguinem alienum motus febris intermittens in sanguine vel suspendatur, & ita cura evadat palliativa & nociva, vel turbetur motus naturæ febrilis intestinus, & ita gravior ejus lucta & periculosior fiat paroxysmus. Quod si post paroxysmum largus sudor prodeat, quod natura suâ sponte extraneum foras excludere nitatur: Ergo tunc sanguinis Transfusio absque emolumento instituitur.

Febres denique ex solidarum partium vitio seu symptomaticas quod attrinet: neque in illis locum habet Transfusio sanguinis, quia

(1) Sanguis transfusus in se, & qua talis non secus ac sanguis ipsius subjecti ægri, non valet positivè partium solidarum vitia, ideoque nec inde natas febres, remove.

(2) Speciatim febres comitatæ accidentales, seu quæ occasione inflammationis partium solidarum oriuntur, reverà sunt symptomaticæ: sic v. g. in Erysipelate cruris, item pleuritide sæpius recurrente, primariò peccat Topicum, quod semper inhæret, & juxta Helmontium in parte affecta corrigenda semper spinam infixam relinquit; Ita in erysipelate cruris semper hæret acidum vitiosum, quod occasione externa excitatum inflammationem, & hinc febrim, excitat. Cum ergo sanguinis Transfusio non valeat vitium illud topicum corrigere, neque etiam febrim inde ortam corrigit: si verò sanguis paulò sit intensior, promptius per absorbentia aut diaphoretica volatilia macria, quam per sanguinis Transfusionem, corrigitur.

(3) In cæteris febribus symptomaticis, plus minus lentis v. g. ex abscessu mesenterii suppurante, ex pure pulmonis exulcerati, aut aliis vulneribus gravioribus præsertim in loco nerveo, nil quoque valet sanguinis Transfusio. Hæ febres etiam sanissimis, occasione externâ lædente v. g. vulnere, supervenire possunt. Quæ vitia cum sanguis proprius, qua talis, non possit corrigere, multò minùs sanguis alienus. Quod si verò à posteriori his malis aliquid opis conferat sanguinis Transfusio,

fusio, id longè melius per media diætetica, quam per Chirurgiam Transfusoriam, fieri potest.

CONCLUSIO VII.

Cachecticis, Hypochondriacis, Scorbuticis, Ictericis, cordisque Palpitatione laborantibus, non confert Chirurgia Transfusoria.

In uno complexu hîc morbos chronicos colligere placuit, cum in radice omnes plus minus ferè conspirent.

Quod verò his nihil conferat Chirurgia Transfusoria, probatur ex eo:

I. Quod morbi chronici in genere ferè primam originem habeant in primis viis, adeoque è prima digestionè, ejusque perfectione, plus minus vitiata. Huic primæ digestionis errato, ceu morbosum productum, subinde viscerum internorum ac abdominis supervenit vitium, quod morbum chronicum durabilem reddit. Jam ad vitia hæc, quæ in genere in cruditate acida, in specie in sapore specifico acido, consistunt, Chirurgia Transfusoria nec immediate, prodesse potest, quia vitia primæ digestionis non corriguntur in secunda, unde nec cruditates chyli, sanguini permixtæ, corrigentur; nec mediatè ad ea confert, quia sanguini transfuso cum ventriculo & intestinis, eorumque functionibus, nullum est commercium, & hoc ipsum imprimis simul valet in affectibus hypochondriacis, ex cruditate acida fermentativa natis, in quibus Chirurgia Transfusoria nil potest.

II. In chronicis talibus affectibus duo sunt distinguenda.

1. Radix mali seu sedes fomitis morbo-
sa, qui est visceris quoddam erratum, cujus vitio morbus chronicus supervenit.

2. Productum hujus morbi chronici, nimirum dyscrasia sanguinis inde nata.

Sic v. g. Erratum primæ digestionis, sub quo non ritè spiritalis fit chylus, vel ex acido fixo macro hypochondriaco melancholiam, adeoque sanguinis dyscrasiam acidam, scorbutum, vel simile quid, infert. Erratum primæ digestionis est radix mali, cui nil conferet sanguinis Transfusio, hoc est productum morbosum, estque dyscrasia sanguinis acrior, acidiuscula. Ad hanc corrigendam forsitan non inepta erit sanguinis Transfusio; sive enim activè sive passivè alteraret sanguinem recipientem, eundem tamen redderet mitiorem. Verum sic non radix morbi, sed saltem productum morbosum, emendaretur. Dein, posito, tantillum posse sanguinis Transfusionem facere, quantum verò exinde massæ sanguinæ accederet emolumentum, cum sanguis ille transfusus à recipiente faciliè alterari, & ita pejor reddi queat. Condu-

Tom. II. Pars 2.

cibilis igitur & tutius videtur, naturæ leges & institutum imitari, ut ita dyscrasia sanguinis Transfusionem emendetur. Atque hæc in specie de scorbutico sanguinis imprimis sunt intelligenda, in quibus dyscrasia sanguinis corrigenda. Tutiùs & commodius lac cum succis vegetabilium antiscorbuticorum imprægnatum, quàm dubia Transfusio substituitur.

III. Optima chronicorum horum morborum remedia sunt, potenter acidum in primis viis absorbentia ac abstergentia. Inter hæc verò imprimis eminent Martialia, tum à natura propinata in acidulis, quàm arte pharmaceuticâ in medicamentis. Tantum scilicet est illud acidum peccans, ut vel Marte vel Saturno vel similibus pro sui saturatione indigeat, utut non semper in majori & spirituosiori acido Martialia sufficiant. Si igitur non semper Mars & Saturnus acidum infringere valent, quantum solatii ex sanguinis Transfusionem sperandum? Porro si lac in scorbuticis corrigendis vix semper sufficit, quia ab eorum acido p. n. mox corrumpitur; multò minus sanguis, minus præsertim temperatus, id efficiet. Imò metuendum, ne similiter sanguis transfusus alteretur, & in aciditatem degeneret. Item quantum & quoties infundendus esset sanguis, ut dyscrasiam sanguinis acidam corrigere valeret, ita ut sanguis, & hinc lymphæ, aliaque contenta fluida, depositâ constitutione suâ acidâ p. n. bonam eamque constantem temperaturam contrahant? Posito verò, posse hic aliquid prodesse sanguinis Transfusionem, non tamen Cura esset constans, sed palliativa, dum continuo à visceribus affectis suppeditaretur acidum, & sub digestionis errato chylus vitiosus, à quo sanguis denuò corrumpetur.

IV. In cachexia in specie sic dicta, & ipsi superveniente imprimis intensiori gradu, qui dicitur Leucophlegmatia, notandum: quod primariò in ea peccet cruditas seu caco-chymia pituitosa, ex chylo plus minus vitiosè acido, viscido, tenaci ac glutinoso & hinc ex bile inertiore, minus acri, minus volatili, ac minus penetrante, nata, i. e. in radice de acri volatili oleoso minus participante. Ex his duobus generatur Cachexia, hinc etiam est, quod in cachexia sanguis venæsectione emissus crustam tenacem ac glutinosam, subinde varii coloris sibi supernatantem, exhibeat, quæ crusta candida est chylus sanguini nondum assimilatus, seu cruditas pituitosa ac acida, adeoque chylus vitiosus, nec ritè volatilifatus ac perfectus. Hinc etiam cum sanguis talis sit glutinosus, & cujus textura particula activæ, acidum scilicet ac urinosum, minus se exerere valeant, est quod cessante fermentatione vel turgescentiâ menstruâ cessent,

[O]

& mu-

& mulieribus cacoehymicis menses. Quare cruditatem pituitosam non nisi lentè & tardè tantum, nec bilem etiam inertiolem, acuerè & emendare poterit sanguis, qualiscunque transfusus, cum notum sit, quod sanguis etiam dicatur frenum bilis, à quo partim ejus acrimonia temperetur & mitigetur, partim impetus ejus volatilis activus coërceatur. Equidem bilis generatur ex cremore & fluore sanguinis, & sic ex parte oleosa sanguinis volatili, adeoque bilis est concretum quasi aromaticum, constans ex acido volatili subtiliter saturato, cum intermixto copiosiori pingui, unde emergit liquor falsus, bilis. Hujus bilis subtilis frenum est sanguis, cum eandem coërceat. Hujus verò inertiam, uti dictum, sanguinis Transfusio corrigere non potest, quia vitium primæ digestionis non corrigitur in secunda. Ut taceam, si forsan sanguis transfusus affectu pavoris & terroris, aut agonix, vehementius fuerit insignitus, à quo spirituum impetus cohibentur, tunc non poterit non plus nocere quam prodesse sanguinis Transfusio, cum ex his terroris ac intensioris pavoris, aliisque animi affectibus, in quibusdam cachexia orta observata sit. Si igitur sanguis ejusmodi transfunderetur, spiritus cachecticorum magis exinde languescerent, ac corrumperebantur.

V. Hisce morbis chronicis meritò etiam accensendus est Icterus. Icterus verò quilibet est morbus, vel secundarius vel primarius: secundarius est iste, qui alium morbum, tanquam effectus suam causam sequitur; sive jam florescat criticè, i. e. prægressà coctione materiæ peccantis, sive symptomaticè, citra tamen coctionem: sic v. g. febris acutæ continuæ septimo aut undecimo die supervenit icterus, quod bonum est signum: econtra si in eadem febre sexto, octavo, vel alio die, icterus effloruerit, est icterus symptomaticus. Hic malus, ille bonus. Sic non rarum est, passioni hystericae graviori supervenire icterum. Novi mulierem, quæ è graviori iracundia intempestivè foetum peperit, & alterâ die tota exinde facta fuit icterica. Icterus primarius est, qui ex se ipso sine alio morbo ægrum affligit. In ictero secundario evacuando sanguinis Transfusio est invalida, cum ad primarium respiciendum sit morbus. Primarium igitur icterum quod concernit, circa hunc observandum:

1. Acidum austri vitium ingens in primis viis.
2. Bilis vitium vel in substantia, vel motu, natum vel ex propria culpa, quando nimirum in folliculo fellis ipsaque bile hæret vitium, vel ex hepatis culpa, quando nimirum hepar est scirrhum.

Hæc bilis vitia aliam & meliorem non

elaborabunt, uti nec, ubi glandulæ hepatis scirrhusæ deficient in scirrhusitate, certè, quod si icterum consideremus, hæc duo etiam dicta vitia ordinariè in ictero occurrunt. Quibusvis his occasionibus neutiquam satisfaciet sanguinis Transfusio, non acidum austri sanguinis in primis viis, undecunque scaturiens, corrigit, propter argumenta suprâ de morbis chronicis allata; cum vix Martialia vel hæmatites aut lapis cæraunius sufficiant: neque hepatis labem restituere valet sanguinis Transfusio, qui viscerum vitia corrigere non possit, nec bilem corrigit (cum bilis materialiter generetur ex sanguine, & sic sanguis se habeat passivè, non activè) nec calculos in folliculo fellis collectos, nec alia impedimenta, Transfusio sanguinis remove potest. Ergo in ictero frustranea est.

VI. Cordis Palpitatio, Symptoma non infrequens, præsertim in affectibus hypochondriacis, aliisque chronicis, oriturque vel occasione nervorum cordis, id irritantium, vel occasione musculorum cordis cor moventium: sic v. g. in melancholicis hypochondriacis nervi splenis per consensum simul afficiunt nervos cordis, adeoque palpitationem excitant: id quod etiam facit polypus in corde, aut lapilli ibidem collecti, vel acrior pericardii lymphæ, aut sanguis semigrumofus, vel sanguis in scorbuticis occultè acescens, & hinc fermentescens, aut sanguinis stasis circa vasa cordis & pulmonum. Ab his occasionaliter per irritationem præter naturalem palpitatio cordis provocari solet. Jam sive in nervis, sive musculis, cordis sit vitium, sanguinis Transfusio nil opis afferet, cum sanguis immediatè nervosi generis vitia, aut impetum spirituum animalium emendare ac enervare nequeat. Neque etiam musculorum irritationem quomodocunque factam, nec vitia lymphæ, nec stasim sanguinis (ut in mensium defectu & cachexia) Transfusio sanguinis corrigere poterit. Si aliquid conferet, erit illud, ut sanguinis dyscrasiam acidam seu acidam falsam, & hinc natam musculorum cordis irritationem, ac convulsionis impetum, ad tempus corrigere in tantum & emendare, seu non nihil morbum palliare, & paroxysmum mitigare, non verò constanter ac perfectè curare possit.

CONCLUSIO VIII.

Melancholicis & Maniacis quibusdam aliquid videtur conferre sanguinis Transfusio, sed circumspicienda instituta.

Scilicet consuetudinem hypochondriacorum esse solent deliria Melancholica, varia quidem specie externa, omnia tamen in radice seu essentia convenientia, hinc diversimodè sunt permu-

permutabilia. Sic quandoque Melancholia cum risu, mœrore ac furore est conjuncta, diciturque tum Mania, suntque unus idemque affectus, quod patet exinde, quia interdum inter se permutantur. Hinc Heinricus ab Heer *in Obs. suis Oppidò raris obs.* 27. refert de Melancholico quodam, quod omne menstruum spatium in tres quasi dimensus fuerit partes; primò enim erat mœstus ac tristis, secundò venationis studio occupatus, tertio cantilenis & Musicis instrumentis delectabatur, admodum hilaris. Melancholia & mania igitur in radice conveniunt.

His præmissis quæritur: an aliquid opis conferre hinc queat sanguinis Transfusio, cum per experimenta Gallica superius citata constet, quantum Maniaco, aut saltem furioso, conferat? Propterea videndum quousque illis fidendum? & quid illæ in recessu habeant? quare etiam non nisi limitatè & certis cautelis in citata Conclusionè propositis, ubi scilicet dixi, quod quibusdam tantum Melancholicis conferat sanguinis Transfusio, quodque eadem cautè institui debeat, accipienda hæc sunt.

Ergò I. notandum: Melancholiam duplicem habere sciendi modum: vel enim

1. Oritur ex animi pathematis; vel
2. Ex hypochondriorum vitiis.

Illæ à causa externa, & occasione immateriali: hæc à causa interna, & occasione materiali. Non his, sed istis interdum proficua est sanguinis Transfusio. Quoad prius: Platerus in elegantibus suis Observationibus refert de quadam muliere, quæ vespere ex porta urbis occlusa ita consternata, ut exinde per totam noctem alterata ac melancholica facta: Idem etiam refert de homine, ex simplici tantum consternatione melancholico facto. Imo nil vulgatius, quam tristitiam, mœrore, in specie studiis intensioribus, oriri Melancholiam, ex simplici spirituum alteratione. Quoad posterius: nil notius, quam occasione cruditarum acidarum, in hypochondriis collectarum, oriri melancholiam. Par ratio est, quando ex mensium defectu supervenit Melancholia.

Quoad differentias deliriorum melancholicorum, notandum

II. Ratione modi delirium melancholicum esse vel ridiculum, activum, plus minus ferox, aut ipsam tandem abiisse in Maniam; vel triste, cum mœrore, luctu, tristitia, pavore, & anxietate conjunctum.

III. Notandum: distinguendos in deliriis Melancholicorum spiritus ipsos malè primario affectos, & in crasi sua plus minus alteratos, à sanguinis dyscrasia, dum sanguis hic Melancholicus acidus, fixus, macer, minus nutritivus, siccus vulgò dictus, redditur:

Tom. II. Pars 2.

spiritus verò minùs lucidi, in motu tamen constantes, hinc agrypnia, & constans ejusdem phantasmatis imaginatio. Ad ipsum delirium Melancholicum, quatale, parum Transfusio sanguinis, sed ad sanguinis dyscrasiam alterandam plus ita confert.

His ergò præmissis, ita intelligenda est conclusio: Melancholicis morosioribus, & plus minùs Maniacis, iisque à causa externa natis, pro temperanda sanguinis dyscrasia, plus minus acida, proficua est sanguinis Transfusio, non quidem pro scopo eradicandi, sed ad tempus plus minùs mitigandi, ac pro idea ista p.n. spiritibus impressa, utcunque delenda: dum interea aliis modis ipsi succurrendum videtur.

Quod verò in his dictis casibus profit sanguinis Transfusio, Probat:ur:

1. Ex tentaminibus Anglicis & Gallicis suprà allegatis, quibus confirmatur, non deterius, sed melius ad tempus se habuisse Maniacos per sanguinis Transfusionem institutam.

2. Superius in fine Explicationis Conclusionis 4. & Conclus. 7. Membro 2. dictum fuit, sanguinem acriorem & asperiores seu acidiusculum, à sanguine transfuso benigniore temperari (sive activè sive passivè sanguinis Transfusio profit) adeoque ægrum mitiorem reddi. Cum verò melancholiæ diuturnitas ex parte dependeat ex sanguine acriori & acidiusculo, cæteris paribus sanguinis Transfusio non penitus erit frustranea, imprimis cum Melancholici largiorem possint ferre venæsectionem.

3. Spiritus influus & sanguis infusus ex animali mitiori, meticuloso, & naturâ pavido, si desumatur, omninò ideam terroris, pavoris, &c. in se sigillatam unâ secum transferet ille sanguis in animal recipiens. Si verò sanguis potentior ex animali generosiore infundatur, utique idea illa melancholica, occursum potentioris ideæ plus minùs deleta, delirio melancholico mutationem in melius afferet: Sic v.g. Maniacorum Cura est, si in aquam frigidam, idque aliquoties ex improvviso conijciantur ac submergantur, sic ob pavoris, mortis ac agoniæ ideam, supprimetur Maniæ idea. Ita etiam sanguis è vitulo pavido in nostrum sanguinem transfusus delebit ideam furoris: sic persuasiones rationales, item auxilia ridicula curant Melancholiam, quatenus istæ ex directo, hæc ex obliquo, & quasi à posteriori, ideas deliras in spiritu conceptas tollunt: per rationem de Transfusionem secundum Præsuppositum sextum.

Patet ergo ex his, in dictis his Casibus sub statu ita limitato sanguinis Transfusionem utcunque prodesse. Non tamen ex oppposito valet in vitiis hypochondriacis, nec prodest in

[O] 2

affe-

affectibus Melancholicis, à causa interna natis, quia radix morbi non attingitur, nec corrigitur, ut antecedens Conclusio circa hypochondriacos probat. Neque prodest in melancholicis meticulosis, tristibus, qui mori, ac suspendio sibi vitam finire volunt; his magis nociva erit sanguinis Transfusio, propter ideas agoniae ac pavoris communicatas. Metus enim est, ne à similibus ideis agonizantis quasi sub Transfusionem animalis, delirium semel conceptum vel confirmetur vel in deterius immutetur, nisi fortè ex homine sano, robusto, animoso, jocosò, &c. Transfusio fiat.

Sed quoniam idea spiritui influo & sanguini impressa facilè superatur, & alteratur ab iisdem in melancholico, unde etiam iste Parisiensis haud multò post recidivam parilem, si non atrociorē, passus fuit: ob id magis prodest sanguinis Transfusio pro sanguine temperando, & ita spirituum crasin alterando, quàm pro Mania & idea delira ex spiritibus eradicanda. Adeoque illi soli haud fidendum, quin potius aut mitigari, aut palliativè ad tempus inhiberi potest paroxysmus maniae, ut interea de aliis remediis possimus esse solliciti.

CONCLUSIO IX.

Inflammationibus, indeque natis abscessibus & exulcerationibus partium quarumcunque Transfusio sanguinis nil confert.

Inflammationes enim vel oriuntur à causa externa vel interna. Internae vix unquam ex sanguine primariò oriuntur, ut ut vulgò à stagnatione sanguinis deducantur, sed ferè semper subest vitium partis externae topicum, hoc est spina infixa, cujus occasione inflammatio excitatur, sive spina hæc sit transmissum quoddam ex sanguine, sive retentum ex digestionem propria. Fiendi modus hic est: stagnatio sanguinis omnis quasi per accidens supervenit, ut inflammatio in arthritide: v. g. si quis spinam infingat manu aut digito, oritur hinc inflammatio, quia occasione spinæ excitatur dolor, ex fibris imprimis inde irritatis, hinc spiritus influus collidendo cum spiritu insito excitat inflammationes: sic quæ à causa interna oritur, v. g. in erysipellate, angina, hepatitide, pleuritide, inflammatione mammillarum, semper aliquid peregrini dabit occasionem, ut pororum cutis fiat angustia, sanguinis transitus impediatur, & hinc oriatur inflammatio: sic corripitur quis ophthalmia ob sanguinis in oculo stagnationem, propter extraneum aliquod oculis fortè illapsum, seu ob lympham acriorem, unde oriatur inflammatio. Unde & naturæ cura est in omnibus, ut vel discutiaturs sanguis stagnans,

vel ut idem suppuretur, & sub forma puris hostile illud acidum correctum unà ejiciatur.

Stantibus ergò hæc nil proderit Transfusio sanguinis:

1. Quia vitium topicum seu particulare partis affectæ sanguinis Transfusio emendare non valet: multò minùs igitur resolutionem sanguinis stagnantis, nec maturationem, adeoque nec inflammationes.

2. Sæpiùs opus est in inflammationibus, ut instituaturs venæsectio, ut affluxus sanguinis præcaveatur; hinc & derivatoriæ venæsectiones locum habent, licèt sit auxilium ex obsequio symptomatis, &c. dicatum. Quid igitur opus est sanguinis Transfusionem?

3. Inflammationibus ordinariò febres, vel lentæ vel acutæ, sunt junctæ: Lenta enim febris tum oritur, quando inflammatio est in loco minùs sensili, minusque venosò, ut, si fiat inflammatio in mesenterio, mammis, &c. econtrà febris acuta jungitur quidem inflammationi, si sit in loco magis sensili, magisque venosò, ut in pleuritide, hepatitide, &c.

4. Sanguis transfusus alienus est, adeoque in crasi sua ita confirmatus, ut minùs penetrare queat angustias pororum ac meatuum corporum, & hinc nec corrigere, aut curare inflammationes; imò metundum ne stagnans iste sanguis alienus magis inflammationes intendat.

Exulceratio verò quævis habitualis, seu jam facta, radicem suam ac fundamentum habet primariò in spiritu insito, qui vi fermentativa peregrinâ, in aciditate specifica fundatâ, nutrimentum corporis proximum corrumpit, alterat, & saporem dulcem chyli in acorem mutat, inque saniem & pus convertit. Nempe idem est spiritus insitus, qui nutrimentum corporis in pus ac saniem, & balsamum oleosum sanguinis in acrem ac acidum, convertit. Incipienti ergò & fienti partis alicujus exulcerationi, quæ oritur ex sanguinis universali acrimonia, seu imminenti pulmonum erosioni, v. g. in scorbutò, &c. omninò aliquid conferet sanguinis Transfusio, imprimis si crebrior ac copiosior instituaturs, ut hac ratione sanguinis acor temperetur. Verùm ejus loco tutiùs & commodiùs diætâ lactea usurpari potest. Pro facta verò jam ac habituali exulceratione nil aut parum, & non nisi per accidens ac indirectè, sanguinis Transfusio valet, si ex acrioris nutrimenti cum sanguine distributi occasione malum diuturnum reddetur; sed & si crebrior & copiosior Transfusio requireretur, cui diætâ aliave media meliùs satisfaciunt. Nam ut à Transfusionem sanguinis sanguis acrior utcunque temperetur, si tamen malum illud originem suam ex viscere malè digerente, & similem chylum subministrante, vel

vel ita sanguinem alterante, habuerit, palliativum tantum erit omnis sanguinis Transfusio, ad productum morbosum saltem directa, quapropter in exulceratione habituali sanguinis Transfusio est inutilis. Probatur

1. Quia causam mali non attingit.
2. Quia auxilium saltem est accidentarium, adeoque palliativum, & à posteriori tantum juvans.

CONCLUSIO X.

Hæmorrhagiis nimis obnoxii, ac periculosis inde habentibus, sanguinis Transfusio præ aliis conveniens videtur.

Nempe sanguis est vitæ thesaurus, in quo nectar vitale est reconditum; unde quælibet sanguinis excretiones, qualescunque sint, sola menstruatione, certò tamen tempore, exceptâ, simpliciter sunt præternaturales. Nec est, quod quem confundat hæmorrhagia, mensium aut narium, periodicus ac salutaris fluxus; huiusmodi enim excretiones omnes sunt bonum signum malæ causæ, & semper præsupponunt aliquid mali in corpore, licet cum euphoria fiant: sic nemo patietur fluxus hæmorrhoidum, nisi dispositio melancholiæ adsit. Omnis hæmorrhagia verò est accidentalis, qualis est illa, quæ ex improvise, causâ aliàs inconsueta ac fortuita, contingit. Huc pertinent hæmorrhagiæ vulneribus supervenientes: vel est habitualis, quæ fomitem in corpore altius radicatum habet, v.g. dum juvenis spirituosior hypochondriacus crebrius obnoxius est hæmorrhagiis narium. In hæmorrhagia quavis duo iterum sunt consideranda: vel ipsa sanguinis effusio per viam undique apertam: vel concomitans hæmorrhagiam virium ista insignis prostratio & periculosissima exhaustio, adeò ut subitâ earum reparatione opus sit.

Nam pro superiori scopo, nimirum effusione sanguinis, vel ex anastomosi vasorum, vel diætesi facta, nihil confert sanguinis Transfusio; nisi enim sanguinis fluxus cohibeat, frustranea erit omnis Transfusio, adeoque idem esset, ac si quis liquorem in vaspertusum infundat. Ex opposito virium lapsui, adeoque periculo mortis ex hæmorrhagia nimia imminente succurrendo an conveniat sanguinis Transfusio? quaritur. Adeoque conclusio ita est intelligenda, quod in tam insigni hæmorrhagia, in qua ob virium lapsum sanguinis spirituosioris crebrior ac celerior instituta requiritur Transfusio, omninò conveniat. Probo enim id per exempla in experimentis suprâ allegatis, ex quibus constat, quod bruta viribus ferè omnibus exhausta per sanguinis transfusionem tantum non revivixerint ac exinde melius habuerint; &

quidem, quod notabile maximè est, sive ex bruto ejusmodi, sive alterius specie fuerit Transfusio, idem tamen effectus inde secutus: quæ omnia ostendunt, simili ratione ex homine in hominem posse sanguinis Transfusionem institui, & virium imbecillitati ac imminenti mortis periculo succurri.

Certum ergò est, quod in tali casu omninò sit conveniens sanguinis Transfusio. Tria autem sunt dubia, quæ conclusionem hanc premunt:

I. Dubitatur: an valeat consequentia à brutis ad hominem? Fit enim nonnunquam aliquid in illis, quod in hoc fieri nequit: sic v.g. excisio lienis, sæpius in brutis, in homine verò non nisi semel instituta: sic etiam è contra canis grana xxiv. Mercurii vitæ absumit absque alteratione, cum grana duo illius hominem alterent: Sic spiritus vini hominibus nectar est, feli verò præsentaneum venenum. Ergò utique non semper valet consequentia à brutis ad hominem. Respondeo: In hoc quidem casu illud valere omninò, quia in partibus fit comparatio: Ergò nulla hîc est differentiæ ratio, adeoque idem omninò de iisdem est asserendum. Non nego etiam Transfusionem illam in brutis fieri sine aliquali præternaturali alteratione, hinc enim & canes mictu cruento exinde corripuntur; imo posito etiam, simile quid in homine contingere, majus tamen erit emolumentum conservatio vitæ, per sanguinis Transfusionem, quàm aliquale nocumentum per eandem institutam.

II. An vires ex sanguine emisso exhaustæ, vel ita sint afflictæ, ut nec alterandis sufficiant, adeoque nec in tali casu copiosiorum sanguinis Transfusionem ferre possint, vel ex opposito an sufficiant utcunque vires alterandis alimentis, tunc verò jucundius per diætam, quàm Chirurgiam Transfusoriam, negotium sanitatis perficitur: Illo in casu vires exhaustæ sanguinem transfusum sibi assimilare non poterunt, quin potius sarcinæ ejus prementur, imprimis si tali in casu non tantum parca, quàm potius copiosior, Transfusio sanguinis instituat. Respondeo: Dilemma hoc intelligendum est cæteris paribus, nimirum si per alimenta vires restitui possint, id quod obtineri semper non potest. Nam si quis v.g. cani viribus exhausto loco Transfusionis sanguinis jusculis aut carnibus succurrere velit, vix credo, eum supervicturum; cum tamen aliàs per Transfusionem sanguinis periculis hîc occurrere possimus. Sed posito, æquè commodè, citò, & absque periculo, per diætam, ac alimentis viribus posse succurri, tunc concedo utique, non opus esse Transfusionem sanguinis. Si autem id succedere non possit, omninò sanguinis Trans-

fusio est instituenda, nec enim sarcina ejus vires prementur, quin potius experimenta superius allata contrarium testantur, bruta exinde facta fuisse alacriora. Idem ergo omnino expectandum, si ex homine in hominem, seu ex bruto in brutum, fiat Transfusio.

III. Posito, vires per sanguinis effusionem in hæmorrhagiis, esse exhaustas, non tamen sequitur, easdem statim per sanguinis transfusionem posse restitui, quia non tam ejus præsentia, quam debita spirituaſcentia fundamentaliter intendit ac auget vires: Sic qui frigore enecantur, stante sanguinis præsentia tamen moriuntur. Cum verò per effusionem est depauperatus, & spiritus exhausti, sanguis, quâ talis, non restituet vires, nisi convenienter spirituaſcat. Sed sanguis transfusus hic passivè se habet, cum in se faciliè vim ab animali, unde profluxit, vitalem in pressione amiserit, quam vel conservare, vel potius certo modo modificare, debet sanguis animalis recipientis: Sed hoc deficiente & exhausto, metus est, ne alienus sanguis vi vitali & ipse pedetentim deficiat, adulationem corruptivam induat, & ita nil commodi in ægrum resultet. Jam verò, cum sanguis transfusus sese assimilare debeat sanguini recipienti, adeoque spirituaſcere, vix illud fieri poterit per sanguinis Transfusionem copiosiore. Tentandum ergò foret, an tali supposito in casu sanguinis humani repetita Transfusio extremo periculo ægri succurrere possit, præsertim cum experimenta superius citata doceant, optimè se exinde bruta habuisse.

CONCLUSIO XI.

Contabescentibus & Atrophia correptis inutilis est Chirurgia Transfusoria.

Pro meliori hujus conclusionis evolutione & intellectu præsuppono:

I. Nutrimentum corporis esse duplex:

1. Chylum,
2. Sanguinem.

Chylus pro partibus nervosis, veteribus spermaticis dictis; sanguis verò pro partibus sanguineis nutriendis, inservit. Sicuti autem fibræ sunt stamina partium solidarum fundamentalia, quæ per totam vitam durant, & semel deperditæ nunquam restitui possunt, pro his verò nutriendis chylus inserviat, sequitur: utique chylum esse primum partium nutrimentum; sanguinem verò secundarium, cum sanguis pro robore tantum ac functionum fibrarum officio fibris accrescat.

II. Atrophiam ac tabem contingere, vel vitio objecti nutrientis, nimirum alimenti, quando illud minus est appropriatum, vel vitio nutriendi subjecti, i.e. ipsius corporis,

quod nutriri dicitur: Sic v.g. supponamus duo esse subjecta, quæ iisdem alimentis in eadem mensa vescantur, horum unum pinguescit, alterum fit macilentum, quod fit ex vitio nutrimenti, quod non tam benè in hujus, quam illius ventriculo digeritur; ventriculi enim digestio præest omnibus aliis digestionibus.

III. Atrophiam fieri vel vitio chyli, vel sanguinis: De illa, quæ fit vitio chyli, hîc jam non loquimur, cum huic cum Transfusionem sanguinis nil sit commercii; sed potius de hac, quæ fit sanguinis vitio, quâ partes corporis sanguineæ enervantur, exhaustiuntur ac contabescunt, ut etiam partes nerveæ rore suo nerveo spoliatae contabescere observentur. Vitium ergò tale in sanguine, quod hîc consideratur, est, quando illa atrophia à nimia sanguinis acrimonia causatur, v.g. in scorbuto, phthisi, &c. in quibus acrior est sanguis, nec particulis suis oleosis ac dulcibus partes nutrit, sed potius easdem acrimoniâ suâ corrodit, rorem nutritivum abrodit, resolvit, liquefacit, & partim per urinam, partim insensibilem transpirationem eundem evacuat.

His igitur præsuppositis conclusio ita intelligenda venit, quod scilicet iis, qui ex acrimonia sanguinis contabescunt, inutilis sit sanguinis Transfusio, quod probatur:

(1.) Quia acrimonia sanguinis oritur vel ex vitio alimenti, vel ex vitio primæ aut secundæ digestionis, vel denique visceris alicujus interni. Vitio alimenti oritur illa acrimonia, quando alimentum est inconveniens, aut cibi saliti, aut fumo indurati à non assuetis assumuntur. In his sanguine alias oleoso ac dulci præditis acrior fit sanguis. Ex vitio primæ & secundæ digestionis in scorbuto, vel ex vitio rerum non naturalium, alimentis, iracundia, &c. oritur acrimonia, quando chylus fit acrior. Denique vitio visceris alicujus & partis solidæ, v.g. in ulcere hepatis, aut pulmonum, aut mesenterii fit acrimonia, partim quod partes benigniores in pus acre & salum convertantur, partim quod ab hoc pure sanguis inquinetur, ac acrior reddatur, adeoque ad nutritionem partium solidarum fiat ineptus. Omnibus igitur his causis acrimoniæ sanguinis nil opis affert sanguinis Transfusio, quin potius metuendum, ne ipse sanguis transfusus, dum sanguini recipienti est assimilandus, itidem ab eodem inquinetur, alteretur, adeoque malum potius deterius, quam melius, reddatur. In tali igitur casu lac potius, quam sanguis infundendus foret.

(2.) Quod longè commodius, jucundius ac tutius per diætam appropriatam, præsertim lacteam, imò etiam certius possit hoc obtineri, quam per sanguinis Transfusionem. Sanè lac ejusque diætâ diutius continuata crasin sanguinis sola emendare valet. Sanguis

guis verò nisi crebrius transfundatur, scopum non facile obtinebit, præprimis cum hæ quoque infusiones crebriores tam nocere, quam prodesse, possint.

(3.) Posito, non tamen concessio, temperari sanguinis recipientis acrimoniam, adeoque sic succurri atrophie per sanguinis Transfusionem; dubium tamen est, an non sanguis recipiens à sanguine transfuso magis reddatur nutritivus, quin potius idem sanguis transfusus ex particularum peregrinarum textura propter crasin suam internam specificam respectu corporis recipientis minus corpori assimilari, idque minus nutrire queat, quam sanguis proprius.

(4.) Qui è sanguine acriore contabescunt, ordinarie calore & acriore & mordaciore comitati observantur. Hic verò calor partim est comes, partim causa concurrens atrophie. Comes est, dum particule acriores salinæ motu intestino plus minus concitantur, & hinc ex collisione particularum acidarum ac terrearum acrior evadit calor. Concurrens seu concomitans verò calor est adjuvans depascentie corporis, dum à particulis his acrioribus particule aliæ corporis mitiores attritæ dissipatæque promptius insensibiliter evanescent, vel cum urina sub sedimenti copiosioris forma evacuantur. Hisce ergò pathematibus meliorandis & corrigendis sanguis alienus fervidus minus confert, quin potius longè benignior ac mitior requiritur liquor, sive ille jam immediate sive mediate infundatur.

CONCLUSIO XII.

Ad arthritidis Curam nil facit Chirurgia Transfusoria.

Pro meliori hujus Conclusionis evolutione ac intellectu præmoneo: Ordinario confundi sensibilia arthritidis phænomena, quæ se habent tanquam effectus, cum causa ac fiendi modo arthritidis. Illa phænomena sunt v. g. Dolor & Tumor, vel inflammatorius, vel œdematosus, quæ revera non causa, sed saltem effectus seu productum arthritidis sunt. Vulgò causa arthritidis censetur esse sanguis feculentus ac tartareus, sed malè. Radix enim ejus est radicata nimirum in ipso spiritu influo, qui volatili acore vitio primæ digestionis concepto inquinat synoviam, seu appropriatum subjectum, quæ vitiata rodit periosmium articulorum, & hinc dolores arthritidis infert: Unde quævis præsupposita acrimonia sanguinis vel lymphæ in arthritide non causæ proximæ formalis, sed vel antecedentis occasionalis vel concomitantis producti morbofi, vices sustinet, quatenus nimirum exinde spiritum insitum excitat. Unde ex hoc quoque fundamento arthritidis nunc

vaga, nunc fixa, observatur. Vaga est recens & non hæreditaria, fixa verò vetus & hæreditaria: Vaga est, quando ab acore mali simpliciter spiritus influus est inquinatus: fixa verò, quando præterea insitus quoque ~ circa articulos est inquinatus. Vaga recens est, quando spiritus insitus odore tenus tantum quasi est affectus: fixa verò habitualis ac inveterata est, quando spiritus insitus ab acido ita est inquinatus, ut habitum quasi contraxerit. Unde vaga modò ex hoc, modò ex alio pelli potest membro, ita ut mox brachium, mox pedes, mox cubitum, mox genua, invadat: Si enim v. g. invadat brachium, idque fomentis calidis foveatur, mox transibit ad pedes; unde porrò quoque vaga non est hæreditaria, fixa verò est hæreditaria, & spiritu genitalem parentum per semen in foetum transplantatur. Nempe in spiritu insito & influo consistunt morbi hæreditarii. Nullus verò morbus acutus est hæreditarius, qui (1.) non sit chronicus, (2.) qui non crebrius aut unâ alterâve alteratione potentius ægrum affligerit, (3.) qui non propter suam diuturnitatem ac potentiorē affligendi modum vehementius quoque spiritum insitum ac influum atterit. Hinc nullus morbus acutus est hæreditarius: è contra verò partium solidarum vitia, v. g. splen à longo tempore male se habens, lithiasis, podagra, lues Venerea, &c. sunt sæpe vitia hæreditaria.

His igitur præmissis conclusio intelligenda venit de arthritide recente, non inveterata, adventitia, non hæreditaria, aut saltem de imminente, non actu secundo erumpente. Hanc ergò sanguinis Transfusio curare non valet. Ut igitur ad arthritidem, imprimis inveteratam, in genere nulla profunt remedia, ita annon ad arthritidis vagæ recentis ac imminente curacionem aliquid conferre possit sanguinis Transfusio? quæritur. Respondeo negando, quod probo:

(1.) Quia nec à priori arthritidi per sanguinis Transfusionem succurri potest, cum extra paroxysmum causâ mali tolli nequeat, siquidem non attingit radicem mali in ventriculo hærentem, nec spiritus insiti inquinamenta. Et posito, vitium oriri ex primis viis, cum primus quasi arthritidis faber hæreat in ventriculo; (unde quoque vomitoria tam in paroxysmo, quam post ipsum, tam egregia sunt in podagra,) nihilominus tamen eandem curare non poterit sanguinis Transfusio, quia copiosior ac crebrior ejus requireretur Transfusio, ut hoc quoque foret frustraneum, stante præsertim radice mali. Posito etiam dietam lacteam pro cura podagræ multum conferre, tamen quantum tempus, quanta diæta, requireretur, neque inde tamen laudatissima hæc diæta lactea, uti in plurimis aliis

aliis morbis, ita imprimis in podagra maximè proficua, eandem curaret. Scripsit Tractatum parvum; & tantum superficiale, Johann-Georgius Greifelius, Medicus Viennensis, de Cura Arthritidis per diætam lacteam, ubi tam per Theoriam, quàm per exempla Practica, satis constabit, quantum temporis ac quanta diætâ requiratur, si per lac curari debeat podagra? Cum itaque lac omnibus numeris magis conveniens sit pro curanda podagra, quàm ipse sanguis, & nihilominus eam perfectè nec constanter curare queat, multò minus id sperari poterit à sanguinis Transfusione, cum fomitem mali in ventriculo hærentem, sanguinem, & alios humores, alterare & corrigere nequeat, ut exin spiritus planè alii, nec adeò acres ac ignei geniti, ab arthritide libertatem præstent.

(2.) Quia nec in paroxysmo aliquid vallet sanguis Transfusio, neque etiam in temperando ac evacuando vitio peccante. Nempe causæ conatus in paroxysmo podagræ hic est, ut conceptus in spiritu acor temperetur, maturè sub seroso vehiculo excernatur, aut in synoviam depositus in falsum successive resolvatur ac discutiatur; (alias enim topi podagrici circa articulos oriuntur, qui ita fiunt: primò nimirum synovia instar albuminis ovi spumescit, deinde spissescit, ac tandem in cretam ac calcem induratur:) hic est naturæ scopus in paroxysmo podagrico. Huic sanguinis Transfusio nil conferet, cum neque spiritum insitum alterare queat. Sicuti verò hoc est naturæ opus, ita ad naturæ imitationem artis opus est, ut in paroxysmo, præmissò vomitorio, internè diaphoretica volatilia aut fixa (quæ hîc utramque faciunt paginam, ac acidum resolvunt,) acidum absorbentia, vel loco diaphoreticorum diuretica, quæ acidum temperatum, & in falsum mutatum, Tartari podagrici nomine, optime per vias urinas expellunt, exhibeantur. Hisce tam naturæ quàm artis moliminibus Chirurgia Transfusoria nil conferet, sed potius iisdem resistet, naturæ motum turbando excretiones tam per sudores quam per urinas impediendo, ac febriculam in omni ferè podagra præsentem, intendendo, ac augendo, adeoque in paroxysmo podagrico nihil valebit sanguinis Transfusio, sed potius plus nocebit, quam proderit: ut taceam sanguini infuso cum synovia, ex chylo & hinc lymphâ genita, nihil commercii esse, quæ tamen primariò, & huius medio, periostium in arthritide alteratur.

(3.) Quod tutius ac jucundius per media diætetica ac Pharmaceutica obtineri potest, illud frustra & malè per sanguinis Transfusionem instituitur. Inter remedia verò Pharmaceutica eminent terrea absorbentia, alcalia,

tam fixa quàm volatilia, & quæ huc imprimis pertinent Mercurialia, quæ, præmissis vomitoriis, in & extra paroxysmum utramque faciunt paginam: Hæc Mercurialia, uti acida alia spirituosa ac medicamentis aliis vix obtemperantia, corrigunt, ita & acidum illud hîc peccans planè imbibunt ac absumunt, adeoque & præter luem Veneream ac scabiem podagram quoque curare valent. Sed

1. non adsit alius morbus, à quo accidentaliter foveatur: v. g. si podagra à scorbutro foveatur.

2. Sit recens, nec spicula sua jam fixerit in spiritu insito, & maturè adhibita auxilia debita: in hoc enim ordinariò peccatur, quod ut ægri, quamdiu acidum illud volatile nondum inquinavit digestionem primam, nolint fateri, se laborare podagra, sed conquerantur tantum de dolore ac erysipellate pedum; interim paroxysmus podagricus sæpius atque sæpius redit, ut tandem exinde ipsa podagra exsurgat, quæ alias curari potuisset, si in tempore remediis convenientibus ipsi occurrissent.

3. Curabilis est podagra, si æger non tam suo quam medici genio indulgeat. Podagrici enim omnium ægrorum ferè sunt pessimi, cum Medicis obtemperare nolint.

CONCLUSIO XIII.

Epileptici nullum perfectum ex Chirurgia Transfusoria auxilium.

Notum est, communem proflare fabulam aut historiam de Epilepticiis, quod Epilepsiâ, imprimis habituali, correpti pro ejus cura sanguinem humanum recentem ex decollati, vel alio modo jugulati, venis adhuc profluentem, haurire soleant. Res hæc non est nova, sed antiquissimum vel medicamenti vel superstitionis genus: Nam in Plinio jam l. 28. cap. 1. sanguinis humani recentis ac quasi spiritualescentis pro cura Epilepsiæ hausti fit mentio: Sic Celsus quoque *Juris peritus Romanus, Medicorum alias Cicero dictus*, lib. 3. cap. 23. refert, quendam *jugulati gladiatoris calido sanguine epoto à comitali morbo liberatum*; sed mox addit: *miserum hoc auxilium tolerabile malum fecisse miserius, cum exinde in aliud malum perius incidere*. Tertulianus etiam in *Apolog. suo adversus Gentes*, Romæ hoc remedii genus admodum fuisse usitatum, testatur.

Verum cum truculentum admodum & abominabile illud remedium pluribus fuerit visum, ideò, in hoc puncto Philatri & Chymici solertiores se præstiterunt, & pro hoc scopo ex sanguine humano alicujus decollati varia remedia antepileptica excogitarunt: Vid. præter Schroederi *Pharm. Medico-Chym.*

Chym. L. 5. Class. 1. pag. 297. seqq., etiam Beckerus in *Medico suo Microcosmico*. Ipse Helmontius, Vir alias in quamplurimis fide dignissimus, *Tract.* Archæus Faber, Epilepsiam hæreditariam spiritu sanguinis humani se curasse, cum aliàs spiritus urinæ fuerit frustra adhibitus, testatur. Hæc ergò, nimirum tam sanguis humanus recens potus, quam spiritus aut sal volatile sanguinis humani, forsan probabile reddere possunt, sanguinem quoque transfusum multum opis epilepsiæ conferre posse.

Verum iste sanguis humanus contra Epilepsiam recens haustus est auxilium

I. Incertum: De ejus enim fama plus, quàm de effectu, constat. Nam affirmativa, quæ afferuntur argumenta, vel penitus sunt falsa, vel incerta & dubia, paucissima vera sunt, de quibus nempe certa fide & ratione securi esse possimus. Pluribus hæc ventilanter videre Bartholinum in *Tr. de sanguine vetito*.

II. Nocivum: Necesse enim est, ut sanguis ille recens calidè haustus in ventriculo in grumos coalescat, ex quibus nausea, cardialgia, sudores frigidi, syncope, cordis palpitationes, & gravia plura symptomata non possunt non supervenire. Non dicam jam de animi ferocitate brutali, quam sibi multi sanguine ejusmodi hausto contraxerunt, saltem hoc urgeo, quod refert Bartholinus loco allegato de mendico quodam, qui decollati hominis sanguine hausto, eò insanix pervenerit, ut linguæ partem magnam dentibus sibi ipsi absciderit. Pariter & Becker in *Tr. citato* narrat, quendam audaculum sanguine hominis jugulati præservationis gratia hausto, subito in epilepsiam, à qua antea immunis erat, incidisse. Debilior profectò est ventriculi vis digestiva, quam ut rhombos ac grumos istos sanguinis subigere valeat. Alia enim ratio est in brutis rapto viventibus, in quibus vis ventriculi digestiva longe est potentior, adeò ut citra læsionem sanguinem ex bestiis aliis exsugant: sic canis & homo ventriculi vi digestivâ multum differunt.

Spiritum autem ac sal volatile sanguinis humani quod attinet: non dubito, hæc selecta esse remedia. An verò adeò sint appropriata, & præ aliis similibus medicamentis magis experta, meritò litem movemus Helmontio, si

1. consideremus ignis vim, quod cum vel sine prævia putrefactione simpliciter sit destructor texturæ concretorum specificæ, ac virtutum rerum seminalium, à quibus tamen dotes singulares emanant. Omnem hanc seminum vim acidum ignis invertit, resolvit, ac in statum pristinum abire facit.

Tom. II. Pars 2.

Hoc itaque cum fiat sub præparatione spiritus ac salis volatilis sanguinis humani, meritò dubitatur: an talis vis epileptica adhuc in spiritu & sale volatili sanguinis humani resideat?

2. Dubium quoque exinde, quod etiam alia salia volatilia ac spiritus urinosi, v. g. spiritus fuliginis, spiritus ac sal volatile secundinæ humanæ ac cranii, non secus ac plures, imò tantum non omnes animalium partes duriores, dentes ac ossa, vi acidum absorbendi ac corrigendi, convenient in epilepsia. Ergò sal volatile sanguinis humani non est appropriatum in epilepsia. Liqueor cornu cervi succinatus laudatissimum est epilepsiæ quoque remedium: ut nil dicam de cinnabarinis nativis ac artificialibus ex antimonio.

Quid ergò ad epilepsiam valeat sanguinis transfusio? quæritur. Præsuppono hic, epilepsiam omnem ratione in hæSIONIS spiritum animale influum pro subjecto agnoscere: nempe idem est movens efficienter, quod partes naturaliter movet, ac easdem præternaturaliter in epilepsia convellit. Ratione verò subjecti radicationis seu respectu modi, in quo fomes consistit, dividitur Epilepsia in eam, quæ per consensum, & quæ per essentiam fit. In Epilepsia per essentiam spiritus animalis simpliciter ac primariò est affectus, in Epilepsia verò per consensum pars quædam tantum solida est affecta: Ibi, si per essentiam est malum, spiritus alterati, aut ut pressius loquar, ideâ peregrinâ sunt insigniti, fitque v. g. quando sanus quis ex conspectu quodam epileptico, fortè sibi obvio, terrore percussus, ex imaginatione idem pathema epilepticum incurrat, quale exemplum est in Hartmanno, item in M. A. N. C. *Ann. 4. Observat. 43. pag. 39.* vel ex Divi Nicolai personati præsentia terrefactus puer septennis, epilepticus evadit, ac exinde moritur, quale exemplum habet Hœchstetterus *Dec. 4. Obs. 5.* vel quando ex iracundia nutricis infans, lac ejus sugens, fit epilepticus; vel quando viso spectro lethalis contrahitur epilepsia, vid. M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. Observat. 32. pag. 65.* In epilepsia verò per consensum saltem Topicum aliquod peccat, fitque, quando illa occasione partis alicujus internæ vel externæ oritur, v. g. si ex splene male habente, & hinc per consensum generis nervosi contrahitur Epilepsia; vel quando mulier parturiens ex partu difficili in epilepsiam incidit; aut quando gravida nonimestris ex hæmorrhoidum suppressione evadit epileptica, & hinc fatum non excludit, sed ejicit: vid. Zacutus Lusitanus [P] L. 1.

L. 1. Observat. 24.; vel ex osse carioso in pollice pedis; è sura; ex annulari digito manus sinistra; vel ex ulcere manus dextræ, quæ antea sensum & motum amiserat, cum frigore & dolore anteparoxysmum, vid. Hildanus *Conf. pag. 23.* Probè hæc discernenda in epilepsia. In Epilepsia per Essentiam remedia anodyna appropriata, v. g. opiata, præsertim camphoratis juncta, cinnabarina, quæ immediatè magis afficiunt spiritus, primatum ducunt. Pertinent huc etiam animi pathemata, peregrinas ideas, in spiritu animali conceptas, delentia, ut quando v. g. epilepsia ex terrore nata per terrorem iterum curata fuit, teste Bierlingio *Cent. 1. Advers. lib. 7.* In epilepsia verò per consensum minus tutò anodyna & cinnabarina, nisi exactissimè præmissis præmittendis, adhibenda; suspendunt enim tantum epilepsiam cum periculo supervenientis vel atrocioris recidivæ, vel alius morbi, præsertim febris. In hac epilepsia per consensum motus naturæ simillimus est rigori febrili, qui rigor nihil aliud est, quàm spasmus epilepticus; concutuntur enim tunc ægri in lecto, non secus ac epileptici essent. Hic naturæ motus hostile illud, spiritus irritans, ejicere in epilepsia conatur. Hinc volatilibus medicamentis promovendus potius iste naturæ motus, quàm sistendus. Utraque igitur epilepsia est vel accidentalis, vel habitualis.

De habituali hîc imprimis quæritur: an huic aliquid Chirurgia Transfusoria conferat? Resp. Neutri videtur conferre, neque illi per consensum, neque illi per essentiam. In illa enim per consensum Chirurgia Transfusoria est frustranea, quoniam sanguinis Transfusio nullum Topicum vitium, unde illæ natæ epilepsiæ, curare valet. In epilepsia per essentiam inutilis est Chirurgia Transfusoria, cum hic primariò laborent spiritus, à sanguine verò transfuso nulla spiritui influo animali immediatè inferri potest alteratio, neque sanguis transfusus cum spiritu insito aliquid habet commercii. Nihil ergò prodest sanguinis Transfusio.

Scrupulus tamen aliquis hîc moveri potest, si scilicet per essentiam oritur Epilepsia, eaque v. g. ex iracundia, terrore, vel alio simili graviore pathemate, &c. dubium est, annon idea epilepsiæ in spiritu concepta, ex idea contraria ac validiore extingui, & ita curari queat? sanè si verum est, quod sanguis humanus ex decollato recens haustus aliquid epilepsiæ conferat, nulla alia subesse videtur ratio, quàm quod id præstet idealiter ex mortis agonia, quâ sanguis decollati fuit insignitus. Si igitur talis sanguis vim habet spirituum vim refrænandi, fortè etiam san-

guis transfusus vi ideali impetum spirituum in epilepsia refrænare ac sistere poterit. Respondeo: Dubium tamen valde est, an remedium hoc sit diuturnum, quin potius metuendum, ne deleat hâc ideâ malum redeat. Item dubium est: an remedium hoc ideale sit certum & perfectum? Deinde aliud quoque dubium oriri posset: Nimirum dixi superius, sanguinem etiam ipsum ad motum partium localem aliquid conferre; simul ac enim sanguis in parte aliqua sufflaminatur, motus cessat, sanguine verò denuò restituto, motus in parte solida reddit. Si igitur ad motum partium localem, utut accidentalem, aliquid confert sanguis, probabile est, annon etiam sanguis transfusus hic in epilepsia hinc foveatur, & ita contumacior vel gravior reddatur. Respondeo: prius hic determinandum est, quale sit illud remedium, ad epilepsiæ vitium corrigendum conferens? dein, an etiam certa salus exinde sit speranda: Maneat ergò conclusio firma: aut nullum, aut saltem imperfectum, epilepsiæ est Chirurgia Transfusoria auxilium.

CONCLUSIO XIV.

Scabiosis, Leprosi, Lue Venerea affectis, nil emolumenti ex sanguine transfuso expectandum.

Scabies vitium est simpliciter topicum, & in genere cutaneum, in specie verò, ubi glandulæ subcutaneæ miliares ratione spiritus insiti à concepto acore & corruptela nutrimenti infectæ sunt. Superius dixi, eundem esse spiritum, qui nutrimentum partibus apponit, ac appositum in partibus mutat in verum & legitimum, illum etiam in ichorem & scabiem mutare. Hinc est, quod Helmontius, aliàs sanissimus, chirothecæ scabiosæ tactu, mox scabie per universum corpus infectus fuerit! Hinc etiam est, quod in confirmata scabie, quicquid internè fiat, sanguinem detrahendo, sudorifera propinando, &c. nil quicquam tamen quis profecerit, sed lapidem tantum sit lavaturus, repullulante infallibiliter malo, nisi remediis externis vitium topicum curetur. Inter hæc eminent, imò sufficiunt, sulphur, mediantribus alcalisatis resolubile factum, & hinc Mercurius, quomodocunque usurpetur. Negari non potest, foveri interdum scabiem per accidens à succo corporis nutritio; ipsa scilicet massa sanguinea, quæ prout magis vel minus alterabilis ac corruptibilis est, malum magis vel minus contumax ac ferinum reddit; sicut ac eodem sanguine chylosiore, & magis temperato ac rorido seu gelatinoso scabies verè humida, ab

ab eodem etiam sanguine asperiore ac magis macro magis scabies sicca fomentetur: sed hoc fit per accidens; nunquam enim exinde oritur scabies, nisi spiritus insitus, nutritioni cutis inserviens, prius, vel interna vel externa à causa, inficiatur: utcumque ergo se habeat scabies, ad ejus tamen curam nil confert sanguinis Transfusio.

1. Quia vitium istud topicum cutis sanguinis Transfusio corrigere nequit; quin potius metuendum, illum ipsum mox à sanguine nostro infecto etiam infici.

2. Quo plus sanguinis aliorumque humorum est in corpore, eò (cæteris paribus) uberius efflorescit scabies. Hinc patet, quod post venæ sectiones, scarificationes, aut purgationes, interdum per accidens, (scilicet quod materia ichoris subtrahita sit:) imminuatur. Potius ergo augmentabitur, quam imminuetur, malum à majori sanguinis cœu pa-buli subministrati copia.

3. Quia nec sanguinis vitia, à quibus accidentaliter sovetur scabies, à Transfusionem sanguinis corrigi possunt. Non sanguinem gelatinosum in scabie humida, quia hæc scabies per decocta lignorum in conopœis potius est curanda; neque sanguinem macrum in scabie sicca, quia hæc potius per lac & lacticia, in specie cum floribus acacia imprægnatum, curatur.

Ergo Chirurgia Transfusoria ad scabi-em, neque humidam neque siccam, aliquid facit, cum nullibi ejus crasin, speciatim macram, in tantum corrigere valebit, etiam sæpius repetita, quin ex digestionum vitio identidem recrudescat.

Quæ dixi de scabie, eadem multò magis intelligenda veniunt de lepra, malo graviore, firmitus in cute radicata, & profundius spiritum insitum inquinante. Unde in hac vix ac ne vix quid proderit hæc sanguinis Transfusio.

Quoad Luem Veneream, de hac præsuppono:

I. Esse illam vel particularem, vel universalem: Particularis, quæ saltim genitalia occupat, & gonorrhœâ, ulceribus membri virilis ex coitu impuro natis, cumque tumoribus testium sese exserit: Universalis est, quæ totum corpus jam infecit; estque vel saltim recens, quæ massam sanguineam ac lympham; vel inveterata, quæ partes solidas erodendo jam infecit, ut ossa, &c. unde etiam isti Venerei generantur modi:

II. Fermentum contagiosum luis Venereæ admodum esse potens, ita ut etiam sanissimos inficere queat, non tantum ordinariè ex congressu impuro, sed etiam aliis modis, v.g. ex halitu sudoris, odore saniei virulentæ, &c.

Tom. II. Pars 2.

III. Pro constitutione corporis ejusque dyscrasia contagium fermentativum luis Venereæ diu in corpore posse delitescere, antequam se exserat: quod fit, quando saltim massam sanguineam invadit, v.g. in subiecto melancholico, cujus sanguis est viscidior, minusque spirituosus, diu delitescere potest. Hinc est, quod in homine Gallo ac Hispano longè citius se exserat contagium, quàm in Germano; loca enim ibi multò sunt calidiora, quàm apud nos: Sic in climate nostro diutius delitescit, quàm Italia & Gallia: Imo sunt, qui ad decem usque annos contagium Venereum latere posse, asserant; quod tamen vix credo.

IV. Ipsum contagium Venereum consistere in acido specifici saporis, quod est corrosivum partium solidarum, ac coagulativum partium fluidarum, in specie sanguinis & lymphæ; hinc & glandulas ac partes nerveas magis lædere solet.

Pro cura ergo luis Venereæ omnis scopus eò est directus, ut acidum specificum absorbeat, nutrimentum chylolum coagulatum resolvatur, glandulæ abstergantur ac emundentur, sive per salivationem sive per sudationem id fiat. Nil hic opis sanguinis transfusio affert. Non in inveterata; ibi enim fermentum per hanc nunquam delebitur: Dubium igitur, an non in lue Venerea recenti & universali aliquid conferre queat Transfusio sanguinis? Respondeo negando:

1. Quia sanguis transfusus alienus fermentum illud potens nullo modo valet corrigere, cum sanguis non sit appropriatum corrigens, quin potius metuendum, ne, ut sanguis ægri proprius jam est infectus, alienus quoque transfusus à contagio, partim adeo potenti, partim à sanguine infecto, & à contagio alterato, similiter inquinetur, & hac ratione sanguinis Transfusio magis noxia, adeoque frustranea, foret. Si enim sanus, proprio sanguine valens, contagium hoc delere non potest, multò minus alienus hoc præstet; toties elutriendus foret sanguis infectus, & novus denuò transfundendus, donec omnis sanguis quasi renovatus & regeneratus esset. Sed posito etiam, quod omnis sanguis ægri inquinatus cum corrupta lymphâ successivè detrahatur, novusque sanguis transfundatur, tamen nec sic negotium ad finem perduceretur; sed potius metuendum, ne copiosiori & frequentiori Transfusionem, & animi & corporis simul notabilis fiat mutatio. Dein occultum delitescit fermentum sub nimia mole, tandem potentissimum, adeoque dubitandum: an illud ita possit infringi ac eradicari, ut post aliquale sui seminium nullas amplius excitet turbas, e.g. in osse carioso, uti v.g. Hildano accidit, cui per salivationem Mercurialem lues Venerea curata, nihilominus tamen eadem occasione

[P] 2

officuli


osliculi minimi, claviculae scabiosae, de novo propullulavit.

2. Quantus labor, quantusque conatus requiritur, totam massam sanguineam per sudationem aut salivationem renovare, ejusque substantiam à fermento corruptam purificare ac emendare? Hoc sanè norunt ii, qui passi sunt curam luis Venereae, qui sudationibus ac salivationibus variis per aliquot septimanas parum aut nihil emolumenti senserunt.


3. Non solum correctioni fermenti maligni, sed etiam exclusioni opera danda, ne tantilli fermentativi, circa glandulas residui, odore malum de novo regeneretur. Neu-

trum à sanguinis Transfusionem hic expectandum. Posito enim, quod corrigere eam valeat, non tamen eam poterit excludere. Solus ergò Mercurius appropriatum luis Venereae est medicamentum. Sunt qui hunc colliquefaciendo tantum, luem Veneream curare, & sic generale saltem remedium esse autumant, uti id praestat in asthmate, febribus quartanis, &c. Verum contrarium docent ulcera Gallica contumacissima, quae soli auscultant Mercurio. Hic est, qui citra pyralissimum ac generalem evacuandi rationem, per simplicem alterationem, auxilium affert. Quid ergo hinc sanguis alienus?

TANTUM.



MICHA.



MICHAELIS ETTMULLERI
*Philosophiæ & Medicinæ Doctoris, Professoris Publici
 Lipsiensis, ac Facultatis Medicæ Adjessoris,*

COLLEGIUM CONSULTATORIUM,

Scilicet

PRACTICO-CASUALE.

PROLEGOMENA.



Inis futuri nostri laboris est, ut acquiramus Habitum Practicum, qui ipse consistit in veritate ingenii & judicii, secundum quam, ob circumstantias varias, quarum ineffabilis multitudo est, diversa remedia inveniamus & applicemus.

Pro illo autem acquirendo duo potissimum veniunt considerata, propter quæ Praxis dubia sæpe & difficilis est:

I. Idiosyncrasia individuorum diversa, quæ non tantum in crassi succorum contentorum; sed etiam in partium solidarum mechanica conformatione consistit, quæ in singulis individuis, quoad poros differt.

II. Multiplicatio seu potius Complicatio multiplicium affectuum & symptomatum, ut si gravida febricitet, mulier variolis laboret, &c.

Quoad I. notum est, Medicum non curare Hominem, Virum, Mulierem, &c. sed hunc virum, istam sceminam. Jam verò cuilibet individuo singularis est sua proprietas, ratione cujus unum ab altero differt: sic v.g. mulieres præ viris patiuntur fluxum mensium, sicut puerperæ lochiorum fluxum, & sic porro. Interim hæc idiosyncrasia nimis crassa videtur, unde singularior aliqua proprietas in quolibet fere individuo consideretur, quæ est vel connata, vel acquisita.

Connata est ea, quæ vi seminali & ex primordiis seminalibus unicuique homini est peculiaris: Acquisita verò varietate diætæ & consequenter vitæ generis, similitumque circumstantiarum externarum, subinde inducitur. Sic v.g. connata idiosyncrasia est, quando mater gravida perterrita à se, parit infantem, qui postmodum per totam vitam fugit selem, & earum præsentiam abhorret,

imò non nisi sub lipothymia metu, perferre potest: acquisita verò est, quando virgo v.g. aliàs optimè moschum perferens, maritata propter metum passionis hysterica eundem odorari nequit postmodum. Utraque hæc idiosyncrasia melioris intellectus ergò distinguere potest, ratione originis, in idealem & materiale. Idealis est, quæ simpliciter ab imagine matris & inde formato conceptu, sine communicatione materiali objecti ad ipsum subjectum, in fœtum contrahitur: vid. Schotti Physica Curiosa, ubi refert exemplum de puero, per totum vitæ cursum panem abhorrente, ideò quod matri ejus gravidæ, panis recens ex clibano extractus, cujus aliquando summo desiderio cum flagrasset, esset denegatus. Materialis autem fit, quando ipsum objectum movens attingit subjectum, quod afficitur: e.g. quando post assumpta vomitoria & purgantia vehiculum deinceps abhorremus, ut vix odorari possimus: Sic est hic loci virgo delicata, jam maritata, quæ aliquando à Pharmacopœo polypragmone acceperat pulverem purgantem ex speciebus diaturbith cum Rhabbarbo, oleo cinnamomi infectum, ubi optimè quidem hæc purgata fuit, interim ab illo tempore tantum à cinnamomi odore tardium contraxit, ex malè affecto tunc stomacho, ut jam ne tantillum ejus assumere, & odorari queat.

Hæc ergo idiosyncrasia in duplici respectu considerata venit:

(1) In partium corporis vel robustarum vel tenuium constitutione.

(2) in remediorum applicatione.

Quoad partium constitutionem; ea vel naturalem partium corporis crasin, vel præternaturalem earum constitutionem respicit, quo etiam characteres hæreditarii pertinent,

[P] 3 quorum

quorum ratione hic præ cæteris in hunc, alter in alium affectum pronus est.

Quoad verò remediorum applicationem: sanè hinc est, quod hoc purgans istud subiectum validè, alterum mediocriter, tertium plane non, moveat; hinc hoc medicamentum huic est sudoriferum, alteri vomitorium; adeoque verum est illud Germanorum: **Es ist nicht eine Natur wie die andere.**

Verùm in hac idiosyncrasia, respectu partium corporearum constitutionis, à qua remediorum efficacia variat, ad tria respiciendum est:

1. ad ipsum stomachum, huiusque fermenti digestivi maiorem vel minorem activitatem.

2. ad massæ sanguineæ crasin ac statum.

3. ad systema nervosum, ejusque maiorem vel minorem sensilitatem, quæ maximum omninò fundamentum est idiosyncrasiarum.

Ac quoad stomachum quidem, ejusque fermentum: sanè prout hic magis vel minùs alterat remedia, eatenus hæc maiorem vel minorem præstant efficaciam. Similiter prout stomachi fermentum magis vel minus est sospes seu validum, eatenus in meliori adhuc vel peiori statu versantur ægri: adeoque verissima est vulgi sententia, imò ex primariis signis prognosticis in acutis & malignis morbis; quod quamdiu æger adhuc cerevisiam vel jusculum sine nausea possit haurire, tamdiu spes reconvalescentiæ superfit, cum sic vitale fermentum stomachi adhuc præstò sit; contrarium si observetur, mors in olla erit. Ulterius prout alterantur remedia in primis viis, eatenus plus vel minus temperantur in eodem subiecto, quatenus acidum fermentale magis vel minus alteratum est. Quoad (2) statum massæ sanguineæ: ex hoc omne punctum temperamentorum deducendum, tam ratione ætatum varietatis, quàm morborum ætatum; hinc morbi, ad quos inclinant ægri, sive sint à parentibus, sive à diata, omnes resident in sanguine ejusque crasi. Status autem ille massæ sanguineæ consistit partim in sale urinoso, partim in acido, cum partibus oleosis intermixtis, unde & spirituum vigor, & habitus notoriè variant: Hinc cholericis, seu sale volatili oleoso sanguinis abundantes, ad acutos morbos dispositi sunt, facilis sunt solutionis alvi, incandescunt facilè, ac calida medicamenta iisdem nocent; non secus ac Melancholici, seu in quibus abundat acidum primariò in primis viis, secundariò in massâ sanguinea, sunt constitutionis robustæ, minus à purgantibus aliisque remediis alterantur, minus proclives sunt ad sudorem, tardi sunt ad iram, &c. sed

chronicis morbis obnoxii. Quoad (3) systema nervosum: hoc est id, quod tanquam automaton machinam corporis nostri movet, quod in cerebro & cerebello, & inde derivatis funiculis, observatur, in quibusdam magis, in aliis minus sensile est. Certè, prout hoc in aliis magis minusque delicatum est, eatenus faciliùs tam à diateticis quàm pharmacenticis mediis afficitur; unde rustici, firmius robustiusque systema obrinentes, etiam à gravi alteratione minorem sentiunt alterationem, & à valido remedio minus moveri possunt: contra mulieres ordinariò cautiùs tractari debent viris, quia earum systema nerveum tenerius est quàm virorum, unde ad malum hypochondriacum seu hystericum procliviores iisdem sint; pariter hinc est, quod alter altero in toto corpore ab acri volatili, ac opiato medicamento, citiùs & sensibiliùs alteretur.

II. Quoad alterum punctum, pro habitu practico acquirendo: illud erat multiplicatio variorum Symptomatum, & imprimis talium, quorum indicationes & remedia sibi invicem adversantur, unde Praxis difficilis redditur. Sic e.g. alius respectus habendus est, si mulier variolis epidemicis laborat; alius quando puerpera in primo puerperio iisdem corripitur, in qua simul lochiorum fluxus attendendus, sui excretionem per inferiora postulans, cum contra aliàs variolæ per sudorifera velint tractari; sicut etiam periculosius est, si mulieres variolis laborant, quàm quando viri, propter mensium fluxum: Sic difficilior curantur gravidæ, quam non gravidæ.

Unicuique ergò casui occurrendum, ne noceamus ægro, atque præsertim hæc duo & in omni casu observanda sunt, ubi particularibus remediis, minus verò universalibus insistendum est. Particularia enim dum sint alterantia, cum cautela applicanda sunt; in universalibus autem, immediatè fundamentum vitæ respicientibus, cautelis his non opus habemus. Hæc duo ergò, Idiosyncrasia & Complicatio affectuum, reddunt Praxin difficilem. Nempe hæ circumstantiæ modificant, ut ita dicam, causam morbificam proximam, selectumque remediorum, ut diversimodè operentur; unde horum illud magis huic, aliud magis illi patienti, conducit: Sic e.g. habui aliquando mulierem scorbuticam curandam, cui ordinabam misturam, quam præter alia ingrediebatur spiritus cochleariæ; hunc autem cum ea adversaretur, hinc passionem hystericam incurrebat. Notanda interim sunt: si accadat, ut Medicus pro cura affectus ægro ordinare velit vomitorium, certâ sub intentione, ægertamen referat, se ex casu ab equo in dorsum ante

aliqui

aliquot septimanas sputum cruentum emisisse, unde meritò quaeritur: an hoc in casu tutum sit vomitorium? Resp. si Medicus audit, præcedente titillatione screando ejectum sanguinem sine tussi, adeoque faciliè, & saltim ex faucibus, eundem produisse, ut nulla pulmonum vel ejusdem vasorum læsorum suspicio adsit, imò potius vascula in faucibus aperta denuò post tantum tempus coaluisse præsumat, tutò vomitorium propinari poterit: quod si verò in pulmonibus læsio colligatur, tunc ex Hippocratis decreto idem minus tutum erit; nam, ut ille ait: *Hæmoptoycis vomitorium noxium est.*

In omni ergò casu resolvendo, præmissa denominatione affectus, quinque capita consideranda sunt:

1. Primum est, ut consideret Medicus Partem affectam seu subjectum morbi: hinc observandum probè, ne confundatur pars per essentiam & per consensum affecta.

2. Secundum erit Causa proxima affectus, ejusque causandi ratio, id est, quomodo causa proxima in hoc subjecto morbum hunc inducat? cui conjungenda est connectio symptomatum variorum se invicem excipientium.

3. Tertium Causa Remota, quæ ad proximam causam vel disponit, vel quæ eandem in actum secundum producit.

4. Quartum est Prognosis, quæ simul instituenda est cum debita cautela, ut satisfacere queamus ægris interrogantibus.

5. Quintum Cura, quæ constat methodo medendi, unà cum junctis remediis, ex omnibus tribus fontibus desumptis.

Ut eò melius in cognitionem morbi seu affectus deveniamus, consultò facimus, si uno loco symptomata, unum post alterum subjungimus, & ea consideramus; altero loco causas aliasque circumstantias combineamus & perpendamus, quomodo unum symptoma cum altero coherere possit? ponderemus etiam vitæ genus, diætam, lapsum, iram &c. e.g. si quis conqueritur de nausea & fastidio ciborum, dolore gravativo circa præcordia sub costis nothis, noctes habet inquietas, &c. hæc primùm sunt consideranda: deinde aliæ circumstantiæ, nempe quod iter fecerit ex Belgio in Westphalia tempore hyberno, tunc considerandum etiam, quò victu ibi usus fuerit? &c. Hisce ita consideratis, faciliè affectus innotescet.

CASUS I.

DE APEPSIA.

Mercator Belga, tenuioris fortunæ tempore hyberno peregrinans per Westphalia, Lipsienses inuisurus nundinas, sed negotiorum causa per tres septi-

manas hinc inde, imprimis in Westphalia, detinetur; post Lipsiam perveniens, conqueritur de nausea & fastidio ciborum, dolore gravativo circa præcordia (es drückte) sub costis nothis antè, noctes habet inquietas, manè evigilans ejicit copiosa viscida sputa, percipit sub jejuniis ructus crebros inspidos, à pastu, licet mediocri, rubores, phlogoses & æstuationes faciem occupant per horam & amplius, urinam excernit turbidam, crassam, pallidam, cum copioso sedimento; virium imbecillitas supervenit.

RESOLUTIO.

DENOMINATIO AFFECTUS.

Si æqua judicii lance omnium concurrentium symptomatum Syndromen perpendimus, ac antecedentes causas pressius paulò examinamus, faciliè cuique obviam erit, & manifestum, præsentem ægrum Apepsiâ seu digestionis & concoctionis stomachi insigniter imminutâ & depravatâ laborare, adeoque id vitii reverà contraxisse, quod Germanorum idiotismo per vulgatum illud: *Er hat den Magen verderbet* explicari solet.

Symptomata sunt:

1. Nausea & fastidium alimentorum.
2. Dolor gravativus in præcordiis.
3. Nox inquieta.
4. Sputa viscida manè rejecta.
5. Ructus inspidi.
6. Rubor & ardor faciei à pastu.
7. Urina crassa, turbida.
8. Vires imbecilles.

Quæ omnia monstrant, virum hunc laborare apepsiâ seu coctione ventriculi imminuta, & ferè abolitâ: id quod causæ antecedentes, quæ fuerunt iter, Westphalia, Belga tenuis fortunæ, disponentes ad hoc malum, confirmant.

CAUSA PROXIMA.

Ut ut verò quamplurimæ obveniant causæ, quæ summè necessarium pro universa animali œconomia negotium digestionis turbare valeant; in præsentitamen ægro, manifestum videtur, causam mali hæere in ipso stomacho, copiosis cruditatibus recrementosis, viscidis ac pituitosis referto, unde fermentum ejus digestivum præ nimia copia obruitur; partim tenaci visciditate hebetatur, quò minus eas digerere, aut desuper ingesta alimentaria ritè fermentando digerere possit. Ab eorum enim infausta præsentia dolor gravativus, non tam in regione stomachi ab ægro perceptibilis exoritur, sed orificium stomachi, potissimum superius, sub noctis requie infestatur & irritatur, speciatim in corporis supino positu, in quo fluctuant magis ista recrementa,

ta, unde somni turbatio, & ex aliquali præcordiorum anxietate, ob orificii sensibilitatem, corporis oritur agitatio, noctesque inquietæ redduntur. Unde quicquid sub nocte dissolutum & attenuatum fuit in stomachi cavo, cum ob pylori clausuram tales cruditates non transmittantur, atque deorsum vergere possint ad intestina, successivè & paulatim per superius orificium in oesophagum & oriscavum regurgitat, manè per sputa viscida rejiciendum. Cumque præterea in tali casu nunquam otiosus sit stomachus, sed, quantum possibile, fermento suo digestivo cruditates dictas digerere nitatur, evenit exinde, ut eadem quidem acorem exinde contrahant, sed ob sui visciditatem, & ad fermentativam volatilisationem ineptitudinem, saltem aliquid flatulenti eructent, indeque insipidi ructus emittantur, adeoque dejecta sic activitate stomachici fermenti omnis pariter appetitus prosternatur, necesse est, & potius alimentorum nausea superveniat. Et utut alimenta assumantur, non ritè tamen ob cruditates istas impediuntur fermentantur & digeruntur, sed acescunt saltem insigniter, & in pastam itidem tenacem crudamque ita faciunt: cujus acoris occasione, & inde dependentis inæqualis succorum in primis viis fermentationis, non secus ac in malo hypochondriaco fieri solet, *Φλογώσις* & æstuationes, ruboresque faciei, post pastum superveniunt. Sed cum denique errata digestionis primæ in nulla alia corrigi soleant, ob id alimentis semi-digestis, nec ritè in primis viis per secum debitam separationem perfectis, ad sanguinem distributis, nec debitè assimilatis, urinæ itidem crudæ, h. e. in hoc quidem casu cruditatibus chylosis permixtis, excretio supervenire solet, dum eadem, potus scilicet urina, ex primis viis ad vesicam delapsa, defectu debitæ fermentativæ dissolutionis, hinc pallida & turbida, idque ob fermentationis defectum, aliàs in statu naturali intimè salina recrementa cum seroso vehiculo jungens, excernitur. Quia autem sic corpus legitimis alimentis defraudatur, tandem virium successivus defectus & declinationes superveniunt.

CAUSÆ REMOTÆ.

Nec est, quod miretur Patiens, unde id mali contraxerit: variorum alimentorum sub itinere ingestio, imprimis scilicet duriorum, salitorum, malè preparatorum, ac copioso lardo impinguatorum, qualia in Westphalia, regione aliàs aëris densioris, impurioris, & ob paludum frequentiam non leviter inquinati, propinantur, insigniter negotium digestionis primæ, hebetando fermentum stomachi digestivum, imminuere valent: Ut

taceam ipsum virum tenuioris fortunæ, minus ordinatæ diætæ deditum, sed quæcunque aliàs ingerentem, non adeò vâlda fermenti digestivi virtute fuisse præditum.

PROGNOSIS.

Rectè autem maturè petit consilium, cum malum ipsum, utut omni graviore careat periculo, neglectum facillè in febrem intermittentem chronicam graviolem degenerare possit; aut in homine, præsertim Belgæ, firmas radices pro futuro malo hypochondriaco agere; vel saltem ad diuturnam cachexiam disponere valeat.

CURÆ.

Medicinæ ergò saluberrima auxilia in eo erunt occupata, ut ex fonte, præsertim Pharmaceutico, dein diætetico, cruditates dictæ lege artis resolvantur & attenuentur, hinc evacuentur, & postmodum appropriatis, internis pariter & externis stomachus roboretur.

Pro priori ergò scopo, ut dissolvantur & attenuentur dicta recrementa, sæpius tenaciora, conducit imprimis absinthium, simul stomacho amicum, cujus vel vinum per ejus infusionem cum radice helenii paratum, vel extractum absinthii, ℞i. pondere in vini haustu dissolutum, & omni manè jejuno stomacho assumptum, ac à meridie, bihorio ante coenam, per aliquod tempus reiteratum, pro incidendis istis recrementis, & præcavendo febris intermittens periculo, erit egregium. Quod si nauseosus sit ejus amaror, de sequenti pulvere in vehiculo calido omni mane capere potest, & à meridie, dicto tempore, in vehiculo frigido:

℞. *Θ*ci depur.* ʒi.
Spec. dia Galang. ʒß.
 M. f. Pulvis,
 divid. in 2. part. æqual.
 D. S.

Erweichend Magen-Pulver.
 Vel si liquida magis arrideant:

℞. *R ʒi* ʒiij.
 ~ *Θ*ci* ʒi.
 M. S.

Resolvende Magen-Tinctur.
 Dosis 40. guttulæ, bis in die, modò dictâ ratione.

Pro Tinctura tartari paranda sumatur nitri & tartari ana, detonentur, & adhuc fervida in spiritum vini infundantur.

Præmissis hisce ad evacuationem porrò accedendum est: inter quæ primatum obtinent Vomitoria, stomachum optimè & immediatè evacuantia: v. g.

℞. *ʒi emet.* gr. iij.
Sacch. albiss. gr. v.

Ol. de-

Ol. destill. Menthe gutt. i.

M. f. Pulvis: D. S.

Brech-Pulver auf einmal.

Capitur manè in vehiculo calido, cum regimine debito; seu cerevisiæ tepidæ post vomitum superbibitione.

Loco hujus etiam

℞. Crocimetall. gr. v. vel viij.

infund. per noctem in Vini absinthii q. f. stent in loco tepido; mane exactè filtratur per chartam, & detur ℥j. S.

Brechwein auf einmal.

Sin horreat pusillanimis æger vomitorium, capiat sequentes per inferiora purgantes pilulas:

*℞. MP. de *co Querc. ℥j.*

Extr. absinth. ℥ss.

troch. alband. gr. ij.

c. f. q. Elix. Proprietat. f. Pilulæ. D. S.

Purgier-Pillen auf einmal.

Evacuato ita stomacho ab istis recrementis, proximum jam est, ut ejus vigor appropriatis denuò restauretur. Pro secundo ergò scopo internè usurpetur Elixyr Proprietatis ad gutt 40. omni manè, & vesperi subintroitum lecti hauriatur cochl. j. vel ij. de spiritu baccharum Juniperi per fermentationem parato; vel capiantur omni manè, & omni vespera sub lecti introitum, sequentis Misturæ cochlearia ij. vel iij.

℞. ∇ Menthe ℥iij.

~ bacc. Junip. 3vj.

Θis dulc. 3j.

Elix. vitæ Matth. 3iij.

Syr. de Mentha 3j. M. D. S.

Magen-Träncklein auf etliche mal.

Externè verò simul omni manè, quoties æger lecto exsurgit, & omni vesperà, dum illud repetit, regio stomachi, speciatim scrobiculus cordis, ut vocant, probè inungatur sequenti balsamo stomachico:

℞. Ol. stomach. Crat. 3j.

destillat. Menth. 3j.

Caryoph. 3ss.

expr. Nuc. mosch. q. f. pro Balsamo.

M. D. S. Magen-Balsam.

Quibus omnibus moderatus alimentorum, sed non supra appetitus dictamen, assumendorum conveniens usus observetur. Deus verò ex alto benedicat!

CASUS II.

ANOREXIA & CIBI FASTIDIUM.

Juvenis vitam agens sedentariam, ex obitu fratris mærore confectus, queritur de imbecillitate virium sensim subnata, de appetitu prostrato & alimentorum, in specie calidorum & carnosorum,

Tom. II. Pars 2.

insigni fastidio, sitis contra molesta est, & bibit licet, statim tamen repetit; superveniunt fluctuationes in regione stomachi, palatum & lingua glutine quasi obducta squalent, somnus profundus est, urina tenuis, pallida, ab usu naturali officio satisfacit.

RESOLUTIO.

Suprà propopositus casus si penitus considerationi subjicitur, ad affectus ventriculi haud dubiè referendus est. Ut autem in specie huic affectui nomen imponamus, certumque morbum statuamus, ex quo deinceps reliqua symptomata infecuta fuere, juxta definitionem symptomatum, quæ morbum partim sequuntur, partim comitantur, vocamus illum Fastidium seu Anorexiam, quatenus in genere quidem ab omni eduliorum genere videtur abhorre æger, in specie tamen carnis esumaversatur. Non quidem me latet, Fastidium si in genere consideretur, involvere simul inappetentiam cibi & potus, sed quod hic æger siti vexatus fuit, non opinor, eam fuisse excitatam, quatenus appetiverit vehementer, sed quatenus saltem halitus illi ex humorum in ventriculo & intestinis existentium effervescencia vellicaverint faucium suppremitates; non enim mirum, linguam squalore viscido faucesque esse oblitras, ætluque laborare corpus, quem insequatur intensa sitis.

PARS AFFECTA.

Partem itaque primariò affectam statuimus suo merito ventriculum, speciatim orificium ejus superius seu stomachum, quin fermentum stomachi malè affectum arbitramur muco, & in specie, quatenus suam volatilitatem perdidit, & hebes ac iners redditum fuit: unde omnia ingesta partim in status, partim in viscidos succos fuere mutata: id quod testantur fluctuationes in & circa stomachum suborta; quæ non solum ingestis, citra digestionem tanquam in bursa vacua contentis, sed etiam excitatis quibuidam statibus, adscribendæ; Unde ex his, quæ dicta sunt, facillè eruitur

CAUSA PROXIMA.

Causa hujus fastidii & anorexiæ proxima, est vitium fermenti digestivi iners seu hebes facti, h. e. non sufficienter acido volatilis, & ita non satisfaciens digestionem. Nempe obrutum est fermentum digestivum muco viscido tenaci, ex impedita digestionem enato: nam quemadmodum vis fermentalis in parte spirituosâ; sustentaculum tamen habet in humore acido-volatili, latitante in stomachi plicis ejusque porulis, undè malè affectis nostri corporis spiritibus simul in deterius ruit hu-

[Q]

mor

morille, investiens istos spiritus, quos primario pro fermento venditamus. Hoc itaque fermento successivè corrupto omnia, quæ ingeruntur, corrumpuntur, acorem, nidorem, visciditates & multas alias inducunt qualitates perversas, hinc perit omnis appetitus, & alimentorum defectu homo delassatur magis magisque, simul spiritus animales afficiuntur, unde non rarò in talibus lipothymia, aliique spirituum animalium excitantur affectus. Ostendit hoc & appetitus prostratus, à fermenti inertia maximè dependens; quin imò fastidium carnosorum pingue viscidum, in stomacho oberrans, ordinariò ostendit. Unde & digestionem deficiente tenuis ac pallida urina reddi solet. Saliva verò, quæ non ultimum gerit punctum in restituendo fermento, acris & glutinosa ipsa facta, uti fovet malum in stomacho, ita non diluens fauces, sitis causam præbet. Quibus ita positis, & spirituum animalium debitus vigor & volatilitas deficiunt, unde torpidis his ipsis redditus somnolentia quædam ægro molesta est, & virium insolita imbecillitas. Quod verò in hoc patiente urina tenuis & pallida à digestionem vitiata orta fuerit, facile probari potest: nimirum ordinariò, ubi digestio vitiata, nullaque, uti communiter dicunt, contingit coctio, ibi crux tenuisque excernuntur urinæ. In testimonium febres adduco, ubi, quamdiu adhuc urina cruda atque tenuis, tamdiu testatur de digestionem ventriculi nondum restituta. Sed præter hanc causam & possumus dicere, quod potus ille multò copiosior propter sitim assumptus non potuerit tamdiu morari in ventriculo ad tinturam urinæ suscipiendam, uti fit in potatoribus, qui itidem urinam crudam emittere solent, dum nimium ingurgitant potulenta: & ex hoc principio deduco & alvum in hoc patiente suo officio fungentem; ubi enim multum bibitur, vix alvus obstructa esse solet.

CAUSA REMOTA.

Properandum nunc est ad Causam occasionalem seu remotam, quæ (nisi aliæ prægressæ fuere me latentes) sufficere potest primò vita sedentaria, hinc maximopere mœror ex obitu fratris, omnes digestionem impediens, & ita viscidorum collectioni occasionem præbens, prædisponente ipsa vitâ sedentariâ ægrum ad hunc ipsum affectum. Mœrorem quippe potentem satis esse ad prosternendum omnem appetitum, & hinc inducendos varios morbos, quotidiana loquitur experientia: solus hic interdum causa est, & hominibus non solum interdum sanitatem, sed etiam vitam perdit.

PROGNOSIS.

Non omni caret periculo hic affectus:

Nam confirmatus ad tabem necessariò disponet ægrum: quin imò periculum est, ne hæctica adjuncta eò magis malum exacerbent: aut redeunte appetitu, ipsis cruditatibus in ventriculo acescentibus, periculum subest, ne appetantur, quæ non digeruntur, unde cachexia & morborum chronicorum patentes fores.

Interim tamen, ubi prudenti utitur Medico, non desperandum de convalescentia.

METHODUS MEDENDI.

Unicus hic in Cura hujus affectus respectus ad ventriculum est habendus: nempe viscidus mucus, removendus, hinc acidis volatilibus & aromaticis stomachi digestio restituenda.

Ut verò successus optatus sequatur, ex fonte diætetico & pharmaceutico media haurienda. Et quidem in specie quod attinet diætam: ibi ex caulis sex non naturalium rerum primario suadenda mœroris sepositio; hinc blandus motus instituendus: unde suaderem conversationem cum amicis plus minus latis.

Quodsi verò ob nimiam lassitudinem æger lecto detineretur, à pharmacia curæ principium sumendum, & ex hac quidem, vomitus ante omnia convenit, blandus idem & cautè provocatus: v. g.

℞. *℥i emet.* gr. iij.

Sacch. gr. vj.

M. f. Pulvis: D. S.

Brech-Pulver auf einmal.

Vel in forma liquida:

℞. *Croci metall.* gr. v.

Infund. in f. q. Vini Rhenani.

stent per noctem in digestionem loco calido: manè filtretur per chartam:

Filtraturæ *℥j.* D. S. **Brech-Wein.**

Hinc pro stomachi digestionem & appetitu revocando analeptics, & stomachico-aromaticis succurrendum erit;

℞. *▽ Menth.* *℥j.*

Cinnam. *℥ss.*

succ. Cydonior. vel *Rubi idæi* *℥vj.*

theriacal. *℥ss.*

Laud. opiat. ferm. gr. ij.

Syr. de Canell. *℥ss.* M. D. S.

Magen-stärkend Träncklein.

Vel sufficit haustus vini generosi, vel panis triticeus vino intinctus, sensim sensimque deglutitus. Hinc usurpentur blande acida volatilia stomacho valde grata, in specie tartarea, specialissimè autem cremor tartari, qui sæpius assumatur; est enim acidum resolutivum, non destructivum: item sal ammoniacum, terra foliata tartari: hinc extractum absinthii, calami aromatici, &c. internè assumptum commendarem. Ex quibus & similibus sequentes formulæ præscribendæ:

℞. *Elix.*

R. *Elix. Oli Mynf.* ʒʒ. D. S.

Magen-stärkend Elixir.

Accipiat 30. gutt. bis in die, manè in vehiculo calido, vespèri in frigido, semper bihorio ante pastum.

Vel R. *Elix. Propriet.* vel *Elix. Stomach.*
D. Mich. ʒʒ.

Detur & signetur simili modo.

Vel R. *Œci depur.* ʒi.

spec. diatrion piper. ʒʒ.

M. f. Pulvis. div. in 5. doses æqu.

D. S. *Magen-Pulver.*

Capiat omni manè unum.

Vel R. *Liqu. ʒ. x fol. ʒi* ʒʒ.

D. S. *Magen-Essenz.*

Dosis 40. Tropfen bis in die.

Vel in malo magis chronico:

R. *Rad. acori veri* ʒij.

HB. absinth.

menthae aa. M. j.

rad. gentiane ʒʒ.

sem. 4. cal. maj. aa. ʒij.

Incisa & contusa includ. nodulo:

D. S. *Magen-Püschel.*

Infundatur vino, de quo capiat æger omni die bis haustum: addendo omni haustui guttas sex spiritus salis dulcis.

Externè verò scrobiculum cordis jube-rem illinire oleo destillato calami aromatici, cum oleo nucistæ in balsamum redactò. Nec inconsultum foret sacculum applicare, herbis, floribus & radicibus aromaticis & carminativis repletum.

Vel R. *Crustam panis medullosam:*

Immerge vino generoso, vel acidulo, vel

Malvatico, adisperge pulver. nucis mo-

schatæ, macis & caryophyllorum.

Applicetur tepidè.

Item conducerent gargarismata pro abstergendo mucoviscido linguæ & faucium.

Pro siti verò tollenda ordinarem Jule-
bum cum succo cydoniorum, citri & spiritu
nitri dulci, addito appropriato syrupo ad gra-
tum saporem redactum, c. g.

R. *Decoſt. Citri Mynf.* lbj.

R. *fl. bellid.* ʒʒ.

Syr. rubi idæi,

scabios. aa. ʒi. M. D. S.

Alteritender Julep vor den Durst.

R. *Decoſt. fol. & rad. acetos.* lbj.

succ. ribinum.

rubi idæi aa. ʒʒ.

R. *fl. violar.* ʒij.

Syrup. cydon. aromat. ʒij.

M. S. ut antè.

R. *Decoſt. fol. & rad. acetos.* lbj.

succ. Cydonior. ʒi.

Ræ fl. rosar. ʒij.

syr. acetos. Citri ʒij.

~ Quidulc. q. f. M. S. ut suprà.

Tom. II. Pars 2.

CASUS III.

*PICA A SCABIE RETRO-
PULSA.*

PUella procax & vegeta, annorum
quindecim vel sedecim, & quæ non-
dum menses passa est, corripitur incunte
vere sponte suâ scabie, cujus pertæsa
molestie, ut & ejus pruritus fastidiosi,
nescio quibus Linimentis eam curare jate-
git: corripitur hinc brevi post febre an-
xiosa, malignæ simili, quæ tandem, licet
difficulter, curata, redeuntibus sensim
functionibus naturalibus, redit postliminiò
& appetitus, sed minus consuetus; præ
ceteris enim eduliis, speciatim cretà sub-
tilissimè tritâ delectatur, ejusque esu mi-
râ quâdam voluptate afficitur, palam
pariter ac clam eam suffurat amcomedendo.

R E S O L U T I O.

Affectus hic rectè dicitur Pica, quæ est
appetitus ad edulia insueta; si enim hæc puella
ferretur ad edulia adsueta intensius, non es-
set Pica, sed Malacia; cui viri pariter ac mu-
lieres obnoxii sunt.

Causa proxima est depravatio fermenti
stomachi digestivi in acrimoniam salinam.
Pars affecta est orificium stomachi sinistrum,
ceu sedes appetitus. Causa remota hic est
scabies, à qua fermentum stomachi digesti-
vum depravatum est. Interim cum puella sit
procax & vegeta, non est suspicio, scabiem
esse ortam ex suppressione vel emansione
mensem, talesque alias asthmaticæ esse so-
lent. Adhæc, si supponatur, menses in hac
ordinariò fluxisse, scabies simul per conta-
ctum contracta & retropulsa Picæ potuit an-
sam dare. Ergò possunt menses deficientes
vel emanentes allegari hic, possunt etiam
omitti.

Cæterum, ut major lux huic negotio
foerneretur, tria circa resolutionem hujus ca-
sus considerata sunt: nempe

1. Quæ sit causa proxima scabiei?
2. Quomodo scabiem & alias excretio-
nes cutaneas retropelli contingat?
3. Quomodo hæc retropulsa tandem fe-
brim & picam intulerit?

Quoad I. Scabiei Causa proxima est fer-
mentum acido-acre, sub cuticula defixum, na-
tum occasione interclusæ transpirationis. In
scabie enim simpliciter afficiuntur partes inter-
cutaneæ, non verò internæ, ut in variolis quan-
doque fit, sed in specie partes extimæ, manus
& pedes, tanquam magis frigori expositæ, ra-
ro internæ, nisi confirmata sit magis scabies,
afficiuntur. Adhæc in scabie primario afficiun-
tur internodia digitorum, carpus, tali & genua,
locaque articulorum tendinosâ. Jam verò oc-
calio scabiei quærenda venit in transpiratione

[Q] 2

inten-

insensibili nonnihil impedita, unde homines quieti aut minus laboriosi ei sunt obnoxii, quatenus ob deficientem laborem deficit quoque transpiratio, non secus ac nonnihil sordidi, & munditici minus dediti, eadem quoque solent corripri, quatenus horum pori ordinariò à sordibus oblinuntur, & sic excernenda retinentur, unde excrementa coacervata acorem contrahunt. Etenim halitus nostri corporis naturaliter per cutem transpirantes sunt ordinariò falsi: qui si mora sua sub cuticula detinentur, in deterius labuntur, corruptionem subeunt, & acorem contrahunt, qui vi suâ fermentativâ adurit nutritum corporis roridum dulce alcalinum, quod corruptum partim degenerat in liquamen acre falsum, partim verò hæc falsa excrementitia irretiuntur in nutrimento hoc spermatico, unde viscositatem contrahunt. Causâ adeoque scabiei proxima est fermentum acido-acre, seu acido-falsum nonnihil viscidum, à quo contagiosa vis scabiei dependet, per contactum se propagantis, quippe hæc visciditate suâ facile adhæret vicino corpori, acrimoniâ verò acido-falsâ parti infixâ, corrumpendo nutrimentum partis proximum, se multiplicat, & tandem corpus defædat. Patet hoc

1. Ex pruritu: Omne enim acidum acre paulò manifestius, cutem attingens, semper pruritus infert, & si est acius, rosionem facit.

2. Ex pustularum colore rubro: Acida siquidem primò rubedinem, postmodum albedinem inferunt; contra alcalia primò albedinem & hinc nigredinem, inducunt. Videbitis hoc in fonticulis, qui, si parantur per spiritum nitri vel butyrum antimonii, rubedinem & hinc albedinem ostendunt; contra verò qui per alcalia excitantur, primò albedinem, tandem nigredinem, partibus inurunt, quæ signum mortificationis est.

3. Ex squamis successivè decidentibus? Acidum scilicet successivè erodit cuticulam, quæ erosa abit in squamas;

4. Ex pure: quod emergit ex sanguine fermentando transmutato, dum ab acido fermentando præcipitatur ejus sulphur, quod ex rubedine transmutatur in albedinem, destructâ nempe alcalicâ parte, sic sanguis salinus volatilis oleosus ab acido in scabie præcipitatur, ita ut destructo alcali præcipitetur sulphur rubrum in albedinem.

Differentia autem scabiei in humidam & siccam est nulla & saltem accidentaria: prout enim subjectum patiens plus minus est serosum, eatenus quoque pustulæ humidiores magis conspiciuntur, & contrà.

Curatio autem scabiei primario peragitur per alcalia, ut Linimenta ex oleo tartari per deliquium, quæ infallibiliter curant Scabiem; sicut confirmata & serina per Mercurium vi-

vum, Decoctum Mercurii vivi, cingula Mercurialia, &c. Mercurius enim est alcalinum subjectum, & acidum absorbet.

II. Quæritur jam, quomodo repellatur scabies, sive benigna, sive aliæ cutaneæ excretiones malignæ: Resp. Repelluntur hæc, sive benignæ sint, sive malignæ, duplici modo; vel (1) à pororum cutis occlusionem; vel (2) à sanguinis motu, & cum hoc feri in alium locum concitatione.

Quoad (1) occluduntur pori duplici occasione: nempe vel à frigore, vel à viscido externo. A frigore quidem, quatenus hoc vel extrinsecus admittitur, vel intrinsecus immittitur. Illud fit, quando corpus denudatur, illudque post sudorem frigori externo incautè exponitur, & quando post sudores prolectos cutis anserina corpus corrugat: in quo casu pori statim stringuntur, ob fibras cutis nerveas, ab aëre frigido vellicatas, quæ se contrahunt, & poros claudunt; unde semper variolis, purpurâ & febribus petechialibus, item scabie decumbentibus autores sumus, ut patientes calidos se teneant. Frigus verò intrinsecus immissum est v. g. haustus frigidus: notum enim est, quod ex ingurgitatione frigida cutis se stringat, quia occasionem præbet, ut per consensum membranarum cum stomacho panniculus carnosus & connexæ fibræ cutaneæ se stringant, & hinc pori se claudant. Unde v. g. si tales subitò frigidam ingurgitant, videtur ipsis, quasi aquâ gelidâ perfunderentur, cum contrà calida iuscula assumentes dicere audiamus, sibi totum corpus incalescere, & non rarò sudorem supervenire; unde similiter ægrotis in febribus malignis petechialibus, purpuratis, aliisque excretionibus cutaneis, suademus, ne frigida hauriant. A viscidis verò, quatenus linimenta unctuosâ & oleosa, imprimis ex pinguedinibus, medullis, oleis expressis, emplastris applicatis, &c. oblinunt poros, abstineant. Et ex hoc fundamento venit, quod quædam subjecta non possint ferre emplastra, imprimis scorbutici, & qui serum habent acius; hinc tales à levi emplastrorum admotione pustulas & herpes quasi contrahunt, quia per emplastra talia coercentur insensiles halitus, qui in scorbuticis per se admodum acres, sub cute coërciti, majorem acrimoniam acquirunt. Observetur hoc in Praxi, cum non rarò Chirurghi talibus emplasticis admotis ulcera faciant deteriora; quin potius in talibus ulceribus corrosivis meliori successu pulveres conducunt, ex lapide calaminari, creta, cerussâ, saccharo saturni, croco Martis præcipitato, & aliis, quæ acidum absorbendo saporem aluminosum acquirunt.

2. Altera causa, est sanguinis motus aliorum concitatus, & ita similiter feri sanguinis ab externis partibus remotio: quò pertinent omnes venæsectiones, purgationes, vomitiones, ac clysmata in cutaneis excretionibus intempestivè applicata, quibus sæpe motus naturæ expulsius ad exteriora pervertitur. Nam ubicunque contingit sanguinis excretio, vel sensibilis vellicatio, ad eum locum semper concitatiùs sanguis moveri solet; non secus ac à spinâ parti infixâ mox hæc tumet, ac festucâ oculo infixâ ille inflammatur & lachrymæ erumpunt: simili ratione, si in talibus morbis clysmata, vomitoria, purgationes & venæsectiones, intempestivè instituuntur, tunc extremæ partes non æquali motu sanguinis solent irrorari, unde minus versus exteriora natura vergit ad expellenda recrementa. Achinc est, quod in febribus petechialibus, variolis, &c. Venæsectio sit adeò periculosa, ob impeditam earum eruptionem, nisi in primo morbi insultu ea instituat, ubi tamen etiam non semper est tuta propter virium prostrationem. Sic novi clysmata jam suppurantibus variolis fuisse lethalia, partim ob deflorescentes inde variolas, partim ob succedentem diarrhœam colliquefactivam lethalem; Unde & in puerperis purpuratis si sit suspicio febris malignæ, tam cautè lochia sunt tractanda, & potius nonnihil stringenda, quàm ad effluxum, cum sanguinis ad alium locum concitatione nimis concitanda, monet Willis, ne excretio cutanea impediatur. Nam cum sanguine ita ferum etiam simul retrahitur, tanquam commune nutrimenti & excrementorum vehiculum, cumque hoc imbibita excrementa cutanea aliorum deponuntur, & ad uterum simul rapiuntur.

Jam III. quæritur: quomodo scabies & aliæ excretiones cutaneæ retropulsæ tam periculosa & anxiosa symptomata, ut febres, cum anhelitu & asthma conjunctas, possint inferre? Recrementa ista antea sub cute defixa, quacunque occasione vel immediatè cum sanguine mixta, vel mediante sero soluta, in cruorem reasuta, turbant sanguinis texturam seu compositionem materialem, primariò à duobus illis salibus, acido nempe & urinoso dependentem: quâ crasi vitiata vitatur & illius fermentatio, depravatur illius spiritusascensio & incallescensio, sicque à tantillo fermento intercutaneo tota massa sanguinea infici potest. Quantum enim valeat tale fermentum, patet ex febribus intermittentibus, subinde post oris pustulas extrusas evanescentibus, ubi expulso tantillo fermenti, febris coercetur.

His ita præsuppositis revertimur ad Picam nostram, quæ in hoc subjecto dependet

à fermento stomachi ob scabiem retropulsam primariò aciditate nimia, sed tamen admodum acri & rosivâ, nonnihilque falsâ, imbuta; unde in talibus fermentum hoc cupit saturari, ubi tamen non sufficiunt ordinaria alimenta consuetâ, sed appetuntur ea, quæ acidum hoc concentrant ac imbibunt, qualia sunt creta, calx, argilla, &c. Illustrat hoc negotium Hildanus in *Observat. Cent. 1. Obs. 37.* Qui observavit picam, in qua appetivit æger haleces, pisces, & carnes salatas ac infumatas, quales optimè digessit; sed res ordinarias, ut juscûla etiam, qualia horruit, cum summa difficultate deglutivit. Pica autem illa oriebatur ex ulcere faucium, quod trans mittebat suum pus & saniem falsam in stomachum: hæc alteravit fermentum stomachi, ut hoc similia promptè appeteret, v.g. haleces & similia, unde depravatus appetitus: Sic & picam ab acrib. & Θ sis humorib. in ventriculo collectis observavit Horstius *T. 1. Observat. 5. l. 4.* ubi Ψ & terra fornacum comesta à puella 10. annorum. Danda proinde, qualia appetunt, modo non in nimia quantitate, vid. Fehr. *Tract. de Absinth. pag. 98.* qui etiam suæ ægræ concessit cretam, sed miscuit cum mechoacanna; quæ, purgans est insipidum ferè, adeoque illam sub larva cretæ agens, utrique sic scopo, elegantî stratagemate, satisfecit, quatenus nempe per cretam destructum fuit acidum, & simul per mechoacannam evacuatum: Similem Casum videbitis in M. A. N. C. Ann. 1. *Observat. 83. pag. 199.* ubi puella non nisi creta saturabilis, admixtâ mechoacannâ albâ, curata fuit.

Quoad Prognosin, metus nullus est, quod scabies recidivet; bonum enim esset, si posset scabies revocari, cum sic ægra curaretur. Alter verò metus majoris ponderis est, nempe si creta in majori quantitate comeditur, nocivum erit, & metus ne reddatur cachectica, quia vis fermenti primæ digestionis destruitur, contrario modo, si sobriè assumitur, non nocebit. Et uti verum est, quod omnis repletio etiam optimorum secundum Hippocratem sit mala, panis verò pessima, ut in se non nocivus; ita creta omninò est insons in parca dosi deglutita. Patet hoc ex eo, quod constat, picâ laborantes varia absurda sine noxa successivè comedisse: nam appetita optimè, non appetita verò minus digeruntur à fermento, ac verus est Hippocratis aphorismus *sect. 2. Aph. 50.* Adsumeta licet deteriora, insuetis licet bonis, minus nocere. Quoad

CURAM,

quia fermentum nimis acre est, metuendum, ne varia symptomata incurrat ex vomitu, primò instituendo. Itaque tutius erit, ut

[Q] 3

1. fer-

1. fermentum ventriculi nimis acidum & rodens saturetur! hinc
2. per vomitum evacuetur; &
3. tandem ventriculus corroboretur.

Pro primo scopo, ad saturationem faciunt Martialia, & hinc alcalia fixa, quæ destruendo acidum illud in tertium falsum mutant, Verbigratia:

℞. *Corall. r. præp.*
Crystall. præp.
Ebor. usti præp.
Θis absinth. ana ʒj.

M. f. Pulvis:

div. in 4. part. æqu. D.S.

Dampffende Pulver.

qui manè & à meridie capiat.

Subjectis delicatioribus Martialia crudiora, vel in majori dosi exhibita, convenientia non sunt, ob sensibilius stomachi orificium, hinc iis loco horum conducit tinctura vitrioli Martis Zwelfferi, in morbis chronicis ex acido artis proficua. Insuper dicta tinctura magis participat de terra foliata tartari, quod ex eo patet; dum enim miscetur terra foliata tartari & vitriolum Martis ritè parata, & in mortario lapideo teruntur, abeunt in deliquium, per spiritum vini extrahendum: quod superest in fundo, maxima pars est Mars. Huic incommodo ut consulamus, huius loco sit sal Martis compositum ex iisdem constans, nisi quod in sicca forma usurpari possit: nempe recipiatur ana terræ foliatæ tartari, & vitrioli Martis ritè parati, (non autem Venerei, quod vomitus creat:) Hæc terantur in mortario lapideo, sub tritura mistio liquefit, & abit in formam pulvis rubicundæ, quæ blando calore exsiccat, & hinc iterum teratur, sic acquiritur pulvis obscurè rubescens, nec amplius liquefcens, sub nomine salis Martis compositi: cuius dosis à gr. xv. ad ʒj. & ʒʒ. Felicem huius usum in affectibus mulierum hystericis, paroxysmum præcavendo, & Melancholicis, vidi sæpius.

Porrò terreis, illis, tanquam privativè acida absorbentibus, addantur salia alcalia fixa, positivè agentia. Quodsi cupiamus temperatum adstringens, conficiatur illud ex succo cydoniorum vel aliò acido blandiore cum ebore usto, ita aluminosus sapor emergit: sin verò scopus sit emendare acidum peccans, omittatur acidum; aliàs enim effervescent, unde extra corpus saturata, intra illud saturari nequeunt.

Ad secundum autem scopum faciunt Vomitoria. Porrò Mercurius dulcis loco purgantis in scabiolis optimum est remedium; scabiei enim fermentum delebit. Hinc reliquis adjungi poterit à gr. xv. ad ʒj. sine periculo: v. g. ita præscripti aliquando scabioso:

℞. *Extr. panchym. Crollii*
ʒii dulc. ritè par. ana gr. xv.
Scamm. ʒat. q. f. pro stimulo.
 M. f. l. a. Pilulæ: S.

Purgier-Pillen.

Nec inconcinuus est pulvis purgans ex pulvere jalappæ & tartaro vitriolato cum scammonio sulphurato; quæ methodus Fehrii est optima.

Pro tertio tandem scopo non inconcinne succi aciduli laudantur: licet enim acida aliàs nervis hostilia sint; blanda tamen ea, & in specie vegetabilium, quæ non sunt adeò acris, stomacho arrident; unde succus cydoniorum & citri egregii sunt. Sed quæritur; quomodo illi conservari possint, cum facile fermentent? ubi vulgaris est modus, ut iisdem superinfundatur oleum, sed malè; ita enim alterantur, & nauseosum rancorem contrahunt; unde potius laudandus est Helmontii modus per fumum sulphuris, quò succi tales præservantur à fermentatione & corruptione. Nempe lagenæ replentur fumo sulphuris, hinc subito succus infunditur, agitur probe: hoc factò, de novo aliquid sulphuris fumi immittatur. Hoc modo quicunque succi vegetabilium essentielles, ut betulæ, &c. conservari possunt. Externè applicanda sunt vina aromatica & olea destillata.

Quoad diatam, egregium est vinum absinthites.

Occasione autem scabiei suprà monitum, quâ ratione affectus cutanei retropulsi turbas excitent in œconomia animali. Jam ergò ratione curationis quæritur: quomodo scabies, ut & variolæ, aliæque excretiones cutaneæ retropulsæ revocari & expelli iterum possint? Resp. Res facilis est: nempe fundamentum expulsionis huiusmodi morborum & excretionum cutanearum consistit in eo, ut ista fermenta salina separentur denuò ex concreto sanguinis, & separata eadem imbibantur à sero, quo, ceu vehiculo, iterum sub cute desigi possint. Jam verò separatio ex liquido fit duplici modo: (1) per præcipationem. (2) per transcolationem. Illa est, quando v. g. ex musto sub fermentationis motu feces præcipitantur, vel quando ex solutione vitrioli per instillationem olei tartari præcipitatur metallum, ab & ex solutione acida. Hæc fit per medium aliquod porosum, liquida transmittens, crassioribus in colatorio relictis. Sic quando mustum præcipitatum transcolatur per chartam, feces in charta remanent: Sic solutio vitrioli data dum filtratur, particulæ metallicæ manent in charta.

Ex quo patet, quod in liquidis ritè invicem unitis separandis transcolatio præsupponat præcipationem factam: sic enim v. g. mustum

mustum ante sui fermentationem & præcipationem pertransit chartam vel colum totum turbidum: quodsi verò idem deferbuerit, & feces præcipitatae sint, hæ in colo remanent, & liquor clarus pertransit. Par ratio est in massa sanguinea, ex qua fermenta salina & recrementa, texturam ejus turbantia, separari prius debent per præcipationem, antequam in corpore; tanquam per chartam emporeticam, transcolationes contingant, & sero puro transeunte, recrementa salina circa poros cutis congesta, defixa maneant, unde excretiones cutaneæ efflorescunt. Unde falsum est, quod sudorifera simpliciter curent affectus tales cutaneos, ejiciendo recrementa ad corporis peripheriam; quin potius illa, quæ talia, colliquefcere faciunt massam sanguineam, & tenuiorem eam reddunt, nil verò hoc ipso præcipitant, adeoque per se hic nullius usus sunt; si verò talia, quæ simul præcipitent, illis addantur, tunc insignis usus erunt. Unde, ut scabies vel aliæ excretiones cutaneæ febrium malignarum retropulsæ, ad peripheriam corporis dehuò revertantur, præcedant absorbentia, Præcipitantia dicta, ubi imprimis conveniunt alcalia fixa fermentum acidum peccans corrigentia, & in salum transmutantia, sicque promoventia, ut præcipitata recrementa salina, imbibita à sero, felicius per sudorem ex massa sanguinea eliminantur. Unde eminent salia, tam fixa, ut cardui benedicti, absinthii, fumariæ, &c. quàm salia volatilia, viperarum, fuliginis, cornu cervi, sanguinis humani, &c. quibus non incommodè, si æstus forte urgeat, antimonialia fixa, imprimis Bezoardica, ut antimonium diaphoreticum, cinnabaris antimonii, aliaque sulphura antimonialia fixa, addi possunt. Non minus locum habet Mixtura illa polychresta ex aceto & lapillis cancerorum, potionibus addita, sumendo lapillorum cancerorum ℥i, aceti verò ℥vj. præterpropter; Ita enim, dum deferbuit mixtura, fit salia, nonnihilque urinosi saporis, sudorifera pariter ac diuretica, adeoque, quæ vi salia acria præcipitandi pollet. Sit v.g. exemplum talis formulæ:

Rx. ▽ *Scabios.*

fl. samb.

Card. bened. ana ℥i.

Acet. vini ℥vj.

Lapill. cer. præp. ℥i.

℥ii diaphor. gr. xv.

Syr. de fumar. ℥iij. ad vj.

M. pro 2. vel 3. dosib. S.

Ausstreibend Schweiß-Träncklein.

Sic quoque convenit Emulsio illa Cratoniana decantata ex seminibus expulvisis, napi, aquilegiæ, cardui benedicti, citri, &c. concinnata, elegans ad revocandos hos morbos,

quam correxit Zwelfferus in Phatmac. Regia adjectione myrrhæ, sub nomine Liqueoris Alexipharmaci, in malignis, purpura puerperarum, aliisque febribus cum excretionem cutaneâ conjunctis, commendanda. Tandem etiam fimus equinus recens nodulo inclusus, & in potu ordinario infusus, expressusque ad purificandam massam sanguineam, expellendamque scabiem, variolas & morbillos, vi suâ salino-ammoniicali multum confert; sicut idem quoque in æstu urgente, & sudore provocando egregius est. Ultimum adhuc consilium Zacuti Lusitani est, quò suadet scabiosis, quibus malum retropulsus est, ut concumbant cum alio scabioso in uno lecto, pro revocanda scabie. Et tanè, si scabiosus potest inficere sanum, multò magis eum, qui jam fermentum scabiosum contraxit.

Quæritur porro etiam hoc in casu, cum picans nostra sit puella, an, si menses forsitan aliquid conferant ad scabiem, & horum excretio in hac puella nondum facta fuerit, venæsectio aliquid conducat ad promovendam vel curandam scabiem? Nego. Cum enim procax & vegeta sit, non ex mensium vitio contraxisse scabiem videtur: ac variant omninò naturæ mulierum; nunc enim citius, nunc tardius effluunt, ita ut quædam 10. 11. 12. imò 18. annum quoque expectent, quale exemplum jure hereditario ex matre, circa vigesimum demum ætatis annum primos menses passæ, in gravida vidi. Unde quando non suspicio mensium suppressorum adest, venæsectio omittenda; cui opinioni nostræ non refragatur, quod Rhodius *Cent. 2. Observ. 57.* adducit, nempe virum malacia laborantem, reconvalescentem tamen post supervenientem hæmorrhoidum fluxum; potuit enim subiectum esse hypochondriacum, cui levamini sunt hæmorrhoides, adeoque malaciam hinc pati. Si verò mensium suppressio juncta fuisset, tunc ejus simul ratio habenda esset, venæsectione eosdem provocando & adjuvando.

Sed quid si post curam picæ superveniet fastidium vel anorexia? Resp. Amara conducere, volatilibus sociata, ut elixir proprietatis sine acido, tinctura tartari composita cum spiritu salis ammoniaci anisato.

An vinum concedendum album, acidum? Nego: benè autem potest admitti dulce, rubrum, antiquum.

Sin febris lenta elui cretæ superveniat, conducit Vomitorium, Mercurius dulcis, item mixtura polychresta ex aceto & lapillis cancerorum, sal ammoniacum cum terra foliata tartari, &c.

Quæritur: an lac ob atrophiam conducat? Resp. Si omnia ritè se habeant, & etiam menses fluxerint, comedi potest debito cum regimine.

CASUS

CASUS IV.

CHYLOSIS LÆSA EX CRUDITATE NIDOROSA CUM SODA.

*F*œmina delicata, lautioribus epulis dedita, bonisque fortunæ abundans, queritur de subito crebrioribus affligentibus, vagis tamen & subito denuo cessantibus, æstuationibus corporis aliquot horis à pastu, cum faciei vago rubore, accedunt subindeructus tetri & saporis, aut nullius aut non facile explicabilis, quibus interdum quintâ vel sextâ noctis horâ superveniunt secessus liquidi, spumosi, varii, quibus interdum de cibis quibusdam assumptis plus minus nonnihil permixtum; quin imò conjunguntur his interdum vomitus materię similis, quos tamen antecedit gravis anxietas cordis, cum dolore circa spinam dorsi compressivo ad jugulum usque quasi ascendente, & fauces constringente. Mane exsurgens lecto, mediocriter se habet, sed assumptum jentaculum abhorret istud, & odorem juseuli gallinacei pro consuetudine hauriendi percipiens nauseat, unde paucis cochlearibus ejusdem assumptis, id seponit: superveniunt brevi post solitæ æstuationes, in specie caloris intensioris sensu in regione stomachi, qui gulam flammæ instar amburit; unde gravior sitis supervenit cum appetitu circa prandium prostrato, frigida saltem, præsertim potulenta desiderat, calida respuit.

RESOLUTIO.

Digestioni nostræ opponitur cruditas. Digestio verò fit à fermento stomachi digestivo effectivè; dispositivè verò à calore stomachi. Quando ergò deficit, fit; vel quando fermentum est nimis acidum; vel nimis iners aut defectuosum: si illud, est cruditas acida: si hoc, nidorosa. In præsentî agra affectus primarius est Chylosis læsa, eaque ex cruditate nidorosa, quam per consequens sequitur ardor stomachi seu soda. Adeoque primario liquamina nidorosa seu biliosa, tunc secundariò cum his effervescentia acida, hic considerata erunt.

Jam verò pro hisce melius intelligendis, præsuppono:

I. Cruditatem nidorosam fieri imprimis in febribus, præsertim acutis, ubi deficit etiam omni consuetorum appetitus, quod sane signum est deficientis plus minus acidi digestivi in stomacho, adeoque in talibus assumpta mox cruditatem nidorosam contrahunt.

II. Eandem cruditatem oriri præsertim

à pinguibus, obtundentibus & hebetantibus fermentum stomachi digestivum, speciatim ab ovis frixis, ut & castaneis butyro comestis: ita sane, ut qui nesciunt, quid sit cruditas nidorosa? me suafore comedant ova frixa, ita experientur ructus tetros putridos, &c. sic pariter cum lac, seu pingue corpus, facilis sit corruptionis in tali stomacho, pinguedine suâ abundanti obtundens & hebetans vim fermenti acidi, proinde etiam hoc ad nidorem disponere valebit.

III. Eam ipsam etiam superverire; quando alimenta diutius in stomachi cavitate retinentur, ita, ut pylorus irritatus eadem non transmittat, tunc scilicet, licet benè digesta sint, successivè ex mora illa corrumpuntur, & in liquamina nidorosa degenerant.

IV. Tandem notum est, omnium frequentissimè fructus horatos aquosos, facile putrescentes, quales sunt cucurbitæ, cucumeres, melones, aliique aquosi facile non tam fermentando acedentes, quam putrescentes, cruditatem nidorosam inducere. Hæc qui laborant, semper habent excrementa alvi liquida impensè foetentia. Hinc à cucurbitis cholera & diarrhœa superveniunt.

Ex his colligere licet, non contingere cruditatem nidorosam, quamdiu fermentum stomachi sufficit vel præpollet, sed quando vel deficit, vel ab assumptis plus minus infringitur, ut vel fermenti defectus vel inertia sit origo cruditatis nidorosa. Hinc assumpta ex defectu vel inertia fermenti digestivi non acorem fermentativum contrahunt, sed defectu hujus in loco calido & humido, qualis est ventriculus, retenta successivè ad corruptionem putredinalem tendunt, sub qua putredine alcali eorum proprium emergit, & agit in adjunctum pingue oleosum, atque ita horum amborum concursu foetor, & sapor teter, amaricans, &c. enascitur.

Scilicet in hoc differt fermentatio à putredine, quod licet in utraque concursus salium videatur, in fermentatione tamen primarium agens sit acidum, in putredine verò alcali. Hæc ergò cruditas nidorosa parit bilem veterum vitellinam, ex nimio calore in stomacho genitam, qui observarunt hunc succum in febribus ardentibus.

Hoc negotium ita illustrari potest: Vegetabilia quæcunque fermentationi exposita, sub principio fermentationis & progressu ejus gratum & acidulum odorem & sorem spirant: si verò ulterius fermententur, tandem rancescendo putrescunt: Similiter quando alimenta ingesta vel non fermentantur, vel sub fermentatione impediuntur in suo motu, in sorem tetrum amaricantem, nunc nauseosè dulcem, abeunt, & usque in perfectam putredinem degenerant. Cruditas ergo

ergò nidoroſa, quæ putredinis inchoatæ ſpecies eſt, à ſpontanea alimentorum corruptione, à defectu vel inertia fermenti digeſti, oritur. Ac facit huc locus Helmontii, qui dicit, quod chylus nimia cocturâ corrumpatur. Sic roſæ ad fermentandum depoſitæ, niſi exactè punctum fermentationis obſervetur in putredinem & ſaporem tetrum abeunt aut degenerant.

Nidoroſam ergò hanc in ægro præſenti cruditatem oſtendunt ructus tetti, *wie ſaul Doß* / idque fit eò magis, quando pylorus ex inſauſtis his retentis ſe claudit, & nihil transmittit, unde retenta magis corrumpuntur. Ructus hi ſunt comites non rectè digeſtorum, tetti, non tamen acidi, niſi quando ex occuſu acidi ſoda exoritur; ſed fœtidi inſtar pinguium ambuſtorum, quia retenta ſucceſſivè ſuum Gas exhalant. Sapor eſt inexplicabilis; ſanè miri ſapores non raro ab ægris in ore percipiuntur: Sic frequenſ eſt, ut ab hypochondriacis ructus acidi & inſignes exſurgant: Imò proſtant exempla eorum, quibus ex ſapore vitriolaceo fauces quaſi conſtrictæ viſæ fuerunt, referente Sennerto *lib. 3. Præcos*. Et ſicut in bile primò dulcedo, dein amaror ſe prodit; ita etiam alimenta corrupta tandem ſaporem amarum naſeoſum reddunt; ſicut idem fit in glycyrrhiza ex longiore digeſtione tandem anareſcente. Nihil autem magis amicum eſt ſtomacho, quàm blandum acidum; nihil etiam eandem magis lædit, quàm naſeoſus amaror, & qui putredinem ſpirat. Hinc ſtomachus alimenta partim putrefacta, partim amara, abhorret, & eadem rejicere tentat, hinc poſt aliquot horas, cum magis nidoroſa facta ſunt eadem, propter ſtimulum per ſuperiora rejicit. Idem fit ac in naſea cereviſiæ in febribus ardentibus.

Ex his itaque patet: quare præmiſſis vomitoriis acida temperantia, v. g. tartarea, ut cremor tartari, tartarus vitriolatus, ſpiritus nitri dulcis, nitrum vitriolatum, &c. in nidoroſitate curanda emineant; cum econtrà nil magis ventriculum lædat, quàm amarities colocynthidis, opii, &c.

Cauſa proxima nidoroſæ cruditatis eſt partim fermentum ſtomachi deficiens, partim iners factum, vel alio modo alteratum, idque ob errorem externum, nempe propter alimenta bona multa ſine moru. Ubi tamen mihi non videtur, reliquias alimentorum conſtituere fermentum illud, ſed potius modificare ac determinare idem, ita quidem, ut hujus ratione melius digerantur conſuetæ ceu ſymbolyzantia cum eodem, & adſuetæ, licèt deteriora, inſuetis, melioribus licèt, parcius lædant.

Dixi nidoroſa lædere ventriculum: Jam ergò cum quælibet aſſumpta, in ſpecie juſcula

Tom. II. Pars 2.

gallinacea, pinguis, facilè in nidorem abeant, hinc ſtomachus talia, æquibus propter nidorem læſus eſt, abhorret, & in naſeam, quæ ſanè eſt ſpasmus oriſicii ventriculi ſiniſtri, cie-tur. Phlogotès verò quod attinet: obſervandum eſt, quod cruditas nidoroſa, quamdiu talis eſt, eaſdem non excitet: ſimul atque verò liquaminibus nidoroſis occurrit acidum, vel ſtomachale, vel pancreaticum vitioſum, vel aliud, mutatur, & novas arripit qualitates, ſpecialim efferveſcit, quod hîc Soda probat. Ex mutua autem & inæquali efferveſcentia horum cum alcali naſcuntur phlogotes, intrante ſcilicèt cacochyliâ hac heterogeneâ maſſam ſanguineam: quod confirmatur ex eo, quod tales ægri aſſum & pulſum obtineant celeriore, ſimilem illi, qui Heſticis aliquot horis à paſtu ſupervenire ſolet; interim phlogotès illæ, ſuperveniente diaphoreſi blandâ, mox evaneſcunt.

Ex eodem quoque fonte eſt Soda, quâ afflicti roſionis & caloris ſenſum percipiunt in gula, *es brennet / alß wann man heiß Scheide-Waſſer auf der Haut hätte* / ab effluviis acribus adſcendentibus; non ſecus ac ſpiritus nitri rectificatus, ſi manui aſſundatur, rodit & ardet. Similiratione cum acidum cum nidoroſo in ſtomacho efferveſcit, emergit ardor, ſimulque roſionis ſenſus, ab effluviis iſtis acribus hinc œſophagum adſcendentibus. Non autem probabile eſt, in ſtatu naturali, fieri in corpore noſtro efferveſcentiam propriè dictam, quia omnia ſunt temperata in ſtatu naturali, cum temperata nos curent, intempeſcata verò lædant, ſicut intemperatiſſima ſunt venena; ſed ſaltem blandus fermentationis modus ſtatuendus videtur.

Lympha ſalivalis in faucibus deficiens eſt cauſa ſitis: quo magis deficit lympha ſalivalis, eò magis intenditur ſitis, in tantum, non in totum; ſitim enim clamorſam non poteſt inferre; ſic enim v. g. noctu dormientes hiant ore, incidunt in ſitim, non tamen intenſam: verùm edat quis piper & ſal, ſitim maximam & clamorſam percipiet, quamvis adſit lympha: ut adeoque, licèt ſitis cauſam privativam, lymphæ ſalivalis puta defectum, agnoſcat, præter hanc tamen & poſitivam habeat. Et talis eſt ſitis febricitantium, ex oriſicio ſtomachi ſiniſtro, ab alcali acri plus minus ſalſo affecto dependens. In hoc caſu oritur à cruditate nidoroſa amara facta in ſtomacho, ita tamen, ut, ſi adjungitur lymphæ ſalivalis defectus, magis adhuc intendatur.

In omni Prognôſi tria attendenda ſunt?

1. Eventus morbi, an nempe hic ſit curabilis, vel non? aut ſalutaris, aut lethalis?

[R]

2. Tem-

2. Tempus eventus, quod sequitur naturæ motum.

3. Modus eventus, præsertim in acutis, an nempe criticè? an verò paulatim cessaturus sit morbus?

Jam ergò ratione (1) noster affectus non est lethalis; ratione (2) potest brevi curari; ratione (3) verò rectè præcavetur ejus incrementum, ne affectu neglecto appetitus prostratio, sitis intensa, diarrhoea, vel fomes pro febris ardentibus, superveniant. Nam cruditate nidorosa laborantes semper alvi liquidioris sunt, & excrementa subinde insignem foetorem de se spirant, aut tandem fomes febrium acutarum cumulat.

Ratione Curæ hæc indicationes observentur:

1. Recrementa in stomacho & primis viis stabulantia sunt evacuanda, & primariò quidem si fieri potest per os, secundariò per alvum.

2. Si quid eorum superest, corrigatur temperatis, imprimis blandè acido salis, quæ dulcia amaricantia temperare & corrigere valent: qualia v.g. sunt cremor tartari, arcanum duplicatum Mynsichti, os sepia cum tartaro vitriolato, &c.

3. Appropriatis acidis blandis adstringentibus stomachi vigor restituendus.

De cætero observandum, quod ii, qui cruditate nidorosa laborant, cum fermentum stomachi iis debile sit, facile supra & infra laxentur, quia excrementa semper sunt liquida, nisi obstiterit robur stomachi membranosum. Speciatim nostra ægra, cum sponte suâ vomat, facile ad vomitum potest esse proclivis, nec digestivis opus habet. Quod si verò Soda invalesceret, acidum absorbentia tunc, ut lapilli cancerorum, corallia, os sepia, &c. præmittantur, & tunc vomitoria superaddantur; effervescencia enim prius sopienda.

De resinis purgantium observandum, quod eæ copiosiores & molestiores purgationes faciant, quam ipsa purgantia in substantia exhibita: Ita enim v.g. resina jalappæ ʒss. longè molestiores, magis nauseosas, & copiosas excretiones facit, quàm grana xv. vel ʒj. pulveris jalappæ creat: ratio est, quod resina illa sint olea condensata in forma pulveris sicca: quod probatur: si enim cum spiritu vini extrahitur ex ligno resina, non dabit illud per distillationem postea factam, oleum. Jam ergò cum resina illa omnes sint viscidæ, glutinosæ, & particulis suis glutinosis & viscosis facile plicis stomachi & intestinorum adhærendo in faucibus sitim & nauseam, sicut in intestinis hypercatharses excitant, unde cautè propinentur. Hinc alii suadent, ut resinis illis semper medicamenta salina abstergentia admisceantur: Vel dissolvantur resina cum

vitello ovi; sic enim dissolutæ penetrant promptius massam sanguineam, & eandem successivè colliquescendo sub copiosiori evacuatione operantur sine torminibus, vel gravioribus symptomatibus, quia fiunt temperiores, nec sunt adeò viscidæ, & insensæ intestinis, minusque adhærent. Resina itaque purgantium, vel cum stimulo salino, vel vitello ovi, vel semine melonum, præscribi debent, v.g.

ʒj. ʒi. *Gluti*, vel *Arcan. dupl.* ʒss. ad gr. xv. *resin. Jalapp.* gr. iij.

scammon. gr. j.

M. f. Pulvis. S.

Exter. Pulver.

Vel in forma dissoluta.

ʒj. *Resin. Jalapp.* vel *Scamm.* gr. vij. viij. vel ix.

dissolve in f. q. *Vitell. ovi*, addendo

ʒ *Mentha* ʒss. ad ʒj.

Cinnam. ʒj. vel ʒij.

M. f. Potio: S. *Purgier. Tranklein.*

Talem formulam nuper dedi robustæ satis mulieri, quæ sanè aliàs moveri non potuit, accipiendo resina jalappæ ʒss. in vitello ovi dissolutæ, & ecce! decem ex hujus usu sedes habuit.

Cæterum particulæ scammonii faucibus acredine suâ ardorem & sitim, in stomacho nauseam, inurentes occasionem suspicandi suggerunt; annon venenum in febris ardentibus malignis similis naturæ sit? Alcalisata autem optimè resinas purgantium corrigunt: illa enim addita resinis, tanquam subjectis sulphureis, dissolvendo earum viscositatem glutinosam hac ratione tollunt, adeoque resina ita correctæ, & in textura sua mutata, postmodum jucundius & facilius operantur sine torminibus, & tutius, sine metu hypercatharses. Scilicet mira vis inest alcalibus, tam fixis quàm volatilibus; corrigunt siquidem ea omnia vegetabilium venena, hæcque tam solutiva, quàm narcotica, quatenus scilicet resolvunt texturam misti, pingue nimirum & acidum glutinosum, à quo dependet textura misti, & in quo venenositas consistit, & temperant acrimoniam. Nec enim melius purgantia vegetabilium corriguntur, itemque narcotica, quàm per alcalia, & mitiora redduntur, quatenus scilicet hæc illorum sulphur certo modo immutant: Unde Boyle in sua Philosophia Experimentalis testatur, se etiam napellum beneficio salis tartari volatilis correxisse. Ut itaque omnium optimè, vel salia salia, vel alcalisata resinis purgantium addi possint.

Dulcia hic exulent, non quasi ea facile mutantur in bilem, sed quatenus suâ dulcedine in stomacho ferè amarescunt, fermentandoque putrescunt.

Aliàs

Aliàs ſenna & ſennata commodius, ob torminoſam pariter & tardioſam ſui operationem, præſcribi poterunt in liquida, quàm ſolida forma; ubi tamen aqua fontana pro potione parum elicere valet, niſi ea ſtimulo aliquo tartareo acuata fuerit, ſic infuſa ſenna- ta grata conficiantur. Exempli loco ſit infuſum laxativum Mannagettæ apud Zwelffe- rum proſtans, ſuaviter & copioſe laxans, ad cujus imitationem tale mihi in uſu eſt:

℞. Fol. ſenn. ſ. ſt. ʒiij.

Θ ʒi ad ʒß.

Infunde in ʒæ fumar. ʒiij.

Stent in loco tepido per noctem.

Manè ʒ. Colaturam, adde

ʒ Cinnamom. ʒiij.

&c, ſi opus eſt,

Syr. roſar. ſolut. ʒß.

M. D. S. Purgier-Träncklein.

Sic egregium quoque eſt in hoc paſſu Vi- num paſſulatum Timæi, ex decocto paſſula- rum, in quo ſenna & cremor tartari ebullie- rint, Hypochondriaci in ſpecie commendan- dum: Vid. *Diſp. de Doloſe Hypochondri- co cap. 5. §. 4.*

Suprà monui: ratione cruditiſ nidoſo- ſæ falſa abſterſiva; ratione ſodæ verò præci- pitantia & acidum abſorbentia, temperantia & corrigentia, conducere. Pro utroque itaque ſcopo talem formulam præſcribere poſſumus:

℞. Arcan. duplic. ʒij.

off. ſepiæ præp. ʒi.

pulv. nuc. moſch. gr. vj.

M. f. Pulvis pro duabus doſibus:

D. S. Alteritende Magen-Pulver.

Quarum prima manè in vehiculo calido, alte- ra circa veſperam in frigido, capiatur.

(In Cruditæ nidoſa, quando nucem moſchatam volumus præſcribere, ſic præſcri- bitur:

℞. Pulv. nuc. moſch. parum toſtæ, &c.)

Vel ʒ. Crem. ʒi ʒi.

Corall. r. præp. ʒi.

M. pro 2. doſ.

Hæc Miſtura præcipitans capiatur pro duabus doſibus, eſtque hæc ſpecificum Ker- geri antifebrile, vid. *Tract. ejus de Ferm.* unde cremorem tartari ob id magnificimus; quia proſtat in *M. A. N. C. Ann. 3. Obſ. 210.* exemplum doloris ſtomachi & ſodæ ferè de- ſperatæ, quæ, utut aliàs per uſum lapidis pru- nellæ fuerit ſublata, hæc tamen vice nil pro- fuit, ſed illa ſaltem uſu cremoris tartari fuit ſublata. Unde euporiſton hoc eſt Cnöſſelii, cui ſi jungantur corallia, vel lapilli cancro- rum, cryſtallus montana, lac Lunæ, unicor- nu ſoffile, creta, &c. efficacior reddetur.

Salia alcaliſata fixa in meram terram, non tamen æquiponderantem ſibi, converti poſ- ſunt, ſuntque concentratæ quaſi calces,

Tom. II. Pars 2.

nata ex colliquatione pinguedinis ſulphuræ acidæ, & ſalis volatilis cum particulis terreis concreti. Olea deſtillata quidem, acidum temperando, in ſoda proſunt, ſed hic non conveniunt propter cruditiſ nidoſam, uti & præprimis expreſſa nocent. Interim cùm periculum enaſcatur, ne exinde efferveſcen- tiæ & phlogoſes intenduntur, ideo nec olea deſtillata tuta ſatis ſunt, quin potius nux mo- ſchata aut macis parum toſta, ut oleum ſub- tilius exhalet, in cruditiſ nidoſa locum ha- bebunt. Medulla oſſis ſepiæ ſingulare eſt præ- cipitans, fuitque hic pulvis præcipitans ma- gnus Dni. D. Langii, qui caſu cum invenit, dum nimirum hunc vino injectum, ſaporem acidulum omnem ei ademiffè obſervavit: lo- co cujus etiam cruſtæ internæ oſtrearum, vel putamina ſeu teſtæ ovorum adhiberi poſſunt. Nam cum præcipitatio in uſu Pharmaceutico nil aliud denotet, quàm quando tale reme- dium adhibetur, quod efferveſcentes acres ſuccos corrigat, & particulas correctas ad fundum ſecedere faciat, ita ſiquidem cerevi- ſia acceſcens vel efferveſcens per ovum in ejus medio ſuſpenſum præcipitatur, uti & in- jectione cretæ, cujus alcalinæ particulæ, abſor- bendo acidum, fermentationis motum coër- cent, particulaſque acidas ſibi adhærentes ſimul ad fundum ſecum rapiunt ſeu præci- pitant; proinde præcipitantia remedia erunt ea, quæ ſuccos fermentefcentes, & præci- pue acidum, corrigunt. Vim habent hanc omnes animalium duræ oſſæ partes, terrea parte & ſale volatili abundantes, & ſubjecta terrea; Interim præ terreſtribus animalibus marina notabilia & nobilia exhibent Præ- cipitantia, quia ſal eorum eſt acrius & poten- tius, & eorum corpus magis concentratur; unde acidum magis in ea agit, quod patet: quando enim calcinantur, dant calcem, quam animalium terreſtrium partes non præ- bent: Sic oſtrea, lapilli cancroſorum, &c. calcinati inſtar calcis in aqua ſimplici ebul- liunt: Ex animalibus putamina ovorum cal- cinata efferveſcunt inſtar calcis vivæ. Hinc ex his marinis, calcinatis tamen, conſtat Specificum antifebrile Strobelbergeri & Crol- lii. Inſuper os ſepiæ aliàs ſpecificum dat in gonorrhœa benigna, & fluore albo mulie- rum.

Pulveres non ſunt larvandi ſaccharo: Il- lud enim fermentando promptè acoſem ſpi- rat, uti & deſtillando ſpiratum acidum præ- bet, in ſtomacho verò putreſcendo amari- tiem contrahit, & multis modis nocere po- teſt: Unde iis ſaccharata fugienda ſunt, qui- bus ſtomachus non valet. Sic Hypochon- driaci, Scorbutici, &c. illud ferre non poſſunt.

Elixyr Proprietatis paravit Paracellſus cum liquore alcaheſt, loco cujus Helmontio

[R] 2

in

in usu est aliud, per digestionem cum aqua cinnamomi paratum, nec id inelegans. Communiter adhibetur cum spiritu sulphuris confectum. Moderni autem illud cum alcalibus, tam volatilibus quam fixis, parant: Fixis quidem, parando alcali ex nitri & tartari ana detonatione, huiusque solutioni species requisitas infundendo, hinc digerendo, post inspissando, & cum spiritu vini extrahendo: Vel species miscent cum dicto alcalifato, hinc affundunt spiritum vini rectificatum, digerunt & filtrant. Vulgò mixtura ex spiritu vini & spiritu salis affunditur speciebus & digeruntur. Quemadmodum autem Elixyr proprietatis cum acido paratum in cruditate nidorosa; ita sine acido, cum alcali fixo paratum, ratione sodæ ad guttas xxx locum habet, quod itidem in affectibus mulierum, à mensium vitis enatis, itemque in affectibus infantum ex acido viscido oriundis, dosi gutt vi, vii ad x, egregium est.

R. *Pulv. hepat. rub.* ℥ij.

Ebor. f. Δc ℥j.

M. pro 2. dol.

Sal volatile succini depuratum egregium est stomachicum & nervinum, saltem modus depurandi non æquè omnibus est notus: Scilicet non sufficit, ut milceatur cum sale tartari aut alio alcali fixo, & destilletur; sic enim sal merè urinosum accipimus, cum tamen acidulum id esse debeat. Unde potius ita procedendum est: Nempe sal volatile succini per se destillatum solvatur in aqua communi, solutio filtrata blando calore evaporet, sic vitri parietibus & fundo adhæret, vel concrevit in loco frigido in crystallos, oleò in aqua relictò, & ab hac separato; quod denuò cum spiritu vini rectificato extrahendum, ut oleum penitus probè separetur: ita acquirimus sal volatile succini candidum acidulum, quod ipsum ingreditur liquorem cornu cervi succinatum. Nimirum recipiatur postmodum huius salis volatilis succini, & salis volatilis cornu cervi ana: affundatur spiritus cornu cervi rectificatus, sic effervescent. Digerantur, & invicem destillentur, vel per filtrationem separentur à magmate; sic est Liquor cornu cervi succinatus egregius.

Cydoniata in quocunque stomachi affectu sunt optima.

Ponamus autem, hunc casum affligere mulierem gravidam, in qua neque purgatio, neque vomitorium conveniat; quid ergò tunc faciendum? Dico: Investigandum esse tempus gestationis, quod ipsum si circumscribatur primis adhuc mensibus, ægraque ad vomitum inclinet, detur ei blandum vomitorium, nisi adsint Contra-indicantia; sin verò medios menses attigerit jam, ab-

horremus ab huius usu, ob metum abortus facile supervenientis. Quod si autem illo tempore nec vomitorium locum haberet, propinentur blandissima laxantia in parva dosi, utut primatum hic temperantia cum terreis mista obtineant.

Tandem in morbis acutis febribusque, tam benignis quàm malignis, quibus ordinariò supervenit cruditas nidorosa, blande acida, quæ & stomacho grata sunt, omne ferunt punctum; quippe hæc cruditatem nidorosam sistunt, fervorem & impetum sanguinis febrilem reprimunt, & malignitati obices ponunt, sitim compescunt, adeoque Julepi aciduli cum spiritu sulphuris acido, spiritu nitri dulci, vel acido, etiam erunt optimi.

CASUS V.

INFLATIO STOMACHI CUM LEVI ORTHOPNOEIA SEU ASTHMAE, ET CARDI- DIALGIA.

Vir laudabilis constitutionis, adeoque cætera sanus, conqueritur de appetitu sensim deficiente, & superveniente difficili admodum & anhelosa respiracione, quæ ipsa in tantum exasperatur, ut decumbere amplius nequeat citra suffocationis periculum, quin semi erectus jacere necesse habeat. Adsunt anxietates insignes, haud quidem continuæ, crebrioribus tamen vicibus repetentes, pro quarum levamine venesectionem urget, alias, dicit, können sonst zu keiner Luft kommen. Accedens Medicus præter dicta, & eum singultientem offendit, & interdum, magno licet conatu, ructum emittentem; unde levamen quoddam se percipere asserit: sub hypochondriis se dolere, omniaque ibidem tensa & plena esse, ita, ut digitum sub iis recondere queat. Medicus aspicit istum locum, & deprehendit intumescientiam in regione epigastrica, mollem, cedentem tactui, & tamen eodem modo permanentem, dum interea æger Medici attactum fugit, & exinde impensè se dolere conqueritur.

RESOLUTIO.

Affectus hic, quem præ nobis habemus, primâ fronte complicatus videtur, cujus symptoma primarium est Stomachi Inflatio: scilicet nunquam ferè simplicem curandum accipimus morbum, sed semper conjuncta sunt pathemata, inter quæ tamen talis subordinatio datur, ut unum primarii, reliqua secundarii morbi rationem habeant.

Et

Et tales affectus dicuntur connexi. Connectuntur autem illi vel per consensum nervorum, vel ob connexum partium situm; quarum ratione, unâ parte affectâ, etiam reliquæ afficiuntur. Inflatio ergo stomachi, est in casu nostro affectus primarius, secundarius asthma seu levis Orthopnoea, cum cardialgia & anxietatibus conjuncta, & ex inflato stomacho primario dependens.

II. Pars affecta statuitur Stomachus, & quidem ratione inflationis quoad totam sui substantiam; ratione verò anxietatis, cardialgiæ & singultus, laborat primario orificium ipsius sinistrum seu superius, quod sensibilissimum.

III. Causa primaria seu proxima sunt Cruditates viscidæ & pituitosæ, partim copiâ, partim visciditate suâ fermenti ventriculi activitatem remorantes; utut cum primario flatus urgeant, hi potius causæ proximæ rationem obtineant, & visciditates remotæ rationem tueantur; interim cum ambo conspirent, simul quoque pro causâ proxima accipi poterunt. Nempe materialiter ex viscido, & efficienter ab acido, oriuntur flatus, adeò in nullo concreto actu flatus reperiuntur, sed fiunt saltem per motum, vel fermentationis vel effervescentiæ. Hoc videre licet in musto, itemque aqua forti, argentum in vase clauso solvente, in quorum amborum conubio flatus prodeunt, utut utraque corpora nil de flatibus participant. Hinc quoque omnia illa subiecta humana in quibus acidum præternaturaliter in primis viis dominatur, qualia sunt hypochondriaca, cachectica, &c. abundant flatibus, ac sic ex acidi & visceri concursu novum & tertium ens enascitur, Gas nomine Helmontio veniens: atque ob hanc causam duo generalia flatuum remedia occurrunt, nempe salia volatilia, & post hæc nitrum & nitrata, quatenus illa acidum corrigunt, & viscidum incidunt; hæc verò quatenus figendo fermentationis motum quemcunque sistunt.

IV. Flatuum horum eruptio in agro impeditur; quæritur à qua causâ? Posito, quod distenderent flatus stomachum, non tamen sequitur, quod simul impediatur flatuum eruptio, sed ita magis erumperent. Scilicet cum flatus præternaturalis quid sint, infestique stomacho, hinc fibræ irritantur ac vellicantur, unde membranæ hujus, post distensionem se contrahentes, orificiis simul stringendis stimulum addunt: Sicut enim aliàs vomitoria idem faciunt, ut orificia se claudant, utut tandem pylori nisus prævaleat; ita etiam dum irritantur à flatibus, se contrahunt orificia, unde flatibus exitum intercludunt. Hanc irritationem confirmant ulterius anxietates Præcordiorum, quæ nil sunt aliud, quam

dolor superius ventriculi orificium angens, ab hujus constrictione & motu convulsivo proveniens. Symptoma hoc frequens & molestissimum est in Praxi, dicunt enim ægri: *Es sey / als wann ihnen ein Pflock daselbst stecke*; cui ordinario inquietudines superveniunt, unde interrogati, respondent: *Es sey ihnen so angst*. In tali casu vulgus putat laborare cor, sed falsò; cor enim non dolet, potius radix harum anxietatum est orificium superius stomachi, quod Græcis καρδιά vocatur, & rectius focus mali est. Ac in his angustiiis si cor laboraret, tunc necessario illud palpitaret; jam verò cum hoc non fiat, ac palpitationes cordis sine talibus angustiiis observentur, proin ex stomacho erunt illæ. Hoc confirmant Ructus cum molestia emissi, quia maximè fuit irritatum orificium ventriculi superius, hinc etiam magis se strinxit, & sic, præter anxietatem, etiam dolorem positivum sensit, unde hæc ægra propter ructus emissos levamen quoddam percepit. Imò accipias quæto vomitorium, & lænties, dum operari illud incipit, similes angustias & anxietates in sinistro orificio ventriculi, ex irritatione se constringentis. Sensibilissimum enim est hoc orificium, unde tantilla irritatio graves parit molestias propter copiosos nervos. Tales molestiæ præcordiorum oriuntur quoque ab aliis partibus communicantibus per nervos cum orificio illo: Sic enim contorsio vertebrarum dorso, pares anxietates & angustias præcordiorum, uri etiam lipqthyrias, imò sudores frigidos inducit, propter spasmos & convulsiones, quia nervi tenduntur in circulum, unde nervis nonnihil translocatis eorum fibræ spasmus edunt, & variis symptomatis dant ansam. Hoc observavi in duobus mechanicis, ex contorsione vertebrarum similia pathemata incurrentibus, ubi tamen restitutâ laxatione, etiam per sudorifera sanguinis coagulo resoluta, sanitati redditi sunt. Similiter habui superiori verno tempore curandam virginem, febre cum intensissima cephalalgia, & intolerabili ferè præcordiorum angustia laborantem, ut etiam convulsiones imminerent, pulsus insuper erat robustus, magnus & validus: Propinavi tandem pulverem ant-epilepticum Conerdingii ex antimonio paratum ad gr. iij. pro scopo epilepsiæ metuendæ. Virgo cruditates viscidas & multas evomens, statim sensit cephalalgiam cum reliquis symptomatis remittentem, evaditque placida; unde colligebatur eadem pathemata ex affecto stomacho fuisse. Non minus quæcunque anxietates, tam in febribus benignis quàm malignis, (in quibus malum signum denotant) *wenn es dem Patienten so weidlich / wehe und bange ums Herze wird* / simpliciter sunt ex stomacho,

rariùs ex corde affecto : ac proinde in febribus malignis quibuscunque , speciatim ex contagio natis, quoties in principio vomitoria ægris exhibui, sive jam ad vitam, sive ad mortem determinatus fuerit morbus, toties semper placatæ sunt anxietates, & ægri quieti fuerunt; è contra quibus vomitoria non dedi, vel talia dare non potui, hi semper summis anxietatibus, inquietudinibus & angustiis obnoxii fuerunt. Idem confirmatur ex hoc, quod Bartholinus in febre maligna demortuis reperit stomachum subinde escharâ obductum. Parili sic modo in febribus benignis sub anxietatibus conqueruntur ægri *de anarore in ore*, propter bilem in stomacho sive naturalis sit sive præternaturalis, acido stomacho hostilem; quæ summam infert molestias; unde etiam bilis æruginosa, summam præcordiorum anxietates, imò syncopes inducit. Equidem non negandum, interdum etiam ægris molestas angustias ex affecto corde provenire: interim notandum, tunc semper simul affligere anhelosam respirationem, ægrosque ex impedito sanguinis circulo, quod tamen rarum est, convulsi quid pati; cum contrà si ea sit liberior, aut non impediatur, ex stomacho tunc ea proveniant. Eadem in puerperis observatur anxietas, *wenn ihnen die Milch zu stark schiesst*; In his enim propter rapidum motum sanguinis chylosi circa vasa pulmonaria & vicina sit quasi stagnatio, antequam lac in mammas effundatur, unde anxietates concitantur.

V. Difficilis respiratio causatur, quia stomachus per inflationem in omnem dimensionem extensus, resistit motui diaphragmatis deorsum, præsertim ægro supino jacente, ita ut hoc ad figuram planam redire nequeat, ob suppositum sibi ventriculum inflatum.

VI. Æger dicit etiam, sub hypochondrio se dolere, omniaque ibidem plane & tensa esse. Sub hypochondriis autem comparentes hi dolores nil sunt aliud, quàm spasmi peritonei & membranarum vicinarum, quæ tensæ liberiolem costarum motum impediunt, & sic etiam simul impediunt respirationem. Et hoc pathema Hippocrates & Veteres hypochondria tensa & illa suspensa vocarunt, estque id non præcisè & semper à flatibus distendentibus, cum & sine his præsentibus observetur; sed redduntur hypochondria tensa à tensione peritonei & partium musculosarum vicinarum, spasmo affectarum, adeoque se stringentium, unde duræ illæ apparent, & sic minus cedunt digitis. Idem patimur nonnunquam post luxationem vertebrarum dorso, in qua, dum nervi nonnihil translocantur, fibræ eorum sic stringuntur, adeoque hypochondria tensa evadunt.

VII. Singultus fit, quando motu contractivo convellitur orificium superius ventriculi, quod in consensum trahit diaphragma, quia firmiter orificio stomachi est connexum.

VIII. P R O G N O S I S.

Inflatio stomachi, quò longior, cò magis imminet Tympanitis. Convulsionis tamen periculum non infert, nisi in febribus malignis, aut in summa anxietate, quale exemplum in Amato Lusitano prostat. Singultus verò hic nihil infert, nisi cardialgiæ vel syncopes imminentiæ metus adsit.

IX. C U R A.

Quoad indicationes à vomitorio non statim incipiendum, nisi sedatis flatibus & spasmis dolorificis, quia metus est, ne hialias intendatur. Potius ergo

1. flatuum impetus & proventus sistendus.
2. pituida viscida, tanquam causa peccans materialis removenda; &
3. fermenti digestivi robur restitutum.

Etenim tutius est, ante exhibitum vomitorium mitigare symptomata, ne alias intendantur pathemata, sed prius status sistendi, & hinc tutò vomitorium exhibendum.

Sin vomitorium legitimò etiam tempore exhibitum nolit operari, quin potius angustia exacerbetur, in tali casu custodia in eo consistit, ut deficiens vomitio promoveatur. Unde tres sunt rationes primariæ, ob quas in quibusdam subjectis vomitus frustraneus est:

1. Prima est vis fermenti digestivi stomachici, antimonialia figentis & subjugantis, ut adeò omnem vim exuant, ut in Melancholicis observare licet, qui nonnunquam, nec duplâ nec triplâ dosi consuetâ vomitoriorum moventur. Signum talium est, si ægri sine ullo stimulo medicamenta emetica perferunt & concoquunt.

2. Secunda, robur stomachi membranosum & fibrosum robustius, ita ut, licet nausea & conatus vomendi adsit, tamen frustra nei illi sint, dicunt: *Es steekt ihnen als ein Pflock da*/ quod ipsum ex nimia strictura orificii ventriculi sinistri dependet, unde, licet ritè operari conetur vomitorium, tamen ejus vim validus stomachus impedit.

3. Tertia causa, quando in tantum prostrata est vis animalis in systemate nervoso radicata, ut & sensibilitas & motus ventriculi deficient. In tali casu pessimus est status ægri, unde tunc ægri nullam in præcordiis sentiunt alterationem, sed saltem superveniunt copiosi secessus. Taliter ergò constituti rarò evadunt, & ut plurimum pereunt.

Quæ-

Quæritur autem; quid agendum sit, si ex prima causa emanent vomitus? Resp. cum frustra sit, quicquid agitur, necesse est, ut naturæ opus relinquatur. Quod si verò ex stomacho nimis membranoso, & fibris robustioribus prædito, deficiat vomitio, tunc maturè eliminandum & abstergendum est vomitorium ex stomacho, ut anxietates saltem remittant; & quidem dandus est haustus cerevisiæ calidæ pingviusculæ, ut vomitus promoveatur, quod tamen euporiston si frustra exhibitum fuerit, dentur, uti dixi, remedia abstergentia: v. g.

R. *℞i Glati*, vel *Arcan. dupl. Myns.*
gr. xv. ad ℞j.

Scamm. Δat. gr. j. vel ij.
M. D. S.

Purrier-Pulver.

Propinctur hoc in vehiculo calido, ut abstergatur vomitorium, & per secessus operetur.

Si tandem ex tertia causa vomitus deficiat, nil possumus agere, nisi analepticiis & spirituosius robori stomachi prospicere saltem velimus, cui scopo inserviunt aquæ analepticiæ, & asthmaticæ, aqua cinnamomi cydoniata, nec non alia cydoniata, stomacho amicissima.

Contrà, si æger, accipiens vomitorium, enormiter nimis moveatur, ita ut lipothymia & sudores frigidi circa frontem immincant, pulsus sit creberrimus, & nonnihil deficiens, hic procompescendo vomitu propinatur haustus vini Rhenani generosi, nonnihil tepidi; utut enim primâ vel secundâ vice revomatur, tamen si repetitur, præter hoc, quod cesset vomitus, vires quoque restaurantur: Vel potest etiam succus cydoniorum cum aqua cinnamomi temperatus præberi. Vel sumatur denique buccella panis albo vino intincta, & blandè deglutitur. Externè autem stomacho illinitur Theriaca, quæ etiam in haustu vini Rhenani soluta propinatur.

Pilulæ possunt hoc modo præscribi:

R. *MP. de *co Querc.* ℞j.

℞i Glat. ℞ß.

Extr. troch. alhand. gr. ij.

Cum f. q. *Ess. Menthæ* f. Pilulæ:

D. S. **Purgier-Pillen.**

Ast si nimia fieret purgatio cum virium prostratione, ad 10. 20. 30. &c. vices, nil melius est Theriacâ, vel in boli forma ℞ß. ad ℞j. cum cornu cervi sine igne ℞ß. ad ℞j. in vehiculo assumptâ, expectatò blando sudore; vel etiam adhibeatur pumex, præsertim in subjectis, in quibus succi acres, ad intestina confluentes, hæc corrodingo, hypercatharses cruentas inducunt; in quo casu vel in forma pulveris, vel boli cum theriaca deglutatur; vel ordinetur talis mixtura:

R. *▽ Menth.* ℞j.

Cinnam. ℞ß.

℞ Pumic. ℞j.

Laud. opiat. gr. ij.

Syr. Cydon. aromat. ℞ß.

M. pro 2. vel 3. vicibus D. S.

Anhaltend Träncklein auff etliche mal.

Quodsi verò in nostro agro purgans nil fecerit, tunc stimulus salinus superaddendus ex tartareis conflatus: nempe quando manè purgans deglutitum, in operatione emanit, in prandio dissolvatur cremoris tart. ℞ß. ad ℞j. in vehiculo calidissimo; sic enim facilius, alias in stomacho non tam citò solubilis, liquatur, & laxatio promovetur; vel loco huius in usum vocetur tartarus vitriolatus, vel sal digestivum hypochondriacum, vel simile sal falsum absterfivum; non assumantur acida, quia augent tormina, non alcalia, quia infringunt vim purgantem, sed salia: ac cum peccare videatur pituita glutinosa, consultum est, ut scammonio jungantur trochisci alhandal, ob summam acrimoniam mirè phlegmata viscida dissolventes, quod alia purgantia non ita faciunt; Unde Helmontius ex colocynthide morborum chronicorum remedium parari asserit. Potest ergò fieri pulvis ita:

R. *℞i Glat.* gr. xv.

Scamm. Δat. gr. iij.

Trochisc. alhand. gr. ij. vel *Extr. trochisc. alhand.* gr. iß.

Ol. destill. anis. gutt. ij.

M. f. Pulvis: S.

Purgier-Pulver.

Pro secundo scopo, qui nobis primus esto, materia Medica selecta est. Etenim Chamomilla Romana, pariter ac Vulgaris, præter vim aromaticam, adeoque carminantem & flatum discussivam, exceller simul vi blandâ anodynâ: Sic Forestus *lib. 18. obs. 39.* refert, Belgam ex esu flatulentorum & potu musti incidisse in intensam inflationem stomachi cum gravi cardialgia conjunctam, quam tamen curavit cum decocto chamomillæ vulgaris & Romanæ in cerevisia factò, addito seminis fœniculi & carvi parum, & propinavit calidè.

Quod attinet Castoreum: etiam est egregium ad flatum, sed habeatur ratio idiosyncrasia, quia multis infestum est, imprimis mulieribus nonnullis, utut hystericis aliàs conducatur: Quæ autem id perferunt, optimè in pulveris, extracti vel essentia forma, assumere possunt. Extracti potest dari ℞ß. ad ℞j. quia multæ particulae volatiles exhalant; sicut essentia à ℞j. ad ℞iß. vel ℞ij. pro circumstantiarum varietate: quibus etiam optimè addi potest laudani opiat granum, anxietates sistens: Vel

R. R

R. R. *Qi comp.* ʒiij.
Eff. Castor. ʒij.
 ~ *Θ*ci anis.* ʒj.
 Misc. S.

Blähung=Essenz.

Dosis guttul. 30. ad 40.

R. *▽ Menthae*,
fœnic. ana ʒj.
Eff. Castor. ʒij.
 ~ *Θ*ci anis.* ʒj.
 • *Laud. op. ferm.* gr. ij.
Syr cort. aurant ʒiij. ad ʒvj.
 M. f. Potio: S.

Mixtur **wider die Blähung.**

Dosis cochlear. j. vel ij.

Ubi verò in flatulentis affectibus simul æstus & phlogoses vagæ fuerint conjunctæ, spiritus nitri dulcis est egregium carminans, & mirabiliter compescit flatum, sistendo motum effervescentiæ nimiam. In tali ergo casu

R. *▽ Menthae*,
fœnic. ana ʒj.
Eff. Castorei,
 ~ *Qi dulc.* ana ʒiʒ. ad ʒij.
Laud. opiat. gr. ij.
Syr. cort. aurant. ʒvj.
 M. S. ut antè.

Et utut castoreum ab acido spiritus nitri nonnihil infringatur, non tamen castratur. Vel

R. *▽ fl. Chamom.* ʒij.
carmin. ʒʒ.
 ~ *Qi dulc.* ʒʒ. ad ʒj.
syr. helen. ʒiij.
 M. S. ut *suprà.*

Vel R. *▽ Menthae*
fl. sambuc. ana ʒj.
Elix. Menthae ʒʒ.
 ~ *Qi* ʒj. ad ʒʒ.
Syr. helen. ʒij.
 M. S. ut *suprà.*

Externe quia oleo destillata inuncta per se subjectis delicatis pruritus, & aliqualem excoriationem, in cute excitant ob acrimoniam; unde necesse est, ut addatur pro delicatioribus corpus pro Balsamo.

Pro tertio scopo. Loco spiritus Vitrioli Philosophici, qui nil est aliud, quàm spiritus nitri ac salis rectificatus, melius adhibetur spiritus salis aut nitri dulcificatus, idque propter cautelam Sylvii, quâ in Praxi suâ jubet Temperatis, quantum possibile, ut instamus, cum hæc minori alteratione soleant operari. Unde spiritus nitri ac salis dulcis ritè paratus, unâ vel alterâ horâ antepastum in vehiculo calido ad gutt. xx. vel xxv. exhibitus, non erit inconueniens.

Quæritur autem, cum æger urgeat venæsectionem, aliàs, dicit, **fönnen er nicht**

zu Arhem kommen / an hæc sit concedenda? Equidem, si stasis sanguinis circa præcordia in causa fuisset illius difficilis respirationis, vel eadem superveniens metuenda, tunc venæ sectio locum habuisset, ut melior motus promoveretur: jam verò cum tota symptomatum cohors circa hypochondria urgeat, non opus fuit venæ sectione: Ceterum, si subjectum ægrotans mulier, & grvida fuisset, illa ad medium usque tempus, aut si pridie menses actu fluentes ex errato aliquo fuissent suppressi, quid tunc faciendum, ubi præsertim talia symptomata superveniant? Respondeo: in primo casu, si adsint plethoræ signa, vel aliàs hæc circa idem gestationis tempus solita fuerit venæsectionem administrare, pro promovendo sanguinis circulo, suadenda eadem esset: si verò in posteriori casu menses fluentes subito fuissent suppressi, unde ordinariò difficilis respiratio superveniat propter sanguinis circa pulmones stagnationem, tunc opus fuisset pro ventilatorio sanguinis scopo venæ sectio, ut liberior sanguinis motus concilietur, eaque vel in pede, vel in brachio.

Tandem ad symptomatum remotionem in principio optimè etiam conduxisset clystma, quod tensionem & dolorem hypochondriorum levasset, v.g.

R. *Dec. Chamom.* ʒv.
Qæ human. ʒiij.
El. de bacc. Lauri
hieræ c. agar. ana ʒʒ.
Ol. destill. tereb. ʒʒ.
 M. pro Clysmate:

Externè autem mox in principio litus & inunctiones aromaticæ stomachico-nervinæ institui possunt circa scrobiculum cordis & regionem epigastricam & hypochondriorum, ut dolor tensivus & spasmodicus membranarum planè remittat: e.g.

R. ~ *Anisi c. V par.* ʒij.
V camphor. croc. ʒʒ.
Theriac. ʒiʒ.
 Misceantur.

Applicetur externè cum linteis multiplicibus.

Vel, ubi dolor pertinax persisteret, in tali casu optimè conveniret Litus cum theriaca cum oleis illis destillatis imprægnata: item imponendum emplastrum ex tacamahaca, malaxata cum theriaca: sicut & internè singulariter prodesset spiritus carminativus Doctoris Michaëlis, qui est urinosus, & præparatur per modum clyssi ex ana tartari & nitri, quibus additur parum de alcali fixo: destillantur per retortam in receptaculum quantitate spiritus vini repletum, qui ~prolektus rectificatur. Hic plurimis morbis ex vitio stomachi, abdominis & similium ab acido oriundis, proficius est, vel per se, vel cum opii

Cardialgia, seu Spasm. Orificii superioris Ventric. &c. 137

opii essentia maritatus; utut opiata cautè propinanda: c. g.

Rx. — *carm. de trib.* ʒij.

Ess. Opii ʒß.

M. S. *Blehung's. Essenz.*

Dosis 40. ad 50. guttas.

Tales affectus in dispositis facilè recidunt; quomodo ergò ventriculo succurrendum, ne recidivet?

1. Vesperi capiatur interdum Elixir menthæ, vel simile aromaticum: Item

2. Prodest crebrior usus cremoris tartari pro absterfione ventriculi.

CASUS VI.

CARDIALGIA

seu

Spasmus Orificii Superioris Ventriculi
à Fungis.

*A*urifaber, ætatis consistentis, cœnâ peractâ, quam & sanus & hilaris assumpserat, lectum petit; sed nocte evigilans, gravissimos dolores & acutissimos in regione dorſi, circa medias præterpropter thoracis vertebraſ, percipit, tanquam pugione aliquis perforaret. Dolor à parte posteriori in dorſo incipiens ad partem anteriorem ſterni tranſit, ubi etiam intense, minus tamen acutè, urget, cum insigni difficultate anhelitus, ita ut ex punctiōe vehementi, cum dolore quodammodo suffocari videretur. Pulsus à Medico deprehenditur magnus, æqualis, paulò celerior, minime durus. Hic investigans circumſtantias antegreſſas, comperit, prægreſſa illâ die ægrum argentea vasa Mercurio incruſtaſſe, & hinc deaurâſſe; item in prandio illius diei inter alia edulia fungos cum butyro frixos comediffe, utpote quibus sæpius cum voluptate uti conſueviſſet, unde & inſequens cœna ſine alteratione fuiſſet.

RESOLUTIO.

Affectus est Cardialgia, cujus formalis ratio conſiſtit in convulſione & firmiſſima ſtriçtura orificii ventriculi ſiniſtri. Germanis vocatur *das Magen-Drücken*.

Pars affecta est orificium ſtomachi: ſcilicet, ſiquæ alia pars in corpore ſenſu exquifito pollet, est illa orificium hoc ſiniſtrum, Cardia dictum, unde Cardialgia; quod totum, quantum quantum nerveum, & maxime ſenſibile est. Ac quidem videtur illud ipſum prima pars ſenſilis in homine: ſiquidem fœtus adhuc in utero latens eâ parte maxime afficitur à nutrimento. Ut adeoque hinc non inconuenienter quidam rationem derivent, cur nempe omnes animi affectus, ſive lætetur ſive triſtetur homo, impetus ſuos

Tom. II. Pars 2.

exſerant in ſtomacho; hinc non mirum, totum ſubinde nervoſum ſyſtema cum hoc compati: Amatus Luſitanus enim dolorem ſtomachi introducit, cui epilepſia ſupervenit, evaneſcens iterum, poſt exhibitum vomitorium: imò certum eſt, ſyncopes illas vagas in ſexu præprimis ſequiori ſæpiſſimè obſervabiles, ordinariò ex affecto hoc ventriculi orificio dependere.

Cauſa proxima Cardialgiæ eſt irritatio hujus orificii ſiniſtri. Jam verò cum irritare, ſit aliquid moleſtiâ quâdam afficere, & moleſtia illa præſupponat ſenſum, ratione cujus organum malè affici dicitur ab objecto aliquo inadæquato, quâ ratione pulvis nicotianæ inſpiratus moleſtiâ quadam afficit membranas narium, unde ſternutatio ſequitur, & ita plus minus lædi Irritari dicatur: quam irritationem immediatè ſequitur ſpasmus ſeu convulſiva ſtriçtura, in qua conſiſtit dolor.

Cæterùm tria in hoc caſu conſiderationem merentur, quorum

1. Eſt dolor circa medias thoracis vertebraſ.

2. Difficultas reſpirationis.

3. Cauſa irritans.

Jam ergò quoad I. parallelum caſum Foreſtus lib. 18. *Obſerv.* 27. habet, de dolore circa vertebraſ dorſi affligente, quod rarum eſt, & inter centum cardialgias vix una occurrir taliter ſe habens. Ubi tamen notum eſt, quod orificium ſtomachi eo in loco, ubi diaphragma perforat, ſupra vertebraſ dorſales adſcendat, quanquam ibi rarò dolor obſervetur, ſæpius in parte anteriore: unde ſi magis ſuperius ſtomachi orificium ſiniſtrum convellatur, tunc magis à parte poſteriori dolor ſentitur, & ægri dicunt, ſibi conſtringi collum fiſtula ſcilicet œſophagi (quæ eſt continuus membranarum tractus) ſimul aliquid convulſivi patiente per conſenſum.

Quoad II. diaphragma conſiderandum erit, quod ſimpliciter à perforante œſophago, non verò ratione nervi phrenici, afficitur; ille enim irritatus ab orificio ſtomachi ſingultum in diaphragmate facit, cum hic firmiſſimè connectatur diaphragmati, uti eodem aliò modò convulſio, ſimul diaphragma aliquid convulſivi patitur; adeoque liber hujus motus impeditur, unde reſpiratio difficilior. Diaphragma ſiquidem præter motum paſſivum, qui à coſtis extrorſum dependet, habet & proprium activum motum ratione fibrarum ſuarum nervearum, quibuſtendere, & inſtar muſculi contrahere valet. Hinc etiam dolor anteriora verſus videtur pergere, quia ſternum alligatur diaphragmati.

Quoad III. nempe cauſam remotam; ea hic non ſunt tumi ſalino-Mercuriales, ſed

[S]

cius

efus fungorum & boletorum in butyro frixorum, qui rectè à Seneca vocantur venenum voluptuarium. Utut enim Mercurii fumus varia pathemata, v. g. tremores, paralyfes & salivationes, inferre queat; non tamen hic cardialgiam causare potest, præsertim cum aurifaber deurationi operam navans talia nunquam passus fuerit, unde etiam nec præsumptio esse poterit, à fumo Mercuriali Cardialgiam esse excitatam. Et utut nonnunquam concursus causarum remotarum contingat, una tamen earum magis efficax & verior videtur, adeoque Mercurius hoc in casu innocens est.

Sed porro nunc consideranda est activitas fungorum, de quibus notandum, quod omnibus Practicis audiant noxii, & edulium pessimum, qualescunque illi etiam fuerint, utut alter altero, ratione loci natalis, malignior sit; omnes tamen in genere sunt plus minus virulenti: Quod ipsum patet ex pathematibus, ab eorum usu inductis, v. g. sensu strangulationis in faucibus, singultu, dolore stomachi, ingentibus torminibus intestinorum, cholera, sudore circa caput frigido, & similibus.

Queritur autem, in quam fungorum parte virulentia allegata consistat? Sanè si examinamus corpus eorum, est illud plus minus viscidum; quoad saporem, sunt ex insipido acris amari, ut plurimum satis penetrantis, & diu in lingua durantis saporis. Virulentia ergo fungorum consistit in acrimonia sensibus ferè occulta, in seipsa tamen caustica quodammodo & alcalina, hærente in subjecto viscido & glutinoso, adeoque locis, per quæ transit, firmiter unibili. Et acrimonia quidem illa colligitur ex sensu, quem excitat in stomacho, doloroso, itemque torminibus intestinorum ab Hildano *Cent. 4. Observat. 34.* relatis, quo in loco cholerae mentionem facit ex esu fungorum concitata, cum sanguinis excretionem, vellicatis scilicet ab eorum acrimonia pyloro & intestinis. Sic quoque illa, ex convulsione diaphragmatis in singultu, non secus ac ex strangulatione quoque, quæ nil est aliud, quam vellicatio oesophagi se stringentis, & convulsivi quid patientis, patet. Quod autem acrimonia illa hospitetur in subjecto eorum viscido glutinoso, liquet tam ex fungis ipsis, viscido ejusmodi succo præditis, quam quod iidem in tales succos abeant; sicut etiam, quod symptomata fungorum usum sequentia, non tam facile ob firmam horum compactionem sint corrigibilia. Imò illustrari illud poterit, per pomum colocynthidos, cujus leve corpus blandissimo lingue attractu mox intensissimam amaritatem eidem inurit, utut amarum in illo tantillum sit. Nam si eidem affundatur lixivium salis tartari, amarities extrahitur, remanente substantia insipida, antiquum etiam pondus ferè

habente; quod ipsum ostendit, tantillum amaritiei fuisse. Similiter confirmata hætenus dicta expertum illud antidotum, quò contra nocumenta fungorum nil præstantius invenitur, quam theriaca cum oxymelle, sive simplici, sive composito scillitico, assumpta, de quo vid. Panarollus, *Cent. 3. Obs. 15.* itemque Timæus von Guldensee *Cas. pag. 315.* Jam ergò in theriaca consideranda est vis narcotica, & dehinc aromatica; ubi ratione illius sistit vellicationis sensum à fungis inductum; ratione verò aromaticæ virtutis inflationem stomachi resolvit. In oxymelle verò vis abstersiva ratione aceti & mellis pensanda est, quâ ipsa resolvit id particulas tenaces, corpori adhaerentes. Vid. mirabilis historia de fungis in Amato Lusitano *Cent. 1. Curat. 30.* Conf. Hildanus *l. c.* Equidem butyri pinguedo in casu hoc aliquo modo impedivit fungorum virulentiam: interim quatenus ista frictio facit, ut tardius sic digesti in stomacho sint, & pertinacius adhæserint, non in totum ita deleta, sed saltem impedita est fungorum virulentia, adeoque iidem non tam citò virulentiam suam exercere potuerunt; unde demum noctu, non vero mox circa prandium vel cenam experitur patiens noster gravissima symptomata.

De pulsu notetur, quod recensetur hic magnus, aqualis, paulo celerior, minimè durus. Durus pulsus ordinario sequitur, quando arteriæ pulsantes simul aliquid convulsivi patiuntur, & membranae earundem tenduntur, ratione cujus tensionis rigidae sunt, adeoque difficilius dilatantur, unde digito attactæ non cedunt, sed digito tangenti resistunt, & quasi foveam relinquunt: hinc pulsus durus rectè ab Helmontio convulsiva arteriarum passio vocatur. Nam experientiam consulentes invenimus, durum pulsum nunquam fere apparere, nisi quando membranae quædam vel inflammatae, vel spasmo insigniter convulsæ sunt: Ita in pleuritide signum inseparabile durus pulsus est: sic qui gravioribus doloribus nephriticis & colicis tentantur, & quibus mesenterium convulsivi quid patitur, semper durum pulsum monstrant, ut adeo queamus præcognoscere ex duris pulsus præsentia aut absentia, an dolores dicti remiserint an verò non? Si enim est durior, dolores observantur acerbiores, si mollis, mitiores; quod monitum in praxi probè observetur. Imò Helmont. in Apoplexia forti correptis pulsum durissimum observavit, sicut & ego sub apoplexiæ paroxysmo semper durum observavi. In nostro autem casu non est durities pulsus, nulla membrana tensa.

P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin, Cum malum sit acutum, periculum est, si gravius exacerbetur, ne superveniat epilepsia vel syncope, cujus prodromus sudor frigidus circa frontem est.

CU-

Obstructio & imminens Ileos, cum Hæmorrhoid. apertis. 139

C U R A.

In hac itaque hæ indicationes observandæ :

1. Causa irritans removenda.

2. Irritatio sistenda, fungis simul per specifica oviam eundo.

Proinde materia peccans per vomitum vel secessum exturbanda; tum dolor opiat & aromaticis specificis sistendus; Unde in præfenti casu ob fungos pro vomitorio.

R. *Oxym. simpl.* ʒi.

ʒi emet. gr. iij.

M. S. *Brech. Safflein.*

Vomitória autem & purgantia saltem gradualiter differunt; hinc purgantia per inferiora, delicatioribus sunt vomitoria; ac ipse observavi Mercurium dulcem, qui aliàs purgat per alvum, in quibusdam tamen, imprimis in infantibus ablactatis, quod sæpius facere soleo, propinatum, vomitus, & secessus movisse. Ratio omnis degenerationis purgantium in vomitoria quærenda est vel in purgationibus acrioribus, vel in pyloro sensiliori, vel in acido ventriculi infirmiori. Interim expertus sum, stomacho robustiori existente, si vomitoriis stimulus scammonii sulphurati ad gr. ij. fuerit additus, supra & infra fuisse motos.

Porro encheirisis est, ut quando spasmus orificium ventriculi sinistrum patitur, & Vomitorium seu Purgans nihilominus exhibendum sit, jam verò simul metuendum, ne dolor intendatur, exin opiata iisdem addantur, hoc fideliter unà observando, ut Purgantia in dosi intendantur, ne opiatis palma maneat, & vis purgantium planè ab opio impediatur; hæc ratione enim & sistitur dolor, & purgatio levior redditur. Hoc inventum quidem paradoxum videtur: at si duobus scopis simul, nempe dolori sistendo & materiæ removendæ satisfaciendum est, conveniens hoc euporiston est; hoc saltem notando, quod opiata purgantibus melius, quàm vomitoriis, combinentur, unde v. g.

R. *Extr. panchym. Croll.* gr. xv.

scamm. ʒat. gr. iij.

Laud. opiat. gr. ij.

Ol. dest. succini gtt. ij.

Cum *ess. Chamom. Rom.* f. Pilulæ:

D. S. *Vindernde Magen-Pillen.*

Appropriata fungorum sunt oxymel & theriaca.

Uterius Forus externè in affectibus stomachi dolorosis locum habent; circa quos tamen observandum est, si iidem fuerint humidi, species inclusas non esse adspargendas oleis destillatis, eo quod sacculi tales vino calido injecti deponant in hoc olea illa, sed potius, si forus sicci fuerint, adspargantur oleis.

Tandem scuti stomachales egregii quoque hic sunt, ex tacamahaca præsertim parati, quæ egregia est in affectibus stomachi doloro-

Tom. II. Pars 2.

sis; conf. Poterius in *Cent.* & Riverius; ut iidem cum theriaca & oleo succini malaxati quoque in febribus malignis proficui sunt. Nobilius ferè adhuc est in cardialgia gummi Carrannæ. Applicentur scilicet sine syndone, ut agglutinentur cuti, & imponatur desuper later vel operculum calefactum: quod etiam locum habebit in linimentis externis; ita enim poris cutis apertis per calorem, vis linimentorum & emplastrorum medicamentosa corpus melius ingredi potest.

C A S U S VII.

ALVI OBSTRUCTIO ET IMMINENS ILEOS CUM HÆMORRHOIDIBUS APERTIS.

*L*iteratus Hypochondriacus consistentis ætatis, & cui ordinario nonnihil contumacior est alvus, conqueritur de nimia ejusdem obstructione, & utut subinde aliquid egerere ægre nitatur, loco tamen fecum alvinarum sanguinis fit excretio, sine dolore tamen aut alio graviore symptomate. Hæc cum aliquot dies continuassent, malum in tantum exasperatur, ut planè nihil recrementorum egerat, graves dolores abdomen torqueant ultra octiduum, supervenit nausea & vomendi conatus. Vocat Medicum, qui accedens abdomen tangit insigniter durum, audit ægrum subinde singultientem, & simul halitum fetentem, quem æger exspirat. Pulsus est parvus & debilis, frequens fluxus sanguinis adhuc durat, ita tamen, ut sub conatu egerendi non sine insigni dolore membranosum quid ex alvo protrudat.

R E S O L U T I O.

Ut ad literati nostri hypochondriaci affectus cognitionem rite perveniamus, non opus erit profunda speculatione longaue cogitatione: Perquam facile enim primo etiam intuitu ex concursu symptomatum affligentium affectus se manifestat. Ubi ergo rerum testimonia adsunt, non necessarium puto ulterius charitam fallere verbis, rectâ enim patente viâ ambages prius ire minimè convenit. Triti propterea hujus adhuc memor, paucis his præmissis affectus ipsius explanationem atque resolutionem aggredior, & statim me accingam ad appellationem hujus affectus, qui in hoc nostro literato hypochondriaco est vel primarius, pertinacior alvi obstructio, in tantum, ut etiam Passio iliaca imineat; vel secundarius, hæmorrhoidum fluxus, quod testatur sanguinis sine dolore excretio, nam dolor hæmorrhoides cæcas seu furentes ob clausuram osculorum in vas arguit; dolorum absentia cum fluxu sanguinis sed insensibili hæmorrhoides apertas innuit. Confirmat me etiâ in hac opinione illud,

[S] 2 quod

quod hæmorrhoides cum affectu hypochondriaco magnam cognationem habeant, & non raro hypochondriacis supervenire soleant. Inchoantem autem morbum iliacum graves dolores in abdomine vexantes, nausea ac vomendi conatus, abdomen insigniter durum, superveniens singultus, atque halitus foetore imprægnati, manifestè monstrant.

Ut autem ritè legitimeque secundum leges resolutionis casuum procedamus, considerationi subijcimus

PARTEM AFFECTAM,

quæ in nostro agro hypochondriaco sunt intestina, tam tenuia quam crassa, in specie tamen in hoc individuo maxime affectum puto inter intestina tenuia ileon; plerumque enim affectis intestinis tenuibus dolores magis exasperantur, quàm affectis crassis. Imo podex etiam non nihil liber esse solet, quod affectis crassis minimè observatur, ut podex interiora versus restrictus appareat, & tanta adest angustia, ut ne specillum intromitti possit, qualem tamen constrictionem atque angustiam in hoc casu minimè adesse judico, quia excretionem sanguinis & membranosi muci liberior datur exitus.

Consideratâ autem cognitâque Parte affecta ordine aggredior causas, primariò tamen proximam, quæ in affectu primario est secum induratio, earumque ab acido coagulatio, quæ in intestinalis fistulæ membranis tam arctè adhærent, ut vix sursum vel deorsum moveri queant. Intestina enim ab acido irritata motum peristalticum naturalem inferiora versus cohibent, & dum irritatio illa molesta ulterius perdurat, fibræ contractis necessariò motus sursum versus excitatur: vid. Sennertus de Ileco; unde ob hanc irritationem & spasmodicam in intestinis contracturam dolores graves in abdomine excitantur, & quidem in specie circa regionem umbilicalem fortasse, quia intestina tenuia imprimis affecta esse auguror, ob rationes supra in parte affectâ allatas. Hinc quoniam scybala illa indurata successivè regurgitare quasi conantur in ventriculum à vaporibus illis malè olentibus, difficili irritationis ac molestiæ sensu afficitur stomachus, unde ratione sensilissimi orificii superioris nausea, inferioris verò inanis vomendi conatus supervenit: fibræ enim non nihil irritatis, copiosius eò derivantur spiritus animales, à quibus impetuosius irruentibus convulsivus excitatur motus. Dum autem orificium ventriculi superius, quod diaphragma perforat, ipsi firmiter connectitur, tali irritatione molesta, per consensum contiguitatis diaphragma etiam violenta convulsione in sui contractionem irritando atque vellicando stimulat. Unde ob id inspirationem non nihil violentius factam singultus,

prodromus epilepsiæ, excitatur. Regurgitationem etiam excrementorum, vaporumque malè olentium in ventriculum incipientem ascensionem ulterius, imò melius confirmat halitus oris maximè foetens ab agro exspiratus, qui non leve argumentum, jamjam incipientis vomitus stercorei existit.

Hæmorrhoides etiam affligentes apertæ nullam aliam agnoscunt causam, quàm analtomosin, ex sanguine consistentiæ spissioris & magis grumolæ, propter acidum in hypochondriacis notoriè peccans factam. Magnam nimirum habent cognationem hæmorrhoides cum affectu hypochondriaco, & hypochondriacorum affectuum quasi consecutarii sunt. Accedit, quod sub conatu egerendi tantum sanguis profluat, adeoque compressione quasi sanguinis profluvium ita excitetur.

Causam occasionalem statuo malum hypochondriacum huiusmodi symptomatis, & obstructioni pertinaciam insinuem subministrans.

PROGNOSIS.

Ut autem Domino nostro hypochondriaco, qui ut pristinæ sanitati iterum restitatur, non levem curam gerit, Prognosin aliquam annectamus, ne spe suâ convalescentiæ planè frustretur, dico malum hoc periculo quidem non planè vacare, præsertim cum jam singultus, tanquam prodromus epilepsiæ, adsit. Auxilium, tamen adhuc expectandum, si modo statim convenientissima adhibeantur remedia.

CURA.

In Cura methodica pro affectus complicati complicatis urgentibus symptomatibus, distinctæ indicationes etiam formandæ erunt: & quidem ratione indurati alvi & inde imminentis volvuli, secum emollitioni, per inferiora ejectioni, & irritationis sensus sedationi, incumbendum; ratione verò fluxus hæmorrhoidalis naturæ motus attendendus, nimium quidem sistendo, deficientem, si forsân sit ordinarius, stimulando, mediocrem linquendo.

Ratione ergò alvi indurati convenient clysmata primò emollientia.

℞. *Spec. emoll.* M. iij.

fl. Samb. M. i.

Coqu. in f. q. *lactis bubuli*: Colat. ℥bj. adde *Mell. q. tal.* ℥iij.

Vitell. ovor. No. ij.

M. pro Clysmate pro duabus vicibus.

Quæ si non suffecerint, & hæmorrhoidalis fluxus permiserit, speciatim si consuetus, & tamen non nihil imminutus fuerit, clysmata cum scorris reguli antim. optimo cum usu applicentur:

℞. *Spec. emoll.* M. iij.

Scor. reg. ℥ij 3vj.

Coqu. in f. q. *æ comm.* Colat. ℥xvj. adde *Mell. q. tal.* ℥iij.

OL

Obstructio & imminens Ileos, cum Hæmorrhoidib. apertis 141

Ol. liq. alb. ℥ij.

M. f. Enema pro duabus vicibus.

Si & hæcce non sufficient, fortiora stimulantia possunt dari:

R. Decoct. emoll. usit. ℥vj.

Croci metall. ℥ij.

El. benedict. lax. ℥i℥.

M. f. Enema.

Quibus in auxilii societatem veniant vel passula laxativa, vel decoctum passulatum hypochondriacum, vel potio Barbette aut Horstii ex decocto althææ, vel serum lactis, vel oleum amygdalarum dulcium: Sub quorum usu fiat intestus seu balneum ex emollientibus confectum. E. g.

R. Rad. althææ ℥vj.

fol. ejusdem.

Malvæ.

Verbasci ana M. vij.

fl. Nymph.

rosar. alb.

Chamomill. ana M. vj.

coq. in. f. q. *¶* *æ comm.* pro Balneo,

cui infideat æger usque ad umbilicum.

Sub egressu vero è balneo inungatur abdomen cum unguento de artanita, acuato cum Oleo diacolocynthidos Quercetani, eaque continentur, donec solvatur pertinax alvi obstructio.

Quo scopo feliciter absoluto, sedentur spasmi intestinales, & irritationis sensus sopiatur per opiata.

R. ¶ Menth.

fænic. ana ℥j.

—theriac. campb. ℥ij.

Laud. opiat. ferm. gr. ij.

Eleosacch. cinnam. gr. xij.

Syr. fænic. ℥℥.

M. D. S.

Schmerzstillend Tranklein.

Capiatur cochleatim.

Ut verò etiam hæmorrhoidibus prospiciatur, mediocres linquantur, deficientes stimulentur; idque in specie clysmatis, paulo acrioribus; vel frictionibus cum follis ficus: si verò copiosius fluant, compescantur, modò prius alvus aperta fuerit, idque speciatim per Martialia; hæc ipsa enim, uti acidum hypochondriacum absorbent, ita hoc ipso in vitrioli quasi naturam degenerant, & alvum suaviter apertam servant, dum simul sanguinem coagulando nimias excretiones ejus quascunque, & speciatim per hæmorrhoidalia vasa sistunt: hinc conducunt tinctura vitrioli Martis Zwelfferi, aut potius tinctura antiphthifica, aut liquor Martis solaris, aut crocus Martis per præcipitationem, &c.

CASUS VIII.

DIARRHOEA SEROSA AB ERRORE EXTERNO.

Mulier uterum gerens tertio mense, cum ex febre acuta continua convalescisset, & jam appetitus egregiè rediret, ipsaque strenuè denuò ederet, & pancreaticè iterum se haberet, cum marito hortum petit, ibique vescitur aliquot uvarum maturarum baccis cum delectatione: sed cum propter rixas inter maritum & vicinum abortas, perterrefacta nonnihil fuisset, domum rediit. Altero mane conqueritur de insolita quadam molestia circa hypochondria & præcordia, sitit nonnihil, & deficit appetitus, per alvum copiosa liquida rejicit; à pastu meridiano, licet mediocri, quem pro consuetudine magis, quam pro appetitu, assumpsit, sitis intenditur, abdomen murmurat, vesperi egerit sæpius per alvum copiosa liquida, appetitus planè destruitur, sitis intenditur, fauces arescunt, noctu supervenit creberrima alvi dejectio, quæ omni hora sexies, vel septies urget: Rejicit copiosa liquida, serosa & aquosa. Mane capit ob id pomum cotoneum conditum: potui ordinario verò panem tostum, macere probe perfriktum, injicit, melius hinc habet; sed vesperi, paulò ante cœnam, eadem redeunt, noctu copiosissime ejicit, vires prosternuntur, sitit admodum, abdomine dolet, lumbos gravis dolor lacerans vel lancinans (*Reissen im Rücken*) & hinc illiacam regionem occupat. Mane vocat Medicum pro Cura.

RESOLUTIO.

Affectus hic est Diarrhœa serosa vel cerebralis, nocturna, in qua promiscuè varia, utilia & inutilia, per alvum ejiciuntur.

Subjectum morbi inhæsionis & excretionis ut sic sunt intestina; radicationis verò seu causæ, aut radix mali, (in quo nempe latet fomes morbosus causæ proximæ, & ex quo oritur malum) est primariò stomachus, secundario verò massa sanguinea, quatenus certum est, omnia illa producta, quæ excernuntur hic, non præstitisse in intestinis, sed ex massa sanguinea quoque magna pars liquaminum excernendorum derivatur ad intestina, & quidem ex massa sanguinea corrupta.

Quoad Causam proximam, uti ea in omni alvi fluxu quaerenda est in stomacho, ita quoque in nostro casu erit defectus fermenti digestivi in stomacho, ejusdemque plus minus inertia, & hinc acre nitrosum ac alcalinum: nam ex acidi seu fermenti digestivi de-

[S] 3

fectu

fectu, & mala digestio, & assumptorum nidorosa corruptio, & sanguinis alteratio, derivanda sunt, & varia excreta superveniunt, producta hinc & hac occasione morboſa afficiunt & sanguinem & intestina, illum colliquando, hæc irritando.

Nempe occasione copiosorum ingestorum (in famelicis post febrim, quibus intensior ordinariò appetitus ob acrius fermentum stimulanſ, ſed minus commoda digestio, ſaltem deficiens volatilifatio ob ſpiritus nondum adeò ſufficientes;) difficiliſ fit digestio, ut quæ per terrorem magis turbata, per uvarum baccas depravata fuit, ita ingeſta à fermento digestivo minus ſpirituſo haud ſpecificè mota ſeu determinata, proprio impetu & præſertim per uvarum baccas tanquam fermento addito vitioſè fermentata fuerint, & texturam acido ſalfam acrem acquiſiverunt. Hoc in inteſtinis cum bile commiſtum liquamen ſaporis fere ſimilis atque purgantia vegetabilia, conſtituit acre, ſalſo-amarum, viſcidum reſpectu inteſtinorum, ſed longè & latè diffuſibile ratione ſanguinis: unde tantillum ejus ad ſanguinem delatum, inſtar paucae eſſentiæ purgantis hunc adhuc muſteum (ob alimenta poſt febrim copioſiùs ingeſta, & vix omnia ſanguificata) facile colliquare, in & ſeroſam conſiſtentiam alterare potuerit, particulis quibusdam ejusdem liquaminis inteſtiniſ adhærendo irritationem eorum inducentibus.

Ergò cauſa proxima ſunt particule fermentativæ ex alimentis corruptis, ſpeciatiſ acore volatili baccarum cum bile amara, concretum acre, quaſi reſinæ purgantium ſimile efficiens, à quo omnia poſtmodum ſymptomata, quæ unâ quaſi catenâ cohærent, & ſe mutuo excipiunt.

Omnis enim alvi fluxus fit vitio ſtomachi, quod declarat à poſteriori Hippocrates *ſect. 6. aphor. 1.* nempe quod in diuturna inteſtinorum lævitate ructus acidi ſupervenientes bonum ſignum ſint, innuunt enim, ceſſare diarrhœam propter reſtauratum fermentum digeſtivum, continerique iterum alimenta in ventriculo, ac debito modo fermentari; ſicque non deeſt ſpes recuperandi vires ſanitatēque priſtinam; non ſecus ac quoque purgationes, quæ artificiales ſunt diarrhœæ & purgantia, quæ has excitant, per acida ſedantur & infringuntur; Nam acida illa ſunt vel naturalia vel artificialia: Sic helleborus albus, rex purgantium vegetabilium aliàs exiſtens, per ſpiritum vitrioli caſtrari poteſt, ut ſit inſons: & ſcammonium per acetum & fumum ſulphuris &c. Non abſimile præſtant acida naturalia: hinc ſiquidem, quorum fermentum ſtomachi digeſtivum magis vel minus eſt graduatum, in iis propinata purgan-

tia magis vel minus operantur, & idem medicamentum hunc nunc validè nunc imbecillius purgat; imò in hypochondriaco-melancholicis validiſſima & antimonialia purgantia parum vel nihil operantur: quod teſtari poteſt Hungarus ille ſtudioſus, cui tartari emetici Mynſichti gr. vi. nec alvum nec vomitum moverunt; cùm contra, quibus deficiat acidum in primis viis, illi fortius & facilius purgentur.

Porro confirmatur aſſertum noſtrum ex eo, quod diarrhœæ naturales & purgantia vegetabilium validiora eadem relinquant ſymptomata; nempe percipiunt talia paſſi amarorem oris, ſitim majorem ex alcali acri, oriſcium ſtomachi vellicante, appetitus ordinariò proſternitur, anxietates præcordiorum & naufœa affligunt. Porro dum acidum in primis viis plus minus deficit, aut iners eſt, non reſtranatur bilis, adeoque diarrhœa in ſtatu morboſo ſupervenit: imò dum fructus horæi in nidorem abeunt, ad diarrhœam diſponunt; ut ergò impoſſibile ſit dari alvi fluxum, ſtante vi fermenti digeſtivi naturalis in ſtomacho. Unde contra, quamdiu in quacunque alvi fluxu appetitus adhuc viget, tamdiu bonum ſignum eſt mali non curandi, ſed relinquatur naturæ ſuus motus; quando autem appetitus languet, aut ceſſat, tum tempus eſt curationis.

Cauſa remota eſt digeſtionis primæ defectus occasione terroris, & uvarum baccarum fructus horæi: unde continuantur dicta pathemata, donec digestio prima reſtituta fuerit, cujus indicium *ſect. 6. Aphor. 1.* aliàs quælibet ingeſta liquida & ſolida corrupta eodem modo ab omni paſtu copioſiores ſeceſſus movere ſolent. Inter cauſas remotas memoranda ſimul quoque eſt graviditas tertio menſe; nam notum eſt, foeminas primò geſtationis tempore non eſſe tam voraces, quàm picantes, adeoque varia edulia ſubinde plus minus noxia ingerere, unde fermentativam actionem habetari, ſicque ad diarrhœam diſponi. Cæterum, quamvis pellicularum ex uvis deglutitarum mentio non facta ſit, moneo tamen, certum eſſe, eaſdem pelliculas difficilimæ vel planè nullius eſſe digeſtionis; non ſecus enim ac piſorum pelliculæ aliorumque fructuum folliculi deglutiti eodem modo per inferius guttur emittuntur & egeruntur, ac per ſuperius ingerebantur: quod teſtatur puer ille, cujus meminit Helmontius *Tract. Sextupl. Digest.* qui pelliculas piſorum per inferiora rejicit, quas aſſerit intenſe fuiſſe acidas, quamvis ſtercus fuerit dulce. Scilicet mirabile eſt fermentum ſtomachi corallia & ſimilia poſſe diſſolvere, non item has pelliculas; non ſecus ac aceto inditum ovum integrum quod teſtam ejus integram ſolvit, tenerâ verò pelliculâ intactâ. Pelliculæ ergò tales in ſtoma-

stomacho non digestæ acefcunt, alvum laxam constipant, & inviscando excrementis se immiscunt: Sic mulier ex copiosa ingestione uvarum cum pelliculis lethalem alvi constipationem incurrit, quia pertinaciter in cellulis coli sibi invicem miscentur.

Quoad fructus horæos, ad diarrhœam disponentes, notum est, quod hi suâ naturâ sint sâlia neutra mixta ac in textura sui utrumque sâl agens contineant; ita quidem, ut quædam magis ad acidam cruditatem declinent, ut ribes, pira, cotonea, mala acida, &c. quæ omnia potus vinosos exhibent: quædam verò de natura alcalina participant, adeoque faciliùs bilefcant & putrescant, qualia sunt insipida aut dulcia, ut pruna majora Hungarica, cerealia, *Spillinge* / cucumeres, cucurbitæ, melones, mustum, &c. quæ omnia magis nociva sunt quam priora. Interim, modò utraque ritè digerantur, noxam non inferunt; Sin verò ventriculi fermenti inertia hæc non subegerit, suo pte feruntur motu, adeoque nunc acefcunt, nunc putrescunt, amarescunt aut indurescunt, sui juris facta, turbas excitant in corpore. Nam quicquid non alteratur à fermento, ut corpori nostro fiat assimilabile, hoc, tanquam hostile naturæ, ejicitur. Ergo nocumenta fructuum horæorum diversa sunt; prout enim illi magis sunt acidi, & ad naturam vinosam accedunt, unde incipiunt fermentescere, eatenus saltem tormina, colicam, &c. cum copiosissimorum flatuum proventu, procurant; quatenus verò iidem sunt insipido-dulces, quò etiam mustum dulce pertinet, & non rectè digeruntur, aut transmutantur à fermento stomachi digestivo, nidorem contrahendo alcalinum nauseosum, diarrhœæ, cholæræ, cœliacæ, &c. ansam dant: Quod testantur pruna cerea, melones, cucumeres, &c. quæ singula non digesta, quatenus putrescunt, rufus nidorosos excitando quandoque choleras, aliosque alvi fluxus induxisse, observationes Practicorum confirmant.

Non ineptè quidem ægra nostra pomum cotoneum & potum macere imprægnatum pro cohibendo alvi fluxu assumpsit. Cum autem remedia hæc pro eradicando malo non sufficiant, ægraque nostra à meridie cibos, ut citra appetitum, assumpserit, unde non mirum, quod brevi post assumpta & similiter corrupta alimenta dicta mala longè atrocius redierint, cum virium prostratione & lumborum dolore lancinante & lacerante, ab intestinorum & plexus nervei mesenterici spasmo ortum ducente.

Quoad dolorem circa lumborum regionem affligentem, notandum, cum non esse intestinale hoc in casu, sed reverà occasione uteri irritati excitatum, & prodromum abor-

tus imminens (quod & in gravidis semper valet) scilicet, prostratis per diarrhœam viribus, & succis corporis, tam nutritivis quam excrementitiis, evacuatis, ipsisque spiritibus dissipatis, non potest non supervenire foetus imbecillitas, indeque instar ponderis inertis in utero jacere necesse habet. Imò ipse uterus ob spirituum animalium vigorem deficientem non sufficiens est ad foetum retinendum, quin partim ob tonum suum naturalem laxatum & resolutum dimittit foetum, partim irritatus motus convulsivos patitur, & dolorem exhibet, foetumque excludit, unde abortus: vid. Hippocrates *Aph.* 1. *sect.* 4. & *Aph.* 34. *sect.* 5. non secus ac imminente partus tempore dolor circa lumborum regionem, ubi mesenterium vertebrae annectitur, sentitur.

Ulteriùs tantillum, quod de cruditate nidorosa ad massam sanguineam fuit distributum, sufficit huic fundendæ & corrumpendæ, cum alias notum sit, omnia subjecta alcalina sive lixivialia, tam fixa quam volatilia, attenuare sanguinem & liquefacere, quatenus sanguinem fluidum reddunt. Sed quæritur: quomodo hæc in sanguinem colliquesendum agant? Dico: vel ea in sanguinis acidum, consistentiam eidem largiens, vel in pingue illius oleum, agere, vel in utrumque. Et quidem, quod sanguini copiosum oleum insit, probò: quia is exsiccatus igni injectus tam promptè inflammatur, uti oleum aliud; & sub hac inflammabilitate sanguinis facili occulta latet aciditas, cum præsertim sanguis exsiccatus nitro in crucibulo fluenti sive liquefacto injectus, hoc simili ratione ac à sulphure vel carbonibus injectis, figatur in alcali. Unde acidum & oleum sanguinis ab alcali tali alterata non coherant amplius cum reliqua massa, sed imbibita à sero foras eliminantur: idque in specie per intestina fit, quia inibi irritatio præstò est, in qua unà cum excrementis ibidem stabulantibus simul reliqua ex sanguine per transmutationem genita recrementa deponuntur, simili ratione ac in prægnantibus.

Dicta hæc occasionem inquirendi suggerunt, unde contingant fluxus alvi colliquativi in febribus ardentibus & malignis, qui pessimi in his semper ominis sunt; non secus ac iidem in phthisicis & hæcticis apparentes mortem in olla esse portendunt.

P R O G N O S I S.

In gravidis semper simul, in quocunque symptomate eas affligente, respiciatur tam ad matrem, quam ad foetum, cum juxta Hippocratem *Sect.* 5. *Aphor.* 34. diarrhœa gravidis abortum minetur.

Imò in hoc casu, cum gravida demum resurrexerit à febre acuta, propter vires exhaustas

haustas periculum vitæ incurrit: suspicio enim est, crasin massæ sanguineæ & vires ejus non suffecturas novo morbo ferendo, de quo per se nullum ferè est periculum.

De dysenteria autem metuenda hîc non solliciti sumus, quia diarrhœa affligens est absque ullo stimulo: quod si verò tenesmus aut tormina præstò essent, tunc propter rasionem intestinorum dysentericæ metus glisceret.

C U R A.

Quoad Curam, hæ indicationes formandæ:

(1.) Fermentativum liquamen alcalicum corrigendum acidis, & blandâ diaphoresi ex massa sanguinea eliminandum.

(2.) Motus humorum præternaturalis & vellicatio intestinorum per blanda opiata sistenda.

(3.) Stomacho blandis acidis succurrendum, & gratis adstringentibus tonus fibrarum restituendus, humoresque moti increassandi.

Cæterum, antequam tales indicationes formentur, consideranda probè differentia diarrhœarum: an nempe sit ea spontanea? an verò coacta? si spontanea, an naturalis vel critica? si coacta, an symptomatrica, habitualis, epidemica, ab errore externo? ut judicari possit, an curanda sit? an verò non? Diarrhœa enim ab errore externo intrepidè sisti potest; minus, quæ motu naturæ spontaneo accidit. Causæ externæ quoque considerandæ, & conditio subjecti: ibi digestio læsa, & hinc corrupti humores: hic massa sanguinea mustea, & crudis chylosis concretis onusta, & hinc facile alterabilis.

In nostra ægra Diarrhœa est coacta, ab errore scilicet externo, adeoque maximè curanda, & quia est gravida, mature: sed

1. præmissis debitis blande laxantibus.

1. non adstringentibus, sed appropriatis & opiat.

3. non actu, sed potiùs successivè, quia tutius.

In hoc ergo casu Clysmata non conveniunt. In aliis tamen casibus, quando acres succi peccant, nonnihil possunt exhiberi cum dictis cautelis, ubi blandè lenientia ex lacte parata sunt optima; quod confirmat *Obs. in M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 303. pag. 528.* ubi refertur hypercatharsis ex medicamento purgante, excitata beneficio clysmatis blande adstringentis & abstergentis curata. Curavi aliquando puellam quatuor annorum, ex febre acuta laborantem, cum diarrhœa insigni & flatuum copiosorum proventu correptam, crebroque, sed parum, dejicientem (quod non tam quantitatem, quam qualitatem seu stimulum excrementorum subesse indicabat) quæ immisso clysmate ex

lacte optimè levabatur. Imò jam nunc sub cura habeo Chirurgum quendam, qui intra 24. horas ultra centum vices ascellare coactus fuit cum viribus prostratis, appetitu stomachi nullo, pulsu crebriori & celeriori, forti tamen & robusto: Huic, postquam in causas antecedentes inquisivissem, & ægrum, qui est Melancholico-hypochondriacus, ultra septimanam in hypochondrio sinistro dolorem obtusum obscurum percepisse audiveram, tandem propter frigus externum præscripsi clysmata ex lacte chalybeato cum therebinthina, cò, quod parum quidem, sed sæpiùs, dejecerit: Quò præmissò ordinavi ei hunc pulverem:

℞. C.C. ʒss.

Lap. Hemat. præp. gr. xv.

℞e sigillat.

Nuc. moschat. ana gr. viij.

Laud. opiat. gr. ij.

M. f. Pulvis.

div. in 2. part. æqual. S.

Anhaltende Pulver.

Harum æger cepit dosin unam, hinc diarrhœa cessavit adeo, ut post hanc saltem bis dejecerit.

Ergò si præsumptio fuerit humoris acrimonie peccantis, speciatim clysmata blanda temperantia & demulcentia locum habebunt.

Quoad II. Vomitoria; nec hæc in nostra ægra convenissent, licet interdum conveniant optimè in diarrhœa habituali seu diuturna, ubi stomachi vitium magis est confirmatum. Ac præcedit nobis hac in parte Hippocrates *sect. 6. Aphor. 15.*; à quo spontaneo motu naturæ, ejusdem minister Medicus indicationem sumat: Sic notandus quoque est *aphorismus 17. & 26. sect. 4.* Qui si ambo observentur, vomitoria in usum trahi poterunt: Videatur etiam Riverius in Praxi, ubi in diarrhœa contumaci stomachi vitio vomitoria commendat. Imò confirmare hoc possum propriâ experientiâ: Vir consistentis ætatis, cætera sanus, in itinere ante tres vel quatuor menses diarrhœam quâdam, adhuc durante, infestabatur, cum appetitu prostrato, siti & imbecillitate virium: Curatus hic quidem quoad diarrhœam per debita remedia; deficit tamen nihilominus adhuc appetitus, & licet pauca comedat, omni tamen nocte quinquies vel sexies per alvum reddit liquida; quo in casu malum simpliciter est ex cruditate stomachi nidorosa; siquidem omni manè patiens hic jejunos ructus nidorosos, de quibus dicebat: *Es schmeckt so garstig und lechschich;* perſentit, signum fermenti digestivi depravati. De cetero, cum per plures septimanas laborasset, exhibui eidem vomitorium, unde me-

de melius ad tempus habebat, sed non diu; post enim recidivabant symptomata, non tamen sic atrociter. Ex quibus patet, in talibus habitualibus diarrhœis, ex læso stomacho natis & imprimis ubi urgent stomachi symptomata, nausea, vertigo, anxietates præcordiorum, &c. vomitoria blanda instituta esse optima: Vid. Alex. Deodatus *Valetud. pag. 123. & 124.*

Quoad III. venæ sectionem: nec hæc in ægra nostra locum habet; partim ob vires debilitatas; partim, quod à febre continua acuta modò surrexerit; imò eam nec plethorâ apparente, nec verâ, præditam esse. Interim si nostra ægra aliàs sana fuisset, & fuisset consueta sub primis gestationis mensib⁹ vomitib⁹ matutinis, & propter hos omissos contraxisset diarrhœam, venæ sectio potuisset suaderi. Nam & gravidarum vomitus usque ad medium gestationis tempus durans venæ sectione compescitur, præsertim si aliàs fuisset venæ sectioni adsueta.

Quoad IV. Purgatio propriè dicta in ægra nostra non conducit. Equidem multi Practicantium in omni diarrhœa blanda absterfiva commendant; sed malè: Nam sicut insulsum est in hypercatharsi laxans propinare pro particularum acrium absterfione; ita etiam in diarrhœa symptomatrica inconueniens erit instituere purgationem; cum naturæ malè operanti non sit calcar addendum, seu stimulanda & irritanda hæc ulterius, quod faciliè fieret. Quin potius in spontanea diarrhœa cum euphoria, sine appetitus prostratione incedente, itemque in critica, eaq; non sufficiente, blandè laxantia ex tamarindis vel rhabarbaro propinare decet, sistendo tamen prius humorum impetum. Et licet dicant tales Practici, Rhabarbarum convenire: non tamen confundendum est cum ceteris purgantibus, & in quaestione adhuc est, an vi alterativâ, an verò laxativa tunc proffit? Nam ex omnibus purgantibus rhabarbarum & aloë solum sunt salubria, & juxta vim suam balsamicam blandè abstergendo laxant, unde & rhabarbarum magis alterat quam laxat, & bilem acuendo Anima hepatis dicitur; non secus ac absinthium in hydrope egregium est. Porro Rhabarbarum etiam est egregium nephriticum, quod jam Paracelsus observavit, si per sal tartari corrigatur, & vis solutiva ei sumitur, sui quoque vestigia tam odoris quam saporis & coloris ratione in urina relinquens.

In curanda nostra ægra præmittatur primarum viarum absterfio per appropriatum seu simulalterativum laxans, quod est rhabarbarum, cum vel sine opiatis usurpandum:

R. Rhabarb. el. ʒj

Pulv. nuc. mosch. gr. vj. ad ʒß.

Laud. opiat. gr. j. vel Extr. Ther. gr. v.

Misc. propulvere: S. Abspülend Pulver.

Tom. II. Pars 2.

Item

R. El. diastord. Frac. ʒj.

Rhabarb. el. ʒj.

Cum f. q. Syr. ros. solut. f. Bolus: D. S.

Abspülende Lattwerge auf einmal.

Habeatur ratio impetus humorum. Ubi horum urget acrimonia, & hinc fluxus, hic prius opiatis & appropriatis absorbentibus sedetur, hinc laxatio instituatur; sin minus illa urgeat, ab his cura inchoetur, nunc solis, nunc opiatis sociatis; sin sola usurpentur, opiata subjungantur: Vel

R. Decoct. torment. ʒiß.

ʒ Rhabarb. ʒß.

Syr. Papav. alb. ʒvj.

M. f. Potio: S. Abspülend Träncklein.

R. Conf. Mentha ʒj.

Rhabarb. el. ʒß.

Laud. opiat. gr. j.

M. f. Bolus: S. Abspülender Zucker.

Quoad V. Opiata: sanè cautissimi sumus in gravidis cum opio, & non nisi probè correctæ ea, & in parva dosi, appropriatis semper mista, adhibeantur. Insuper electuarium diascordii, theriaca, & mithridatium, similiaque opiata, in specie hic in diarrhœa, semper cum aceto & acidis propinentur; meliùs enim tutiusque operabuntur, & potentius sudorem movent, adeo quidem, ut hinc sæpiùs theriaca sola cum aceto propinata, expectando blandum sudorem, hoc in casu quidem absolveret totum negotium. Gelatina autem cornu cervi in potu dissoluta prodest in specie, quando temperandi sunt succi acriores. Porro vinum in omni alvi fluxu ex stomachi vitio, quatenus summum est stomachicum, imprimis Rhenanum, ceu alimentum medicamentosum, egregium & proficuum est.

Ceteroquin unâ fidelia pluribus Indicationibus simul in cura satisfacere studebimus sedulo, ubi hinc terræ sigillatæ eminent, quæ participant de vi metallica, & non saltem adstringendi, sed & alterandi atque temperandi humores vi pollent; adeoque pro scopo sudorifero in usum revocandæ illæ erunt hoc modo:

R. ʒ Acetos. ʒiij.

Cinnam. ʒiij.

succ. Citri, vel cydonior. rec. ana ʒj.

C. C. f. ʒc ʒj.

ʒe sigillat. ʒß.

Laud. opiat. ferm. gr. iijß.

M. f. Potio; D. S.

Anhaltende Stärk. Mixtur. Köffel. weise.

De terræ sigillatæ energia hoc in passu conf. Poterius *Cent. 2. Cur. 62.* ubi allegat desperatam diarrhœam, beneficio

ʒe Pimpinell. ʒiij.

Syr. Papav. nigri ʒiij. &

ʒe sigill. ʒj.

[T]

cura-

curatam: in qua mistura terræ sigillatæ dosis ad ʒi. augenda.

De oleis destillatis, cynamomi & caryophyllorum notandum, ea nimis esse generosa, fœtumque pellentia & stimulantia, adeoque in gravidis cautè vel non usurpanda.

Aliàs aliquoties proficuam expertus sum in Diarrhœa à causa externa hanc formulam:

℞. ▽ *Plantag.* ʒij.

Mentha ʒj.

Cinnamom. ʒvj.

Acet. vini, vel *succi. Citr.* ʒʒ. vel ʒvj.

El. diasc. Frac. vel *Theriac.* ʒi. ad ʒij.

ʒii diaphor. ʒi. ad ʒʒ.

Syr. cydonior. ʒvj.

M. f. Potio cochleatim sumenda:

D. S. ut supra.

Hæc mistura omnibus Indicationibus satisfacit. Capiatur illa pro duabus vel tribus dosibus, expectando sudorem blandum, loco cuius etiam electuarium sequens est:

℞. *Conf. Rosar. probè* ʒlat. ʒij.

Theriac. Androm. ʒij.

Boli Arm. præp. vel *ʒe sigill.* ʒij. ad ʒi.

Cum f. q. *Syr. Cydonior.* f. Electuarium:

D. S. *Anhaltende Stärk- & Lattverge.*

Eleganter additur conservâ vitriolata: Nam spiritus vitrioli cum bolo Armēna concurrento abit in aluminosam texturam, unde & liquor ille Prævotii ex terra sigillata & spiritu vitrioli constans, notus est.

Juxta hæc optimum est experimentum Helmontii, bina vitella ovorum, cum aqua simplici ad duritiem coctorum, eaque cum aceto, vel simplici vel rosaceo, mista & subacta, assumenda jubentis: quibus si addatur aliquid pulveris macis vel nucis moschatae, certè si non primâ, tamen altera vel tertiâ vice diarrhœa emanabit.

Hujus loco etiam prodest rob vel succus sorbi baccarum inspissatus; & cum genuina sorbus torminalis rara sit apud nos, Aucuparia, *die Vogelbeer* / substituenda; cujus fructuum non planè maturorum succus exprimatur & hinc inspissetur in rob, diarrhœa compescendæ optimum.

Externè autem frustum panis, vino generoso, v. g. Malvatico, intinctum, adpersio nucis moschatae & caryophyllorum pulvere, calidè regioni stomachi imponatur: Vel conficiantur sacculi ex herba absinthii, centaurii minoris, cardui benedicti, menthae, &c. unâ cum caryophyllis & macere, iique in vinum calefactum immissi, fœtus humidi forma applicentur stomacho.

In Diarrhœa post usum vini emetici pertinaci cum successu præscripti:

℞. *Ess. theriacal.* ʒij.

opii ʒi.

M. S. *Anhaltende Essenz.*

Dosis 40. gutt. bis vel ter in die.

Sitis verò fallatur, vel si bibant, bibant non nimis frigide; potui verò infundatur panis torrefactus, nuceq; moschata probè perfrictus.

Tandem agra nostra etiam de dolore in dorso seu lumbis urgente sollicita erat, & metu imminentis abortus externè, tam lumbis & ossi sacro spinæque dorso, quàm abdomini, calidè admoendum curabat panem mellitum, melle depurato illitum, & pulvere nucis moschatae & caryophyllorum probè conspersum, vel etiam tantum in vino Malvatico aut balsamo embryonum intinctum. Est bonum remedium, si tales dolores afficiant mulieres. Item umbilico calidè potest imponi frustum panis simplicis vino malvatico intinctum, & similibus aromatibus adpersum.

CASUS IX.

DIARRHOEA BILIOSA & SEROSA.

Senex floridus verno tempore sponte, sine progressa causa ipsi cognita, nisi quod forsan deambulando extra urbem aeris frigidiusculi insultum passus fuerit, conqueritur de tumultuationibus & agitationibus in abdomine, superveniunt copiose dejectiones liquaminum variorum, in specie aquosorum & flavescientium, ita ut plus vicies a sellare cogatur, cum dolore in podice insigni continuo infestante, & etiam post dejectionem adhuc urgente: accedit exco-riatio admodum dolorosa circa posteriora, & sine dolore nec nates detergere, nec sedere potest; supervenit hinc sitis, & gravis virium prostratio, ita ut Medicum vocare cogatur, qui accedens, pulsumque tangens, hunc præter enarrata celerem & frequentem, in robore verò moderatum, invenit.

R E S O L U T I O.

Si suprâ præscriptum casum accuratiori mentis trutinâ perpendimus, ceteraque symptomata insequentia diligenter consideramus, ad alios affectus illum referre vix possumus, quam ad alvi fluxus. Nam quoties contentorum per intestinalem fistulam expulsio sæpius ac copiosius, ac debet, contingit, toties etiam alvi fluxu laborare dicitur homo. Distinguuntur autem ejusmodi alvi fluxus in species diversas, maximeque variant, præsertim ratione materiæ diversæ excretæ, partisque, & loci, a quo materia in intestina confluit; propterea melioris distinctionis gratia distinctam quoque appellationem huic affectui imponere animus est.

A F F E C T U S.

Nuncupamus ergò illum (prout omnes circumstantiæ indicant:) Diarrhœam biliosam atque serosam; nam copiosæ frequentioresq; dejectiones liquaminum variorum, in specie aquoso-

aquosorum & flavescentium, certissima infallibiliaque diarrhœæ talismodi signa sunt.

PARS AFFECTA.

Est autem in hoc casu Pars affecta seu subiectum inhalationis massa sanguinea, quæ sub forma talium sordium depauperatur; Denominationis verò subiectum sunt intestina, primariò tamen stomachus, qui instar causæ occasionalis se habet, quatenus ejus fermentum acido-volatile nonnihil destructum, unde subito hujus culpam massa sanguinea & alvus luit, & ejus fluxus excitatur.

CAUSA PROXIMA.

Causa proxima est miasma acre fermentativum inspiratum tempore verno, quod & massam sanguineam infecerit, & stomachi acidum, inspirando nempe attractum, destruxerit; quod massam sanguineam colliquefaciendo, bilem in folliculo felleo acriorem & magis mobilem reddendo, ad talem diarrhœam disposuerit. Cujus colliquamenta ad intestina delata, ibique bili & succo pancreatico permista, tumultuationes istas excitarunt, & massam sanguineam afficiunt, quæ præternaturali fermentatione colliquefacta sordium seu liquaminum aquosorum forma corrumpitur, & ad intestina, tam per ductum choledochum & pancreaticum (quibus natura tunc temporis quasi abutitur) quàm per glandulas miliares, in intestinis post intimam eorum membranam sitas, derivantur. Quatenus autem dicta excrementa per vasa choledocha magis transcolantur, eò magis flavescent, ut in hac diarrhœa; sicuti dum simul per pancreaticæ vasa ac glandulas miliares liquamina serosa ex parte ejiciuntur, etiam serosus simul hic fluxus observatur. Unde consequenter ob nimiam excretionem serosi laticis sitis excitatur, dum latex serosus, salivæ ex parte constituens materiam, uberius evacuatus non sufficientem suggerit salivam, pro faucium linimento & absterfione.

Ast non putandum est, quod fermentativa illa colliquatio efficiat succos solum recrementosos, sed etiam laudabiles alimentitiosque corporis nostri humores una resolvit & colliquat; unde necessariò insignis virium supervenire solet prostratio. Sanè non leviter commotam esse universam sanguinis massam, & eam fermentatione hacce præternaturali, utut sub florida ætate & spirituum animalium adhuc vigente impetu, cieri, monstrat pulsus celer, frequens, in robore moderatus. Dolor in & post excretionem urgens, ob liquaminum flavescentium acrimoniam salinam, intestini recti extremitatem maximè, nempe sensibilem, excoriantem, oritur; unde nec sine insigni dolore excrementa illa ejicere, neque posteriora & ipsa excoriata detergere, nec iis commodè insedere potuit.

Tom. II. Pars 2.

CAUSA REMOTA.

Quod attinet Causam remotam; potest illa esse aeris frigidiusculi insultus, qui non minimam ad ejusmodi fermentationem præternaturalem promovendam ansam suppeditavit, quatenus nempe frigus poros cutis ita obstruxit, ut sensibili transpiratione impedita humoris illius vitiosi, qui alias per cutis spiracula transire debebat, nunc impediti ad massam sanguineam retrogredi cogatur, unde massa sanguinea particulis hæterogeneis repleta facile ad fermentationem vitiosam disponitur. Accedit & hoc præfenti in subiecto conspirans habitus corporis; nam quatenus densæ est textura, cutemque habet non nihil spissiore, ita ut cum quotidie copiosiora per alvum soleant ejici, sic etiam magis dispositus est ad diarrhœas. Accedit etiam tanquam concausa tempus vernale, quod, testantibus observationibus, non levem humorum motum excitare valet: quando enim circa tempus vernale omnia è terræ visceribus progerminare incipiunt, & etiam multiplicia fermentativa miasmata exspirant, etiam humores in corpore humano, qui per tempus hyemale quasi quieti fuerunt, nunc fundi inchoant; idque eò magis, si inspiratio talium miasmatum peregrinorum accedat; unde propter aeris frigidiusculi insultum, texturam cutis nimis densam, pori præclusi humores illos vitiosos vel superfluos emittere non potuerunt, unde facile fermentativa illa colliquatio promoveri magis potuit.

PROGNOSIS.

Cum verò Dominus æger non parum videatur sollicitus de morbi adeò insperati eventu, ob id, ne ejus spem frustremur, Prognosin in se facilem annectamus. Nam utut biliosus atque serosus talis fluxus nimis quidem, & vires simul notabiliter prosterbens, minime negligendus sit, quin imò durante nimia colliquefactione sanguinis, & magis deficiente chylosi, ægri tandem consumantur; tamen in præfenti ægro, morbo nondum adhuc adeò confirmato, & saltem externa occasione enato, in senectute florida lætior omninò factis faciendis eventus sperandus.

CURA.

Quod ergò facienda attinet: pro mali hujus medela attendendum

1. Ut fermentum præternaturale, massam sanguineam turbans & colliquetaciens, destruat blandè acidis, nonnihil austeris, vel appropriatis.

2. Idem ex massa sanguinea una cum colliquis recrementis ejiciatur: idque per blanda sudorifera, quorum ope simul pori plus minus conniventes aperiantur.

3. Ut feliciùs talia operari possint, adjunctis moderate opiatis & illorum operatio promovenda, & crebrior alvi dejectio sistenda.

[T] 2

4. Sem-

4. Semper simul stomachi ratio habenda, & ejus acidum vitale, quantum possibile, restaurandum.

His ut satis fiat scopis, ante omnia sequens mistura usurpanda venit:

℞. *▽ Menth.* ℥ij.

theriac. Aug., vel *Cinnam.* ℥℥.

~ *theriac. campb.* ℥iij.

El. diascord. Frac. ℥i℥.

Σ. sigill. ℥℥.

Syr. Cydon. ℥vj.

M. S. **Anhaltende Schweiß-Mixtur.**

Usurpetur pro tribus dosibus expectando sudorem: capiendo dosin unam manè, alteram à meridie hora quarta vel quinta, tertiam post mediam noctem; vel expectando alterum manè.

Quod si æger nauseet tales Potiones, accipiat Bolum:

℞. *Conf. rosar.* ℥i.

Bezoard. miner. gr. xv.

laud. opiat. gr. i℥.

Ol. dest. Cinam. gtt. ij.

Cum f. q. *Syr. Cydonior. f. Bolus:*

D. S. **Anhaltender Bolus.**

Imo hunc ægrum præmissis sudorifero cum opio restituet vitellum ovi ad duritiem coctum, cum aceto rosaceo assumptum.

Quibus internis simul tale linimentum, scrobiculo cordis & regioni umbilicali illinendum, vel admovendum, crebrius subjungendum erit.

℞. *Theriac. Androm. rec.* ℥iij.

Ol. dest. bacc. Junip. ℥℥.

Macis.

Caryophyll. ana gtt. v.

M. in forma Linimenti.

Externè imponendo laterem calefactum.

Ut verò storthacho simul succurramus, optimè ipsi conducent Cydoniata, speciatim vinum Cydoniatum, pro lubitu subinde hauriendum. Vel fiat mistura cydoniata, urgente siti subinde cochleatim loco Julepi haurienda, intermedio reliquorum remediorum tempore.

℞. *▽ rubi idæi* ℥ij.

Cinnam. cydon. ℥i.

succ. Cydonior. ℥i℥.

~ *℞i* *℞is* gtt. vj. vel ~ *℞is dulc.* gtt. xv.

Syr. Cydonior. aromat. ℥vj. M. S.

Stärck-Träncklein/oder Magen-Mixtur.

Item conducit haustus vini generosi, item vitellum ovi cum aceto.

Pro dolore in ano, & excretionem intestini recti & podicis, confert clyisma ex lacte, vel simplici, vel chalybeato; item fons ex lacte calido, cum spongia applicato; vel lactis decoctio cum floribus verbasci, chamomillæ, foliis hyoscyami, &c. applicetur.

In Diarrhœa torminosa cum copiosis

secessibus nigricantibus, appetitu prostrato, siti intensa, &c. primò ad abstergendas primas vias, & ad removendas, si quæ adsint, sordes, & temperandum simul nimium impetum humorum, præscripti:

℞. *Conf. Menth.*

El. diascord. Frac. ana ℥ij.

Rhabarb. el. ℥i.

Corall. r. præp. ℥ij.

Cum f. q. *Syr. Corall. Querc. f. Electuarium.*

D. S. **Abspülende Magen-Lattwerge.**

De quo æger capiebat sæpius pro lubitu: cuius usu cum imminueretur quidem nonnihil alvi fluxus, non tamen penitus sisteretur, ac tormina simul urgerent, præscripti:

℞. *Ess. tormentill.* ℥ij.

Opii ℥℥. ad ℥i.

M. S. **Anhaltende Essenz.**

Dosis 40. gutt. bis vel ter in die.

Denique ovum ad duritiem coctum cum aceto rosaceo profuit.

Vir quidam gravi diarrhœa maligna decumbebat, junctis febrilibus symptomatis, unde inter alia optimè profuit:

℞. *▽ Mentha.*

scord. ana ℥i℥.

Cinnam. ℥iij.

Acet. vini. ℥vj.

Theriac. And. ℥i℥.

Bezoard. miner. ℥℥.

Syr. Cydonior. ℥iij.

M. D. S. **Anhaltende Stärck-Mixtur.**

Capiebat pro lubitu, ad diaphoresin corpus disponendo.

Hinc vitellum ovi durum cum aceto assumpsit.

Externè interpolatis vicibus clyisma ex lacte ordinatum propter tenesimum simul graviter urgentem.

CASUS X.

CHOLERÆ SPECIES.

Juvenis *ισαακ* & probè sanus, exercitiis deditus, cum gravissimâ irâ incanduisset, citra hoc, quod vindictam instituere posset, bibit aliquantulum vini cerasci, (*Rirsche-Wein*) hinc domum rediens ingruente nocte ex improvîso tumultu graviter terrore percutitur; unde in sequente die ex languore universali & lassitudine artuum in lecto subsistere cogitur. Mater sollicita propinat dosin *Tincturæ Bezoardicæ*, unde sudor sufficiens prolicitur cum aliquali ægri euphoria: sed die secunda atroces anxietates eum corripunt; *er weiß nicht / wo er vor Angst bleiben soll / ut hinc inde in lecto inquietus se jactitet: sudores copiosi circa caput saltem prorumpunt, flatus abdomen distendunt, sitis urget intensissima, modò calet corpus intense,*

intense, naturaliter tepet. Ex propinato remedio confortante nauseat stomachus, in vomitus erumpit copiosæ materiæ viridis, amarissimæ, cui & copulantur aliquot dejectiones per inferiora, cum flatuum emissionem; hincque levatur malum, ægerque commodè satis se habet, non secus ac sequente die tertiâ: sed die quartâ eadem recurrunt symptomata, anxietates longè crudeliùs affligentes, adeò, ut æger moribundi instar jaceat cum facie pallida, & quasi exsangui. Cum ad horam & diutius ita afflictus fuisset, tandem summo vomendi conatu, antea sæpius irritò, excernit aliquantulum materiæ viridissimæ & amarissimæ. Vocatur Medicus, qui tangit pulsus, huncque validum, magnus, celerem tamen & frequentem, invenit.

R E S O L U T I O.

Affectus hic est Choleræ affinis, non autem est propriè sic dicta cholera, quia non continuus excretionis per superiora & inferiora adest actus; nec est morbus acutus, sed tantum per intervalla redit.

Subiectum duplex est; nempe

(1.) Consideranda venit massa sanguinea; &

(2.) Intestinum duodenum, cum annexo stomacho, aliisque intestinis.

Massa sanguinea quidem est subiectum transmissionis; intestina vero sunt subiectum receptionis & excretionis, à quibus stimularis, & in motum peristalticum seu convulsivum concitatis, supervenit hic affectus; adeoque stomachus & intestina se habent passivè ratione receptionis succorum ductus choledochi & pancreatici, & inde ortæ vellicationis, simul tamen & activè se habent ratione excretionis, ab intestini duodeni & pylori convulsione dependentis.

C A U S A P R O X I M A.

Causa proxima est humorum acriorum salinorum in primis viis perturbatio & effervescencia, unde præsertim pensandæ sunt potestates salinæ, acidum scilicet & urinosum, & hinc exsurgens falsum, præsertim tamen utrumque illud, alcali scilicet, & acidum acre effleratum: quorum hoc ex lymphâ pancreatica; illud ex succo felleo corrupto, deducendum; & hæc ambo sui miscella dant tertium humorem præternaturalem, qualem vomitu rejicit æger.

Pro causâ autem remota tria consideranda veniunt: nempe iracundia, terror, & potus vini cerasci. Nam dum causam proximam denominavimus & perturbationem & effervescenciam summam succorum acriorum corruptorum, hinc alcalina acredo debet originem iræ, non quasi hæc bilem mo-

veret, sed quod sanguinis dissolutioni & auctæ turgescenciæ ansam præbeat, ratione cujus bilis copiosius sæcernatur, & turgescat intensius.

Terror vero uti suppressit spirituum & sanguinis motum, ita emergit hinc acidum, quod confirmare videtur lac nutricis in terrore coagulatum. Adeoque ex his causis remotis in hoc ægro summa corruptio & acrimonia istorum succorum in primis viis & universo corpore derivanda est.

Cæterum causa movens, succosque hos acriores in motum concitans, fuit in hoc subiecto vinum cerascum fermentescibile, quod de utroque sale participans, utrumque agens movere & commovere aptum fuit, unde agendo in succos hos, altero die effervescenciam in primis viis, & symptomata in universo corpore, sicque succorum dictorum scintillas in apertam flammam commutavit. Scilicet est fiendi choleræ modus vel simpliciter ob irritationem molestatam intestini duodeni & pylori, vel ob fermentationem & turgescenciam universæ massæ sanguinæ, & effusionem recrementorum in primas vias. Prioris modi exemplum est, quando cholera ab assumpto medicamento antimoniali fortiori, supra & intrâ excretionem excitante, contingit, quod ultra primas vias se non extendens, pylorum saltem & intestinum duodenum pungendo & rodendo, horum spasmos & convulsiones inducit: quale phænomenon etiam ex usu Mercurii sublimati & arsenici expectandum est: Posterioris vero choleræ exemplum peti potest ex Chirurgia Infusoria, ubi remedio violentiori purgante massâ sanguinæ infusò similiter in choleram incurrimus, ex nimis commoto & liquefacto sanguine ab alcali acri remedii purgantis. Unde in hoc nostro casu posterior fiendi modus locum habet, ubi ex commota massa sanguinea bilis acrior facta, & ex eadem in motu naturali suppressa, pancreaticus succus acrior redditus fuit, qui succi dum irritant suas partes sensibiles, cholera exoritur. Non negamus interim, in cruditate nidorosa etiam quandoque varia liquamina hujus mali futuros autores in primis viis generari posse; quod confirmare etiam videtur error externus commissus; ita siquidem melones frequentius comestos Amatus Lusitanus; ova vero barbi piscis Timæus von Gildentlee/ pro cholera allegant. At in hoc ægro iracundo, postmodum perterrefacto, videtur ex succo pancreatico & felleo esse affectum hunc, quia intermediis temporibus ægrum fuisse sine cibis scimus. Vinum cerascum in se facile fermentescibile variè fementescendo scintillas priores in actum deducere potuit; hinc si

quis post iracundiam edit, percipit cruditatem nidorofam: quâ occasione memini Medicum quendam, ex vino cerasaceo ebrium pro cruenta vomituriente agnovisse. Porro ex terrore defectus primæ digestionis promanare potest; ex tristitia enim vel terrore alimenta cruda ob digestionem debilitatam in primis viis postmodum hærent & acorem contrahunt, hinc nonnunquam ex duobus acidis erga se agentibus fermentatio cum copioso Gas erumpente excitatur, quod patet ex spiritus nitri in butyrum antimonii affusione. Interim in hoc nostro subjecto crusta intestinorum, ex acrium succorum concursu, contulit ad flatuum proventum, ac ubi major copia flatuum se offert, imprimis respiciendum est ad effervescentiam. Hinc in nostro corpore crusta viscosa intestinorum dissolvitur à salibus acris, quæ non parum ad flatus conducit.

De cætero anxietates ægri nostri non sunt ex flatibus, cum constet, cum ex rejectione varii generis liquaminum istorum se melius habuisse; sed sequitur potius hinc, anxietates illas ingentes fuisse ex istis liquaminibus in stomacho coacervatis. Nempe ut nil magis ventriculo amicum est, quam blandum acidum; ita nil etiam inimicus quam amarum acre seu amarum oleosum, Veteribus æruginosum vocatum. Et hæc anxietas illi fuit similis, quam vomituriæ patiuntur post repetitos conatus, quando nempe ultimo materia amara evomitur, quæ maximas facit anxietates. Bilis æruginosa hic peccat ceu causa materialis: hæc (1) est saporis nauseosissimi (2) acerrimi, & (3) consistentiæ viscidæ. Hujus ratione pertinaciter adhærendo, symptomata malorum ratione producta exacerbant, etiamsi tantillum fuerit, siue ergo in ventriculo relicta fuerint talia liquamina, siue eadem regurgitaverint in stomachum, perinde est, utut hic rejecti sint succi regurgitantes ex primis viis in stomachum, qui acrimoniâ utraque insigniti, vellendo utrumque ventriculi orificium, constrictione horum anxietates pariunt, donec tandem vigori pylori prævaleat, & vomitus sequatur.

Sudores autem frigidi circa caput apparentes sunt partim prodromi partim effectus syncopes; siue enim syncope, (in qua primario spiritus animales, secundario vitales deficiunt,) contingat, ratione intercepti motus spirituum, siue ratione lucis interceptæ, sanè semper sudores frigidiusculi, circa frontem & extrema corporis apparentes, defectum spirituum indicant, unde ros nutritivus extimarum partium ex harum poris spontè effluit, & frigus quasi moribundorum instar; est enim hic sudor succi nutritivi

spontaneus effluxus, non sudor ordinarius, quippe quem calidum aliàs observamus.

Quoad sitim notandum, cum primario offendere fauces; interim non plane videtur excludendum orificium ventriculi superius, quod fermenti ab acido in famem stimulat, ita vellicatur à sale alcalino, præsertim salso, in sitim clamorofam. Unde in febribus ardentibus nil magis sitim sedat stigmatate seu spiritu sulphuris, juxta Helmontii effatum, quatenus alcali rodens corrigitur; contra omnia amara ex intestinis regurgitantia ad stomachum ordinario clamorofam sitim inferunt, wenn die Galle in den Magen getreten.

Uterius observandum, quod verissimum esse multoties observavi æstus, vel rigores varios alternatim torquentes, dependere semper ex inæquali succorum in primis viis fermentatione. Nam quemadmodum intermittentes febres radicem in stomacho & primis viis defixam habent, ita quando reciproci motus in quibuscunque morbis, & nunc frigoris, nunc æstus, occurrunt, tunc mali fons semper in ventriculo & duodeno quærendus est, ex inæquali dictorum succorum fermentatione: in quibus ergo, quam diu prædominatur acidum, & hoc vellicans membranas primarum viarum, tamdiu viget rigor; contra quando sub isto inæquali succorum concursu prædominatur pinguedo bilis, tunc urgent phlogoses. Unde in tali casu præcipitantibus dictis, i. e. succos primarum viarum temperantibus, insistendum; ac si magis urget frigus, alcalia, v. g. sal absinthii, corallia vel os sepia, crystallus &c. sin vero phlogoses se offerunt, acida nitrosa, ut præcæteris nitrum antimoniatum, hinc arcanum duplicatum Mynsichti, & spiritus nitri dulcis, primatum ducunt. Unde hujusmodi inæquales motus, qui sæpius ægros affligunt, semper sunt in primis viis. Hinc clysmata talibus quæque in casibus suo modo suam laudem merentur, ac vomitoria, si nil obstat.

Porro languoris universalis mentio fit, successivè ægrum nostrum affligentis, qui sane aliud quid est ab eo, quod Germanicè exprimimus: *es zittern ihm alle Glieder*. Distinguendus est à subitanea virium prostratione. Siquidem universalis ægri languor successivè invalescens, dependet ex perturbata massa sanguinea, ejusque inæquali motu per partes musculosas sensiles, diciturque aliàs Lassitudo ulcerosa; contra subitaneus corporis languor in spirituum animalium inæquali & interrupto motu quærendus est: Quod autem morbus fuerit interruptus, est in causa robur ægri.

Dum autem sub præcordiorum anxietate imminerent lipothymia, rejectis succis pec-

peccantibus evanescences, hæc phænomena confirmant, lipothymias sæpius esse ex affecto orificio ventriculi sinistro, ex quo fonte & sub hystericeis paroxysmis affligentes, derivandæ sunt; & præsertim bilis illa aruginosa summas anxietates & lipothymias inferre solet, quando est in stomacho.

Jam verò quoad rejectionem succorum flavescentium, amarissimorum, acidorum & similium, quæritur, unde horum origo sit? Ubi notum est, quem colorem succi corporis nostri, in statu naturali constituti, habeant, dum nempe sanguis rubet, lac & chylus albicant, bilis ex viridi intensè flavet, lymphæ sine colore pellucida apparet, urina citrina conspicitur, & alvi excreta ex obscuro nonnihil flava sunt. Sic similiter sapor sanguinis est dulcis, lac & chylus ex dulcedine fere insipidi sunt, bilis ex dulci intensè amaricat, lymphæ vel insipida subsalsæ, vel acidula, excreta verò alvina sunt aquosè dulcia. Ergo succi hi mutant suos colores, & hinc fiunt in colore, odore & sapore simpliciter tam varia excrementa secundum leges vel solutionis, vel coagulationis, quas præcipitationes insequuntur. Scilicet est unicuique succo corporis nostri textura propria materialis, quæ quatenus variè mutatur, & lucis radius vel transmittitur, hinc ille perspicuus; quatenus verò radius luminosus reflexione moveretur, hinc nobis varii colores apparent, vid. Boyle de Coloribus. Hæc enim textura dependet ex concreti solutione & coagulatione. Sic v. g. solutioni vitrioli perspicuæ simul ac affundatur solutio vel decoctum gallarum, seu alcali quoddam, tunc hoc se cum acido vitrioli coagulat, & sic nonnihil particularum metallicarum præcipitatur, ac ob mutatam texturam particularum radii obscurantur, emergitque color niger; contra si aliud acidum spiritus vitrioli, vel novum vitriolum, vel spiritus salis addatur liquori illi nigro, apparebit iterum clarus; si demum novum quoddam alcali adjiciatur, iterum novus prodibit color. Par ratio obtinet locum in conservæ & syrupo violarum purpurearum, cui si tantillum acidi instilletur, fit intensè rubens; contra si alcali quoddam, v. g. calx viva, vel sal tartari, adjiciatur, exin color viridis, plus minus obscurus, emerget: Non secus flores cyani, omnesque cœrulei, attractu spiritus vitrioli intensam rubedinem acquirunt, ex spiritu vero salis vel nitri obscurum & ferè lutolum colorem induunt; ac succo ribium rubeo, si instilletur lixivium salis tartari vel cinerum clavellatorum, liquor mox obscure purpureus apparebit. Simili ergo ratione in corpore nostro ex miscela succorum variorum varii quoque colores & saporis secundum leges

coagulationis & solutionis, repræsentantur: Conf. Bartholinus in Epist. Medicinalibus, ubi varia experimenta habet coloris in sanguine mutati, ex instillatione succorum variorum.

Jam verò excrementa ista, præsertim ex primis viis, varios saporis, odores & colores repræsentantia, ex duplici causâ promanant; nempe vel ab assumptis, vel à contentis. Ab assumptis quidem, tam medicamentosis quam alimentosis, variae proprietates succorum derivantur; Ita enim ex esu croci vel Rhabarbari urinæ flavedine insigniter tinctæ observantur; ex esu Martialium ritè operantium excrementa sunt nigerrima; ex aloës verò usu flava eadem conspiciuntur: quod seduxit veteres, putantes, tales humores in corpore præexistere. Sic quoque usus Jalapæ aut Colocynthidos aquosæ & quasi lacteæ reddit excrementa alvina cum pauca vel nulla flavedine; opuntia verò succus urinam intensè rubram efficit. A retentis verò ipsis, iisque vel solitariis, vel permixtis aliis oriuntur varii colores. A solitariis quidem iis, quando ea sunt in statu præternaturali, & bilis, quæ naturaliter flava, quandoque nigra, interdum viridis invenitur: quo spectat in statu præternaturali urina nunc nigra, nunc subpurpurea, nunc viridescens, nunc flammea. Præsertim tamen tingi contenta solent, ob aliorum permiscelam, & hinc vel solvuntur, vel coagulantur & sic in textura mutantur, sive ipsa excreta sint naturaliter constituta, sive præternaturaliter. Sic enim excrementa alvi naturaliter, utut bilis interveniat, non sunt amara, sed aquosè dulcia, demonstrante hoc Helmontio; propter permiscelam enim chyli & succi pancreatici mutatur textura. Adeo ergo in quibuscunque excretis præternaturalibus non solum non solus odor, nec color, sudorque, sed & omnia reliqua attributa, simul probè consideranda sunt, quo tandem hac ratione possimus colligere, unde ea excreta ortum traxerint.

Quod ergo in specie attinet albedinem excrementorum: illa sanè in consistentia liquidis ut plurimum oritur à commistione non adeo exacta subjecti oleosi cum aqueo, quando nempe oleolum subjectum ex aquoso præcipitari incipit: ex hac siquidem causa spiritus vini summe rectificatus cum aqua permixtus, colorem lacteum repræsentat; quod resinæ purgantium etiam faciunt. Eadem est ratio puris, & lactis in mammis candidi: pus est album, quatenus sulphur sanguinis ab acido in vulneribus præcipitatur: lac est album, quatenus est chylus depuratus, quia mediante certo acido in mammis ex sero præcipitatur: quod illustratur porro ex eo, quod si sero venæ sectione emissio spiritus nitri instilletur,

letur, hoc præcipitetur in offam. Simile etiam facit spiritus vitrioli instillatus, nisi quod tunc color obscurus magis emergat, ob particulas metallicas adjunctas. Ipse chylus est candidus, quia oritur ex subjectis oleosis fermentando ab acido exclusis, nec exactè cum aqua mistis. Pari ratione semina oleosa cum aqua trita liquorem lacteum exhibent, oleo scilicet non ritè coeunte cum aqua. Jam ergo ubi alba è corpore nostro prodeunt excreta, semper suspicio sit olei dissoluti, ab acido præcipitati, cum illud beneficio salis volatilis alcalini dissolutum in corpore existat.

Rubedinem excretorum quod attinet, quæ aliàs sanguini & urinæ propria est, dependet illa à sale volatili, dissolvente sulphur seu oleum volatile. Nam si consideramus salia volatilia, & spiritus volatiles animalium, sane illa instar nivis candida primo apparent, quod si tamen aliquamdiu asserventur, successivè flavescent, & tandem intense rubescunt. Ratio est, quia iisdem semper aliquid olei adhæret, unde, dum hoc oleum à salibus volatilibus dissolvitur, color fit ruber: Sic spiritus vini digestus cum alcalibus rubedinem contrahit; si sal ammoniacum, calx viva & sulphur destillentur unà, spiritus prodit rutilans à sulphure ab alcali soluto, huic spiritui aureo si affundatur aqua, totus liquor lactescit, & sulphur ad fundum secedit. Sanguinis ergò rubedo exoritur à sale volatili, dissolvente intimè ejus oleum, seu sulphur; non secus urinæ ruberæ conspiciuntur sine sanguine, quæ quo magis ad flammeum colorem declinat, eò magis turgēt alcali volatili intimè cum copioso oleo conjuncto seu permixto; unde in febribus ardentibus propter sal volatile oleosum urinæ flammeæ conspiciuntur, quasi salia volatilia diutius fuissent cum sulphure vel oleis digesta: hinc dum cum urina aliquid acidi admisceatur, non rite cum reliquis salibus uniti, turbidæ fiunt; unde rectè Hornius in arca Mosis dicit: urinam turbidam indicare acidum præcipitans, ac urina clara, si in febribus acutis conturbatur, bonum exhibet signum, restituri scilicet fermenti stomachici.

Quoad flavedinem porro excrementorum: ea naturaliter est à bile, & dependet ab ejusdem oleo cum alcali moderatè digesto, oleum autem prædominatur. Jam ergo bili oleum inesse probatur, si blandè inspiscitur; sic enim instar lardi aut olei concipit ignem, adeoque præternaturales flavedines excrementorum primario ex liquaminibus in stomacho, ob cruditatem nidorosam enatis; secundario vero in intestinis ortis, dependebunt. Scilicet multa apud Veteres leguntur de bile porracea, æruginosa, &c.

quarum existentia non est neganda; saltem in modo explicandi feliciores illis sumus. Ac quidem præ omnibus aliis rebus lacticina, dulcia, saccharata, mellita, &c. nisi debita digestionem resolvuntur, ad flavedinem corruptivam ruunt, corrumpuntur & putrescunt, quatenus in iisdem defectu acidi digestivi incipiunt putrescere, sub qua putredine emergit alcali, agens in eorum oleum, unde sapor nidorosus & color flavus oritur. Hinc & lautiores epulas insequuntur altero manè vomitus amarorum liquaminum, flavescentium, & horride saporum, non secus ac quoque ipsi infantes sub corruptela lactis copiosissima liquamina flavescentia & nidorosa rejiciunt. Quo spectat etiam, quod purgantia nonnulla assumpta sequatur liquaminum flavorum rejectio, non quod à bile eadem tincta sint, sed quod purgantia illa vi suâ, ac virulentia colliquefactivâ massam sanguineam & succum nutritivum ita corrumpant, ut hi in putredinem, & consequenter in flavedinem declinent, alcali illorum acre eosdem dissolvente, unde etiam odor foetidus.

Viriditas autem excretorum ut plurimum est ab acido, agente in bilem, eamque vel naturalem vel præternaturalem, & sub cruditate nidorosa genitam. Quod probatur: dum enim acidum bili affunditur, viridem colorem hoc contrahit, itemque quod viridia talia vomitu rejecta, præter saporem amarum, aciditatem suâ conjunctâ, dentibus stuporem inferant. Nec aliâ ratione crystalus montana bilis æruginosæ proprium est quasi alexipharmacum, nisi quod ea acidum peccans, & bilem in acorem vitians, corrigat. Cæterum, an hoc universale sit? affirmare nolumus. Equidem, quoties in ægris, speciatim adultis, liquamina ejusmodi observantur, fere semper ab acido dependere hæc, præsumitur; attamen cum etiam spiritus salis ammoniaci bili admixtus hanc in virotem aliqualem tingat, ideo hoc paradoxon in medio relinquamus.

Porro cœruleus excretorum color rarus est, nisi quod Meara lactis cœrulei ex mammis prolekti mentionem faciat, viridique est cognatus: nam ex cœrulei & flavi miscela viridis color emanat. Adeoque cœruleus color dependet ab acido intensiori, magis condensante liquamina biliosa, sive naturalia ea, sive præternaturalia fuerint. Unde autem lac cœruleum evaserit, Autor citatus non determinat; ex eo tamen hoc elicimus, quod, quo magis coagulantur & condensantur succi corporis nostri, adeoque radii luminosi incidentes in poris magis obliterantur & obfuscantur, eo obscuriores colores apparent; e contrâ quo magis iisdem resolvuntur

& atte-

Attenuantur, eò dilutiorem & minus obscureum acquirunt colorem. Quod confirmat sanguis & ejusdem mutatio: e.g. qui, quatenus ex acidis quibuscunque instillatis in grumum feculentum coagulatur, eatenus obscureum colorem repræsentat; contra verò, quatenus alcalia, tam fixa quàm volatilia, eundem diluunt, eatenus clariorem & rubicundum magis colorem præ se fert. Ubi curiosum est, quod sanguis à puro spiritu vini exceptus promptè coaguletur; non secus ac sanguinem quoque suillum recens collectum miscui cum spiritu salis ammoniaci, ceu pro sapia alcalinæ concreto, & conservavi illum fluidum; mox tamen, cum eidem fœtoris gratiâ spiritum vini affunderem, coagulabatur; Spiritus vini enim purus promptè coagulat sanguinem in momento. Omnia ergò, quæ possunt condensare succos, ipsis obscureum colorem contrahunt & contra. Cum ergo nostra œconomia turgeat sale volatili, coagulationes humorum fere semper oriuntur ab acido, resolutiones ab alcali.

Quoad nigredinem excretorum, sive per os, sive per alvum prodeant, uti semper in fausti ominis habentur; ita triplex eorum differentia datur: quorum

1. est sanguis ab acido coagulatus:
2. Succus p. n. ac feculentia in primis viis coacervata & inquinata, atque in obscureum colorem data, succi Melancholici nomine venientes.

3. Omnium pessimum illud excreti genus, quod aliàs vocant bilem atram, quæ sanè nil aliud est, quàm summa bilis naturalis corruptela, ab acido summè rodente facta, unde Humor niger summe causticus.

Quoad 1. sanguinem puta, patet certè ex observatis Practicorum, prodiisse tale quid per os, simulque per alvum instar amurcæ nigrae, sanguini in intestinis corrupto, & ab acido coagulato, in acceptis ferendum.

Quoad (2.) notum est, quod idcirco Hypochondriaci ac Melancholici hypochondriacalaborantes, ut plurimum alvi sint obstinatoris, reddant excreta obscura & nigra, ex acido austero coagulata, *als wenn alles verbrandt wäre* / quod falso ita vocant.

Quoad (3.) tandem quando nempe tenuis humor, ad instar picis splendidus, *αῖμα* & *κῆτω* cum intenso dolore eliminatur, quæ est pessima. Sane de hac verus est Hippocratis aphorismus: Dysentericos talia reddentes, ad plures abire. Conf. Henricus ab Heer *Obs.* 27. item Hæchstetterus *Dec.* 2. *obs.* 4. & 5. qui diversos talia vomitantes allegat, fuisse saporis austeri; sic notandus est ille Horstii locus *lib.* 9. *Obs.* 4.

Quoad excretorum fœtorem: Sanè hic semper originem ducit à putredine excretis

inducta. Nempe nil fœtet in corpore nostro, nisi à putredine inducta, unde & alvi excrementa cum à corrumpente putredine contrahunt. Fœtor autem oritur, quando sub solutione concreti alcali liberatum agit in sulphur, hocque dissolvendo mutat texturam, ut repræsentetur fœtor, imprimis quando accedit occultum acidum: Sic enim exempli gratiâ, quando in crucibulo simul funduntur sal tartari & flores sulphuris, mistura immensi fœtoris emergit: Par ratio in salibus volatilibus animalium, quorum alcali, quando agit in pingue subjectum, fœtor tunc prominet: Non secus palam est, qualem fœtorem antimonialia, alcalibus tractata, spirent. Adeò scilicet omnia, quæ putrescunt, fœtent, quatenus scilicet sub dissolutione alcali agit in pingue, ita, ut acidum occultum separet sulphur istud. Atque hæc causa est, cur tam solliciti simus medentes, de agrorum excrementis fœtentibus; Ut ut enim ea nullatenus moschum & ambram redoleant, interdum tamen plus, interdum minus fœtent; quemadmodum fluxus alvi morborum & febrium malignarum acutarum cadaverosi & horreædi fœtoris observamus, & tunc pessima res est, non secus ac quoque vegetabilium Purgantia fortia excrementa intolerabili fœtore inficiunt, propter alcali acre, agens in sulphur scybalorum, & pinguedinem succi excernendi; quod phenomenon aniam dubitandi præbet, annon in febribus malignis tale alcali acre instar purgantium peccet?

Quoad Prognosin; ut ut malum non sit cholera vera, tamen symptomata graviora urgent.

C U R A.

In qua hæc Indicationes observentur, ut scilicet

- (1.) Ratione causæ morbificæ acrimonia salina quacunque succorum in primis viis effervescentium corrigatur & temperetur: quod faciunt præcipitantia.

- (2.) Motus humorum, præsertim localis, sistatur, quod opiata faciunt.

- (3.) Sudoriferis massa sanguinea ventiletur, & purificetur per temperata fixa, quibus pro necessitate alexipharmaca associanda.

- (4.) Stomachus acidis blandè adstringentibus corroboretur.

Caterùm quod semper observetur, ratio simul habenda est naturæ motus, an nempe sit excretio vomitoria spontanea? an verò symptomatica? adeoque si esset ab usu nimio vini cerasci adeoque spontanea, non statim sistenda, ne febris ardens concitetur; quin potius in tali casu rectè clysmata in usum vocantur, ut nempe per consensum, vellicatis intestinis, regurgitatio succorum

[U]

vitio-

vitiosorum effervescentium in stomachum inhibeatur. Quod si vero vomitus fuerit symptomaticus, ut hic est, propter nimium orgasmum succorum, equo, ut ita dicam, non subdenda sunt calcaria, sed ille motus humorum & irritatio systematis nervosi in primis viis est sistenda; ubi etiam clysmata cautius usurpentur. Aliàs temperata & mitia clysmata conveniunt, ne magis irritentur intestina. Malignitas non adest. Quæritur autem, in quonam consistat morborum malignitas? *℞.* Malignitas in genere nil aliud est, quàm nimia & excessiva acrimonia causæ peccantis, sive ea jam alcalina fuerit, sive acida. Notandum est e. g., quod Mercurius sublimatus sit venenum summum, & tamen Mercurius dulcis, qui ex illo additione Mercurii vivi paratur, sit sine noxa, ut dosi \mathfrak{zj} . pro scopo salivationis adhibeatur. Ratio est nimia in sublimato acrimonia, quæ si temperetur à Mercurio vivo sit purgans suavissimum: sic quoque purgantia vegetabilium, ut scammonium, colocynthis, helleborus albus, &c. sunt venena, succos corporis nostri nimia sua acrimonia alcalina colliquefacientia; interim, si hæc corrigantur, vel per acida, vel, quod melius per salia alcalia fixa, cessat acrimonia, cessat venenum & evadunt saltem alterantia: Sic se habet cum omnibus reliquis venenis, quorum venenositas in excessiva quadam acrimonia, perturbante succos, & irritante nervos, consistit. Atque hæc acrimonia venenorum, mutans texturam concretorum, & irritans systema nervosum, subinde in particulis, tam minutissimis sensus omnes effugientibus, nec nisi à stomacho perceptibilibus, latet; ita enim v. g. arsenicum est dulce quoad saporem, adeò, ut etiam à pueris pro saccharo devoretur ex errore; stomacho vero sua acrimonia violenta est inimicissimum: Vitrum antimonii insensibile est, cum etiam pro ophthalmico usurpetur; stomacho verò, etiam in forma infusi, ingestum, maximas turbas efficit. Achinc est, quod lac, oleum amygdalarum dulcium, item crystallus, & oleum tartari, simpliciter temperando acrimoniam excessivam venenis resistent. Adeò scilicet, quando morbus malignus est chronicus, peccat acidum nimis excessivum, ut in lue Venerea; quando vero idem est acutus, acre alcalinum peccat, ubi inquietudines, scabrities faucium, fluxus alvi & similia symptomata tunc affligere solent, quæ aliàs à purgantibus acrioribus excessivis inducuntur, unde blandè acida conducunt. Venena ergo omnia operantur vi texturæ materialis, sive ex regno vegetabili sive minerali desumantur, operantur vel vi narcotica, vel excessiva acrimonia: Quoad illam, an non & hanc acrimonia salina intendat? res probabilis est,

quia hac sublata narcosis cessat. De venenis animatorum res intricata est, an in contagio materiali consistat? an in imagine cujusdam affectus, v. g. iræ, secundum Helmontium?

Cæterum mater filio ægro Tincturam Bezoardicam propinans, non adeo inepta est; cum enim illa non simpliciter ex volatilibus, sed ex spiritibus vulgaribus etiam constet, adeoque falsa temperata sit mixtura, hinc hac ratione utrumque acre, acidum & alcalinum, temperare poterit, non secus ac spiritus vitrioli aliàs acre alcalinum mitigat; tamen melius fuisset, si laudanum opiatum addidisset. Unde laudandus est Ludovici ubique mixturæ suæ simplici vel laudanum opiatum, vel essentiam opii adjungens.

Cautela insuper hæc notetur, quod vomituri entes tales unâ vice non multum, sed cochleatim, medicamenta sumant, ne stomachus obruatur; v. g.

℞. ☞ tormentill.

Menthæ.

theriacal. camph. ana \mathfrak{zj} .

Cinnam. \mathfrak{zvj} .

El. diascord. Frac. $\mathfrak{z}iij$.

lapill. \mathfrak{ss} . præp.

Boli Armen. præp. vel ☞ sigill. præp. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Syr. de Canell. $\mathfrak{z}iij$.

M. f. Potio: S.

Anhaltend Stårck-Tråncklein.

Detur cochleatim in paroxysmo, & ante illum.

Vel. ☞ Menthæ $\mathfrak{z}iij$.

fænic.

portul. ana \mathfrak{zj} .

Cinnam. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

El. diascord. Frac. $\mathfrak{z}iv$. ad $\mathfrak{z}iij$.

Lapill. \mathfrak{ss} . præp.

Ebor. s. Δ ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Crystall. præp. \mathfrak{zj} .

M. f. Potio:

Loco electuarii diascordii etiam essentia opii $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$, & hinc syrupi coralliorum vel portulacæ $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. ad \mathfrak{zvj} . possunt addi.

Opium enim ritè correctum sistit quoscunque vomitus & alias excretiones, quatenus sistit spirituum animalium impetum, adeoque etiam motus partium cessat. Præparata autem opiata in sicca & humida forma propinantur. In forma sicca optimum est Extractum opii, quod habet Langelott in *Epistola ad Curiosos Naturæ* extrahendo opium cum spiritu vini, & extractum inspissando, pro dosi gr. ij. vel iij. aut si ulterius adhuc inspissetur aliis formulis addi, & in forma pulveris usurpari potest. In humida verò forma optima est illa præparatio, quæ fit cum sale tartari fixo, vel alio alcali; ita enim parata essentia cum quocunque alio liquore miscibilis sine præcipitatione existit, nisi quod tantil-

tantillum turbetur. Præparatio est facilis. Solvitur scilicet opium in lixivio salis tartari, solutio digeritur, ita corrigitur opium, hinc inspissatur in consistentiam ferè siccam, & effuso spiritu vini, qui relinquit sal tartari, emergit essentia opii, quæ aliquali spiritus vini evaporatione ita concentrari potest, ut gutta 6. 8. & 10. pro dosi sufficere possint, pro ratione scilicet consistentiæ, in quocunque liquore propinanda.

Cæterum opiata omnium optimè vespertino tempore dantur, cum, si interdum exhibeantur, & somnus interrumpatur, mirè debilitentur ægri. Et quidem propinentur cum aliis appropriatis, vel morbo aut parti affectæ specificis, mista, nunquam sola.

Conveniunt ad hunc morbum Smaragdi præparati, de quibus notandum: hos à Practicis communiter ad terrores nocturnos, epilepsiam, dysenteriam, &c. commendari; an verò merito illorum hoc fiat, dubitamus. Quicquid enim præstant, hoc faciunt beneficio tincturæ suæ Martialis, vel etiam Veneræ, à qua virorem suum habent. Jam verò tantillum sulphuris quid, quæso, efficere potest: reliquum cum sit vitrum, quod de novo excernitur? Dicis: At multi Practici iisdem felici cum successu usi sunt! Respondeo: Attendendum est, in Praxi omnium frequentissimè committi fallaciam secundum non causam ut causam; unde non dubito, subinde effectum adscribi remediis aliis debere, quam quidem Smaragdis. Vitrum eorum si quidem nil præstare potest, cum hoc calcinatum, nec aqua forti solvi queat; tinctura verò Smaragdi vulgaris cum sit supposititia, proin nec illa tanti æstimanda.

℞. ∇ *Fœnic.* ℥ij. } vel ∇ *Menth.* ℥iij.
Plantag. ℥j. }

Cinnam. ℥iij. vel ℥℥. ad ℥vj.

Extr. theriac. gr. jx.

Ebor. f. Δe.

Mag. Corall. c. f. c. ana ℥℥.

Syr. de Canell. ℥℥. M.

℞. ∇ *fœnic.*

portulac. ana ℥j.

Cinnam. ℥℥.

~ *theriac. campb.* ℥ij.

Syr. papav. alb. ℥℥. ad ℥vj.

~ *Qidulc.* q. l. pro grato sapore vel ℥j.

M. D. S. *Träncklein auf etliche mal.*

℞. ∇ *portul.*

fl. papav. errat. ana ℥℥.

~ *theriac. campb.* ℥iij.

Qidulc. ℥j.

Syr. Pap. alb. vel rhæad. ℥vj. ad ℥j. M.

Crystallus præparata rectè hic usurpatur; est enim ex gemmis molissima, imò à Langio & Sennertò bilis æruginosæ alexipharmacum vocatur, quod confirmat etiam Hein-

Tom. II. Pars 2.

ricus ab Heer *in Observation.* ubi observavit choleram beneficio crystalli præparatæ curatam.

Laudanum opiatum optimo consilio sudoriferis additur, quia Walæo quoque illud basis theriacæ audit, utpote ipsum sudoriferum. Unde remediis, ubi opium additur, danda opera, ut sudor simul promoveatur, adjectis sudoriferis.

Externe Spiritus vini camphoratus solus, fortis forma calide applicatus, stomacho cum linteis multiplicatis, egregius est in affectibus cholericis, in specie in cholera maligna, cum aliàs camphora in malignis remediorum sit apex.

Quando ægri sunt anxii, emplastrum ex tacamahaca est egregium, vel theriaca externe applicata.

Collutiones sitim fallentes conveniunt, si fauces sunt squalidæ; si verò oriatur sitis illa ex humoribus stomachi acribus, ut hic, tunc collutiones dictæ non sufficerent, sed potius aqueis & temperatis acidis locus erit.

De fastidio autem cerevisiæ, quod æger noster patitur, queritur, quomodo eidem sit succurrendum? Nam utut sitis clamosa in nostro agro affligeret, propter bilem æruginosam in stomacho; non poterat tamen cerevisiam haurire, unde interrogabat, an sibi liceret aquam vel coventum bibere? sanè frequens hoc in acutis febribus est, ut ægri mox horreant cerevisiam, & postulent contra potum aquosum, dilutum, plus minus acidulum & confortantem; *etwas Dersshafftiges* vocant.

Jam ergò observandum, quod quamdiu nos esurimus, & acidum dominatur, tamdiu nulla affligat sitis; simul autem ac fauces incipiunt arefcere, aut alimenta acrimoniâ salinâ plus minus amarâ prædita vellicant stomachi orificium sinistrum, oritur sitis, tuncque sapit cerevisia: interim licet in febribus acutis intensè sitiamus, non tamen cerevisiam desideramus. Ideoque in talibus ægris ordinariò cruditas nidorosa adest, & assumpta abierunt in amara liquamina, quæ sitim quidem inferunt, cum nausea cerevisiæ; nam cum ista amara stomacho tunc hostilia sint, & eidem horrorem amarum incutiant, ac cerevisia lupulata quævis amara sit, hinc stomachus aliis amaris læsus, & hanc horret. Nempe à quo remedio stomachus semel est læsus, ab eo postmodum abhorret. Imò observavi etiam, quod ægri qui adhuc cerevisiam haurire potuerunt, crebrius opium assumentes propter symptomata urgentia, ex hujus usu in cerevisiæ fastidium inciderint, eò quod nauseosa amarities supra colocynthidem, quæ saltem acris, sit in opio; Opium enim est subiectum resinofum, unde

[U] 2

resi-

resinositate sua hinc inde stomacho adhæret, & sic eum offendit, unde ægri amara abhorrent. Non aliâ ratione in diarrhœis biliolis, aut hypercatharsi à purgante acriori facta & excitata, utut sitiant ægri, fastiditur cerevisia, & vinum vel aqua aliaque amaritici resistantia partim corrigendo, partim diluendo, postulantur. Unde quoties ægri cum appetitu adhuc cerevisiam assument, toties bonum signum est, quod adhuc adsit fermentum; sin verò eam una cum aliis medicamentis horrent, appetitus est dejectus, unde quælibet assumpta abeunt in cruditarem nidorofam, optimo consilio iis largiter ordinatur cerevisia secundaria cum vino mista, aut succo citri acidulata; Vel recipiatur ▽ fontana, cum tertia parte vini temperanda, infundendo simul pomum citrium, in taleolas incisum. Loco quorum etiam Julepi aciduli, ex syrupis blandè acidulis, præsertim in blando madore, præscribi poterunt, cum reliqui saccharati, melliti, &c. in stomacho nidorem contrahant, &, dum non digeruntur, in amaritiem facebant. Verbi gratia in præsentis ægro præscripti.

℞. *Fl. papav. rhœad.* M. j.

Infund. in

▽ *simpl. c.* ~ *℥is. per camp.* q. f.
acidulata ℥i℥.

Stent in digestionem ad extractionem ℞:

Colaturæ addatur

Syr. de Jujub.

Corall.

cort. aur. ana ʒ℥. ad ʒvj.

~ *℥i dulc.* parum.

M. f. Julepus.

Et sic cruditas nidorosa fuit deleta, illatò blandò madore.

Porrò adstantes postulabant venæ sectionem, recusabam hanc, tanquam nocivam, quia fomes mali hærebat in primis viis, & æger potius in maiorem debilitatem fuisset coniectus, si illam suasisset. Verùm altero die superveniebat hæmorrhagia narium ingens, qua multum sanguinis effluebat, forsàn quintus erat dies ab invasione morbi, hinc omnes instantius urgebant venæ sectionem.

Hic quærebatur, quid agendum? nam ex conturbatione massæ sanguineæ morbum contraxerat: propterea attendens naturæ motum, cum, symptomatibus maximam partem evanescentibus, spontè supervenisset hæmorrhagia illa, hinc eam aliquamdiu. donec ℥i℥. fortè sanguinis evacuata esset, durare permittebam, & post spontè cessabat; cum autem à meridie recrudesceret cum majore impetu, tunc tempus erat sistendi, unde cum hoc Julepo blanda acida opiatæ temperata propinavi, & sic convaluit.

CASUS XL

DYSENTERIA BENIGNA.

*M*ulier juvencula, *ισσακνα*, & succi plena, sed hysterice affectibus levi ex causa admodum obnoxia, simulque aliquanti mensium difficultate non raro affecta, capit à Medico præscriptas pilulas sequentes:

℞. *MP. de hierac.* agar. gr. xv.

℥li disrite præp. ℥℥.

Scamm. ℥at. gr. ij.

Extr. troch. alband. gr. j.

Cum f. q. Ol. Terebinth. f. l. a. Pilulæ.

Dabantur pro dosi, & S.

Purgier-Pillen.

Capit eas cum regimine debito horis matutinis. A meridie succedit evacuatio sex vel septem vicibus copiosæ materie sordidæ, viscidæ & variæ, cum euphoria insigni; sed nocte sequenti è somno evigilans, gravissima & atrocissima persentit in abdomine tormina; succedunt creberrimæ alvi dejectiones, superveniunt vomitus, &c. Ipsa doloribus vexata, & creberrimis excretionibus debilitata, manè vocat Medicum, qui reperit eam summe debilem, cum pulsu celeri, frequenti. Introspectiens excreta, invenit ea tenuia, rubicunda, instar loturæ carniū, sed intensius tincta: agra in lecto se circumvolvitur, corpus mirè præ dolore incurvat, & miserè ejulat.

RESOLUTIO.

Affectus est dysenteria benigna, & quidem *die rothe Ruhr*. *Ruhr* est generale vocabulum, distinguiturque in rubram & albam, in *die rothe und weisse Ruhr*: Rubra est diarrhœa cruenta torminosa: alba verò, *die weisse Ruhr*/ quando nempe cum torminibus adjunctis albicantia plus minus viscida dejiciuntur. In cruenta sanguis extravasatus rejicitur; in alba verò rejicitur mucosus intestinorum cum nutrimento eorum proximo, per poros ex latione transsudante. Etenim in hac alba tam copiosa mucosa non raro profluunt, ut decies ea mucorem in intestinis aliàs contentum superent. Porrò dysenteria est vel benigna, vel maligna: quarum posterior contagiosa esse solet, & ex causa aliqua communi, in specie vitio vel potulentorum vel esculentorum, aëre &c. originem ducit.

Pars affecta non sunt crassa intestina, sed tenuia. Cellulas non sola crassa obtinent intestina, sed in jejuno quoque similes detexit Kerkringius in spicilegio, utut non adeò ingentes.

Cete-

Ceterum tenuia intestina hic affecta esse, probo.

1. Ex modo dejectionum; quæ non statim post tormina fiunt; cum contrà, si crassa laborent, ferè cum torminibus fiat ipsa excretio.

2. Ex modo afflictionis, torminibus nempe atrocissimis, tenuia intestina, ceu magis sensilia, vexantibus.

3. Ex vomitu; cum enim ægra nostra vomere dicatur una cum dejectionibus cruentis, hinc certissimum colligitur signum, superiora intestina, jejunum nempe, forsan & duodenum, esse affecta; cum crassis affectis non observatus sit vomitus conjunctus à Practicis.

4. Ex dejectionibus tenuibus.

Causa proxima dysenteriae simpliciter est spiritus impetum faciens, ex objecto molesto in parte sensili irritatus, & in motum spasmodicum concitatus. Interim cum hæc causa sit nimis generalis, uti & ipsa irritatio, proinde allego hic pro causa proxima acidum acre rodens, & superficietenus intestina exorians, particulisque suis acutis eadem irritans. Et quidem acidum acre rodens peccare, patet ex eo, quod ægra nostra aliàs levi ex causa sit obnoxia passionibus hystericis, in quibus notoriè acidum plus minus austerum abundat, unde per purgationem hæc Camarina commota intestina rosit & exoriavit. De cætero, percipitur dolor contorquens & lancinans, qui nil est aliud, quàm spasmus & contorsiones intestinorum; quando intestina sic irritata se convellunt; dicunt: *es windet sich im Leibe*. Scilicet notus est motus peristalticus intestinorum naturalis, quo instar lumbrici cujusdam desuper circulariter constringuntur. Ille ergo motus si intenditur, & evadit convulsivus, dolor lancinans & lacerans vel pressius adhuc loquendo, vagè contorquens, sentitur, imprimis vagus est dolor, qui est simpliciter à spasmò, quo convelluntur intestina, dum nempe naturalis ille intestinorum motus degenerat in spasmum præternaturalem.

Duplex autem symptoma aliàs communiter præ aliis dysenteriam periculosam facit: quorum primum est vomitus, secundum est febris conjuncta adeoque maligna. Dysenteria maligna, quæ vomitum seu febrim conjunctam habet, periculum maximum post se trahit: Ratio est, quod sæpius in dysentericis, cum vomitu mortuis, inventum sit vestigium escharæ & gangrænæ in stomacho. Febris in nostra ægra abest, hinc vomitus non est adeo malus, quia manus erant moderate calidæ. Et utut pulsus sit concitator, celerior & naturali frequentior, qui in aliis plerumque febrem præfigit; in præsentī tamen ægra non

est febrilis, sed non naturalis, quia saltem ex causa manifesta, nempe dolore erat; non secus ac ex cursu aut ebrietate pulsus obtinemus naturali majorem & frequentiore, non tamen febrilem dicendum & præternaturalem, sed non naturalem; ubi observandum, quod quoties urget dolor, toties intendatur in nostro corpore calor, (nisi in tantum urgeat dolor, ut lipothymia superveniat, quo in casu frigus potius corpus nostrum occupat) imo ob dolorem magis urgentem contingit interdum, ut pulsus unâ alterâve vice intermittat. Hoc monitum inculcat Bartholinus in Histor. Anatomicis, qui dicit: Medicum non terri debere, si interdum ex nimis doloribus pulsus intermittat: Sic enim Pleuriticam se curasse, in qua quartâ vel demum quinta vice pulsus semper intermittebat: qualem etiam Wedelius in M. A. N. C. introducit citra periculum tamen.

Sanguis vero qui profluit in hoc casu est tenuior & serosior ex diabrosi sive erosione læsis, & ab acido acri arrosio vasculis capillaribus, ad intestina delatis. Est ergo sanguis profluens saltem productum morbosum adeoque non statim, quando sanguis ex intestinis profluit, argumentandum est ad eorum excoriationem, cum in dysenteria maligna, v. g. ex contagio, vel per fellam communem, vel per instrumentum clymaticum infectum, nata, idem phænomenon se offerat; nec tamen colligendum hinc, erosa intestina esse; quin potius eadem tunc à miasmate fermenti acri vellicata & non nihil arrota ratione spiritus impetum facientis plus sanguinis recipere, qui tamen ob spasmos continuos & motus convulsivos tandem continuata irritatione sanguinem extra vasa profundit. Scilicet idem hic contingere observamus, quale ex pulvere acri sternutatorio in naribus; ubi tandem etiam sanguinem profluere cernimus, sine speciali vasorum corrosione: simili ratione intestina à contagio vellicata, tandem sanguinem suum procluendo objecto irritante, sine excoriatione plorant.

Causa remota in hac ægra fuit Purgans, quatenus nempe hoc movit acidum istud in eadem hystericæ obivum, & ita acres acidos succos ex pancreatis & intestinorum miliaribus glandulis profluere fecit. Nempe primo sex vel septem vicibus sine torminibus recte & cum euphoria Patiens fuit purgata, partim quod succi varii invicem committi, acrimoniam suam mutuo temperarint, partim quod in pilulis vitriolum Martis fuerit commixtum, absorbens & edulcorans acidos illos succos: unde quamdiu hæc temperatura duravit, feliciter purgata fuit; ubi vero succi temperantes fuerunt expulsi, & vitriolum Martiale saturatum, & foras exclusum, nihilomi-

hilominus tamen purgans operaretur, hincque acida lymphæ pancreatica sola existens, istam excoriationem & rosionem induxit, idque imprimis in hoc subiecto sensibili delicato, spasmodicis intestinum aliàs obnoxio. Adeo scilicet observavi sæpius, mulieres hystericas à levissimis purgantibus maxime lædi, & nisi caute tractentur, sæpissime sub operatione paroxysmum incidere hystericum, propter sensibile genus nervosum, & quia spasmodicis intestinum consuevit sunt obnoxia. Jam ergo consideranda venit resina illa purgans acris, amara, & viscida præprimis, quæ in extracto colocynthidos ingrediente pilulas deglutitas continetur, itemque quæ in massa pilularum de hiera cum agarico est, ut ut mitior in agarico. Hæ resinae viscidæ sunt & acres amaricantes. Jam ergo hæ resinae firmitus intestinum partibus adhærentes, & acrimonia sua amaricante eadem continuo stimulant, faciunt, ut glandula pancreatica & miliares stimulatæ tandem lympham suam acrem acidam, mali matrem, profundant, & successive hæc mala inducant.

Ex quibus patet, cur dysenteria, variolis superveniens, funesta adeo sit? Scilicet signum est causam materialem variolarum, vel variolas ipsas, intestina obsidentes, incepisse eadem jam erodere. Jam autem cum in talibus vel blandior alvi fluxus periculosus sit, multo magis alvi fluxus cruentus periculum post se trahet; & excretionem variolarum impedita periculum adhuc subest, ne intestina, gangræna correpta, ad inteterritum ducant.

Et tantillæ particula resinosa allegata suspicionem suggerunt, qua ratione nempe tantillum in maligna & contagiosa dysenteria tam efficax sit, ut propagetur. Scilicet similes particulae aciores, subiecto viscido irretitæ, ab alio communicatæ, in altero affectum similem oriri faciunt, utpote quæ speciatim intestinis infestæ, ad eadem delatæ morficando, rodendo, dysenteriam in alio subiecto sano oriri faciunt; istæ tamen particulae speciatim infestæ sunt intestinis, non enim ibidem aliæ partes affliguntur, nisi per metastasin aliò prolabantur, simili fere ratione ac particulae antimoniales hypercatharsin cruentam excitant. Quemadmodum enim infusum antimoniale, venis infusum, nec dum cessat intestina irritare, aliis partibus autem innoxium est: ita contagium dysentericum malignum specialiter intestinis infestum est; Sicut etiam tinctura antimonii propter particulas antimoniales venis infusa vomitus movet, corpore, ceteroquin intacto relicto. Sed quaeritur: in quonam specialis hæc configuratio particularum consistat? Resp. Res à priori est indemonstrabilis, nisi in similitudine cum particulis antimonialibus

acquiescere velimus dicendo, idem usu venire, ac ex cantharidibus assumptis vesicæ speciatim infensis, sive assumantur pro usu venereo & stimulant, sive externè pro vesicatorio nuchæ applicentur, quod & dysuriam, ischuriam, mictum cruentum & exulcerationem vesicæ introducant. Unde forsitan in dysenteria maligna similes acres particulae speciatim intestinis sunt infestæ.

P R O G N O S I S.

Dysenteria hæc benigna non adeo est atrox, & periculosa, nisi quatenus vomitus affligunt, impediunt medicamentorum operationem, & pylorum affectum esse attestantes. Coalescentia autem intestinum, quæ fortè metui posset, præpeditur medicamentorum liquidorum crebro usu, ut ut per se sit rara, & nonnisi in declinatione contingat.

C U R A.

In Cura hæc Indicationes sunt:

1. Acidum acre corrigatur.
2. Dolor sistatur; eo enim cessante, cessabit cruoris profusio.
3. Massæ sanguinæ & reliquorum humorum & succorum motum compescamus, imprimis per sudorifera.
4. Tandem læsionem intestinis indutam debitis remediis emendemus.

Opiata conveniunt, sed caute usurpentur. De his autem notandum, ea à Thonero dici necrotica, quia gangrænam intestinis introducunt, & impediendo excretiones, materiamque morificam in alia loca transfereundo, occasionem dant futuræ anginae. Unde in legitima eorum administratione totum negotium situm est: Scilicet caveamus nobis ab horum usu tam in benignæ quam malignæ dysenteriae progressu vel statu, ob metuendam materiam morificam aliorum metastasin: aliàs cum specificis temperantibus, & sudoriferis mista in principio & incremento morbi locum habebunt. V.g. in dysenteria maligna sequens pulvis conducit optimè:

R. ʒi sigill. ʒi.

C. C. usi præp. ʒss.

ʒii diaphor. ʒi.

Laud. opiat. ferm. gr. iij.

Ol. destill. Cinnam. gtt. iij.

M. f. Pulvis:

div. in 3. partes:

D. S. Anhaltende Pulver.

In hoc pulvere terra sigillata, acidum absorbendo, acquirit aluminosam texturam, & saporem, & ita simul adstringit; cornu cervi ustum verò immediate alcali peccans imbibit sine ulla ferè effervescencia; oleum destillatum Cinnamomi propter stomachum convenit, & quia resistit vomitibus.

Capia-

Capiatur autem dosi una in aqua cina-
momi cydoniata aromatica, ut hæc ipsa sto-
machi furor sopiatur. Interim quæta jaceat
ægra, & si possibile est post dosin primam aut
alteram expectet blandum sudorem.

Hicce ulterius succurramus operculis ca-
lescentis abdomini insternendis, ut ipsarum ca-
lore remittant spasmi; loco quorum etiam
faculitales tepidi applicari & pro usus exi-
gentia reiterari poterunt:

- ℞. *HB. Chamom. c. flor.* M. iij.
- fol. Quercus* M. iß. vel M. ij.
- Menthæ.* M. j. ad Miß.
- fl. Verbasci.*
- Samb. ana* M. j. vel ij.

Incisa duobus sæculis interpassatis
rotundis includantur, lacti, vel, quod me-
lius, vino incoquendis, hinc tepidissime ab-
domini, reperitum insternendis.

Quodsi verò talia hæcenus non suffece-
rint ad anti-dysenterica specifica fiat accessus:
& quidem rectè sub forma pulveris præseri-
buntur, liquida siquidem faciliè vomitu reji-
ciuntur, v. g.

- ℞. *Rasur. priapicervi* vel *ceti* ʒij.
- Hepat. viper. exsicc.* ʒß.
- Mag. Corall. c. f. c.* ʒij.
- Laud. opiat.* gr. vj.
- M. f. Pulvis pro 6. dosibus;

D. S. Unhaltende Pulver.

In dysenteria autem maligna cum febre
conjuncta Bezoardica reliquis anti-dysenteri-
cis mista egregia sunt.

- ℞. *Ufn. cran. hum.*
- Bezoard. Oar. ana* ʒß.
- M. f. Pulvis: S.

Unhaltend Schweiß. Pulver.

Sanguis draconis est egregium stypti-
cum per se, nisi sanguine hircino fuerit adul-
teratus, cujus fuci signum est, quod affuso
aceto vini in bullas effervescente incipiat, quæ
nota est subjecti alcalini, nec aliàs in sangui-
ne draconis puro, nec aliis gummatibus re-
periundi. Adulterino autem in omnibus
scopis, ubi verus commendatur, substitui
potest gummi arabicum & terra sigillata.

Si quid læsionis in intestinis restiterit, bal-
samicis ea delenda; adeoque pro hoc scopo
ordinatur balsamus Peruvianus in vitello ovi
sorbilis solutus, ad gutt. 6, 8, 10, &c. ca-
piendus, ut ita guttæ illæ dispareant; Vitel-
lum enim ovi in dissolvendis resinis, in spe-
cie purgantium, est præstantissimum. Vel
loco hujus capiatur essentia sulphuris, cujus
modum parandi Willisius in Pharmac. Ration.
Ac simili modo confici poterit Essentia bal-
sami Peruviani, quæ concinnius ita paratur:

- ℞. *Bals. Peru.*

Subigatur terendo c. Θ ʒi q. f. pro
pasta:

cui affundatur \sim vini *ʒisatus*, &
in loco calido digeratur ad ex-
tractionem essentia, acrioris
saporis ipso balsamo Peru-
viano.

Dosis sunt guttæ 12. 15. 20. ad 25. in vehi-
culo calido, sed hoc incommodi habet, quod
ructus pariat.

Ceterum notabile est, quod balsamus
etiam Peruvianus cum vitello ovi solutus lon-
ge acrior & penetrantior se gustui sistat, quàm
per se existens; tantum vitellum ovi in dissol-
vendis corporibus resinosis præstat.

Cum his dictis etiam adhiberi poterit
balsamus sulphuris, ut & tinctura antiphthisi-
ca. D. Michaelis; ex saccharo saturni, & vi-
triolo Martis constans, parum quidem de
Marte participans, propter saccharum satur-
ni tamen, egregiè in dysenteria & quibusvis
alvi fluxibus cruentis præstans, læsa simul in-
testina tinctura hæc consolidat, & egregia est
in fluxibus alvi cruentis, cui etiam tinctura
sulphuris vitrioli, & tinctura vitrioli Martis,
non inconvenienter substitui potest.

Quibus autem Decocta vulneraria pla-
cent, illi sic ordinare poterunt.

- ℞. *Rad. Sympb. maj.*
- Tormentill. ana* ʒß. ad ʒj.
- HB. Veron.*
- Alchim. ana* M. j.
- Plantag.*
- Com. hypercin. ana* Mß.
- Concisa coqu. in ∇ *simpl.* q. f.
- Colat lbj. adde
- Syr. de Sympb. Fern.*
- Corallior. ana* ʒß.
- M. S.

Bund. Trans.

Capiatur, addendo singulis haustibus guttu-
las aliquot balsami sulphuris terebinthinati,
vel tinctura antiphthistica.

Quodsi intestinum rectum simul fuerit
affectum, cum tenesmo, ordinentur tunc
clysmata temperatissima ex lacte, adjecta in-
terdum terebinthina: v. g.

- ℞. *Lact. bubul. rec.* lbß. ad ʒix.
- Terebinth. in vit. ovi dissol.* ʒiij.
- & si opus,
- Mell. rutac.* ʒvj.
- M. pro clysmate.

Hic curiosum est, quod observavi in quadam
puerpera, cum tale clyisma ordinassem, quod
ingrediebantur ʒvj. terebinthinæ, & patiens
hoc ad horas decem retinisset, & quidem
cum euphoria, tandemque altero demum
manè reddidisset, ecce! urinam tunc emisit,
violaceum odorem valdè referentem.

Pro restaurando denique stomacho vi-
num absinthites, cydoniata, elixyr menthæ,
& reli.

& reliqua aromatica, stomachi & intestinorum tonum fibrosum restituentia, erunt convenientissima.

Cnoëffellius iussit excrementa deponere super caput mortuum vitrioli.

Tribus vicibus mihi occurrit hic casus, scilicet proritatio alvi largior ex medicamentis in dosi non excedentibus:

(1.) In hac ægra.

(2.) In virgine cachectica cum mensium difficultate, & hinc tumore abdominis flatulento, nato ex muco acido viscido circa primas vias, cui præmissis Martialibus & digestivis ordinavi Porionem laxativam blandam ex gummi amoniaco in aceto soluto, cum scammonii sulphurati & extracti trochiscorum alhandal ana gr. j. & tamen hæc mistura ultra 15. imo 18. secessus procuravit, & similem huic casui casum induxit, cum maximis torminibus, superveniente tandem passione hysterica, cum copiosa sanguinis rejectione per inferiora, ultra biduum durante. In quo casu ubi omnia, etiam optima specifica aliàs incassum adhibuissim, tandem præscripsi hanc misturam:

℞. ▽ *Plantag.* ʒij.

Cinnam. cydon. ʒvj.

El. diascord. Frac. ʒj.

troch. de Carabe ʒß.

Hemat. pulveris. ʒij.

ʒii *diaphor.* gr. xij.

Syr. Plantag. ʒß.

Hæc cochleatim sumpta, omnia pacata reddidit.

In hac Mistura, præter hæmatiten, qui est terra metallica, trochisci de Carabe sunt notandi, vetus quidem & corrigenda, sed tamen egregia compositio; & ut verum fatear, hæc in fluxibus alvi, ex acrioribus succis enatis, & in maligna dysenteria, laudem meretur. Sic in vomitu cruento felicem ejus usum expertus est Forestus sub forma pulveris in haustu vini, vel in misturis, quibus parum aceti additum sit, dosi ʒß. ad ʒj. exhibenda, non secus ac eadem trochiscorum de carabe compositio nuperrimè etiam in desperata fere gonorrhœa aliquot annos durante, admiraculum profuit.

Tandem (3.) curavi etiam agnatam mulierem, 27. annos natam, texturæ aliàs delicatæ & sensilis, simulque fermento digestivo stomachico tenerrimo existente, ita quidem ut blandiora quoque remedia, tam alterantia quàm laxantia, eandem graviter afficerent. Præterea hæc scorbuto hæreditario affecta, & hystericis passionibus obnoxia, nullum stomachi chronicam experta est, ex muco acido viscido stomachi obortam. Pro qua curanda præscripsi præmissis præmitten-

dis has pilulas: (vomitorium enim non conveniebat propter passionem hystericam:)

℞. *G. xci in acet. sol.* ʒß.

Aloës luc. gr. iij.

extr. troch. alhand. gr. ʒ.

Laud. hyster. gr. v.

Cum *ess. Salvie* f. l. a. Pilulæ: D. S.

Laxierende Mutter-Pillen.

Cepit has vesperi ante cœnam, benè dormitavit, manè aliquoties cacavit, & vomuit semel, sanaque reddita fuit. Verum interjectis aliquot mensibus tussis rediit, unde easdem pilulas iterum præscripsi. Quid autem fit? postquam eas cepisset, copiosissimos vomitus, hypercatharses cruentas torminosas, ex quibus hinc vires prosternebantur, tenesimum, passionemque simul hystericam tandem incidit in gradu excessivo, & certè pessimè se habebat: in quo tamen casu inter alia adhibita remedia hunc pulverem proficuum experta est:

℞. *Corall. rub. præp.*

C. C. isti præp.

ʒii *diaphor.*

Æ sigillatæ ana gr. vj. vel vij.

Laud. hyster. gr. iv.

M. f. Pulvis: S.

Anhaltend Pulver.

Hunc aliquoties deglutivit, non sine successu. Passioni verò hystericæ satisfecit Elixyr uterinum D. Michaelis, sicut tenesmo sacculi ex floribus verbasci & chamomillæ in lacte bulliti, & tepidè applicati, ut & clystima ex lacte simplici, addito tamen paucò saccharo; quibus adhibitis restituta est felicitèr.

Vomitória de cœtero magis in benigna quàm maligna locum habere videntur (Lamonièrè tamen Tract. de Fluxu dysenterico maligno observavit subinde in primo principio vomitoria fuisse proficua; & arbitror, hoc ita esse, in casu nempe, quo contagium malignum inspirando haustum ventriculum saltem adhuc obsideat) idque, si superiora intestina laborent, si cacoehyia adsit, aut malum soveat, nec non humorum in primis intestinis & ventriculo molesta saburra, si denique natura eò vergat, ægrique eidem facilius auscultent, viribusque adhuc consent, &c. Vomitu namque diuturnas dysenterias curatas vidit Mercatus.

C A S U S XII.

DYSENTERIA MALIGNA.

Juvenis curiositate ductus visitaverat castra Belgarum, sed domum reversus conqueritur de doloribus abdominis contorquentibus & lacerantibus, ita ut lacerari quodammodo intestina videantur. Adest simul crebrior alvi dejectio, primitus

mitus quidem recrementorum naturaliter constitutorum, sed postmodum saltem pauca, eaque viscida & glutinosa, continuo licet alvus stimuletur plus minus rubicunda, acerbissimo tamen dolore comitata egeruntur. Appetitus plane est prostratus, adest sitis continua, in specie notu, caput dolet, nausea supervenit, & interdum vomitus materiae variae, sepius inanis vomendi conatus, accedit. Percipitur simul circa umbilicalem regionem cum supra dictis acerbissimis cruciatibus pulsationis quidam lenior sensus. Pulsus celer, frequens & magnitudine moderatus est.

R E S O L U T I O.

Plura sunt symptomata, & quidem truculentissime combinata, agrum nostrum praesentem vexantia, ex quorum tamen peniori consideratione dignoscere licet, illa eo collimare, ut nos, eundem morbo, non minus saevo quam molesto, ad excretionis vitia laesa, & praepriis non tam aucta quam depravata, potius spectante laborare, certiores reddant; quod vitium proprio nomine Dysenteria audit, seu, quo nullus ambiguitatis sit locus, Dyarrhoea cruenta torminosa, quam Germanico idiomate explicant: **Er hat dieweisse und rothe Ruhr**; hanc enim adesse, dejectiones viscidae plus minus rubicundae, cum acerbissimis doloribus abdominis, reliquisque truculentis symptomatibus stipatae, indicant.

S U B J E C T U M.

Quibus omnibus intestina, seu subjectum, cui illa, accidentia cum sint, inhærere necesse habent, characterisata esse meritoro statuimus, quae undique ex laesis vasibus doloribus, & inde natis spasmis, affecta & interiorius abrafa, sanguinem unâ cum reliquis excretis, tam naturalibus quam praeternaturalibus permixtum effundunt. Licet autem intestina sint corpora unâ eademque membrana communi à pyloro ad podicem usque constantia; attamen ob accidentia quaedam Anatomici illa distinxerunt in tenuia & crassa. Hoc autem in loco tenuia saltem intestina huius mali subjectum determinamus, quod manifestat doloris exacerbationis sensus circa regionem umbilicalem. Dum autem intestina tenuia vocamus subjectum, non in fontem interim ab hoc malo volumus esse stomachum, cum & intestina recte ventriculus prolongatus vocentur, sed & characterem huius vitiosum & exoticum non silentem in stomacho, ceu nido materialiter intus depositum, segregatoque pabulo in plicis & rugis stomachi exceptum esse, nausea & appetitus dejectus sufficienter convincunt, quod jam

Tom. II. Pars 2.

Hippocrates acidus ructus protractis alvi solutionibus supervenientes faustos deprædicando annuit. Proinde non in casum fore autumo, distinguere inter subjectum morbi, quod intestina tenuia esse diximus; & inter subjectum causae, cujus rationem formalem ventriculus explicat.

CAUSA PROXIMA.

Quo vero agro nostro in juvenili ætate persistenti, nec talibus adiuncto, clarior evadat natura ejus mali, consideranda sunt ejus causae, generationisque modus: Causam ergo huius torminosi affectus proximam statuimus Fermentum malignum & quasi arsenicale, per contagium haustum, ab excretis, & militibus simili affectu laborantibus, intestinis pertinaciter adhærens, ea rodens & excorians; unde horum archæus ab ejusmodi hostilitate irritatus proprium suum hospitium devastans, continuo ea ad excernendam mucis sanguinisque copiam cum insigni cruciatu stimulat.

CAUSA REMOTA.

Tale autem vitium seu hostile miasma acidum, ejusmodi martyria conferens, unde contraxerit, non miretur Patiens, cum causa prægressa occasionalis sit amplas fenestras & fores apertas concesserit, hinc ab externa causa suum ortum, adjuvante simul prædisposita aliquali corporis constitutione, ad ejusmodi producenda apta, duxisse auguramur & quidem ut à prægresso, ex curioso ad castra Belgarum visitanda animo, suscepto itinere hunc Martialem hostem tyrannide sua illum sit cruciantem, in humeros suos contraxerit; quippe putridus talis aer ad febres malignas in castris disponit, quæ ob vitia diætæ, & inde nata stomachi pathemata, alias morbus Ungaricus seu Febris Castrensis dicuntur. Hinc facile æger noster hoc in Martis musco ab aliis ægris, eodem affectu jam inquinatis, per contagium affectus fuit, quod loco trophæi atrox tanè malum secum domum reportavit. Imò non mirum, si accedat & soli fracescentis vitium: nempe visitavit castra Belgarum, quo in climate ob præsentiam fluminum, paludum, litorumvè, ejusmodi exhalationes semisalfæ plus minus acres facile exhalant, quarum atomorum impressione hanc violentam tyrannidem introduxerunt nostro agro, qui alias in juvenili & florida ætate, & ob copiam humorum, fortassis & redundantiam acidi præternaturaliter in corpore existentis; magis magisque dispositus fuit, ut ita facilius morbida & dysenterica hæc progenies introduci potuerit. Imò propius eundo probabile videtur, & stomachum ipsum antam huic malo dedisse, alimentorum infuكتورum & variorum eorundem

[X]

sub

sub itinere ingestorum, præprimis duriorum salitorum malèque preparatorum, qualia in Belgio, regione alias impuriore, propinatur, assumptione, insigniter negotium digestionis, hebetando fermentum stomachi digestivum, æger noster imminuit, hinc ob ordinatam minus diætam non obtinuit validam digestivi fermenti vim, ut ita non inconcinnè Sennertus exinde dysenteriam deducat; quod & in nostro ægro ita esse, appetitus insigniter prostratus sat dilucidè probat. Fermentum proinde stomachi exacerbatum loco chyli laudabilis acidum vitiosum crudele peperit, quod orificium stomachi superius afficiendo nauseam; postea arctius pylorum vellicando & irritando, & vomitum materiæ, pro fermenti digestivi vitii corruptione, variæ, dum acor hic præternaturalis non in cibos ingestos agat, sed errabundè in archæum stomachi, illumque inficiat, excitet, sapiusque post rejectionem talis non tamen omnimodæ materiæ vitiosæ idcirco ob viscidiorum quarundam particularum remanentiam stomachum continuò irritantium conatus vomendi inanis ægrum vexat. Acidum proinde hoc acre malignum quasi antimoniale aut arsenicale, aut rithymalinum, &c. ad intestina delatum, cum bile & succo pancreatico vitiosè effervescebat, fomitem præbuit huius cladis ægro inductæ; imò exinde massa sanguinea turbata fuit, unde postmodum ex vitiosa, ob peregrinarum particularum præsentiam ejus crasin aliquomodo deturbantium, fermentatione pulsus celer, frequens, & sub virium adhuc constanti ratione in robore hinc moderatus persistit. Ad huius autem præternaturalis acidi peccantis reatus ulterius examinandos, non incongruum erit consideratu & symptomata ex ejus præsentia proritata libare, quibus præsertim ægro crudele & molestum existit. Acre autem hoc vitiosum acidum ex dictis causis enatum, tam immediatè ventriculum & intestina afficiens, quàm mediante massa sanguinea ab extra affecta eò delatum, morbificâ suâ phalange illis pertinaciter pro sua, quam adeptum est, vitiosa natura viscida adhæret, hinc illa irritando ad crebriorem alvi defectionem, & primitus quidem naturaliter constitutorum recrementorum, postmodum verò paucorum viscidiorum & glutinosorum excitat, quatenus nempe acre istud excessivè acidum stimulando intestina fecerit, ut primitus quidem se à fœculentiis naturalibus liberent, postmodum verò acritus irritata, obque affluentiam succorum per pancreas, vasa choledocha & glandulas intestinorum miliares ex massa sanguinea vitiosa eò effusorum continuam continuò vellicata & mucorum chyloso, ceu optimo parietum eorum tutamine spoliata sunt, ut ita

membranis sensim tali tegmine denudatis, hinc erosio, & vasorum sanguifluorum orificiola capillaria aperta fuerint, exinde postmodum excrementorum talium plus minus rubicundorum ejection, ad exemplum pulveris sternutatorii fortioris narium membranas continuò vellicantis, & non solum lympham copiosiore, sed & sanguinem tandem, prolicentis. Ejectiones autem istas partim præcesserunt, partim comitati sunt, dolores abdominis tam truculentissimi, contorquentes & lacerantes vagi, in specie noctu affligentes, ita ut lacerari quodammodo intestina videantur, qui sat manifestant acris alicujus præsentiam, quod insigniter rodit intestinorum intimam substantiam, & tunicas fibrolas insigniter sensiles morficat, ut exinde ingentes dolores, & propter hos ipsos convulsivos earum spasmos & contracturas, adeoque acerbissimum contorsionis & omnimodæ quasi lacerationis sensum conjunctum, cruciatus intolerabiles, præprimis tempore nocturno, inducantur; quales dolorosi spasmi & convulsivi motus præprimis jejunum torquent intestinum reliquaque tenuia, hinc ut præcipue circa umbilici regionem cum dictis cruciatibus & pulsationis quidem, etsi levior, sensus observabilis sit, ob sanguinem nimirum in vasis capillaribus stagnantem, & in motu suo, ob nervos vasis sanguifluis subjacentes irritatos, exindeque vasa sanguiflua comprimentes, impeditum, ob quos nervos affectos & simul caput per consensum insigniter doler. Quatenus autem acre vellicans miasma seu fermentum pungens & vellicans intestina, ex intestinis superioribus, partim motu suo proprio, partim horum convulsorum contorsione spasmodicâ, ad intestinum rectum propellatur, huicque postmodum pertinaciter adhærendo, illudque vellicando, dolores tales acerbissimos non solum infert, sed & alvum continuò stimulat, unde & tenesmus & cupiditas egerendi, & si interdum inanis, ægrum ita cruciat, ut si non alia, hac saltem & solum tyrannidis specie, hoc malum veniat ægro abominandum. Prout etiam acre hoc vitiosum ad fauces usque exhalat, illarum membranam insigniter irritat & vellicat, hinc concurrente simul saliva, non ritè saliva ista acria diluentis & abstergentis, ob laticis aquosi uberiorem evacuationem evacuatæ, nec à massa sanguinea, quæ & ipsa hoc destituta, copiosius ad fauces delatæ defectu, sitis oritur intensâ, maximèque ægro molesta.

P R O G N O S I S.

Æger itaque sub huius mali tyrannide gemens & anxius, doloribus quippe acerbissimis vexatus rectè maturè petit consilium, cum malum hoc sit periculosius, eo nomine, quod

quod intestina tenuia imprimis invaserit, unde & symptomata graviora supervenire solent; accedit & contagium malum inferens pessimi ominis, & gravissimè lædens. Cum tamen in præsentī casu non adeò confirmata dysenteria, æger ipse in ætate florida, nec virium dejectio adsit, idcirco spes est aliqualis, cum facili in integrum restitutum iri, cum æger magis crudelius quam periculosius affectus sit.

C U R A.

Ut igitur ad ejus preces à talibus cruciatibus illum liberemus, Curam aggrediamur, quæ, ut melius instituat, pro ratione morbi introducti, quatuor indicationibus absolvi potest.

1. Causam proximam, acre malignum vellicans, corrigendo, & ex intestinis horum abstersione, ex massa sanguinea hujus per sudoriferam purificationem, eliminando.

2. Urgentem dolorem sistendo.

3. Vulnerariis læsionem intestinorum corrigendo.

4. Abstergentibus anodynis tenesimum sistendo.

Semper in universo dysentericæ curæ cursu stomachum simul ejusque robur respiciendo.

Pro his itaque scopis obtinendis ad hoc malum abigendum, offerunt se scilicet fontes Medicinæ tres, Chirurgicus, Pharmaceuticus & Diæticus; quorum primus cum vix scopo nostro satis faciat, proinde generosioribus ex eo petitis remediis hæc vice supersedebimus, & adornabimus nostram curam remediis ex Pharmacia desumptis, quibus pro quadruplici superiori Indicatione cum indicatis sequentibus subsidiis cura expeditur. Hinc commendamus illi in principio statim sequens:

℞. ▽ *Card. bened.*

Menthae ana ℥ij.

Cinnam. ℥ss.

ras. priapi Cervi ℥ij.

C. C. f. Δc.

℥ii *diaphor.* ana ℥j.

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. card. bened. ℥ss.

M. D. S. **Anhaltend Schweiß-Träncklein.**

De hoc capiat æger duo vel tria cochlearia, & inter cooperturas stragulorum lecti probè sudet, aliquoties reiterando; hoc enim peracto, curam facilius hoc erit malum.

Vel ℞. *Pulv. hepat. viper. vel serpent.* vel

ras. priapi cervi ℥ij.

C. C. f. Δc.

℥ii *diaphor.* ana ℥j.

M. f. Pulvis pro tribus dosibus:

D. S. **Anhaltende Stärck-Pulver.**

Pro vehiculo dictorum pulverum præscribatur.

Tom. II. Pars 2.

℞. ▽ *Menthae.*

card. bened. ana ℥ss.

cinnam. ℥vj.

Ess. Opii ℥ss.

Syr. Card. bened. ℥vj.

M. f. Potio: S.

Stärck-Träncklein zu den Pulvern.

His simul externa adhibeantur, hinc

℞. *Theriac.* ℥ss. vel ℥vj.

Ol. dest. Macis, vel *Menthae* ℥j.

M. pro Unguento.

Quò largiter abdomen & scrobiculus cordis, & quidem quam calidè, inungatur.

Peracto sudore, quoties æger potum, cum sitis urgeat maximè, petat, commendamus, ut in ordinario potu largiter dissolvatur gelatina cornu cervi, vel gelatina priapi cervi;

Vel ℞. *Decoct. Citri Myns.* ℥ij.

▽ *cinnam. cydon.* ℥ij.

Gelat. C. C. ℥j.

Syr. Corall. Querc. ℥vj.

M. pro Julepo:

D. S. **Stärckender Julep.**

De hoc, quoties potum exigit, aliquot cochlearia ægro, in hypocaulito moderatè calido degenti, offerantur.

Quodsi verò malum gravius, ita ut ex his non sentiat levamen æger, ad specifica magis accedendum.

℞. ▽ *plantag.* ℥ij.

Cinnam. ℥vj.

Acet. rosac. ℥ss.

El. diascord. Frac. ℥j.

✧ *sigillat.* ℥ss.

Sacch: hni ℥j.

Laud. Opiat. gr. ij.

Syr. myrtin. ℥ss. M. f. Potio: S.

Anhaltende Stärck-Mixtur.

Vel ℞. *Conf. rosar. vetust.* ℥ss.

Ras. priapi Cervi ℥ij.

Laud. opiat. gr. iij.

Cum l. q. *Syr. Cydon. aromat. f.* Electuarium.

D. S. **Anhaltende Stärck-Pattwerge auf 2. mal.**

Convenit etiam pro hoc scopo Tinctura antiphthifica.

Sin autem urgente dolore ani & tenesmo æger adhuc sit anxius, convenit clyster blandè abstergens anodynus, qui simul dolorem lenit, & id, quod in intestinis læsum, consolidat; hinc prodest vel clyisma ex lacte simplici cum sevo hircino, vel

℞. *HB. burse pastor.*

plantag.

fl. Chamom.

Verbasci ana Mß.

rad. symphyt. maj.

sem. Cicer. rubr. ana ℥j.

Coqu. in l. q. *lactis caprini:*

[X] 2

Colat.

sub itinere ingestorum, præprimis duriorum salitorum malèque præparatorum, qualia in Belgio, regione alias impuriore, propinantur, assumptione, insigniter negotium digestionis, hebetando fermentum stomachi digestivum, æger noster imminuit, hinc ob ordinatam minus diætã non obtinuit validam digestivi fermenti vim, ut ita non inconcinnè Sennertus exinde dysenteriam deducat; quod & in nostro agro ita esse, appetitus insigniter prostratus sat dilucidè probat. Fermentum proinde stomachi exacerbatum loco chyli laudabilis acidum vitiosum crudele peperit, quod orificium stomachi superius afficiendo nauseam; postea arctius pylorum vellicando & irritando, & vomitum materiæ, pro fermenti digestivi vitiati corruptione, variæ, dum acor hic præternaturalis non in cibos ingestos agit, sed errabundè in archæum stomachi, illumque inficiat, excitet, sæpiusque post rejectionem talis non tamen omnimodæ materiæ vitiosæ idcirco ob viscidiorum quarundam particularum remanentiam stomachum continuò irritantium conatus vomendi inanis ægrum vexat. Acidum proinde hoc acre malignum quasi antimoniale aut arsenicale, aut rithymalinum, &c. ad intestina delatum, cum bile & succo pancreatico vitiosè effervescens, fomitem præbuit hujus cladis agro inductæ; imò exinde massa sanguinea turbata fuit, unde postmodum ex vitiosa, ob peregrinarum particularum præsentiam ejus crasin aliquomodo deturbantium, fermentatione pulsus celer, frequens, & sub virium adhuc constanti ratione in robore hinc moderatus persistit. Ad hujus autem præternaturalis acidi peccantis reatus ulterius examinandos, non incongruum erit consideratu & symptomata ex ejus præsentia proritata libare, quibus præsertim agro crudele & molestum existit. Acre autem hoc vitiosum acidum ex dictis causis enatum, tam immediate ventriculum & intestina afficiens, quàm mediante massa sanguinea ab extra affecta eò delatum, morbificâ suâ phalange illis pernitenter pro sua, quam adeptum est, vitiosa natura viscida adhæret, hinc illa irritando ad crebriorem alvi dejectionem, & primitus quidem naturaliter constitutorum recrementorum, postmodum verò paucorum viscidiorum & glutinosorum excitat, quatenus nempe acre istud excessivè acidum stimulando intestina fecerit, ut primitus quidem se à foculentis naturalibus liberent, postmodum verò acrius irritata, obque affluentiam succorum per pancreas, vasa choledocha & glandulas intestinorum miliares ex massa sanguinea vitiata eò effusorum continuam continuò vellicata & muco eorum chyloso, ceu optimo parietum eorum tutamine spoliata sunt, ut ita

membranis sensim tali tegmine denudatis; hinc erosio, & vasorum sanguifluorum orificiola capillaria aperta fuerint, exinde postmodum excrementorum talium plus minus rubicundorum ejectio, ad exemplum pulveris sternutatorii fortioris narium membranas continuò vellicantis, & non solum lympham copiosorem, sed & sanguinem tandem, prolicientis. Ejectiones autem istas partim præcesserunt, partim comitati sunt, dolores abdominis tam truculentissimi, contorquentes & lacerantes vagi, in specie noctu affligentes, ita ut lacerari quodammodo intestina videantur, qui sat manifestant acris alicujus præsentiam, quod insigniter rodit intestinorum intimam substantiam, & tunicas fibrosas insigniter sensiles morficat, ut exinde ingentes dolores, & propter hos ipsos convulsivos earum spasmos & contracturas, adeoque acerbissimum contorsionis & omnimodæ quasi lacerationis sensum conjunctum, cruciatus intolerabiles, præprimis tempore nocturno, inducantur; quales dolorosi spasmi & convulsivi motus præprimis jejunum torquent intestinum reliquaque tenuia, hinc ut præcipuè circa umbilici regionem cum dictis cruciatus & pulsationis quidem, etsi levior, sensus observabilis sit, ob sanguinem nimirum in vasis capillaribus stagnantem, & in motu suo, ob nervos vasis sanguifluos subjacentes irritatos, exindeque vasa sanguiflua comprimentes, impeditum, ob quos nervos affectos & simul caput per consensum insigniter doler. Quatenus autem acre vellicans miasma seu fermentum pungens & vellicans intestina, ex intestinis superioribus, partim motu suo proprio, partim horum convulsorum contorsione spasmodicâ, ad intestinum rectum propellatur, huicque postmodum pertinaciter adhærendo, illudque vellicando, dolores tales acerbissimos non solum infert, sed & alvum continuò stimulat, unde & tenesmus & cupiditas egerendi, & si interdum inanis, ægrum ita cruciat, ut si non alia, hac saltem & solum tyrannidis specie, hoc malum veniat agro abominandum. Prout etiam acre hoc vitiosum ad fauces usque exhalat, illarum membranam insigniter irritat & vellicat, hinc concurrente simul salivâ, non ritè saliva ista acria diluentis & abstergentis, ob laticis aquosi uberiorem evacuationem evacuatæ, nec à massa sanguinea, quæ & ipsa hoc destituta, copiosius ad fauces delatæ defectu, sitis oritur intensâ, maximèque agro molesta.

P R O G N O S I S.

Æger itaque sub hujus mali tyrannide gemens & anxius, doloribus quippe acerbissimis vexatus rectè maturè petit consilium, cum malum hoc sit periculosius, eo nomine, quod

quod intestina tenuia imprimis invaserit, unde & symptomata graviora supervenire solent; accedit & contagium malum inferens pessimi ominis, & gravissimè lædens. Cum tamen in præsentī casu non adeò confirmata dysenteria, æger ipse in ætate florida, nec virium dejectio adsit, idcirco spes est aliqualis, cum facile in integrum restitutum iri, cum æger magis crudelius quam periculosius affectus sit.

C U R A.

Ut igitur ad ejus preces à talibus cruciatus illum liberemus, Curam aggrediamur, quæ, ut melius instituat, pro ratione morbi introducti, quatuor indicationibus absolvi potest.

1. Causam proximam, acre malignum vellicans, corrigendo, & ex intestinis horum abstersione, ex massa sanguinea hujus per sudorifera purificatione, eliminando.

2. Urgentem dolorem sistendo.

3. Vulnerariis læsionem intestinorum corrigendo.

4. Abstergentibus anodynis tenesimum sistendo.

Semper in universo dysenteriae curæ cursu stomachum simul ejusque robur respiciendo.

Pro his itaque scopis obtinendis ad hoc malum abigendum, offerunt sese fontes Medicinæ tres, Chirurgicus, Pharmaceuticus & Diæticus; quorum primus cum vix scopo nostro satis faciat, proinde generosioribus ex eo petitis remediis hæc vice supersedebimus, & adornabimus nostram curam remediis ex Pharmacia desumptis, quibus pro quadruplici superiori Indicatione cum indicatis sequentibus subsidiis cura expeditur. Hinc commendamus illi in principio statim sequens:

R. ▽ *Card. bened.*

Mentha ana ℥ij.

Cinnam. ℥℔.

ras. priapi Cervi ℥ij.

C. C. f. Δe.

℥ii *diaphor.* ana ℥j.

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. card. bened. ℥℔.

M. D. S. *Anhaltend Schweiß-Träncklein.*

De hoc capiat æger duo vel tria cochlearia, & inter cooperturas stragulorum lecti probè sudet, aliquoties reiterando; hoc enim peracto, curam facilius hoc erit malum.

Vel R. *Pulv. hepat. viper. vel serpent.* vel

ras. priapi cervi ℥ij.

C. C. f. Δe.

℥ii *diaphor.* ana ℥j.

M. f. Pulvis pro tribus dosibus:

D. S. *Anhaltende Stärck-Pulver.*

Pro vehiculo dictorum pulverum præscribatur.

Tom. II. Pars 2.

R. ▽ *Mentha.*

card. bened. ana ℥℔.

cinam. ℥vj.

Ess. Opii ℥℔.

Syr. Card. bened. ℥vj.

M. f. Potio: S.

Stärck-Träncklein zu den Pulvern.

His simul externa adhibeantur, hinc

R. *Theriac.* ℥℔. vel ℥vj.

Ol. dest. Macis, vel *Mentha* ℥j.

M. pro Unguento.

Quò largiter abdomen & scrobiculus cordis, & quidem quam calidè, inungatur.

Peracto sudore, quoties æger potum, cum sitis urgeat maximè, petat, commendamus, ut in ordinario potu largiter dissolvatur gelatina cornu cervi, vel gelatina priapi cervi;

Vel R. *Decoct. Citri Myrs.* ℔j.

▽ *cinnam. cydon.* ℥ij.

Gelat. C. C. ℥j.

Syr. Corall. Querc. ℥vj.

M. pro Julepo:

D. S. *Stärckender Julep.*

De hoc, quoties potum exigit, aliquot cochlearia ægro, in hypocausto moderatè calido degenti, offerantur.

Quod si verò malum gravius, ita ut ex his non sentiat levamen æger, ad specifica magis accedendum.

R. ▽ *plantag.* ℥ij.

Cinnam. ℥vj.

Acet. rosac. ℥℔.

El. diascord. Frac. ℥j.

☞ *sigillat.* ℥℔.

Sacch: hni ℥j.

Laud. Opiat. gr. ij.

Syr. myrtin. ℥℔. M. f. Potio: S.

Anhaltende Stärck-Mixtur.

Vel R. *Conf. rosar. vetust.* ℥℔.

Ras. priapi Cervi ℥ij.

Laud. opiat. gr. iij.

Cum f. q. *Syr. Cydon. aromat.* f. Electuarium.

D. S. *Anhaltende Stärck-Lattwerge auf 2. mal.*

Convenit etiam pro hoc scopo Tinctura antiphthifica.

Sin autem urgente dolore ani & tenesmo æger adhuc sit anxius, convenit clyster blandè abstergens anodynus, qui simul dolorem lenit, & id, quod in intestinis læsum, consolidat; hinc prodest vel clyisma ex lacte simplici cum sevo hircino, vel

R. *HB. burse pastor.*

plantag.

fl. Chamom.

Verbasci ana M℔.

rad. symphyt. maj.

sem. Cicer. rubr. ana ℥j.

Coqu. in f. q. *lactis caprini*:

[X] 2

Colat.

Colat. ℥ix. adde

Sevi hircin. c. vitell. ovi sol. ℥j.

Bals. Peruv. in vitello ovi sol. ℥ij.

M. pro clysmate.

Duabus vicibus tepidè injiciendo.

Excreto clysmate, fomentis adhuc tenissimo succurratur.

R. *HB. & fl. Verbasci* M. ij.

Chamomill.

fl. sambuci ana M. j.

Incisa includantur Sacculo in lacte coquendo & applicando:

D. S. *Lindernd Säcklein.*

Ut autem declinante malo intestinorum læsio maturè corrigatur:

R. *HB. hederæ.*

plantag. ana M. j.

summ. hyperic. Mß.

Ras. priapi cervi ℥vj.

coqu. in f. q: ∇ *simpl.*

Colat. ℔bj. adde

Syr. Corall.

Cydonior. ana ℥ij.

M. D. S. *Wund-Trank.*

Capiatur subinde cum haustu, addendo sedulo *Balsami & terebinth. gtt. vj. vel viij.*

Dehinc tandem, ut ad stomachum respectum habeamus, hinc ei commendamus vel haustum vini generosi, vel micam panis tostam vino generoso ebriam, cui pulvis macis largiter inspersus; Vel:

R. ∇ *fœnicul.*

Menthæ ana ℥i℔.

Cinnam. ℥vj.

succ. Cydon. rec. ℥i℔.

~ *Θis dulc. ℥j.*

Syr. Menthæ ℥vj.

M. D. S. *Wagen-stärkend Tranklein.*

De quo æger capiat pro lubitu.

Hiscæ jam addatur diætæ, quæ consistat in hoc, ut in usu sex rerum non naturalium modestè segerat, præprimis, ne se nimis exponat aëris impurioris insultui.

CASUS XIII.

HAEMORRHOIDES COECAE DO- LENTES, EX MENSIIUM NA- TURALI EMANSIONE.

Mulier vegeta & floridæ faciei, corpulenta, cætera sana, indeque luxui dedita, ætatis præter propter 49. annorum, & quod excurrit, conqueritur de dolore lumborum lancinante, & gravativè distendente, successivè crescente, una cum intenso dolore ardente, rodente, & nonnihil pulsante in interioribus podicis, hinc laboriosam alvi dejectionem patitur, in tantum, ut quoties eam exonerare nititur, hoc cum summis fiat doloribus. Accedit tunc extremorum tremor, phlogosis &

æstuatio ex præcordiis caput petens, cum faciei rubore intenso, & largo sudoris per frontem & tempora defluxu. Patitur hæc, quoties alvum liberat, istis prioribus pathematis continuo eam torquentibus. Medicus ordinarius varia ordinat, interna & externa, linimenta & somenta, clysmata, venam in brachio secat, &c. levatur his malum, sed supervenit difficilis respiratio, ita ut quoties parum ambulet, vel aliquot saltem scalas adscendat, spiritus nonnihil interceptatur, & libera respiratio impediatur, cum pulsatione sensibili in temporibus & pedibus. Molestissimo hoc malo aliquandiu conflictata, & diversimodè tractata à Medico, illud pedetentim evanescit, sed supervenientibus seu redeuntibus istis prioribus in lumbis, ano, & vicinis regionibus, malis, vocatur alius Medicus pro Cura.

RESOLUTIO.

In antecessum moneo, frequentissimos mulieribus accidere dolores, tam sub mensem incipiente fluxu, quam instante abortu, etiam sine læsione inflammationis in viscere aliquo, in qua semper affligit dolor pulsatorius & distendens. Cæterum præsentem affectum non esse renes inflammatos, patet ex absentia signorum; quia abest v. g. febris continua, & quæ in nostra plethorica ægrâ adesset acuta, abestque motus erigendi impotentia, & insignior urinæ mutatio, aut ejusdem suppressio; imò si inflammatio renis subesset, crus etiam illius lateris, cujus ren esset affectus, stuperet, & necessariò etiam dolor pulsatorius perciperetur, quippe qui in omni inflammatione affligit; utur non à pulsatorio ad inflammationem argumentandum sit: quin imò præsentem renis inflammationem affectus stomachi & vicinarum partium per consensum. c. g. nausea, vel vomitus, vel cardialgia, adesset: si autem fuisset nephritis seu inflammatio renum, conduxisset tinctura antiphthisica, cujus basis est saccharum saturni, quod ipsum etiam in omnibus viscerum inflammationibus egregium est.

Potius ergò affectus ægræ nostræ primarius est Hæmorrhoidum cæcarum dolor, sive jam internæ sive externæ affligant: utraque siquidem affectæ videntur, propter atrociam supervenientia symptomata. Huic autem dolori supervenit difficilis respiratio per accidens culpâ Medici, nata ex sanguinis per venæ sectionem coacervatione in pulmonibus, & ejusdem impedito sanguinis per eundem circulo.

Pars ergò affecta intestinum rectum est, in specie quoad orificium sui externum, podicem constituens, ubi vasa hæmorrhoidalialia inserta sunt, tam interna quam externa.

Causa

Hæmorrh. cæcæ dolentes ex Mensium nat. Emanfione. 165

Causa proxima est inchoata inflammatio in intestino recto circa situm vasorum hæmorrhoidalium, quæ simpliciter fit à sanguinis stagnantis copia in nostra ægra, quæ alias in locis vicinis, nempe circa vaginam uterinam, sub ordinario mensium fluxu consue-
ta erat evacuari, cessante hac evacuatione.

Quod autem à naturaliter cessante ob-
tatem mensium fluxu in subiecto hoc san-
guineo supervenerit hæmorrhoidum dolor, &
omnia in historia casus recensita pathema-
ta, colligitur (α.) quod non rarum sit. ces-
santibus naturaliter mensibus in subiectis ve-
getioribus supervenire hæmorrhoidalem flu-
xum menstruum, (β.) nec rarum, loco
mensium obstructorum, hæmorrhoides,
hæmorrhagiam narium, hæmoptysin, &c.
supervenire: vid. Bartholinus in *Act. Med.
Hafn. Vol. 1. p. 165.* (γ.) in habitioribus una
cum mensibus fluentibus etiam quandoque
hæmorrhoides fluant, de quib' vid. M.A.N.C.
Ann. 3. Obs. 22. p. 39. & Ann. 4. & 5. p. 299.
Tandem (δ.) ordinarium quoque sit, quod
in partu difficili, ex conatu isto nimio,
partes genitalibus vicinæ in tantum tumes-
cant, & ex vasis circa eadem loca distentis
sæpe insequantur hæmorrhoides cæcæ; sicut
etiam ipsæ gravidæ ultimis mensibus gestati-
onis tam varicibus, quam dolore hæmorrhoi-
dum cæcarum, nonnunquam infestari solent.
Porrò viri, uti his naturaliter deficiunt men-
struationes, ita e contra hæmorrhoidalis flu-
xus periodicus per penem visus in iisdem est.
Et ratio quidem, quod subinde mensium vel
naturali emanfioni, vel præternaturali sup-
pressioni, superveniant hæmorrhoidalia pa-
themata, est vicinitas vasorum, ex commu-
ni tunica oriundorum. Vasa nempe hæmor-
rhoidalia externa tam venæ quam arteriæ,
oriuntur ex ramis hypogastricis trunci iliaci
interni, ex quibus etiam propagantur vasa
ad vaginam uterinam; unde mensium fluxu
ordinariò cessante, per vicina loca & vasa
ejusdem sanguinis fit excretio, aut saltem in
iisdem stagnatio aliqua. Pari ratione vaso-
rum hæmorrhoidalium internorum arteria
derivatur ex arteria mesenterica inferiore, ve-
na verò ex ramo venæ portæ splenico.

Jam quoad connexionem & evolutio-
nem symptomatum: conqueritur ægra de do-
lore lumborum lancinante, distendente &
gravante; dicunt tales: *Es liegt mir so im
Rücken/ es spannet im Kreuz/ und ist
darbey/ als wenn es risse.* Hæc sympto-
mata dependent simpliciter ex turgescencia
sanguinis & repletione vasorum circa uterum
& loca vicina; ac ordinariò quidem patiun-
tur talia pathemata, quando menses emana-
re volunt, *es drückt mich so im Rücken
nach dem Schoffe zu/* dicunt, *Sie kön-*

nen sich kaum rühren/ quod signum in-
stantium mensium est; sicut etiam dicunt:
Es ist schwehr in Beinen/ ex impetu san-
guinis.

Similiter in præsentī ægra plethorica san-
guis superfluous, per uterum antehac evacuari
solitus, ob locorum viciniam in vasis hæmor-
rhoidalibus restagnans & aliqualem inflamma-
tionem, quam innuit pulsus, pariens primum
tensionem dolorificam lumborum, hinc dolo-
rem ardentem, rodentem & pulsantem in inte-
rioribus podicis, quod est signum doloris hæ-
morrhoidalis ex sanguine stagnante, non po-
tuit non producere; dicunt enim: *Es sey/ als
wann man mit einem heißen Bratspieß in
der Kerben herum führe/* ubi in specie pul-
sans dolor est vestigium inflammationis. Por-
rò laboriosam alvi dejectionem patitur ægra
nostra, quæ ex duplici fonte derivanda venit:
nempe partim ex intensione partis affectæ do-
lorum, cujus ratione dum protruditur po-
dex, à fecibus præterlabentibus afficitur, un-
de difficillima dejectio; partim quod sic san-
guis stagnans quodammodo, impetu per do-
lorem factò, ad superiora ejaculetur. Ex
qua causâ etiam tremor oritur, cum propter
intensum dolorem hæmorrhoidum in con-
sensum trahatur totum nervosum genus, &
spiritibus animalibus inæqualis fluxus concil-
lietur: Sic propter dolorem totum corpus
tremat, si Chirurgus partem aliquam exter-
nam exulceratam tangat. Ulteriùs solita
æstuatio, phlogosis & rubedo faciei, origi-
nem ducunt ex subito sanguinis stagnantis re-
pulsu, & superiora versus rejectione, quò
ipso ad caput ita commoto, feri emanatio, &
consequenter sudor largus circa frontem &
tempora apparet, quod ipsùm illustrat Bar-
tholinus *Cent. 4. Histor. 40.* ubi similia pa-
themata difficiliorem alvi dejectionem cau-
santia recenset.

Sed quæritur: unde difficilis respiratio,
ceu secundarium pathema, in nostra ægra or-
ta sit? Resp. ab inepta venæsectione in bra-
chio instituta; supervenit enim, quando do-
lores circa podicem desinunt. In nostra
ægra hirudines hæmorrhoidibus applicari,
vel sapinæna aperiri debuissent; unde post
ineptam venæsectionem difficilior respiratio
originem duxit ex sanguinis nimia copia, &
aliquali circa præcordia ex pulmonum vasis
mora, indeque tardiore ejus per pulmones
circuitu, facta nimirum sanguinis ab inferio-
ribus partibus versus superiora revulsionem,
unde urgentior respiratio. Confirmatur hoc
ipsùm ex eo, quod semper, quoties per mo-
tum se exerceret, aut scalas adscenderet, to-
ties respiratio facta fuerit gravior propter san-
guinis cursum rapidiorem factum, & per
pulmonum vasa retardatum. Atque hinc,

quibus deficiunt menses præternaturaliter, semper ex ordinario conqueruntur de difficili respiratione. Idem accidit nostræ ægræ, quæ sanguinis copiâ ab hæmorrhoidibus sursum revocatâ, propter impeditum ejusdem per pulmones circulum, effecit difficilem respirationem. Quare autem sanguis relictis vasis inferioribus occupet primario partes superiores? quæritur! Resp. fieri hoc propter venæsectionem in brachio institutam, quia sic sanguis fuit revulsus à partibus inferioribus, & sic circa pulmones stagnavit. Res ut pateat: hæmorrhoidum hic affectus similiter fere se habuit, ac quando mulieribus mensium fluxus subito supprimitur; vel etiam, quando mulieri instant menses erupturi. Jam in tali ægræ statu quæritur, in quonam loco secanda sit vena? an suprâ, an infrâ cor? Resp. infra cor, nempe vena saphæna; quia ad eam regionem, in qua vena aperitur, sanguis rapidiori motu solet ferri propter vasa liberiora, majus spatium acquisitum, & propter vasa depleta, hinc ad istum locum promptior impetus. Et hoc est, quod Veteres vocarunt Revulsionem: quippe revellere nil est aliud, quam sanguinis ad locum aliquem rapidiorem motum per venæ sectionem conciliare. Diceret quis: At non diu impetus ille sanguinis ad locum illum durat! Regero: Verum quidem illud esse; interim non plane cessat sanguinis ille ad locum sectum motus, sed diutius durat, quam quidem alio in loco. Et hanc ob causam, cum in nostra ægra vena fuit secta in brachio, sanguis circa inferiora stagnans rapidiori impetu ad regionem superiorem delatus fuit, hincque cessarunt quidem pathemata podicis; circa tamen superiora exacerbata fuerunt, cum sanguis circa pulmones & cor fuerit coacervatus. Et hætenus dicta occasionem dant venæsectionem legitime instituendi: Scilicet instantibus mensibus nondum verò apparentibus, **wenn sie in zwey Tagen kommen sollen** / iterum suppressis, secanda vena in brachio pro ventilatione sanguinis, seu liberiori ejus motu conciliando, unde liberior sanguinis motus circa vasa uterina: Econtra mensibus actu jam fluentibus, sed iisdem vel subito suppressis aliquò errore externò, v.g. terrore, aut partium refrigeratione, vel parcius fluentibus (nisi adsit impedimentum in vasis uterinis) aut denique jamjam fluxuris, sectio saphænæ aut quæcunque alia apparens in pede, modò sanguini deorsum motus concilietur, conducit, quatenus sanguis, spatio inferius facto, rapidiori motu versus inferiora fertur. Et eadem leges observandæ sunt circa puerperas: interdum enim his instante labore partus, aut etiam in ipso partu, secanda est vena in brachio; post partum verò pro lochiorum motu

promovendo, & liberiori sanguinis circulo per genitalia conciliando, secatur vena in pede. Quare autem instantibus mensibus in brachio secetur? ut sanguinis quantitas detrahatur: nam aliàs nimia copiâ circa uterum stagnat & propter majorem copiam non potest emergere, in pede; si verò actu fluunt, pro majori fluxu potest secari in pede. Has cautelas observandas confirmant Practici unanimiter, & inter eos Riverius *Cent. 1. Obs. 2.* Hæferus in *Herc. Med. p. 304.* Deodatus in *Valet. pag. 129.* & Amatus Lusitanus *Cent. 6. Obs. 28.* ubi mulieri cui menses aliquamdiu suppressi fuerunt, secavit venam in brachio, unde tertio die menses supervenerunt. Bartholinus in *Act. Med. Hafn. Vol. 2. Obs. 95. pag. 238.* habet exemplum mulieris quæ sub mensium fluxu, in nimia ira percita, passa fuit suppressionem, Medicus secavit venam in pede, & curata fuit: Sic Riverius *Cent. 1. Observ. 1. & 89. pag. 87.* refert de ischuria, quæ aliis irritis venæsectione in brachio fuit curata: Sanguis enim impetu suo & copiâ se ipsum impedit, & circa renes stagnavit, venâ sectâ vero liberius facta fuit urinæ secretio facilis per renes. Quantum vero noceat venæsectio in brachio, quando menses fluunt? harum lethalia exempla allegantur in Bartholini *Act. Med. Hafn. Vol. 2. pag. 195.* & Foresto *lib. 28. Obs. 3.* Quo pertinet, quod Gabelchoverus *Cent. 4. Observ. 17.* habet, nempe sub actuali mensium fluxu cucurbitulis supernè applicatis hunc cessasse, & graviora symptomata supervenisse. In nostra ægra, dum sub hæmorrhoidum cæcarum dolore venæsectio in brachio administrata, factâ sic revulsionem sanguinis, omnis ejus impetus sursum fertur, unde difficilis respiratio secuta est.

P R O G N O S I S.

Affectus per se non est periculosus, & curabilis; sed metuendum, ne foris ob negligentiam superveniant vitia, quæ aliàs hæmorrhoidibus cæcis aut inflammatis solent supervenire: quæ sunt (1.) fluxus earum nimius, vel abscessus, & consequenter tandem fistula ani; vel (2.) ne ex sanguinis motu aliorum concitato, quocunque errore facto, respiratio asthmatica & varia mala inducantur. Hæc ipsa vero cum possint ope Medica preveniri, malum est sine periculo.

C U R A.

Itaque quoad Curam, observentur hæc Indicationes:

1. ut dolor inflammatorius hæmorrhoidum cæcarum tollatur.
2. hinc nata symptomata, si quæ superviunt, removeantur.
3. recidiva in corpore plethorico præcavea-

caveatur. In specie hoc præstetur, quia ex conditione subjecti periculum est, ne tandem, licet curetur, tamen post aliquot menses levi ex causa recurrat.

Jam quoad primum; dolor inflammatorius sistitur

1. Sanguinem circa vasa hæmorrhoidalia stagnantem removendo; quod fiet vel sensibilibiter, eum evacuando, vel si hoc non suffecerit, insensibilibiter discutendo; hinc

2. Sistitur dolor, præmissis hisce, anodynis internis & externis. Quò etiam pertinent appropriata, & in hæmorrhoidum cæcarum dolore specifica.

His scopis inserviunt remedia ex triplici fonte haurienda. Fons diæticus quidem in diæta temperata fundatus clarus est. Quoad Pharmaciâ, consideret Medicus, an remedia pharmaceutica dolori hæmorrhoidum insensibilibiter discutendo sufficiant? an vero non? Si sufficit discussio insensibilis, eidem insistat, cum optima sit illa curandi dolorem illum ratio; quod si autem illa non sufficit, sensibilis sanguinis evacuatio in usum vocetur. In nostra ægra necesse est sensibilibiter evacuare sanguinem propter vim causæ antecedentis, naturalem nempe mensium emanfionem. Jam autem quæritur; ubi sit evacuandus sanguis? Resp. Monstrat hoc subjecti conditio, quantitas & motus sanguinis, quæ etiam innuunt, an sufficiat sola hæmorrhoidum apertio? an vero, si hæc non sufficiens sit, vena secanda in pede? an vero tandem, si utraq; non sufficiant, etiam venæ sectio in brachio præmittenda? Ergo cum ægra nostra in statu hujus morbi sit plethorica, cætera sana, vegeta, succulenta, & patitur hoc malum ex naturali mensium emanfione, malum insuper sit pertinax, quia alterâ vice recurrit: hinc colligitur, non sufficere solam apertionem vasorum hæmorrhoidalium, ne sanguis nimio impetu eo feratur, vel inflammatio earundem intendatur: adeoque in alio loco præmittenda est venæ sectio, ea tamen non in brachio secetur, quæ difficilem respirationem in nostra ægra induxit; quin potius in pede instituatur, & quidem saphæna aperiatur. Interim cum etiam taliter periculum immineat, ne à nimio sanguinis versus inferiora concitato impetu, in immensum augeatur dolor & inflammatio hæmorrhoidum, quæritur ergo: per quas vias sanguis evacuandus? Resp. in subjecto tali plethorico suaferim præmittendam esse venæ sectionem loco circa cor, adeoque in brachio pro revulsione universali, ut ita sanguinis quanto imminuto æqualis & liberior per corpus motus sanguini concilietur. Dicit quis: at sic supervenit difficilis respiratio! Resp. Verum esse; vesperi tamen, vel altero aut tertio die reiteran-

dam esse venæ sectionem in pede, postmodum evacuationem per hæmorrhoides tentandam; ita namque tuta est evacuatio sanguinis, cum in brachio, cœu in contrario affectæ loco, secta vena conducat hac ratione pro revulsione universali, promiscuè licet in quacunque vena brachii instituta. Ubi tamen quæri posset; an venæ salvatellæ in manu sectio specie aliquid in recessu habeat, quam Sanctorius Sanctorii in egregio Tract. de Meth. Vitandi Error. in Med. pag. 956. mirè commendat in passionibus hæmorrhoidalibus curandis? Sed perinde est, quodcunque vas in brachio aperiatur; nec salvatellæ incisionem præ aliis prærogativæ quid obtinere, videbitis confirmatum à Marco Aurelio Severino in Castigata nova Phlebot. In nostra ergo ægra venæ sectio primitus in brachio pro revulsione universali, deinde ejusdem diei vespera pro revulsione particulari seu aversione in pede, ut ita præcaveatur difficilis respiratio, & tamen sanguis ad loca vicina profluat; sicut tandem ultimo loco hæmorrhoidalium venarum in ano apertio pro derivatione fuisset instituenda, ut hujus medio sanguis stagnans evacuetur per ista vasa, per quæ aliàs deberet naturaliter refluerere, vel insensibilibiter discutatur.

Hæc occasione autem quæritur; quomodo hæmorrhoides aperiuntur? Dico, id fieri vel medicamentis, vel hirudinibus, quarum hic tutissimus est modus, & præsentaneum remedium. Nam sugunt hæc largiter: Potest applicari una, duæ vel tres, pro ratione circumstantiarum. Modus autem applicandi illas est, ut locus, cui apponi debent, illinatur vel lacte tepido, vel sanguine calido animalis cujusdam, v.g. gallinæ, ita enim mox arripiunt hirudines sanguinem, &c. Contra vero, quæ hæmorrhoidum apertio per medicamenta fit, conjuncta semper est cum doloris & ardoris exacerbatione: Sive enim externè succus ceparum &c. sive nunc aloëtica internè administrantur, semper tamen acria, vellicando intestinum rectum, & ita impetum sanguini imprimendo, aperiunt tandem vasa hæmorrhoidalia.

Medicamenta autem insensibilibiter discutientia vel interna vel externa sunt: & quidem interna sunt Sudorifera fortiora, speciatim fixa volatilibus nonnihil acuata: Largius autem sudor excitetur, partim pro liberrimo sanguinis motu conciliando, partim pro excremento sanguinis per peripheriam corporis eliminando. Juxta hæc sudorifera pro scopo discutienti unâ subjungenda sunt alia, partim interna discutientia appropriata, partim anodyna externa: Illa sunt pulvis radicis scrophulariæ, bis ad ʒj. usurpatus; itemque infusum hujus cum radice chelidonii majoris internè

internè pro potu ordinario. Præ cæteris autem conveniunt externa discutientia cum anodynis, præsertim appropriatis juncta: adeoque applicentur fots, scilicet sacculi parati ex linaria, floribus verbasci, in lacte coctis, qui sub forma fots humidi crebrius applicentur pro scopo discutiendi & dolorem leniendi. Loco cujus etiam unguentum de linaria, cujus descriptio prostat in Hæfero, Hartmanno, & Zwelferi Pharmac. Augustana. Quibus tamen hoc non placet, adhibeant unguentum ex cineribus suberis, præsertim quò aliquamdiu cadi vinarii fuerunt obturati, fiat ex his unguentum cum vitello ovi & oleo rosaceo, à Foresto, Borello, (qui etiam rationem suberis assumendi reddit) & Lindano in Colleg. super Prax. Hartmanni, commendatum, idque eo magis, si sub mistura sui illud crebrius ducatur in mortario saturnino, cum pistillo itidem saturnino circum agitur, quo ita recrementa Saturni immisceantur, cum præsertim ipse quoque saturnus sit egregius in inflammationibus, acidum absorbendo, & stagnationem sanguinis curando. Cum his oleum momordicæ vetus cum oleo nucum expresso paratum, nobile quoque est, sicut expertus id sum in cognata quadam mihi, quæ cum ex mensibus non rite fluentibus dolorem in ano, hæmorrhoidum dolori affinem, pateretur, suasi eidem oleum hocce tunc temporis ad manus existens, & ecce! hujus litu dolor affligens hætenus evanescebat. Nec oleis allegatis facillè cedent oleum asellorum & scarabeorum; utut enim asellus insectum sit vilissimum, egregium tamen medicamen exhibet, notante Boyle in Physica Experimental. Nempe aselli contusi, & oleo nucum expresso infusi ebulliant vel digerantur saltem, postmodum verò leni expressione inde oleum eliciatur. Loco quorum etiam scarabæi pilulares contusi, in oleo violarum vel olivarum infusi & digesti, oleum egregium ad affectus hæmorrhoidum dolorosos dant. Quin imò sola Theriaca vi sudorifera sua aromaticâ, discutitiva & anodyna, insigne esset euporiston applicando eam, si externè saltem hæmorrhoidum dolor affligerit, cum linteolis: Sin verò internæ magis molestæ fuerint hæmorrhoides, imbibatur stuppa cannabina aut bombax dictis oleis, & podici profunde indatur. Tandem quoque balsamus sulphuris ad extra cum oleo papaveris expresso paratus, de quo vid. Hartmannus, anodynum est egregium. Ubi autem maxime urget ardor, recipiatur *rosar.* largiter imprægnata cum Camphora, vel spiritu vini camphorato, & cum linteis duplicatis vel triplicibus locis affectis applicetur.

His omnibus urgente dolore, addantur

anodyna alia, ut essentia opiata, solanum, folia & semen hyoscyami, oleum seminis papaveris aut hyoscyami, expressum, imo ipsum opium, sed cautè, & non nimis maturè adhibendum; quia si intempestivè cerebro applicatur locis inflammatis, ad gangrænam ea disponit.

Secunda Indicatio erat, Symptomata ex dolore hæmorrhoidali nata, si quæ supersint, nempe dolorosam alvi dejectionem, & inde dependentes phlogoses in fronte, sistere; quod fiet, alvum servando apertam, sed non stimulantibus, nec resinosis, quæ suâ adhæsiōne malum exasperant; nec purgantibus, quæ itidem acrimoniâ suâ intendunt dolores; sed saltem continuatis emollientibus, & blandissime lubricantibus intestina fecesque alvi fluidas servantibus: quod faciunt decocta passularum cum malva, ovorum sorbiliun crebrior usus, fots humidi ex lacte, itemque sicci, & clysmata ex lacte.

Pro tertia tandem Indicatione recidiva præcavetur, quod fit per cucurbitulas scarificando omni menstruo spatio, & partim cruribus applicatas; Si vero vel non sufficiant, vel sanguinis dejectio sit suspecta, in auxilium vocentur fonticuli in crure, cum quibus jungatur victus parcior, & uberior corporis motus. Sicut tandem vitentur Purgantia quæcunque propriè sic dicta, aloëtica, & alia purgantia resinosa.

Quod attinet fonticulos; eorum usum hoc in casu confirmat Polyhistor ille Medicus Velschius *Hecatoft. 2. Observ. 60. pag. 50.* ubi habet casum nostro fere similem in corpulenta, fonticulorum inustione præservata ab hæmorrhoidum dolore. Sunt tamen saltem palliativum remedium & radicem non evellunt, & tantum simul nocent sanguinem imminuendo, quantum profunt. Non igitur suadendi, nisi quando alia remedia frustra tentata sunt, & à priori amplius curare non possumus, idque vel ratione subjecti, vel ratione ætatis, vel ratione alius circumstantiæ. In nostra ægra singularis idiosyncrasiæ sufficiunt fonticuli, quia crebrior sanguinis evacuatio est suspecta. Cæterum si Medicus sub illo statu, ubi post venæ sectionem administratam adsit adhuc difficilis respiratio, advocaretur, in tali casu sanguini motus liberior est conciliandus, & stagnatio removenda, quod fit per venæsectionem in pede, nempe saphænæ pro scopo revulsorio; postmodum vero sudorifera propinentur, quibus æquabilis sanguinis motus conciliatur; si autem recidivare vult difficilis respiratio, tunc in nostro subjecto fonticulus unus inuratur in brachio, vel bini in utroque, raro duo in uno brachio, cum ex his pallo-

Colica Hypochondriaca Humorosa, cum Doloze Iliaco. 169

pallorem faciei talia subiecta ad mortem usque afflixisse observârint Practici.

CASUS XIV.

COLICA HYPOCHONDRIACA HUMOROSA CUM DOLORE ILIACO.

Seu

DOLOZ COLICUS FIXUS HYPOCHONDRIACUS PER ACCIDENS CONVULSIVUS à PEDUM REFRIGERATIONE SUSCITATUS.

Juvenis, natione Westphalus, malo hypochondriaco, ut vocant, aliàs obnoxius, post insignem corporis, in specie pedum, inludo scenico spectando refrigerationem, altero die incipit dolere latere sinistro, sub costis in den weichen/ Dolor erat acutus, admodum punctorius, gravissimè affligens agrum, conjunctus cum frequenti vomitu, admodum molesto, ipsique egro doloroso, ingenti siti & virium prostratione; hinc dolores lancinantes, sed rari interdum ex isto loco in totum abdomen progredi, ad lumbos reflexi, & in sinistro hypochondrio tandem terminari solent, ubi terebrantes punitiones primariò urgent; pulsus est mediocris in omnibus, celerior tamen & debilior, quam naturaliter esse solet, durus, & interdum post aliquot pulsationes intermittens, urina pallida, cum copioso sedimento lateritio, alvus obstructa, clysmata injecta cum paucò effectù brevi post rejiciuntur; symptomatum atrociam eadem, respiratio parva & difficilis; contactum in latere dolente, etiam fortius prementem, benè ferre potest: punitiones subinde sursum ad præcordia adscendere videntur.

RESOLUTIO.

Hic morbus à sede est dolor Colicus, à modo verò, quo affligit fixus terebransque; sicut tandem à loco, in quo perseverat, à modernis Hypochondriacus vocatur.

Affectus hic complicatus est, & iliacus & colicus dolor.

Quando igitur syndrome ejusmodi symptomatum communium occurrit, probè consideretur: quænam sint symptomata primaria? & quænam secundaria? Nam symptomata primaria sunt, à quibus, tanquam radice, omnia reliqua originem ducunt, eaque facile possunt cognosci, modò conferantur causæ antecedentes, proximæ & remotæ, & quamnam partem hæc proximè affligant? In qua parte affecta duo considerata:

Tom. II. Pars 2.

1. Dolor progrediens in abdomen; &

2. Ad lumbos reflexus.

His facile ad symptomatum primariorum cognitionem pervenire poterimus.

Porro distinguenda est Colica à dolore splenico, *dem Mißstehen/* cum uterque affectus à Practicorum vulgo confundatur, scilicet dolor terebrans fixusque in hypochondrio sinistro apparens cum splenico: Non enim hunc splenicum esse, pater ex eo, quod etiam talis dolor sæpius in hypochondrio dextro observetur, & quidem in utroque hominum sexu. Præterea in utroque latere etiam simul affligens ejusmodi percipitur, utrobique revera colicus vocandus, ab angulis coli in utroque hypochondrio apparentibus; unde & tales eodem modo curantur sine reflexione ad splenem vel etiam ad hepar factâ, cum dolores isti sint aut in colo, aut in intestinis vicinis tenuibus. Contrà, quod etiam in hoc casu splen minus sit affectus, probatur, quia nulla ratione & experimento adhuc convictum est, cum dolore punctorio, lancinante & terebrante affici posse, utpote qui membranis tensis, & in superficie quasi exporrectis, propriè competit. Jam autem splen est corpus membranosum circumvolutum, intertextis invicem nervorum fibris, adeoque saltem aut distendens, aut pulsans, aut obtusè gravans dolor huic dicari poterit; distendens quidem & gravans ex collectis succis vel quibuscunque humoribus inibi, successivè coacervatis, & cellulas ejusdem membranaeas distendentibus; pulsans vero, quatenus sanguis in fluxu suo retardatur, in splene potest produci; at verò punctorius dolor non invenit in taliter constituto viscere locum. Insuper confirmantur hæcenus dicta ex eo, quod & illi, qui vulgò pro spleneticiis doloribus habentur, quales sunt ab equitatione, aut cursu nimio inducti, reverà sub hypochondrio sinistro in colo latent, à flatibus scilicet dependentes, unde etiam vel exonerata alvo, vel emissio flatu, iidem cessant. Hæc ostendunt, insulsum esse eorum consilium, qui cursoribus lienem eximendum esse jubent, cum, ut ut centies insons splen excindatur, non tamen cessabunt dolores colon obsidentes. Interim tamen non negamus, splenem subinde posse affici molestiâ, quia quandoque in splene tales dolores adsunt, *denn es pocht je zuweilen gegen den Rücken zu/dahinden tief wallet und drückt es/* eò scilicet in loco, ubi rami splenici, arteriosi & venosi, ex ramis celiacis, arteriosis & ramo venæ portæ derivantur ad splenem. Quod ipsi pathema frequenter observatur in febribus intermittentibus chronicis, melancholicis, hypochondriacis, &c. in quo casu tamen iterum cauti esse debem, attendendo an splen sit pars affecta primaria? an verò productum mor-

[Y]

mor-

morboſum? (nam in confirmatis demum morbis ægri de lienis dolore conqueri ſolent, in principio vero eorum non,) adeoque an pathemata pro cauſa? an verò pro producto morboſo habenda ſint? attendendum. Confirmatur hoc, quod Horſtius & Sylvius in ſcorbuticis confirmatis poſt mortem apertis ſplenem optimè conſtitutum reperere.

Palpitationes autem cordis in hiſtoria memoratæ non ſuggerunt ſuſpicionem affecti lienis, nec vapores aſcendentes hic accuſandi ſunt.

Quoad Ileon autem: ille eſt complicatus morbus, nempe ex obſtructione alvi, adeoque motu inteſtinorum perſtaltico inverſo; ſive jam contenta ſive feces inteſtina obſtruendo, ſive etiam ipſa inteſtina vel convulſa & inflammata, aut gangranofa, aut invicem ingreſſa, paſſionem hanc induxerint. Et notandæ ſunt illæ obſervationes duæ, quas habet Hildanus *Cent. I. Obſ. 61.* ubi introducit ileum, natum ex pertinaci coli in confinibus cæci & ilei circa valvulam ſuam obſtructione, & *Obſ. 58.* ubi affectum narrat, noſtro caſui ſimillimum, & pro ſplenetico habitum, curatum tamen carminantibus. Aliàs ileos vitio inteſtinorum craſſorum oriri poſſe videtur, niſi vel coli vel cæci, velut anguli in hypochondrio ſiniſtro firmiſſimè obſtructi vitio, ordinariò ex affectis tenuibus, in ſpecie ileo, unde etiam κατ' ἐξ ἧν Ileos vocatur.

Cum ergò craſſa ob ſui amplitudinem nequeant commode obſtrui, & ſic affici ac ileon, nec ſe invicem ſubintrent propter firmam connexionem, & rariùs inflammantur, imò eadem nec hernias producant; ſed ſi forte in culpa fuerint craſſa, erit principium coli & valvula, cujus tamen obſtructio, ob clyſterum illuc tendentium progreſſum, vix perſeverare poteſt. Inſuper in Iliaco affectu ſubinde obſervatur podex intro retractus, ut ne ſpecillum quidem clyſteris applicari queat; quæ retractio ani eſt à convulſione inteſtini recti, & quoque tam ſphincteris, quàm muſculorum ani levatoriorum; hi enim ſi convelluntur, ordinariò & retrahitur & conſtringitur podex. Et quidem tunc hoc phænomenon in colicis convulſivjs & volvulo, ſimilibuſque inteſtinorum impedimentis, non autem obſtructis inteſtinis, obſervatur, quando nempe tam tenuia quàm craſſa convulſione inſigni & motu perſtaltico inverſo laborant: in quo caſu etiam ſuppoſitoriorum & clyſmatum per ſuperiora reſectio continget, ubi autem ex inteſtinis inflammatis, ex obſtructis, ex hernia translocatis, vel ex alijs inteſtinorum affectibus, ileos, quantumvis lethalis, fuerit, non tamen apparebit podex retractus: Conf. Drawitius *Tr. de dolore abdominis ſcorbutico.*

Cauſa proxima materialis eſt acidum

viſcidum, quod in colo regionis hypochondriacæ ſiniſtræ ſtabulans & firmiter agglutinatum, vellicando & rodendo inteſtina, hoc eſt, fibras inteſtinorum nerveas, ſenſus organa, ſpirituum impetum excitat; hincque duæ doloris conditiones præſto ſunt; terebrans nempe, & fixus; ubi dolor terebrans dependet ab acido continuò rodente, & aculeis ſuis ſcindente membranam inteſtinorum interiorem fibroſam; fixus verò à ſucco viſcido, firmiter parietibus coli agglutinato. Ut adeoque affectus noſter præſens ſit vocandus Colica hypochondriaca humorofa, nec niſi per accidens, convulſiva.

Nam quod dolor ille colicus introrſum totum abdomen occupet, ſit illud ſimpliciter per conſenſum, quatenus nempe nervi in dolore iliaco ſpaſmodicè contracti, continuant ſuum ſpaſmum uſque ad plexus mēſaraicos, quorum occasione totum abdomen affligitur: quod autem dorſi & lumborum dolor urget, eſt ex convulſivo mēſenterico plexu. Non reticendum ſiquidem eſt, quadruplicem circa lumbos obſervari dolorem: puta vel nephriticum, vel pancreaticum, vel mēſentericum, vel inteſtinalem, duodeni ſcilicet. Hos inter dolor præſentis ægri non eſt nephriticus, ſed hic dolor lumbaris eſt mēſentericus, ubi hoc annectitur lumbis, iſque lancinans, & obſcurè gravans.

Porro affligunt præſentem ægrum punſiones ſurſum aſcendentes, cujus phænomeni quæ ratio? ſcilicet colon in ſiniſtro hypochondrio connexum eſt locis membranofis vicinis, peritonæo & diaphragmati inferiùs deſcendenti. Quando ergò colon fortiùs à viſcido acido irritatur, convulſivi quid patitur; vid. Helmontius §. 18. *Tr. Pleura Furens pag. 320.* & dum convellitur, connexæ partes membranofæ ſimul ſpaſmo afficiuntur, & ſub iſta contractura punſtorius iſte dolor ſurſum aſcendere videtur, utut non pectoris loca, ſed ſaltem oriſcium ventriculi ſiniſtrum petat. Hinc & reſpiratio moleſta eſt, quia quoties reſpiramus, toties diaphragma ex convexo commovetur in figuram planam, unde colon comprimitur, quod antea affectum, irritatum a cauſa externa mox affligitur, & dolor exaſperatur atque intenditur.

Quæritur autem: unde æger ferre poſſit applicationem manus; fortiter prementis hypochondrium ſiniſtrum? Equidem ſi ad eſſent ſtatus, ſolutio foret facilis, cum flatibus ſic progreſſus creetur. Verùm in noſtro caſu ſaltem mucus acidus hæret, unde ex iſta compreſſione colon ſimul fortiùs premitur, adeoque inſenſibilitate ſua non nihil minuitur, quatenus angulus coli ſit quoddammodo circularis; ſicuti aliàs in parte externa dolente fortiùs compreſſa, dolorem quoddammodo ſiſti experimur.

Pulſus

Pulsus existit celerior, sed debilior, forsân simul durus: Debilior, ob spirituum depauperationem; celerior verò ex eorum impetu & dolore. Unde etiam, si vires magis fuerint prostratæ, deficiens nonnihil (quod tamen sine periculo est;) observatur, sicut tandem, si membranosæ partes doleant, simul durus is est.

Urina pallida à cruditatibus copiosis salibusque non rite combinatis, ut & sedimentum hujus lateritium à scorbuto latente, derivatur: nempe tria urina prædicit: statum digestionis primæ, secundæ, & partium urinariarum.

Et quemadmodum in Hypochondriacis ordinariò peccat acidum in subiecto viscido, quoad causam proximam; ita quoque Causa remota est hic cruditas acida; causa externa verò est frigus, quod semper inspissare solet mucum antea fluidum, & ita partibus magis impactum reddit, in quibus antea solutus fluctuavit. Imo proprium hoc est frigoris, ut quæcunque liquida, aquea & oleosa, adeoque succos in corpore nostro inspissent, condensent, & ad coagulationem disponant, sicque glutinosi idem magis fiunt. Speciatim quoque in nostro ægro præcessit refrigeratio pedum, quorum plantis cum abdomine intercedit consensus maximus, & consequenter cum capite: hinc, qui nudis pedibus pavementum perambulant, horum alii tormina abdominis incidunt, aliis vero alvus solvi solet, *sie bekommen leichtlich den Durchgang/ so barsüßicht gehen*: unde etiam, qui diarrhoeis aut dysenteria laborant, quò magis extrema, in specie pedes, refrigerantur, eò magis his symptomata excretoria exacerbantur. Hunc pedum cum abdomine consensum confirmat *Observatio* Hæferi in *Hercul. Medico*, qui ex pilulis, plantis pedum illitis, purgationem alvi copiosam excitatam vidit: quod omne potest ad nostrum affectum applicari. Quod autem à pedum refrigeratione affligatur abdomen, fit ob insignes nervos per crus descendentes, & in plantis pedum in fibrillas dispersos & desinentes: de quo consensu conf. Simon Pauli in *Digress. de Febr. Malign.* Aliàs quoad acidum in aëre contentum, cum nondum confirmata res sit ubique, an nempe illud nitrosum? an verò ammoniacale sapiat? nondum scimus: Ergò taceo hac vice, & decisionem suspendo.

PROGNOSIS.

Hoc unicum periculum subest, ne malo diutius progrediente, etiam intestina tenuia affligantur, & ita per accidens superveniat iliaca passio, cum affectus aliàs per se sit facile curabilis.

Tom. II. Pars 2.

CURAE.

Quoad Curam. Sicut nihil magis præter naturam est, quàm dolor; sic Medicus dolorum sublatione facile famam sibi parare potest. Hæ ergò Indicationes formandæ.

1. Dolor sistendus.
2. Symptomata reliqua maturè removere.

Quoad 1. dolor sistitur, vel causam materialem removendo, vel dolorem sopiendo. Unde respectu causæ removendæ ad duas proprietates, nempe ad aciditatem rodentem & pungentem, & hinc ad visciditatem pertinaciter adhærentem, respiciendum est. Cæterum dubium in antecessum occurrit: quidnam in hoc & similibus aliis doloribus intestinalibus primitus agendum sit? an nempe dolor prius sistendus opiat? an verò causa materialis peccans removeatur per evacuantia? Rationes dubitandi sunt:

1. Quia si opiat insistimus, saltem palliativè tales dolores curamus, causam materialem impediendo, & morbum quasi concentrando.

2. Si evacuantia primitus in usum vocamus, periculum est, ne iritemus crabrones, & dum intestina vellicantur, major dolor & graviora pathemata superveniant, cum evacuationis scopo planè frustraneo.

Pro decisione ergò respondeo cum distinctione: Scilicet:

(1.) Attendendum est ad id, quod magis urget, & an dolor prævaleat? ita ut exinde vel syncope, vel convulsivi motus vel alia similia pathemata metuenda sint? an vero magis urgeat materialis peccans humorosa causa, eaque sui remotionem indicet, sive jam copiâ, sive acrimonia, sive alia qualitate hostili dotata sit? pro diversitate harum circumstantiarum, siquidem nunc ab opiat, nunc à laxantibus, initium faciendum.

(2.) Distinguendum est inter colicam convulsivam & humorosam; nam in colica convulsiva opiat; in humorosa verò evacuantia magis conveniunt; cum contrà in convulsiva purgantia adhibita propter acrimoniam spasmos intestinorum magis exacerbent, nisi blande laxantia sint, & abdominis symptomata magis dolorosa reddant, imò evacuationem frustraneam faciant. Unde in convulsiva potius blandis opiat sensus dolorosus & spasmus intestinorum tunc temporis præsens, initio demulcendus, postmodum verò blande emollientia subjungenda. Humorosam autem colicam, cum opiat initio usurpata motum humoris impediendo, malum concentrent, & pertinacius reddant; hinc in convulsiva blanda lenientia conveniunt; in humorosa verò temperatis purgantibus cura auspicanda est.

[Y] 2

Distin-

(3.) Distinguendæ ante curam probe sunt partes affectæ seu intestina, quæ dolent: quæ si tenuia affligantur, conveniunt magis blanda laxantia per os assumpta; sin crassa, blanda abstergentia per alvum injecta, seu clysmata eligenda erunt.

(4.) Opiata nunquam solitariè in abdominis torminibus præscribenda sunt, sed ea in colica humerosa locum invenire debent, laxantibus admisceantur; uti contra in colica convulsiva, eadem opiata aromaticis, & imprimis castorinis, combinanda.

(5.) Purgantia proprie sic dicta nunquam in abdominis dolorosis pathematibus prosunt, sed potius, si scopus evacuandi necessarius videtur, laxantia saltem conveniunt, & perinde est, sive hæc abstergendo, sive emolliendo, sive lubricando, sive leviter fermentando, operentur, modò sine insigni stimulo operentur.

(6.) Circa legitimum purgantium usum observandum est, quod frequentius in talibus abdominis doloribus contingere solet, ejusmodi ægros sæpius quidem & egregiè purgari, sine levamine tamen, quia non evacuantur, quæ evacuanda erant, relictis scilicet evacuandis, morbum efficientibus. Quod ipsum etiam in hoc nostro ægro obvenit, & alio præterea in casu, quando nempe copiosus mucus viscidus intestinis crassis impactus eadem incrustans irritat; in tali enim purgantia per os adhibita, copiosa expurgant quidem recrementa ex primis viis & intestinis tenuibus, interim crassiora & viscidiora in crassis intestinis intacta relinquunt. Probo ex Salmuth. *Cent. 1. Obs. 78. p. 49.* introducente quendam ex torminibus colicis mortuum, in cujus toto intestino colo reperiebatur crassa mucago, id obsidens, hiscente saltem foramine ad digiti crassitiem, per quod tenues mucagines fuerunt translocatæ. In simili quidem subjecto copiosè quidem operantur purgantia: ast quod sine levamine id fiat non mirum est. Conf. Sennertus *l. 3. Prax. p. 201.* quo in loco allegatur Heurnius, Lipsio, post reddita recrementa ejusmodi viscida & pituitosa formam & characterem intestinorum præ se ferentia, tropheum de morbo acclamans; fuit enim pituita vitrea, quæ incrustavit antea intestina: Conf. Fernelius *lib. 6. de Part. morb. & symptom. cap. 9.* ubi coli ex toto pituita infarcti legitur exemplum. Igitur selectus inter purgantia habendus, & non tam vis eorum purgans, quàm alterativa & acidum correctiva respicienda.

Et quidem in nostro hoc casu magis laxantia, & his præmissis demum opiata, si opus videtur, locum habent; & illa quidem vel simpliciter talia, vel materiam viscidam

corrigentibus & incidentibus permista. Hæc inter ex regno vegetabili palmam auferre videntur Colocynthis & Gummata, speciatim gummi ammoniacum internè; sicut externè galbanum, & resina carannæ: ex regno minerali verò aurum fulminans, & Mercurius dulcis, vegetabilibus purgantibus ideo præferendus, quod is valde incidat viscida, & sine torminibus ac sine virium prostratione evacuet, adeoque simpliciter resolvendo & abstergendo operetur.

Notandum: Saltartari speciebus in clysterem decoquendis addendum esse ad ʒi. decocto verò ipsi jam facto gemmæ ad ʒi. quippe hoc, juxta Forestum, feces duras emollit, & visciditates incidit. Et quemadmodum clysmata terebinthinata in doloribus abdominis convulsivis, nephriticis & scorbuticis, aliàs egregiè conveniunt, ita eadem nostro in casu locum non habent: unde saltem sola urina humana sufficere potest pro clysmate adhibendo, cui, si libuerit, addendum quid de electuario hieræ picræ cum agarico, vel alio stimulante, & mel despumatum; sicut etiam fumustabaciano inflatus bonus est.

Opiata interdum clysteribus adduntur, si nimius sit abdominis dolor, aliàs non.

Externè olea carminativa egregiè se gerunt, imprimis oleum hyoscyami ad ʒiʒ. cum oleo carminativo Mynsichti, oleum Jovis, spiritus & oleum baccarum juniperi. Prodest etiam tegula calida imposita; omnia enim calida nervis amica, frigida verò inimica. Emplastrum de hyoscyamo, item decoctum hyoscyami, quo feliciter usus Drawitzius, convenit, cui in infantibus aliquid Theriacæ addi potest; vitandus potus frigidus, panis calidus, blandus calor eligendus.

Si acidum viscidum firmiter colo agglutinatum, fibras nerveas vellicando dolorem colicum producat, ille tamen, clysmatibus benè licet operantibus, persistat, vix aliis evacuari potest medicamentis, quàm gummi ammoniaco & Mercurio dulci. Cum ergò hic casus occurreret, clysmata operabantur quidem, sed dolor persistebat. Usurpabam alterantia antiscorbutica, antihypochondriaca, sed nil juvabant. Tandem sequentem formulam ex gummi ammoniaco præscribebam:

ʒ. ∇ *Menth.* ʒi.

G. xci in acet. sol. ʒʒ.

Qi Blat. gr. xv.

Scamm. rosat. gr. iv.

Extr. troch. alhand. gr. j.

Syr. de Pom. ʒʒ.

M. f. Potio: S.

Größnend Träncklein.

Est Potio amara, sed scopus erat incidere viscida per gummi ammoniacum &

tartarum vitriolatum; stimulan- s fuit extra- ctum trochiscorum alhandal. Ager exinde quindecim vicibus sine virium prostratione & torminibus cum euphoria purgatus fuit, & multa viscida rejecit, & symptomata dolo- rosa evanuerunt, aliis purgantibus & clyf- matibus causam morbi non attingentibus.

Timæus von Guldensee in usu habet vinum passulatum, quod pro hypochon- driacis & scorbuticis egregium est.

Porro præmissis hisce evacuantibus, ad aliquaedam alterantia progrediendum erat; unde remota per evacuantia causa, pro vo- mitu sistendo misturam sequentem propi- navi:

Rx. Δ Menth. \mathfrak{z} ij.
Cinnam. \mathfrak{z} vj.
succ. cydonior. \mathfrak{z} j.
— Oli gutt. vj.
ol. dest. Cinnam. gutt. iij.
Syr. Cinnam. \mathfrak{z} vj. M.

Bona est mixtura, quæ mox sistebat vo- mitus, & nauseantem stomachum egregiè levabat.

Interdum in casu necessitatis potest addi gr. j. laudani opiat.

Stercus equinum & Castoreum magis in colica convulsiva, quàm humorosa, con- veniunt.

Tandem usus absinthii, helenii & corti- cum aurantiorum curam absolvunt.

Veteribus systema nervorum, & eorun- dem distributio, non fuit nota; unde in qua- cunque colica mox materiam peccantem al- legarunt; ubi autem iisdem doloribus pare- ses supervenirent, non poterant se expli- care.

Si tamen his omnibus, dolores & alvus clausa pertinaciter maneat, & ob id metus sit Ilei, tria adhuc supersunt generosa remedia, quæ tentari possunt:

(1.) Sunt globuli bombardarum plum- bei deglutiendi.

(2.) Follis ano applicandus.

(3.) Mercurius vivus.

Quoad globulos plumbeos: deglutiun- tur No. i. ij. vel iij. De his curiosa est obser- vatio Welschii *Hecat.* 2. p. 19. ubi ileon ex omphalocèle incarcerata imminentem cu- ravit propinatis tribus globulis plumbeis, quorum maximus ponderavit \mathfrak{z} j. reliqui duo fuerunt minores: sic enim hernia sublata & alvus reclusa fuit; imò, quod mirandum, tertius globulus, maximus omnium, & ul- timò ingestus qui fuerat, primò fuit excre- tus, & sic antecessit minores prius assum- ptos, pondere suo adiutus. Sed suspecti sunt hi globuli ob sui pondus, quo in ven- triculi fundo manere possunt, qui metus non est de nihilo. Magis autem placet consili-

um ejusdem auctoris, quò globulos illos ex amalgamate Saturni & Mercurii vivi confici- endos jubet; sic enim in minori quantitate sunt ponderosiores: Vid. præter Hildanum Heinricus ab Heer *Observ.* 2. & Zacutus Lu- sitanus *lib.* 2. *Prax. Admir. Observat.* 27. præmittatur tamen \mathfrak{z} j. vel \mathfrak{z} ij. olei amygdalarum dulcium, ut viæ lubricentur, sic globuli tutò in hoc puncto in usum vo- candi. Follis ano applicatus pro intestinis dilatandis, Veteribus usitatus fuit, ut inte- stina à scybalis induratis, vel mucagine vi- scida oblinente, secedant, & scybalis dictis pareatur exitus: vid. Amatus Lusitanus. Sed modus hic hodiè paulò desuevit. Quoad Mercurium vivum, hic ad \mathfrak{z} ij. vel iv. cum aliis in forma misturæ propinari debet, si suc- cessus voto respondere debeat; non minor ejus dosis sit, cum ponderositate sua exigua molem præ se ferat, & aliàs frustra usur- petur.

C A S U S X V.

DOLOR HYPOCHONDRIACUS CUM HERNIA UMBI- LICALI.

*M*ulier alias obnoxia hysterica, seu, ut rectius vocantur, hypochondriacis passionibus, simulque admodum gulosa, conqueritur tempore hyberno de gravi do- lore punctorio in latere sinistro sub & infra costas nothas admodum acerbo & contu- maci ferè continuo, ita ut pars pertere- brari quasi videatur. Superveniunt et- iam nonnunquam vomitus, lateri affecto incumbere potest cum aliquali euphoria: quoties manum fortiter applicat regioni dolenti, eamque quasi introrsum premit, levamen percipit, utut non diu durans, appetitus prostratus, alvus respondet offi- cio, non tamen copiosè, quia parum co- medit. Dolor successivè exasperatur, ita ut repetitis ac vagis lancinationibus totum abdomen occupet, wann es kommt / so reißet es im ganzen Leibe / maxima ta- men tormina sunt in latere sinistro, ita ut & respiratio paulò profundior impedia- tur, quia ita respirando dolor exacerba- tur. Cruciatibus his per aliquot dies ve- xata, & hinc inde volvendo & jacti- tando se variè, quantum permisit do- loris ratio, continuo inquieta fuit. Me- dicus appellatur pro cura, qui, ut cò exactius totum negotium intelligat, con- trectat hinc inde abdomen, quod ubique molle & tractabile offendit, observat ta- men tumorem ovi pullinacei ferè magni- tudine à parte dextra, exactè è regione umbilici trium digitorum latitudine ab

[Y] 3

hoc

hoc distans, medio loco inter costas & ilia. Tumor est tactu mollis indolens, interdum plus, interdum minus prominens, qui & fortiori compressioni cedens & succidens, mox repullulat.

RESOLUTIO.

Affectus, quo ægra nostra cruciatur, est complicatus, ex Dolore hypochondriaco, & Hernia quasi umbilicali. Dolor est vel primarius, Hypochondriacus pungens & trebrans; vel secundarius, per illius quasi consensum, lancinans & lacerans ipsa in medio abdominis intestina. Hæc enim symptomata amico quidem inter se, ægræ autem summè molesto, fœdere illam vexant. Prioris quippe præsentia, præter causas antecedentes, ad sensum patet; ægra enim ipsa patefacit, dum de cruciatibus abdominis maximis conqueritur: Posterius autem nec hoc tactum, præprimis visum aufugit, cum tumor in abdomine præternaturalis sit dilucidè ejus cognitionem declaret; hinc enim tactu mollis, indolens, interdum plus, interdum minus prominens, imò fortiori compressioni cedens & succidens, moxque repullulans, quid aliud, quam prolapsum intestinorum sufficienter probat? Verum cum Practici non inconsultò distinxerint inter dolores intestinorum & ratione partis affectæ, & ratione causarum efficientium, hinc horum methodum insequemur, melioris cognitionis gratiâ dicendo; ægram nostram Dolore quoad affectam partem, Colico, & præprimis, quod ex situ clarum, Hypochondriaco, additaque simul speciei urgentis nomenclatura, lancinante & perterebrante; quoad causam verò efficientem, Humoroso, laborare.

PARS AFFECTA.

Quoad Partem affectam enim, quæ quænam sit? merito disquisitionem meretur. Dicimus esse huius mali subiectum ut quod, universum abdomen; hoc enim totum dolore laborare, etsi per consensum, dicitur: ut quo verò, erunt, ut remotum, intestina universa; ut proximum verò, intestina crassa, & præprimis colon, speciatim tamen flexura illa sub hypochondrio sinistro, quàm situs doloris manifestat; etsi interim hic minimè nervos, præprimis plexum eorum mesentericum, excludamus. Cum e contra, si ad posterius malum, Herniam puto, respectus fuerit, huius pars affecta seu proxima & primaria, est Peritonæum, quatenus hoc ipsum nimis relaxatum vel ruptum: cujus occasione intestina tenuia prolabantur, cum crassa firmius lumbis adhæreant, & cum his nihil herniæ sit negotii.

CAUSA PROXIMA.

Quod causam vero, hoc malum, atrocissima nempe tormina, inferentem, concernit, illam proximam statuimus esse irritationem, inductam ab acido acri austero, plus minus viscido, in intestinis hærente, illorumque membranam tam interiorem vellitante, præprimis autem præternaturalem acoris ejusmodi præsentiam sentit intestinum colon, & præsertim in flexura illa sub costis nothis in hypochondrio sinistro à figura sigmoidea dicta, hinc de gravi dolore pulsatorio in latere sinistro sub costis nothis, maxime ægra nostra conqueritur, & quidem ita, ut pars quasi perterebrari videatur. Dum autem acidum accusamus, tam cruditatum acidarum ex stomachi læsa digestionem, & fermenti fellei deficientia oriundarum, quam succi pancreatici præternaturaliter constituti, vitium hic deplorandum; acidum enim multum acre austerrimum, simulque materiæ viscidæ immistum, vitæ pituitæ nomine tunc notum, talium truculentorum symptomatum causa existit; non inconcinne enim Sylvius perterebrationem & sensum puncturæ acrimonie acidæ, fixitatem verò visciditatis comiti assignat. Siquidem gulæ errata cruditatum acidarum sæcundæ sunt matres, eò periculosiores excludentes fœtus, quò magis acidum vitiosum pancreaticum in muliere hysterica antea excesserit. Bigamiae ergo huic austeritati acriori & visciditati nuptus succus pancreaticus, intestina continuo & indefinenter vellicat & pungit, & cum ob suam mucilaginem viscidam in determinato quodam loco hæreat, pertinaciterque agglutinatis fuerit, hinc in specie in angulis intestinorum sub hypochondrio sinistro molestias illas infert, contumaces admodum & continuos dolores, ita ut & pars quasi perterebrari videatur.

CAUSÆ REMOTIORES.

Et hoc esse verum calcar efficiens, demonstrant causæ huius affectus remotiores, quæ sunt Cruditates acidæ ex stomachi digestionem læsa; hinc enim est, quod hystericis crebro conflitetur paroxysmis, à tali nempe acido plus minus austero ortis, quod eo magis liberiores suas exferit actiones, cum offenderit subiectum subtilius, foeminei putæ sexus, quibus semper nervorum systema sensibilius existit, hinc & eo promptius & dolores & alia symptomata ab acido tali hostili exasperari poterunt. Dum vero ægram nostram admodum gulosam fuisse constet, eo promptius natales suos accepit acidum hoc, hostilitatis nomine maxime odiosum, ab hac enim nimia alimentorum assumptorum copia fermentum stomachicum obrutum & hebes

hebes factum fuit, ut non sufficiat illis ingestis digerendis, hinc assumpta, accedente simul fermento stomachi nimis acido fixo, quod in hypochondriacis fatale est, abeunt in acorem peregrinum, massamque acidoviscidam, cum quidem accipiant acorem fermentativum, sed propter sui copiam non sufficienter fermentari & rite volatilari queunt, adeoque in pastam transmutantur, quæ deinde ad intestina delata, ibique hærens, cum succo pancreatico & bile, utroque succo; & illo quidem nimiam aciditate; hoc vero nimiam inertia peccante effervescens, talium dolorum atrocissimorum causa existit: ex quo deinde & alvus suo fraudatur officio, etsi pro ratione assumptorum, quæ in pauca quantitate ingerit, minus copiose iterum egerat: acor quippe hic ex immodica præcedente ingestorum copia natus, cum aliàs ægra nostra ventriculorum & intestina debilia habeat, delatus ad intestinum rectum, sui excretionem illud irritando promovet, hinc & hoc stante, cum nulla infarctionis illius à fecibus, aliorumve contentorum sit præsumptio probabilis ejus abdomen tactu molle & tractabile offenditur.

CAUSA ADJUVANS.

Nec inconveniens ad hoc malum inducendum est causa adjuvans, quæ est frigus hybernium; hoc enim non tantum ratione sui contentarum particularum acidarum, inspiratione haustarum, materialiter auxit tales acidos succos acres & austeros, sed & constringendo poros occasionem dedit, quatenus nempe aliàs per poros istos patulos mediante insensibili transpiratione eliminandi fuissent tales succi, & effluvia lymphæ præternaturaliter acidæ, quibus hoc tempore via interclusa, hinc ratione lymphæ pancreaticæ deferuntur ad primas vias, ibidemque turbas has excitant, quod nervose, si à naturali ad præternaturalem statum argumentari licet, Hippocrates innuit, tum illos maxime esurire asserit, qui tempore hyberno in nive ambulant.

Hic acor vitiosus etiam excitavit vomitum, vel propter consensum contiguitatis cum colo, vel propter consensum cum funiculis nerveis, pylorum simul investientibus, occasione harum causarum, vel plurium, affectus pylorus vomitum excitavit. Pungentis insuper alius acoris præsentiam experiuntur intestina crassa, præprimis colon, uti in hoc præcipuum fomitem hæere superius dictum, exindeque etiam doloris in sinistro hypochondrio pungentis natura explicanda. Accedit enim dolor iste perterebrans in intestini coli anfractibus & flexura illa, quam descendens in latere sinistro facit, quo loco, dum humores tales irritantes ad latus feruntur, illis

adhærent, & quasi perterebrari videntur, hinc cum ægra illorum exitum promoveat, dum lateri huic incumbit, cum ejus euphoria hoc fit. Quod manu hypochondrio sinistro admotâ levamen percipiat, fit tam propter flatuum impetum, manuum admotione retusum, quam propter spasmus, cujus vis contrariâ pressurâ imminuitur. Lancinationes intestinales ex consensu nervorum colicum plexu mesenterico, & inde natis spasmis nervorum ex dicto plexu distributorum, originem ducunt. Respiratio difficilis fit propter dolorem, quia diaphragma in profunda respiratione colon premente, dolorem exasperat.

Alterum affectum quod concernit; dictum fuit esse Herniam, quæ fortassis jectionibus illis incautè institutis natales suos debet, ut exinde peritonæum laxum præternaturaliter factum sit, quam laxationem postea intestina secuta fuerunt; ad quod etiam multum contulit fortis manuum in sinistro latere ad dolorem aliquo modo leniendum applicatio; sic enim intestina quasi vi propullâ fuerunt in latus dextrum; laxum autem peritonæum esse diximus? non autem penitus ruptum, cum ex historia constet, quod fortiori compressioni cedat & succidat, moxque repullulet, quod minimè nec tam facile fieret, si prorsus peritonæum fuerit laceratum, præprimis etiam cum tumor sit indolens; si enim peritonæum, membrana quippe, sit ruptum, probabiliter ob unitatem solutam necessariò, præcipuè in parte membranosa, dolor adesset.

PROGNOSIS.

Devolvitur jam ad Prognosin, in qua, quidnam de eventu sperandum? dicendum est. Lethale malum esse per se dolorem colicum, nemo facile dixerit, cum magis truculenter quam periculosè sit affecta ægra nostra, etsi, cum nimis contumax, & accedentibus convulsionibus corporis universalibus & epilepticis insultibus, malum possit fieri lethale; vires autem in nostra ægra fortes, morbus non adeo inveteratus, colica quoque quod fuerit humorosa, & crassa intestina præprimis affligens (utpote quæ curatu facilior) & alia benè ominari jubent, curabile malum præfigimus, modo rectè se gerat.

Hernialem vero tumorem quod attinet: in hoc etsi magis periculosè quam truculenter affecta sit, tamen nec hujus intuitu ægra quid habet, quod metuat: etsi enim aliàs hernia non careat periculo, interim tamen cum sit in nostra ægra minimè perfecta, sed adhuc in fieri, & non ex rupto, sed laxo peritonæo, hinc bonæ mentis sit ægra, cum eventum promittamus faustum, modo legitima remedia

media ritè & continuò cursu, cum non unus diei sit labor, adhibeat.

C U R A.

Ad Curam igitur ut aggressum faciamus, cum duplicatus sit affectus, & hæc diversis indicationibus, ad utrumque affectum directis, absolvitur. Et quidem dolorem colicum quod attinet; huic ut medicinam faciamus, erit eo dirigenda, ut

1. Causa peccans & irritans removeatur incidentibus & evacuantibus.

2. Irritatio ipsa dolorosa opiatas & appropriatis sistatur.

3. Tandem salibus volatilibus oleosis aliisque nervinis intestina irritata nimis læsa restaurentur.

Pro his ergo scopis obtinendis se offert fons Medicinæ Pharmaceuticus præprimis, dehinc Diatericus. Ex priori ergo statim remedia salutaria ægræ nostræ propinanda, proinde statim pro priori scopo obtinendo merito evacuatio materiæ peccantis præmittenda erit: hinc, cum vomitus hoc in loco planè non convenient, sufficit adhibere evacuantia per alvum; cumque malum præprimis hæreat in intestinis crassis, non inconueniens erit clysmata adhibere, eaque non tam incidentia quàm abstergentia, leniterque stimulantia; hinc commendamus illi sequens:

℞. *HB. alth.*

Malva

Parietar. ana M. j.

fl. Chamom.

Melilot.

samb. ana Mß.

bacc. lauri ʒi.

sem. anisi.

Carvi ana ʒi.

Coqu. in f. q. *∇ simpl.*

Colat ʒix. adde

Ol. amygd. dulc.

Chamomill. ana ʒi.

dest. Carvi.

bacc. lauri ana ʒß.

M. f. Clysma.

duabus vicibus tepidè injiciendum, quod abstergit vitiosos succos intestinorum: cui, si scopus fortius stimulandi, & ʒi. præter propter de sale tartari addi potest; sic enim saponariâ quasi virtute melius intestina abstergentur.

Vel fiat clysma simpliciter ex lacte, vel simplici, vel cui mel additum sit.

Præmissio clysmate, ut materia peccans, in stomacho & intestinis tenuibus hærens, evacuetur, purgantia per os assumpta non erunt incongrua; à fortioribus tamen immittens hernia nos avocat. Conveniunt ergo blandè evacuantia, & succos acidos destruentia viscidâque incidentia: præstat sic repe-

titis vicibus purgantia per epicrasin adhibere. Quò autem melius materia peccans acida viscida evacuetur, convenit unum alterumvè digestivum præmittere, quod materiam peccantem pro feliciore evacuatione disponit; hinc commendamus sequens:

℞. *ʒi. Glut. ʒß.*

Ol. dest. anis. gtt. ij.

M. S.

Digestiv. **Pulver.**

℞. *ʒi. ʒi. depur. ʒi.*

Ol. dest. anis. gtt. iv.

div. in 2. part. æqu.

D. S.

Digestiv. **Pulver.**

Quo præmissio, ad blandè alvum laxantia fiat accessus, hinc

℞. *MP. de ʒco Querc.* ʒi.

Extr. absinth. gr. vj.

troch. alhand. gr. ij.

c. ol. dest. anis f. Pilulæ:

D. S.

Purgier-Pillen auff einmal.

Vel si nauseat pilulas:

℞. *∇ Menth.* ʒi.

g. ʒci in acet. sol. gr. xv. ad ʒi.

scamm. ʒat gr. ij.

extr. troch. alhand. gr. j.

syr. ros. solut. ʒß.

M. D. S.

Purgier-Träncklein auff einmal.

Nec incongruum erit, aliquot vicibus in septimana assumere passulas laxativas, pro dosi ʒvj. vel ʒi. singulæ dosi semper tartari vitriolati ʒß. addendo, ut sit alvus semper aperta, acidum temperetur, illius vis infringatur, & blandè evacuetur.

Purgatis itaque primis viis, & evacuata saburra peccante, pro dolore sistendo

℞. *∇ Fænic.*

Menthæ ana ʒiß.

Ess. Castor. ʒi.

ʒci ʒß.

Ol. dest. cort. aur.

Chamom. ana gtt. ij.

Laud. opiat. gr. ij.

syr. Fænic. ʒß.

M. f. Potio: S.

Schmerzstillender Trank auff etlich mal.

Vel ℞. *∇ Fænic.*

Menthæ ana ʒiß.

ʒci anis. ʒiß.

Laud. opiat. gr. ij.

Syr. fænic. ʒß.

M. S. ut antè.

℞. *∇ Menthæ* ʒij.

ʒci ʒi.

Ess. opii ʒß.

Syr. Chamom. ʒß.

M. S. ut antè.

His

Dolor Hypochondriacus cum Hernia Umbilicali. 177

His ergò dolore mitigato, restat, ut nervis intestinalibus quoque succurramus, salibus præprimis volatilibus oleosis appropriatis; hæc enim curam absolvent. Hinc præter laudanum hystericum conveniunt hic imprimis salia volatilia aromatica, quæ acidum temperant, nervis amica sunt, eorum spasmos sistunt, & fermentum stomachi fixius volatilizando excitant: hinc

℞. *Chamomill.* ℥ij.

Elix. Menthe ℥vj.

— *Θ *ci anis.* ℥j.

fyr. cort. aur. ℥℔.

M. f. Potio, cochleatim haurienda.

Vel loco hujus recipiatur essentia castorei, quæ nupta cum bigamia essentiae corticum aurantiorum & essentia myrt hæ, egregiè convenit, dosi singulis vicibus gutt. xxx. in vehiculo calido.

Vel ℞. *Fl. Anis* ℥j.

Lapill. Ser. præp.

Succin. præp. ana ℥℔.

ol. dest. cort. aurant.

Chamom. ana gutt. ij.

Laud. opiat. gr. ij.

M. f. Pulvis pro 4. dosibus.

℞. *Sacch. albiss.* ℥℔.

ol. dest. Caryoph.

Cinnam.

Nuc. mosch. ana gutt. v.

M. in form. Eleosacchari.

de quo capiat ægra pro lubitu, quantum cuspidis cultelli detinere potest.

His internis simul Externa blando & amico fœdere sunt conjungenda, hinc

℞. *Ol. expr. nuc. Mosch.* ℥℔.

dest. Chamom. ℥j.

ruta ℥℔.

M. D. S. **Eufferlicher Balsam.**

qui largiter abdomini quàm calidè inungatur, postmodum sacculus abdomini imponatur calidè, qui

℞. *Fl. Chamom.*

sambuc. ana M. iij.

bacc. Junip. ℥j.

M. f. Sacculus.

Restat jam, ut & alterum oculum manumque auxiliatricem adhibeamus alteri affectui, ægram nostram magis periculosè quam atrociter affligenti. Ad hernialem itaque hunc tumorem carandum his Indicationibus insistimus, ut nempe

1. Intestina prolapsa reponantur.

2. Peritonæum laxius redditum consolidetur, ne denuò excidant.

Quibus scopis satisfaciunt præprimis externa, cum interna jam superius in cura doloris colici laudata sât fortia sint ad sistendam irritationem, quàm maximè hîc metuentiam. Conveniunt ergò externè, & quidem

Tom. II. Pars 2.

pro priori scopo anodyna carminantia tepidè applicanda, hinc levi pressione manuum adhibita inungatur locus læsus oleo amygdalarum dulcium cum oleo destillato carvi, fœniculi, &c. acuaturn; aut loco horum unguentum Mynsichti ad hernias; vel stercus ovillum in dulci lacte coctum tepidè in forma cataplasmatismis imponatur, hinc ægra supina in lecto quieta detineatur. Ut verò peritonæum consolidetur & firmetur, ne denuò decidant intestina, hinc internè conveniunt Consolidantia vulneraria.

℞. *HB. perfoliat.*

plantag.

sympb. maj. ana M. j.

rad. consol. Maj.

torment. ana ℥℔.

sem. Fœnic.

nasturt.

perfoliat. ana ℥ij.

Caryophyll.

Galang. min.

Nuc. Mosch. ana ℥j.

Coqu. in f. q. Vini, Colat. ℥vj. adde

fyr. de sympb. Fern. q. f.

D. S. **Heilender Trank.**

De quo subinde ægra haustum pro lubitu capiat, dissolvendo in quolibet haustu calido vel spermatis ceti ℥j. vel addendo balsami sulphuris guttas sex.

Externe simul applicentur adstringentia vulneraria: hinc commendatur emplastrum de herniaria Mynsichti, aut loco hujus inungatur parti affectæ oleum lacertarum cum balsamo sulphuris mistum, & tepidè applicatum, imponendo desuper vel emplastrum de racamahaca vel diasulphuris Rulandi, quæ per aliquot dies cum debita & concinna ligatura adhibeat.

Interim ægra nostra in lecto quieta cum stricta & tenui diætâ degat, imprimis sibi à frigidis caveat.

CASUS XVI.

COLICA CONVULSIVA HABITUALIS, CUM EPILEPSIA CONJUNCTA.

Juvenis Nobilis in adolescentiæ constitutus annis, jam diu est, quod abdominis patiebatur tormina, quæ vocant die Colicæ / ita quidem, ut, quoties vel dulcia vel facile fermentescibilia, tantillum licet horum, comederet, mox patitur dolores colicos, dicebat: Es reisse ihn so sehr um den Nabel / und sey eben / als wenn sich krümmt / oder windet; unde etiam extratales paroxysmos sæpissimè, circa istam mediam regionem umbilicalem, aliquem dolorem percepit, cetera

{Z}

licet

*licet sanus. Cum dicto malo subinde etiam subitaneis corripitur paroxysmis, in quibus sensu & motu omni subito evanescente, subito corruit & prosternitur, nescius, quid secum agatur. Adstantes tamen tremere eum, & oculos hinc & inde contorquere dicunt. Evanescente hinc pedetentim hoc ipso pathemate, sanus ad se redit. Ingruunt hi paroxysmi præsertim, quoties à terrore aut iracundia nimis subito corripitur. Abvi naturaliter paulò siccioris, constitutionis incæteris est scorbutica, circa cubiti articulos pustulas scabiosas & crustosas cum pruritu patitur, manantes subinde sanie. Fit interdum, ut utrumque jungatur malum, ita, ut ex dulcium esu patiatur mox tormina abdominis, wenn es ihn dann so reisse und kni-
pe im Leibe/ so steige es allsachte höher/und käme ihm ans Herz/ also daß er denn nicht wüßte/ wie ihm weiter geschehe; tunc corruit, & supra dicta symptomata patitur. Hæc ipsa propter mala continuo fasciâ vel zonâ coriaceâ firmiter hypochondria cingere solet, ut quantocyus colicam suam, ut vocat, ingruere persentit, zonam illam firmiter contrahere, & hypochondria arctè stringere queat, cum in finem, ne intantum exacerbetur totus paroxysmus, sed hac ipsâ ligaturâ mediò quasi sui impetu coerceatur.*

RESOLUTIO.

Affectus præsens quoad exactam Theoriam est perplexus quidem, in Praxi tamen sapius observabilis, & propter casus similes sæpius occurrentes proficius, Veteribus ob neglectum nervorum usum sub Colicæ nothæ nomine absconditus, vocatur Colica convulsiva seu convulsiones colicæ propter intestina; quia complicata est cum insultu epileptico paulò leviori, vel si *desideretur* Theoreticam adhibere velimus, hic morbus Iliacus potius quam Colicus dolor dicendus esset, eò, quod iliapræ cæteris maximè tententur. Interim, cum hoc negotium non sit magni ponderis, proinde etiam sine noxa ægrorum confundi potest.

Cæterum, dum Colicam convulsivam allego, duo consideranda veniunt:

1. Convulsio.

2. Consensus partium, quo mediante colica convulsiva alias partes affectit convellendo.

Scilicet quoad 1. Colicam: distinguimus in humorosas, quæ in Praxi raræ sunt; & convulsivas, quæ omnium frequentissimæ, oriundæ ex convulsivis motibus intestinorum & viscerum spasmis: imò, si colica humorosa, qualis vulgò describitur, affligit,

ea ut plurimum quoque cum spasmis intestinorum complicata esse solet. Atque tali convulsivâ colicâ affecti ut plurimum de doloribus lancinantibus, lacerantibus & contorquentibus conqueruntur, innuentes hoc ipso intestinorum spasmos, quorum ratione & ipsa humorosa colica, primario ab humoribus, secundario ab excrementis & flatibus, ordinario affligentibus, dependens, cum clausa alvo conjuncta est, ut etiam quandoque clysmata officium suum præstare nequeant. Dum enim humores contenti intestina vellicant, hæc convelluntur, stringuntur, & aliquid convulsivi patièdo angustantur; adeoque consequenter transcuntibus flatibus vel excrementis via intercluditur.

Dolores dicti lacerantes ut plurimum sunt convulsivi & frequentissimi, reliqui vero distendentes, & pulsantes, à contentis oriundi, rariores sunt. Ac ipsa infantum tormina intestinorum ab acido lactis corrupti nervos vellicante derivandæ, cum spasmis tamen & tensionibus sunt conjuncta; quod apparet ex abdominis tensione spasmodica, & interdum sunt prodromi epilepsiæ.

In hac colicâ convulsivâ, ut modus fieri melius intelligatur, considerentur pathemata nephritica, si scilicet calculus per ureteres pelvim renum intrat, ob laceratos & contractos nervos tormina abdominis atrocia, nausea, vomitus continui, tenesmus, &c. affligunt. Imo nunc temporis sub cura habeo nephriticum, dolorem usque ad scapularum regionem extensam sentientem; ac Bartholinus meminit in *Epist.* hemicranii istius præcisè lateris, cuius reñ calculo fuerat obiectus; quæ pathemata omnia per nervos affectos, ex plexibus mesenterii derivatos, qui in renibus dolorum sunt organa, & furculos derivant ad stomachum & intestina, explicanda veniunt; non secus ac puncturam nervi in brachio sequitur convulsio & spasmus totius brachii: pari ratione, si afficiantur nervi intestinorum, eorum spasmus & contractura sequitur. Et tales colicæ convulsivæ sunt, quæ mulieribus hysteris, hypochondriacis, scorbuticis, febribus intermittentibus malè curatis, superveniunt: imo ipsi parturientium dolores nil sunt aliud, quàm spasmi uteri, intestinorum, & partium membranarum connexarum; hinc fit, quod aliquando, notante id Hæsero, nephritica mulier gravida ex urgentibus doloribus se ad partum procinctam putaverit, uti contrà alia prægnans se nephritide esse affectam, loco tamen calculi, quem accusabat, partum ediderit.

Horum dolorum colicorum convulsivorum hinc inde vestigia leguntur apud Præcticos veteres, qui propter neglectum nervorum minus

minus rem capere valentes, subinde dolores colicos nothos allegant: Vid. Matthæus Martini *de Morb. Mesenterii* pag. 95. cum quo confer etiam Thiermayer *Conf. & schol.* ubi rectius colica ista pathemata à convulsionibus intestinorum deducuntur; secus enim mutationis colicæ in paresin ratio reddi non posset.

II. Quoad consensum partium; sanè hic ab omnibus allegatur quidem, non tamen ab ullo rectè explicatur; vid. Sennertus in *Paralip.* & Sanctorius Sanctorii præ omnibus aliis Patavinis maximè curiosus, partim in *Commentar. in Art. Parvam Galeni*, partim in *Meth. Vitandi Error. in Medicin.* item Barthol. Bauserus *de Consens. part. humani corp.* Anno 1656. evulgatus. Summatim: consensus partium præsupponit sensum; sensus verò præsupponit fibras nerveas, ceu organa illius proxima: unde sequitur, consensum propriè sic dictum simpliciter locum habere inter partes nerveas connexas sensu instructas. Dico notanter: Consensus partium propriè sic dictus; nam distinguitur ab hoc consensus impropriè sic dictus, qui ratione metastaseos materiæ contingit mediante sanguinis circulo: ita siquidem mammarum cum utero consentiunt, quatenus mensibus suppressis cancer in mamina latens, exulceratus & manifestus redditur; non secus ac testes quoque hac ratione cum capite conspiciant, dum illis epithemata refrigerantia applicata ebrietatem arcent, atque hæmorrhagiam & similia tollunt. Aliàs consensus propriè dictus fit tripliciter; vel enim inter partes sibi continuas, vel contiguas, vel denique mediantibus funiculis nerveis invicem connexis. Et hic postremus huc spectat, & ubique in corpore observatur ex communi trunco. Hinc tam mirabilis est structura nervorum, præcipuè nervi intercostalis & paris vagi seu octavi aliàs dicti. Cateroquin multa ignota Helmontius habet in *Ignoræ Actionis Regimine*; eaque est nil aliud, quam consensus partium, mediantibus nervis: hinc renibus patientibus, universa abdominis viscera consentiunt. Causa verò, quod induxerit Actionem illam Ignotam, fuit, quia Anatomie modernæ ignarus conatus est easdem excogitare; cum tamen universa abdominis viscera, ut dixi, saltem consentiant, quatenus nervicorum ex plexibus communibus ortum ducunt.

Pars affecta, quæ est mesenterium & intestina, duo considerata sistit.

(1.) Nervosum genus delicatius.

(2.) Quod affectus hic simillimus sit passioni hysterice.

Quoad prius, nempe generis nervosi delicatioris structuram; concipiendum hic erit discrimen, intercedens filum sericeum sub-

Tom. II. Pars 2.

tilius, & lineum crassius, *unter ein seiden Faden und groben Zwirn / einen bindfaden und Pfennigstrick* / mulierem delicatam & rusticum robustum, quorum illi similis videtur structura generis nervosi in virginibus; huic verò rusticorum comparanda est, ut & reliquorum mechanicorum conformatio nervosa. Unde etiam rusticus non nisi à graduato objecto feriri & affici potest: & quemadmodum in illis fibræ nerveæ sunt teneræ, tenues, molliores, & flexibiliores, unde filamenta nervea delicata a levissimo objecto in varios motus & vibrationes concitantur, simili ratione, ac subtilis chorda facilius movetur, quam crassa; ita fibræ rigide sunt in rusticis; & quemadmodum a levi objecto cæteris paribus iisdem alteratio aut motus humorum aut motus succorum longè sensibilior & enormior est, & symptomata graviora inducuntur, quam in corpore robusto; ita medicamenta quædam nos tam fortiter alterant, alios non.

Quoad alterum autem: sanè verissimum est, hunc nostrum affectum esse passioni hysterice simillimum. Et ponam, cum afflixisset mulierem quandam, tunc omnes Practici dixissent, esse passionem hysterice, *Es wäre Mutter-Beschwehrung* / adeò colica virorum convulsiva, & hysterica mulierum passio, sunt unus idemque morbus, in radice absolute coincidentes, utut secundum symptomatum varietatem, propter subjectorum diversitatem, soleant esse diversi: hincque meritò rejiciuntur ista nomina: Hysterica passio, ascensus uteri, &c. & substituitur eis Suffocatio Hypochondriaca, quæ nil aliud est, quam convulsiones colicæ, maribus pariter ac foeminis, ex fomite hypochondriaco communes.

Equidem vulgò duabus notis à colica virorum convulsiva distinguitur hysterica passio scilicet:

(1.) Ratione sensus globi, hinc inde in abdomine commoti.

(2.) Ratione majoris suffocationis in hac versantis.

Sed quoad prius respondetur: rarò mulieres percipere talis globi ascensum; qui nihil aliud est, quam motus intestinorum contractivus, neque omnes hysterice cum experiuntur; ut taceam contrarium exemplum ejusdem phænomeni, in viro observati, motus scilicet globuli, a Willisio allegatum. Suffocationis etiam metus nec semper hysterice urget, & viris quoque non rarò accidit; sicut dantur hysterice quædam, quæ præter suffocationem simplicem, nulla abdominis symptomata alia sentiunt, aliæ alia pathemata sine suffocatione percipiunt: Sic juvenes hypochondriaci quandoque maximâ suffocatione laborant: Sic curavi olim Studiosum Francum, nomine *Crausened* eumque

[Z] 2

hypo-

hypochondriacum, qui omni noctis meridie experiebatur sibi esse, **als wann er mit der Presse zugeschnüret würde.** Restituebatur tamen per carminativa volatilia & Martialia. Similiter alium hypochondriacum terrefactum, convulsivam colicam incidentem, curavi spiritu volatili urinoso cum laudano opiato, &c. Conquerebatur de flatibus, qui hinc successivè adscendebant, & suffocationem inferebant, post sudor eveniebat.

Quoad causam proximam hujus colicæ convulsivæ; præsupponens ubique spiritus impetum facientes, dico, eam esse acre acidum peccans scorbuticum? quod confirmabant in casu nostro pustulæ circa cubitum & ulcera scorbutica sanie manantia, quibus non rite fluentibus ejusmodi ager pej⁹ se habebat.

Jam quaritur: qualenam acidum acre scorbuticum hoc sit? De hoc variæ sunt opiniones: sed an sit acidum acre salsum? an austrium? an verò rancidum? hoc determinari nequit. Caterum, cum generales sapes non sufficiant, sed sicuti sapes sunt milleformes, ita etiam acida in nobis peccantia differunt; uti in specie in medicamentis appropriatis præter generales sapes etiam specificus sapor datur: ita simili ratione speciales humorum præternaturalium sapes sunt investigandi. Interim cum fermentorum internorum & humorum in corpore nostro crasis nobis nondum adeò sit perspecta, proinde nec aberrationes eorum ac reliquorum humorum præternaturalium cognitæ habere possumus; quia fermentorum & succorum proprietates naturales præcisè adeò nondum sunt cognitæ. Ac hinc est, quod remedia, specifica dicta, empiricè magis quam dogmaticè administremus; ubi quidem scimus, quod ea profint, sed quomodo? cum omnibus nescio.

Urina non rarò signum Scorbuti præbet, cui si cauda pavonis (**eine Fertigheit**) supernatet, & de præsentia scorbuti non est dubitandum.

Quoad spirituum verò motum effertum; possumus suspicari, concurrere quendam motum explosivum secundum Willisium. Nam ipsi Moderni effervescentiam ex vi elastica particularum alcalinarum derivare volunt; quæ tamen vis elastica in statu sano forsan locum non habet, unde illa fortean solum in statu præternaturali concipienda est.

Porro causarum remotarum duæ insinuantur, quarum

1. Est dulcium usus, contenta corporis nostri in fermentationes p. n. concitans.
2. Pathemata animi, ~ impetum facientes turbantia.

Jam quoad I. observandum: dulcia quoque esse concreta salsa pingua, constantia ex

acido & urinoso; cum oleo unita, neutro modo se habentia, adeoque non nocent præcisè, quod ipsa fermentescant, sed quod fermentorum instar se habeant, & camarinam fermentescibilem moveant; unde in minîma quantitate interdum valde sunt activa; pro ratione autem succorum, quos fermentando movent, ipsa diversimodè corrumpuntur, ita ut nunc acescant, nunc bilecant. Taliter constituta subiecta conqueri solent: **Sie dürfen nichts süßes essen / auch nichts saures.** Dulcia nocent: acida etiam: Quid ergo? Verum datur tertium, nempe amarum: quæ ipsa amara, ut juxta Forestum, absinthium, hypochondriacis & mulieribus hysteriis sunt convenientissima, juxta quæ & acria volatilia oleosa & aromatica excellunt, ut castoreum, myrrha, &c.

Quoad posterius; ira & terror, utut contrarii sint affectus, eundem tamen hîc præstant effectum in nostro ægro. Scilicet præsupponimus, in ira impetuosè moveri spiritus, à quibus omnes corporis succi, quasi vi, protruduntur: quod & probo ex corde insigniùs motu, unde rapidior sanguinis circulatio, & hinc necessariò & reliquorum liquidorum contentorum vehementior commotio contingit, atque sic humores acriores faciliè in actum secundum nocendi deduci poterunt. Terrore autem spiritus concentrantur & hebetantur, hinc cessante quodammodo spirituum impetu contenta corporis nostri spontaneo fluxu diffluunt & elabuntur, ob organa flaccida & relaxata, unde & motus & facilis eorum corruptela, sicque laxatis & quasi resolutis partibus propter spirituum defectum sudor frigidus apparere solet.

Porro quoad generationem hujus acidi acris scorbutici, tam ad digestionem primam in stomacho celebrandam, quam ad ejus perfectionem in duodeno à succis bilioso & pancreatico dependentem, & hinc ad excrementa quoque in intestinis stabulantia respiciendum erit; vitia enim digestionis primæ vitiant contenta corporis, quæ vitata iterum digestionem primam vitiant.

Ab acido hoc abundante quoque, stercora coagulante, oritur alvus naturaliter paulò siccior: sicut è contrario alcali bilis acido contrarium, intestinorum excrementis debitam fluiditatem conciliat, quatenus hoc in ipsorum sulphur agens, colliquefaciendo ea dissolvit, hinc putredo secum, eorumque fœtor.

De sanie notandum: eam ex ulceribus scorbuticorum emanantem nonnunquam corium sive cutim erossisse propter acrimoniam. Distinguiturque ea à puri, non tam ob materiæ, quàm efficientis conditionem; etenim idem sanguis & in pus & in sanie fatiscere potest. Interim si peccans fermentum

tum

tum fuerit acidum temperatius, minus agens, dabit pus falsius, spissum & crassius; contra si illud fuerit acido-acre, magis colliquat nutrimentum corporis, unde generabitur sanies diluta magis. Hinc dicunt: pus est melius seu minus malum, quam sanies; innuit enim fermentum mitius.

Quoad istud verò pathema, quod scilicet æger noster conqueratur de adscensu quasi auræ ex abdomine ad cor (*das Aufsteigen zum Herzen*) sanè hic sensus adscensionis per frequens est in ægris, tam viris quam feminis, & non imaginarius, sed verus. Percipiunt enim præternaturalem circa præcordia alterationem, dicentes: *Es wäre ich nen so weichlich*. Ac qui sibi hoc pathema imaginari volunt, considerent pathema illud, quod quidam ex terrore subito contrahunt. Caterum, dum dicunt: *Es steigt ihnen ans Herz*/ non patitur cor, sed est vana illorum persuasio, symptomata orificii ventriculi sinistri cum cordis pathematibus confundentium; & si in talibus anxietatibus afficeretur cor, necessario illud etiam palpitaret; unde illud est insens, & simpliciter in tali casu orificium stomachi sensibilissimum laborat. Jam vero quæritur: quomodo stomachi orificium afficiatur; Duplex sententia hac in parte oberrat; alii quippe per vapores & halitus ad cor adscendentes id explicant; alii per texturam mirabilem nervorum ex plexibus mesenterii oriundorum, & hinc dependentem consensum partium. Equidem quoad halituum & vaporum motum illum, verum illud Hippocratis est: Totum corpus est transpirabile: Ita siquidem Mercurius vivus plantis pedum pro Cura luis Veneræ applicatus, ad os penetrando, salivationem & pathemata oris causatur; & cantharides nuchæ impositæ mictum dolorosum inferunt. Interim perspirabile illud nimis extenditur; unde videmus alios, qui spiritus hinc sylvestres accusant, ubi pariter non negamus, sæpius ex hypochondriis spiritus flatulentos vagari hinc inde, qui etiam in stomacho graviora inferunt pathemata: id quod patet ex emissionem ructuum, per quam hysterica non raro levantur, nullum tamen in nostro hoc casu ejusmodi halitus locum habent; nam neque borborygmi neque ructus vestigium hic reperitur: quale quid etiam ex historia morbi non patet. Unde potius concludendum est, rem se hoc loco habere, ac in nephriticis, in quibus calculus tenesmus, vomitum, &c infert, non per vaporum adscensum, sed simpliciter per continuatum spasmum seu convulsionem partium nervosarum, mesenterii & reliquorum viscerum, ratione nervorum ex plexibus mesenterii prodeuntium. Scilicet mirabilis nervorum in automato corporis

nostri structura, rotularum in automato artificiali vices gerit, à quibus omnis motus organicus simpliciter dependet: Quo loco etiam præsupponimus, singularissimam illam & maximè admirandam texturam nervi intercostalis, ex ramificationibus paris quinti & sexti enati, ut & nervi vagi seu octavi: vid. Willisius, quorum connexum & distributionem si consideremus, tanquam in speculo cernere possumus, quomodo partes consentiant? Lipothymia ergo in hoc casu dependet ex interrupto spirituum animalium in cerebro ad stomachum motu, unde luce eorum plus minus eclipsata cessant functiones animales, utut impetu facto denuo proruant in nervos quosdam, sed cum convulsivo impetu. Dantur observationes, in quibus confirmatur, perceptum fuisse in pollicis extremitate sensum vellicationis, ex illoque quasi auram petiisse caput, epilepsiâ superveniente, Vid. Hildanus. Eadem planè ratio est auræ ex mesenterio adscendentis, quæ similiter est spasmus continuatus: nempe fibræ solum motrices spiritibus animalibus irradiantur, reliquæ partes iisdem ferè destitutæ languent, hinc illorum defectu & calor debitus deficit, & hinc frigoris sensus occupat partes. Scilicet tria symptomata in Praxi frequentius occurrunt, quorum

(1.) Sunt tormina seu motus convulsivi interni *die innerliche schwähre Noth*.

(2.) Sensus & motus cessatio subitanea, quam vocant *die Ohnmachten*; &

(3.) His succedentes manifesti motus convulsivi, quod nominant, *die schwähre Noth bricht aus*.

Unde non novum est, hystericas, imo nonnunquam parturientes sub ipso partu epilepsiæ insultum experiri, cum præsertim noscam mulierem, toties epilepsiâ corporis totius correptam, quoties partum sustinet, ut hinc quoque semper nescia pariat.

Fascia autem & zona confert, quatenus inhibet motus convulsivos, non verò quatenus vapores sursum adscensuros prohibet; omnia enim sunt plena, quod probatur: Si enim, aura frigida putatitia adscendente maturè ligatura fortis membro supernè injicitur, prohibetur motus convulsivi atrocitas. Et sanè halitus in tali casu non subesse, patet ex eo, quod vulnere capitis graviori, ita ut vel tenuis seu pia, vel dura mater fuerit læsa, superveniant per consensum vomitus biliosi? ubi tamen nemo sibi persuadeat, velim, descendisse vapores ex capite ad stomachum & intestina, non secus ac stomacho, vitiosâ saburrâ molestato, sentitur cephalalgia, concitato vomitu evanescens, ubi sanè non halitus ad caput adscendunt, sed fit per continuatos spasmos. Illustrasti hoc observatio-

nes epileptiarum, ex particulari membro enatarum, quarum paroxysmi injectâ zona vel fascia avertuntur.

De differentia colicæ convulsivæ in habitualementem & accidentalem, vid. Willisius de *Morb. convuls.*

PROGNOSIS.

Quoad prognosin, & quidem eventum morbi: Vita aut facultas vitalis per se hic nil patitur, sed afficitur facultas animalis in nervoso genere, & exercitu spirituum animalium radicata: utur etiam per accidens illa compatiatur cessante nimirum cordis motu, qui tamen vix metuendus, cum malum sit transitorium. Ergo periculo vitæ caret æger, quamquam metu penses non careat.

Cæteroquin morbus propter scorbutum est quidem chronicus, & propter hunc curatu difficilior, non tamen impossibilis, cum præsertim æger sit juvenis; interim idem ex sua natura scorbuticus, requirit curam ut diximus chronicam.

CURA.

Quoad Curam, considerandum est duplex tempus: in paroxysmo scilicet, & extra paroxysmum.

In paroxysmo iterum duo tempora notanda; principium scilicet morbi; & incrementum ejus, quamdiu nempe dolores urgent, dein ad statum ejusdem, quando convulsiones epilepticæ & lipothymicæ superveniunt.

In principio ergo & incremento *respicendum est*

1. Ad acidum acre scorbuticum vellians.

2. Ad spirituum impetum & inordinatum motum hincque natos dolores.

Adeoque ratione illius salia volatilia oleosa; ratione posterioris verò opiatæ & nervina locum habebunt.

Principium à clysmatibus fit, quæ in specie cum lacte parata, temperata puta, & demulcendo intestina, illorum spasmos & dolorificam convulsionem remittere faciunt, in his casibus sunt optima; cum contrà acria spasmos augeant, & magis alvum claudant, quia magis irritando spasmos augent & malum magis exasperant. Hinc Horstius in *Observ. pag. 395.* clysmata nocturna ex lacte, h. e. per integram noctem retenta, & in specie in abdominis pathematibus ex scorbuto proficua, expertus est: quale quid etiam observavit Drawizius in *Schmerzmachenden Scharbock.* Præter quæ tamen etiam clysmata ex tabaco parata non contemnenda sunt, quorum applicandorum rationem tradit Bartholinus in *Hist. Anatomicis*, ubi notandum: egregia fuisse illa in colica dolorosissima, do-

lorem sistendo, & stimulando. Insuper clysmata ex terebinthina & urina humana in omnibus affectibus torminosis, & flatibus, sunt convenientissima: Vid. Zacutus Lusitanus in *Prax. Admir. lib. 2. Observ. 25.* ubi clyisma ad §viii. ex urina pueri cum melle despumato factum, in colica ferè desperata commendat; itemque Scholzius in *Consiliis*, Gesnerus in *Epist. & Valeriola.* Adhæc cum terebinthina sit nobile simplex, nervis amicissimum (quando enim nervus in inepta venæ sectione à Chirurgo pungitur, oleum destillatum terebinthinæ cum felici successu instillatur) illa quoque vel in vitello ovi dissoluta, vel ejusdem oleum destillatum clysmatibus addi potest: clysmatibus additur in nephritide & morbis convulsivis, non quidem ob vim diureticam, sed ut remittant spasmi, partim abdominales, partim renales.

Sed quæritur: an etiam opiatæ & castoreum clysteribus addi queant? Resp. Omnino; nempe castoreum vel similibus coquitur, vel colaturæ additur extractum castorei à §ß. ad §j. Similiter opiatæ in affectibus dolorosis abdominis combinari poterunt; vid. Deodatus in *Valetud. p. 216.* qui syrupum papaveris albi ad §j. tam in dysenteria quàm in colico dolore, clysmatibus immiscuit: idemque fecit Willisius in *Pharm. Rational. p. 129.* Theriacam ad §ij. addendo; ubi alii Philonii Romani §j. ad §ij. admiscunt: sicut & locus ille Borelli *Cent. 4. Observ. 92.* notandus venit, ubi in colica dolorosa opii §ß. addendum monet, cum adjecta cautela, ne excedamus in dosi, ob metum soporis insequendi, quæ confirmantur à Salmuth *Centur. 2. observ. 97.* ubi mulier quædam ex opii §j. clysmati addita, Coma soporosum incidit, sed curata est per aliud clyisma ex vino Malvatico. Opiatæ ergo debite cum aliis ingredientibus addantur.

Purgantia autem in paroxysmo adhibita non conveniunt, sed exacerbant malum, unde potius Lenientia, v. g. passulata adhibeantur; adeoque præter decoctum passulatum, & passulæ laxativæ usuales erunt optimæ, quarum compositionem egregiam Timæus & Zwelfserus in *Pharm. Reg. pag. 209.* habent. Cæterum passulis laxativis commode adjicitur aurum fulminans: nam cum superiori anno curandum haberem juvenem colicum, præscripsi eidem passularum laxativarum §j. unde ter aut quater purgatus fuit. Alio tempore

R. Passul. laxat. §ß. adjeci

Öi fulmin. gr. jv. Miscui.

hinc ultra undecim vices fuit laxatus. Imò observavi idem in infantum torminibus dolorosis, gr. j. vel alterum istius auri, pro stimulo

Colica convulsiva Habitualis cum Epilepsia conjuncta. 183

mulo aliis additum, etiam proficuum esse.

Convenit etiam Riverii Infusum sennæ alcalinum, quod hinc inde præscribit in observationibus; item serum lactis cum syrupo rosarum solutivo.

His præmissis salacre scorbuticum cortigendum. Primatum hic obtinent chalybeata, castorina, salia volatilia aromatica, diaphoretica, & hinc opiota, quæ utramque faciunt paginam. Unde est, quod singulare sit fuligo furni, in specie hystericis proficua, assumendo ejus ℥ss. ad ℥j. cum paucō aceto, & expectando sudorem. Alii spiritum fuliginis ad Colicās in usu habent; & par ratio est.

Quodsi autem extemporaneum remedium obtinere gestias, accipe stercus equinum, quo non melius datur in passione hystERICA, exprinendo succum cum vino, & hauriendo hinc sudorem expectando: Vid. Welschius *Hecat.* 2. 32. Et sanè stercoꝝ animalium aluminosa planè singulārīa continent; hinc enim est, quod stercus lupi à Panatollo *Pent.* 3. *Observat.* 36. commendetur; sicut etiam alii stercus columbinum ad colicām desperatā, exprimendo succum cum lacte extollunt. Aliās quoque specificum dant testiculi equorum exsiccati & pulverisati ad ℥j. sumpti, qui ipsi etiam ad partum, & dolores quoque post eum, itemque ad colicām convulsivā, euporiston sunt. Pariter hic convenit priapus tauri, cervi ac ceti; non secus decoctum sclæræ, (*Scharlach*) quō aliās œnopolæ pro fucando vino utuntur. Olea autem destillata aromatica non semper æque conveniunt; nam ubi in specie acidum viscidum offendunt ea, patiunt copiosos ructus, qui emissi levamen suggerunt; retenti verò insigniores anxietates creant propter flatulentias. Unde abstinemus ab his; quin potius præscribo in talibus ægris talem formulam:

℞. ▽ *Chamomill.* ℥ij.
 ~ *Cochlear.* ℥ij.
 Θ*ci ℥j.
Laud. hyster. gr. vj.
Syr. cort. aurant. ℥ss.
 M. D. S.

Uindernd Träncklein.

Hauriatur cochleatim cum blando sudore, qui finem paroxysmi accelerat. Vel

℞. ▽ *Mentha.*
fl. Chamom. ana ℥ss.
 ~ Θ*ci, vel *fulig.* vel *Liquor.*
C.C. succinat., vel qui omnium optimus est, ~ *carmin.*
de trib., ℥ss. ad ℥ij.
laud. opiat. gr. iij. vel loco hujus

laud. hyster. gr. v. vel vj.

Syr. cort. aurant. ℥vj.

M. f. Potio:

D. S. ut *suprà.*

Si visum fuerit, præsertim in mulieribus, addi potest Essentiæ castorei, vel essentiæ myrrhæ cum spiritu vini tartarisato paratæ, ℥j. vel ℥ss.

Quod si verò patiens hæc volatilia ferre nequeat vel ea nauseet, aut propter nauseam rejiciat, exhibeantur fixiora, præsertim cinnabaris antimonii, quæ in internis convulsionibus est egregia, & à Cratone Magnes epilepsiæ dicitur; hinc cephalicum quoque specificum cum laudano opiato egregium erit, verbi gratiā:

℞. ▽ *fœnic.*

Matricar. ana ℥j.

Specif. cephal. vel *Cinnab.* ℥ii ℥ss.

Pulv. testic. equin. ℥j.

Laud. opiat. ferm. gr. iij.

Syr. de alth. Fern. ℥vj.

M. f. Potio:

D. S. ut *suprà.*

℞. ~ *carminat: de trib.* ℥ii.

Ess. castor. ℥ss. ℥ss.

opii ℥ss. ad ℥j.

M. D. S.

Uindernde Essenz 40. bis 50. Tropfen auff ein mal.

Vel prædest Theriaca cum cornu cervi sine igne assumpta, expectando sudorem, ubi alvus prius aperta fuerit.

Porro conveniens est, ut externè oleum destillatum succini & spicæ, vel solitariè, vel cum s. q. Corporis pro balsamo, in morbis convulsivis internis, regioni umbilicali aut quoque stomachali illinatur, imponendo de super laterem calefactum: item confert emplastrum de Galbano, vel simplex vel matricale de galbano usitatum, malaxatum cum oleo destillato succini, & impositum umbilico. Spectat hæc & Galbanetum Paracelsi, quod illitum abdomini mirabile est in spasms corporis internis; uti spinæ inunctum in paralyssi id proderit: item oleum destillatum saponis, nec non sebum hircinum cum unguento potabili rubro, &c. Tandem singulare quoque est pinguedo cati sylvestris in colica convulsiva, & plurimum habet in recessu umbilico illita: vid. Brunnerus & Schmuckius. Quidam addunt parum zibethi ad imitationem Paracelsi; quidam scrupulosi sunt, & pinguedinem cati maris, pro viris, contra cati feminae, pro fœmellis, adhibent in colica convulsiva curanda: Ast electio sexus superstitiosa est.

In statu vero paroxysmi, ubi membra jam convulsa sunt plus minus, cum maxilla, ob musculum temporalem spasmo affectum constri-

constricta, non queat deduci, aut licet possit os aperiri, non tamen medicamenta, ob musculos oesophagi & pharyngis convulsos, possit aeger deglutire, (nam si hoc facere possit, capiat antea dicta) externa, fortiter sensuum organa ferientia, applicentur, ut excitetur in iisdem spirituum motus, adeoque in tali casu primarius erit spiritus salis ammoniaci naribus applicatus; vel loco huius suffitus succini, aliis hystericis proficiuus in paroxysmo, inspergendo succinum carbonibus vivis & fumigando, pro quo etiam balsamus succini linguae, vertici, temporibus & naribus affricari poterit. His autem non sufficientibus, ad sternutatoria accedendum erit, parata ex helleboro nigro vel albo, nicotiana, floribus liliorum convallium, addito; vel, si acius desideratur hocce, euphorbio; vel, quod melius, salibus volatilibus, urinae v.g. cornu cervi, & similibus. Talia inspergantur, vel potius insufflentur per canulam naribus, pro excitatione aegrorum.

Quod attinet aegrum extra paroxysmum, cum malum illud habituale sit, curetur illud methodo aliorum morborum chronicorum, cachecticorum, hypochondriacorum, scorbuticorum, &c. Nempe (1.) ante omnia digestiva salina, & blande alterantia alcalia, & ex his parata falsa, ut sal hypochondriacum, tinctura tartari, arcanum duplicatum Mynsichti, ceu universale scorbuticorum digestivum, praemittantur. (2.) His ad aliquot dies continuatis vomitorium subjungatur; siquidem impossibile est, radices morborum Chronicorum absque vomitorio evellere, quod plus praestat decem purgationibus; unde etiam illud repetitum, si opus fuerit, in usum trahi debet. (3.) Postmodum ad Martialia, praemittenda alcalibus volatilibus fiat accessus; haec enim vices obeunt acidularum naturalium, adeoque propinetur v.g. vel ipse pulvis cachecticus Hartmanni ex Marte rubro, vel solutio Martis cum succo pomorum Borsdorfianorum, vel tinctura vitrioli martis Zwelferi, vel liquor martis solaris. Ex hisce eligatur aliquod pro circumstantiarum varietate. Hinc subjungenda (4.) sunt volatilia aromatica, plus minus acria, eaque vel generalia, vel antiscorbutica specialia, ex regno vegetabili nota:

℞. *Ess. myrrh. c. alcali par.* ʒʒ.

— *Θ*ci simpl.* ʒiij.

Cochlear. rect. ʒij.

M. S.

Essenz 40. oder 50. Tropffen.

Usurpetur ter de die.

℞. *Elix. propr. f. acido c. — u cochl.* par. ʒʒ.

— *carmin. de trib.* ʒij.

M. S. ut antea.

Dosis 40. guttul.

℞. — *Θ*ci simpl.* ʒiij.

Cochlear. vel antiscorb. ʒij.
carminat. ʒj.

M. S.

Scorbutischer Spiritus.

Pro sudore convenit vinum guajacinum.

Pro urina:

℞. *R ʒi compos.*

— *antiscorb.* ana ʒj.

M. S.

Scorbutische Tinctur.

Dosis 50. gutt.

℞. *Liqu. — e fol. ʒi ʒʒ.*

— *carmin.*

Cochlear. ana ʒj.

M. S. ut antea.

Quod si sub hac cura aeger nihil omnius diutis pathematibus corripiatur, aliquando fortior & generosa purgatio institui debet, quam mirè quidem aegros torquet, & pathemata excitat, nihil tamen periculi subest, sed constantem salutem promittit. Ceteroquin extra paroxysmum iussi nostram agram aliquamdiu gestare emplastrum de galbano, & omni mane haurire liquorem Martis solaris, & omni vespera spiritum salis ammoniaci anisatum, & sic melius habuit per longum tempus.

C A S U S XVII.

HERNIA INGUINALIS.

five

BUBONOCELE CUM PASSIONE HYSTERICA.

*M*ulier 38. praeterpropter annorum, agilis caetera & vegeta, conqueritur de duobus tumoribus, magnitudine utrinque ovi gallinacei in inguinibus, seu paulo supra os pubis, prominentibus, sine tamen insigniori molestia. Dum supina recubat, tumores hi disparent; sed, dum tussit, aut erecta incedit, denuo prominent; sine noxa tamen ulla, aut incommodo hoc patitur, etiam gravida facta; tunc enim nullum tumoris vestigium, post partum tamen dictis tumoribus recurrentibus. Interim cum hoc, quod suaviter olentia ferre nequeat, foetida verò ut & castoreia eam delectent, frequenter, idque levissimà datà occasione, singulares patitur paroxysmos, in quibus, praegressà gravi totius corporis refrigeratione, una cum tumultu aliquid sursum pergere, & praecordia occupare: Es walle ihr nach dem Herzen zu (dicit patiens) quod, ut impediatur, ligaturà forti hypochondria cingit: Hinc vomitus graves subinde eam prehendunt, & ut plurimum repetitae dejectiones alvi, sub quo statui tumores isti admodum

dum protuberant, indurantur (sic werden wie ein Stein so hart) qui aliis sunt molles & indolentes, dolent acerbè una cum gravissimis torminibus, & exquisitissimis doloribus lancinantibus, saltem circa loca tumorum affligentibus, supra umbilicum verò non adscendentibus. Sub hoc statu, ceu medicinam domesticam, capit absinthium & matricariam, horumque incisorum cum aqua simplici decoctum paratum bibit calidè, & ita sub corporis horripilatione, quocunque modo ad sudorem se disponit, quo erumpente res salva est, symptomata evanescent, ipsa hilaris & vegeta resurgit. Sed cum aliquando mense Februario tota die linum carminando se gravius exercuisset, eadem symptomata præfati paroxysmi redeunt, sed atrocissima, in specie præter vomitus tumor prope inguen sinistrum, cum insigni duritie, intolerabili lancinante cruciatu, & abdominis borborygmis, alvoque pertinaciter clausa, eam affligunt: ipsa ægra ad quævis assumpta crebrius singultit, & violenter eructare videtur, sine flatu licet, es stößet nur so auf.

RESOLUTIO.

*Hic affectus complicatus est ex bubonocèle, & passione hysterica, ita tamen, ut illa non sit hujus causa, sed potius hæc ab hernia in guinali exasperetur in prædispositis, qualis in se ægra quoque nostra est. Quod bubonocèle simul adsit, est per accidens, ut ut hæc semper sub Paroxysmo suo modo exasperetur; non autem ab hac ægra ad hystericam passionem disponi potest. Adeoque

Causa proxima bubonocèles est ruptio peritonæi, concitata in hoc subjecto à nimio nisu partus secundi, ceu à causa remota; ubi tamen etiam, sicut in omnibus herniosis, tam pallativè quam propriè curandis, simul attendendi sunt flatus, qui in hernia facta admodum exasperant symptomata.

De cætero ratione herniæ continentis notandum contra vulgarem sententiam: in herniis non solum intestina, sed & omentum, naturaliter posse ad inguen, imò in scrotum, descendere; siquidem nuperrime observavi in viro juvene duplicem herniam scrotalem: nempe in scroti sinistra parte erat conspicua hernia varicosa seu Cirsocele; in dextra verò ejusdem scroti parte conspiciebatur Epiplocele, denn da hieng es wie ein Länggen in scroto, manifestum omenti indicium. Quod verò in cadaveribus vix ultra umbilicum descendat, est ejus corrugatio, situs ratio, & corporis agitatio; hinc putatur; illud circa inguina non protendi, cum tamen in vivis reverà ultra umbilicum, & fere ad inguina usque descendat: ut itaque epiplocele in-

guinalis & scrotalis non penitus sint neganda. In nostra ægra intestina reverà sunt prolapsa.

Jam vero porro quoad dolorem lancinantem, tumorem & duritiem, in Paroxysmo hysterico circa locum herniosum observabilem: sane illa phænomena non sunt à scybalis induratis, uti nec à flatibus, distendentibus intestina prolapsa; sed saltem ab horum spasminis & convulsionibus circa ista loca. Quod illustratur ex eo, quia infantibus, quibus imminet epilepsia; pariter abdomen indurefcit, & habui hodie infantem, cui ex variolis Adstantibus prædixi sub hoc phænomeno epilepsiam; & factum est præsagium ratum. Videatur insuper duplex locus Helmontii: quorum prior est *Tractatu de Flatibus* §. 38. & posterior *de Lithiasi*, cap. 9. §. 132. & pag. 243. §. 20. ubi introducit puerum, simile fatum expertum, quale præfenti nostræ ægræ obtigit.

Euporiston domesticum ex matricaria & absinthio conflatum, quod attinet: usum sane hoc habet ratione passionis hystericae, quippe superveniente sudore cessabat Paroxysmus, & cum hoc etiam symptomata bubonocèles. Et notandum omnino: quocunque Paroxysmos hystericos, qui ex elu dulcium exacerbantur, per amara (qualem saporem quoque dicta simplicia, referunt) optime curari, vid. Forestus; ubi par ratio est, si quædam mulieres tanacetum, aliæ gentianam, sclaream aliæ, nec non castoreum in usum vocant; hæc enim omnia, destruendo acidum peccans, Paroxysmum levant. In passione hysterica ergo duo respicienda: nempe pathemata spasmodica, quæ per consensum membranarum rigores inducunt; & hinc acidum vitiosum: utrique scopo conducit oleorum destillatorum umbilico inunctio.

Ulteriùs in affectus historia duo consideranda veniunt: quorum primum est Hernia; secundum verò frigus externum, tanquam causa remota. Ratione herniæ notabile est, ægram nostram extra Paroxysmum hystericum optimè se habere; in Paroxysmo autem dolorem, tumorem, duritiem, &c. herniæ affligere. Ex quo colligo:

I. Symptomata talia hernias concomitantia, nempe tumorem, dolorem lancinantem, duritiem, &c. non oriri semper ex flatibus, nec ex scybalis durioribus; Intestina enim saltem tenuia dant hernias, in quibus feces adhuc sunt liquidiores, in cæco autem coloq; demum solidiores evadunt. Fit quatenus mutatione situs, & occasione prolapsus intestinorū, intestina spasmo corripiuntur, quorum ratione

[Aa]

etiam

etiam non rarò iliaca passio herniis aliaque dicta symptomata superveniunt. Unde, quando in tali casu intestina ob sui renitentiam reponi nequeunt, non usurpemus simpliciter carminantia, sicut nec emollientia: sed talia, quæ intestina blandè solari possunt, ut à spasmus remittant, hoc est, nervina remedia; hinc juxta Panarollum tenerrimè sunt tractanda intestina, ne irriterentur, aliàs eò magis irritata maximos dolores patiuntur, & eò minus reponi possunt, hinc interdum nihil potest loco dolenti imponi. Et in hoc consistit fundamentum curandarum herniarum, quæ quò magis tractantur, eò magis reniruntur & turgent.

2. Colligo hinc: in hysterica passione reverà spasmos & motus convulsivos intestinorum obvios esse; v. g. in nostra ægra non induratur locus, nisi passio hysterica superveniat. Ergò potius hernia exasperatur à passione hysterica, quàm quod passio hysterica debeat excitari propter herniam.

3. Infero inde: tormina intestinorum quæcunque formaliter consistere in tali motu eorum convulsivo; non tamen sunt dolorosa, nisi irriterentur intestina, & hinc spasmus eadem corripit, licet occasionaliter pro varietate causæ peccantis variam originem agnoscant, nunc nempe acidum ponticum, nunc flatuum impetum, nunc scybala indurata, nunc pituitam vitream.

4. Concludo: pathemata hysterica non posse tutius & melius curari, quàm per sudorem; unde & semper remediis antihystericis combinanda sunt sudorifera, ut post ea superveniat sudor, & quidem in declinatione paroxysmi; sic enim tutius curatur, & recidiva præcavetur; uti in ejus incremento optimum est, ut alvum servemus liberam, quæ si non fuerit talis, nunquam in vigore paroxysmi eandem reserare poterimus, propter motum convulsivum intestinorum.

.Ratione autem frigoris notandum: quod cum ægra nostra linum carminando se aëri frigido exposuerit, & hujus causæ externæ occasione paroxysmum excitarit, nil æquè magis adversetur herniosis, quàm quidem frigus externum. Nam intestina, quia sunt nervea, à frigore passio mox convelluntur, adeò ut hernia inveterata facilè ad iliacam passionem disponi possit: Vid. Welschius *Hecat.* 3. p. 6. quo loco bina exempla similis tragædiæ recenset: Sic quoque anni sex sunt, ex quo veteranus Jctus, à multis annis herniosis, mortem incurrit, die Festivitatæ Natalitiorum tertia frigoris insolitum perpeffus insultum, sicque exacerbata hernia ileon expertus, secundo die mortem incurrit, quia intestina irritata convellebantur, & convulsà indurabantur.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: singultus, vomitus, alvus pertinaciter clausa, &c. ileum imminere ostendunt, nisi radicitus curetur passio hysterica, ne superveniat mox paroxysmus: imò periculum nascitur, ne sub nimio vomendi conatu insigniori, hernia augeatur, & ulterius peritonæi læsio procedat; hinc non propinanda herniosis vomitoria, cum iis sint periculosa.

CURA.

Quoad Curam: In hac non tam Hernia est respicienda, quàm hysterica passio, quia bubonocèle est consequens passionis hysterice; hinc duo tempora considerentur, eaque nunc in paroxysmo, nunc extra eundem.

In Paroxysmo

1. Ante omnia curandi & auferendi sunt spasmi intestinorum; ita enim hinc orta omnia reliqua symptomata in loco hernioso circa stomachum spontè cessabunt; nisi enim spasmos remitti facies, frustra laborabis: id quod fit optimè (1) per absinthium & matricariam, & similia antihysterica & aromatica; sicut & posthinc (2) per blanda opiata, dolorem sistentia; denique (3) per externa loca herniosa dolentia blandè foventia.

2. His præmissis, alvus laxetur & blandè evacuetur, vel clysmate & leni purgante, & quidem in declinatione, ubi tensio, durities & spasmus intestinorum remiserit, aut etiam in principio, minus in incremento. Aliàs omnia evacuantia & clysmata, repositio intestinorum, &c. erunt frustranea propter spasmus intestinorum. Vomitus & singultus propter intestinorum convulsionem non possunt sisti.

Primariò ergò spasmus intestinorum sistatur, sic omnia symptomata cessabunt, & postmodum possumus evacuare alvum.

Extra Paroxysmum verò

1. Cacochymia hysterica acida appropriatis & diaphoreticis est corrigenda.

2. Hernia reponenda.

3. Loca herniosa firmanda; &, si possibile, consolidanda.

4. Alvus teneatur semper aperta.

Ergò in Paroxysmi principio pro fovendis dolorosis locis conveniet Fomentum humidum, Decoctum nempe quoddam pargoricum, aut lac, in quo species aromaticæ, v. g. chamomilla, &c. coctæ sint, cui intincta spongia vel linteamina multiplicata, insternantur; species verò ipsæ sacculo inclusæ non æquè, ob asperitatem sui, convenient, quia dolorem possunt exasperare; uti & ipsa cataplasmata non convenienter apponuntur locis herniosis, & ideo suspecta nobis videntur.

Hernia Inguinalis seu Bubon. cum Passione Hyst. 187

videntur, quod facile refrigerantur, adeoque cutis attactu frigoris, constringentis ejus poros, anserina evadat, sicque illa malum deteriorando plus noceant, unde cautè usurpentur? de quo cataplasmatum usu & abusu vid. Felix Wurzius *in Chirurg.* Vel pro eodem scopo intingatur bombax oleis aromaticis repidis, hincque loca dolentia eadem perungantur. Vel denique applicetur umbilici regioni pro sistendis spasmodis hystericis galbanum Paracelsi, aut emplastrum de galbano, quæ proficua satis.

Extra paroxysmum, pro repositionis herniæ scopo, convenire videri posset secretum illud emplastrum magneticum. Frid. Hofmanni *in Meth. Med.* qui illud in scrotali hernia proficuum observavit: sed locum habet saltem in nuda intestinorum in scrotum procidentia. Interim tamen hic observandum, quod una hirundo non faciat ver. In nostro autem casu intestina facili negotio, modò foveantur antea, retrahuntur, hinc tantum auxilium minus hic necessarium esse concludo.

Pro consolidatione demum, præter alia commendatur esus raparum flaccidarum ad septimanas sex continuatus: circa quod euporiston duo consideremus, nempe

1. Rapas ipsas, quæ quatenus temperatæ, egregiè herniosis convenire videntur.

2. Quietem, & huic primas deferimus, imò Panaceam Herniosorum eandem salutamus: Vid. Hildanus *Centur. 5. obs. 54.*

Adeò ergo in vulnerariorum usu continuatio eorundem injungenda, in quorum numero præ hederæ arborea, locus terrestri quoque concedendus est. Insuper in curatione herniosorum, rectè semper semen anisi, & similia carminantia, statûs respiciendo, in usum vocantur: sicut & ipsa vulneraria optimo consilio in vino decoquenda jubentur, quippe hac ratione ex alcali eorum occulto, cum hujus acido concurrente, emergit tertium falsum; non secus ac ex lapillis cancrorum cum aceto assumptis, idque magis proficuum esse solet.

De cætero, vulgò emplastris contra herniam usitatis, admiscetur crocus Martis adstringens; ubi tamen, nisi ulcera adfuerint, aut vulnera aperta, frustra in auxilium vocatur, quippe crocus Martis ab humiditatibus saturari cupit; quas tamen, cum ex locis clausis petere nequeat, nec vis ejusdem introrsum penetret, quæritur, cui usui addatur? Pinguedine ursina & erinacei regio lumborum, ubi connectitur mesenterium, est injungenda. Curavi quendam herniosum bubonocèle correptum internè emplastro ex gummi caranna cum debito subligaculo.

Tandem respectu potiùs habito ad Pass.
Tom. II. Pars 2.

fionem hystericam, quomodo hæc ægra à me curata sit, narrabo: Scilicet, ubi tres dies in dicto statu perstitisset, & me vocandum curasset, die tertia à meridie externè præscripsi clysmacarmians cum sale tartari & oleo destillato succini, pro scopo emolliendi stimulantique alvum; internè simul ordinando hanc formulam:

℞. *His Card. bened.*
lapill. Ser. præp. aa. ℥j.
Laud. hyst. gr. vj.
M. f. Pulvis:
div. in 2. part. æqu.

Cepit unam dosin vespere, alteram circa mediam noctem; sicque ab usu horum pulverum aliquantisper dolores fuere sedati. Clysma autem eodem modo, quo injectum erat, post semihorium rejiciebat, & sine efficacia.

Sed post mediam noctem, cessante laudani hystericæ vi, omnia symptomata recrudefcebant; unde ordinavi clysmata domestica ex lacte, cum paucis lixivii communis; itemque simul pariter externè regioni umbilicali applicandum ægræ jussi emplastrum ex galbano, malaxatum cum f. q. olei destillati succini, & internè præscripsi:

℞. *Liqu. C. C. succin.*
Ess. Castor. aa. ℥ij. Misc.

Dosis 40. gutt. bis vel ter pro libitu.

Factis hæc, clysmata denuò rejiciebatur, & frustranea erant omnia, ægra erat debiliior & sacerdos vocabatur. In his ergo angustiis die quarto vespere præscripsi hos pulveres:

℞. *Cinn.* ℥ij. 3ß.
Laud. hyst. 3ß.
Ol. dest. anis. gutt. iij.

Cum f. q. *ess. cort. aur.* f. Pilulæ:

Pro duab. dosibus in paroxysmo.

Harum unam vespera cepit, alteram post mediam noctem.

Manè sequenti benè se habens, de nihilo conquerebatur, nisi quod alvus clausa sit & sitiat, unde, ut cum paucis butyro imprægnatam cerevisiam ægra calidè, (ne dolores exacerbentur) bibat, & emollientia sint in usu, sedulò suasi; frigida enim si bibisset, mox dolores revertissent, stimulantia etiam frustranea fuissent, imò nociva. Sed horâ quartâ pomeridianâ omnia recrudescente, ita ut status affligerent loca herniosa, quæ instar lapidum indurecebant, atque dolebant, vomitus ac singultus, & summatim iliaca passio, imminere videbatur; unde ad leniendum spasmodum intestinorum, sudorem provocandum, dolorem sistendum, alvumque reserandam, præscripsi seqq.

℞. *Extr. Castor.*
gent. aa. 3ß.
[Aa] 2

Laud.

Laud. hyst. 3ß.

Öifubnin. (quod in colica convulsiva & alvo clausa, ubi feces induratae sunt cum torminibus, egregium est) gr. vj.

c. f. q. ol. dest. anisi f. Pilulae pro duab. dosibus:

Quarum unam vesperti sumpsit, & alteram post mediam noctem, sed frustra.

Unde custos agra, miserabilem huius statum aspiciens, post mediam noctem hoc consilium domesticum cepit: scilicet recepit aliquot poma Borsdorffiana putrida, quae conquassata cum pauxillo croci miscuit in cataplasmatibus formam hocque calide regioni umbilicali & loco hernioso applicavit; totum interim abdomen, uti & lumbos, hircinâ pinguedine largiter inungendo, & supposito-rium simul ex melle confectum applicando; unde factum, ut reserata sic alvo, sana patientis haecenus evaserit. Adeo non raro gloriosus & strenuus miles ab inermi pumilione ludibrio exponitur, quod dolendum!

Alias poma Borsdorffiana assa, *gebratene Aepffel* / cum paucis croco & pinguedine hircina *angeschmiert* / in adstricta alvo sunt optima.

CASUS XIX.

CATARRHUS SUFFOCATIVUS.

Puer ingenuus novem vel decem annorum, macilentus corpore, facie tamen plenâ, floridâ, paulo tamen pallidiore, ornatus, solet subinde subito nocturno tempore, alto oppressus somno, in difficillimam respirationem incurrere, ita quidem, ut cum stertore & sonitu (adstantes dicunt, *es pfeiff!*) spiritum du-cendo, expergesfactus omni modo suffocandus videatur, facie sub istis angustiis intumescente, & ex rubro caerulecente (*firschbraun*) cum extremorum refrigeratione. Accedit tussis crebra, sed difficillima & inanis, cuius impetu nil, praeterquam tenuis aqua, eaque non copiosa, excernitur; sic pedetentim remittit paroxysmus, supersit febre aliquot dierum lentâ; ipse vero aeger cum facie subtumida raucus remanet, & continuo tussit. Tandem elapsis duobus vel tribus diebus copiosam materiam viscidam rejicit: quo facto totius morbi absolutus est cursus. Redit idem paroxysmus crebrius, ut plurimum omni menstruo spatio semel, idque autumnali & hyberno praesertim tempore. Interrogatus, quid patiatur sub paroxysmo? de respirationis

difficultate, & in larynge titillatione conqueritur. Praecedit interdum dolor capitis, colli, aut partium vicinarum, ipse aeger etiam subinde dolori & tumori tonsillarum est obnoxius. Occasionem paroxysmi redeunti suggerit nunc aera frigida susceptio, nunc, praegresso corporis motu & exercitio aliqualis extremorum refrigeratio.

RESOLUTIO.

Affectus hic est Catarrhus suffocativus, de quo Hoffmannus in *Instit.* & Lindanus super *Prax. Chymiatr. Hartmanni*, ista statuunt: *Maxima sit de nihilo fabula*; at male. Equidem in Praxi Vulgari magna contingit confusio aliorum affectuum sub Catarrhi suffocativi nomine, unde varie accipitur: ita siquidem subitanea raucedo, asthma convulsivum, suffocatio ex stasi sanguinis dependens, catarrhus suffocativus vitio membranae posterioris, tussis sicca nocturna gravior, omnia, inquam haec pathemata, si praesertim cum tussi incidant, pro catarrho suffocativo habentur. Facilis tamen erit extricatio, si dixerim: Catarrhum suffocativum proprie sic dictum esse hunc affectum, qui oritur vel ex sanguine, vel ex lymphâ. Ex sanguine quidem, quando hic restagnans in vasis pulmonalibus in suo motu impeditur, indeque subitanea imminet suffocatio. Et hunc solum D. Schneiderus lib. 5. de *Catarrhis sect.* 7. cap. 4. pag. 241. ex Vincentio Baronio, quem etiam allegat, Medico Italo, agnoscit & fideliter tractat; qui ipse etiam apud veteres dicitur Syncope Cardiaca aliâs, quo nomine etiam ab Hoffmanno, & Wepfero *Tr. de loc. aff. Apoplexiæ*, designatur. Sed hic casus est rarus. Alter vero proprie magis dictus Catarrhus suffocativus, dependet ex vitio lymphæ, estque iterum duplex:

1. nempe vitio lymphæ asperæ arteriæ, seu quæ arteriam asperam affligendo suffocationis periculum infert, gignitur.

2. Ex vitio lymphæ, ex membrana pituitaria posteriori derivatæ oritur: conjunctus est cum continuo secretu, qui est reiectio istius lymphæ, ex dicta membrana prolectæ; unde in hoc casu conqueruntur aegri, *es siele thnen der Fluss vom Kopfe*.

Noster interim casus est saltem de genere catarrhorum suffocativorum, qui fiunt ex vitio lymphæ, asperam arteriam irritantis, & subito affligentis, & pathemata suffocativa inducentis: de quo vid. *Disput. de Catarrh.* Lipsiæ sub Præsidio Dn. D. Bohnii habita.

Pars.

Pars affecta est aspera arteria, ejusque in specie caput, larynx, quæ eadem ratione à præternaturali lymphæ afficitur. Nempe eadem hæc est ratio, atque quando nobis sub pastu per errorem aliquid in rimulam asperæ arteriæ illabatur (*als wenn einem etwas in die unrechte Kehle kömmet*) ubi similiter mox tussis, difficilis respiratio & suffocationis metus imminere solet. Ac dicimus notanter per errorem; concludimus hinc, nihil naturaliter asperam arteriam ingredi posse, quippe hæc beneficio epiglottidis exactè clauditur: quod ipsum etiam urget Schneiderus; & utut Cæso Grammius huic se opponat sententiæ; ipse tamen non benè distinguit vim externam, quam animal in mortis articulo constitutum experitur, ab eo, quod nobis naturaliter contingere etiam possit.

Causa proxima est, præsupposito ubique, tam in quibusvis actionibus naturalibus & hinc circa laryngem, motore spiritu imperum faciente; quam in præternaturalibus eodem in exorbitantem motum concitato, lymphæ partim in motu, partim in substantia, peccans.

Distinguendum tamen inter lympham glandularum conglobatarum & conglomeratarum: nam in nostro ægro revera impeditur lymphæ motus per glandulas conglobatas, unde uberius per vicinas glandulas conglomeratas effunditur: hinc in nostro ægro ob prioris lymphæ denegatum motum tumor faciei œdematosus, colli & vicinorum locorum tumor & dolor, hinc per laryngis glandulas, ex conglomeratarum pariter numero effusio; cum etiam, quod catarrhi circa caput frequentiores sint, hoc ob glandulas præfentes innumeras per accidens eveniat.

Substantiâ verò lymphæ, partim acrimonia salâ aut acido-salâ, partim eadem copiosius effusa, adeoque abundans, peccare videtur. Etenim in principio morbi ejusdem saltem acrimonia, in paroxysmo verò abundantia, affligit; nam dum larynx à lymphæ aciore irritatur dolorosè, copiosam lympham fundit. Sufficit autem simplex laryngis dolorosa irritatio; (thorax est sine ullo affectu) sic enim ratione interioris suæ membranæ mox convulsio musculorum laryngis sequitur, qui se pertinaciter stringunt, & laryngem claudunt; unde difficilis respiratio, motu pulmonum ob aëris insufficientem inspirationem præpedito; hinc cessat aliquantulum sanguinis motus, & ob aliqualem ejus stagnationem fit decoloratio faciei: sicut similiter tussis affligens simpliciter est ab irritato larynge, & propter materiæ tenuitatem inanis; sonitus autem affligens, *das Pfeissen/* de-

rivandus venit ex aëre in bronchiis incarcerationi, & probe hic distinguendus est à stertore: etenim sonitus simpliciter sequitur laryngis angustiam; clausus enim & angustatus præternaturaliter facit, ut aër per angustum foramen penetret, & magis cogatur & elidatur; speciatim verò percipitur sub inspiratione, quia epiglottidem jam conniventem quodammodo comprimendo sonitum producit, exundo verò sub expiratione eandem aperit. Sonitus ergò talis raucus fit ex aspera arteria & ejus capite clausis.

Stertoris verò contraria est ratio: contingit enim hic, quando reciprocans halitus seu spiritus aëris per materiam viscosam sibi viam quaerit circa caput laryngis consitam: nempe speciatim locum habet talis stertor, quando membrana pituitaria posterior affecta plorat paulò copiosorem lympham, quæ aliàs paulò spissior naturaliter esse solet. Lymphæ enim talis, si copiosa & spissa effunditur, in vicinia faucium colligitur, unde ibidem collecta propter aëris meatum & remeatum stertorem infert, qualem ore aperto dormientes experiuntur; hinc infantes, tam sani, quam imprimis in dentitione tunc temporis salivantes, *wenn sie geiffen/* stertunt, eò, quod propter dolentes gingivas lymphæ copiosius effundatur. Iste stertor non est in pulmonibus, sed summitate laryngis. Frequens est agris stertor, qui patiuntur Catarrhum suffocativum alterum, vitio membranæ pituitariæ, quando nempe copiosa lymphæ deorsum prolabitur ex capite secundum nonnullorum hypothelin. Qui patiuntur tussim stomachalem, etiam continuo stertunt ex lymphæ viscidioris; sicut etiam ille, quem habent anginosi, & qui tonsillarum inflammatione laborant, est ex faucibus, ob lympham circa laryngem collectam. Rarus ergo est stertor vitio pulmonum, aut bronchiorum asperæ arteriæ enatus, nec nisi in moribundis observabilis, in quibus ex profundo pectoris prodiens auditur: non secus ac hic quoque phthisicis vel empyematicis, in quibus pus colligitur in ramis asperæ arteriæ, proprius esse solet; sed in tali casu non adeo fortiter stertunt; sonitus enim magis est profundus, nec adeo superficialis.

Cæterum æger noster, dum tussit, nil rejicit, nisi nonnihil tenuis materiæ, sicut altero die raucus fit & tandem tertio vel quarto, tussiendo copiosa viscida expectorat. Ubi observandum: materiam istam viscidam non esse causam materialem morbosam, suffocationem minantem, sed productum saltem morbosum, superveniens occasione irritatæ laryngis; quod patet ex eo, sin in principio morbi ea adfuisset materia, facilè fuisset rejecta. Dicet quis: hoc non sequi, quia

materia illa erat coquenda & incrassanda. Regeo autem, quid quæso est coctio & incrassatio materiæ peccantis, nisi hujus beneficio naturalis partium caloris condensatio? unde etiam veterum materia Medica, quæ primò exhibuerunt materiam incrassantia, postmodum verò alterantia, in rei veritate sibi constat, utut circa modum ejusdem magna sit differentia. Ergò, ut negotium pateat magis, in principio hujus paroxysmi simpliciter peccat lymphæ tenuis acrior, quæ vellicando lædit laryngem, hinc dolor & tirillationis sensus, hinc tussis sicca. Procedente autem vellicatione ista, & factâ partium excoaratione, plorat proprium nutrimentum, quod quasi tegmen laryngi adhæret, eumque obviscat, ne magis lædatur: curatâ verò excoaratione, successivè mucus hic ex nutrimento factus, tanquam peregrinum quid, ejicitur; adeoque ridiculum est, in principio morbi incrassantia, quasi catarrhum concoquentia, & postmodum Expectorantia, propinare: nam cum talia sint vel lympham acrem temperantia, vel vellicationis sensum obtundentia, qualia sunt syrupus papaveris, opium, pilulæ de cynoglossa, Philonium Romanum & Persicum, pilulæ de styrace, &c. quæ operantur simpliciter obtundendo sensilitatem nimiam laryngis, & tollunt sensum vellicationis, unde etiam lymphæ non amplius effunditur. Temperantia etiam excellunt, v.g. glycyrrhiza, remedia ex violis, jujubis, amygdalis dulcibus, tragacantha, sulphur, item antimonium diaphoreticum, antihecticum Poterii, & similia subiecta sulphurea; quæ omnia operantur sensum partis hebetando, & lymphæ uberiores effluxum sistendo, ejusdemque acrimoniam falsam obtundendo. Hinc in affectibus catarrhalibus, imprimis in faucibus, rectè nos usurpamus, præmissis opiatibus in principio, sensum vellicationis sistentia; in fine potius morbi Incidentia, dictum mucum per expectorationem facilitantia. Redit malum singulis mensibus, ratione cujus periodi duo sunt consideranda: Pars affecta, quare nempe determinata pars affligatur? & tempus, i. e. quare statò tempore in eodem loco recurrit?

Quoad partem affectam, laryngem: hic una alterâve vice affectus & debilitatus, propter robur hujus inæquale facilius afficitur & recurrit, quia factò jam catarrhi impetu in isto loco, ille spongiosus & resolutus factus est; unde hic magis catarrhalis lymphæ effusio potest fieri, quàm alibi vel in alia parte, cujus fibræ adhuc sunt in debito tono, præsertim cum patiens ipse serosioris constitutionis existens, frigore aeris externi eò facilius dicta mala incidere potuerit.

Quoad posterius: certum est, sub incremento lunæ, humorum dominæ, expandi quasi & turgere magis massam sanguineam, indeque reliquos ejus succos; exinde enim est, quod plerisque circa plenilunium cerebrum videatur majus, non quidem quod verè tale illud sit, sed quia propter sanguinem, tunc temporis turgescentem, expanditur, & meninges cerebri extenduntur, cuius tamen modus specialis non est cognitus.

Causa remota potest esse refrigeratio externa, & auræ frigida susceptio; quia erat constitutionis phlegmaticæ, hinc omni nocte sudabat.

P R O G N O S I S.

Metus sane adest phthiseos catarrhalis, uti vocant, sive à defluxionibus natæ, oriundæ ex lymphæ acriori, sive per glandulas asperæ arteriæ sive pulmonales effusæ, quæ faciliè substantiam pulmonum excoarare & exulcerare potest. Adhæc sub crebriori illa tussi debilitantur & inflantur pulmones, fiuntque spumosiore amploresque, unde ex læso vesicularum pulmonalium tono aptiores fiunt fovendæ acriori lymphæ & variis sordibus recipiendis: ut taceam ægrum etiam ex ruptura eorum à tussi incidere posse in hæmoptysin, instantis phthiseos prodromum.

C U R A.

Duo tempora distinguantur: in & extra paroxysmum; illud quidem curationis; hoc præservationis gratiâ.

Quoad Curam in paroxysmo: adhuc particularia temporâ sunt consideranda:

Nempe:

1. Principium & Incrementum;
2. & deinde ejus status.

Principium & incrementum est, quando viget vellicationis sensus, & symptomata maximè urgent; Status vero, quando cessantibus symptomatibus, rauco & tussis humida adest, cum materiæ viscosæ rejectione. Adeoque in principio & incremento paroxysmi

1. Naturalis lymphæ circa glandulas colli & vicinas partes motus concitetur per sudorifera blanda, in specie salina volatilia oleosa.

2. Motus præternaturalis lymphæ seu impetus ad laryngem sistatur per opiata.

3. Acrimonia lymphæ vellicans temperetur, partim per vulgo dicta incrassantia, partim per adjuncta opiata, v.g. papaverina, amygdalas dulces, tragacantham, glycyrrhizam, syrupum violarum: e. g.

℞. ∇ scabios. ℥iij.

asthmat. ℥iij.

Syr. Violar. ℥ss.

Papav. simpl. ℥j.

Misc.

Coch-

Cochleatim usurpetur. Vel

℞. ▽ *scabios.* ℥iij.

asthmat. ℥j.

Syr. diacod. Mont. ℥i℥.

Misc.

℞. ▽ *Papav. rhæad.* ℥ij.

Syr. diacod. Mont. ℥i℥.

Misc.

Detur in principio mali:

℞. ▽ *scabios.* ℥iij.

asthmat. ℥vj.

~ ⊕ *xi. anis.* ℥i℥.

Ess. opii ℥℥. vel *Syr. papav.* ℥j.

Syr. Violar. ℥vj. M.

In affectibus lymphæ catarrhalibus semper salia volatilia præferuntur fixis, ob sui cum materia morbifica facile connubium. Et cum in paroxysmi principio ægri tales sudare non possint, eò, quod serè ut orthopnoëici respirent, & propter metum suffocationis inquieti reddantur, hinc remedia sudorifera maritentur cum laudano opiato, ut hæc tollatur irritatio laryngis, hincque cessante stricture laryngis & suffocationis metu ægri placidiùs decumbant, hincque quieti sudore blando diffuant: Vid. Riverius *in Cent.* 3. *Observ.* 15. qui habet similem casum singulis noctibus repetentem per opium curatum; cum quo, quoad Theoriam, Tr. Custos Errans; sicut quoad Praxin Tr. Jus duumvir. §. 62. conferatur Helmontrius.

Pertinent huc Tussès illæ siccæ nocturnæ, quæ sunt ominosæ, & frequentius negliguntur; sed tamen ut plurimum prodromi sunt phthysicos. Curantur autem recentes eadem per temperantia, opiata, v.g. decantatas pilulas de styrace, paratas vel juxta veterum descriptiones, vel etiam Sylvii correctas: sicut confirmatas tales nocturnas tussès siccas difficillimum est curare sine præmissio vomitu; sedes enim earum est stomachus. Corripit sæpe juvenes parca diætæ.

Diuretica in declinatione paroxysmi conveniunt, ubi nempe adhuc aliquid in lymphæ motu corrigendum, & reliquæ evacuandæ: cum contra in principio paroxysmi videantur sine methodo legitimâ administrata. Ergò proderit spiritus lumbricorum terrestrium per putrefactionem paratus, quippe qui urinosus, & nitri formam referens, sal volatile fundit.

In principio paroxysmi etiam spermatis ceti ℥℥. ad ℥j. optimo cum successu propinatur, quod aliàs in orthopnoëcia mirè laudatur à Timæo **von Guldenlee.** Propinatur in cerevisia calida, vel alio vehiculo; sicut enim liquefcit instar butyri. Egregiè acorem lymphæ lenit, & stagnantem sanguinem resolvit; sicut etiam post repetitum aliquot dosium ejus usum alvum aliquoties laxat. Ef-

fectia etiam myrrhæ cum tinctura tartari aut spiritu vini tartarifato parata egregiè temperat acidum;

℞. *Pulv. pectoral.* gr. xv. ad ℥j.

Laud. op. sine acido gr. ij.

M. f. Pulvis.

Exhibeatur vespere. Vel

℞. *Extr.* *xi.* ℥i℥.

Myrrh. el. ℥j.

Croci ℥j.

M. f. Pulvis.

℞. *Extr.* *xi.* ℥j.

Antihæc. Poter.

Lap. tr. præp. aa. ℥℥.

Croci ℥℥.

M. f. Pulvis.

In statu verò, quando raucedo, tussis humida, & materiæ rejectio adest, attenuantia & expectorantia conducunt: v. gr.

℞. ▽ *hyssopi* ℥iij.

G. xi. in acet. sol. ℥i℥.

Sir. nicot. ℥j. ad ℥i℥. M.

℞. ▽ *hyssopi*

Cherefol. aa. ℥j.

asthmat. ℥℥.

oxym. squillit. ℥vj.

Syr. emet. ℥ij.

nicot. ℥℥. M.

℞. *Lap. tr. præp.* ℥i℥.

fl. *xi.* ℥j.

ol. dest. tereb. gutt. xij.

anis. gutt. viij.

Sacch. rosat. q. f.

M. f. Electuarium.

Ubi excretio simul promovenda, addatur radix Ireos Florentinæ.

Egregiè quoque confert spiritus asthmaticus D. Michaëlis ex ære viridi cum gummi ammoniaco:

℞. ▽ *hyssopi* ℥iij.

asthmat. ℥vj.

~ ⊕ *c.* *xi.* ℥i℥.

Syr. enul.

nicot. aa. ℥j.

emet. ℥ij.

M. f. Potio.

℞. ▽ *hyssopi* ℥iij.

(vel *hujus* ℥ij. & ▽ *menthæ* ℥j.)

asthmat. ℥℥. vel ℥vj.

~ *asthmat.* ℥ij. vel ij.

Syr. nicot. ℥℥. vel ℥vj.

M. f. Potio.

Cæterum veteres clysmata acriora adhibebant, pro scopo nempe, ne materia peccans ex capite in pulmones, sed in stomachum, labatur; interim hæc omnia frustranea sunt, nisi fortean in primis viis morbosum quid afferant.

Venæ sectiones autem, quas itidem iidem

iidem suadebant, certo modo non rejiciendas puto, in casu nempe, si æger copioso sanguine turgesceret; unde, ne ejusdem copiosi sanguinis stasi sub vellicatione suffocationem incurrat veram, hinc pro liberiori sanguinis motu posset in brachio vena secari: loco cujus tamen in nostro ægro commodè frictiones & ligaturæ extremorum dolorificæ instituebantur, ne sanguis nimis versus pulmones recurreret, & suffocationem inferret: quæ tamen non habent locum, præterquam in plethoricis, & ubi sanguinis periculosior circa præcordia urget stagnatio.

Ego puerum præsentem sic curavi; In principio paroxysmi, qui noctu repente affligebat puerum (in quo etiam formalis ratio catarrhi suffocativi consistebat; aliàs enim tussis sicca vocanda fuisset) adeoque in ipsis angustiis constitutum, jubendo inungere mox verticem capitis & cervicem cum oleo destillato succini, brachiis jubebam admove- re frictiones & ligaturas strictas, plus minus dolorosas, ne nempe sanguinis suffocationem inferat: quibus, si patiens fuisset ætatis profectioris, substituissem venæsectionem pro eodem scopo. Cum his ligaturis ordinavi in principio misturam sequentem cochleatim assumendam, cunctis curationis scopis satisfaciendam; vomitus enim & clysmata fuissent frustranea:

R. ∇ scabios. \mathfrak{z} ij.

asthmat. Imper. Rud. \mathfrak{z} ß.

Syr. diacod. Mont. \mathfrak{z} vj. ad \mathfrak{z} i. M.

Aut, ubi magis urgeret lymphæ vitium, adeoque sudor procurandus esset, præscribebatur ita:

R. ∇ scabios. \mathfrak{z} ij.

~ Θ *ci anis. \mathfrak{z} ß.

Syr. papav. albi \mathfrak{z} vj. M.

Capiebat cochleatim.

Hæc mox in principio paroxysmi dabatur, *ich solte und muste Ruffe machen*/ quod saltem poteram facere sensum vellicationis sistendo, & lymphæ acrimoniam temperando, ejusque circularem motum cum sanguine conciliando.

Postmodum in incremento paroxysmi, pro incrassando catarrho tenui, vel potius lymphæ acrimonia temperanda, ordinavi:

R. ∇ scabios.

serpill. aa. \mathfrak{z} ß.

asthmat. \mathfrak{z} vj.

fl. \mathfrak{z} ß. vel \mathfrak{z} ij. ad \mathfrak{z} i.

Syr. Scabios. vel Violar. vel Papav. vel de Jujub. \mathfrak{z} vj. ad \mathfrak{z} i.

M. f. Mixture.

Hæc probè agitata, crebriusque assumpta, & tussim leniebat, & materiæ mucosæ copiosioris proventui præveniebam. Nam & irritantem causam in faucibus demulce-

bam, & sensum irritationis sistebam, unde lymphæ affluxus copiosior præcavebatur.

Post in statu paroxysmi, nempe cum excerneretur mucus, sufficiebat euporiston illud, nimirum succus raphani orbicularis expressus, cum paucis saccharo mistus; sicut tandem, si quid restaret febriculæ lentæ, hoc blando sudore per liquorem cornu cervi succinatum, & spiritum salis ammoniaci oleosum excitato, vel etiam per blanda diuretica, præsertim ex succino, vel ex lumbricis removebam.

Extra paroxysmum, præservationis gratiâ plura quidem tentabam; semper tamen voracitas pueri, & vita sedentaria, somnolentia, facies subtumida, & habitus corporis serosior, obstabant, quæ ostendebant, à priori malo huic non posse succurri; unde saltem à posteriori curaturus, fonticulum in brachio sinistro inurendum jussi, & sic levabatur, unde ab illo tempore benè valet. Fonticulus autem tam ubertim fluebat, sine tamen periculo, ut manè & vesperi esset mundandus. Sed puer non futurus erit crassius, continuandus itaque tantum erit usque ad annum 14. quò tempore habitus corporis serosius sensibilibiter immutabitur, unde tunc poterit fonticulus absque periculo claudi.

Tandem quoque præcavebunt paroxysmum, cujus prodromus esse potest colli intumescencia, Sudorifera & Diuretica, quæ ante invasionis tempus propinanda. Verùm in ægroto nostro erat quidem periodicum, sed incertum, hoc verò vagum.

C A S U S XIX.

ASTHMA HUMIDUM STOMACHALE CUM INCUBO.

Mercator quidam mediæ ætatis, constitutionis, ut ajunt, Melancholicæ, curis & negotiis in nudinis hyemalibus districtus, his absolutis percipit impedimentum sub respiratione, ita ut frequentius ac difficilius respirare cogatur. Aggravatur malum, quoties deambulando, vel scalas scandendo sese exercet. Speciatim vesperi à pastu gravius affligitur. Comedit probè, appetitus optimus, sed borborygmi & flatuum impetus exercent abdomen. Dormit benè, sed non sine insomniorum graviorum molestia, imprimis merces copiosas sibi incumbere, & ita totum corpus comprimi imaginatur, donec impetu facto in somno exiliat, & ita molestias has dispellat. Imprimis hypochondria, dum dorso incumbit, dolere sibi, querenti Medico respondet, & ibidem etiam interdiu impedimento esse, quò mi-

mus

nus respirare queat. Ejicit per os copiosa mucosa imprimis evigilans. Ante meridiem melius se habet, à meridie pejus, sub noctem mediam pessimè. Urina est pallida cum sedimento copioso albicante.

R E S O L U T I O.

Affectus hic, examinationi jamjam subjectus, est Asthma humidum stomachale, complicatum cum Incubo, quod plurima testantur symptomata concomitantia.

Quod autem Partem affectam concernit, ratione asthmatis & incubi: pars primario & immediate affecta est Diaphragma, quatenus ob ejus motum impeditum sufflamatur inspiratio, idque, speciatim sub decubitu in dorso: ratione causæ pars secundo & mediate affecta est stomachus, ejusque chylosis læsa, idque in specie ratione fermenti sui præternaturaliter depravati, quatenus nempe nimis acidum, fixum, debitaque volatilitate depauperatum existit. Et tale etiam jamjam denominatum acidum præternaturale viscidum ventriculi suo meritò causæ proximæ appellatione hujus chylicationis læsæ, seu mali hypochondriaci, meretur: quatenus nempe fermentum illud in stomachi plicis contentum non satis volatile, unde nec sufficienter digerere valet ingesta, sed nimis acidum fixum peregrinoque acore in stomacho corruptum existit, unde quidem alimenta promptè dissolvit, ut in hypochondriaci fieri solet, eadem tamen non ritè fermentando, debite volatilifare nequit, potius in massam acidam plus minus viscidam transmutat, quæ fundamentum & origo tantum non omnium morborum chronicorum. Hinc etsi quidem appetitus ordinarius avidè semper propter fermenti stomachalis acidi nimis fixi copiam, alimenta urgeat, digestio tamen debita minime respondet assumptis, sed borborygmi & flatuum impetus sub & post digestionem abdomen maxime exercent, quod admirationem tamen nullo modo admittit; quia, sicuti aliàs in hypochondriaci vitio fermenti ventriculi, vel succi pancreatici nimis acidi, ordinario generantur flatus, ita & in hoc subjecto hypochondriaco eadem flatuum positâ causâ efficiente, nempe acido, & materiâ illorum, nempe mucosâ viscidâ, manifestè per ordinarium generationis modum, nempe fermentationem, in promptu est idem effectus. Materiarum autem hujus mucosæ atque viscidæ in ventriculo & intestinis massa sanguinea existentiam non exiguam ulterius, imò melius, probare haud laboriosum erit. In medium namque proferam tanquam effe-

ctus, testimoniaque minime fallibilia, respirationem difficilem diurnam pariter atque nocturnam. Quod vero priorem illam diurnam difficilem attinet respirationem: præter ventriculum mucosâ viscido repletum, flatuumque copiâ nonnihil ampliatum, & propterea diaphragmatis motum sursum versus impedientem, etiam massam sanguineam ipsam ex dicta vitiosa stomachi digestionem crudam, mucosâ acido viscido imprægnatam, tanquam causam agnosco. Chylus enim vitiosè digestus, quia non potest debite fermentando assimilari, sub formæ talis muci vitiosi sanguini confusus permanet. Ob quam causam æger, quando levi motu vel deambulando, sese exercet, difficillimâ respiratione vexatur; dum enim per motum istum circulus sanguinis melius promovetur, à pituitâ illa viscida in bronchiis pulmonum jam præexistente, & diversam in ipsis angustiam producente, ulterioreque sanguinis mucosi continuo affluxu urgente, malum respirationis eò magis aggravatur. Hinc etiam noster æger vesperi, & speciam à pastu tantum, gravius affligitur, quoniam tunc non solum ventriculus magis materiâ viscidâ repletus, sed chylus etiam minus rectè coctus atque digestus, massæ sanguineæ successivè se associare incipit, & per circulum sanguinis ad bronchias pulmonum iterum delatus, prædictum malum exasperat. In specie tamen etiam hic intestinum colon à flatuum copia expansum difficile respirationis causam statuo; Colon enim, ventriculi fundo subjacens, distensione suâ ventriculum, materiâ mucosâ aliàs plenum, non nihil elevat, & ita diaphragmatis motum quodammodo impedit. Ante meridiem melius se habet, ob longam digestionis moram, hinc minorem materiæ viscidæ in stomacho & intestinis existentiam, à meridie verò pejus, quia ventriculo aliàs malè digerenti à meridie usque ad vespertinum tempus non sufficiens spatium digestionis suppeditatur. Quod verò sub noctem mediam se pessimè habeat, hæc ratio subesse videtur, quia alimenta nova sub cæna, prioribus in prandio ingestis, ex vitio stomachi nondum rite digestis, & semiflatulentis; superingesta, mali radicem, indeque effectus ejus morbosos, deteriores reddunt, unde & flatus dolorem illum distendentem, dum æger dorso incumbit, inferunt, junctum cum partium circa hypochondria inflatione; dolor verò tensivus, qui probabiliter in hoc ægro erit, oritur à spasmo membratarum, speciatim peritonæi, circa hypochondriorum regionem nimis tensarum, adeoque obscuro quidem, sed molesto dolore affectarum. Deinde paulo clarius materiæ viscidæ in ventriculo

[Bb]

abun-

abundantiam confirmant tam infomniorum graviorum nocturna molestia, quàm etiam copiosa mucosa per os rejecta. Prior illa molestia nihil aliud videtur esse, quàm Incubus accidentalis, quem inter affectus respirationem nonnihil lædentes meritò numerandum censeo. Causa proxima verò hujus incubi est objectum quoddam diaphragmatis, motui deorsum versus reluctans, nempe ventriculus, copiosis nimirum alimentis minus digestis infarctus, materia mucilaginosa inquinatus, flatuumque copiâ distentus, qui dorso incumbens diaphragma sursum repellit, & ejusdem inferiora versus motum impedit. Quod verò anima rationalis, talium rerum quidem nescia, in hoc ægro tale somnium, mercium nempe sibi incumbentium pondus, concipiat, ex eo forsan est, quia tanquam mercator curis & negotiationibus maximè implicatus, vix alias cogitationes mente circumvolvitur, quàm de mercium suarum commoda comparatione, debitaque conservatione, hinc phantasia cogitationes atque actiones diurnas tempore nocturno confusè repetit, taleque somnium certo cuidam objecto applicatum producit. Posteriora verò mucosa viscida per os rejecta nullum alium fomitem agnoscunt in hoc subiecto patiente quàm prædictum ventriculus, eadem materiâ mucosâ oneratum, dum nempe æger noster dorso incumbit, per recubationem illam nocturnam pedetentim ex stomacho ad oesophagum materia illatendit, & matutino tempore, quando evigilat, per os screatu excernitur. Urinam tandem pallidam cum copioso sedimento albicante ex vitiosa digestionem deduco. Est enim sedimentum illud albicans nihil aliud quam chylus minùs rectè digestus, sanguinique, ratione urinæ potus, nondum assimilatus, & sic se causa proxima ejusque connexio cum affectu habet.

Ordine jam devolvimur ad Causam remotam, quæ licet quidem varia in hoc subiecto esse possit, tamen maximè hîc peregrinationes inordinario atque inconsueto alimentorum usu plenas accusandas esse, probabile videtur; curæ tamen nimix, constitutio melancholica, hîc minimè negligenda; punctulum enim suum ad hanc chylosin læsam etiam quodammodo conferunt.

PROGNOSIS.

Quemadmodum verò afflictis nullo modo addenda afflictio, solamen aliquod ægro nostro futuræ convalescentiæ subnectimus: quatenus non adeò periculosum præcisè hunc affectum, licet diuturnum, pronunciamus, qui tamen pedetentim, ventriculo probè curato, sit evaniturus.

C U R A.

In medendi ratione & respiratio difficilis levanda, & incubi insultus removendus. Vix his scopis satisfacere poterimus, nisi fomitem in primis viis removeamus, adeoque chylosin perditam restituamus. Difficile quidem est arte promovere chylosin, est enim simpliciter opus naturæ; nihilominus tamen, quantum possibile, auxilium debitum suppeditandum naturæ, quò mediante melius ad pristinam integritatem redire queat. Adeoque

1. Primarum viarum saburra acido-viscida incidenda & removenda, tam per superiores vias, quod convenientius, quàm per inferiores, quod difficilius.

2. Stomachica appropriata volatilia aromatica propinanda.

3. Si opus fuerit, Martialibus acidum, in specie in Melancholico, corrigendum.

4. Incubus appropriatis præservandus.

Primò ergò usurpetur sequens Vomitorium, præmittendo digestivum, quod corrigat acidum, & incidat viscidum, c. g.

℞. *Θ*ci* ʒj.

Spec. diatr. piper. ʒß.

M. D. in ʒ. part. æqu. S.

Digestif-Pulver.

Vel si digestivum ex gummi ammoniaco in forma liquida postuletur, usurpetur potiuncula Brunneri. Dein

℞. *∇ Ment. h.* ʒvj.

Cinnam. ʒij.

Syr. emet. A. S. ʒß.

M. D. S. *Brech-Mixtur auf einmal.*

Quæ pro circumstantiarum ratione reiteranda vel omittenda.

Dein laxativis passulatis secundum locum attribuo: hinc sequentem præscriberem formulam,

℞. *Pass. min. purg. usit.* ʒj.

ʒi Glat. ʒj.

M. D. S. *Laxier-Rosinen auf einmal.*

Loco hujus in morbo chronico convenit vinum medicatum aromatico-laxativum.

℞. *Rad. armor. rec.* ʒij.

angel.

acori veri ana ʒj.

Ireos nostr. rec. ʒiß.

H. rorismar.

Ment. h.

salvia ana M. j.

fol. Senn. f. st. ʒj.

Galang. ʒiij.

Cinnam. ʒj.

Passul. min. ʒvj.

Misc.

Pro secundo scopo optimè corrigunt volatilia tartarea, v. g.

R. *carmin. de trib.* ʒiij.

D. S. *Bertheilender Spiritus.*

Capiat de hoc æger 30. vel 40. gutt. ter in die: manè in vehiculo calido, à meridie bihorio antepastum in frigido, vesperi, post moderatam coenam, sub introitum lecti iterum. Vel

R. *Θ*ci anis.* ʒß.

D. S. *Eröffnender Lufft-Spiritus.*

Eodem modo usurpetur. Vel

R. *R ʒi ʒß.*

*Θ*ci ʒij.*

M. D. S.

Resolvende Tinctur.

Usurpetur eodem modo.

Quod si Incubus urgeat, iisdem volatilibus, sub introitum lecti assumptis, præcavendus, vel olei destillati anisi, aut balsami sulphuris anisati gutt. vj. vel viij. sub introitum lecti capiantur, & æger jubeatur minus dorso incumbere.

In contumaciori malo ad Martialia accessus faciendus, pro meliori evacuatione atque absorptione humorum acrium peregrinorum: v. gr.

R. *R Oli ʒis Zuvelff.* ʒj.

D. S. *Eröffnende Mixtur 30. Tropffen auf einmal.*

Si forsân in Paroxysmo vocaretur Medicus, ita ut sub medio noctis quasi orthopnoicus spiraret æger, vomitorium præscribatur: sed si hoc jam aliquot dies antè præscriptum sit, aut suspicio sit magis flatulenta, quam præcisè humorosa peccare, præscribatur clystma, simulque mistura volatilis aromatica.

R. *HB. absinth.*

hyssopi ana M. j.

fl. Chamomill. M. ij.

bacc. lauri ʒj.

Θ ʒi ʒij.

Coq. inf. q. ʒ simpl.

Colat. ʒix. adde

Elect. de hier. c. agar. ʒj.

Ol. dest. terebinth. ʒj.

M. pro Clysmate.

R. *ʒ hyss.* ʒij.

Menth. ʒj.

Cinnam. ʒß.

*Θ*ci ʒijß. ad ʒij.*

Syr. Nicotian. ʒj.

M. f. Potio: S.

Eröffnende Mixtur Löffel weise.

Capiat cochleatim.

Vel R. *ʒ hyssopi* ʒij.

Menth. ʒj.

Cinnam. ʒvj.

asthmat. ʒj.

Oxym. squillit. ʒj.

M. S. ut antè.

Tom. II. Pars 2.

CASUS XX.

ASTHMA CONVULSIVUM.

Stannarius, vir robustus aliàs, & optimè sanus, inconsistente ætate constitutus, incidit in tussim, præsertim noctu affligentem, sub qua rejiciebat quædam viscida atque cruenta, sed pauca. Interdum mediocriter se habet, utut difficilior nonnihil esset respiratio: Pedetentim verò in tantum accrescit morbus, ut gravissimæ anxietates suffocatoria cum prehendant, & lecto exsilire, fenestram aperire, auramque recentem captare necesse habeat, nisi omni momento suffocari vellet; adeò ut subinde noctes integras insomnes, sedendo in sella, & anxie, cum alta, crebra & difficillima inspiratione, respirando peragere cogatur, ita ut nullo modo spiritum profundè adducere posset, quia inspiratio mediâ quasi viâ impediatur, cum tussi mediocri, & pauca cruenta mucaginis rejectione. Apparente aurora, symptomata pedetentim remittunt, unde lectum & somnum repetebat. Quæsitus de loco affecto, superiora & anteriora pectoris, pulmonum cubilia, monstrabat. Interdum mediocriter se habebat, vir alioquin sanissimus, alimenta capit, supinus, & pro lubitu jacere, & quietè in utramque aurem dormire potest: sed nocte ingruente anxiosissimas patiebatur suffocationes, quæcunque exscreabat, sine ullo prodibant levamine. Causam antecedentem sciebat nullam, nisi forsân, quod paulo antè, quam dicto affectu correptus fuisset, pondus gravius gestasset, à quo tamen nulum nocumentum sensile percepisset. A Medico requisito jam purgatus fuerat, pessimè verò exinde se habuit: Venæ sectio etiam instituta fuit, sed frustra, pectoralia incidentia, expectorantia, antiasthmatica, &c. propinantur, sed sine successu. Ab aliis ergò Medicis requiritur Consilium.

RESOLUTIO.

Morbus est asthma quoddam convulsivum, quod frequens est in Praxi. Imprimis arthritici confirmati, itemque scorbutici, asthma convulsivo crebrò vexantur: dicunt, *das Podagra ist in den Leib getreten/ und machet kurzen Athem.*

Distinguendum autem hic sedulò est inter causam morbosam, & productum morbosum. Mucago siquidem illa pauca,

[Bb 2]

cru-

cruenta &c. quam æger excreat, sub tantis angustiis per vim naturæ coacervatur in aspera arteria tanquam productum morbosum, & ab evacuata lymphâ dependet: quod confirmatur inde per experimentum in cane vivo institutum mediante spiritu sulphuris, in venam cruralem immisso, unde hic lethale asthma incidit: post in eodem secto tota aspera arteria mucagine viscidâ spumosa cruenta erat plena, genitâ ex impedita circulatione sanguinis per præcordia, unde sanguis erebrâ agitatione instar albuminis ovi per aëris meatum & remeatum in spumam erat transmutatus: vid. experimentum diductius enarratum in *Disputatione de Chirurgia Insuforia*. Simili ratione ac in epilepticis talis spuma ante os conspicitur, quæ nil aliud est, quam saliva per impeditum aëris com meatum in spumam redacta. Ad hæc noster æger pondus grave gestavit, hinc suspicio: annon aliquod vasculum in pulmonibus ruptum fuerit, unde sputatio cruenta? Illustrat hunc casum evidenter ista respirationis interceptio, quæ fumo sulphuris incensi inspirato, & odore butyri antimonii, excitari solet; quatenus propter suam acrimoniam acidam pulmones constringunt, simileque asthma inferunt.

Est ergo asthma siccum ratione causæ natum à strictione pulmonum, qui simul sunt Pars affecta, & quidem per essentiam. In omni autem asthma Pars affecta est investiganda vel in thorace, vel viis, quas transit aër, vel pulmonibus, quos intrat aër.

In ægro nostro vitium non est in thorace, nec in viis, per quas aër transit: ergo in pulmonibus. Jam verò triplicia vitia respectu asthmatis in pulmonibus occurrunt: nempe vel vitium conformationis, quando iidem calculis vel vomica obsessi; vel vitium nutritionis, si ex ulcere v.g. horum nutrimentum pervertitur in pus; vel tandem vitium motionis, quando se iidem debite non possunt ad dilatationem accommodare, adeoque nec dilatari. Ac in nostro ægro non subest vitium conformationis; aliàs enim continuum foret asthma, quale tamen non est: nec vitium nutritionis, ob eandem causam, sicut etiam, quod & necessario materiæ fieret rejectio, & hæc excretâ levamen: Ergo vitium motionis in pulmonibus latet; ubi tamen, cum exspiratio sit libera, vitium non est quærendum in eorum motu contractorio, sed expansorio, hinc thorax non poterat expandi, unde in medio cursu inspiratio impediabatur: Vitium ergo est in pulmonibus, dum non ritè expanduntur. Scilicet in pulmonibus duplex substantia consideretur: quarum prior est ratione materiæ

substantia membranosa; altera ratione conformationis textura vesiculosa, ita ut sit congeries illa vesicularum membranacearum invicem confitarum, quas intercurrent vasa sanguinea in- & emittentia, unâ cum nervis, in filamenta nervea fibrosa se explicantibus, & extra pulmones plexum illum retiformem fibrosum efformantibus, quod vicem musculi gerens, extrinsecus pulmonum vesiculas ambit, adeoque ab hoc fit, ut pulmones se quodammodo activè constringere possint; dilatari verò, ubi se habent passivè. Equidem de hoc reticulari pulmonum plexu nil adhuc refert Malpighius in suis scriptis: interim eum postmodum in Epistola aliqua manuscripta declaravit; ac confertur de eodem Lamswerde in Respirationis Swammerdamianæ *Exspir.* pag. 35. & 36. Est adeoque pulmonibus duplex motus: expansorius, in quo merè passivè se habent, ut dictum; dilatantur nempe, quia replentur ab aëre: & constrictorius, qui itidem per maximam partem passivus est, utur in statu naturali tantillum conferant, & aliquatenus activè se habeant, quatenus earum fibrarum plexus debito tono & levi strictione in ordinariam & debitam vesicularum membranacearum plicaturam & ordinem conservat & promovet; tamen etiam passivè, quatenus à costis thoracis se constringentibus etiam constringuntur.

Causa autem proxima asthmatis convulsi in casu nostro est strictione plexus nervei fibrosi reticularis, pulmones ambientis, se stringentis, & expansionem pulmonum impediens; unde difficilis respiratio, & sic ægri suffocandi videntur. Cæterum Willisius & Helmontius sibi in hoc negotio explicando planè sunt contrarii, & toto cælo discrepant: & sicut hic in defectu peccat, dum omnem motum pulmonibus denegat, & eosdem saltem cribrum aëris putat, dum nempe pori stringantur, ut non possit transire aër, unde asthma siccum; ita Willisius videtur peccare in excessu, qui etiam vult, pulmones se in expansione quoque activè habere propter nervos, quod tamen impossibile est, quia dicit: pulmones manere in continuo expansionis motu, sed sic tales ægri facile possent inspirare, cum tamen videamus contrarium; hinc nec pulmones se expandere, probabile est; nisi enim constringerent se, & impedirent aërem, quomodo posset fieri asthma siccum? Asthmata autem sicca sunt multiplicia: nostrum est vitio pulmonum; alia sunt vitio musculorum thoracis, &c.

Causa remota in nostro casu non potuit esse gestatio ponderis, quia aliàs continuum fuisset

fuiſſet aſthma. Interim nec in de nihilo eſt, præſertim cum ex ſpiritu tunc temporis re-
tento vas aliquod in pulmonibus rumpi po-
tuerit, non ſecus ac aliàs tantilla eroſio à ſul-
phure acri metallico facta, lædendo vaſcula
pulmonum, generationem ſputi & muci
cruenti procurare poteſt. Sed arbitror:
cauſam remotam hîc eſſe Gas metallicum &
carbonum, uti apud victores, aſthmata ta-
lia incidentes, gas fumoſum piccum. Nem-
pe ſtannarii occupati ſunt circa ſtannum &
bismuthum, in quibus copioſè luxuriat ſul-
phur, metallicæ quidem proſapiæ, ſed ta-
men valde volatile exiſtens; quod patet ex
phænomenis ejusdem: Si enim raſura ſtanni
miſcetur cum nitro, ſtrepitum quaſi pulve-
ris pyrii edit; non ſecus ac quoque fit, dum
aqua fortis rodit Jovem, purum nitrum re-
manet, alcaliſatum nempe à ſulphure Jovis:
hinc quidam dicunt, Jovem, ſi roditur à
ſpiritu nîtri vel aqua forti, flammam concipere.
Imò ſulphur Jovis vel Saturni Mer-
curium facilè coagulat, dum illorum unum
in crucibulo liqueſcit, & parum frigeſcit, in
medio fovea, Mercurio implenda imprimi-
tur; ita enim ſulphur ſtanni aut plumbi ex-
traverſum, Mercurium arripiens, facilè coa-
gulat. Stannum ideò ob hoc ſulphur omni-
um metallorum Diabolus dicitur, *weil es
alle metallen ſpröde machet.* Sic itidem
metallarii bismuthum vulgò vocant tectum
argenti, itemque argentum immaturum, &
primum ens argenti; habetur enim pro ar-
gento immaturo, hinc facilè elevari poteſt in
flores. Sed in metallis, quæ conſtant ſulphure
volatili, ſulphur iſtud, quò magis volatile eſt,
eò magis reſolvitur ab igne, & prodit acrimo-
niam antea concentratam. Contrarium eſt in
metallis, quæ ſulphur fixius habent; Un-
de quando ſtannarii circa Jovem & biſmu-
thum occupantur, idque igne fuſionis, ho-
rum metallorum ſulphureos fumos, qui aliàs
ſub forma florum in vaſe clauſo ſe conſpicu-
os reddunt, & in aëre libero ſeparantur à
concreto, acriores factos copioſè inſpirant.
Hoc poſito, neceſſariò incurrunt læſionem
pulmonum, & quidem talem, quod dictæ
particulæ ſulphuris acidæ, rodendo fibras
nerveas pulmonum, eas facilè ad ſtriſturam
convulſivam diſponant. De cætero & car-
bonum gas inſpiratione attractum præter
vim narcoticam pulmones exſiccare, & ad-
modum rarefacere, & ad ariduram diſpo-
nere poteſt. In ægro quoque noſtro hæc
aridura probabilis eſt propter gas carbonum,
unde interdium non adeò benè respirare po-
teſt, utut aſthma convulſivum periodicum ſi-
mul ſit, quatenus alia ſymptomata concur-
runt: Conf. M. A. N. C. *Ann.* 3. *obſ.* 131.
pag. 239. ubi talium fumorum metallico-

rum, ſtannarios morboſos reddentium, men-
tio fit. Imò eodem loco allegatur Timæus
von *Gildentlee* / de figulorum noxis, ex
ollarum vitrificatione has recensens, non in-
digna lectu; & verum eſt, facilè ſunt figu-
li phthiſici & aſthmatici *wegen der Glette.*

Semel ita læſa pars aliqua poſtmodum
à tantillo inadæquato objecto facillimè
offendi & irritari poteſt: ita enim illi, qui
reſpectu texturæ materialis pulmones obti-
nent delicatos, faciliùs poſſunt lædi, levio-
rem etiam alterationem aëris magis ſentiunt
quàm alii; non ſecus, ac cephalalgia ex de-
bilitate capitis obnoxii idem fatum experi-
untur. Ex quo colligendum: in noſtro
ægro, quoad pulmones ex gas carbonum in-
ſpirato, læſa antea, veſperi exacerbari ma-
lum, quatenus ab elevatis interdium miaſma-
tibus aura aſperior reddita ſuum ſymbolum
conferat, unà cum aliis concauſis. Unde hic
æger, cum tempore veſpertino aër frequen-
tiùs ſit vehementior, facillimè potuit ſenti-
re noxam, aliis, qui pulmones robuſtos
habent, inſenſilem.

Quod autem aſthmata talia convulſiva
nunc periodicè nunc vagè moveantur, ſit
pro tempeſtatum mutationibus, aut vario
corporis motu.

Tuſſis ex materia iſta, non niſiſil velli-
cante, producto nempe morboſo, originem
duxit.

Quoad Prognofin: Difficilia curatu ſunt
talìa ſicca aſthmata, præſertim inveterata,
cùm non adeò cognita adhuc ſint remedia
ſpecifica.

Interim ut plurimum funeſtum omen eſt,
ſi pedes intumeſcant; tunc enim periculum
enaſcitur, ne tandem, ex tali virium defi-
cientium ſigno, ſuffocati ſubitò intereant.

Quoad Curam: Hæc reſpectu temporis
intra & extra paroxyſmum inſtituenda eſt: ita
ut in paroxyſmo optimè locum habeant an-
tiepileptica & antihyſterica volatilia: quibus
aſſocianda ſunt cinnabarina, tam antimonialia,
quàm illa Hungarica cinnabaris nativa,
aureæ proſapiæ.

Extra verò paroxyſmum præſervativè
opiata, adeoque & theriacalia, ſuſpendentia
eundem, conveniunt, reſpiciendo ſimul ad
cauſas remotas, in ſpecie ad fumos metallicos:
qui cùm in noſtro caſu ſint ſulphur Jovis &
bismuthi, acre volatile ab una parte per ignem
extraverſum, adeoque in textura ſui muta-
tum, & conſequenter acrius factum, ſicuti
ab altera parte Gas carbonum, pulmones ad
ariduram diſponens, hinc reſpectu ſulphurum
iſtorum metallicorum nil melius, ſublimio-
ribus remediis exceptis, in Praxi vulgari ex-
pertum, quàm demulcentia ac temperantia
pinguia, nutritiva, & blandè humectantia,
adeo.

adeoque in specie olea destillata, sperma ceti, butyrum, oleum amygdalarum dulcium, & lac cum sapone Veneto; quod ultimum quidem Barbette primus ad curam epilepsiæ introduxit, à Practicis tamen aliis quoque hujusmodi in casu proficuum observatum est: Vid. M. A. N. C. *l. cit.* Sic etiam qui laborant in antimonio, aliisque laboribus metallicis sulphureis, à tali asthma te convulsivo se præservant largâ butyri assumptione. Sperma ceti ex modernorum experientiis in paroxysmo asthmatico mirabile est, & Timæus von Guldenslee *in Cas. & Epist.* ceu præsentaneum in paroxysmis asthmaticis (in asthma autem humoroso non utile, utut aliquoties laxet alvum) convulsivis, & proficuum observavit temperando acrimoniam causæ vellicantis. Interim hoc in paroxysmo nihil proficiebat, sed in principio exhibitum juvat aliquid; sicut optimè extra eundem. Huic aliàs ægro propinavi primitus Expectorantia acida cum spiritu asthmatico, sed frustra; postmodum expectorantia dulcia cum spiritu salis ammoniaci anisato, sed etiam frustra; tandem autem misturam ex oleosis & salibus volatilibus ei præscripti, & melior sanitas hinc affulsit, reliquiis restantibus per liquorem terræ foliatæ tartari, bis quotidie ad gutt. xxx. depulsis. Imò proficua fuisset quoque talis mistura:

℞. *fl. Pæon.* ℥ij.
Liqu. C. C. succin. ℥j.
Cinn. ℥ii ℥ss.
Θis vol. lunbr. ℥ss.
Laud. opiat. gr. ij.

Misc. pro duabus dosibus.

Tandem externè unguenta cum spiritu salis ammoniaci confecta, sunt optima, si v. g. terebinthina, affuso successivè spiritu salis ammoniaci calido ex parte, terendo redigatur in massam albam: ita hæc sola cum aliis in pleuritide est polychresta, sub forma emplastri pectori applicata.

Asthma autem convulsivum ex hypochondriorum, adeoque diaphragmatis, convulsione tollitur primariò per vomitum, præprimis blandis digestivis, quod & inculcat Willisius.

CASUS XXI.

TUSSIS STOMACHALIS FERINA HUMIDA.

*V*etula pro ætatis ratione adhuc utcunque robusta, occasione inclementioris aeris hybernici sensim incidit in tussim ferinam. Primitus sentit vellicationem in faucibus, cum aliquali dolore, & copioso sputi falsi, mediocris consistentiæ,

screatu: hinc pedetentim tussire incipit, præsertim cum dorso incumbit, & hinc, dum manè evigilat, cum mucis viscidis & tenacis moderata rejectione. Intenditur paulatim malum, ita, ut interdum pariter & noctu tussiat, sed cum summo conatu, ex imo & profundo emergente; (*es flinget / wie aus einem hohlen Topff / dicit*) Copiosa viscida, sed cum summo labore, & crebrius repetito conatu, tussi ejicit, in tantum, ut ex laboriosa tussi non raro superveniat vomitus, mucinunc viscidis, nunc plus minus copiosis. Malum pertinaciter durat, appetitus prostermitur, sitis intenditur, febricula supervenit lenta, decumbens insigniter stertit, *sie röhelt*. Interrogata de loco & sensu materiæ, tussim excitantis, ostendit regionem epigastricam, speciatim locum, quem, vulgi etymo appellant scrobiculum cordis.

RESOLUTIO.

Affectus est tussis humida ab effectu, excretionem nempe materiæ mucaginosa dicta; quæ tamen non contradistinguenda est convulsivæ. Etenim omnis tussis consistit in convulsiva clausura pectoris, sive jam ea fuerit humida, sive fiat sicca. Et par hinc est ratio atque in vomitu: quemadmodum enim vomitus convulsivus stomachi, sic etiam tussis est cum motu convulsivo pectoris. Et ista tussis sicca; quæ oritur ex titillatione auriscalpii profundius auri intrusi, propter consensum nempe conjugationis nervorum cum ramo intercostali.

Quoad Partem affectam primariò, cum nostra vetula in statu demum morbi curæ se subjiciat, quæri de ea posset: ubi tamen de larynge dubitatur admodum, cum non omnis tussis oriatur ex vellicata larynge, nec ipsa ægra interrogata unquam conquesta fuit de dolore laryngis, sed potius de vellicatione in faucibus; unde colligo: pharyngem & membranam pituitariam posteriorem esse in hujus casus principiò affectam, eamque laborare phlogosi, & superficiali sui excoriatione. Confirmatur hoc, quia excretio fit cum screatu; non verò cum tussi; signum quod est, materiam ex membrana pituitaria, naturaliter spissiore lympham plorante, provenire.

Pars ergò primariò in principio affecta sunt fauces circa regionem membranæ pituitariæ posterioris; sicut postmodum in progressu & statu morbi simpliciter affectus est stomachus: quippe propter crebriorem descensum & coacervationem lymphæ illius spissioris ad stomachum turbatur digestio prima, sicque postmodum visciditate collecta sequitur tussis stomachalis.

Cæte.

Cæterum quod affectus sit stomachus, patet ex quinque circumstantiis:

1. est situs vellicationis; monstrat enim ægra nostra scrobiculum cordis. Unde ingruente malo ægri dicunt: *Es fällt mir ein scharffer Fluß auß dem Kopffe den Hals hinunter / und sezet sich um die Brust;* monstrantque regionem stomachi.

2. materiæ avulsio, quæ contingit circa regionem epigastricam; nam & phthisici exactè sciunt locum, in quo pus avellitur.

3. est sonitus inter tussendum cum impetu ex profundo (*auffm Grunde*) quasi *auff einem hollen Dopffe*; dicit: *sic müste lange husten / che es herauf kömmet.*

4. supervenit subinde vomitus, à quo, rejectis ordinariò viscidis recrementis, ægra nostra melius se habet.

5. pejus habet, quando dorso incumbit; quia tunc causa peccans magis orificium stomachi superius, & per consensum diaphragma, affligit.

Equidem paradoxon esse videtur, quod tussis ex stomacho oriri possit. Verum tamen id est, & modus, quo fiat, est duplex: Vel enim propter œsophagum asperæ arteriæ connexum; vel propter stomachum diaphragma attingentem, quod ab œsophago perforatur: Quorum primus tamen modus dubius ex eo est, quod materiâ deorsum per œsophagum vergente nasci tussis queat; interim posterior modus certior est. Ubi obiter quoque observandum; præter tussim humidam stomachalem apud quosdam etiam se offerre nonnunquam tussim siccam stomachalem nocturnam, qua monstrat locum præcordiorum, & omnium est pessima; talisque corripit interdum juvenes malæ & parca diætæ addictos, quæ sunt prodromi phthiseos, & curantur vix sine vomitu, eoque præmissio per liquorem terræ foliatæ tartari, utpote abstergentem ventriculi orificium superius.

Quoad causam remotam: hæc est aëris inclementia, quæ membranam faucium, speciatim pituitariam posteriorem, excoriat, quæ læsa mox dolet, phlogosi rubet & copiosam lympham plorat falso-acrem; hinc dolor inter deglutiendum à levissimo etiam objecto oritur. Notandum est, ob læsionem istam aëris facilem à natura narium meatus ordinatos esse, quibus quasi temperatur inspiratus aër, cum majorem longè impressionem per os inspiratus habeat: hinc etiam pessimè sibi consulunt, qui ore aperto dormiunt, quia tales inter alias concausas proniores sunt ad phthisin, quatenus scilicet aër non modificatus pulmones subit. Interim quod aër talis inclementior tunc magis laringem, nunc pharyngem, nunc tandem

nares afficiat, hoc partim dispositioni variæ, partim verò partium harum texturæ variæ, adscribendum est.

Porrò quicquid mucosi mulier rejicit, illud non est causa morbofa, sed tantum productum morbosum, natum ex digestionelæsa stomachi, quia ex stomacho rejicitur. Et enim duo in hoc casu occurrunt:

1. Lympha non adeò quidem acris, falsa tamen, primum irritans œsophagum, hinc mucii copiosi, sub noctem cumprimis, in stomacho congestis; undè manè tussis molestior, & ejectio copiosior.

2. Ex lymphâ descendente in stomachum digestio hujus læsa, unde secretus in principio est saltem ex faucibus, & tunc minus tussit; imò parum quoque vel nil mucii rejicit, sed in progressu tandem morbi.

Talis tussis interdum est chronica; quæ tamen non ex faucibus est, cum hæ optimè se habeant, & ægri vinum liberè bibere possint, sed ex stomacho. Et licet mitigata videatur, tamen subinde recurrit, & vix, nisi per vomitum, vel sponte vel arte provocatum, eradicari potest. Fovetur malum à falsa lymphâ in plicis stomachi alimentorum digestionem impediende; hinc speciatim manè evigilantes violentius tussunt, & copiosius ejiciunt; quatenus nempe tunc uberius ista recrementa ex digestionelæsa congesta ad majorem quantitatem excrescunt. Certè tussis infantum frequentissimè est stomachalis, tam ab lactatorum, quam sugentium, quatenus in stomacho alimenta in pastam viscidam tenacem degenerant, hinc stomachum & œsophagum, atque per consensum asperam arteriam irritant.

Stertor non semper est ex pulmonibus, sed quatenus reliquiæ quædam mucii hinc inde hærent, quibus transiens aër stertorem infert, potius est ex stomacho.

Insuper observavi simillimam tussim in matre mea ex inspiratione fumi pinguis nidorosi in culina, nundinarum tempore, qui similiter penetrat ad fauces, quas acrimoniâ falso-acidâ vellicat: sicut enim nuges pingues, rancidæ & olidæ, faucibus solis talem raudinem pinguedine falso-acida inferunt; ita quoque fumus acrimoniâ suâ acido-falsâ tussim stomachali ansam præbet.

Tussis augetur, quando dorso incumbunt propter stomachum; quasi in glomum mutatum. Notandum: diaphragma semper in eodem situ, sive stemus sive cubemus, manere; de stomacho verò aliud dicendum, quippe quod prostrato corpore diaphragma magis attingit.

Quoad febrim hîc concurrentem: monendum, eam in statu lentam, in principio magis acutam esse, adeoque facilè nos decipi

cipi posse, ut ardentem eam putemus, nisi circumstantiæ docuerint, eam symptomaticeam potius fuisse: unde utut continuo pulsū concitatore comitata incedat, à pastu tamen calor magis urget, quàm in statu morbi confirmato remittit; & si aliquot dies transierunt, sit lenta, & hæctica ferè similis, quæ tamen remoto mucó spontè cessat.

Quoad Prognosin: Morbus per se non est periculosus, debilitat tamen; utut per accidens ex concursu aliorum symptomatum periculosior fieri aut ipse in habitualementransire queat. Cæteroquin tales sitiunt magis, non autem edunt, & metus est imminentis tandem hæmoptiseos, speciatim ubi constitutio ægri conspiraverit.

De Pleuritide metus est nullus.

Quoad Curam: hæ tres Indicationes potissimum observentur; nempe

1. Causa vellicans in stomacho removeatur.
2. Irritatio & vellicatio sistatur, si quæ superest.
3. In faucibus asperitas, vel dolor adhucurgens, Temperantibus & Corrigentibus leniatur: quæ tamen indicatio ultima magis in principio urget, unde in Praxi ferè primò omnium observetur; secus enim impeditur remediorum usus.

Jam verò, utut certum sit, malum per simplicia incidentia curari non posse, causam tamen vellicantem in stomacho optimè removeant, quæ citius longè & tutius tussim hanc curant, præmissio, ubi visum fuerit, digestivo.

Post vomitorium, nisi faucium urgeat asperitas, pro expectoratione promovenda oxymel simplex & squilliticum convenit, quatenus incidit, & propter mel fauces lubricat: sicut & nicotiana est mirabile Simplex, cujus aqua & syrupus ritè paratus mirus est in promovendo pectoris & stomachi mucos. Ad tussim ergò humidam præscribitur mistura sequens, quam sæpius usurpavi:

℞. ▽ *Menthae*.
scabios. ana ℥ij.
oxym. squillit. ℥j.
Syr. de Cryf.
nicot. ana ℥℔.
emet. ℥ij.

M. f. Potio.

Quibus, si æger potest ferre, addatur, q. s. spiritus nitri dulcis, qui mucos expectorationem in tussim stomachali egregie promovet. Vel

℞. ▽ *hyssopi*
Meenthae ana ℥℔.
asthmat. ℥ij. vel ℥vj.
*G. *ci c. *osol* ℥ij. ad ℥j.

Syr. scabios. vel Violar. vel de Jub. ℥℔. vel ℥vj. ad ℥j.

M. pro Potione.

Ad incidendum mucum excellit radix ari, quæ in se singulare planè & causticum sal continet, resolvens mucum viscidum primarum viarum, & appetitum provocans. Adhibetur autem tam cruda, scilicet **gerieben auff einer Butter-Bamme gestreuet**/ quàm præparata, non tamen cum aceto, quæ potius est castratio virtutis incidentis; sed sumatur radix integra purgata, trajectaque filo; suspendatur in umbrosus locum; sic enim, utut phlegmatis evaporatione salacre jacturam sui aliquomodo patiat, magna tamen ejus pars remanet, ratione cujus etiam egregium antiscorbuticum est: Post si volumus usurpare, corticem prius separemus.

Ne exasperentur fauces, Temperata, & ipsum stomachum quasi nonnihil excoriatum demulcentia, conducunt: qualia sunt nonnihil viscosa & insipido-dulcia, glycyrrhiza, mel, saccharum, passulæ, tragacantha, &c. **sie machen einen glatten Hals.** Optimus est sperma ceti recens, flores sulphuris, crocus, qui etiam mucum resolvit: e.g.

℞. *Sperm. ceti* ℥j.

fl. Anis ℥j.

Croc. gr. vj. vel ℥℔.

M. pro duabus vicibus, manè & vesperi sub introitum lecti in cerevisia calida assumendis.

Balsamus sulphuris anisatus est etiam egregius in tussim; item opium, pilulæ de cynoglossa, & de styrace.

Vulneraria frustra sunt; nulla enim horum est indicatio.

Gargarismata, dum fauces dolent, sunt suspecta; saltem in ore sunt tenenda absque gargarisatione, quia motu nimio fauces nimis exasperant; unde etiam non semper in angina conveniunt. Præterea decoctum raparum, vel recentium vel exsiccatarum, est egregium, etiam post decoctionem primam expressus ex iisdem succus sicut etiam in affectibus urinaris, dysuria, in urina magis acri ab assumptis cantharidibus oriunda, morbisque etiam à lymphâ falsa enatis, optimè convenit. Pro leniendis etiam faucibus optimi sunt linctus, ex quibus præfertur succus expressus ex passulis, decoctione elicitus, vel loh passularum; item opiata, ut syrupus diacodion Montani, mistus cum syrupo scabiosæ, & cum baculo liquoritæ sensim deglutiendo.

Hos ægros etiam simul interdum urgent anxietates & vagæ angustia præcordiorum, **die Herzens-Angsten**/ & miserè interdum torquentur, speciatim propter mucum & produ-

productum morbosum, in flatus in stomacho resolutum fermentando. Ad has tollendas præter clysmata carminativa, nil melius est spiritu carminativo de tribus. Dosis à gutt. 30. vel 40. in cerevisia calida assumptus; loco hujus etiam spiritus salis ammoniaci anisatus potest hoc in casu substitui.

CASUS XXII.

FEBRIS TERTIANA INTERMITTENS SCORBATICA.

Studiosus Juvenis, sedulo studiis incumbens, indeque ad hypochondriacum malum inclinans, corripitur die 5. Aprilis, cum nox prægressa præter morem fuisset inquieta, & non nihil anxiosa, præcedente artuum lassitudine, & cephalalgia, horrore gravi, cum insequente aestu & siti, aliquot horas durantibus. Negligit autem talia, præsertim cum post noctis suavem quietem sequenti die melius habuerat, nisi quod appetitus minus urgeat. Excipit verò hunc nox inquietas, somno admodum anxio & interrupto gravis: appetente mane, die 7. Aprilis, aliquoties vomit varia liquamina multi coloris, amaricantia, &c. hunc vomitum insequitur tussis sicca & inanis, ultra mediam horam graviter affligens (locum irritationis scrobiculum cordis seu cartilaginis ensiformis regionem monstrat) quæ evanescente varia phantasmata & incondita cogitata mentem perturbant, quæ excipit leve corporis frigus, successivè in intensum corporis aestum, & ardorem, extrema imprimis lancinantem, transiens, cum efflorescentibus hinc inde maculis rubris & purpureis; comitantur talia insignes anxietates, ut æger hinc inde miserè se jactitet, hypochondria simul quoque tendi videantur. Durationis hæc tragædia successivè remittendo, ultra 9. horas, ita ut maculae etiam pedetentim iterum evanescant, lassitudine saltem artuum & cephalalgia superstite; nox insequens quieta, & somno placido amica, altero mane bene se habet, horis antemeridianis supervenit sudor copiosus universalis, cephalalgia reliquias, & si quid aliud superest præternaturale tollens, à meridie quoque optime habet; vespèri verò conturbari quid sibi in hypochondriis videtur, artuumque lassitudinem redire, metuens novas turbas, Medicum vocat pro Cura.

RESOLUTIO.

Affectus est Tertiaria intermittens simplex:

Ad sunt tamen Symptomata longè plura, & atrociora, quàm aliàs adesse solent, quia
Tom. II. Pars 2.

æger noster est hypochondriaco-scorbuticus, unde dicitur scorbutica; utut hypochondriacæ febres cum scorbuticis ferè coincident. Jam verò in nullis subjectis febres intermittentes majoribus symptomatibus comitatæ incidunt, quàm in hypochondriacis & scorbuticis mirabiliter affligunt, subinde videntur malignæ, cum tamen non sint. Interim febris nostri Patientis est periodica, non erraticæ, quales plerumque solent esse scorbuticæ, & nunc semel, nunc bis, unâ die Paroxysmus recurrit: unde, quando talis in febribus intermittens occurrit typus, indicium est, subesse crasim massæ sanguineæ scorbuticam.

Cæterum archei sub febribus dominium post Paracelsum allegat Helmontius, ejus vestigio insistit Faber & Clariss. Langius in *Commentar. in hunc*. Quoad archeum: ejus vox propriè de spiritu insito, non autem de influo, cujus affectiones hic explicantur, intelligitur. Ad hæc demus operam, ne, Platonis instar, animal peculiare, archeum, in animali statuamus, quod faciunt plures Medici, hunc & scibilem, & irascibilem & concupiscibilem vulgò fingentes & introductes: summatim: hi Autores parabolis quidem rem illustrent, minus vero scientificè eam explicant. Binas potiùs substantias in corpore nostro invenimus, animam saltem, spiritum immortalem, cum quo Medicis nil est negotii, & hinc machinam corpoream. Hujus ergò pathemata, quantum possibile, ex conditionibus materialibus, quas intereminent mechanicæ, & post has chymicæ, explicemus: siquidem & ipsi spiritus nostri reverà sunt materiales, adeoque si quæ sunt spirituum affectiones & motus, ex iisdem principiis, tanquam universalibus & sensu notioribus, pro distinctione & clariore affectionum notitia explicare enitamur. Ubi que nempe in corpore spirituum vim & energiam observamus, animalium pariter ac vitalium: illorum in sensuum affectionibus, & consequenter spirituum illorum organicis motibus: horum in variis succorum alterationibus, mutationibus, & partium solidarum consequentes plus minus vitiis inductis. Sed tamen sobriè & distinctè, non verò quia similitudines aut exempla ab animalibus, & tantum non homine desumpta, rem saltem illustremus.

Uti ergò in omni morbo, ita in specie in febribus, præsupponitur spirituum motus inordinatus & energia, quia corporum viventium affectiones sunt morbi. Hoc ergò ceu catholico vitæ & actionum, tam naturalium quàm præternaturalium, principio præsupposito, speciatim in machina corporea, conficeretur fiendi ratio. Adeoque in omni

[Cc]

affectu

• affectu specialis energia spirituum indaganda: & hinc, dum spirituum impetus per opium sistitur, eo ipso febres suspenduntur: quatenus autem iidem spiritus à causa materiali aliter ac aliter afficiuntur, eatenus diversos morbos producant.

Præsupponitur ergò in omni febre vis spirituum animalium: consideretur solummodo, quomodo afficiantur à causa morbifica?

Videatur jam in nostro ægro, quanam Pars sit affecta: Illa autem distinguetur in specie in subjectum inhaesionis, & hinc radicationis. Subjectum inhaesionis est totum corpus: nam totus homo febricitat, in specie tota massa sanguinea, quod testatur aestus, calor, &c. Radicationis verò subjectum, seu in quo & circa quod, est circa primas vias, stomachum puta & intestina. Hinc enim in quibusvis febribus intermittentibus ordinariò frequentia symptomata circa primas vias & hypochondria maximè urgent. Res ut pateat, hic & in similibus febricitantibus consideretur horror, qui in nostro ægro obvius non est ex fuga spirituum sed potius ex impetu eorumdem; quandoquidem horror est saltem spasmodi species & impetus spirituum, quia interdum febricitantes, præsertim quartanarii, sub rigore nonnunquam ita corripiuntur, ut etiam instar epilepticorum contremiscant. Nam similiter rigor & tremor artuum à frigore externo est motus convulsivus in cute & partibus membranosis. Horror verò in febricitantibus non necessariò fit à positivo frigore, quia in talibus sub rigore manus & pedes tacti positivè calent; quod innuit inchoantem spasmum, qui exacerbatus horrorem & rigorem infert circa stomachum & duodenum; quia Patientes, incipientes frigere, locum vel anteriorem vel posteriorem stomachi monstrant, unde in febricitantibus positivum frigus requiri non necesse est. Imò olea destillata, scrobiculo cordis illita, præsertim caryophyllorum & anisi, præservativè, desuper imponendo laterem calefactum, contra horrorem mirabiliter conveniunt; sicut si internis eundem velimus compescere, præter olea destillata dicta opium primatum ducit, utut saltem palliativè curet, & postmodum saltem morbum concentret, nisi illud cum aliis specificis misceatur. Porro spasmodicam fibrarum in primis viis contractionem excipit succorum effusio, unde anxietas, sitis, vomitus, aliaque symptomata circa præcordia & hypochondria. Scorbutici & hypochondriaci, quando laborant febribus intermittentibus, in principio paroxysmi frequentissimè patiuntur anxietates præcordiorum, potissimum in nostro scorbutico, quæ ordinariò sunt ex

stomacho, hinc ut plurimum anxietates tales superveniente vomitu cessant, uti in incremento & statu paroxysmi, si urgent hæ anxietates, easdem clysmata optimè sistunt. Vomitus autem variorum liquaminum viridium, in ægro nostro in principio Paroxysmi observabiles, non sunt critici vi naturæ, sed saltem symptomati, dependentes ex spasmis intestinorum & locorum vicinorum, quibus non evacuatur fomes morbi, sed succi aliàs naturaliter constituti à causa morbifica corrumpuntur & lacerantur, retroeunt ad stomachum. Par ratio est de sudore, qui post Paroxysmum non est criticus sed symptomaticus. Res ut pateat, succi, qui eijciuntur, subinde naturaliter se habent; non secus ac in sanis ex usu antimonii flava rejiciuntur, unde etiam, licet ægrum valde debilitent, non statim sistendi sunt; sunt enim bonum signum malæ causæ; fit enim quandoque, ut aliquid de fomite morbi simul evacuetur, & dum rejiciuntur, per accidens symptomata quadam remittunt. Interim tamen critici non sunt; nisi enim urgeret vis morbi, non sudarent, nec vomerent ægri: non tamen etiam nisi certis in casibus provocandi. Similiter tussis illa sicca nostri ægri reverà erat saltem ex stomacho & primis viis, commoto à febrili fermento, & irritato diaphragmate. Cum enim dedissem eidem laudanum opiatum ante Paroxysmum, emanabat tussis; uti omisso illo illa redibat, & Paroxysmum per semihorium antecedeat: unde non curanda sunt tales tusses, nec aliquid inferunt, sed dato valido vomitorio cedunt.

Cephalalgia affligens, quæ est absque pulsatione temporum, uti in nostro ægro, frequenter est per consensum stomachi affecti, hinc imminente vomitu intensius urget, & præmissio vomitu cessat; quæ verò affligit cum pulsatione circa tempora, dependet ex orgasmo sanguinis vehementiori, & solummodo superveniente sudore cessat. Hinc æger post Paroxysmum benè se habet, saltem superest cephalalgia, quæ postero die per sudorem cessat. Tandem etiam Sitis clamosa, ut & hypochondria tensa, de fomite circa stomachum & partes vicinas latente, testantur.

Cæterum considerandum adhuc: mox cum febre cessare appetitum, ægrosque extraordinaria appetere, ova, carnes, juscula, aliaque alimenta nutrientia horrere, sique edunt, saporem nidorosum percipiunt propter fermentum cessans in stomacho, hinc cessat appetitus, digestio, unde alimenta ingesta tunc temporis putrescunt, & nidorem contrahunt. Contrà sitis intenditur, quæ

quâ tamen affligente, non bibunt cerevisiam, ob similem rationem, sed potius coventum, aut aquam simplicem, ideò, quod hæc facillè intestina transeant; secus ac cerevisia, varia incommoda quæ excitat.

Ex his ceu universalis ferè axiomatis loco sit: Si in quibuscunque febribus, in specie continuis, tantillum adhuc appetitus superest, tunc semper bonum pronuntiatur: quod idem valet de cerevisiæ appetitu adhuc salvo. Imò si in quacunque febre post horrorem redeat denuò sapor vel appetitus cerevisiæ, & gustus ejusdem, optimum indicium renovati fermenti stomachi digestivi suggerit.

Et hæc inter alia sunt symptomata, quæ fermentum febrile in primis viis, fibras nerveas vellicando, producit: Hæc confirmant, subjectum radicationis esse primas vias, ubi symptomata dicta oriuntur, vel per essentiam, vel per consensum.

Subjectum autem InhæSIONIS esse massam sanguineam, testantur æstus, pulsus, sudor, &c. quatenus fermentum febrile sanguini ulterius communicatum, motum ejus naturalem fermentativum pervertit, sulphur infringit, à quo incalescentia aliàs naturalis tandem spiritus afficit, hinc frigus magis vel minus positivum. Æstus dependet non à spiritibus, quia delassantur, sed ex sanguine nimis æstuante & incalescente corpus, simili ac quidam ex pulsu incalescit, cujus rapidiorem circulum & intensiorem orgasmum indicat. Pulsus in qualibet febre frequentior, celerior, & ut plurimum major, bonus est, quia irritatur propter modificatum suo modo motum fermentativum; dum enim à sale volatili sanguinis sulphur subjugatur, incalescit corpus, & febriliter æstuat, donec particula ista acidæ in falsum mutata mediante sudore foras excernantur. Sudor hic universalis sanguinem affectum esse ostendit: qui, si mox post paroxysmum apparet, bonum est; quò verò diutius post paroxysmum apparet, eò tardior, & magis chronicam futuram esse intermittentem indicat; uti ante paroxysmum affligens sudor malus est; & talis ferè colliquetivus in scorbuticis observabilis est, & ægros debilitat. Ardor artuum lancinans, ægrum in Paroxysmo corripens, frequens esse solet laborantibus febre intermittente scorbutica, speciatim, qui subinde dolores graves lancinantes patiuntur, idque interdum & frequentius sub rigore, interdum & rariis sub æstu, ut extra paroxysmum nullum dolorem percipiant, quale quid in muliere quadam, arthritide vaga sub æstu correpta, observavi. Tales ergo dolores ar-

tuum lancinantes sensiles unum sunt ex certissimis & primariis signis latentis scorbuti in febribus intermittens; non secus ac maculae purpureæ efflorescentes in nostro ægro ordinarius comes sunt intermittens scorbuticarum, in statu paroxysmi efflorescentes, dum summè urget æstus; in declinatione verò nunc mediante sudore, nunc sine eo iterum disparentes. Cæterum non solum hac in parte nimis audaces; observantur enim, teste Fehrio *Tr. de Scorz. pag. 27.* quoque intermittentes malignæ cum petechiis.

Causa proxima febris in ægro nostro, materialis nempe seu occasionalis, nihil aliud est, quàm fermentum aliquod præternaturale in stomacho, ex læsa ejus digestionem genitum; & in eo exaltatum, quod massam sanguineam alterando, & primarum viarum nervos vellicando, occasionem suggerit motui spirituum animalium inordinato. Scilicet fermentum illud febrile sunt minima illa miasmata, activa tamen & penetrantia, similiterque alterativa, omnium symptomatum autores, & analogæ ferè (ne dicam similia) contagiis, in aliis morbis & febrilibus observabilibus; præsertim cum & intermittentes quandoque contagiosæ à Lotichio in *Obs.* observatæ sint. Ut itaque non præcisè colluvies morbofa materialis quædam præfens, & febrium causa existat; secus enim per purgationes illa expugnari posset; cum contra, etsi talis febricitans millies purgetur, febris tamen in eodem tenore, nisi specifica adhibeantur, persistet.

Fermentum autem hoc febrile est salinæ prosapia, & in specie naturæ acidæ, in hoc siquidem conspirant symptomata & cura. Symptomata, v. g. horror, rigor, frigus, lancinationes artuum, vomitus, declarant acidum, cujus occasione, nempe fermentatione in sanguine, mutatio horroris in æstum contingit; & cura demum per salia alcalia, & terrea, maximè acidorum destructiva, instituenda; adeò, ut nullum sit artificium, febrem intermittentem curare, modò maturè Medicus adhibeat.

Origo autem hujus fermenti febrilis est tam ex imminuta, quàm depravata stomachi digestionem, cujus occasione ex acido fermento naturali facillimè præternaturale emergit, & ventriculi rugis se cum recrementis insinuat, sicque vomitum causat. Hoc confirmant causæ antecedentes, quæ acidum stomachale pervertere possunt, nempe perversa ut plurimum diætæ, aut nausea super aliqua intermittentes febres generant; sicut, & ex morbis acutis convalescentibus, quos ordinariò fames ingens affligit, dum

avidius & nimis copiosè ingurgitant alimenta, febres inintermittentes contrahunt; non secus ac fructus horæ, copiosius ingesti, quàm quod stomachi fermentum iis digerendis sufficiat, ad intermittentes disponunt. Unde quemadmodum per inediam non rarò, destructo fermento febrili, febres intermittentes curantur; ita econtrà per largiorem potum, superveniente vomitu, idem interdum expectatur eventus. Hinc intermittentes adeò sunt durantes sine vitæ periculo.

Febres hæ distinguuntur in nothas & legitimas. In his est fermentum febrile magis volatile & activum, ubi paroxysmi vehementiores, sed breviores sunt; in nothis verò est fermentum minus volatile, & subiecto viscido irretitum, hinc minus activum; unde paroxysmi sunt leniores, sed diuturniores: Et hæ tertianæ sunt febres lentæ.

Fermentum hoc febrile acidum, delitescens in stomacho, dum exserere se incipit, ratione acidi partes nervæ primarum viarum vellicantur, & occasione vellicationis dictarum partium spasmi, ratione spasmorum succorum in dictis locis effusio contingit, & ab his duobus omnia viscerum symptomata derivanda sunt, quæ in principio paroxysmi circa præcordia & hypochondria observantur, nempe rigor, horror, vomitus, lancinationes, tensiones hypochondriorum &c. Nempe succi isti, pancreaticus puta & biliosus, effusi, prout magis vel minus naturaliter sunt constituti, eatenus varium motum concursu suo excitant; sicque variorum symptomatum autores sunt; uti & in scorbuticis intermittens, ob varium statum succorum illorum, symptomata variant.

Idem fermentum sanguini permistum activitate suâ materiale ejus motum fermentativum pervertere, incalescentiam debitam, impediendo sulphuris motum, sistere, hinc spirituum animalium debitam emersionem impedire potest, hinc frigus magis vel minus positivum infert; dum verò à sale volatili sanguinis subjugatur, supervenit major sanguinis fusio, hinc incalescentia & æstus, donec particula ista fermentativa ab alcali sanguinis in salsum mutata, & sero infusa, mediante sudore excernantur foras.

Ex hoc omnia symptomata possunt deduci. Unus adhuc est scrupulus, nempe certa illa determinatio temporis, quod adhuc nescimus.

Causa antecedens in nostro ægro est nimium studium & ardor in literas. In specie autem meretur considerationem, quod nox paroxysmum præcedens gravior fuerit, anxia nempe & inquieta, quales inquietudines & insomnes noctes, si ægros sine manifesta cau-

sa, h. e. citra curas, dolores aut tusses, affligant, fontem ordinariò ex molestia quadam circa præcordia & hypochondria habent, & præsertim ex stomacho oriuntur, vitiata vel hujus digestionem, vel chyli in duodeno à fecibus separationem. Hoc confirmatur exinde, quod, qui vesperi largius & seriùs cenant, minùs suaviter dormiant, quia stomachus sub laboriosiori digestionem istas anxietates molestiâ quâdam circa hypochondria excitat. Sic quoque hypochondriaci noctes inquietas patiuntur, idque ex inæquali alimentorum digestionem, propter acidum præternaturale peccans, unde in talibus hypochondriacis ad conciliandum somnum nil melius est Martialibus, ante cœnam datis, continuando eadem.

Quoad Prognosin: metus est, ne fiat chronica; quia diversimodè variant hæ intermittentes, nunc in typo, nunc in symptomatibus. Ratio hujus permutationis est ex concurrentibus circumstantiis vel concausis fermenti febrilis, quæ sunt vel externæ vel internæ. Externæ mala & inordinata diætæ, si nempe ægri die intermissionis copiosius, aut ante absolutum paroxysmum, comedunt; aut quando patiuntur paroxysmum pleno stomacho. (2.) Propter abusum acidorum in æstu seu statu paroxysmi: blanda quidem acida proficua sunt, maximè nitrata, sed nimium acida, aut frigidiora alia omnia, in statu paroxysmi bibita, febres & harum symptomata diversè modificant. Sic faciunt huc (3) medicamenta, præsertim specifica & opiata, quæ malè, sine selectu, & nimis citò applicata, duplicant interdum intermittentes, nisi universalis illorum usus præmissa fuerint; non secus ac quoque, qui sine selectu iisdem abutuntur, nunc in colicas gravissimas, nunc paralyses, ægros præcipitant. Opiata etiam, nisi aliis appropriatis admista adhibeantur, hoc præstare queunt, aut febres chronicas reddunt.

Causæ autem internæ sunt vel major vel minor fermenti febrilis activitas, hinc febris vel acrior vel minor, &c. itemque prout sanguinis crasis vel nativa vel adscititia, variat, febres intermittentes possunt fieri continuæ, & vice versa: quò pertinent quoque succorum primarum viarum variæ alterationes, qui uberius effusi variorum symptomatum & mutationum sunt autores.

Pro Cura itaque sequentes Indicationes observandæ:

1. Radix mali ex primis viis evacuanda.
2. Fermentum febrile acidum volatile corrigendum.

3. Massa

3. massæ sanguineæ & universi corporis habitus sudore depurandus.

4. stomacho & primis viis appropriatis succurrendum, ne recurrat.

Prius optimè expedit vomitorium, quod in febribus quibuscunque intermittibus est optimum, quò radix ex primis viis evellatur, aliquot horis ante paroxysmum dandum, sic optimè operari possunt; si æger autem propter pusillanimitatem abhorreat vomitum, detur digestivum salinum ante paroxysmum & vesperi, & hinc loco Vomitorii sequenti intermissione die blandum laxativum per alvum. Nam purgationes fortes in febribus intermittibus sunt hostiles. Imò ex observatione Gabelchoveri constat, febres intermittentes per fortiora purgantia recidivasse. Venæ sectio nihil valet. Quando verò symptomata ex sanguinis turgescencia urgent, ut in statu, æstu, doloribus capitis, turgescencia corporis, difficili respiratione, si ante paroxysmum die intermissione secatur vena, symptomata quidem remittunt, sed ægri diutius morbo laborant, aliàs symptomata quidem sine venæ sectione sunt vehementiora, citius tamen pertranseunt. Interim tamen in mulieribus, quibus menstrua fluunt, si in febribus intermittibus sub rigore supprimatur mensium fluxus, ante paroxysmum venæ sectio in talo instituenda est: utur enim menses sub rigore suppressi sub æstu redeant, parum tamen est, hinc symptomata exasperantur, unde tunc venæ sectio convenit.

Hypochondriacis, quando anxietates ex stomacho patiuntur, etiam in statu paroxysmi utiliter applicantur clysmata pro evacuatione primarum viarum, retinenda tamdiu, ac retineri possunt.

Externè applicetur emplastrum ex taca-mahaca.

Vinum in quibuscunque febribus, etiam malignis, non est interdendum; parum vini enim est potus medicamentosus, nisi forte percipiant ex eo æstum. In intermittibus in decremento paroxysmi haustus vini insignis est restaurativum & sudorem promovet.

Alterum scopum obtinemus specificis, quæ vel destruunt acidum fermentum febrile, vel istud abstergunt, & è stomacho educunt. Priora sunt vel terrea, vel salia alcalia: Terra sunt lapilli cancerorum, cornu cervi ustum, testæ ostrearum, corallia, & similia: Alcalia sunt aut fixa, aut volatilia; Inter fixa sal absinthii, &c. Volatilia sunt nunc macra, nunc pingua seu aromatica. Quæ abstergunt, sunt nitrosa, nitrum antimoniatum, arcanum duplicatum, sal ammoniacum, sal hypochondriacum, &c.

Talis inter remedia hæc subordinatio est observanda, ut (1) alcalia fixa & terrea sint optima in frigore, horrore, & symptomatibus hypochondriacis, v. g. coralliorum, salis absinthii à ℥j. ad 3℥. &, si opus est, cum gr. j. laudani opiati, nec non guttula una vel altera olei cujusdam destillati, maritata.

(2) quando verò urgent symptomata in massa sanguinea, ut æstus, &c. commodius dantur nitrosa, uti & alcalia volatilia, v. g. spiritus salis ammoniaci bihorio ante paroxysmum à 3℥. ad 3j. vel sal volatile cornu cervi pro sudore promovendo ad ℥j. in minori non dentur. Sed salia volatilia aromatica pingua frigus quidem compescunt, sed intensiorem æstum concitant, hinc cautè usurpentur: spiritus salis ammoniaci & sal quoddam fixum sufficiunt.

(3) opium est saltem remedium palliativum.

(4) observetur usus legitimus & abusus horum specificorum. Usus est, ut primò dentur legitimâ dosi & tempore. Legitimum tempus est vel universale vel particulare: Universale quod attinet, non dentur, nisi præmissis universalibus: quoad particulare, dantur ante paroxysmum horis duabus vel tribus. Medicus autem vocatur ad ægrum, cum nox est gravis, quamque debet insequi paroxysmus sequenti die. Ante omnia ergo noctem inquietam, & impetum ad paroxysmum sequentem, supprimat; hinc isto vespere ordinetur pulvis salinus.

(5) Si unâ vel alterâ vice non juvet medicamentum, consultum erit variare propter idiosyncrasiam ægrotantium. Simplicia autem sunt optima. Sed posito, quod sal absinthii datum sit ter vel quater, non tamen curat, tunc observanda idiosyncrasia; v. g. noster æger ratione idiosyncrasie abhorret à cochlearia, si hanc præscriberem, vellemque insistere eidem, non fieret sine læsione.

(6) Sitis compescitur per aquosa acidula: declinante paroxysmo Julebi aciduli & quilibet potus conveniunt, ad promovendum si supervenire vult, sudorem.

(7) Intermissione tempore usurpentur remedia alterantia appropriata, ut essentia cardui benedicti, absinthii, centaurii minoris cum spiritu salis ammoniaci mista, ut promoveatur largius sudor: v. g.

℞. *Ess. card. bened.* ʒij.

— *Θ*ci* ʒj.

M. S.

Fieber = Essentz.

In nostro autem agro altero tandem die superveniebat sudor, quod bonum erat; hinc præmissio vomitorio usurpabat spiritum salis ammoniaci, & promovebatur largius sudor, quem proficuum observavi.

(8) In-

(8) Ingruente horrore & anxietate scrobiculus cordis cum oleo macis, anisi, caryophyllorum, &c. cum fructu illinitur, imposito desuper latere calefacto, vel emplastro, de tacamahaca.

(9) Qui cerevisiam fastidiunt, sumant vinum, cerevisiâ largius dilutum.

(10) In febribus intermittentibus diuturnis optimè conveniunt Vesicatoria; ex quorum usu speciatim rigor cessare solet: applicantur die intermissionis, ut ita eorum operatio paroxysmum præveniat.

(11) In cephalalgia fronti & temporibus applicatur emulsio papaveris cum camphora.

(12) In tussi detur spiritus salis ammoniaci, laudanum opiatum, & opiata.

(13) Delirium sistitur per clysmata, nec non per placentas plantis pedum applicatas.

(14) Tandem, evanescente febre, pro primis viis abstergendis & roborando stomacho, propinetur Elixir proprietatis cum vel sine acido; item sal ammoniacum, vel sal hypochondriacum; uti & in nostro ægro, quia est hypochondriacus, proficua fuissent Martialia, v. gr. tinctura vitrioli Martis Zwelfferi, vel etiam solutio Martis cum succo pomorum, horumque extractum.

(15) Hæctica tertianis male tractatis superveniens curatur per spiritum salis ammoniaci, cum antihectico Poterii.

CASUS XXIII.

TERTIANA MALIGNA.

Juvenis aliàs sanus & robustæ constitutionis, octodecim præterpropter annorum, corripitur die Mercurii vespere levi horrore, post quem incalcescit mediocriter, nox insequens mediocris, manè caput intense circa frontem dolet, sitit graviter, fauces & lingua siccae, dolor gravativus præcordia occupat, calor adest totius mediocris, lassitudo omnium artuum, &c. capit proprio nutu pilulas cephalicas; sed adit circa meridiem præterea Medicum, qui ordinat pro sequente manè ʒss. Syrupi emetici: pilulæ à meridie semel per superiora, ter per inferiora, operantur. Die Veneris capit vomitorium, unde septies supra copiosa mucosa, octies infra excernit. Die Saturni vocat Medicum, quia nox prægressa gravis, symptomata eadem, sitis clamosa, appetitus nullus, cephalalgia intensa, fauces aride, lingua aspera, nonnihil nigricans, calor totius acris seu mordax, non tamen adeo intensus, cutis arida, lassitudo omnium artuum, vires prostrate, pulsus celer, frequens, debilis, ferè inæqualis, cerevisiam horret; petit auxilium.

RESOLUTIO.

Affectus præsens quin in febrium numerum possit referri, nihil equidem dubito: sed utut ratione periodi typum tertianæ intermittentis præ se ferre videatur, attamen non simplicem, sed cum malignitate, tertio vel quarto paroxysmo demum se proditura, simul esse conjunctum, ex funestis symptomatibus tutò satis licèt colligere, adeò, ut vero nomine Febris Tertiana Intermittens cum latente adhuc malignitate conjuncta, dici mereatur.

Partes affectæ quænam sint? non est quòd anxie inquiremus. Siquidem primò huc referenda erit massa sanguinea tanquam subjectum inhæSIONIS, & præter hanc simul etiam spirituum influorum, in varios & inordinatos motus concitatorum, habenda veniet ratio.

Causa proxima materialis erit lymphæ vitiosè acido-falsa, ad massam sanguineam lege circulationis delata, ibidemque ratione salis volatilis acris hujus febris causa existens.

Causam proximam formalem nihil aliud dixeris, quàm spirituum influorum motum vitiosum, & massæ sanguineæ non debitam fermentationem.

Causæ remotæ vices hic imprimis gerit fermentum vitiosè acido-falsum; ex digestionem ventriculi, vel immutata, vel depravata, præternaturaliter ita alteratum, quod postmodum alimenta vitiosè subigendo, hujus mali fomes, & mater foecunda existit. Quin & huc revocari posset suo modo constitutio ægri robusta & ætas juvenilis, quorum fundamentum in sanguine spirituosum, ejusque laudabili copia, (quæ pro ætatis hujus termino viget) consistit & exinde oritur. Sed quare hisce non simul aliquid vitii subesse queat? jam dicta non vetant, nec refragantur, imò longè majus periculum ægrotanti nostro exinde imminet, siquidem morbus habet, in quod vires suas malignas posse exerere.

COHÆSIO SYMPTOMATUM CUM CAUSA PROXIMA.

Quantum ad symptomata: Primò itaque conqueritur æger noster de dolore capitis intenso, siti clamosa, faucibus aridis, lingua aspera, & nonnihil nigricante: quæ pathemata omnia in principio febrium si apparent, pessimi ominis sunt, & latentis malignitatis indicia certò certius præ se ferunt. Hæc autem quod ita sint? colligo inde, quia abest calor præternaturalis febrilis, qui partes has posset exsiccare, ut adeò per consensum continuitatis membranarum cum ventriculi tunicis

nicis oriantur hæc pathemata, & stomachum summè labefactatum esse indicent.

Quibus præterea & hoc accedit, quod de stomachi affectibus propriè sic dicendis conqueratur æger hic noster, nempe de appetitu prostrato, cerevisiæ fastidio, dolore gravativo præcordiorum: quæ omnia satis superque innuunt, fermentum stomachi pessundatum, & acidum loco hujus prædominans.

Lassitudo verò artuum nullam aliam fortè agnoscit causam, quàm lymphæ in extremitatibus partium stagnantis vitia, & impeditum motum localem. Prout autem ejusdem crasis præternaturaliter sæpè vitatur, ita & hic sal aliquod scorbuticum subesse omninò mihi probabile videtur, à quo spasmus membranarum & glandularum subcutanearum dependet, & hinc cutis etiam asperitas, & calor acris seu mordax, irritando scilicet membranas cutis, derivanda veniunt. Pulsus celer, frequens, debilis, ferè inæqualis, multum in recessu habet, præprimis autem vigente adhuc fermentationis febrilis motu, siquidem non tertianæ simplicis cujusdam, sed potius malignitatis adhuc periculum subesse, indicat. Quibus præterea & hoc accedit, quod, utut præmissa sint optimo consilio vocati Medici universalia emetica, febribus in his, quæ aliàs utramque faciunt paginam, nulla tamen exinde euphoria & symptomatum levamen subsequuta fuerint, quæ omnia dicta jam mea de malignitate, in fieri quæ adhuc est, eò magis confirmant.

Quanam autem hoc in casu formanda sit prognosis? non satis mihi constat; siquidem meo quali judicio tutius foret expectare motum naturæ, ejusque aliquamdiu spectatorem agere, quàm varia, eaque non satis appropriata, huic morbo, tentare remedia. Prout autem modò dictum, certò latet anguis sub herba: Itaque ne prorsus Prognostico relinquatur Pateriens, Cura ejusdem secundum has indicationes institui posset:

1. Fomes materiæ morbosæ in primis viis & massa sanguinea resolvatur & removeatur.

2. Fermentum febrile & inde nati paroxysmi enerventur & tollantur; ita tamen, ut semper aliquis respectus habeatur ad latentem malignitatem.

3. Dyscrasia sanguinis & lymphæ, & inde quæ dependent symptomata urgentia corrigantur, removeantur & mitigentur.

Pro prima Indicatione equidem quævis emetica & Purgantia sufficere possent; præmitterem tamen ego prius sequentem pulverem:

℞. *Op. essentif.* ʒj.
lapill. ær. præp. ʒʒ.
Camph. gr. vj.
 M. div. in 3. part. æqual.
 D. S.

Dämpfende Pulver / Abends und Morgens eines zu nehmen.

Hoc ita die intermissionis præmissio, jus fasque equidem foret, subjungere emetica: sed quia à vocato jam antea Medico, uti in casu dicitur, negotium hoc ex voto fuit peractum, itaque forsàn nihil ulterius erit movendum, nisi pro aliquali adhuc abstersione viscerum & muci viscerum, nec non lymphæ vitiatæ, ex cruditatibus chylosis genitæ, sequentes pilulæ adhibeantur:

℞. *MP. de trib. Russi* gr. xv.
ʒii dulc. ʒʒ.
Scamm. præp. gr. ij.
Extr. troch. alband. gr. j.
 Cum. f. q. R. *ʒi f. Pilulæ:*
 D. S.

Purgierende Fieber-Pillen.

Spectaret etiam huc pulvis Cornachini legitimo modo ac dosi adhibitus.

Secunda Intentio obtineri poterit absorbentibus, & specificis sic dictis appropriatis, ex coralliis rubris, sale absinthii, antimonio diaphoretico, febrifugo Strobelbergeri, &c.

Formula tales viderentur mihi proficuae:

℞. *Theriac.* ʒij.
Specif. febril. Strobelb. ʒʒ.
Ol. dest. Caryophyll. gutt. iij.
 M. f. Bolus.
 D. S.

Fieber-Lattwerge auff einmal.

Capiatur pro una dosi ante paroxysmum, cum sequenti sudore.

Vel ℞. *C. C. f. Δe* gr. xv.
ʒii diaphor. ʒʒ.
Θ vol. Succini gr. vj.
 M. f. Pulvis:
 M. D. S.

Fieber-Pulver auff einmal.

Quibus etiam repetitis, & alternatis vicibus, pulveres jam dicti absorbentes jungi poterunt.

Pro tertiâ Indicatione, & temperatura præ cæteris sanguinis:

℞. *Sem. Melon.* ʒvj.
Citri
aquileg. à ʒj.
▽ tarax.
Cent. min.
fl. samb. ana ʒij.
 f. l. a. Emulsio:
 adde
ʒij. diaphor. ʒj.
Spec. febril. Strobelb. ʒij.

Θ is

Os card. ben. ʒß.
 edulc. c. Julep. rosar. q. ʒ.
 M. D. S.

**Kühl- und Stärk. Milch / löffelweise
 zu nehmen.**

Vel ʒ. ʒ rubi idæi ʒiij.
 Succ. rub idæi ʒvj.
 ʒii diaphor. ʒi.
 Gel. C. C. rec.
 Syr. rub. idæi aa ʒß.
 — Di dulc. q. s. pro grato sapore:
 M. D. S.

Kühl. Julep offeres davon zu nehmen.

In specie autem pro avertenda scilicet
 inflammatione venæsectionem raninarum sub
 lingua ex usu fore mihi persuasum habeo.

Deus interim hisce clementer benedicat!

CASUS XXIV.

QUARTANA DUPLICATA SCORBUTICA.

Juvenis noviter creatus Magister, cum
 antea, ob examinis rigorem, solici-
 tis studiis & diuturnis lucubrationibus se
 fatigasset, peractâ Promotione, cum in bo-
 nis finalibus largius indulgisset genio, bre-
 vi post aliquando die Saturni à meridie ex
 templo rediens, corripitur horrore & gra-
 vi frigore, hinc lectum petit, in cæna nil
 comedit, dormit, evigilans manè caput
 sentit perturbatum, abdomen tument, bor-
 borygmus audit, appetitus prostratus. Die
 Solis à meridie egreditur domo citra aliam
 graviolem noxam, ut & die Lunæ: die
 Martis inter prandendum, cum vix men-
 se assedisset, horror & frigus cum alimen-
 torum nausea quatiunt membra, redit do-
 mum, lectum petit, sitit insigniter, bibit
 cerevisiæ bonum haustum, quem subito
 revomit; supervenit tam gravis rigor, ut
 totus lectus cum eo tremere, qui cum per
 horam continuasset, & in specie dorsum
 mirè lacerasset, supervenit æstus modera-
 tus, qui cum bihorium continuasset, de-
 nuò æger levem horrorem, dorsum succes-
 sivè perreptantem, unà cum frigore, &
 aliquali, non tamen adeò intenso, rigore
 ac antea persensit, quem per horam per-
 durantem excipit gravis æstus & intensus,
 cephalalgia, ardor faucium, tandem su-
 pervenit sudor, cum quo simul ma-
 culæ hinc inde ex rubro cærulescentes
 instar pulicum morsus erumpunt, quæ
 tamen sudore cessante etiam evanescent;
 post mediam noctem somnus turbulentus.
 Manè æger die Mercurii debilis, die Jovis ro-
 bustior, sine noxa: die Veneris manè ex tem-
 plo rediens horâ nonâ frigus & horror unà
 cum rigore novo & insequente gravi æstu,

ægrum corripit, simili ratione atque supe-
 rioribus factum diebus. Die Saturni, dum
 adhuc est debilis, sperat quietem, sed à
 meridie horâ primâ ex improvviso horror
 & rigor quatiunt membra, vomitus, æstus
 ac sudor cum maculis supervenit. Die So-
 lis cum omnia essent quæta, nisi quod ca-
 pitis adesset perturbatio ac virium imbe-
 cillitas insignis, vocat Medicum.

RESOLUTIO. AFFECTUS.

Propositi hujus casus naturam ut accura-
 tius rimemur & investigemus, eò, ut de affe-
 ctu præprimis constet, allaborandum. Fe-
 brem autem intermittentem eò nomine,
 quod pertinacissimis & atrocioribus sympto-
 matibus constipata sit, molestam cruciatu
 ægrum nostrum, ex dictis palam liquet; hor-
 ror enim & insequens æstus febrem, inter-
 valla autem invasionum & paroxysmorum
 eam intermittentem indicant; & quò præ-
 silius & specialiori nomine illam indigitemus,
 dicimus febrem hanc intermittentem esse, à
 tempore invasionis quartanæ proprio Quar-
 tanam, à modo invasionis duplicatam, ab
 adjuncto verò symptomate, dictam febrem
 exacerbante, scorbuticam; quorum omni-
 um vestigia è casus historiâ patent.

SUBJECTUM.

Partem verò affectam seu subjectum
 quod attinet: malum hoc cum triplici no-
 mine molestum sit, non iniquum fore pu-
 to, si & triplex hujus statuamus subjectum.
 Et quidem habitò respectu ad febrem, hujus
 subjectum pronunciamus massam sanguine-
 am, quâ subjectum morbi indigitamus; hæc
 enim præternaturalibus salibus turgida ho-
 rum febrilium motuum pabulum existit:
 Subjectum autem causæ seu focum determi-
 nat ventriculus & primæ viæ, quæ vitioso
 acore characterisatæ fomitem quàm ampli-
 simum præbent: Adjunctorum autem sym-
 ptomatum, horrores nempe & rigoris, pan-
 niculum carnosum, sicuti macularum scor-
 buticarum, cutem epidermidemvè ceu sub-
 jectum adæquatum esse determinamus.

CAUSA PROXIMA.

Ad causam autem hujus mali jam devol-
 vimur, quæ ceu proxima & immediata ac-
 cusanda est dyscrasia massæ sanguinæ, seu
 crasis ejus à particulis salinis heterogeneis per-
 versa, quæ ob heterogeneitatem suam cum
 sanguine non miscibiles, hinc ad fermenta-
 tionem præternaturalem excitandam quàm
 aptissima existunt.

CAUSA MEDIATA PROXIMIOR.

Causam verò, mediatam, & quidem
 proximior, quod attinet: quæ particulas hæc

has vitiosas & febrilis hujus motus causas sup-
peditavit, illam latere suspicamur in primis
viis, illis nimirum in visceribus chylificatio-
ni, chylique à fecibus separationi, dicatis;
quatenus nempe chylus vitiosè in stomacho
ob vitiosorum humorum, præprimis de na-
tura acidaparticipantium, partim vitiosè di-
gestus, partim non ritè separatus à fecibus,
vitio succi, præprimis pancreatici, dehinc &
biliosi, hinc postmodum sanguini infundi-
tur, adhuc vitiosis particulis characterisatus.
Præprimis autem accusandus chylus minus
temperatus, sed à dulcedine suâ balsamicâ
desciscens, & in aciditatem & austeritatem
transiens, in ventriculo productus, quem
ulteriùs augmentavit succus pancreaticus &
bilis, quatenus & illi tam quantitate quàm
qualitate peccant, in actionibus suis impe-
diuntur, hincque ad fermentandum aptio-
res fiunt, ut ita cum particulis sanguinis oleo-
sis & alcalibus faciliè in ejusmodi febrilem fer-
mentationem abire potuerint.

CAUSÆ REMOTIORES.

Et nos in dictis confirmant causæ remo-
tiores, adjunctaque simul symptomata: &
quidem prædisponentes causæ fuerunt salia
scorbatica in corpore latitantia; hæc enim
ubi præstò erunt, stomachum semper acidâ
cruditate laborare Practici contendunt, &
ubi hoc & succus pancreaticus nimis acidus
& austerior redditur, & bilis per consequens
balsamicâ suâ vi destituitur, & iners redditur.
Nec mirum, unde contraxerit vitia hæc, cum
solenne sit admodum literatis ob diuturniores
lucubrationes & studia immodica, quibus &
hic æger noster indulsit, ut illis digestionis
primæ actiones insigniter læsæ sint; hinc enim
& κατ' ἐξοχήν hypochondriaci existunt, qui-
bus paul accedit, quod non paucis curis &
negotiis laboriosissimis, animoque plurimis
angoribus & metu, ob examen instans, in-
sistentibus, conflictatus fuerit, sub quorum
tormento plus justo fermenti stomachalis
activitas hebetata fuerit, ut hinc, cum se
insigniter studiis accuratioribus in seram no-
ctem protractis defatigasset, ob deficientem
simul debitam motionem chylus non ritè
fuerit subactus, volatilifatus, sed in liquo-
rem acido-viscidum transmutatus; sic exces-
sus circa bona finalia fomitem latentem com-
movendo hunc morbum excitavit, cum præ-
primis eo faciliùs in actum sic potuerit dedu-
ci, quoniam fuit juvenis, quibus jam massa
sanguinea præexistit faciliè effervescent, &
promptior ad fermentandum, & ob gaudium
præfens, novus cum factus Magister, sanguis
turgidior magisque ebulliens factus, sicque
accedente nimia vini ingestione in bonis fina-
libus, ob particulas vini spirituosiores, quæ

faciliè cum latentibus succis vitiosis acidis ef-
fervescere potuerunt, febrilis hic motus fuit
inductus.

S Y M P T O M A T A.

Et hæc omnia ita esse patet, si adjuncto-
rum symptomatum naturam explicaverimus:
Et quidem ipsum febrilem Paroxysmum quod
attinet: hic incipit horrore & gravi frigore,
manifestum indicium, acidum in causâ esse;
à bile quippe alcalino magistale quid non me-
tuendum. Turbatâ enim istâ sanguinis fer-
mentatione naturali salia non ritè invicem
agunt, nec partes oleosæ ex motu fermenta-
tivo debitum calorem concipiunt, unde ca-
lor deficit, & horror atque frigus succedit,
& præprimis rigor, cum ab acido dicto velli-
cetur panniculus carnosus, & ferè universum
membranarum & nervorum corporis, in
specie dorsi & abdominis, syllema; hinc-
que in rigore & horrore tali convulsivi quid
patiuntur partes membranosæ, & præprimis
abdominis. Tumor abdominis & borbo-
rygmi effectus sunt acidi in primis viis peccan-
tis, & effervescentiæ flatus generantis, à qui-
bus & in talibus crebrò præcordiorum angus-
tiæ excitari solent. Ob consensum nervo-
rum plexus mesenterii cum nervis intercosta-
libus frigus & horror in dorso præprimis per-
sentitur, ita ut perreptare videatur, quod
manifestum vellicationis indicium. Nec non
ob eundem consensum vellicationis nervorū
cum capite communium, & spiritus animales
turbantur in suis actionib⁹, ita ut exinde neces-
sariò caput perturbatum sentiat. Supervenit
hinc appetitus prostratus, ex quo sat dilucidè
patet, fermentum stomachale à materia vi-
tiosa esse obrutum, & nimis fixum atque iners
redditum, ita ut & alimenta nausæet; dum
vellicatur orificium sinistrum, se arctè con-
stringit, partim etiam quod recordetur de
noxa illi à nimis ingestionibus illata, hinc re-
spuit talia illi nociva; & quatenus hæc velli-
catio ultiores radices egerit, ut etiam to-
tum stomachum & præprimis pylorum velli-
cet, vomitus insequitur. Dehinc & sitis in-
signiter cruciat ægrum, ob halitus vitiosos ex
ventriculo adscendentes, & fauces irritantes;
quam sitim auget saliva salibus scorbuticis im-
prægnata & viscidior, non diluens fauces,
sed malum sic exacerbans; hinc etiam cum
cerevisiam appeteret ad sistendam sitim, vo-
mitus supervenit, itidem indicium stomachi
malè dispositi; proindeque materiam inje-
ctam sibi infestam rejicientis, præprimis cum
æger injecerit talem haustum sub ipsa febrili
pugna, quâ cladem stomachus patitur ma-
ximam.

Acidum autem vitiosè effervescent, ita
tamen, ut prædominium habeat, autor existit

[Dd]

ejus-

eiusmodi symptomatum: quamprimum verò à sale volatili subigitur, ut sal nempe volatile emergat, & sui fiat juris, acidum pedetentim infractum temperatur, & subito vehemens effervescencia excitatur, sub qua partes oleosæ massæ sanguineæ velocius motæ æstum corporis excitant, calorque supervenit, & primò quidem in Paroxysmo nullus, in altero moderatus, in tertio gravis & intensus; sicut & in quarto & quinto, pro ratione nempe salis volatilis oleosi massæ sanguineæ cum acido effervescentis, supervenit cephalalgia; ex tali enim vitiosa effervescencia sanguis turgidus partim distendit vasa, parim etiam velliat partes membranosas: hinc & ardor faucium cruciat ægrum ob sal volatile biliosum fauces rodens. Hæcque tamdiu durant, donec superveniat sudor, indicium, terminum pugnae febrilis adesse: præcipitata enim faces, i. e. acidum vitiosum ab alcali in falsum tertium mutatum, & ita correctum à sero imbibitur, & per sudorem evacuat, cum quo simul maculae erumpunt, quæ nihil aliud quàm salia scorbutica sub cute latitantia, & per sudorem excernenda; hinc etiam sudore cessante evanescent, & sic Paroxysmus remittit, donec à similibus recrementis fermenta in massa sanguinea adhuc relictæ iterum in motum excitentur, novumque sic inducant Paroxysmum. Post pugnam autem hanc, dum massa sanguinea æquabiliter quasi denuò fermentet, omnia in corpore quæta, nihil hinc sensit, quàm imbecillitatem, quatenus nempe & systema nervorum sub hac clade non liberum, sed & spiritus animales & vitales confunduntur, hinc debitus vigor corporis perit, & his confusis non potest non sequi somnus turbulentus.

Multiplicationis verò causam puto fabricatam esse itidem in stomacho, & quidem vitio diætæ; quod patet, quippe æger noster in primo Paroxysmo fuit vacuo stomacho, hinc & simplex fuit accessus & invasio; alterò verò in Paroxysmo inter prandendum fuit correptus, dum ventriculus cibis onustus bibit simul bonum haustum cerevisiæ, hinc & non potest non fieri, quin sub Paroxysmo assumpta non ritè digesta ex ventriculo præcipitata, & post aliquot horas massæ sanguineæ infusa, novam suppeditent materiam, ut vix uno Paroxysmo remittente alter statim superveniat, sicque febris duplicata evadat.

P R O G N O S I S.

Cujus, ut jam Prognosin demus, dicimus, securissimum aliàs esse affectum febrem quartanam, & sic etiam non adeò periculosum, nisi ratione adjunctorum; scorbutica quippe est & duplicata, appetitusque est prostratus, mala aliàs quæ signa dant.

Non autem æger sit timidus exinde, cum

hoc tantum periculi habeat, ut sit malum contumacius, & nisi citius curetur, viscus aliquod scirrhus afficeretur; ægro interim liberationem successive factam ab hoc malo promittimus.

C U R A.

Quod ut fiat, Curam aggredimur, vestitam duabus indicationibus: nempe

1. Ut alterentur & evacuentur succi vitiosi.

2. Ut Paroxysmi febriles tollantur, & symptomata urgentia removeantur.

Priori scopo, & quidem humores alterando satisfaciunt salia alcalia, viscidum inciduntia, & acidum destruentia; hinc

℞. *Θξci depur.* ʒij.

℥i ʒiat. ʒj.

Arcan. dupl. Myns.

Lapill. ʒr. præp. aa. ʒss.

M. f. Pulvis. div. in 4. part. æqu.

D. S. Resolvirende **Pulver.**

℞. *Θξci depur.* ʒj.

℥i ʒiat. ʒj.

Misc. div. in 2. part. æqu.

D. S. ut antè.

Sumantur mane in vehiculo calido, & vespere in frigido. Vel

℞. *Arcan. dupl.* ʒij.

Lapill. ʒr. præp. ʒj.

Misc.

div. in 2. par. æquales:

D. S. ut suprâ.

Capiantur eodem modò.

Ut materia evacuetur, convenit vomitus; hinc die Lunæ, ceu Paroxysmi, ante Paroxysmum præscribatur:

℞. *Rad. asari pulv.* ʒj.

Arcan. dupl. ʒj.

M. S. **Brech-Pulver.**

Vel ℞. *Tart. emet.* gr. iij.

Sacch. vel Lapill. ʒr. præp. ʒj.

M. f. Pulvis.

D. S. ut antè.

Sic enim eò tempore agitata massa faciliùs excludetur. Post Paroxysmum æger sit quietus, altero die jejuno stomacho expectet novam invasionem, assumendo sequens:

℞. *℥i ʒiat.*, vel potius *Arcan. dupl.* ʒj.

ʒis Cent. min. ʒss.

Ol. dest. Caryoph. gutt. ij.

M. D. S. **Zieber-Pulver.**

Capiat in vehiculo calido, horâ unâ ante Paroxysmum.

Paroxysmo finito, si placet, cibum assumat. Die intermissionis propinentur alterantia appropriata, vel Martialia, ubi acidum vitiosum magis peccat, & infringendum est; vel alcalia, ubi magis febrili Paroxysmo occurrendum.

His peractis, ut febriles Paroxysmos infrin-

infringamus, ad appropriata antiscorbuticis mista fiat accessus:

℞. ▽ Card. bened.

fumar. aa. ℥j.

— Θ *ci ℥j.

Cochlear. ℥℞.

℥ii diaphor. ℥j.

Ol. dest. caryophyll. gutt. jv.

Syr. Card. bened. ℥j.

M. D. S. Fieber-Träncklein auf 2. mal.

Mistura hæc imminente proximo die Jovis Paroxysmo propinetur. Item

℞. ▽ Card. bened.

Mentha aa. ℥j.

— Cochlear. ℥j.

℥ii diaphor. ℥j.

Lap. Er. præp. ℥℞.

Laud. opiat. gr. ij.

Syr. fœnic. ℥j.

M. S. Fieber-Träncklein auf 2. mal.

Capiat æger hanc portionem pro duabus vicibus; vel melius istam superiorem, & quidem prima dosis horâ una ante Paroxysmum, altera in principio Paroxysmi subintrantis. Vel

℞. Arcan. dupl. Myns.

Mag. Corall. c. f. c. aa. ℥j.

℥ii diaphor. dial. gr. xvj.

Θ vol. viper. ℥℞.

Laud. opiat. gr. iij.

Ol. dest. Caryoph. gutt. vj.

M. f. Pulvis.

div. in 2. part. æqual.

D. S. Fieber-Pulver.

Prima dosis horâ unâ ante Paroxysmum; secunda verò sub Paroxysmo intrante.

Symptomatum cruciatus dicta sat infringere & mitigare queunt; sin tamen frigus nimis urgeat, inungatur scrobiculo cordis oleum destillatum succini, mistum cum oleo destillato macis, & imponatur later calefactus; aut emplastrum ex theriaca factum, quod simul tumores abdominis infringat. Sitis si urgeat, in Paroxysmo, quamdiu frigus urget, non bibat; sed æstus dum jam increbuit, potus conveniens non denegandus.

Tandem ne recidivæ sit metus, per aliquot dies continuet remedia ex absinthio, v. g. vinum absinthii, de quo singulo manè bonum haustum accipiat: in assumendis cibis mediocritatem sedulò observet, blandum motum imprimat. His enim ritè observatis, sperare est, ut mox bono eventui litet.

Totum hunc affectum curant Martialia, postmodum volatilia sudorifera. Venæsectio nullum habet hic locum, nisi sit à nimia oppressione solennis alicujus evacuationis sanguinis; sin autem nimium fluerent hæmorrhoides, optimè convenirent ad hæ-

Tom. II. Pars 2.

morrhoides sistendas, & febrilem æstum sistendum, martialia. Ante Paroxysmum regio lumborum, item regio stomachi, & dorsum, inungantur cum petroleo, oleo destillato succini, macis, &c. rigorem & horrorem præcavet. Loco potus Coven-tum prodest cum dimidia parte vini, injecto pane tosto, nuce moschatâ imbuto, vel serum lactis cum succo citri parum acidulatum.

CASUS XXV.

QUARTANA SPLENETICA.

*M*ulier juvencula sterilis, hypochondriaca & splenetica, ratione hereditatis maternæ, quartanaria cum insigni dolore splenis in hypochondrio sinistro, quoties frigus urgeret, post cujus remissionem etiam dolor successivè remittebat, sed quoties urgeret frigus, etiam urgebat dolor, & quo intensius frigus, eò intensior dolor & contra.

Præmissio vomitu jussi capere die intermissionis tincturam tartari simplicem cum elyxir proprietatis sine acido à gutt. 50. bis in die; nam alia amara febrifuga qualibet fugiebat, interdum etiam die intermissionis, qui diem Paroxysmi præcedebat, præscripti:

℞. Θ *ci gr. xv.

‡ Jalapp. ℥℞. Misc.

Sed hætenus omnia sipe levamine.

Procedente morbo necesse erat, ut toto die Paroxysmi, circa quartam saltem pomeridianam repetentis, jejuna maneret, aliàs vomitus, præcordiorum anxietates, graviores rigores & dolores, patiebatur. Hinc ad imitationem observationum quarundam Riverii, ipsâ hypochondriacâ & durioris alvi existente, præscripti:

℞. Fol. fern. s. st. ℥vj.

Θ ‡ ℥ij.

infund. in f. q. ▽ comm.

stent in loco tepido per noctem,

manè Colat. ℥℞. adde.

Q. E. Cinnam. ℥j.

M. D. S.

Parier-Trand auf etliche mal.

Capiebat omni manè haustulum, unde aliquoties viscosa evacuabat, idque saltem intermissionis diebus; etenim die Paroxysmi propter supra enarrata symptomata nihil tentare poteram.

Sed cum splenis vitia, scirrhum, similiaque mala metuerem, ob id ordinavi:

℞. Solut. c. f. p. ℥℞.

Capiebat omni manè gutt. 30. quod cum etiam die Paroxysmi faceret, commodè admodum, cum paucò splenis dolore, habuit:

[Dd 2]

sed

sed continuato licet remedii usu, idem levamen continuare noluit. Propterea ordinavi:

℞. *☞ Eris Car.* ʒʒ.

dosi 20. gutt. omni manè. Benè contulit, alvum apertam servavit, interposito subinde haustu superioris infusi sennati. Sed febris constans permansit; quin imò ex causis aliis supervenientibus simplex quartana facta fuit triplex; unde cum leniter tractanda esset, ipsâ à medicamentis abhorrente, dedi die, quò primarius urgebat Paroxysmus, sequentem pulverem:

℞. *Θ*ci* ʒʒ.

ʒ *epil. ʒial.* gr. ij.

M. f. Pulvis.

Cepit manè, vomuit aliquoties, & per alvum egressit.

℞. *Corall. r. præp.* ʒj.

ʒ *epil. ʒial.* gr. ij.

M. f. Pulvis.

Cepit vesperi bihorio ante Paroxysmum, quem vix periecit.

Sequenti die hunc pulverem iterum bis cepit, & nunquam vomitus secutus fuit, potius somnolenta admodum evasit. Tertiò die pro tertio Paroxysmo eosdem pulveres, sed dimidiatâ tandem dosi accepit, unde Paroxysmi omnes tres evanuerunt, qui etiam per sex successivè dies penitus non redierunt, ipsâ interim omni nocte profundè dormiente, sed simul lassitudinem insignem membrorum omnium percipiente: propterea res mihi suspecta visa fuit vñ anodynâ antimoniali non extirpante, sed palliante febrim, quod etiam eventus docuit. Nam ex improvise statâ die statâque horâ primarius Paroxysmus cum vomitu, tussi & asthmate convulsivo, ac repetentibus subinde epilepticis convulsionibus, rediit, quem etiam ordine cæteri insecuti fuerunt; hinc præscripsi:

℞. *Ol. ʒip. d.* ʒj.

dosi 40. gutt. manè & vesperi trihorio ante Paroxysmum. Item:

℞. *Fol. Senn. s. st.* ʒʒ.

rad. helleb. nigr. non præp. ʒʒ.

esulæ non præp. ʒʒ.

Θ ʒj ʒʒ.

Infund. in *▽ comm.*

stent in loco tepido per noctem;
manè ℞. Colat. ʒʒ.

de qua bibebat mane bonum haustum, vesperi verò oleum tartari, & ita alternis vicibus continuando, Paroxysmi brevi post evanuerunt, saltem primario illo adhuc nonnihil affligente: pro quo profligando præscripsi pilulas:

℞. *Extr. Gent.* ʒj.

Corall. r. præp. ʒʒ.

Cum s. q. *ol. dest. Caryoph.* s. Pilulæ.

quas cepit in vehiculo rob Sambuci tribus horis ante Paroxysmum, qui non rediit.

Continuavit sic adhuc duabus vicibus die intermissionis oleum tartari per deliquium bis aliquamdiu assumendo, & ita convaluit.

In hoc casu observandum:

1. Consensus splenis cum febre, dolore isto sub frigore urgente, reverà splenetico existente, simpliciter convulsivo.

2. Martialia non solum splenis vitiis conducere, sed etiam impetum Paroxysmorum febrilium notabiliter retundere.

3. Anodyna quælibet pro radicali februm cura nihil conferre, saltem spirituum impetum & motum naturæ cohibendo morbum palliare, qui postmodum eò intensiori impetu resurgunt, unde etiam cum epilepticis convulsionibus redibant Paroxysmi; post cessantes.

4. Febres intermittentes lassitudinem membrorum superstitem vel recidivam vel cachexiam, interdum etiam anasarcam minari.

5. Chinam non propinavi, in splenetica enim hac maximopere nocuisset; figendo enim acidum febrile & concentrando etiam pariter acidum in splene peccans visceris hujus scirrhum, & hinc continuam ægritudinem induxisset.

CASUS XXVI.

QUARTANA DUPLICATA CUM COLICA CONVULSIVA,

Auditoribus communicata.

*N*obilis quartanâ duplicatâ affectus alio in loco ab alio Medico aliquoties acceperat pulverem China-Chinæ, cujus usu semper quidem evanuit febris, sed etiam rediit, idque aliquoties. In hoc pro cura præmissi:

℞. *ʒ dulc.* ʒj.

Scamm. ʒat. gr. jv.

M. pro Pulvere.

Benè profuit.

Hinc pulveris istius Mercurialis (quem describit Hoffmannus in *Cl. Schræder.* sub nomine *Antiquart. Riveriani*, utit falsò, pag. 275.) ʒj. ad ʒʒ. sed hic parum evacuavit, mitigata tamen fuit febris. Ast quia pulvis non evacuaverat, post quatrimum salivatio supervenit ferè per octiduum durans, sub qua nihilominus febris contumaciter perstitit; Hinc post repetita vomitoria:

℞. *Elix. febril. D. Mich.*

Ess. absinth.

Opii ana ʒʒ.

M. pro dosi una ante Paroxysmum.

Aliquoties hoc accepit, unde remittentes successivè Paroxysmi evanuerunt. Sed ipse admodum debilis reddi cepit, & mani-

manifestò quasi tabescere, tandem etiam paroxysmis febrilibus redeuntibus. Hinc intermissionis die creberrimè & copiosè essentiam absinthii, centaurii minoris, & elixyr febrile mista usurpavit, ut tonum viscerum & eucrasiam bilis conservarem: hypochondrio sinistro applicui emplastrum de nicotiana cum gummi ammoniaco, quia ibidem & prope spinam maximè frigus ceteraque urgebant symptomata. Diebus verò paroxysmorum

Rx. *Lap. Ser. præp.* ʒi.

Sacch. Fni gr. xviii.

M. pro 2. dos.

accipiendo unam manè, alteram verò à meridie duabus vel tribus ante paroxysmum horis, cujus usu per aliquot dies continuato febris evanuit.

Sed alvi contumacia & excreta admodum dura supervenerunt, & subinde dolores compressivi sub umbilico afflixere, unde Colicam humoroso-convulsivam ex acido viscido, per saccharum Saturni ejusque texturam aluminosam fixato & condensato, passulis laxativis ad ʒv. propinatis alvi beneficium conservavi; nihilominus colica cum cardialgia complicata, utraque lancinans, constrictiva & praviter compressiva supervenit; hinc urgente graviter malo ordinavi:

Rx. *Ess. Castor.* ʒij.

Capiebatur pro duabus dosibus.

Rx. *Fl. Chamom.* M. iij.

sem. anis. ʒvj.

pulp. Colocynth. ʒj.

coqu. in f. q. *seri lactis.*

Colat. lbj. adde

Terebinth. in vitell. ovi diff. ʒvj.

Mell. rosat. ʒiʒ.

M. pro Clysmate;

duabus vicibus applicando.

Sequenti die passulas laxativas assumpsit.

Extra:

Rx. *Empl. matricul. de galb.* p. ij.

Tacamahac.

bals. Peruv. ana p. j.

M. f. Emplastrum,

abdomini insternendum,

Quibus etiam symptomata levata fuerunt.

Sensit nihilominus adhuc Colicam periodicam per aliquot dies paroxysmi consueto tempore recurrentem, sed levem, dicto emplastro & usu essentiae castorei ac absinthii tandem evanescentem.

Ex hoc casu observandum:

(1) Salivationem Mercurialem, nisi fuerit insignis, & quæ diu ac copiosè evacuando universum corpus evacuet, non curare quartanas: quod tamen observarunt Piens de *Febr. lib. 2. pag. 273.* item ex Ballonio *Pharos Med. pag. 200. 616. & 653.*

(2) Si immaturè concentratur aut figuratur fermentum febrile, præter alia multiplicia symptomata speciatim Colicas convulsivas graves induci, acido fixato partes sensiles saltem fortiter irritante.

(3) Idem ferè esse peccans materiale in colicis inde natis, cum fermento febrili, pro ut ex eo patet, quod periodum febrilem observent colicæ aliquamdiu, utut interdum lethaliter affligentes.

CASUS XXVII.

FEBRIS CONTINUA ARDENS BENIGNA, EX IRACUNDIA.

Vir vegetus & sanus (ein Barbierer) tenerioris licet constitutionis, in convivio vespertino genio plus debito indulget, Baccho in specie litando; unde post noctem inquietam manè copioso vomitu & aliquot secessibus se exonerat. Tertiâ ab hinc die gravissimâ afficitur iracundiâ, unde aliquot interjectis diebus languorem & lassitudinem artuum insolitam percipit, cum aliquali siti, donec aliquando sub medio noctis post mediocrem horrorem gravi æstus cum cephalalgia intensa corripitur, vires prostratæ, sitis clamorosa, hinc inquietudines cum pulsu frequenti, celeri, molli, magno, & vehementi: Urina intense tincta emissa, successivè per totum turbida crassa, & copiosis contentis saturata, ubique conspicitur. Medicus circa meridiem vocatus præscribit:

Rx. *ʒ rubi idæi*

acetos. ana ʒiʒ.

ʒii diaphor. ʒj.

Syr. Papav. ʒj.

— Di dulc. q. s. pro grato sapore.

Misc.

Jubet cochleatim pro lubitu istam misturam capere. Vespere rediens hic ipse, offendit ægrum in priori statu, sed magis anxium, cum fluctuationis quasi quodam sensu circa præcordia, conquerentem simul, quoties de præscripta mixtura caperet, sentire se insignem exæstuationem totius corporis, præprimis capitis. Hinc querit ex Medico: qualis sit affectus, & quid porro agendum?

RESOLUTIO.

Morbus est Febris continua ardens, eaq; benigna. Dubitari autem meritò potest: an præcisè benigna sit? idque ex eo, quod iracundia, quæ causæ remotæ hinc rationem habet, etiam benignam febrem faciliè possit reddere malignam. Eandem & hinc inducere non improbabile fit, cum præsertim iracundia

[Dd] 3

torum

torum hominum morsus fuisse virulentos, ita ut cum viperarum aliquorumque venenatorum animalium iratorum moribus non disparem effectum post se relinquat: Conf. Hildanus *Centur. 1. Observ. 84. & 85.* & Glandorpius *in Specim. Chirurg. cap. 48. & 49.* Cui accedit, quod febres, occasione iracundiæ natæ, pessima concomitantia habeant symptomata, ita ut observaverim instar malignarum eas sæviisse. Cæterum non omittendus hic est spirituum vitalium, pariter ac animalium exercitus, quorum impetus inordinatus ac concitator motus in qualibet febre obvius est, cum turbata massa sanguinea, & primarum viarum digestionis negotio, vitiato, non possunt non iidem similiter turbari. Et sanè, nisi semper in morbis ad primum illud vivens, indequè actionum omnium, tam naturalium quam præternaturalium, primum efficiens, respectus habeatur, in multis errare necessum est.

Interim non confundamus formam febris cum efficiente ejusdem proxima; cum massa sanguinea enim non omittendi sunt spiritus, quorum inordinatus impetus ac motus in qualibet febre obvius est, propter digestionem primam vitiata. Si ergo ex hac hypothesi de febrium discurremus natura, ita ut speciatim sanguinem, & hinc spiritus, seu ejus nucleum, ac sanguinis quasi quintam essentiam, consideremus, forma febris potius consistit in præternaturali isto motu fermentativo; cujus causa speciatim erit heterogeneous salino-oleosum seu nitrosum, occasione læsæ stomachi digestionis genitum, & ex hoc in sanguinem illatum, unde hujus & spirituum motus necessariò turbatur. Adeoque Causa proxima erit Sanguinis dyscrasia, vitio chyli in primis viis depravati enata, in talem præternaturalem effervescentiam erumpens: Vel causa proxima materialis erit nidorulentum fermentum, vitio errati digestionis primæ, ob inadæquatum objectum genitum, sanguinis secundum minima crasin, & hinc motum ejus fermentativum, pessundans, unde febrilia symptomata postmodum superveniunt.

Causa ergo remota est digestio vitiata ob inordinatam diætam, quæ fomitem suggestit, quam excitavit iracundia, in movendis corporis nostri contentis efficacissima.

Observandum tamen:

(1) In febribus talibus non semper ad materiæ peccantis copiam respiciendum esse, cum admodum febrem malignam uti tantillum contagii, ita tantillum quoque fermenti nidorulenti à vomitu reliquum, ex primis viis massam sanguineam ad febrem ardentem disponere potest.

(2) Effervescentiæ bilis & succi pancrea-

tici non nimium tribuamus, cum succi pancreatici natura adhuc sit controversa. Ponamus: succum pancreaticum esse naturaliter subacidum; non tamen tanta effervescentia inde expectari poterit, cum præsertim bilis phlegmate detracto inspissata, lardi instar quidem deflagret, adeoque de oleositate sua testetur; contrà tamen salina ejus acrimonia non tanta, nec de natura ejusdem alcalina æquè constat. Nam licet bilis destillata aliquantulum salis volatilis reddat; tamen nec hoc phænomenon sufficientiam meretur, cum igne non tam rerum formas inhaerentes evolvi, quam novas produci, experientia loquatur; unde falsus est Willisius, statuens, bilem pro clysmate esse posse; cum, si perficiatur tali casu aliquid, præstet illud saltem oleositate suâ blandâ & vi saponaria, cum ex copioso oleo & occulto acido, debito tamen alcali volatili saturato, constat, adeoque lubricando & abstergendo, non verò stimulando: Ut itaque multum quidem concursui horum succorum in primis viis, non tamen nimium, tribuamus.

Cephalalgia, in nostro ægro obvia, dependet simpliciter ex impetu sanguinis.

Porro quoad urinam: ejus inspectio continua in febribus speciatim acutis admodum est necessaria; testatur enim illa de statu & eventu harum. Quamdiu enim in continuis febribus urina est clara & perspicua, tamdiu cruda dicitur; si autem turbida videtur, signum coctionis denotat: Sicut si in eadem copiosum sedimentum deprehendatur, perfectè cocta vocatur, uti ejusmodi phænomena per experimenta chymica declarari possunt. Et quidem in hujusmodi casibus expetitur ab ægris urina sanguinis, non potus, hinc manè digestionem absolutâ colligatur. Scilicet urina sanguinis (nam hæc manè excepta postuletur) est liquor salino-volatilis oleosus, seu lixivium, constans ex aqua, copioso alcali volatili oleoso turgida, unde prout plus de hoc sale volatili oleoso imbibit urina, eò plus tinctæ est, ita ut simul, quo plus salis continet, eò consistentiam crassiorem obtineat; quò magis est oleosum hoc sal, habeat tincturam intensiorem, hinc ab oleo tinctura, à sale consistentia: Sic scorbutici intensissimè tinctas urinas emittunt, sed simul crassas, ob copiam salis imbibiri, quod, postquam eadem steterunt aliquamdiu, sub arenularum forma præcipitatum, & parietibus vitri crystallatum, urinas minus tinctas relinquit: contrà urinæ tenues, intensissimè tinctæ, observantur in hecticis; nempe quando sal copiosum oleum imbibit: Sic Salia volatilia, quando agunt in sulphur seu oleum, emergit color rubicundus plus minus, unde etiam spiritus partium animalium primum aquæ instar clares-

clarescunt, postmodum flavescent aquæ, hinc glutinescent à sale volatili proprio oleo adhuc juncto; non secus, ac ex destillatione calcis vivæ, salis ammoniaci & sulphuris, prodit spiritus rutilans instar auri; ubi simpliciter alcali salis ammoniaci agendo in sulphur sub tortura ignis, & dissolvendo istud, hujus caloris causa est: vid. Boyle Philos. Experiment. quod probatur: quando enim illi spiritui instillatur aqua, tunc totus liquor, antea rubicundus, lactescit, secedente ad fundum sulphure nativo, ita ut alcali egerit in sulphur, hoc tamen adhuc vivum sit; sicut aliàs notum est, quod ex quibuscunque liquoribus, sale alcali & oleo turgidis, si instilletur illis tantillum acidi, turbentur, & prodeat lacteus color. Ex hisce colligimus: urinam prius rutilantem, postmodum turbidam reddi, simpliciter ab acido, in urina existente, per modum præcipitationis, urinam præfatis modis turbante. Ut adeò verissimum putemus illud Hornii in Arca Mosis effatum, dicentis: omnem urinam turbidam, semper occultum acidum fovere. Et quidem turbatur vel extra corpus, vel intra corpus: Extra corpus naturaliter, præsertim tempore æstivo, quando urina tunc stans corrumpi, & aliquo modo fermentare incipit, tunc acidum occultum sese manifestat, unde turbatur urina: Intra corpus, & quidem in febribus, quando acidum antea ferè deficiens, sed emergens, præcipitat alcali oleosum, unde urina crassa & turbida provenit, & si majus fuerit, copiosa sedimenta ad fundum secedunt. Unde verum est ejusdem Hornii præfagium, quod nubecula in urina apparens signum sit redeuntis in stomachum acidi. Urina ergò, quæ fit turbida in febribus, hoc habet ab acido, præcipitante oleum ex alcali. Quæritur quale sit acidum? Hoc est revera in stomacho (Thomsono protopepticum vocatum) quod uti est primum digestivum in corpore, ita dirigit etiam illud quascunque digestiones, unde hoc plus minus in febribus redeunte, atque revivificante eodem, urinæ antea claræ per præcipitationis modum quoque fiunt turbidæ, & copiosa sedimenta seponunt in fundum. Turbatio ergò urinæ est quædam præcipitatio ab acido moderato, agente in alcali, à quo separatur oleum. Jam urina, quando turbida redditur, dicitur esse signum incipientis coctionis, quando nempe incipit fieri præcipitatio ac turbatio. Coctio ergò consistit in separatione quadam, quam sequitur præcipitatio ac turbatio; in separatione nempe quorundam recrementorum ex massa sanguinea, sub cursu morbi à fermento febrili genitorum, quæ dum vi acidi stomachi separatur, denuò ex massa sanguinea in urina per

inchoatam præcipitationem transeunt, eamque turbidam reddunt; dum verò perfectè separantur & præcipitantur, urina copiosa deponit sedimenta, quæ est coctio & præcipitatio perfecta. Ad acidum ergò respiciendum, & hinc ad transpirationem.

Et hæcenus dicta de febribus continuis benignis intelligenda sunt. Urinæ enim malignarum, sanorum simillimæ sunt, & maximè fallunt; imò in petechialibus ad tres septimanas tenues & claræ sunt, nec, nisi in plenaria earum declinatione, quando nempe meliorescit valetudo, nubecula apparet, & turbantur, ut ita quoque in illis periculosior sit prognoscos eventus.

Porro in nostro ægro considerata venit idiosyncrasia seu constitutio tenerior & sensibilibior, adeoque hæc ob curæ modificationem ponderanda. Scilicet tenerior is dicitur, indeque mutabilior, ratione liquidorum seu contentorum corporis sui partium, quæ tunc dicuntur facere constitutionem teneriorem, quando nempe liquida contenta ejusdem mutabilia & facile alterabilia existunt, etiam ex levi mutatione, id quod vocamus: *Er hat eine schwache oder weiche Natur*; & opponitur huic robustior constitutio, qualem in rusticis observamus. Fundamentum constitutionis firmioris consistit in acido stomachi protopeptico valido, cogente contenta corporis nostri, & quasi concentrante eadem, quo sub firmiori miscela minus mutari queant; sicut contrà defectu istius acidi stomachici debiliores redduntur corporis nostri succi. Unde etiam in tenerioribus istis spirituum textura rara quasi est & tenera, facile mobilis & dissipabilis, atque minus fixa: contrà in firmioribus spiritus minus dissipabiles & paulò fixiores existunt. Illustrari negotium hoc potest, conferendo vinum dulce Italicum cum vino Rhenano: Uri enim illud, ob acidi defectum ultra unum vel duos annos sine corruptione non persistit: ita Rhenanum ob acidum præponderans per viginti & tringinta annos durat: illud uberiori alcali & oleo, spiritibusque magis raris & volatilibus, præditum est; hoc copiosiore acido, spiritibusque magis fixis: unde etiam odor & Gas sulphuris acidum conservat vina à corruptione. Par ratio est cum corpore nostro, cujus firmiore constitutione præditi à fortissimis etiam purgantibus non moventur; secus ac teneriores à lenissimo etiam Purgante insigniter turbantur. Sed quoad sensibiliorem constitutionem, Germanis *eine empfindliche Natur*: fundatur illa in fibrarum nervosarum textura molli & delicata: structura reddit subjectum sensile; densa verò minus sensile. Jam ergò in Praxi hujusmodi constitutionum habemus

mus rationem, quandoquidem tenerioribus minus propinanda fortiora, sed moderata & temperata in usum vocanda sunt, & talibus neque opiata adhibenda, *weil sie davon matt werden*; in firmioribus verò magis graduata remedia requiruntur, etiam opiata ferre possunt. In sensilioris constitutionis ægris contrarium est: qui enim habent genus nervosum delicatum, iis quandoque dari possunt imò debent opiata, aliis admista; contrà minus sensibiliorem texturam habentes, iisdem nullo modo egent. Noster æger est talis, unde non mirum, si à rebus extrinsecus facile alteretur.

Causæ remotæ sunt læsio diætæ & iracundia. Erratum ab ægro nostro constitutionis tenerioris in diætâ commissum, suggestit fomitem morbosum, nempe fermentum febrile, in quod iracundia quasi scintillas excussit, unde fomes in ignem febrilem exarsit. Scilicet iracundia movere contenta corporis nostri, notum est; observetur solummodò pulsus iræ percitorum, qui est vehemens, & simillimus febricitantium. In iracundia quibusdam alvus, quibusdam urina stimulat, imò nonnullis horum sanguis è naribus effluit; pathemata omnia monstrant, quantas turbas corpori det iracundia, sub qua, cum insignis motus humorum à spirituum animalium impetu contingat, à quo quælibet contenta corporis nostri moventur, hinc etiam fermentum febrile in actum secundum quasi deduci potuit.

Quoad Prognosin: morbus in se est periculosus, qui tamen non necessario mortem post se trahit; quia

1. Est à causâ externa. Symptomata verò, quæ fiunt à causâ externa, semper longè mitiora sunt, quàm si febris illa fomitem internum agnosceret. Interim pessimum est, quod ira accesserit, quia quandoque convulsiones, deliria, & alia atrocia symptomata infert, quod in pistore quodam nimia iracundia mortuo observavi.

2. Malignis febribus laborantes ut plurimum pessimè se habent circa præcordia, hinc anxii, inquieti, clamosè sitiunt, & graviora symptomata circa præcordia patiuntur; quæ in quacunque febre quò mitiora sunt, eo semper major spes futuræ reconvalescentiæ apparet.

3. Pulsus magnus bonum signum suggerit; innuit enim æquabilem sanguinis motum fermentativum.

4. Quia urina coctionis charactere sigillata, quæ simul incrementum morbi monstrat, sicuti sedimentum illius statum quoque huius denotat.

C U R A.

Quoad Curam; hæc primò jubet, ut stomachus à cruditate nidorosa liberetur, idque per vomitum. Ubi tamen quæritur: anne

etiam hic in nostro ægro vomitus locum habeat? quod ut plurimum felicissimè contingit. Certum quidem est, cum, qui in chronicis & acutis morbis dextrè vomitoria adhibere novit, citius longè curare; imò & in febrium continuarum principio nil melius vomitu. Interim cum æger (1) sex diebus ante invasionem morbi vomitum non-naturalem & quasi symptomaticum, naturâ coactâ, propter ebrietatem passus fuerit, adeoque motus naturæ non proprius fuerit, dubitari de eo administrando potest; imò, si fuisset ille criticus, natura jamdum se exonerasset, adeoque nec necesse foret, eundem repetere. Verum ille nil ad curam facit, quia intercessit ab illo tempore iracundia, de novo turbans œconomiam corporis ægri nostri. Ad hæc, cum (2) æger noster sit tenerioris, uti patet ex historia, constitutionis, hinc periculum crescit, ne ex vomitorio propinato, aut hypercatharses sequantur, eò, quod vomitoria sine violentia non operentur; aut ægrum, si eum vomitorio tentare velimus, viribus jamdum satis attritis lipothymia corripit. Insuper cum (3) urina jam appareat turbida, morbusque adeò principium transcenderit, & in incremento sit, sanè & hæc dissuadent vomitorii usum, præsertim, quia hic in principio continuarum saltem conceditur, non verò in incremento, ubi occasio præterlapsa, & (4) ipsa natura jam se exoneraverit. Contra ab altera parte, pro vomitu instituendo urgent (α) quod æger anxius sit & inquietus, quæ affecta esse præcordia indicant, adeoque si intermittatur vomitus, metus est, ne dicta symptomata ab affecto stomacho oriunda exasperentur. (β) quia fluctuationis sensum in præcordiis percipit æger, quod signum est, ut Practici loqui amant, anopsiam humorum instare. (γ) quia æger dicit, quoties de mixtura præscripta caperet, exastuationem circa præcordia pati; quod indicium est, spiritum nitri dulcis cum contentis stomachi & vicinarum partium effervesce. Hæc ergò permittentia & dissuadentia vomitum, dum occurrebant, vespertino tempore accedens, quid agerem? in bivio hærebam; neglectis tamen dissuadentibus, rectè dedi vomitorium, quod ipsum in principio primò advocatus sine deliberatione mox dedissem. Equidem bene nosse aliàs convenit Medicos, vomitoria, dum sunt ex illorum manu, non esse amplius in eorum potestate: interim probè quoque distinguere sciebam inter vomitoria ex regno minerali, & inter purgantia vegetabilia: quorum illa in stomacho & duodeno, & ultra primas vias non operantur; hæc verò ulterius pergunt, adeoque nociva sunt, tam in malignis quàm benignis continuis, idque, quia massam sanguineam colliquefaciunt, causam

causam morbosam evacuant, & symptomata potius augent quàm curant.

Secundus scopus est, ut massa sanguinea corrigatur: quod fieri potest misturis alterantibus; unà operam dando, ut semper aget, quantum possibile, in blanda diaphoresi conservetur: quippe hâc ratione illa melius longè operari solent, & cephalalgia simul discutitur, unde spiritus nitri dulcis egregius est, ob vim singularem diaphoreticam, quam præ aliis spiritibus acidis habet, & sistendum æstum, ex effervescentiâ humorum natum.

Opiata in incremento harum febrium, aliorumque morborum acutorum, optimè profunt, ritè administrata: Sed in incremento morbi saltem dando cum bezoardicis, præmissis universalibus, vel primas vias mundantibus; sic enim maturè in incremento morbi præcaventur deliria & majora symptomata, quæ aliàs in statu essent metuenda; ægrumque quietum reddunt: imprimis tinctura Bezoardica cum opio est proficua, de qua vid. Ludovici in *Pharmac.* In statu autem non propinentur opiata, nec si adsit crisis, quæ per vomitum, vel per secessum, aut similem sit expectandum, ubi adest stimulus in nervis; talem enim opium impedit; in ceteris verò crisis per urinam, sudorem, & similia, quæ fiunt per internos humorum motus, crisis non sistunt.

In usu autem Bezoardici Lunaris, sumus cauti ob adulterium lunæ, quod habet cum Venere: quandoquidem aliquando illud in febre ardente cum delirio conjuncta præscribens observavi aliquot secessus in ægro hinc excitatos fuisse; unde nisi ex defæcatissima luna fuerit confectum, periculum semper imminet, ne de Venere participando, vi cathartica turbas in corpore suscitet, & ad secessus disponat.

Quoad sitim: ægris potus largior concedendus, modò non nimis una vice, nec nimis frigide, hauriant; adeoque rectè Panatollus *Pentec. 4. Observ. 8.* eos perstringit, qui ægrotis suis omnem potum interdicunt, & sui miserè torquent. Julebi sunt optimi, sed quòsimpliciores, eò meliores, v. g. succus acetosellæ, succus cydoniorum recens, rubi idæi, &c. uti & reliquis vegetabilium succis acidulis per fimum sulphuris asservatis, condensando quasi massam sanguineam, in continuis cum aqua simplici propinati, addita tincturâ quâdam vegetabili, & paucò saccharo: succus cydoniorum optimus est, cum cydonia habeant vim quandam nitrosam, vel cerevisia secundaria, aut aqua cum modico vini & pomo citrio in taleolas inciso & immisso. Malignæ si sint, gelatina cornu cervi addatur; quia succo nutritio

constat, & hinc copioso sale volatili temperato, inde habet vim analepticam, & blandè temperat aciores succos; etiam propter sal volatile temperatum diaphoretica est, vel in potu ordinario, vel Julebo: item decoctum citri Mynsichti & Tilemanni.

℞. *Æ fontanæ* ℥ij.

Syr. rub. idæi ℥ij.

Papav. albi ℥j.

& si placet, acde

℥i q. s.

M. f. Julebus suavis.

Huic etiam Gelatina cornu cervi ℥i℥. ad ℥ij. addi possunt.

Si alvus simul sit obstructa, in his Julepis decoctum tamarindorum, vel solum, vel cum passulis optimè convenit, v. g.

℞. *Decoct. Tamarind. c. pass.* ℥vj.

Syr. acetos. citri ℥i℥.

℥i dulc. q. s.

M. pro Julepo.

Nitrum depuratum etiam est egregium; lapis prunellæ verò nil valet. Pro depuratione nitrum ebulliat probè in lixivio torti, & per blandum calorem inspissetur, & aqua eluatur; Vid. Tachenius. Nitrum antimoniatum etiam melius est propter subtilissimas particulas sulphuris antimonii concentratas, sed in larga dosi propinandum, in mensura nempe una potus ad ℥ij vel iij addatur; sic optimum successum habet in ægris, servat simul alvum apertam, & disponit ad diaphoresin. Loco hujus sumitur liquor ablutionis antimonii diaphoretici, instillatur acetum, & pulvis in fundum secedit, qui dicitur Magisterium antimonii.

Ægrum vocatus sic curavi: scilicet postquam illi die Solis propinandam jussieram misturam, in casu enarratam, sed postmodum ægrum sic inveni, ut in casu dictum, vespèrique ejusdem diei rediens diu deliberavi mecum; an vomitorium conveniret? tandem deliberatis circumstantiis ei lenè præscripsi, ex tartari emetici Mynsichti gr. ij. unde factum est, ut horâ una interjecta, æger incideret in vomitiones crebriores, cum copiosissimis alvi dejectionibus, reverâ cholericis pathematibus, superveniente summâ virium prostratione, extremorum refrigeratione, & sudore circa frontem syncoptico. His ita perseverantibus, cum æger non posset surgere præ languore, revocatus jussi ei exhiberi tantillum vini generosi, quietumque simul in lecto manere eundem, ut extrema incalescerent, sed mox rejiciebat, & moribundi instar jacebat; nihilominus tamen ordinavi, ut in lecto quietus jaceat, imò etiam naribus crebrò admovi vinum

[Ee] gene-

generosum, ut huius odore reficeretur. De-
hinc internè præscripsi:

℞. ▽ *Ment. b.*

rubi idæi ana ℥i℥.

Cinam. ℥vj.

Succ. Cydonior. ℥j.

— *theriac. camph.* ℥iij.

Essent. ambre ℥℥. M.

Hæc suavis mistura ab ægro successivè as-
sumpta vomitus & secessus sedavit, cum-
que sequenti nocte quietum reddidit, unde
simul regioni stomachali crebrius inungi cu-
ravi Theriacam, vel solam, vel in vino gene-
roso calidè dissolutam, proter vim aromati-
cam: Cum his autem post mediam noctem,
& post vomitum præscripsi:

℞. *Ebor. s. Δe.*

℞iidiaphor. aa. ℥j.

Bezoard. Car. gr. xv.

Laud. opiat. ferm. gr. iij.

M. f. Pulvis pro tribus dosibus.

Quarum unam cepit post mediam noctem,
alteram sequenti mane, tertiam vesperi.
Hoc facto atrocia symptomata ex voto eva-
nuerunt, & æger maximam partem levatus
fuit, de febre ardente moderata aderant ve-
stigia.

Hinc externè pro cephalalgia arcenda,
ordinavi emulsionem sequentem:

℞. *Sem. Papav.* ℥iij.

▽ *fl. sam.* ℥iij.

f. l. a. Emulsio: adde

Camph. (si ferre eam potest æger) gr. vi.

Misc. pro Epithemate, fronti applican-
do, sic æger restitutus.

Sed audite, quid porro factum! Æger
biberat cerevisiam novellam, hinc ex ejus usu
& impetu in stomacho adhuc debili, & cere-
visiam non digerere valente, nova revivisce-
bant symptomata febrilia, frigus cum inse-
quente æstu, &c. quæ dolores artuum corni-
tarentur quotidie à meridie ita redeunt, ut
semper alternis diebus per bihorium anticipa-
rent, & ita febrem tertianam duplicatam re-
præsentarent. Hinc ordinavi Tincturam tar-
tari ad guttas 30. omni manè in haustu vehi-
culi calidi assumendum, uti à meridie ante
Paroxysmum, & sub introitum lecti, spiritus
salis ammoniaci gutt. 50. in vehiculo omni.
Cum æger hoc continuaret, & scrobiculum
cordis inungeret oleo destillato baccarum ju-
niperi, ita sensim continuato usu conva-
luit.

ornatus, cum sponsa & aliis sodalibus die
Solis rus petit mense Majo, ubi hilares
valdè convivio excepti choreas ducunt,
potant, vesperi domum redeunt. Spon-
sus in lectum cum sponsa se conferens, no-
ctem patitur nonnihil inquietam, variis
vagus insomniis & vigiliis interruptam.
Manè die Lunæ sitim intensiorem percipit,
lingua glutinosa admodum cum aliquali
capitis dolore, postquam surrexerit, &
vestimenta sibi adaptaverit, frigidum
quendam horrorem dorsum vagè perre-
ptantem percipit; hunc excipit successivè
frigus intensum cum rigore, quaticiente
membra. Hinc rejectis vestibus, lectum
repetit, probeque se contegit, ubi brevi
denuò incalescit, sed ita intensus æstus cum
gravi cephalalgia & summa bibendi ap-
petentia supervenit, ut ceu ægrotus le-
ctum colere necesse habeat. Bibit avidè
cerevisiam, non sapit, sed ob amarorem
& glutinositatem eam fastidit, hinc co-
ventum, tandem aquam frigidam, ap-
portari jubet, sed omnia eodem tenore
manent. Vesperi cum tota fere die nihil
comeasset, capit seu euporiston Tinctu-
ram Bezoardicam ad ℥j. in haustulo vini,
sudat, hinc æstus & cephalalgia nonnihil
remittunt: sed nox insequens inquieta,
ut antecedens, unde manè die Martis omnia
eadem atque præcedente die, sed non adeo
gravia, nihiledit, semper bibit, nox in-
sequens paulò quietior. Manè die Mer-
curii denuò capit istam tincturam, cura-
turus hæc ipsa seipsum, sudat, sed eodem
modo omnia persistunt. A meridie incli-
nante vespera gravior cephalalgia eum
prehendit, ita ut etiam oculos vix aperi-
re queat: sitis immensa, lingua arida, ut
& labia, æstus insignis, conqueritur de
dolore & anxietate circa præcordia, nau-
seat, & leviter vomiturit, sub noctem
loquitur varia, interdum ridicula; ma-
nè symptomata nonnihil remissiora. Die
ergo Jovis Medicus vocatur, qui accedens,
præter enarrata pathemata observat uri-
nam intensè tinctam, aliquantulum turbi-
dam cum aliquali encephalate. Pulsus fre-
quens admodum, vehemens, plenus ma-
gnitudine, & celeritate moderatus, re-
spiratio crebra, tangens manum, eam non-
nihil madidam, uti & frontem deprehen-
dit, debet curare ægrum.

CASUS XXVIII.

FEBRIS CONTINUA PE- RIODICA.

Juvenis sponsus laudabilis constitutio-
nis fronte serena & facie rubicunda

RESOLUTIO.

Quod Juvenis noster sponsus febre ar-
dente continua periodicâ laboret, calor in-
tensus atque continuus, sitis insigniter aucta,
cepha-

cephalalgia, & tertia quoque die exacerbatio, reliquaque ex ordine symptomata, signa harum febrium pathognomonica, probabilissimè testantur.

Cognito ergò affectu, absque ulteriori mora ipsius Partem primariò affectam ordine aggredimur, vix verò aliam statuere possumus in hac febre, quam massam sanguineam ad vitiosam fermentationem nonnihil dispositam.

Hujus autem febris continuæ periodicæ formalitas haud dubiè est effervescèntia sanguinis præternaturalis.

Causa proxima est dyscrasia sanguinis oleosa volatilis salina seu biliosa veterum, ratione cujus æger corripitur febre ardente continua: quatenus verò Paroxysmi tertiâ quoque die exacerbantur, adeoque Tertiana simul, & quidem intermittens, ex digestionis primæ vitio conjuncta est, ob id hæc febris composita rectè dicitur. Conferatur Sylvius. Hinc etiam noster sponsus, tanquam Juvenis laudabilioris constitutionis, & aliàs massam sanguineam non nihil oleosam habens, levi accedente occasione, dum nempe exspatiando in rus convivio exceptus ventriculum cibo, & forsàn nimio potu, nonnihil onerat, & ex hilaritate choreas ducit, à re nonnaturali, nempe motione nonnihil fortiori, tanquam causa externa, facillimè vitium primæ digestionis nidorosum contrahere, & ita fomitem pro toto morbo in primis viis constituere potuit; unde massa sanguinea ad vitiosam fermentationem disposita in actum secundum erumpit, & fermentatione præternaturali, præsertim mense Maio, tempore nempe vernali eò citius affligitur. Si enim ægri ardenti aliâve in febre conquerantur de amatore oris, certum est, vitium tunc hære in primis viis, adeoque vel in cruditate nidorosa, vel vitio confluentiæ succorum primarum viarum; ita ut tali in casu ad stomachum imprimis respiciendum sit. Minus benè ergò ægro nostro cerevisia sapit, sed ob amarorem & glutinositatem, & quia ob fermenti ventriculi inertiam, digestionem primâ turbatâ, cerevisia ingesta, utpote nonnihil crassa, mox corrumpitur & cadaverisatur, molestia aliqua excitatur, eam insigniter fastidit. A vitiosa verò illa chylicatione, & sanguinis fermentatione, vitiosi etiam producuntur spiritus animales, unde sponsus noster cum sponsa in lectum se conferens, noctem patitur nonnihil inquietam, variis vagis in somniis vigiliisque interruptam, quia spiritus animales turbulenti, & à quiete tranquillitateque naturali impediuntur. Dum autem duo illa salia massæ sanguineæ, acidum & urinosum acre oleosum bilis, motu

Tom. II. Pars 2.

mutuò in se invicem magis magisque fermentando agere incipiunt, successivè effervescendo febrilem inducunt calorem, & quidem tantò majorem, quò magis oleosa pinguis ac volatilis massa sanguinea existit. In principio autem motus hujus effervescèntiæ febrilis, dum acidum fortiter pugnat, & nonnihil præponderat, partes nervæ membranosæ, panniculus nempe carnosus, in specie abdominis systema, vellicantur, unde harum spasmi, & convulsivæ vibrationes excitantur, quæ sub forma horroris & frigoris, in specie in lumbis & abdomine, percipiuntur. Hunc autem frigoris sensum, mox excipit æstus intensus, cum gravi cephalalgia, & summâ bibendi appetentia conjunctus. Quando enim particulæ massæ sanguineæ volatiles oleosæ successivè emergere, acidumque pedetentim infractum temperare incipiunt, vehemens excitatur effervescèntia, sub qua partes massæ sanguineæ oleosæ sulphureæ velocius motæ & agitatae, intimiusque dissolutæ, calorem istum insignem concipiunt. Nihil enim magis effervescendo incalescit, quàm salia volatilia oleosa. Hinc talis turgescèntia sanguinis febrilis, vascula meningum copiosissima distendit, in suo motu nonnihil remoratur, & ita cephalalgiam insignem ægro nostro infert. Nec mirum proinde, quod tali ardori febrili summa bibendi copuletur appetentia. Ardor enim talis alterat lympham salivalem, fauces humectantem.

Æger ergò noster multis symptomatibus afflictus confugium sumit ad euporiston illud domesticum, tincturam nempe bezoardicam, hinc sudore excreto æstus & cephalalgia nonnihil remittunt. Diaphoresis enim, etsi quidem in omni febre utilis, maximè tamen etiam in continuis proficua est; materia enim fermentativa vitiosa successivè subacta, & instar sæcum in vino præcipitata, à reliquarum partium consortio liberata, copioso à sero, vi medicamenti assumpti per rapidiorem circulum sanguinis attenuato imbibita, effuso sudore excernitur, & sic massa sanguinea nonnihil æqualiter iterum fermentante, febrilia symptomata nonnihil remittunt. Noctem tamen iterum inquietam, vigiliisque interruptam, à spirituum animalium inordinato motu patitur. Die Martis omnia symptomata, sed non adeò gravia, iterum ægrum affligunt; nox tamen insequens quodammodo inquietior. Die Mercurii iterum omnia eodem in tenore permanent, à meridie autem inclinante vespere gravior cephalalgia ægrum nostrumprehendit, ita ut etiam oculos vix aperire queat; afficiuntur enim

[Ec 2]

ab hac

ab hac turgescencia sanguinis febrili membrana internæ, dum & tenuis meninx, à copia sanguinis vascula meningum distenduntur, & in motu suo remorantur; quia verò membrana illa, dura mater nominata, per consensum etiam pericranium afficit, nervumque opticum usque ad oculum comitatur ibidemque tunicam scleroticam constituit, ob id ipsi oculi intensè simul dolent, & cephalalgia dolores non parum exasperantur. Nec mirum quoque, quod tali effervescentia sanguinis febrili æstus insignis, labia & lingua arida, sitisque immensa, tanquam propria ipsi symptomata, adjungantur. Dolorem & angustiam circa præcordia gravissimam, vomendique levem conatum atque nauseam, à cruditate nidorosa, in stomacho & primis viis hærente, talem molestiam excitante, deduco. Delirium illud, dum æger noster juvenis varia & ridicula sub noctem loquitur, exinde originem habet, quod calefacto per sanguinem effervescentem cerebro, spiritus animales in cerebro & cerebello inordinatè moveantur atque agitentur, hinc occasione talis inordinati & continuati motus vigilia & deliria proveniunt. Urina intensè tincta, maximè oleosum innuit sal peccans. Quia verò febris quodammodo ad statum tendit, urina cruda fit magis cocta, & ex turbulentia ejus & aliquali eneoremate recrementorum præternaturalium præcipitatio & separatio innuitur, ob id jam morbum in incremento constitutum ad statum properare indicatur. Pulsus vehemens à robore cordis motus dependet; calor autem, quò intensior magnam sequitur sanguinis ebullitionem, eò celerius & frequentius vibratur arteria, unde pulsus frequens provenit. Respirationem verò nimis crebram atque auctam ut tandem etiam attingam, dico illam originem ducere à rarefactione nimia massæ sanguineæ, hinc celeriori sanguinis circulo per pulmones. Manuum autem atque frontis levis mador, calorem intensum, vaporosum dictum, pro causa agnoscit: imò naturam diaphoresin augere, & ægrum ad sudorem inclinare, adeoque eundem secundum naturæ motum, per sudorifera curandum, ostendit.

P R O G N O S I S.

Quod verò eventum attinet: paucis dicimus, febrim hanc, utpote benignam, minus periculosa, potius salutarem esse; brevi enim tempore, quia coctionis signa jam die quarto apparuerunt, fortasse die septimo exitum optatum haud dubiè, adjuvante DEo, promittimus: idque præsertim; si critico motu natura se exoneret: sin minus, ad aliquot dies diutius, & ita ad paucas septimanas morbum iri protractum, prædicimus.

In quorum enim morbis tempus, natura, habitus, ætateque congruit, levio periculo versantur multo, quam si nihil horum congruat, vid. Hippocrates *sect. 2. aph. 34*. Fontanus *Meth. General. Cognosc. Prædicendi & Curandi Morbos, eorumque symptomata lib. 2. cap. 3. 5. p. 18. & cap. 56*. Ratione enim naturæ aut temperamenti morbi alii dicuntur naturæ familiares, & cognati, qui similes sunt; alii minus cognati: Ita juvenibus febres ardentes & acutæ familiares sunt; senibus non. Magnitudo ergò morbi cognoscitur ex indispositione subjecti ad recipiendam causæ efficientis actionem: quò enim subjectum minus est dispositum ad causæ efficientis vim recipiendam, eò, cum receperit, majorem causam adesse necesse est; contra, quò major est dispositio, eò minorem.

C U R A.

Methodum verò medendi quod concernit: medicamenta eò dirigenda erunt, ut

1. Removeatur fomes ex primis viis, qui consistit in scoriis ex chylo vitiato, à bile præternaturaliter corrupto, genitis, i. e. in cruditate nidorosa.

2. Corrigatur dyscrasia massæ sanguineæ, temperando sal volatile urinosum, plus minus oleosum, effervescentiam excitans.

3. Correcta materia peccans per convenientes vias evacuanda, quod optimè fieri potest per sudorem, & per urinam.

4. Symptomata in cursu morbi urgentia non nihil mitiganda.

Primo scorbutica satisfacit Purgatio, vel per superiora, vel per inferiora. Posterior enim evacuantia, quia morbus jam ad statum pergit, minus convenit. In principio enim, si quid movendum videtur, move: vid. Hippocrates. Potius emetica conducunt, hinc manè:

℞. *Qi emet.* gr. ij.

Scamm. & at. gr. j.

Sacch. albiss. gr. vj.

M. f. Pulvis. D. S.

Brech-Pülverlein auf einmal.

Vel si vomitoria in forma pulveris minus placent:

℞. *Conf. Rosar.* ʒß.

Qi emet. gr. iij.

M. f. Bolus. D. S.

Brech-Bissen.

Si febris est benigna, & nondum adeò propinqua statui, consentientibus omnibus circa ægrum circumstantiis non adeò planè inconsultum videtur venam secare.

Secundo, tertio & quarto scopo satisfactientia, corrigendo nempe sal volatile oleosum, unde plurima symptomata, nempe sitis,

sitis, &c. proveniunt, sunt omnia acida, sal volatile acre præcipitantia. Imprimis tamen nitrata, & cum coparata remedia fixa; figunt enim sal volatile acre, oleositatem ejus coërcent, simulque per urinam vel sudorem evacuant.

Commodè autem his remediis laudanum opiatum, idque morbo adhuc in incremento existente, adjungitur; in statu enim minus liceret; quælibet enim symptomata reddit mitiora, & præter somnum inducendum, deliria præcavet, turgescencesque humores placat & sopit.

Die ergò Jovis vesperi:

℞. *℞ii diaph. aial. ℞ij.*
Bezoard. miner. gr. xv.
Laud. op. ferm. gr. ij.
M. f. Pulvis:
div. in 2. part. æqu.

D. S. *Schweiß-treibende Pülverlein.*

Capiendo unum tempore vespertino, alterum post mediam noctem. Vel

℞. *C. C. f. Δe*
℞ii diaph. aa. ℞ß.
Laud. opiat. gr. ij.
M. div. in 2. part. æqu.

D. S.

Schweiß-treibende Pülverlein.

Die Veneris ingruente paroxysmo.

℞. *∇ Cent. min.*
fl. samb. aa. ℞ij.
℞ diaph. ℞ij.
Bezoard. miner. ℞j.
Syr. Papav. albi ℞j.
— Qi dulc. q. s.

M. S.

Schweiß-Träncklein auffetliche mal.

Capiebat pro tribus dosibus, expectando blandum sudorem. Vel

℞. *R. Bezoard. ℞ij.*

D. S.

Schweiß-Tinctur auffetliche mal.

Dosis gutt. 50. in aqua florum sambuci.

Possunt etiam Spiritus minerales, & acidi & dulcificati magis, nempe temperati, in potu ordinario & decoctis alterantibus usurpari. Ergò.

℞. *— Qi dulc. ℞j.*

Instillantur subinde aliquot guttulæ in potum ordinarium.

Vel injiciatur parum de nitro antimoniato.

Die verò Saturni:

℞. *Decoct. Tamarid. c. pass. lbj.*
Syr. ribium
Granat. acid. aa. ℞ß.

— *Qi dulc. q. s. pro debita aciditate.*

M. Pro Julebo.

de quo pro lubitu hauriebat bonum haustum.

Quartò symptomata febrilia, in cursu fe-

bris adhuc urgentia, non nihil mitiganda. Si nempe dolor capitis nimis urgeat, pro mitigando dolore applicetur capiti Verbena contusa, vel tali modo etiam applicetur Betonica, vel unguentum Alabastrinum, cum linteis multiplicatis; vel conquisatum cum acetore temporibus imponatur. Sitim verò intensam antecedentia medicamenta optimè mitigant.

CASUS XXIX.

FEBRIS CATARRHALIS.

Virgo nobilis & delicata, facta tempore hyberno mensium excretionem, conqueri cepit de lassitudine artuum, ac vagis eorum lancinationibus, alvique crebriore in liquida forma solutione, ex pancreaticæ lymphæ intestina stimulantem. Supervenit difficultas loquæ, & vox aspera & rauca, vix perceptibilis, redditur. Comitatur hæc accidentia tussis ferina sicca, sæpius quatens pectus sine etiam materie rejectione per fauces, quæ dolentes & quasi excoriatæ sunt. Tussis hæc subinde eam vexat, magis tamen noctu quam interdiu, ita ut nimio tussendi conatu vomitus decumbenti in lecto accidat. Adest simul calor præternaturalis, interdiu remissus, vesperi gravior, noctu satis intensus. Caput dolet, sitis moderata, urina naturaliter tincta, tenuis, cum aliquanti encephalæmate, pulsus frequens, vehementia & magnitudine moderatus, sub calore tamen vespertino satis frequens ac celer.

RESOLUTIO.

AFFECTUS.

Historia symptomatum occurrentium in hoc nos certos reddit, ut affectum nostræ agræ complicatum esse, asserere nulli dubitemus. Primarium enim urgens videtur Febris lymphatica catarrhalis, & quoad modum invasionis, continua periodica, interdiu remittens, non tamen planè intermittens; quæ subinde raucedine, difficultate loquendi, simulque tussi ferina, & excretionis modi ratione habitâ, sicca, ceu satellitibus, causali consortio conjunctis, stipata est. Et hæc adesse patet; lassitudines enim artuum, eorum lancinationes vagæ, calor præternaturalis interdiu remissior, noctu gravior, pulsus frequentior & celerior febrilem æstum; tussim verò vocemque asperam agræ nostræ loquela aliaque similima manifestissimè declarant.

SUBJECTUM.

Detecto ergò horum symptomatum fonte, ex affectu primario focum, in quo hæc accensa, subjectum puto, indigitemus.

[Ec] 3

In

In hoc autem determinando minus incongruum fore puto, distinguere inter subjectum morbi, & inter subjectum causæ. Morbi subjectum ratione febris catarrhalis est massa sanguinea vitio lymphæ in motu fermentativo vitiata, in cuius præternaturali effervescencia febrilis æstus ratio formalis petenda; ratione tussis & raucedinis aspera arteria. Subjectum causæ ceu principale est lymphæ seu latex Helmontii aquosus, ex glandulis, tam conglomeratis quàm conglobatis, exstillans.

CAUSA PROXIMA.

Hæc ultima ut pressius examinemus, Causam explicare animus est, seu quis ex hoc foco ortorum symptomatum fuerit Vulcanus. Causam autem proximam quod attinet: illa est lymphæ, non tam glandularum conglomeratarum, sed quam maximè conglobatarum, præternaturali acrimoniâ acidofalsâ inquinata; hæc enim dum per partes distribuitur, eas irritat, & ad dolorem lancinantem commovet, sanguinique immista in vena axillari in eo effervescenciam febrilem excitat, sicque talium symptomatum autor existit.

Et se ita dicta habere, lymphamque præternaturaliter constitutam esse ejusmodi malorum causam, explicatio adjunctorum symptomatum dilucidabit. Et quidem, cum duplicem nominaverimus lympham, glandularum nempe conglomeratarum & conglobatarum, utriusque scilicet diversæ, rationem reddere promittimus. Lympham enim glandularum conglobatarum hic peccare non ulli negare puto: Nam hæc nimis acida, acris & falsa reddita, dum venæ axillari sinistra infunditur, uti alias naturaliter constituta turgescenciam sanguinis promovet, ita vitiosa reddita & vitiosam omninòque præternaturalem effervescenciam excitat; unde postmodum calor ille præternaturalis & febrilis cum pulsû frequente, ac sub calore vespertino fatisceleri, ceu febris præsentis signo pathognominico, exoritur. Dum itaque sanguini permista lymphæ ista potens fuerit calorem febrilem introducere, certum hinc, quod distributa ad partes corporis, ejusmodi lassitudines artuum, membranasque eorum rodendo lancements, easque vagas, induxit; certo indicio, non fermentum partium glandulosarum proximum hic peccare, sed lympham glandularum conglobatarum, utpote quæ vagè ad corporis artus & viscera universa distribuitur, hincque peregrinis salibus imbuta tales lancements infert, more salium scorbuticorum, similes ejusmodi dolores inducentium. Eadem itidem lymphæ ad caput delata, ob copiosissimarum glandu-

larum præsentiam, quæ ibi copiosissimæ exstant, (cùm cortex cerebri ipse totus glandulosus) & ibi falsedine suâ muriaticâ simulque acidâ, capitis dolorem exacerbando, molesta existit.

Confirmant nos in dicta sententia, si ulterius uberiores hujus lymphæ vitiatæ progressum indigitemus; hæc enim lymphæ acrior ad fauces, arteriam præprimis asperam, delata, illas partes dictas irritat, hinc ex lymphæ effusione vox aspera & rauca vixque perceptibilis redditur, quæ à lymphæ acriori ulterius irriatæ, uberiores lymphæ profluxum concitant; unde non potest non fieri, quin talis effectus, raucedo nempe, sequatur. Et hoc ita esse demonstrat, quod ejusmodi symptomata comitetur tussis ferina, ortum suum ducens ab ejusmodi lymphæ falsa acri, pertinaciùs asperam arteriam, tam delicatè sensilem, vellicante, istamque rodente; proinde summus tussendi conatus adest, totum pectus quatiens; cumque materia subtilis, minus cocta Practicis dicta, hinc sine rejectione aliqua materiæ procedit, & absque omni effectû, nisi quod fortiori hac irritatione exindeque exorta motione, fauces quasi excoriatæ, & ita quasi phlogosi affectæ, doleant. Tussim autem hanc catarrhalem esse, ortam ex lymphæ vitiosa, confirmat, quod magis circa vesperam ægram cruciet: solenne quippe est omnibus lymphæ affectibus, ut semper noctu exasperentur, ob rationem, quod poritunc magis occlusi ansum dent ulteriori lymphæ effusioni; cumque salia peregrina per insensibilem transpirationem non tam faciliter exhalent, hinc & tussis ægram nostram magis noctu quàm interdiu vexat, ut decumbenti in lecto ex nimio tussendi conatu vomitus superveniat, claro indicio, stomachum, & imprimis ejus Rectorem, ob nimiam concussionem pectoris & diaphragmatis in consensum trahere, hic ita irritatus convellatur, & vomitus superveniat. Non autem tussis solum exasperationes suas circa vesperi ortum exorditur, sed & reliqua symptomata circa idem tempus suum capiunt incrementum, hinc & calor seu effervescencia illa præternaturalis interdiu minùs intensa, vesperi gravior, noctuque satis intensa est ob eandem, cum tussi nocturno tempore asperiore facta, rationem; ita enim lymphæ in majori copia sanguini affusa uti majorem effervescenciam, sic & pulsus magis frequentem & celerem, causatur.

Dictum autem superius; febrilis effervescenciæ causam non tantum glandularum conglobatarum, quàm etiam conglomeratarum lympham esse. De priori certitudo ex dictis patet; de posteriori jam dicendum, & illam suum addere symbolum. Præprimis autem

autem accusandum lymphæ pancreaticæ vitium; hæc enim simul acrior facta, & ad intestina delata, non solum præternaturaliter cum bile effervescens molestias ibi infert, sed & postea massæ sanguineæ infusa multum ad calorem febrilem inducendum contulit; & hujus succi, pancreatici puto, vitio corpus nostræ ægræ affligi historia indicat, cum ob eandem rationem crebriores alvi dejectiones passa fuerit, quatenus hic præternaturaliter acrior & viscidior redditus continuo intestina vellicando ea excitat, ut copiosius tributum solvant. Salivam verò, quæ & aliàs sub vexillo lymphæ glandularum conglomeratarum militat, immunem hoc in loco esse, exinde conjicere licebit, quod sitis in ægra sit moderata, nam hæc statum ejus aliquomodo adhuc faustum, & à salibus acrioribus liberum, indicat, ut ita fauces nonnihil abstergere posset, sicque sitim aliàs molestam in ejusmodi affectibus modificari; cum enim peccet lymphæ acida, hinc sitis minor & moderata, quam si esset salsa nimis.

CAUSÆ REMOTIORES.

Ad dictorum autem certiores dilucidationem multum facit, si & causas prægressas remotiores examinaverimus, satis potentes & aptas ad talem effervescentiam sanguini inducendam. Eminent autem hinc tempus brumale; hoc enim tempore aer partim impurus redditus, dehinc talis inspiratus materialiter ad hunc morbum disponere potuit; partim verò, & quidem maximè, quatenus obstruendo poros corporis frenum injecit insensibili transpirationi, hinc recrementa vitiosa salina excerni non potuerunt, sed regurgitando ad massam sanguineam tales efferos motus excitarunt: cui postmodum *ἰνισάμενον μέγεθος* addidit tributum lunare, quod tunc temporis solvit; hujus enim excretionis tempore, cum jam massa sanguinea turgat, & effera reddita, accedente de hinc lymphæ acriori, facile in majorem effervescentiam abire potuit, idque eo magis, cum offenderit subjectum juvenile, humoribus turgens & delicatæ constitutionis, cui facile ejusmodi mala imprimi possunt.

P R O G N O S I S.

Horum ergò cum ægra nostra sit impatiens, hinc eo citius Curam aggreditur, de qua ut certiores simus, Prognosin præmittimus.

Quoad eventum itaque: cum febris minus acuta sit, adeoque minus periculosa, hinc tantum abest, ut ægræ nostræ malè ominemur, vel sinistrum eventum prædicemus, cum speciatim, non sit febris maligna; hinc facilius curatu erit, cum jam, ut ex urina patet, signa fausta coctionis ex eneoremate in

illa hærente appareant; hinc debellato fermento peregrino, mineræque febrili eradicatâ, h. e. lymphæ vitio & in constitutione seu textura materiali & motu correcto, facilius erit cura.

C U R A.

Hanc fundatam methodo medendi per indicationes & materias auxiliorum illi respondentibus legitimè aggredimur, præmissis tribus Indicationibus, & quidem

1. Ut lymphæ acrior & magis acida temperetur, æstusque febrilis inde dependens sic inhibeatur.

2. Temperata lymphæ copiosius adhuc residua per debitas vias, sudoris & urinæ excretioni dicatas, evacuetur, & sic, quod à frigore externo inclusum, reſeratis claustris eliminetur.

3. Alperæ arteriæ partibusque aliis, sub his pathematis læsis, appropriatis medicamentis catarrhum incrassantibus, seu potius temperantibus, adeoque ulterioris irritationis sensum inhibentibus, succurramus, ut quævis in suis crassi & debita constitutione & tono servantur.

Apparatus specierum, quibus hisce indicationibus satisfiat, depromitur ex tribus consuetis fontibus, & quidem è Chirurgico. Etsi venæsectio, cum ægra sit in juvenili ætate posita, parè adhibita conveniret, quò motus sisteretur præternaturalis: Interim tamen, cum jam ejus sufficiens quantitas per menstruum fluxum exhausta, non ampliùs erit sanguis educendus, sed potius legitimis remediis ejus fervor sustendus, nec piandum hoc malum puto scarificationibus & fonticulis, cum ægra delicata vix admitteret, malum etiam adhuc recens; hinc cum nobis promittamus radicatus; & ut dicunt à priori, evellere hunc morbum, illa remedia generosiora, & tantum palliativè curantia, è Chirurgia non mutuabimur, sed potius Pharmaciâ compellamus, quæ ad hunc hostem extrudendum copiosa suggerit remedia.

Vomitus hinc nil prodest:

1. Quia non est tussis stomachalis.
2. Quia vomitus, qui præcessit spontaneus, reverà est symptomaticus.

3. Quia nulli indicationum satisfacit.

Omisso ergò vomitu, quàm citissimè, ut corrigatur lymphæ acris acida præternaturaliter peccans, conveniunt sàlia volatilia sudorifera opiatis mista; hinc ad Indicationem primam à meridie

℞. *ʒ fœnic.*

Petrosel. aa. ʒiʒ.

theriac. simpl. ʒiij.

~ *Θ*ci anis. ʒi.*

C. C. succinat. ʒʒ.

Laud.

Laud. opiat. ferm. gr. iij.

Syr. de fœnic. ʒß.

M. f. Potio.

D. S.

Stillender Trand.

Quæ postmodum cochleatim hauriatur, benè sudorem subinde, in specie sub quiete nocturna, expectando.

Ad indicationem secundam, lympham jam temperata ut evacuetur, ulteriùs conveniunt per sudorem & insensibilem transpirationem expellentia. Si talia non suffecerint, in subiecto aliàs catarrhali seu phlegmatico, manè insequente præscribantur evacuantia per alvum:

ʒ. *MP. de succin. Crat. gr. xv.*

Extr. absinth.

Card. bened. aa. gr. vj.

Scamm. ʒati gr. ij.

Extr. troch. alhand. gr. j.

Cum f. q. R ʒi f. Pilulæ: S.

Fluß-Pillen.

Vel ʒ. *MP. de succin. Crat. ʒj.*

ʒ *vol. succin. gr. vj.*

Ref. Jalapp. gr. iij.

Extr. troch. alhand. gr. ʒ.

Ol. destill. succini, vel ligni Sassafr. per vesicam destillati gutt. ij.

Cum *Ess. succini, vel ligni sassafr. f. Pilulæ:*

Ad indicationem tertiam vesperi præscribatur sequens Potiuncula:

ʒ. *Card. bened.*

serpill. aa. ʒj.

~ *theriac. camph.*

Ess. Ligni Sassafr. aa. ʒij.

Liqu. C. C. succin. ʒj.

Syr. Papav. alb. ʒij.

M. D. S.

Fluß-Träncklein.

Dehinc & Catarrhi, reliquorumque symptomatum, nec non pectoris læsi habeatur ratio. Certum quidem quod materiâ peccante ablatâ, & catarrhales affectus reliqui cessarent, si tamen adhuc ulteriùs urgerent, præter laudatum liquorem cornu cervi, ad ʒi. altero die manè, vesperi & sub introitum lecti assumptum,

ʒ. *Fl. ʒis ʒj.*

Antihæst. Poter. ʒß.

ʒ *vol. succin. ʒj.*

Ol. destill. Sassafr. gutt. vj.

Laud. opiat. gr. iij.

M. f. Pulvis pro tribus dosibus:

D. S.

Fluß-Pulver.

Si loquelæ difficultas & raucedo urgeat, commendamus Syrupum diacodii Montani, qui cum baculo liquiritiæ assumatur, & lentè subinde deglutitur;

Vel ʒ. *Mentha ʒij.*

Cinnam. ʒß.

~ *ʒci anis. ʒj.*

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. de passul. vel de liquirit. ʒvj.

M. D. S.

Fluß-Träncklein löffelweise.

Si tussis nimis urgeat, usurpentur flores sulphuris, misti cum floribus benzoës, & in in ovo sorbili assumantur vesperi sub introitum lecti, simulque pro incrustanda materia, & ut fauces exulceratæ curentur, continetur usus syrupi diacodii Montani cum baculo liquiritiæ. Posthæc, si ulteriùs petantur medicamenta, posset dari liquor cornu cervi succinatus bis in die, aut aliud quid, vel essentia, vel quod placuerit, aut pulvis superior, quando placuerit.

Si petat quid pro stomacho, convenit elixyr proprietatis, per aliquot dies propinatum.

Quoad Externa, præprimis ad dolorem capitis mitigandum, convenit sequens:

ʒ. *Ol. expr. nucistæ ʒß.*

destill. Macis.

Major. aa. ʒß.

succin. ʒj.

M. f. Balf.

Qui calidè vertici inungatur.

Vel instituatursuffitus ex succino, mastiche & similibus, qui naribus & ore aperto hauriatur.

Quodsi febris hæc corripere gravidam, & degat in octavo mense ingravidationis, abstineat ab ejusmodi volatilibus, quæ partum promovent, & sic illum immaturum expellunt. Cavendum quoque ab Opio, quia nocet foetui maximè. Sin casus, ut in hoc morbo simul menses fluere, & emitteret vel eiceret sanguinem ex nimio conatu, hic venæ sectio conveniret quàm maximè: sed quod notandum benè, non in brachio sed in pede; si enim in brachio vena secetur, materia ad superiora copiosius deduceretur, & hominem jugularet, quod notandum. Si etiam, antequam menses fluere, hæmorrhoides prorumperent, hæmorrhoides relinquendæ, cum sint salutares, quia quod aliàs per mensium fluxum erat evacuandum, evacuetur per hæmorrhoides.

CASUS XXX.

FEBRES ET MORBI CATARRHALES EPIDEMICI.

Quoad morbum, qui Anno 1675. pertotam ferè Germaniam epidemicè grassatus fuit, observandum: quod universi anni tempestas fuerit admodum inequalis seu inconstans, imprimis æstas pluviosa, indeque aquarum repetitæ inundationes ingen-

ingentes; cum spirantibus crebrioribus zephyris. Hinc principio Septembris circa æquinoctium nebulae spissiores auroram obscurabant, circa meridiem claro solis splendore denuò illucescente, utut tandem pluviosum & humidum tempus superveniret; hinc sub finem Septembris & mense Octobri atque Novembri ubique grassari incipiebat coryza gravis & diuturna, cum copiosa muciper nares reiectione, quam cephalalgia, speciatim dolor gravativus & tensivus capitis, comitabatur; superveniebat hinc in aegris post aliquot dies tussis crebra, ferina (ein Schaaf-Husten) profunda, frequentissime hinc pectus concutiens, in principio inanis & sicca, aut in qua pauca saltem, subinde subcruenta, rejiciebantur, noctu praesertim affligens, donec post aliquot dies transactos, & successivè humida fieret; unde copiosis reiectis viscidis liquaminibus, pedetentim cessavit. Quidam subitò obmutescabant raucedine, verbum sonorum nullum proferre poterant, cum tanta respirationis difficultate, ut ferè suffocari viderentur, ex eo, quod pectus ipsis angustissimum & ubique repletum appareret; unde & tales nec tussire poterant, donec, cessante pectoris angustia, & liberiore facta respiratione, tussis superveniret, raucitasque paulatim cessaret. Plures cum dictis symptomatibus, praesertim in principio morbi, frigus vagum, spinam dorsipererrans, interdum affligebat, aestu plus minus intensio, vesperi insequente post mediam noctem usque, & sic quotidie repetebat. Quibusdam laniationes artuum superveniebant; plurimi, & tantum non omnes, gravi dolore punctorio in alterutro saltem latere, sive dextrum sive sinistrum fuerit, affligebantur, gravissimè occupante spatia costarum immansueti notharum, & à regione spinæ dorsilumbari sursum, anteriora versus, ad sternum usque adscendente, respirationem, ob gravissimos dolores, qui per tussim mirè exasperabantur, insigniter impediende. Continuabant hæc aliquamdiu, rejiciebantur tandem in taliter constitutis quibusdam cruenta & viscida glutinosa, horrida, non tamen purulenta: aderat tunc simul calor, in principio intensus, cum pulsu crebro, celeri, magnitudine & vehementia moderato, qui ipse tamen, uti & excretiones, doloribus cessantibus & ipsæ cessabant. Urine manè emissæ intense erant tinctæ, quæ turbabantur postmodum, & copiosum sedimentum lateritium & farinaceum seponebant. Vires prosternebantur insigniter, ut lectum colere cogerentur. Queritur: qualis affectus fuerit? un-

de ortus? & quomodo denique curandus?

RESOLUTIO.

Præsens affectus vocandus est Catarrhalis affectus, ex lymphæ præternaturaliter constitutæ effusione, facta ab irritatione externa, ortus.

Pars affecta sunt glandulae, & loca glandulosa, quæ in genere sunt scaturigines lymphæ & fontes catarrhorum. Specialiter autem catarrhorum pars affecta variat pro symptomatum varietate; eaque nunc sunt membranae narium, nunc vasa glandulosa laryngis, nunc circa corporis peripheriam, &c.

Quoad causas: duplex harum genus considerandum est,

nempe

1. Materialis Causa; &
2. Efficiens, quæ illam movet.

Causa materialis est lymphæ vitata & acris, acida facta, plus minus abundans, nimis commota, vel præternaturaliter effusa. Depravata verò illa in hoc calu est imprimis ab inæquali qualitate præcedentis temporis, æstivipariter ac infecuri autumnalis, asperioris, & matutino tempore nebulosi: aëre enim hoc pluvioso & nebuloso massa sanguinea nostra, per copiam aquarum & zephyri flatuum, unà humidior & magis aquosa facta est, hinc minùs spirituosâ eadem reddita, ac spiritus ipsi minus volatiles & mobiles, sed quasi phlegmatici facti; unde tandem etiam lymphæ, tam copiosioris, quàm crassioris & acidioris, acriorisque origo. Zephyrus enim est humidus in nostris climatibus, adeoque de blando humido calore ferè interpretandus est. Ut nil dicam jam de aëris illo sale universali, quò plus minus enervato, massæ sanguineæ debitam alterationem imprimere non potuit.

Quoad efficientem causam, quæ nempe præternaturaliter commoverit & effuderit lympham ita constitutam extra suos canales, eaque proxima, est spiritus vitalis & animalis; sive insitus sive influus allegetur, omnium scilicet motuum localium, mediante tamen partium structura, primarius autor; qui occasione irritationis externæ fibras partium variè movit, quibus commotis etiam partium contenta & glandulosa loca fortius commovit, adeoque lymphæ effusionem procuravit, sive in statu naturali, sive, uti hic, acris vel præternaturaliter constituta sit; quæ aciditas consistit in particularum pungentium, acidarum, &c. structura.

Causa autem efficiens remota, quæ scilicet moverit istam causam efficientem internam,

[Ff]

hoc

hoc est, procatarcticum materiale, pro inducenda lymphæ in determinata loca effusione & depravatione, est externa; quia malum epidemicum; nempe inclementia aëris autumnalis, nebulosi præsertim, quæ nebulae scatentes, quorumcunque corporum effluviis, & variis sordibus imprægnatæ, cum aëre inspiratæ, ob contenta acia læserunt intense nares, fauces, asperam arteriam, pulmones, & loca vicina. Unde hæ partes irritatæ, lympham dimiserunt; sicque coryza, tussis, pleuritis notha, &c. prognata est; non secus ac spina infixæ dolorem & affluxum facit, qualis spina cum aëre attracta fuit.

Possit aliquis dicere: acrimoniæ lymphæ præternaturalem huic phænomeno inducendo sufficere potuisse: sed nego hoc ideò, quia malum fuit universale, promiscuè omnia subiecta affligens; quod fieri non potuisset, si una eademque causa stimulans interna latitasset. Unde potius dicendum est: illam irritationem ex causa externâ communi, omnes æqualiter afficiente, originem suam derivasse, qualis est aër. Adeò scilicet coryzæ istæ, quæ obveniunt sub mutationibus temporum, à causa externa, irritante nares, semper esse solent. Aër enim asperior, atomis asperioribus irregularibus stimulantibus, & quasi pulvere sternutatorio refertus, vellicavit & læsit membranam narium internam cum membrana pituitaria superiore, unde ex irritatione fibrarum & spirituum animalium affluxu lymphæ fuit effusa; sicut effectum similem videmus à pulvere sternutatorio, solutione vitrioli albi intra nares attractâ: Conf. Helmontius *Tract. Asthma & Tussis*.

Sic cum tales coryzæ affecti postmodum tussirent, hinc idem aër, irritans & lædens membranas faucium & laryngis, effundentes per suas glandulas lympham acriorem ac præternaturalem, accusandus venit. Tussis autem fuit vel sicca vel humida: Et quidem tussis initio affligebat sicca, à simplici lymphæ effusione, acrimoniâ sua membranam asperæ arteriæ stimulantis, quæ tenuis adhuc rejici non poterat ob sui ineptitudinem; postmodum tamen, ubi læsio laryngis procederet, & aspera arteria quoad interiora quodammodo excoriaretur, & non nihil exulceraretur, tunc ex iis succus quidam nutritius, de natura chylosa, emanabat, qui effusus & corruptus in locis istis dat mucum, & tussim humidam: Non secus, ac si e. g. quis cæteroquin sanissimus, miculam panis casu in asperam arteriam dimittit, tunc mox tussis oboritur sicca propter irritationem, in humidam tandem, si continuatur, desinens. Unde non mirum, tussiles tales phthisicos præmium post se relinquere, excoriatis scilicet istis partibus, & ulterius excoriationem extendentibus.

Raucedo porrò ex eadem causa deducenda est, larynge scilicet & aspera arteriâ subito à lymphæ nimis humectata, imprimis quando quidam humor sanguinolentus conjunctus fuerit, musculos tumefaciens, hinc asthma supervenit. Humectationem laryngis probat fistula, quæ imbuta salivâ raucedine quasi laborare videtur. Asthma autem, *der Stöck-Fluss*/ in quo sub primo insultu omnia plena circa præcordia esse conquerebantur, utut falsò, dependebat à nimia strictura pulmonum, qui non poterant distendi: Nam thorax non poterat ampliari propter motum convulsivum pulmonum, ex irritatione eorum ab aëre externo; unde irritati, & ratione sui retis fibrosi musculosi contracti, angustabantur, & asthma convulsivum & vocis defectum constituebant; unde quia ab irruente aëre iidem distendi non poterant, hinc nec thorax distendebatur. Ac quia nonnulli horum ægrorum liberè inspirare non poterant, propterea etiam nec violenter expirare, hinc dicebant: *Es sey alles voll*/ adeoque propter impeditam thoracis ampliationem, nec tussire ipsis licitum erat, quia tussis fit per validam inspirationem & expirationem. Per opiata autem cessabat, sine materiæ rejectione. Ergo causa erat irritatio externâ.

Uterius febris catarrhalis oriebatur à lymphæ nimis acida, nervis inimicissima, effervescente in sanguine.

Rigor erat ab acore lymphæ, vellicante partes membranosas intercutaneas & circa præcordia. Aëstus verò insequens, ab aliquali lymphæ ejusdem acidæ cum sale volatili oleoso massæ sanguineæ effervescencia. Sicut tandem Pleuritis notha dependet ab effusione lymphæ circa costas nothas & pleuræ locum inferiorem; unde quoties tales Patientes inspirabant, dolorem puncturium patiebantur, ex lymphæ acri rodente membranam. Conferatur de hoc dolore Sennertus *lib. 2. Prax. de Pectoris affectibus*, ubi ex mala curata scabie talis pleuritidis nothæ meminit: quo loco etiam alium casum refert doloris, ex acri sero circa pectus effuso.

De cætero, circa problema: an scilicet corporis calor vitalis remissior sit tempore hyberno, quam æstivo? tria pensanda sunt:

1. Analogia macro & microcosmi.
2. An transpiratio simpliciter fiat à calore?
3. An hyeme imminuta transpiratio an- sam dare possit catarrhis?

Quoad I. nempe analogiam macro- & microcosmicam: eam introduxit primus Paracelsus, sed est nimis generalis, & in Medicina, tam Theoretica, quam Practica, inutilis & nulla. Nam

I. Cum

1. Cum homo vel ratione animæ, vel corporis, considerandus sit; animæ rationalis ratione microcosmus dici non poterit, quia ratione hujus ab Altissimo creatus est ad imaginem DEI, non verò mundi; nec ratione structuræ corporeæ, nam eadem sic valent de reliquis brutis, quæ de homine, cum in essentialibus corpora brutorum & hominum æquè convenient, & non nisi accidentalibus proprietatibus saltem differant; proin & hæc microcosmi dici poterunt: ut taceam, hominem, quoad interiora viscera, comparari sui; sicut quoad exteriora simiæ; analogia autem non est identitas. Unde cum generalia saltem in analogia ista considerari queant, etiam eadem de bruto, sue, simia, lepore, &c. valebunt, quæ de homine.

2. Porro analogia hæc non æquè commodè institui potest: nam quando cor dicitur sol microcosmi, non putandum, illud esse fontem vitalem; sed potius, cum cor sit musculus, à spiritibus & à sanguine vigorem suum derivans, proin non cor, sed spiritus potius erunt sol microcosmi. Malè enim viscera planetis horumque sic putato influxui comparantur, quia viscera omne suum vitale robur non ex se, sed ex sanguine, habent.

Quoad II. An nempe transpiratio simpliciter fiat à calore? hoc est, quod nego cum Helmontio, quia, quæ simpliciter calore solvuntur, topium relinquunt; unde si transpiratio à solo calore procederet; necessariò caput mortuum remaneret, abscessuum generandorum sufficiens materia. Ergò potius dicendum: aërem transpirationi fiendæ unà cum calore & partium structura calcar addere, sine ullius capitis mortui remanentia.

Quoad III. Ponamus, hyemali tempore minorem transpirationem contingere, an itaque catarrhis occasio proclivior dabitur? Nego hoc. Quanquam enim minus tunc temporis transpiremus, ob corporis calorem vitalem tempore hyemali remissiore, & aërem inclementiorem, cutis poros claudentem, & lymphæ hanc ratione coacervetur; nonne per alias vias à natura ejicitur? nam ob id eodem tempore magis mingimus, in æstate minus: ac cum sudoris & urinæ eadem sit materia, hinc, modò hyeme urinæ miæus copiosior secundum naturam contingat, non orientur catarrhi. Ut itaque catarrhi hujus epidemici fons non ex collectione uberius lymphæ, sed potius ex aëre, derivandus sit. Taceo jam, si thesis illa firma esset, sequi hinc, tempore æstivo nos catarrhis non infestari, cujus tamen contrarium annus 1669. probavit, ubi mense Julio epidemicè plures iis corripiebantur, ob aëris externi alterationem: Imò sequeretur,

Tom. II. Pars 2.

singulis hyemalibus temporibus nos catarrhis esse obnoxios, adeoque necessitate naturæ, & lege à Creatore sic statuta, necessariò ingruente hyeme ægrotaremus: quod pariter contra experientiam est.

Causam proximam suprà allegavi, esse nempe spiritum impetum facientem, qui irritatus à quacunque causâ movet contenta quacunque in locis vicinis, pariter ac continentes partes; adeoque & lympham commovet; quæ tamen, prout variè ad locum quendam movetur, ita varia exinde pathemata exsurgunt; hinc mota ad cerebrum & meninges cephalalgiam infert, coagulata per os cribriforme ad nares defertur. Coryza rectè derivatur ex lymphâ acri, ad cerebrum, & hinc ad nares commota, in qua, an in statu naturali aliquid ex cerebro vel ejus sinubus defluat? dubito, argumentis magni Schneideri innixus; utut in statu præternaturali, quando nempe erosa sunt filamenta nervea, quæ penetrant ad cerebrum, ex locis cerebri foras aliquid amandari posse, non negaverim; in specie, cum sufficiant nobis aliæ viæ, partim à Stenone *Tr. de Musc. & Gland. & de Vasis Oris & Aurium* detectæ; partim à Schneidero demonstratæ, ad membranam pituitariam superiorem; quæ continuò stillat lympham paulò spissiore, & blandiorem, à qua humectantur istæ; quæ si præternaturaliter vellicentur, fit lymphæ acrioris excretio, unde Coryza. Præsupponit autem omnis coryza irritationem summitatis narium molestam, hinc lymphæ post irritationem mediantibus spiritibus uberius effunditur, ut quandoque continuò stillent nares. Par ratio est, ac quando sternutatorium quoddam intra nares trahimus, quo coryza facillè inducitur: Sic præscripsi aliquando solutionem vitrioli albi in aqua majoranæ pro ptarmico; Quid autem fiebat? caput ejusdem ægri æstare incipiebat, tendebatur, gravativo dolore corripiebatur, & primò tenuis lymphæ effluebat, & sic inducebatur perfecta coryza: Hinc denuò eandem solutionem alio in casu similiter periclitabar, & ecce! idem pathema incipiebat, hemicrania scilicet, cum intensâ incalescentia, stillante hinc lymphæ. Ex quo discere possumus, coryzas istas, quæ sub temporis mutatione obveniunt, oriri ex irritatione narium, occasione inspirati aëris tunc temporis inclementioris, per consensum membranas capitis afficientis. Unde dolor capitis tensivus per consensum membranæ narium cum cerebri spasmus affectarum; sicut gravativus à sanguine, in dictis locis stagnante & turgesciente, oritur.

An autem meninges cerebri vellicentur?

[Ff 2]

dubito

dubito ex eo, quia dolor externus pullatorius se offert ex convulsis capitis integumentis, & pericranio exterius; non secus ac odontalgia vexatis, per consensum periostii dentis & maxillæ cum temporali musculo, spasmo correpto, totum hemicranium & universa mala convellitur, in qua tamen emplastrum ex tacamahaca, cum balsamo Peruviano malaxato, convenit saltem, quod tensio hinc remittat, sicque levamen percipiatur.

Dicis: ergo ne omnis coryza est à causa externa? Resp. distinguendo, quia quidam semper habent coryzam. Vidi enim v. g. scorbuticam mulierem quotidianam coryzâ vexatam, & sic benè habet in capite, ubi verò remittit, de cephalalgia conqueritur, oriundâ ex lymphâ acriuscula, in talibus coryza loco fonticuli inservit, & salubris est. Quando ergo crebrius coryza occurrit, ita ut membrana relaxentur & flaccidæ evadant, & glandula ex uberiori effusione fiant spongiosæ, & quasi patulæ, tunc vel spontè, vel propter levem irritationem à causa externa, vel etiam propter lympham acrem, has partes ob robur inæquale, Helmontio ita vocatum, semper coryzam incidimus, in specie, quando partes læsæ excoariate sunt. Cæteroquin falsum est illud vulgare, quod coryza sit sana, *der Schnupfen sey gesund*; ratio est, quia materia excreta non præstitit in capite, sed sit demum in naribus ab irritatione.

Porro Tussis oriebatur à particulis lymphæ rigidis circa partes respirationis effusis; sed quæritur: an præcisè ex pulmonibus orta fuerit in hoc casu? Dubito ex eo, quia aliàs non rarò salia talia acra in iis hærent, sine superveniente tamen tussi: sic enim vomica pulmonum laborantes nonnunquam non tussunt, pure quantumvis in pulmonibus hærente. Ut taceam pulmones non adeò acutum, sed obtusum sensum habere; unde potius tussis ferina obveniens præsupponit partem aliquam sensilem magis, qualis est tam aspera arteria, quàm hujus caput, nec non diaphragma. Cæteroquin initio, dum lymphâ fuit effusa in laryngem, tussis sicca fuit, postmodum humida: Sicca erat, quia nihil ejici poterat; lymphâ enim in principio acris tenuisque vellicabat partes illas, sicut aliàs quoque ex accensi sulphuris particulis acidis tussis sicca excitatur: postmodum verò humida illa, tanquam ex cavo pectoris prodiens, audiebatur. Quo loco quæritur: unde mucus ille processerit? Sanè mucus hic in his ægris non fuit causa tussis illius, quâ remota cessasset hæc; sed potius productum morbosum, seque instar puris habet. Scilicet lymphâ acris vellicando asperam arteriam, hanc superficiem tenus excoariabat, inde in isto loco lymphâ copiosior fuit effusa, & simul copio-

sum nutrimentum ejusdem partis proximum spermaticum evacuabatur per poros partis læsæ, quod non assimilatum cum lymphâ copiosè effusa degenerabat in istum mucum, & destillavit in pulmones, qui in bronchiis coarctatus, tandem successivè per tussim eliminatus fuit. Sic spina infixâ etiam talem mucum ex tempore producit. Et hic mucus medicamento quoque locum simul habebat, quatenus oblinebat partes erosas; adeoque tertiâ demum aut quartâ die humida accedebat tussis: nisi præcessisset tussis sicca, non supervenisset humida; quando enim mox in principio tussis sicca opiata exhibebantur, subito cessabat tussis, quatenus irritationem impediunt.

Cur autem noctu magis affligit? Ægri orthopnoia, empyemate, aut ulcere & vomica pulmonum laborantes, ex decubitu corporis magis infestantur, & exacerbationem sentiunt. Verum in his affectibus catarrhalibus notum est, & tussim siccam tempore vespertino magis; sicut humidam continuo, tam interdiu, quam noctu, affligere. Ubi observandum, affectus catarrhales omnes, qui modernis à lymphâ vitiosa, Veteribus à sero dependere, statuuntur, ordinariò vesperti post quintam vel sextam horam exacerbari, ad mediam usque noctem durantes. Ac quidem hoc locum habet in omni febre catarrhali, itemque coryza, ut ex his affectibus laborantes, ordinariò circa vespertam pejus se habeant. Idem fatum patiuntur & experiuntur lue Venereâ infecti, similiter de doloribus, in specie nocturnis, conquerentes, in quorum lymphâ acidum quoque peccat. In hac autem periodicatione intricata, si conjecturæ locus est, arbitramur, eam fieri, quod vesperti nonnihil insensibilis transpiratio, interdiu magis libera existens, impediatur; hinc occasione particularum heterogenearum cum sanguine & lymphâ permixtarum, contingit major & sanguinis & lymphæ ad partes irritatas commotio, sicque magis exacerbantur, & deteriora fiunt hæc pathemata, quæ tamen, si sudores superveniunt, evanescent nonnihil, aut, si præveniatur sudoriferis, hujusmodi exacerbationes vespertinae ferè præcaventur.

Tandem febricula ex eodem catarrho derivatur: Nempe febris hæc catarrhalis est ex lymphâ acida commota, & cum sanguine effervescente; unde Rigor, quatenus partes membranosa intercutanea vellicantur.

P R O G N O S I S.

In Prognosi distinguendæ sunt Personæ, catarrhis laborantes, partes catarrhis correptæ, catarrhorum modus, ætates: pro quorum omnium diversitate aliarumque circumstantiarum ratione Prognosin maximè variat.

CURA

C U R A.

In causâ materiali evacuanda attendatur analogia spinæ digito infixæ, quæ dolor, rubor, inflammatio, &c. oriri solet; quæ omnia sunt productum morbosum: sic spina talis ex aëre inclementiori naribus infixæ dat coryzam; faucibus raucedinem, tussim; circa costas nothas dolorem, &c. Ad hæc materia, quæ rejicitur, se habet instar puris, occasione spinæ geniti, qui mucus non est causâ, sed productum morbosum: si consideretur saltem pulvisculus oculo illapsus, quantum inferat dolorem & tumorem, quantum inflammationem, quantum lachrymarum effusionem, &c. pulvisculus ille est causâ, reliqua pathemata sunt effectus. Observetur hoc in Praxi, & spina mox, quantum fieri potest, removeatur; Sic apparebit, falsum illud esse, quod dicitur, *der Fluß sey auf die Lunge gefallen*; aut si removeri spina nequeat, opiata in tempore administrentur in tali affectu catarrhoso, quò sic saltem dolores sistantur, tumor & inflammatio, & reliqua pathemata cessent, hinc tandem spina evellatur.

In Cura ergò hujus affectus hæ Indicationes sunt:

1. Ratione causarum efficientium in principio impetus spirituum, moventium partes contentas & continentes, sistendus, & irritationis sensus nimius tollendus: quod fit per Opiata, vel horum succedaneum, sulphur vitriolici anodynum, &c. quæ in principio tussis sicca præsentaneè juvant, minus verò excoaratione jam factâ.

2. Ratione causæ materialis acrimonia lymphæ per salia volatilia, speciatim oleosa seu balsamica, est temperanda, & hinc ejusdem vel naturaliter constitutæ, vel præternaturaliter corruptæ, abundantia removenda, per sudorifera & diuretica.

3. In incremento & progressu morbi, siordes quædam in privatis partium culinis, i.e. in naribus ex coryza, pulmonibus è tussi, &c. ceu producta morbosa restitent, eæ appropriatis incidentibus & solventibus removendæ, & si quæ superest partium læsio, per appropriata restituenda.

Præservativè autem cum à coryza affectus noster catarrhalis inciperet, suasi, ut balsamo apoplectico nares, manè in specie ante egressum è domo, & vesperti ante decubitum, illinirent: hujus enim balsamica vis in sale volatili oleoso oleorum consistens, temperat & corrigit aërem, imò si alteratio quædam naribus jam inducta fuerit, balsamus dictus progressum sistit, & læsionem jam inductam curat.

Cum coryza aut post coryzam semper presso pede insequeretur tussis, quam præca-

vebam per opiata, assumendo circa introitum lecti laudani opiatum Langelotti debitam dosin; quò facto, non rediit tussis, nec aliud amplius afflixit, nisi quod sudor largus insequeretur, qui bonus est.

Curativè, ubi de coryza & tussi inciperent ægri conqueri, mox tale sudoriferum propinabam:

℞. *▽ Serpilli* ʒj.

Liqu. C. C. succin. ʒj.

(vel loco hujus *~ C. C. essent.* ʒss.)

Laud. opiat. ferm. gr. ij.

(vel loco hujus *Ess. opii ritè par.* ʒss.)

Syr. Papav. errat. ʒij. vel ʒiij.

M. pro una vice.

Hanc Misturam capiendam jussi vesperti cœna antegressâ vel parcellima, vel nulla, vel etiam ante eandem, & pro necessitate bis; hinc mox tussis evanuit, correctâ sic lymphæ beneficio salium volatilium, quo largiter sudarunt, & placatâ irritatione per laudanum opiatum fermentatum ulterior progressus præcavebatur.

Quibus verò hæc mixtura nauseosa fuit, iis loco hujus præscripsi:

℞. *Liqu. C. C. succin.* ʒij.

Ess. opii ʒss. Misc.

Dabantur quotidie bis de hac mixtura in principio hujus affectus & ingruentis febriculæ catarrhalis gutt. 30. vel 40. sic evanuit febris, superveniente sudore nocturno.

Deficiente verò liquore cornu cervi succinato, exhibui:

℞. *~ C. C. cum Θe volat. acuat.* ʒss.

Θis vol. succini gr. xij. Misc.

Dabantur vel in vehiculo, vel miscebantur cum reliquis in forma potus, pro dosi.

Volatilia enim in affectibus lymphaticis optima sunt, quia penetrant, & immediatè causam peccantem attingunt.

Ubi verò jam fluxerat lymphæ à naribus, & morbo jam aucto spissior mucus easdem obsederat, tunc fuit optimum oleum destillatum anisi naribus illitum, quod equidem mordicat, egregiâ tamen cum euphorîâ mucum resolvit, nares obsidentem, ut facile excerni hinc potuerit, progressumque coryzæ inhibuit. Loco cujus etiam crebrior salium & spirituum volatilium urinosorum odoratus. v. g. spiritus salis ammoniaci simplicis, salis ammoniaci anisati, salis volatilis urinæ, aut cornu cervi, tempore præprijis vespertino reperitus, mucum resolvendo à coryza liberavit.

Hiscæ non sufficientibus, ultimum præsidium extitit pulvis sternutatorius Helmontii, ex ana pulveris radicis hellebori nigri & sacchari, cum aliquot gutt. olei destillari caryophyllorum additis; vel alius, naribus injiciendus.

[Ff 3]

Si au-

Si autem sub coryza dolor capitis, præsertim tensivus, invalesceret, optimum fuit olei destillati succini aliquot guttulæ vertici illitæ; vel si id nimis acre visum fuerit, ejus loco balsamus Peruvianus illitus, satis fecit.

Ratione tussis porrò duo tempora consideranda erant:

1. quando ea adhuc sicca erat.
2. quando humida evadebat.

Ubi ratione prioris, seu in principio & incremento morbi, talia requirebantur, quæ lymphæ acrimoniam temperarent, &, ut vocant vulgò, materiam tenuem incrassarent, fauciumque & asperæ arteriæ irritationem dolorosam sisterent, & materiam incrassare poterant. In progressu verò & statu, ubi nempe materia expectorari incipiebat, incidentia & viscidum mucum attenuantia, illiusque per pectus expectorationem promotiva, in usum vocabantur. Sic in principio tussis sicca opiata & his affinia erant optata, c. g.

Rx. ∇ *scabios.* \mathfrak{z} ij.

asthmat. \mathfrak{z} vj.

Syr. Papav. albi, vel *diacod. Mont.* \mathfrak{z} j. Misc.

Capiebatur hæc Mixtura cochleatim, imprimis vesperi; cui interdum, si acrioris lymphæ ratio id suadebat, simul aliquid de spiritu salis ammoniaci anisato addebatur, v. g.

Rx. ∇ *scabios.* \mathfrak{z} ij.

asthmat. \mathfrak{z} vj.

$\sim \Theta$ **ci anis.* \mathfrak{z} j.

Syr. violar.

papav. albi aa. \mathfrak{z} ß. ad \mathfrak{z} vj. Misc.

Capiebatur cochleatim.

Hæc una cum laudano opiato aut essentia opii in principio tussis mista & adhibita, eandem præcavebant, quò minus tussis humida fieri posset, si præsertim nocturno tempore vel diurno sudor blandus expectabatur desuper.

Quodsi verò Medicus demum in incremento morbi accederet, aut hic propter medicamenta irrita ad statum properaret, mucusque jam obsideret loca præcordiorum, tunc incidentia & expectorantia erant proficua, v. g.

Rx. ∇ *hyssopi* \mathfrak{z} ij.

asthmat. \mathfrak{z} ß.

$\sim \oplus$ vel qui melior, \sim *asthmat. D. Mich.* \mathfrak{z} ij.

Syr. Nicot. \mathfrak{z} ß. ad \mathfrak{z} vj. M.

His interdum \mathfrak{z} j. vel \mathfrak{z} ij. syrupi emetici antimonialis Angeli Salæ addebantur, cujus dosis ordinaria aliàs \mathfrak{z} ß; sic hujus medio magis præcordia, fauces, stomachus & loca vicina stimulabantur, & expectoratio eò melius succedebat.

Loco hujus etiam misturæ raphani orbicularis minutim triti succus expressus, temperatus cum paucis syrupo violarum, vel saccharo candi, & paulatim deglutitus, in mucosæ præcordia obsidente, incidendo egregiè proficuus erat.

Quodsi autem sub tussi sicca vel humida fauces, pharynx & larynx asperiores, & quasi excoarctatæ factæ fuerint, blandi Linctus, qui lubricas eas faciant, & tantillum excoarctationem temperent, usurpati fuerunt; v. g. Looh vel syrupus passularum cum syrupo diacodii Montani, & paucis syrupo vel succo violarum mistus, qui cum baculo liquiritiæ lubricando fauces adhibebatur.

Asthma verò convulsivum observavi eadem ratione ac ipsam tussim, esse curandum: scilicet, dum ægri in principio querebantur, sibi præcordia à mucosæ obsessa esse, incidentia & expectorantia nil profuere, sed potius blanda opiata, & acrimoniam lymphæ irritantem temperantia; sic enim irritatione sublata asthma evanuit, & expectoratio cum tussi postmodum post asthma supervenit.

Quod si verò suspicio fuerit ex tussi ferina materiæ rejectione successivè aliquam læsionem in partibus fuisse inductam, tunc pro auferenda noxa illata in declinatione morbi præscripsi balsamum sulphuris therebinthinatum, vel anisatum, vel utriusque simul \mathfrak{z} j, & de hoc quotidie manè in vehiculo calido gutt. x. vel xij. in haustu jusculi vel cerevisiæ calidæ recipiendas jussi; sic enim ejusdem balsamicæ vi læsio partium curata est.

Febrem verò catarrhalem sustuli per salia volatilia oleosa, imperando sudorem, & in progressu opium omittendo.

Quoad Pleuritidem notham, in doloris puncto, propter consensum pulmonum cum pleura, cum vera certante, sicut etiam maximè vexavit ægros, in hac ratione causæ materialis peccantis, Θ ina volatilia, ratione doloris verò opiata, adhibebantur, additis specificis, in pleuritide vera aliàs usitatis. Adeoque profuerunt spiritus salis ammoniaci anisatus, liquor cornu cervi succinatus, tinctura tartari cum spiritu salis ammoniaci, dens apri, maxilla lucii piscis, sal volatile eorundem & similia. Unde ordinabatur talis mixtura:

Rx. ∇ *Card. bened.*

fl. papav. errat. ana \mathfrak{z} ß.

$\sim \Theta$ **ci anis.* \mathfrak{z} ß.

Laud. opiat. ritè par. gr. iij.

Syr. Cheresfol. \mathfrak{z} ij. \mathfrak{z} ß. ad \mathfrak{z} vj. M.

Capiebatur cochleatim.

Vel in alio ægro, qui vesperi habebat magnum frigus, & post magnum & insolitum æstum, cum magno pulsu & intensissima respirationis angustia; item pungitivum maximum

ximum circa costas nothas dolorem, ordinavi sequens cum euphoria:

℞. ▽ *fl. sambuc.*
scabios. aa. ʒiʒ.
Lapill. ʒr. præp.
Dent. apri præp.
ʒii diaphor. ana. ʒi.
Θ is vol. Maxill. lucii pisc. gr. xij.
Laud. opiat ferm gr. iij.
Syr. card. bened. ʒʒ. M.

Mixturam hanc probè agitatam aliquoties, bis vel ter, ad duo cochlearia, expectando sudorem, hauriendam præcepi, unde sic altero manè magnam partem levatus est æger, & per expectorantia reliquum facilè cessavit.

Cæterum urinæ in hac pleuritide notha erant crassæ, & turbidæ, cum copioso sedimento lateritio, quod separatum & præcipitatum erat sub effervescencia ex sanguine ab acido lymphæ peccantis. Et pro hoc scopo, naturæ scilicet juvamen præstando, in statu & declinatione, præmisso sudorifero, diuretica adhibebantur, & inter ea prævalebat maximè tinctura tartari propter alcali fixum, v. g.

℞. ▽ *Menthe*
serpilli ana ʒiʒ.
R ʒi ʒi. ad ʒij.
*~ Θ *ci ʒʒ. ad ʒi.*
Syr. hed. terr. ʒvj.
Misc.

Propinabatur successivè.

Aut capiebatur hujus mixturæ loco simpliciter tinctura tartari, cum dimidia vel tertia parte spiritus salis ammoniaci mista, dosi guttar. 40.

Insuper cum his internis simul pro doloribus mitigandis applicabantur Externa. Ubi tamen litus & unguenta oleosa, itemque emplastra mucilaginosa aut unctuosa nocebant, aut saltem nihil juvabant, quia fortè pororum obstructionem procurabant; quin potius fortis calidi sicci omnem spei paginam supplebant, adeoque ægri ad fornacem calidum sedentes, sensile levamen percipiebant, ubi præsertim blanda frictio cum linteis calidis accederet. Quod si verò dolor anteriora magis affligeret, sacculi tunc avenâ impleti probè calefacti, loco dolenti, permutando subinde eosdem, imponebantur, ubi quidem avena nil salutis promittere potuit, nisi quod calorem diu fovere apta sit. Tandem quoque egregium fuit illud Emplastrum.

℞. Θ vol. ☐æ, vel Θ is vol. Θ *ci ʒiij.
Terebinth. ʒʒ. vel ʒi.

Hæc mista in mortario marmoreo redigantur in consistentiam spissiore, quibus, ut consistentiam emplastri acquirat, addi potest nonnihil emplastri de meliloto, hincque indu-

ci super alutam, & absque syndone applicari.

Est profectò maximè commendabile, de quo sapienti satis: loco tamen salis volatilis urinæ, etiam spiritus salis ammoniaci cum terebinthina subigi poterit.

Restat unus adhuc scrupulus eximendus, circa opii & opiatorum usum, hoc loco sæpius allegatum: scilicet posset horum usus esse suspectus, quia impedit naturæ motum, in lymphæ uberius & vitiosæ excretionem consistentem; nam uti illa spirituum, sic quoque omnes humorum motus sistunt: (2) quia periculum est, ne sistat expectorationem per os, unde observavi in quadam muliere, cui, cum inciperet expectorare, liquorem cornu cervi cum essentia opii præscripseram, illam non expectorasse, sed conquestam fuisse ex hujus usu: *es sey ihr so dampfsicht um die Brust / obgleich das Flußwerffen zwar nicht so stark wäre.* Adeò scilicet opium nil curat, sed saltem symptomata palliat. Interim quatenus atrociora symptomata præcavet, & talia præsertim, quæ ex doloribus continuò urgentibus imminet, & interea, dum ista opprimit, commodiorem agendi occasionem subministrat Medico; in his casibus justo tempore usurpari poterit. Aliàs dixi, maturè in principio & incremento morbi ejus usum locum habere, quando nempe tussis sicca aut febri-cula vesperis affligit; prævenitur enim sic abundantia nimia excernendorum. His verò in statu præsentibus opiata non sunt in usum vocanda, ubi scilicet circa præcordia collecta jam materia est mucosa. Et utut opium omnes excretiones sistat, sudorem tamen opium non impedit, sed magis promovet, adeoque rectè Theriacæ basis à Walæo audit, quippe cujus vis sudorifera ab opio derivanda. Nunquam tamen opiata solum, sed semper cum appropriatis, & imprimis causæ materiali resistentibus, commixta adhibeantur, v. g. salibus volatilibus oleosis maritentur.

In affectibus lymphæ salia volatilia meliora sunt, quàm salia fixa & his cognata terrea; illa enim magis penetrando, & succis corporis nostri se immiscendo, ultra primas vias positivè lympham corrigunt, fixa contra privativè hoc agunt.

De Myrrha autem observetur, eam in affectibus lymphæ corrigendis egregiam esse; unde etiam in variolis & morbillis, in quibus etiam lymphæ peccat, nec non in febribus purpuratis, est egregia, & nunquam negligenda; vel etiam essentia myrrhæ cum tinctura tartari vel spiritu vini tartarifato parata est optima in praxi, quæ etiam in scorbutto convenit.

Purgantia nil valent in affectibus lymphæ;

phæ; utut enim ejus aliquid per pancreas & vicina loca evacuetur, quia tamen movent & turbant universam massam sanguineam, & bilis excretionem stimulant, ideò illa in hoc casu vitentur. Vera autem & optima Hydragoga, seu lympham expurgantia, sunt sudorifera & diuretica, quæ omnem paginam faciunt: quorum hæc omnium optimè conveniunt, quia sine virium destructione operantur, quod in sudoriferis non æquè fit; utpote quæ nonnihil imbecilles ægros reddunt. Sal volatile succini acidulum egregium est diureticum & lympham corrigens in declinatione morbi, ubi urinæ lateritiæ apparent; pro quibus corrigendis etiam proficuum esse observavi arcanum duplicatum Mynsichti, quotidie bis ad ℥j. assumptum. Alioquin, ubi lymphæ acida peccat, non propinanda erunt diuretica acida, sed potius alcalina; vel oleosa volatilia, olea destillata diuretica, ut terebinthinæ vel juniperi, quæ tamen sunt acrida.

Porro si affectus ejusmodi catarrhalis infantes corripere; iisdem spiritus salis ammoniaci anisatus solus, repetitis vicibus usurpatus, sufficere potest; addendo vespere pro tussi sicca nocturna gr. j. vel ij. Theriacæ, quæ aliàs nec in ventris torminibus negligenda, uti aliàs quoque in adultis loco hujus laudani opiatigr. j. vel ij. locum habent, ut supra dictum.

Senibus verò eodem affectu correptis illinatur vertex oleo destillato succini, ob genus nervosum debilius, ne atrociora mala superveniant: vel applicetur vertici emplastrum pro bregmate cum balsamo Peruviano malaxatum, & irroratum cum paucis olei destillati succini; opiata enim senibus turò non conferunt, sed saltem extractum theriacale in parva dosi iisdem concedi potest; contra salia volatilia cum spirituosis, oleosis mista, ut spiritus liliorum convallium, optimè conveniunt; hinc sudorifera moderata & diuretica commendata fuerunt.

Gravidis tandem in tussi ejusmodi ob metum abortus opiata nocentissima sunt, nisi cautissimè propinentur, & potius reperitis vicibus; hæc enim aut interimunt foetum, aut disponunt ad abortum; unde loco illorum vel syrupus papaveris, vel diacodion Montani iisdem præscribatur: volatilia verò salia mitiora & oleosa seu temperata nec nimis acrida cum blando sudore erunt proficua; hæc enim conferunt & foetui & matri in specie.

C A S U S XXXI.

FEBRIS CONTINUA LENTA.

Virgo annorum octodecim, & cui diffi-

culter fluere solent menses, negotiis domesticis adjecta, nec adeò ordinatâ utens dietâ, conqueritur de lassitudine artuum spontaneâ, tensivâ, quasi contundente, cum cephalalgia intensâ, & siti pedetentim auctâ. His, aliquot diebus ita persistentibus, corripitur aliquando à meridie horrore mediocri per aliquot horas, quem insequitur nox gravis cum æstu mediocriter intenso, cephalalgia gravissima, angustis præcordiorum gravativis, sine somno, &c. manè melius se habet, cephalalgia tolerabilior, calor præternaturalis quidem, sed & moderatus, ut & reliqua symptomata: sed circa vespere, omnia sensim exacerbantur, nox insequens, iisdem symptomatis, ac antecedens gravis contingit, sequentitamen manè omnia denuò remissiora & mediocria, continuo tamen eadem urgent symptomata, quæ saltem vespertino & nocturno tempore exacerbantur. Medicus à meridie vocatus, præter hæcenus enumerata, ægram offendit quidem nonnihil debilem, de cephalalgia & lassitudine artuum præsertim conquerentem, calor ab eo deprehenditur mediocris, naturali tamen longè intensior, isque continuus, non adeò acris vel mordax, qui vespere saltem intenditur, & per noctis medium gravis urit: pulsus celer, frequens, magnitudine & vehementia moderatus; appetitus nullus, sitis intensa, potum consuetum cerevisiæ horret, aquam appetit: urina turbida, crassa, intensius nonnihil tinctoria, fauces & lingua salivâ viscidâ infestata.

R E S O L U T I O.

Affectus est febris, eaque continua, generaliter & specialiter sic dicta, ardens quidem, sed lenta, & non adeò acuta; quod symptomata mediocriter urgentia indicant. Item est solitaria, & tandem benigna, quod itidem symptomata mediocritatem servet. Quamvis autem plura adsint illorum, non tamen ea atrociora adeò, sed conditione talia, qualia intermittentibus & continuis febribus aliàs familiaria sunt; cum contra pauca etiam interdum symptomata malignissimam febrem indicent: v. g. sufficiunt pro febre maligna, si vires mox in principio morbi sine ulla manifesta causâ deficient, itemque si mox omnis appetitus prosteratur, & sitis clamorosa cum linguæ & faucium squalore urgeat. Hæc pauca sufficiunt pro febre maligna, quibus si accedat pulsus celer, frequens & parvus, eò certiores simus de malignitatis præsentia.

Observentur autem quadam de febribus continuis differentia. Nempe febres continuae

tinuæ sunt vel primariæ vel secundariæ: Primariæ, quæ per se morbum constituunt, & ægrum primariò ægrotum reddunt; secundariæ, quæ occasione aliorum affectuum tandem superveniunt, quæ propterea dicuntur symptomatice, v. g. quæ superveniunt graviter vulneratis, it. ulceribus partium gravioribus, v. g. phthisi &c. 2. Febres continuæ primariæ sunt vel acutæ vel minus acutæ, adeoque plus minus lentæ: Acutæ, quæ cum gravioribus symptomatis brevi motum absolvunt, & vel ad vitam vel mortem disponunt; minus acutæ, quæ cum minoribus symptomatis tardius moventur in typo, & ad finem perveniunt. Utræque hæ sunt vel continentes vel continuæ: Continentes, quæ eodem tenore usque ad finem perdurant, quæ sunt raræ: continuæ autem quæ subinde exasperantur, adeoque per Paroxysmos vagos quandoque affligunt; ad quas pertinent continuæ tertianæ, item hæcticæ & lymphaticæ. 3. Febres acutæ sunt vel solitariae vel comitatæ: Illæ, quæ solæ ægros affligunt; hæ, quæ secum alium affectum gravem conjunctum habent, ut febres, quæ in pleuritide, angina, erysipelate, &c. affligunt. 4. Utræque hæ acutæ sunt vel benignæ, vel malignæ: sic enim præter febres benignas & malignas variæ notæ; dantur etiam pleuritides, angina, &c. benignæ & malignæ. Tò malignum est nomen insinuans statum morbi, ratione cujus vel vitam vel mortem infert.

Nostra ergò febris est (1) primaria, (2) continua, (3) non adeò acuta, quod symptomata multa quidem, sed impetu mediocritæ testantur, (4) est solitaria (5) benigna, quatenus symptomata adhuc mediocritatem servant, (6) lenta. Hinc febris ægræ nostræ ex earum est genere, quæ juxta Sylvium in *Prax. l. 1.* dicuntur lymphaticæ, ex vitio lymphæ, sanguinis fermentativum motum turbantis, natæ; quales sæpè occurrunt in Praxi; & sanè meretur considerationem ratione Præcos distinctionis allegati Sylvii in febres biliosas & lymphaticas:

Febres hæ Lymphaticæ triplici potissimum modo affligunt:

1. Aut enim eadem superveniunt subinde curatis febribus intermittentibus, si nempe convalescentes ægri sunt admodum voraces, adeoque hinc lymphæ glutinosa acidæque evadit; aut
2. quoque ejusmodi lymphaticæ per se affligere observantur sine alio morbo præcedente, & primarium morbum constituunt, quale quidem etiam in nostra ægra locum habet; aut

3. iniis quoque observantur, qui lue Venereæ laborant. In his enim vel morbo ingravescente, vel etiam si nimis confertim utantur decoctis lignorum sudoriferis, subinde fe-

bres tales lymphaticæ excitantur. Jam verò lue Venereæ causâ proxima consistit in acido viscido. Conf. Sylvius *lib. 4. Præcos de Lue Venerea*. Lympham autem in specie in lue Venerea ab isto acido viscido specifici saporis esse inquinatam, monstrat, quod in specie loca glandulosa, speciatim circa axillas, collum & fauces, afficiantur ab aciditate lymphæ viscida, unde etiam pathemata hæc postmodum per salvationem, ubi lymphæ vitia sub forma lymphæ viscidæ ejiciuntur, curantur.

Adeoque causâ proxima nostræ febris est lymphæ acida, vitio fermenti stomachici, præsertim ex cruditate acida, enata, cujus corruptelæ occasione massa sanguinea simul afficitur, & hujus motus fermentativus turbatur.

Remota verò causâ est læsio diætæ.

Et quidem viscidum acidum subesse, patet ex eo, quod ægra patitur simul mensium difficultatem, & horum fluxum imminutum: quod signum est, vitium hoc non esse præcisè in viis, per quas iidem evacuantur, sed in ipso sanguine plus minus viscido, & ad istam turgescientiam, mediante qua fit menstruatio, inepto, nempe ob acidum viscidum, eandem impediens.

Circa lassitudinem autem spontaneam, affligentem ægram nostram, duo sunt consideranda: nempe quod præter lassitudinem hanc privativam, quæ ex defectu & inordinato spirituum animalium motu dependet, in nostra ægra simul quædam alteratio positiva adsit, & tensiva quædam contundensque quasi lassitudo. Dicunt enim ejusmodi ægri: *Es sey ihnen/ als wenn sie geprügelt wären worden; hingegen sagen sie: Es sey alles so schwehr an ihnen/ es verdrieße sie einen Arm aufzuheben.* Ubi sanè causam positivam latere indicatur, adeoque lympham in nostra ægra acore occulto plus minus viscido præditam esse, quæ talem alterationem in artubus infert, qualis lassitudo contundens quoque & lancinans in febribus catarrhalibus obvia est.

Quoad porrò cephalalgiam; hæc non per essentiam, sed per consensum primarum viarum affligit: nam dolor ille capitis non erat pulsatorius solum, sed simul admodum gravativus & tensivus, qui non præcisè est ex sanguine derivandus, utpote qui ut plurimum pulsatorius est, sed ex stomacho simpliciter per consensum ortus: id quod etiam Praxis ostendebat; propinato enim vomitorio, adeoque remoto sic fomite, penitus cessabat.

Patiens etiam conquerebatur de saliva viscida & glutinositate faucium, plus minus salsa, vellicante, in quibus ordinariò est sitis, & talis saliva febribus lymphaticis juncta est; ubi tamen non crustâ quâdam fauces obducuntur, sed saltem sputatio altera alteram sequitur.

[Gg]

Angu-

CASUS XXXIII.

FEBRIS LENTA SYMPTOMATICA.

Vir consilientis ætatis ex febre acuta & gravi, cum sine notabili materie morbosæ evacuatione convalesceret, nullas vero diætæ regulas observaret, aliquot interjectis mensibus conqueri cepit de sensu doloris gravantis, & nonnihil lancinantis, in profundo abdominis circa umbilicalem præterpropter regionem, quem tamen negligit. Supervenit sensim sitis intensior, calor quidam præternaturalis, isque continuus, sed qui incertis vicibus subinde nonnihil exasperatur, appetitus dejicitur, corpus sensim emaciatur, sitis intenditur, abdomen paulatim intumescere videtur, liquida & varia per alvum dejicit. Hæc per aliquot septimanas consueta munia obiens, cum pertulisset, Medicum vocat; qui cum enarratis calorem percipit lentum, cum pulsu celeri, frequenti, parvo, duro, vehementi; tangenti abdomen circa loca dolorosa se offerunt vestigia tumoris mediocris, ægro tactum fortiolem, ob auctum doloris sensum, fugiente; urina intensius tincta, clara, fulgida; Medicus cum per aliquot dies tractasset ægrum, exasperatur dolor, intenditur æstus, æger inquietus & anxius evadit; supervenit tandem gravis horror totius corporis, qui æstu consueto permutatur, quem post tres horas excipit intensus rigor, totum corpus quatiens, per integram ferè horam, quo evanescente, æstus intensus supervenit, sensim ad solitum calorem lentum rediens. Accedunt his excreta tetra per alvum fætida, varicolora & nonnihil cruenta; urinae autem emittuntur turbida, crasse, post horulae quietem clarescentes, & copiosum sedimentum, crassum, album, seponentes, quod ad levem vitri agitationem subito dissiliit, & hinc inde vago motu urinam imprægnat, eamque lacteam reddit. Sapor teter percipitur in ore, aliquot horis ab omni pastu intenditur calor, in vola manus præsertim perceptibilis.

RESOLUTIO.

Morbus est ex genere febrium lentarum, & tandem hecticarum, earumque symptomaticarum abscessui in viscere quodam interno latenti supervenientium. Nempe in historia morbi duo tempora distincta observantur:

1. Tumoris in abscessum abeuntis, seu dum successivè suppuratur, & conjunctam habet febrim lentam;

2. Abscessus jam facti suppurati, & simul comitem trahit propriè dictam febrim hecticam.

Oritur ergò hicce morbus ab abscessu in mesenterio collecto, hinc febris lenta, post hectica. Ubi in antecessum monendum, quæ fiat, quod tumor hic, cum ceu suppurandus necessariò inflammationem comitem adsciscat (nam etiam coagulatum lac nonnisi inflammatione superveniente suppuratur,) non acutam accendat febrim? Responsio est facilis; quia nempe tumor ac inflammatio hoc in casu non hæret in parte adeò sensili, nec adeò copiosis vasis sanguiferis minoribus instructa; unde sine adjuncta febre acuta suppuratio absolvitur; qualem tamen pleura inflammata, ad suppurationem abiens, semper conjunctam habet: mesenterium enim minus sensile est propter pinguedinem, & minus instructum est vasis capillaribus; & utut ramos majores vasorum obtineat, illi tamen in intestinis demum in vasa capillaria abeunt. Cæterum materia tumoris non dependet à fermento febrili, sed à succis sub cursu febris acutæ enatis: unde in abscessibus his & supervenientibus febribus semper ad conditionem partis simul respiciendum: nempe sicut in intermittentiis, ita etiam in omni febre benigna, & hinc in declinatione malignæ, ordinariè materie coctio supervenit, quæ separata & præcipitata, quia à fermento febrili prius vitata excernenda est, per quasunque fieri potest vias; unde & succi hi, sub fermentatione febrili separati & præcipitati, materiam constituunt tumoris, aliàs ex corpore eliminandam. Materia autem hæc rarò præexistit in ægris ante febres, sed subinde fit sub cursu febrium, quatenus fermenta peregrina massam sanguineam reliquosque succos alterant & corrumpunt, quæ præcipitata materiam concoctam constituunt. Monstrat hoc natura sub motibus criticis, quæ excernit materiam, sed non nisi coctam; si tamen secretio & excretio hujus materie non fiat, sed intra corpus eadem cum reliquis succis confusa hæreat, tunc recidivam parit, vel eadem materia retenta, & tandem in loco quodam corporis interno transcolata affigitur, ubi hostili sua præsentia, ceu spina quædam præsens infixæ, doloris, tumoris, inflammationis & suppurationis causa est: quale quid & nostro ægro quoque contigit.

Quæritur autem: quâ ratione distinguenda sunt pus, genitura, & succus chylosus crudus, pituitæ nomine aliàs veniens, in urina? Vid. Henricus ab Heer *Obs. 10. lib. 1.* scilicet in gonorrhœæ, tam benignæ quàm virulentæ, principio, genitura urinæ supernatat instar cremoris alicujus, nisi magnam

[Gg 3] virulen-

virulentiam nata sit; contra pus & pituita fundum occupant: pus ad levem vitri motum mox dissilit, & per totam urinam inordinatè vagatur, eandemque imprægnando lactescentem reddit, quiescente verò lotio subsidet; sicut tandem pituita motu spirali cum urina circumgyratur.

Parsigitur, in qua fomes morbosus latitat; scilicet Pars affecta ægri nostri, ratione abscessus & tumoris est mesenterium; ratione verò febris lentæ adjunctæ massa sanguinea & spirituum exercitus primariò consideranda veniunt.

Quoad Causas, tam proximas quam remotas: præsupponendum, quod in omni morbo spiritus ceu partes primò viventes, adeoque etiam primò ægotantes, considerandi sint; quia, sicuti spina cadaveri infixæ, ob illorum absentiam nec dolorem, nec inflammationem, nec apostema parit; pari ratione spina mesenterio infixæ præsupponit spirituum motum & impetum. Ergò hi erunt causa proxima efficiens; sicut materialis seu occasionalis alia est proxima, alia remota.

Causa proxima materialis, movens spiritus ad hos imperus, sunt fermenta purulenta salinæ naturæ. Salinæ nempe heterogeneæ factæ particulæ (cum omne pus sit salsum,) massæ sanguineæ motum fermentativum æqualem turbando, eamque impuram agitando, febrem talem lentam & postmodum hæticam, induxerunt. Ubi tamen fermenta illa sunt consideranda vel in fieri, vel in facto esse: nam in illo statu, dum abscessus ad suppurationem pergit, prædominatur adhuc acidum, adeoque fermenta sunt naturæ salino-acidæ; ast ubi jam factum est pus ex alcali & acido in subiecto pingui paulò viscido, emergit falsum, unde in facto esse fermenta erunt falsa, sed magis viscida; unde febrem non acutam, sed magis lentam, inferunt.

Causa verò remota sunt partim fermenta morbosæ (ceu producta morbosæ, à fermento febrili sub cursu acutæ febris prioris relicta:) partim cruditates in primis viis, tam ex fermenti digestivi minori activitate, quam ex læsa diætâ, in agro à morbo acuto adhuc debili, genitæ, magis magisque foventes febrem, naturalem motum sanguinis & spirituum sufflaminando; unde & cruda & viscida excrementa collecta, & motus naturæ, recrementa febrilia restantia eliminare intendentis, turbatus fuit. Nempe nil magis reconvalescentes post morbos acutos ad chronicos disponit, quam læsa diætâ, speciatim excessu si peccent.

Hinc enim ratio quoque petenda, qui fiat, quod ab acutis morbis reconvalescen-

tes subinde tam diu debiles sint? imò non raro chronicos morbos, v.g. cachexiam, hydropem, febres intermittentes, tumores pedum œdematosos, &c. incurrant? Resp. Nimirum quadruplex causa subest: Vel enim

(1) fæculentiæ morbosæ non sufficienter motu naturæ spontaneo, vel medicamentorum ope, evacuantur; unde reliquæ quædam successivè sub cursu morbi acuti ex massa sanguinea degeneres factæ, in corpore adhuc resistunt, quæ puritatem contentorum postmodum turbant, & interdum debilitatem, interdum morbos chronicos, inducunt.

(2) Observandum, quod alteratio quædam insignior in morbis acutis inducatur, vel succo cuidam corporis nostri primariò imprimatur, vel tandem labes quædam visceri cuidam profundius impressa, ejusdem functionem lædens, affricata est. Quoad alterationem in succis: ingens dyscrasia oritur, unde ægri vel chronicis morbis obnoxii, vel debiles fiunt. Quoad labem; facile fit, ut, si non ulcera, saltem tumores & oppilationes in visceribus fiant, ratione quarum morbis chronicis obnoxii sunt: Hinc post pleuritidem v. g. aut peripneumoniam sæpe ulcus pulmonum & phthisis sequitur; ex vitio verò felli inducto ad hydropem, icterum, &c. disponit.

(3) Diætâ uberior & voracitas post convalescentiam: nil enim magis nocet, quam uberior diætâ, quia fermentum enervatum est sub cursu morbi.

(4) perversus quorundam medicamentorum in acutis usus disponit reconvalescentes ad chronicos morbos: quorum prima classis est abusus terreorum & fixorum antimonialium, partium animalium durarum calcinatarum, coralliatorum, &c. quæ copiosius aut crebrius sub cursu morbi ægris propinata tardissimè eos reconvalescere faciunt; magnam enim vim fermento stomachi digestivo inferunt, illud obtundendo.

Hoc imprimis intelligendum est de magisteriis largiter propinatis, quia sunt calces mortuæ & saltem in stomacho hærentes incrustant cum fermentumque extinguunt: Altera remediorum classis est abusus acidorum, & imprimis vitriolaceorum, quæ ordinariò solent destruere & obtundere sal volatile massæ sanguineæ & bilis, quo facto, massa sanguinea in suo motu fermentativo iners redditur, nec bilis secretioni chyli à facib⁹ sufficit, unde ægri difficillimè reconvalescunt. Hæc ergò medicos commonefaciunt, ne abutantur duplici horum remediorum in acutis genere, præsertim cum & eadem fixa antimonialia in intermittentibus copiosius usurpata convalescentes interdum diu debiles relinquant, imò hi

pedes

ad horam septimam dici sequentis usque, calor tamen non adeo mordax affligebat, interrim erat somnolentus, & rejiciebat per os copiosa viscida. Hunc scilicet ægrum, præmissis repetito bis vomitu, tandem usu salis ammoniaci restitui, quod admodum convenit in talibus febribus, subinde admiscui antihæcticum Poterii, e.g.

Rx. *Θ*ci* ℥j. ad gr. xxvj.

Antihæct. Poter. gr. xij. ad xv.

M. pro 2. dosibus.

Opiata in ejusmodi febribus lymphaticis locum non inveniunt, imò magis nocent, quam profunt, calq; magis diurnas reddunt.

CASUS XXXII.

*FEBRIS CONTINUA LYM-
PHATICA.*

*M*ulier sana, sed cui difficulter fluent menses, negotiis domesticis occupata, neglectusque dietam observans, corripitur Tertianâ intermittente legitimâ, quâ curata, brevi post, antequam menses experitur fluxum, gravida redditur. Graviditatis tempore utcumque se habet, crebrius tamen, præsertim sub fine gestationis, percipit lassitudinem artuum insolitam, tendentem & contundentem, cum cephalalgia intensa, &c. Enixò fœtu aliquot postea horis corripitur rigore aliquali cum insigni æstu, lochia naturaliter fluunt, cephalalgia intensa, os glutinosum, sitis nonnihil intensior, nox post horrorem gravis, inquieta, æstus intensus, cum præcordiorum angustiiis, sed intensissima cephalalgia, mucus copiosus in ore, quem crebrius etiam rejicit: manè omnia quidem tolerabilia, ut & sequente die, cum æstu & siti moderatis; appetente tamen vespere omnia sensim exacerbantur, adeo ut nox insequens æquè gravis ac antecedens contingat: sed appetente mane omnia, ut præcedente die, sensim remittunt. Medicus vocatus ægram nonnihil debilem, calore mediocri, naturali tamen intensiori, conflictatam offendit, continuo, haud tamen adeo acri ac mordaci, vespera quavis intenditur, & per noctis medium ferè intensius urit: pulsus hinc celer, frequens, magnitudine & vehementia moderatus, crevisiam horret, urina crassa, turbida, fauces & lingua saliva copiosa & glutinosa madent, qualem & crebriore scature rejicit.

R E S O L U T I O.

Præsens, qui sub manibus est casus, Febrim quotidianam continuam præ se ferre videtur, eamque, juxta omnium concurrentium symptomatum indicia, ex lymphæ vi-

Tom. II. Pars 2.

tio pronatam, indeque cum Sylvio simul Lymphaticam dicendam esse, nihil omnino dubito. Hæc quod ita sint, certum fit ex eo, quod ratione prioris quavis die cerram suam fervet periodum, & pro more lymphaticarum frequentius circa vesperam exacerbari soleat.

Pars affecta, cui inharet fomes mali, tota massa sanguinea erit, nec non cæteri humores corporis omnes, qui si salibus à se invicem plus minus diversis turgeant, in concursu suo mutuam inter se, & subinde satis intensam, excitant effervescentiam, quod dum ita fit, formaliter sic dictus Paroxysmus febrilis inde resultat. Prout autem in subiecto viscidior hæret malum, aut ab acido plus minus acri dependet, nunc lentam, nunc acutam magis, inducit febrem.

His ita præmissis, ad causas nobis transcendendum.

Prima igitur causa proxima materialis erit lymphæ acida & plus minus tenax, vitio seu defectu digestionis primæ genita, & ex primis viis, ceu fomite radicationis serè omnium febrium, per vasa chyli ad massam sanguineam vitiosè delata, in coque peregrino suo sapore acido sanguinis motum fermentativum turbans.

Causa autem proxima formalis erit concitatio spirituum impetus, qui à vellicatione acidi, in nervis excitata, dependet.

Causæ remotæ vices sustinere poterit partim diæta neglectius observata, partim etiam febris antegressa intermittens tertiana, minus exactè curata, sed fortè præmaturè nimis præcipitantium aut absorbentium abusu impetus naturæ suppressus, indeque particulæ quædam heterogeneæ adhuc relictæ motum naturæ fermentativum inhibentes.

Accedit & his mensium difficilis subinde excretio, propter acidi præternaturalis viscidii impedimentum.

Quantum ad symptomata, primò lassitudo artuum insolita, tendens & contundens, causam aliam non agnoscit, quam defectum & inordinatum plus minus spirituum motum, unde languor artuum, imò serè omnis motus cessatio. Tendens verò dolor & contundens adhuc aliud quid videtur tacitè innuere, scilicet lympham motu suo tardiore in subiecto hoc nostro phlegmatico, uti videtur, partibus cæteris dolorem aliquem gravativum & tensivum inducere, quin & acore salso acri, quò abundat, partes extremorum nerveo-membraceas vellicare, & obscure contundere. Cephalalgia verò intensa, febrium comes individua, serè in hoc morbi genere videtur per consensum stomachi & primarum viarum oriri, uti hoc sæpius, evacuato scilicet morbi fomite, experiri, & à posteriori colligere licet. Sitis affligens ordinariò febribus hisce lymphaticis juncta

[Gg 2] est, &

pedes œdematosos incidant. Medium ergò ex his servandum.

Dolor apud agrum erat obscurè lancinans & gravativus, propter partem obscurè sentientem.

Ægri in febribus lentis ordinariò conqueruntur de minore humectatione faucium; utut enim lingua sit humida, non tamen est sufficiens, nec saliva glutinosa sufficit diluendis faucibus, hinc tanquam molesta hæret in faucibus, sicque sitim infert.

Appetitus dejectus tam ex cruditatibus ventriculi viscidis, quàm spiritibus animalibus affectis, oritur; hi enim, ubi plus minus afficiuntur, plus minus etiam appetitus urget.

Porrò in his febribus lentis ordinarium est, quod, utut à pastu æqualiter calefiant ægri ab aliis contrectati, in volis tamen manuum iidem per se calorem intensiorem percipiant; cujus rei causâ probabilis est, si alicui conjecturæ indulgendum, quod in volis manuum organon tactus sensilius sit: hujus suspicionem suggerit titillatio, quæ teneritudinem organi tactus, adeoque sensilitatem sequitur. Quippe tria loca in corpore humano præ cæteris titillationem sentiunt: nempe volæ manuum, hypochondria, & plantæ pedum; in plantis pedum tamen interdum minus urget, quia ferè callum obduxerunt; in tenerioribus magis. Jam quæritur: in quonam hic sensilior tactus consistat? Resp. Respiciendas esse papillas illarum nerveas in extrema cute tactum constituentes, quæ in volis manuum & plantis pedum, ubi nervorum extremitates sunt, peculiarem structuram & conformationem habent. Interim in quonam præcisè harum papillarum conformatio specialiter consistat? latet adhuc.

Consideremus jam in primo morbi tempore excrementa varia præternaturalia, in secundo foetida. Quoad excrementa præternaturalia: in his ad vitiosam chylosin, bilem præcipuè plus minus inertem, ejusque vim alterantem, præsertim respiciendum; quia bilis est instrumentum, quò secernuntur sæculentiæ à chylo, & chylus perficitur. In nostro agro ex febre ardente & neglecta diæta bilis minus olcosa & volatilis, sed iners existit, quæ concurrens cum ipsis recrementis & cruditatibus primarum viarum, varias rejectiones efficit. Quoad excrementa verò foetida, sub secundo morbi tempore se manifestantia, & purulenta: sanè foetor ordinariè in corpore humano comes est putredinis, nunc inchoatæ nunc confirmata. Scilicet putredo fit ex motu minimorum, quæcunque corpora materialiter constituentium, quando nempe destructo acido actio salis volatilis urinosi agit in pingue; sicut contra

fermentatio oritur à prædominante acido in urinosum; unde quando sub actione hac pingue ab alcali urinoso volatili dissolvitur, oritur alteratio illa in odore, quæ vocatur Foetor; qui eò intensior est, quo magis acidum nonnihil occultum accedit. Testantur hoc naturalia: sic enim semper, quoties alcali in subjectum pingue sulphureum agit, si hoc radicitus dissolvatur, foetor emergit: sic ex animalium partibus carneis, licet inodoris, si tractentur per ignem, aut assentur, ubi urinosum volatile exsuscitatum incipit agere in pingue, resolutum ab igne, provenit foetor, qui vocatur empyreuma: sicut etiam hinc derivandum, cur vegetabilium purgantia sordes eliminatas adeò maximè foetentes, faciant, quale tamen quid, nec antimonialia, nec Mercurialia, per inferiora purgantia, procreant; in vegetabilibus enim acre istud volatile urinosum colliquat, & ad putredinem disponit succos excernendos: unde in febribus, præsertim malignis observantur subinde sordes alvi foetentes, quæ habendæ sunt pro pessimo omine, ut & urinæ foetidæ, indices nempe certi inchoatæ putredinis; colliquescit enim & deficit virtus in corpore balsamica à spiritibus derivata: Non secus pus laudabile minus foetet, quia est concretum salsum viscidum, concurrentibus alcali & acido cum pingui in æquali dominio; contra pus foetens deterius magis est; alcali enim in pingue actionem, & acidi simul aliquam activitatem, indeque inæqualem horum principiorum motum insinuat, unde de putredinis ob alcali dominium majori progressu metuendum. Hinc abscessus nimis foetentes ad gangrænam vergunt: in omni autem gangræna viget actio urinosi in pingue, destructo acido, unde præcavetur & curatur gangræna per acida, unguentum Ægyptiacum, &c. sicut sphacelus, ne ulterius serpat, præcavetur per acida, v. g. butyrum antimonii, oleum vitriolicum, amygdalarum dulcium oleo mistum, &c. Foetor ergò in hoc casu est signum abscessus rupti, & puris taliter constituti, ubi urinosum agit magis in pingue, & ubi ulcus sordidum imminet. Quando verò abscessus in corpore sponte suâ rumpere vult, infert agro horrorem; sicut ruptus rigorem in membranaceis partibus conciliat. Hinc secundum Hippocratem, ubi suppuratio abscessus intenditur, ibi major dolor & febris, &c. Quò magis ergò cruciat abscessus, eò promptior speranda est suppuratio, & postmodum apertio. Quotiescunque verò abscessus rumpuntur, horror & rigor & hinc æstus, sed transitorii, solent supervenire. Membranz autem secundum Croon de Motu Muscul. omnes sui habent connexionem tandem cum membranis cere.

cerebri, tanquam matre communi omnium membranarum; hinc conspirant per spasmos continuatos. Quodsi autem partium internarum abscessus rupti sanguini permiscerentur, anxietates inducit, & nunc per urinam, nunc per alvum, & alia loca, pus evacuatur, uti observavi id in Pleuritica, diarrhoeam purulentam passa, contigisse hoc. Sed quando puris major fit cum sanguine commistio, ex puris injuria, speciatim empyici, interdum subito moriuntur, pure scilicet cum sanguine ad thalamos cordis delato, sicque hujus motum fermentativum sufflaminando suffocationem infert.

PROGNOSIS.

Est anceps: Ab una enim parte salutem promittunt ætas ægri consistens, morbus recens, & naturæ motus pus evacuantes; ab altera verò metus subest, ne, si abscessus mesenterii non ritè mundificetur, ulcus foetidum depascens emineat, phthisin seu tabem lethalem post se, sicuti ulcera partium internarum omnia, trahens; imò ne à pure in mesenterio ramus aliquis insignis erodatur, sicque profusio sanguinis lethalis superveniat. Adhæc ægra modò surrexit à morbo acuto, malum hoc contraxit ex imperfecta excretionem materiæ peccantis, & inordinata diætâ; hinc massæ sanguineæ insignem alterationem & depravationem, imprimis verò visciditatem, inertiam & deficientem motum fermentativum contraxit; quæ omnia periculosum reddunt morbum.

CURA.

Quoad Curam verò, cum abscessus hic mesenterii ab acuta febre malè soluta, adeoque ex deficiente materiæ morbosæ excretionem, natus sit; idè in Cura

1. similis abscessus in reconvalescentibus ex morbis acutis, & ne hi in morbis chronicis delabantur, præcavendus.

2. Factus abscessus vel tumor saltem curandus.

Fontes, ex quibus morbi chronici post acutos invadant, jam dicti sunt, quando v.g. aliquod eliminandum remanet, hinc ratione præservationis in declinatione morborum acutorum, si quid producti morbose vel materiæ coctæ eliminandæ retentum sit, vel per sudorem, vel alvum, vel per urinam, evacuandum. Verissimum siquidem est, nullam febrem solutam tutam esse, nisi in fine sudor universalis supervenerit. Si ergò supervenit, bonum est; sin verò non, & tamen in urina sæculentiæ præcipitata hæreant, ne ab his nova noxa fiat, vel per sudorem, vel per blandum tandem laxans intestina stimulentur, ut sic concitior reddatur sanguinis motus; & per pan-

creas vicinaque loca recrementa morbosa resistantia removeantur. Quodsi verò alteratio quadam insignior succorum aliquo corporis nostri sub cursu morbi contigerit, vel à causa morbifica vel etiam ex abusu fixorum terreorum vel acidorum, bilem figentium, adeoque visciditas bilis & inertia fermenti stomachalis & succorum corporis nostri lateat, tunc pro horum alterationibus corrigendis maturè usurpanda veniunt remedia salina temperata, nonnihil spirituosâ, observando simul, an magis necesse sit, stomacho succurrere? quo in casu conveniunt acida blanda cum aromaticis remixta, elixyr proprietatis sine acido, & cum eo, idemque album istud Helmontii per circulationem paratum, item tinctura antimonii ex scoriiis, liquor terræ foliatæ tartari, isque vel solitariè, vel cum dimidio spiritus salis ammoniaci mixtus; an verò bili potius calcar addere, cujus ratione amara, & salina volatilia magis locum habebunt, v.g. ex absinthio, centauro minori, junipero, roremarino, mentha, &c. parata; hæc enim omnia in declinatione acutarum & præservatione morborum chronicorum locum inveniunt. Tandem

3. sin labes quædam aut noxa visceris cujusdam interni post acutas, ex læso ejus tono remansisse videbitur, tunc remedia Martialis, blandè adstringentia, & in forma tincturarum, aut solutione liquida, ut tinctura vitrioli Martis Zwelfferi, item solutio Martis cum succo pomorum, nec non Vina Martialis, conducent; quippe his ipsis robur visceribus iterum conciliatur.

Quoad Curationem; duo tempora distinguenda esse, monitum fuit. Hinc in cura subministrantur Indicationes, tam curativæ affectuum, quam præcativæ, imò etiam vitales virium.

Inter Indicationes præservativas respectu causarum:

1. Primæ viæ à cruditatibus obsidentibus vindicentur, vel per vomitoria, vel per blanda purgantia.

2. Digestio prima stomachi integra conservetur, vel per diætâ blandam, vel stomachica remedia.

Inter Curationem ratione affectus autem distinguenda erunt ante omnia ista tempora in nostro ægro, quorum primum est, quando tumor in mesenterio hærens, tendit ad suppurationem, ubi

(1) Tumor congestus attenuetur.

(2) Materia ejusdem, quorsum vergit naturæ motus, per illas vias eliminetur.

Jam verò tumor in mesenterio resolvitur & attenuatur, tam per interna, quam per externa. Externa optima erunt gummata, ut galbanum, ammoniacum, & suo modo mastix:

massix: quæ omnia turgent sapore acri amaro, & sub ignis tortura copiosum oleum penetrans amarissimum reddunt: Constant ergo sale volatili oleoso acri, ratione cuius successivè attenuatur & resolvitur materia tumoris congesta. Quibus pro stimulo addenda nicotiana & cicuta, tumores duros emollientia, cum & ipsa nicotiana ob suum salacerrimum in Decoctis prodest. Imò hisce simul addendus est Mercurius vivus, mirabiliter penetrans & emolliens tumores duros, & ad sui discussionem disponens: Nam & plantis pedum is illitus, etiam caput petit, unde emplastrum de ranis Vigonis cum Mercurio vivo, idque tam ordinaria, quàm duplici portione constans, tam nobile est in resolvendis viscerum tumoribus & scirrhis incipientibus. Equidem Mercurii usum vulgus horret, at sine ratione; novi enim diuturnas cephalalgias ex pituita acida hoc emplastro sublevatas; in splenis enim tumore & infarctu ejusmodi emplastrum externè applicatum omnibus aliis emplastris spleneticis palmam præripit; unde ad imitationem Vigonis, si Mercurius vivus, non autem juxta Zwelfferi curiositatem Mercurius præcipitatus, reliquis discutientibus emplastris addatur, pro tumoribus discutiendis, feliciorum effectum sperare possumus, præsertim in locis glandulosis, quorum visciditates & heterogeneitates inhaerentes mirabiliter dissolvit, & in forma salivæ easdem evacuabiles reddit; id quod in lue Venerea conspici licet. Insuper his adnumeranda olea destillata foetida, ut oleum tartari foetidum, gummi ammoniaci, ligni guajaci, & sim. Hæc quidem si sola illinuntur, insigniter foetent; si verò cum ejusmodi emplastris immisceantur hæc, egregii usus sunt, nec adeò horrida minusque foetida sunt, imprimis si super cornu cerviustum rectificentur. Hæc ergo emplastra exinde parata, v.g. emplastrum de ammoniaco Quercetani, emplastrum carminativum Sylvii, &c. malaxata cum oleis dictis destillatis, vel etiam cum oleo Philosophorum, loco affecto pro tumoribus duris resolvendis insternantur. Quibus si admiscetur Mercurius vivus, & hinc oleum tale pro malaxatione additur, sperare possumus effectum longè potentiorum.

Inter interna resolventia maximè excellent tartarea alcalina, tinctura tartari, ex detonatione nitri & tartari calidè extracta, liquor terræ foliatæ tartari, spiritus tartari volatilis, & similia salia volatilia, quæ omnia resolvendo, externis remediis adjumentum afferunt. Tandem hisce pro evacuandi & simul emolliendi scopo addatur Mercurius dulcis, qui vel solus, vel cum extracto heliobori nigri ad ℥j. aut cum massa pilularum de

Tom. II. Pars 2.

ammoniaco Quercetani ad gr. xv. ℥j. imò 3℔. mistus, etiam potest adhiberi, ut sic simul emolliatur tumor.

Quod si autem his ipsis administratis non dispereat tumor, & symptomata ingravescant, sed tumor speciatim accrescat, dolor fiat intensior, & pulsationis sensus manifestior, tuncque signum est, tumorem non discussum iri, sed tandem ad suppurationem tendere, adeoque blandis alcalinis & oleosis humectantibus, & emollientibus vulgo dictis, naturæ motus ad suppurationem promoveatur, inter quæ nil melius est terebinthina, cujus vel oleum umbilico illitum, vel ipsa terebinthina emplastri formâ imposita, ad faciliorem suppurationem disponit. Interim febris lentæ appropriatis, temperatis præsertim tartareis, simul occurratur, & decocto Chinæ cum radice scorzonæræ, & caryophyllatæ, &c.

Posteriori verò morbi tempore, quando nempe abscessus est ruptus,

1. isapertus est mundificandus, & purulentia ejus facta per vias, quò natura vergit, evacuanda.
2. Abscessus mundificatus sublato pure consolidandus; &
3. tandem hæctica febris per acrimoniam puris temperantia mitiganda.

Ratione primæ Indicationis, nempe mundificationis, conducunt balsamica, vi alcalinâ oleosâ seu sulphureâ pollentia, qualia sunt terebinthina, item sulphur, & balsamus sulphuris terebinthinatus & anisatus, item juniperinus, & quæcunque ex sulphure parata, juniperi oleum, & Malvaticum juniperinum, in casu præsertim, ubi natura ad vias urinarias vergit. Similiter pro mundificatione conferunt huc lapilli cancerorum, catholicum illud vulnerarium, cum aceto propinati, ideo tamen, ne illi penitus ab aceto, sed saltem quasi inchoativè, dissolvantur: quibus accedunt etiam alia balsamica, v.g. benzoë, aloë, myrrha, crocus, & ex his parata elixyria, in specie sine acido.

Alteri Indicationi satisfacit consolidatio mundificati abscessus, puta per vulneraria vegetabilia, Martialia & Saturnina; quorum inter illa nota sunt & excellunt hedera terrestris, cherefolium, salvia; uti post hæc succedunt Martialia, imprimis in forma liquida propinanda: ad quæ pertinet lapis hæmatites, medium quoddam inter terras metallicas & metalla, tam naturalis, quàm artificialis, qui præparari solet ex extractione lithargyrii cum aceto destillato facta, cumque spiritu salis præcipitata, & solutione Martis cum spiritu salis, ubi caput mortuum remanens est instar genuini lapidis hæmatitis. Descriptio processus vid. in M.A.N.C. Ann. 2. Observat. 143. pag. 227. item in

[Hh] Glau-

Glauberi scriptis, ac ferè idem est, quod tinctura antiphthifica ex vitriolo Martis & saccharo Saturni parata; ex quibus \pm atur hæmatites quasi verus. His tamen, tam mundificantibus, quàm consolidantibus, semper admisceantur, prout naturæ motus adest, nunc diuretica, nunc per alvum laxantia; inter quæ excellunt rhabarbarina & aloëtica; sic in usum quoque trahi possunt clysmata, ex decoctis vulnerariis parata.

Tertiæ Indicationi satisfacimus, & Hæcticæ occurrimus, per acrimoniam puris temperantia, quæ sunt sulphurea fixa, ut antimonium diaphoreticum, antihecticum Poterii, saccharum Saturni, &c.

Sed quid agendum foret, si in nostro ægro superveniret fluxus alvi cruentus, ab erosione vasis cujusdam? Resp. pro restringendo fluxu hoc convenire imprimis Martialia, & genuinum lapidem hæmatitem, qui mollior & rubicundior vulgari (hic enim saltem est minera Martis) deprehenditur, & quæ huic non cedit, rubrica fabrilis. Hæc posterior forsan non cedit lapidi hæmatiti, & in talibus casibus, fluxu nempe cruento alvino, ex erosione cujusdam partis, est egregia.

Quid autem tunc faciendum, si æger, rupto abscessu, pus per os spuendo rejiceret, uti etiam factum? In hoc puncto grave negotium imminet; metus enim est, ne abscessu soluto pus acrius in vesiculolosa teneriori pulmonum substantia ulcus & phthisin inferat. Resp. In tali casu non videri imitandum naturæ motum, quin potius ad inferiora, per clysmata acriora, & laxantia temperata per os exhibita, promovenda puris excretio, prospiciendo tamen simul pulmonibus per temperantia acrimoniam puris, quale est sperma ceti, trochisci de carabe, &c.

Balsamus Saturni terebinthinatus nobilis etiam est in hoc casu, si Hæctica ejusdem usum permittit. Saccharum enim Saturni blandâ calcinatione fiat friabile, cui affundatur oleum terebinthinæ, & in blanda digestionem servetur. Et hoc etiam egregium est remedium in gonorrhœa virulenta, ubi exulceratio partium internarum subest.

Decoctum etiam radicis Chinæ cum passulis, in affectibus ex pure natis multum valet, præsertim cum passulæ, ob vim temperandi, Hæcticis optimè convenient. Dulcia autem aliàs omnia, quia ulcera ob sui acorem, in viscido residentem, sordida magis reddunt, fugienda sunt. Item acidula in nostro casu cautè adhibeantur; suppurationem quippe eadem impediunt, & abscessus ad ulcera sordida disponunt. Contrà tartarus vitriolatus, nitrum antimoniatum, sal ammoniacum, in hujusmodi Hæcticis cum tempe-

rent pus, & ad vias urinarias deducant, sunt optima, & miscentur cum sulphureis fixis, cinnabaris antimonii, vel nativa sublimando depurata, mista commendanda; non secus ac sal ammoniacum cum tertia parte antihectici Poterii continuatum, Hæcticis est usitatissimum.

In Hæctica quoque & febribus lentis alioquin cauti simus & parci in sudore ciendo, quia quandoque satis largiter spontè supervenit, ut etiam opiatis sit sistendus; unde potius blandâ diaphoresi simus contenti: pro quo scopo conducet tinctura bezoardica, cum spiritu tartari & vitrioli volatilibus parata.

Tandem Lac sedato & mundato abscessu egregium & optimum est temperativum abscessus, & nutritivum corporis. Interim necesse est, ut pro meliori eorum operatione primò mundificetur stomachus, ut hic id rectè digerat, aliàs abeundo in viscidum & glutinosum cremorem, plus nocet. Lac asininum in Italia frequens est propter longævitatem bestiarum; verum apud nos caprillum & bubulum in usu est, quorum hoc magis est nutritivum, illud verò diureticum.

CASUS XXXIV.

FEBRIS MALIGNA.

Virgo sana & optimi habitus conqueritur de aliquali imbecillitate corporis, quam tamen non æstimat, accedit insignis appetitus prostratio, cum siti admodum aucta; dormiens noctu interruptam nonnihil habet quietem, & hinc inde in lecto se jactitat, nescia ob quam causam? Sic sen unrühig/ und wissen nicht warum? vocatus Medicus invenit urinam naturaliter constitutam, pulsum parum mutatum, ob id vitia hæc prægressæ cuidam diætæ læsioni adscribit, adeoque elixyr proprietatis ordinat, quotidie bis ad 30. gutt. hauriendum: Patiens exinde nullum percipit levamen, sed potius aridura faucium cum squalore linguæ insigni exinde supervenit, & virium imbecillitas in tantum accrescit, ut lectum colere necesse habeat. Rediens Medicus post aliquot dies ipsam invenit insigniter imbecillem, de lassitudine artuum conquerentem, es liegt ihr in allen Gliedern/ ut & intensa siti, & aliquali præcordiorum angustia; menses rectè se habent, qui ante tres septimanas jam ritè fluxerant: Alvus clausa, parum vel nihil ejicit; tangens etiam, calorem persentit mordacem, sine hoc, ut de eo conqueratur ægra; urina naturalis, nonnihil turbida, es ist ihr thum und dämisch im Kopfe/ pulsus celer admodum & frequens, non adeo validus, magni-

magnitudine saltem moderatus, ad parvum non inclinans, ipsa propinat diaphoreticum præcipitans ex antimonio diaphoretico, sale volatili cornu cervi & viperarum, &c. sed frustra; nullus sudor venit, ardor intenditur, caput insigniter æstuat, sitis inquieta, oculi fulgent. Ipse Medicus anxius alium pro medela simul advocari jubet.

RESOLUTIO.

Mihi casum huncce propositum ejusque symptomata accuratè consideranti, primo quasi intuitu Malignitatis nota apparebat. Nam licet quidem subinde varia in febribus malignis observentur symptomata affligentia, nunc plura, nunc pauciora, imprimis tamen hæc tria, utpote frequentiora, & in hoc casu concurrentia: nempe subitanea virium prostratio, sitis admodum intensa, appetitus dejectus citra manifestam causam, vigiliæque pertinaces, Febrim malignam, & quidem minus acutam, adesse, infallibiliter indicant atque ostendunt.

Febris autem nostra maligna agnoscit pro parte affecta tam massam sanguineam, ab acrimonia volatili seu spirituosâ inquinatam, hincque in motu naturali fermentativo impeditam, quàm etiam ventriculum, in specie orificium ejus sinistrum, quod optimè probant inquietudines, jectigationes, aliæque molestiæ.

Ordine jam ergò attingenda atque examinanda est Causa proxima, quæ nihil aliud videtur esse, quàm sal volatile acre, spiritus plus minus destruens, massam sanguineam enervans, & ad aliqualem putredinem disponens, hinc massæ sanguineæ crasi destructâ, & spiritibus affectis, sanguinisque consistentiâ, fermentatione vitali atque spiritualescentiâ debitâ, deficiente, mox virium prostratio in promptu est. Spiritus enim animales non debite & naturaliter influere possunt in partes pro excitando motu, & licet quidem influant, quia tamen illorum vigor naturalis torpet, partim ob deficientem quantitatem, partim etiam ob deficientem subtilitatem, inepti tamen sunt ad motum naturalem ordinatum excitandum, hinc membra quasi torpent, & virgo nostra ægra insignem lassitudinem ætuum percipit, quam molestiam per hæc verba explicare conatur: *Es liege ich in allen Gliedern.* Appetitum verò prostratum ut & sitim auctam cum aridura faucium linguæque squalore ex acrimonia volatili, fermentum destruente, & fauces vellitante, originem habere judico. Nox verò inquieta, jectigatio corporis molesta in lecto, ut & præcordiorum aliqualis angustia, ex affecto stomacho, imprimis tamen orificio ejus sinistro, haud dubiè deducenda. Quod

Tom. II. Pars 2.

verò attinet calorem illum quasi mordacem, interne saltem urgentem; dico, illum provenire ex eadem acrimonia volatili, destruente texturam massæ sanguineæ, & ita incalescientiam in præcordiis maximè gliscientem, excitante. Quod verò nostra ægra de eo minimè conqueratur, delirium imminere auguror, & quod me in hac opinione magis confirmat, sunt oculi fulgidi & quasi ignei, tanquam certissima deliriorum imminantium indicia. Accedit & hoc, quod ardor magis magisque intendatur, & caput insigniter æstuarè incipiat ex prædominante acrimonia volatili, texturam sanguinis salino sulphuream plus minus destruente. Quod autem alvus nonnihil clausa, & illa parum vel nihil ejiciat, ex paucitate forsan excrementorum in cellulis intestinorum, in specie coli, subsistentium, originem habet.

De causâ remota parum habeo quod dicam; Nullum enim indicium causarum remotarum in hoc casu inveniendum.

PROGNOSIS.

Ad eventum ergò hujus febris malignæ accedo. Est autem Prognosis februm malignarum, secundum Practicorum unanimem consensum, admodum incerta: mox enim inopinato vel ad vitam vel ad mortem terminantur, propterea & ego nihil certi prædicere valeo. Hoc tantum dico: quia febris hæc minus acuta existit, idcirco medicamentis proficuis locum adhuc superesse, nemo negabit.

CURA.

Methodum medendi quod concernit: cum ægram nostram affligat febris maligna, eaque in sanguine gliscens, præcordia infestans, indeque varia ac periculosa symptomata inferens, observandum:

1. Malignum virus destruendum, figentibus & persudorem expellentibus.
2. Primæ viæ repurgandæ, & fomes ac ipsum virus ibidem affixum removendum.
3. Symptomatis atrocioribus maturè occurrendum.

Priori scopo veneno nempe maligno corrigendo, satisfaciunt alexipharmaca dicta & sudorifera, eaque tam fixa antimonialia, quàm in principio & incremento in specie volatilia, simplicia nempe salia & composita theriacalia v. g.

℞. *Ex succ. ceras. nigr. rubi idæi* aa. ʒiʒ.

C. C. f. Δc ʒij.

ʒii diaphor. ʒj.

Syr. rubi idæi ʒvj.

— Qi dulc. q. s.

M. D. S. *Tranklein.*

Usurpatur pro duabus dosibus, expectando sub moderatis tegumentis sudorem blandum.

[Hh 2]

Vel ʒ.

Vel \mathfrak{R} . ∇ Card. bened.

scorzoner. ana \mathfrak{z} iß.

Succ. Citri rec. \mathfrak{z} vj.

Theriac. Andr. \mathfrak{z} iß.

Bezoard. miner. \mathfrak{z} ß.

Laud. opiat. gr. iß.

Syr. Menthe. \mathfrak{z} j.

~ *Di dulc.* q. s. si acidior placet hæc
Mixture.

Usurpatur pro tribus dosibus.

Repetenda sunt talia aliquoties. Item

\mathfrak{R} . ∇ Card. bened.

fl. samb. ana \mathfrak{z} iß.

Acetivini \mathfrak{z} j.

Theriac. Andr. \mathfrak{z} ij.

Æi diaphor. \mathfrak{z} ij.

Syr. acetos. Citri \mathfrak{z} vj.

M. f. Potio.

Capiatur pro lubitu.

Secundo scopo vomitus, imprimis sub morbi adhuc principio, satisfacit, qui etiam primâ vice instituendus videtur, ut remotis ibidem sordibus variis & fomes purgetur, & symptomata ibidem urgentia præcaveantur; quin & reliquis remediis commodior operatio concilietur: E. g.

\mathfrak{R} . *Vitri Æi hyacinth.* gr. vj.

Infund. per ρ in loco calido in *Vini Rhe-*
nani q. s. manè filtratur:

filtraturæ \mathfrak{z} ß. adde

∇ *Cinnam.* \mathfrak{z} iß.

M. D. S. *Brech Träncklein auf einmal.*

Tertiò symptomatis variis varia appropriata, præsertim opiatâ mista, occurrere debent.

In specie pro squalore linguæ:

1. Mundetur lingua bene cum virgula aliqua falicis rubræ.

2. Profunt mucilagines ex seminibus.

Verbi gratia:

\mathfrak{R} . *Mucil. sem. Cydon.*

Psyllii ana \mathfrak{z} vj.

Di purif. \mathfrak{z} j.

Syr. rubi idæi \mathfrak{z} ij. vel \mathfrak{z} ß.

M. D. S. *Lindernder Schleim.*

Vel pro siti tollenda usurpetur sequens Deco-
ctum.

\mathfrak{R} . *Decoct. Citri Myns.* \mathfrak{t} iß.

Succ. Citri

rubi idæi

Syr. Ceras. acid. c. flor. Tun.

rubi idæi aa. \mathfrak{z} ij.

~ *Di dulc.* q. s. M.

Hauriatur subinde bonus haustus, vel sub, vel post sudationem, in specie ubi volatilibus sudor fuerit provocatus, vel etiam alio tempore.

\mathfrak{R} . *Decoct. Citri Myns.* \mathfrak{t} iß.

Gel. C. C. rec. \mathfrak{z} iß.

Syr. Ceras. acid.

rubi idæi aa. \mathfrak{z} j.

Succ. Citri & Rubi idæi q. s. pro grato
sapore.

Externè Epithemata capiti applicari pos-
sunt ad præcavendas cephalalgias, & deliria.

Verbi gratia:

\mathfrak{R} . ∇ *Verben.* \mathfrak{z} ij.

Spir. vini camphor. \mathfrak{z} j.

Opii gr. v.

M. f. Epithema.

Applicetur cum linteis multiplicatis te-
pidè.

CASUS XXXV.

FEBRIS MALIGNA PETE- CHIALIS.

Mulier sana, quæ per decem menses lactitaverat puerum, eumque modo ablactasset, corripitur paulò ante solstitium hybernum per aliquot dies insueti virium languore, idque sine manifesta causa, cum insigni extremorum lassitudine, dicit: *Es lege ihr in Armen und Wei-
nen.* Appetitus deficit, intenditur sitis, lingua sicca, fauces glutinosæ fiunt: cerevisiam horret, ceu nimis amaram, & quæ faucium squalorem intendat; hinc cerevisiam secundariam, aut aquam frigidam desiderat. Calor insuetus, isque continuus, corpus occupat, moderatustamen, & qui interdum, præsertim noctu, incertis vicibus, ad aliquot horas intenditur, caput intensè, præsertim circa frontem, dolet. Ipsa ob id a Pharmacopœo die Lunæ capit pilulas purgantes, nescio quas, quæ quinquies aut sexies eam laxant copiosè, sed sine euphoria, qualibet potius symptomata, præsertim virium imbecillitas, intenduntur: ob id die Martis vespere, neglecta cœna, capit Theriacæ \mathfrak{z} j. in cochleari aceti vini, cubitum itura, dormit exinde inquieta, sudat insigniter; manè melius habere videtur, extra lectum tamen durare nequit. Eadem interea subsistunt symptomata, vires infringuntur, nox altera die denuò inquieta, variis insomniis turbatur. Adstantes eam crebro in lectum jectigantem, & subinde anxie respirantem, observant. Die Jovis vocatur Medicus, qui mulierem in statu hætenus enarrato offendit, calorem persentit obscurum, acriorem tamen & præternaturaliter auctum, sed non adeò intensum. Pulsus creber, frequens in magnitudine & vehementia moderatus, ad parvitatem declinans, mollis, æqualis, &c. Urinæ offeruntur clæræ, intensius tinctæ sine contentis. Dejectiones prægressa nocte habuerat quinque tenues seu fluidas, obscure tinctas, insigniter fæcentes, & jam iterum quatuor hoc ipso manè; alias hypochondria subtumida & mur-

& murmurantia sunt, frons & tempora crebro sudore madent. Interrogata ægra a medico, de quo præcipue conqueratur? respondet: Sie befinde sich gar wohl/ nur daß sie matt und sehr durstig sey. Interim subinde se jectigat, anhelosa est, torum videt, &c. flagitat curam, & urget imprimis venæsectionem.

RESOLUTIO.

Morbus primarius est Febris maligna, & quia morbus non est adeò acutus, suspicio est, eam futuram petechialem, quam symptomata innuunt; nam petechiales ita incipere, & promoveri solent.

Primarium autem & maximæ considerationis symptoma est adjuncta diarrhœa, quæ ex ipsius naturæ motu ægræ supervenit, ut occasione pilularum antea assumptarum nonnihil excitatam fuisse post aliquot dies, concludi potest.

Cæterum contagium in hoc casu non subest, neque corporale, cum de conversatione cum ægro nulla fiat mentio, neque spirituale seu epidemicum, cum pariter nec hic ullæ circumstantiæ. De epidemica enim constitutione Lindanus exclamat: *Si quis sine manifesta causa nausæa corripitur, signum esse suscepti seminis contagiosi*; Sed ægra nostra de ea non queritur.

Pars primaria affecta est massa sanguinea; secundaria verò stomachus, quia quarum hujus symptomata in cursu morbi superveniunt, idque ex ordine effectuum, in febribus ordinariò supervenientium. Præter massam sanguineam in febribus malignis etiam spirituum influentium ratio haberi debet, idque periculosissimo statu; & idem nunc vitales, nunc animales, pro ratione malignitatis simul affliguntur: si animales, ypnia, deliria & convulsiones, aliaque symptomata nervosi generis, ad sunt; si verò vitales, mox summa virium prostratio, pulsus celer debilis & formicans, & sudor ex frontem syncopiticus, apparere solent. Quod si tandem ex contagio suscepto febris maligna nata sit, tunc stomachus, qui in magnis aliis secundariò aliàs affligitur, primaria ejusdem sedes est.

Et quidem ægram nostram laborare febre maligna, syndrome symptomatum urgentium confirmat: inter quæ primum est prostratio virium, eaque sine manifesta causa; nescit enim nostra ægra, unde hanc contraxisset, sed quia ablactarat foetum, non in foetus, facesseret; hinc incrementum virium sperandum fuisset. Aliud er- quid subest. Jam verò virium fundamentum consistit in sanguine spirituofo; hinc

enim vires & spiritus pari ambulant passu; hinc per exercitia, spiritibus exhaustis, reddimur debiles: ac si in quorumcunque morborum principiis vires prosteruntur, vel spirituum influentium plus minus extinctorum, vel talis sanguinis non debitam fermentationem subeuntis, causa, ut nempe non possit volatilifari in spiritus, morbum non vulgarem, sed majoris ponderis & mali moris instare, signum est. (2) Conqueritur ægra nostra de siti intensa, faucibus aridis, & lingua sicca; quæ pathemata omnia in principio febrium si appareant, pessimi ominis sunt, vel febrim malignam, vel morbum Hungarico similem, affligere confirmant, præsertim si æstus non fuerit tantus, qui linguam & fauces exsiccare queat. Nam in febribus ardentibus benignis quidem etiam adest talis siccitas, sed in statu demum; imò stomachum summè labefactatum esse, confirmant. (3) Dum conqueritur ægra nostra de stomachi symptomatibus, appetitum prostrato, cerevisiæ fastidio; quæ pathemata pariter innuunt fermentum stomachi penitus pessundatum, cujus digestionem cessante, in tali subiecto, ubi vires aliàs prostratæ, periculum tantò majus exurgit. (4) Pessimi præsertim ominis est, quod ægra nostra sit anxiosa, & inquieta, sine vomituriendi conatu tamen, qualiter affecti ordinariò regionem stomachalem monstrant. Interrogati tales dicunt: *Sie wissen es selber nicht/ es wäre ihnen bange ums Derge.* Unde tales in principio & incremento morborum anxii & inquieti apparentes, periculosissimum se fovere morbum, indicant. (5) Pulsus à Medico die quinto exploratus, deprehenditur celer, frequens, in magnitudine & vehementia moderatus, ad parvitatem declinans, ex quo certi esse possumus de latente malignitate. Equidem in principio possumus decipi, quia tunc quandoque naturali similis videtur. At in incremento fit debiliior, & tandem tantum non formicans evadit, unde hac in parte cautum decet esse Medicum; nam pessimus pulsus ejusmodi est. Si verò mox in principio debilis, celer, formicans, parvus, apparet, non est quod dubitemus de malignitate.

Hæc quinque ergò si conferantur cum febre, æstu, &c. liquet, ægram nostram febre admodum maligna laborare, morbumque ipsum plus habere in recessu, quam primitus innuere videbatur: Et dicuntur tales morbi mali moris seu maligni, quasi dixeris, *bänisch*; primâ facie benignos & blandos se exhibentes, in recessu verò pessimi sunt. Insuper accedunt his pathematibus duo adhuc alia: nempe ægra nostra est anhelosa, accedentesque quosvis torvè aspiciit, quod pessimum signum est, præsertim si libera fuerit

[Hh] 3 respici-

respiratio & mediocris æstus, *wenn sie so seuffzen/* nam juxta Hippocratem tales mente agrotare, h. e. spirituum animalium circa præcordia motum perturbatum esse, indicatur. Aspectus autem torvus, ferox, & oculis intentis factus, *wenn sie einen so starre ansehen/* innuit imminens delirium & convulsiones, idque præsertim in non adfuetis, imò jam convulsi quid musculos oculorum pati, indicium est. Sic ægri tales interdum jacent cum fronte caperata circa nasum, & interrogati, *wie ihnen sey/* de levioribus conqueruntur, quod itidem pessimum est signum. Indicat enim tale molestiam quandam intrinsecam non explicabilem, quam in externis sensuum organis non percipiunt, unde taliter constitutos raro evasisse, observavi.

Cæterum Diarrhœa colliquativa in casu nostro primum symptoma est, qua apparente in malignis, gaudeant ægri, si evadere possint; & quamvis occasionem eidem suggererit pilularum importuna deglutitio, non tamen hinc sequitur, diarrhœam colliquefactivam esse artificialem, præsertim cum hæcce integras tres dies post diarrhœam artificialem demum comparuerit.

Dictum: in febribus malignis quibuscunque ad spiritus influos respiciendum esse, utut indicationes curatoria ex iis habere nequeant: optima ergo est pro cura Hypothesis Sylvii.

Quemadmodum autem vitæ radix consistit in sanguine, & formalitas ejusdem in vasis ex quibus dependet vita; ita

Causa proxima in nostro Casu est fermentum febrile malignum, vel Malignitas, ut sic, probabiliter juxta Sylvii hypothesin ex sale volatili acerrimo (minus verò ex acido, quippe quod in variolis, morbillis, petechialibus, & purpuratis accusandum est) destruyente texturam massæ sanguineæ, salino-sulphureo-oleosam, derivanda est, ex quo præservatio & curatio petitur: Vid. Sylvius de Peste *lib. 4.* Confirmant hoc pathemata in nostra ægra circa stomachum & primas vias obvia, v. g. appetitus prostratus, nausea, sitis clamorosa, fauces siccae, asperæ, glutinosæ, &c. qualia symptomata interdum etiam acria purgantia excitant, & ab acidis curantur. Imò considerentur assumpta caustica, v. g. arsenicum, quod escharam inducit stomacho, cujus assumptionem mox dicta symptomata insequuntur. Adhæc Purgans assumptum quælibet symptomata exasperavit. Consideremus pathemata, quæ in ægro tenerioris constitutionis ab acrioribus purgantibus, (quæ occulta sunt venena,) scammoniatis, esulinis, euphorbio, &c. assumptis, superveniunt, ubi omnia dicta symptomata, reme-

dio adhuc in stomacho quantumvis saltem existente, præsentia sunt. Manifestatur etiam sufficienter per diarrhœam colliquativam, quæ etiam eidem alcali acri, dissolyenti massam sanguineam, ejusdemque texturam, originem debet; quod probo, considerando affectus cholericos, ex bile præternaturaliter instomachum regurgitante natos: item saltem ex cruditatibus nidorosis, per læsam digestionem introductis, magnas anxietates, sitim &c. excitante. Imò etiam in stomacho febribus malignis demortuorum interdum eschara nigra fuit reperta, qualis in fonticulis à salibus causticis acrioribus induci solet. Hinc ergo causticum acre latere concludo.

Jam quaeritur, cum nostra diarrhœa sit spontanea, impetu naturæ nata, an critica, an verò symptomatica ea dicenda? Nam in hoc cardo curæ consistit. Et critici quidem motus in morbis acutis, præsertim malignis, benè observandi sunt ii, nisi remediis generosioribus morbo ante crisin prævenire queamus, ut non opus sit eam expectare. Si talia defunt, necesse est, ut subordinaria methodo medendi motus critici ordinarii observentur. Cæterum crisin quod attinet; nil aliud est, quàm subitanea morbi & naturæ mutatio, dum nempe sub tegmine materiæ alicujus, sive sanguinis, sive sudoris, sive urinæ, fermentum malignum, aut sub cursu morbi producta alia, in loco quodam vel seponuntur, vel extra corpus excernuntur, ita, ut status hinc pacatus in ægro superveniat. Scilicet tria hæc se invicem in crisi sequuntur:

1. Causæ peccantis correctio.
2. Fermentorum morbosorum & materiæ correctæ separatio (quod per coctionem exprimi solet.)
3. Concoctæ materiæ morbosæ, aut metastasis, aut excretio, uno nomine exclusio ex contentis.

Vid. Mœbius.

Jam verò fundamentum criseos consistit in motu isto fermentativo sanguinis, quo fermenta maligna & corrupta in corpore contenta, sub cursu morbi corriguntur; quæ correctio fit propter texturæ mutationem talem, ita ut istud, quod fuit acre, fiat temperatum: hinc correctæ ex sanguine separantur, quæ separatio absolvitur motu demum præcipitatorio; Unde & coctio & separatio consistunt in motu sanguinis fermentativo. Adeoque nulla crisis expectanda est, nisi, ubi fermenta febrilia fuerint correctæ, & signa coctionis præcesserint.

Ex dictis his concluditur, qualisnam sit nostra diarrhœa? Criticam eam esse, possent persuadere:

1. Quia

1. Quia fit die quarto, quod ipsum ad minimum criseos, septimo die subsecuturæ, indicium esse possit.

2. Quia ægra de symptomatibus hypochondriorum, i. e. hypochondriis subtumidis & murmurationibus conqueritur, quæ innuunt orgasmum humorum circa primas vias, & motum naturæ inferiora versus tendere, & crisin per diarrhoeam imminere.

Verum dicta argumenta de die quarto non sufficiunt, nisi alia simul respondeant.

Sed quæritur: annon sit Diarrhoea symptomatica? Symptomaticam eandem diarrhoeam esse, probo:

(1) Quia contingit sine signis coctionis præcedentis; urina etiam clara est, intensius tincta & sine sedimento conspicitur, quod ignum summæ cruditatis, nec separatorum fermentorum morbosorum est; secus enim turbida urina fuisset excreta, & adhuc excretetur; crisin enim semper præcedunt signa coctionis in urina conspicua.

(2) Quia contingit sine ægræ euphoria, sed cum malo signo. Non enim evadit ægra quieta, nec percipit cum his excretionibus evamen; sed potius sudorem frigidum & crebrum circa frontem & tempora habet: nam verò *sudores particulares circa caput & frontem sunt periculosi*, juxta Hypocratem; præsertim si sint maximè glutinosi vel frigidi, aut subfrigidi summæ virium prostrationis certissimi indices.

(3) Diarrhoeam esse symptomaticam & æternaturalem, patet ex excretorum conditione, quia foetida ea sunt; foetor enim in ejusmodi diarrhoeis pessimi ominis est. In quibuscunque morbis acutis urina & alvi excrementa, foetorem præ se ferentia, semper faciant colliquationem & inchoatam putredinem succorum corporis nostri, ejusque firmum statum: nam quemadmodum putredia vegetabilia aciora similes fatentes acridas excludunt fæces, quatenus alcali cum resinosis massam sanguineam dissolvit, & collinescere cogit, & sic texturam sanguinis dissolvit, ut particulæ colliquatæ per vim excretæ tali foetore se exhibeant; ita nam in nostra ægra à fermento febrili acri maligno pingue sulphur massæ sanguineæ dissolvitur, hinc textura collinescit, & particulæ corruptæ putredinem contrahunt, & liamen foetidum exhibent.

Est ergo diarrhoea spontanea colliquativa fermento alcalino, dissolvente & ad putrilaginem disponente massam sanguineam. Insuper ægra per quatrimum propter nauseam comedisset, & ex quinque vel sex priores secessibus primæ viæ redditæ fuissent liquida, hinc sequitur, subsequentes ex massa sanguinea provenisse.

Quod autem ægra nostra post assumptam theriacam cum aceto sudaverit, hoc bonum est; præsertim cum febre maligna correpti in principio sudant quidem tales ægri, at in progressu aut statu morbi non, aut rarò sudare possunt. Unde quamdiu tales ægri post sudorifera propinata in hisce casibus sudant, bonum est: sed hoc fallit quandoque, quia in principio sudant, in incremento non, pessimo omine. Interim quod ægra nostra non dormiverit post usum theriacæ, sed inquieta manserit, pessimum omen est; sicut si in principio & incremento malignarum febrium morborumque acutorum ægri ab usu theriacæ & opiatorum non fiant quieti, status turbulentissimus œconomiae animalis innuitur, quem deliria & convulsiones subsequi ferè solent.

Quæritur autem: an assumptio theriacæ ægræ nostræ bona fuerit? Resp. ita: Theriaca enim ratione ingredientis opii, nobilis est, Autore Ludovici, & Horstio in *Judic. Chirurgiæ Infusoriæ*. Opiata enim in principio morbi bona sunt. Et rectius adhuc fecit eadem, quod cum aceto theriacam deglutiverit, cum præsertim theriaca, uti & electuarium diascordii, & theriacalia quaecunque, in malignis semper unà cum aceto debent assumi, quippe hac ratione hæc longè melius operantur, quatenus (1) non tantum æstum, quem excitant, compescunt, sed & (2) longè potentiùs sudorem movent, & (3) ex sudore ægri non tam debilitantur. Unde etiam sequentem misturam ex theriaca in morbis ardentibus acutis malignis mihi familiarem sæpissimè proficuum observavi:

℞. *fl. samb.* ℥iij.

✚ *vini acerr. non destill.* ℥vj. ad ℥j.

Theriac. vel *Mithridat.* ℥j. ℥ss.

ad ℥ij. imò etiam in robustioribus juxta *Horstium* & *Zwelfferum* ℥iij. ad ℥ss.

℥iij. *diaphor.* ℥ss. ad ℥j.

Syr. acetos. Citri, vel *rubi idæi*, ℥j. M.

Capiatur pro duabus, quod ordinariò fit, vel tribus dosibus; ita sudant hinc ægri, nec adeò debilitantur, quiescunt, dormiunt, & ordinariò melius habent. Adeoque tam in incremento, quam statu malignarum, magni mistura hæc propter quietem atque sudorem, qui supervenit, æstimanda est. Loco cujus in dosi minori prostat & tinctura bezoardica, quam tam theriacalia, quam acidum vinosum, in spiritu vitrioli obvium, ingrediuntur, cum omnia hæc ingredientia in ea repariantur, saltem deficit opium, quod tamen & facile addi potest.

Quoad Prognosin: Affectus hic est admodum periculosus. (1) ob morbum admodum

dum malignum, jam jam in incremento constitutum, cum atrocibus aut saltem periculosis symptomatis. (2) Diarrhœa colliquativa, in his febribus aliàs ut plurimum est lethalis, nisi eidem maturè occurratur, ad mortem deducit. (3) quia ægra etiam propter prægressam lactationem viribus maximam partem exhausta fuit, quâ tantum detrahitur matri, quantum foetui in nutrimentum cedit.

Vix autem, si evasura ægra sit, per motum criticum evadet, propter vires per diarrhœam exhaustas; sed morbus potius pedetentim & paulatim solvetur.

Quoad Curam: Cum jam non curemus febrem malignam in genere, sed versetur cura circa febrem hujus ægræ malignam in specie, hinc selectiora remedia eligenda, considerando simul, quod illa diarrhœam colliquativam adjunctam habeat. Cæterum occasione alexipharmacorum in ægra nostra usurpandorum, præmoneo

1. quod fermentum alcalinum acre malignum, appropriatis sit enervandum & corrigendum.

2. Correctum illud per sudorem à confortio reliquorum succorum vitalium, speciatim sanguinis, per coctionem separandum & excludendum.

3. Symptomatis urgentibus occurrendum.

Priores duæ Indicationes primariæ sunt. Methodum autem hanc in primo & secundo scopo monstrat ipsa natura quotidie, in curationibus nempe spontaneis talium febrium. Jam verò, sive per motum naturæ criticum, sive paulatim, absque medicamentorum usu, solvantur morbi, observamus tamen, naturam non mox in principio moliri excretiones, sed demum in statu morbi, ubi scilicet venenum acre jam correctum est, & à partibus succorum à veneno corruptis separatatum: hoc enim sub communi vehiculo nutrimenti & excrementi sero involutum, vel criticè, vel successive, per sudorem eliminat.

Imitemur ergò naturæ motum, &

1. fermentum malignum corrigamus; & dein

2. illud correctum foras eliminemus.

Adeoque sudorifera sola adhibita, qualia, in febribus malignis non sufficiunt; turbant enim & perturbant saltem naturam, corpus movent, sed nil promovent, & vires deiciendo, quia non rejiciunt virus malignum acre alcalinum volatile, plus nocent, quam profunt, nisi fuerint simul talia, quæ fermentum malignum curant. Contrariâ quoque ratione nec solis alexipharmacis fidentum, quin cum his semper simul respi-

ciatur ad excretionem fermenti correcti per poros cutis fiendam; posito namque, fermentum malignum alexipharmacis illis corrigi, nisi simul correctum illud foras ejiciatur, periculum est, ne illud fermentum recrudescat, & ad morem morborum benignorum quasi novæ turbæ seu recidiva sequatur. Correctum ergo venenum etiam per sudorifera emittendum est.

Adeò ergò alexipharmaca corrigentia, & sudorifera eliminantia, simul jungenda sunt: v.g. si ponamus, quendam assumpsisse arsenicum; hunc propter symptomata si simpliciter sudoriferis etiam fortioribus, vel purgantibus etiam validissimis, tractare coneris, incassum ages, nisi simul prius venenum correxeris: sin verò eidem saltem lacticia vel pingua propinaveris, quæ obtundunt & corrigunt venenum; optimè succedet cura.

His præmissis liquet, qualia sint corrigentia illa fermentum hoc malignum, in sale volatili acri fundatum? Vulgò sunt ista, quæ dicuntur alexipharmaca, alias bezoardica. Jam porrò quæritur: in quonam consistat hæc veneni per alexipharmaca Correctio? Resp. simpliciter in ejusdem noxiarum qualitatum temperatura, ita ut venenum malignum volatile alcalinum acre temperetur, & mitius atque lenius reddatur: sicut etiam ipsa temperatura in minimorum materialium fermenti virulenti texturæ mutatione fundata est, qua illud, quod fuit acre, blandum; quod volatile, fixius, aut saltem minus mobile; quod spirituosum aut rarum, fiat densius ac spissius, & minus penetrativum; & similia proprietatum, quarum castratione & temperatura exserunt vires suas alexipharmaca. Ac elegans omninò est discursus Beccheri in *Phys. subterranea lib. 1. sect. 5. cap. 1. pag. 305.* alexipharmaca venena pellere simpliciter vi temperando venena. Alexipharmaca ergò venenorum noxias qualitates temperant & mitigant: Scilicet per simplicem degeneraturam & texturæ mutationem etiam pessima venena facile degenerant in mitissima remedia, v.g. antimonium per nitrum figendo cicuratur in remedium tutissimum; non secus ac Mercurius sublimatus temperaturâ simplici redditur innocuus, quando post eum assumitur lac aut quoque temperatur per oleum tartari per deliquium in vehiculo aqueo; vel quando additur ana Mercurii vivi, fit mite remedium, ita cum Mercurius sublimatus antea ad gr. viij. cum vitæ periculo assumeretur, in Mercurio dulci ad gr. xxx. xl. &c. tutò capi queat. Similiter virulentissima vegetabilium purgantia, & horum rex, helleborus albus, evadit innocuus, correctus tam per acida, quam per alcalia, invertentia texturam resinofam particula-

cularum ejusmodi purgantium: sicut acida hoc faciunt immutando alcali acre; alcalia vero hoc faciunt, resinofam texturam particularum purgantium dissolvendo, & tertium quoddam innocuum producendo. Ex his patet: fermenta febrilia posse pluribus modis corrigi & alterari. Notabile est de arsenico, veneno pessimo, quo assumpto, symptomata convulsiva enascuntur, ad oreum ducenda, quod tamen simplici butyro ita mitescit, ut tuto deglutiri queat: vid. Fehr *Tract. de scorzonera*, ubi allegat arsenicum cum butyro præparatum fuisse, pro necandis muris repositum, ex errore verò à quodam de-utitum, innoxium fuisse; quia butyri pingues particulae, arsenici particulas acres virtutes inviscabant, imò post bihorium, merente Mercurio vitæ rejectum: quod etiam cit lac; temperant enim hæc pingua arseni-virus, & temperaturâ texturam invertunt: vid. Bartholini *Acta Hafniens. Vol. 2.* Cæ-terum id fieri in febribus malignis puto, ubi mentum malignum acre per corrigentia alexipharmaca in sua textura materiali muta-ur, ut fiant temperantia, quod pluribus modis potest fieri, sicuti dictum; hinc etiam randoque experimenta variant in uno co-muniquo morbo.

In nostro casu ergò alexipharmaca corri-gentia probabilissima sunt vel acida, vel fixa-per nitro-sulphurea.

Inter acida, excellunt acetum, succus i, ~ nitri, & sulphuris. Inter fixa, sul-ura mineralia fixa, terræ minerales fixæ, artes animalium sine igne præparatae. Aci-ista notissima sunt, quantum valeant in e febribus. Hinc in constitutione mali-epidémica acetum camphoratum est tu-num præservativum, temperans volati-na fermenta maligna; camphora enim abilibiter penetrans pinguedo est, quæ liciter temperando suam vim exerit. ita acetum sub cursu febrium maligna-rarò omittendum suadetur; non secus itro & spiritu nitri constat, quod acidum, uti in quibuscunque febribus ardenti-, ita & malignis, proficuum sit: Hinc & imonialia fixata ratione acidi nitri concen-trim ipsis conducunt, sive jam in humida ma, spiritus nitri bezoardicis mineralibus mbinetur, sive in via sicca per liquefactio-n cum nitro in antimonio diaphoretico; itroque enim modo substantiæ nitrosæ i regulo antimonii connexio fit mediante cum sulphure antimonii. Et sanè, ni-in præparatione antimonii diaphoretici attingit sulphur antimonii, sed rodit re-n, mediante quo postmodum etiam in ur antimonii operari potest. Quoad ur: hujus acidum est egregium quoque

[Com. II. Pars 2.

in febribus malignis & pestilentialibus, hinc post spiritum nitri spiritus sulphuris in tali casu optimo consilio Julepis addendus. Post spi-ritum sulphuris laudantur liquores sulphurati juxta Helmontium *Tract. Tumulus Pestis*, & Cnœffellius *de Febribus Epidemicis*, tam præservativè quàm curativè: Sic quidam Practicus optimum observavit Julebum se-quentem.

℞. *Liqu. Æat.* ℥ijss.

▽ *lactuc.*

Cichor.

fl. Sambuc. ana ʒvj.

succ. Citri ʒss.

℞i *diat.* ʒss.

Syr. acetos. Citr.

ribium ana ʒss.

~ ℞i gutt. xxx.

Misc. pro Julebo.

Quoad fixa autem: in specie excellunt sulphura mineralium, partim propter acidum nitrosum fixata, partim propter acre alcali-num agens in particulas sulphureas, & sic semper mitigantur & corriguntur: Item ter-ræ mineralium fixæ, & partes animalium fixiores.

Quoad secundum scopum: inter sudori-fera primatum obtinent partes animalium, tam earum salia volatilia, quàm sine igne cal-cinata. In horum verò & corrigentium & sudoriferorum selectu semper observandum est, an magis malignitas, an magis sympto-mata febris ardentis urgeant? Si prius: tu-tius dictorum animalium salia volatilia eli-genda, cum debitis alexipharmacis mixta; si verò posterius, volatilibus cautius utamur, & potius fixiora, & acida non nihil alexiphar-macis mixta, conveniunt. Ex his animalium partibus & gelatina cornu cervi in febribus malignis egregia, quodcunque acre tempe-rando, quæcunque symptomata leniens, quia per liquorem sui nutritivum acrimoniam malignam corrigit, & simul ratione salis vo-latilis temperati ad blandam diaphoresin disponit. Camphora etiam ad quæcunque symptomata egregia est; sed non omnes fe-runt hanc: quibuldam mulieribus infert pas-sionem hystericam; item qui habent spiritus animales texturæ rarioris, ut eruditi, his camphora est nimis gravis, perturbat men-tem.

Sudoriferis autem subinde interponenda sunt acida, ut sanguini redeat debita consi-stentia, & vires per sudorem perditæ restau-rentur, imprimis, si sudor salibus volatili-bus prolicitus fuerit; sola enim sudorifera, præsertim alcalina aut fixa, sine acidis inter-positis non sufficiunt, cum ægri nimis debili-entur. Si post sudorem ægri fiant vege-tiores, sudoriferis insistamus. Sed in &

[11]

post

post sudorem in febris malignis observandus semper pulsus ad cognoscendam magnitudinem & vehementiam: nempe si in sudore fiat magnus vel nonnihil major, qui ante eum erat parvus, bonum signum est; vel si post sudorem, sedatâ sanguinis turgescentiâ, inde paulò major deprehendatur, quàm ante sudorem, bonum signum erit, speciatim si simul vehementior nonnihil post sudorem evadat: econtrâ si in sudore parvus sit & etiam post sudorem eodem in tenore perduret, aut minor evadat, pessimum est.

Cùm verò ægri post sudorem in febris malignis multum debilitentur, convenit hic imprimis vinum generosum, propter suum acidum summè analepticum; confortativum enim est optimum post sudorem, tam interius, quam exterius.

Cæterùm in nostra ægra, in qua febris maligna admodum adest, juncta cum diarrhœa colliquativa, quæ ceu maximè urgens symptoma sui meretur considerationem, antea dictæ obtinent Indicationes; nam correcto acri colliquante veneno, ceu fermento maligno, còque per sudorem evacuato, spontè cessabit diarrhœa. Conveniet siquidem mistura alexipharmaca; quam ingreditur electuarium diascordii Fracastorii, cujus loco electuarium diascordii correctum à Sylvio, vel Theriaca, substitui potest; item Jubelî citrati & nitrati, nec non pulveres ex fixioribus parati: Quibus, si adjungantur moderata opiate, citior successus sperandus; Unde compositiones theriacales propter opium hic primatum obtinent, in misturis propinatae. Non ergò diarrhœa hæc adstringentibus, quatalibus, est curanda & statim supprimenda, quin secus graves præcordiorum anxietates, singultus, nausæa, speciatim inquietudines & cephalalgia intensissimæ inducerentur, si simpliciter adstringentibus insisteremus, quia adhuc adest motus & orgasmus humorum in primis viis; dein nec diarrhœa hæc per se simpliciter curanda aut sistenda venit, sed fomiti virulento potius occurrendum est; sic spontè cessabit; applicando saltem ratione illius externè Theriacam, cum vino generoso acidulo subactam sub forma epithematis, fervidè stomacho & hypochondriis, sæpiùs repetendo, sicut internè pro scopo sistendi turgescentiâ simul & fermentativum succorum circa hypochondria & colliquefactionum impetum propinari possunt cornu cervi sine igne, terra sigillata, bezoardicum Martiale, antimonium diaphoreticum Martiale, &c. Adeoque in nostra ægra vocatus præmissi misturam theriacalem superiùs allegatam, à cujus usu bis sudavit. Possset etiam præscribi sequens Pulvis:

℞. *ſii diaphor.* ℥ij.

☞ *ſigillat.* ℥j.

Laud. opiat. gr. ij. vel *Ext. theriacal.* gr. vj.

M. f. Pulvis. div. in 2. part. æqual.

Quæ capiantur in vehiculo calido & acidulo. Hinc quiescat ægra, cui si sudor superveniat, eo melius est, aut si blanda diaphoresis subsequatur.

Sed quid agendum, si ægræ nostræ, in tali statu enarrato constitutæ, superveniret menstruatio? Resp. consideretur.

1. Tempus morbi.

2. Tempus menstruationis: an legitimum? an, quod sæpiùs fit, anticipaverit?

Utrumque motum naturæ excretorium ostendit. Considerandum: an magis criticus? an magis symptomaticus? Sic ergò menstruatio debitò modo & in legitima quantitate, & sine gravioribus symptomatibus superveniat in incremento morbi; tunc naturæ linquendum directorium est; cessabit enim hujus fluxu diarrhœa: de cætero consuetis remediis insistendum, nec nimis acida usurpanda. Sin verò deficiat, & hinc symptomata præcordiorum, atque abdominis tormina & similia affligant, tunc quidem pariter diarrhœa exin sistitur, at malo omine: interim suprâ dictis medicamentis addantur volatilia & myrrhata, moderata tamen in dosi, ut unâ superveniente sudore moderato nonnihil stimuletur dicta sanguinis excretio, idque speciatim, si vires ægræ hoc permittere videantur. Sin verò nimis fluat menstruatio, hæc suppressenda nonnihil; periculum enim ingens innuit, præsertim si forsan excretio cutanea expectetur, ne inverso sic naturæ motu imminentes petechiæ impediuntur, unde in talicasu acidula & remedia terrea, v. g. mineralia blande adstringentia, in usum vocentur; aut quoque opiate cum alexipharmacis maritentur; sic enim ipsis nimius mensium fluxus sufflaminabitur. Si verò in statu superveniat, in quo jam petechiæ efflorescunt, magis suspectus est, ne retrocedam. Consideranda ergò

1. Euphoria ægri.

2. Signa in urina coctionis.

3. Antecedentia fluxum hunc quasi criticum plus minus indicantia.

4. Quantitas, an debita? an excessiva? an defectuosa?

Si ergò in statu, debito menstruationis tempore, debita quantitate superveniat, linquatur; saltem diaphoreticis excretio cutanea conservetur: si excedat, nonnihil cohibeatur: si deficiat, volatilibus excretionem cutaneam unâ promoventibus adjuvetur: si verò anticipet sine prodromis circa lumbos, instantis talis hæmorrhagiæ signis, citra coctionem

urinae,

urina, adeoque periculum est, ne petechiæ retrocedant, aut saltem debita excretio & discussio impediatur: si excedat, præsertim sistatur moderatè, semper diaphoretica solvendo: si verò indicia præfata præcesserunt, & ægræ euphoria adsit, relinquatur, nisi summe excedat: si deficiat, promoveatur blande. In genere minus noxiam in petechiis observavi menstruationem.

Sed quid? si symptomatibus præfatis instantibus copiosæ erumperent petechiæ & octavo morbi superveniret copiosa hæmorrhagia narium? Rarò critica est, facta in petechiarum eruptione: si ergò symptomatologica, coercetur per bufones.

Sed quid? si ex contagio febris maligna: id quod præter ægri relationem anxie præcordiorum, aliaque symptomata, venter imprimis, edocent; quæ innuunt succum corruptos circa primas vias, aut ipsum machum à contagio affectum, in principio vocatus Medicus vomitorio instet; sin in incrementum & altero jam morbi die cum diarræa colliquativa, propter hanc omittat; si nulla talis adesset excretio symptomatologica.

Si vires ægri ferant, & adhuc fermentum lignum præcordia magis afficere videtur, in incremento provocet vomitum, non propter minus celerem harum febrium terminum tempora sint longiora particularia, tantum periculi ac ipsi auctioribus: e. g. in meo die Martis dedi vomitorium, cum die Solis Potionem theriacalem acce-

venæ sectio nil præstat.

CASUS XXXVI.

VARIOLÆ.

*assantur hoc tempore hic passim variolæ; hinc puer decem annorum, die virii è lecto surgens, post noctem in-
m, conqueritur de intensa cepha-
dolore spinæ dorsæ, aestu corporis,
præcordiorum anxietate, vesperi
& continui vomitus, & frequen-
tes vomendi conatus superveniunt,
amosa urget, quicquid tamen propi-
subito vomitus impetu rejicitur,
inquieta, uti & insequens dies. Die
is manè cessat vomitus, efflorescunt
vide macule & pustule parvæ, ru-
minatæ per corporis peripheriam,
iosâ narium hæmorrhagia comita-
æ subinde cessat, subinde repetit.
atroces insultus epileptici super-
successivis vicibus per noctem
es. Die Saturni omnia quieta,
copiosiores intumescunt, ægro in-
modum siticuloso; à meridie diar-
a. II. Pars 2.*

*rhæa spumosa ægrum prehendit, anxium
eum reddens, viresque dejiciens. Queritur, quâ ratione hic affectus curandus?*

RESOLUTIO.

Affectus sunt Variolæ jam efflorescere incipientes, & ad statum properantes.

Subjectum invasionis est nunc massa sanguinea, nunc cutis.

Distinguendum autem tempus ebullitionis & excretionis: Ebullitionis distinguitur in quatuor primos dies: Excretionis usque ad septimum; octavo incipit suppuratio; nono jam suppuratæ sunt: ita ut variolæ sint morbus criticus, ut sanguis quasi depuretur, & heterogeneam spumam in peripheriam corporis quasi deponat. Pro varietate tamen circumstantiarum, vel promoventium vel impediendum naturæ motum, nunc tardior nunc citior solet esse excretio, ut quandoque ad diem vigesimum tempus excretionis fuerit extensum.

Quoad subjectum radicationis: dubitatur, an illud stomachus esse possit? siquidem omne acidum, excepto corrosivo, stomacho est amicum. Posito, fontem variolarum nobis esse congenitum, hinc porro queritur: ubi fermentum variolarum radices primas fixerit? an in sanguinea massa? an vero in stomacho? si à lactis nutrimento originem duxerit. Ratione illius nulla ratio persuadere videtur: ergò potius massa sanguinea erit fomes; unde postmodum fermenta variolarum in actum deducuntur.

Fermentum variolarum nobis firmiter esse impressum, illustrat:

1. Observatio Drelincurtii, quod mater gravida assidens puero variolis correpto, puero convalescente eadem infantem variolis repletum enixa sit.

2. Quod ferè universalissimus morbus sit, qualis aliàs non datur, adeoque ex causa omnibus communi & inevitabili ortum habet, eoque infantibus speciatim familiari.

3. Sympathetica exempla, radicem in vitalibus ferè principiis ostendentia: vid. Bartholinus in *Act. Med. Hafn.* ubi habet exempla eodem tempore variolis infectorum, & eodem temporis puncto iisdem intereuntium: Vid. etiam Grube de *Transplant. morbor.*

Causa proxima est acidum fermentativum, cujus sententiæ primus Autor est Sylvius lib. 4. *Prax. Traç.* 1. c. 9. & confirmatur exinde, quia omnia symptomata sub variolarum cursu observabilia sunt talia, quæ ab acido derivari, & explicari queant. Etenim acidum hoc in variolis effectivè peccare, persuadet

(1) Pustularum conditio: quippe hæ sunt rubræ, prurientes, dolentes, rodentes, ardentes;

[Ii 2] hinc

hinc abeundo in pus crustam faciunt, & tandem foveam relinquunt. Pustulae autem hae, quò magis rubent, eò potentiùs acidum reconditum monstrant, & sunt meliores; at verò si ex alcali acri dependeant eadem, pallescunt, & tandem livescentes nigrescunt, quod signum est mortificationis sanguinis. Adeoque meliores pustulae sunt rubrae; nigrescentes verò & lividae pessimae, & subinde lethales: unde sicut in rubris major est ardor; ita in lividis & nigricantibus nullus pruritus, tandem sensus penitus deficit, & partis mors. Ardor enim, rubor, pruritus, &c. sunt signum acidi. Cæteroquin nascitur pus ex sanguinis sale volatili oleoso, ab acido variolarum per præcipationem in corpus ejusmodi album salsum, pus, mutato; non secus ac crusta sequitur erosionem partis, factam ab acido: quemadmodum enim alcalia acra partes membranaceas dissolvunt in liquamen putrilaginosum; ita acidum rodit easdem in crustas. Tandem fovearum vestigia sunt cicatrices, factae in cute & cuticula, erosio prius ab acido peccante, quod patet exinde, quia foveae spissiores in substantia sua sunt, quàm vicina cute non erosa: deinde etiam, quia in foveis variolarum non procreascunt pili.

(2) Probant corrosiones partium etiam duriorum: sicut enim observavit Paræus, ossa etiam fuisse erosa in variolis: ac nil novi est, fauces palatumque erodi, & ulcera oris gravia variolis supervenire; itemque os nasi arrodi, & ozænas variolas insequi: imò hinc inde ulcera depascentia ex acido concentrato relinqui.

(3) Ulcera pravi moris partibus subinde supervenientia: Ita curiosum est, quod refert Drelincurtius in *Diff. de Variol.* mulieres lactantes pueros variolis obsessos ulcera mammas erodentia periculosissima incidisse, contagio variolarum acido ex infante in mammas derivato, ibidemque exulcerationes inferente.

(4) Considerationem meretur, si non identitas, saltem analogia scabiei seu tinearum^t capitis, & achorum cum variolis: ita enim pluribus pueris tineâ caput tempore variolarum non rarò incrustatur, & facies achoribus obsidetur. Ex quo patet, utrorumque affectuum eandem esse rationem; jam verò ibi peccare acidum, notum est.

(5) Juvantia, quæ talia in se sunt, ut vel positivè acidum corrigant, vel privative illud absorbeant. Inter positivè agentia excellent alcalia fixa & volatilia, præsertim volatilia, sine quibus graviorum symptomatum, præsertim variolarum cura, contra vulgarem sententiam ferè impossibilis est. Juxta hæc salia fixa alcalisata sunt egregia.

Accedit Mercurius dulcis, qui præservativè & curativè in variolis egregius est, imò sicuti Mercurialia sunt appropriatum alexipharmacum veneni acidi in lue Venerea, ita etiam propria panacea acidi virulenti in variolis. Inter privativè verò absorbentia fixa sunt terrea, ut cornu cervi, terra sigillata, unicornu fossile, & similia.

Cum autem ægri, sive adulti sive infantes, variolis correpti subinde per universum corpus communi quasi crustâ cingantur, non putandum: omnem istam materiam, quæ in pustulas congeritur & efflorescit, primitus in corpore latuisse (*wie sie pflegen zu sagen / wenn viel Böses darinnen steckt / so müsse auch viel Böses heraus*) cum in tenellis & adultis æqualiter universum corpus affligatur; sed ista materia fit demum sub cursu morbi tempore ebullitionis, per alterationem & corruptionem massæ sanguineæ ac lymphæ à fermento variolarum: Nempe fermentum acidum morbosum est, quod later absconditum in massa sanguinea, & data occasione exfuscitatum, insignem motum fermentativum excitat, sub isto motu sanguinem & lympham alterat, corrumpit, & in sui naturam transmutat, quæ particulae tandem sub cute & cuticula defiguntur, & pustulas excitant.

Quod lymphæ etiam potissimum sit inquinata & alterata, loquitur Tussis, in principio variolarum sicca & cruenta, postmodum humida evadens; item oculorum affectus sub cursu affligentes: qui subinde à lymphæ lachrymali acri alterata eroduntur, admodum dolent, & occasione erosionis pannos atque nubeculas contrahunt; sicut etiam faucium & oris vitia: cum enim frequentiores glandulae collum & fauces obsideant, hinc variolis laborantes, ex lymphæ præternaturali rauci evadunt, etiamsi variolæ easdem non obsideant, & excoriationem faucium exulcerationemque patiuntur (quæ vitia conspirant cum vitis in lue venerea) imò non rarò post tussim asperâ arteria erosa, à destillante lymphæ quoque pulmones nonnunquam eroduntur, sic phthisis supervenit. Unde cadit præconcepta opinio, eos, qui vel achoribus vel scabie antea laborarunt, aut adhuc laborant, minus variolis affligi; siquidem in Fehr *de Scorzon.* & Heinrico ab Heer, prostant observationes, actu scabiosos etiam variolis fuisse correptos: quin potius, quorum sanguis magis vel minus alterabilis est, aut quorum fermentum morbosum magis vel minus acre activum, plus vel minus variolis inquinari.

Causa remota, quæ exfuscitat fomitem antea absconditum, est aeris vitium epidemicum. Considerandum autem, quâ ratione aer concurrat, quod tantoperè grassentur.

Conta-

Contagia ista esse non à solo aëre, patet, aliàs etiam bruta affligerentur. Contagia igitur ex agris expirata non excludenda, utut hæc approximantes saltem inquinent. Scilicet præterita æstas (sub cuius canicularium dierum declinatione variolæ incipientes, ad hoc usque tempus adhuc dum grassantur) admodum fuit humida, & crebrioribus imbribus combinata, nec solum aëris humiditas aderat, sed etiam tres insignes exundationes nostra & vicina climata inebriarunt. Imò cum hac æstas minus fervida, sed moderatè tepescente, autumnus similis tepediufculus illucebat, imò per hyems, præter octiduum durante illo, illa sed semper squalida fuit. Ex hisce ergo tepidis & humidis temporibus, cum inundationibus allegatis, incedentibus etiam floribus fracidis & putredinosi, non potuit aër alterari, ita ut hic humidior semper moderatè calidus frigidusque, passus fue-
 hebetationem salis sui universalis nitrosi; ipse quod à dicta humiditate plus minùs sida & putredinali resolutum, sicque intactum, non suffecit sanguinis volatilifacii promovendæ, neque ejusdem fermentationi, neque transpirationi: hæc enim tria cessario in omni vivente à sale hocce aëris versali expectanda sunt. Unde dum aër æcto, sal ejusdem universale nitrosum in redditum est, hinc ab eodem aëre humi-
 emperato, & sic putredinosi effluviis plus us inquinato, sanguis alteratus fuit, hinc is spirituosus factus est, sed potius ad simi-
 putredinalem alterationem & resolutionem massa sanguinea non nihil disposita fuit, ut ejusdem constitutione exaltatum & versum quasi fuit alcali volatile sanguis-
 contra oleum seu sulphur ejusdem balsam quasi dissolutum, oppressum, & introversum, unde sub tali occasione tantum in adultis febres ardentes mali-
 ex genere petechialium autumno grassant, sed etiam in tenerioribus subjectis, in massa sanguinea minùs oleosa, sed iufcula temperata existit, speciatim ta variolarum acida resoluta & excitant, quæ se exerendo, cum alcali san-
 effervescente, & hinc massæ sanguis-
 samum, olei tegmine destitutum, al-
 & in sui multiplicatione eandem magisque corrumpere potuerunt. Cate-
 nile quid commune vitium antecedere
 olis, confirmare videtur commune
 ilicircularum euporiston, dum nem-
 ræ, quæ ratione virtutis suæ balsami-
 rporibus mortuis à putredine con-
 insignis est, tam in præservandis
 randis variolis, primatum tribuunt,
 do, eam in substantia, item essen-
 thæ cum spiritu vini tartarifato, nec

non elixir proprietatis cum & sine acido; si-
 cut eadem quoque curativè etiam in declina-
 tione, ne partes à variolis noxas contrahant,
 sunt egregia. Prout ergo ab hac aëris consti-
 tutione massa sanguinea plus minus alteratur,
 & ad putredinem disponitur, eatenus vario-
 læ nunc plus nunc minùs observantur mali-
 gnæ & periculosa; sicut etiam hoc tempore
 minùs malignæ sunt. Conf. observatio Fo-
 resti lib. 6. obs. 44. ubi ante centum annos
 dispositio aëris humida, tepida, &c. similem
 grassationem variolarum per Belgium univer-
 sum intulit.

Quoad symptomata febrilia nostri casus:
 ea simpliciter ex acido variolarum fermenta-
 tivo, cum alcali sanguinis effervescente, de-
 ducenda sunt. Sic enim Cephalalgia oritur
 ex solo impetu sanguinis ebullientis, quod
 probat pulsus concitatus, & in princi-
 pio admodum magnus. Sitis clamosa, an-
 xietates præcordiorum, vomitus, superv-
 niens alvi fluxus spumofus, originem ducit a bi-
 le, quatenus hæc à fermento variolarum acido,
 bili contrario & hostili, mediante communi
 circulo eidem permisto, alterata & vitata
 fuit; unde ipsa in præternaturalem orgasmum
 seu turgescentiam in intestino duodeno con-
 citata, amaritie suæ, à fermento morbofo
 magis extraversa, sitim, vomitum, & post-
 modum diarrhœam spumofam unà excitat:
 ratione cuius diarrhœæ observavi, excreta
 aliquoties strophiole excepta, instar ovi
 conquassati apparuisse, nihilque materiæ,
 præter spumam eidem induxisse; hinc dicunt:
**Es gehet ganz gâschicht von ihm / es siehet
 auß wie Hefen /** propter fermentalem orgas-
 mum bilis & acidi. Sanè spuma hæc fit ab
 agitatione pinguidiusculi, eaque vel per vim
 externam conquassando, v. g. cum baculo in-
 ductâ, vel per internum effervescentiæ mo-
 tum factâ. Hæc diarrhœa spumofa excita-
 ta fuit per vim internam fermentativam, bile
 in orgasmo constitutâ, cum acido fermento
 variolarum concurrente: Sic etiam bilis in-
 quinata ab acido fermentativo variolarum,
 istas turbas præcordiorum infert? ex quo
 puncto etiam derivatur diarrhœa spumofa in
 incremento & statu variolarum, hoc in agro
 se conspiciendam præbens, quæ innuit hu-
 morum peccantium in motu enormem ataxi-
 am, etiam eorum corruptorum & depravato-
 rum inordinatâ fermentationem: unde & bilis
 hinc corrupta, & uberius expulsa, occurrente in
 intestino succo pancreatico itidem acriori, di-
 arrhœam spumofam hanc & plerumque lethale-
 m, post se trahit: ut taceam, ex acriorum horû
 succorum concursu mixturam quandam ter-
 tiam enasci, analogam cujusdam purgantis
 acrioris succo, quæ si per errorem in mas-
 sam sanguineam derivetur, promovet hujus
 [1] 3 effe-

effervescentiam, & colliquationem, specialiter ad locum irritatum, intestina scilicet tendentem, sicque alvi excretiones causantem. Dejectiones ejusmodi sunt foetidissimæ, dicunt: *Es stincket wie faule Eyer* / & recte: quippe in ovis abundat sal volatile cum copioso oleo; hinc sub putrescentia ovorum sal volatile, dissolvendo copiosius oleum, foetorem tam perditum concitat. Simili modo secessus & flatus variolis affectorum foetidissimi dependent ex miscela succorum primarum viarum corruptorum, destructa præsertim vi bilis balsamicæ ab acido; unde myrrha tam bilis defectum, quam ejusdem balsami corruptelæ prospicit. Die quarto, nempe efflorescere incipientibus variolis, narium hæmorrhagia interpolata superveniebat, quam excipiebat epilepsia, hanc verò diarrhœa spumosa.

Epilepsia frequens est symptoma variolarum, oritur à vellicatione nervorum ab acri fermento maligno, sed in principio aut incremento, ante & etiam in eruptione, neminem terreat; si verò post eruptionem superveniat, pessima est; innuit enim non sufficientem exclusionem variolarum, unde periculosa symptomata infert. (2) Fit nunc cum, nunc sine consensu abdominis. In infantibus frequenter ex consensu abdominis oritur, unde vel imminente vel præsentē epilepsia abdomen circa vel infra regionem umbilicalem sæpè tensum est. Item observatur, quod interdum infantes epilepsia corripiens non cesset, nisi vel vomitus, vel copiosi secessus per alvum, superveniant, in quibus casibus signum est, consensum partium abdominis vellicatarum supervenisse.

Quoad Hæmorrhagiam: illa etiam non rara est in variolis, varias partes interdum affligit, præ ceteris tamen observatur narium, alvi, vesicæ, unde fluxus alvi cruentus, & mictus cruentus. Hæmorrhagia narium, præsertim quæ in incremento morbi ante eruptionem venit, est simpliciter per anastomosin seu apertionem vasorum capillarium, propter sanguinis turgescientis impetum, non à fermento acri variolarum, quia tunc nulla adhuc materiæ secretio facta est; quæ fit demum, quando pustulæ efflorescere incipiunt. Mictio verò sanguinis & dejectiones cruentæ quandoque in statu, separatione jam factâ, & quando variolæ etiam partes internas obsident, superveniunt. Exemplalia partium internarum variolis obsitarum non rara sunt: hinc viscera & partes membranose faciliè eroduntur, erosa, cum sint partes nerveæ, quibus aliàs acidum maxime hostile est, faciliè in gangrænâ & corruptionem sui abeunt, unde tandem supervenit mictus cruentus, & alvi fluxus cruentus, ut

plurimum indolentes; quæ excretio sanguinis indolens est signum non solum erosionis, sed etiam gangrænæ; hinc tales excretiones sanguineæ in variolis ut plurimum sunt lethales: Vid. tamen Hœchstetterus, qui habet exemplum mictus cruenti in variolis non lethalis. In diarrhœa variolarum, præsertim in incremento & statu, insinuat in signis humorum depravatio, unde ex bile corrupta, & in intestinum duodenum expulsa, concurrente succo pancreatico acidiori, adest diarrhœa spumosa. Duorum horum acrium concursu fit mixtura quædam tertia, analoga cuidam succo acriori purganti, quæ massæ sanguineæ permixta eandem colliquefacta, unde succorum colliquatorum motus ad intestina, & per alvum secretio. Narium autem hæmorrhagia in incremento & principio si moderatè fiat, & continuò sanguis stillat, bonum signum est; hoc modo enim orgasmus sanguinis tandem tepescit, & minor fit variolarum copia. Jam verò in nostro ægro subinde cessat hæmorrhagia illa, subinde autem repetit, quam insequitur epilepsia; unde verissimum, juxta Hippocratis effatum: *Stillicidium narium pessimum*; innuit enim deficientem naturæ seu spirituum moventium impetum in suo motu, quo non sufficiente, nihil boni augurari possumus; non secus ac Stephanus in Oper. Medicis testatur, ægris in febribus ardentibus & malignis crebrius nares fricantibus, malum signum denotari; innuit enim quandam molestiam circa nares, oriundam ex conatu naturæ, sed non sufficiente. In nostro ergo ægro fatiscentem naturæ motivam arguimus. Posito autem, hæmorrhagiam largiorem nec interpolatam esse; tamen superveniens eidem epilepsia, pessimum omen est; contra si epilepsiæ hæmorrhagia supervenisset, bonum fuisset; cessat enim tunc epilepsia: sed si fit modo inverso, malum est; innuit enim naturam motu critico per hæmorrhagiam non suffecisse materiæ vel etiam productæ morbose eliminando, quod omne resistans fermenti variolarum delatum fuerit in genus nervosum.

Sed quid sibi vult diarrhœa spumosa, epilepsiam cessantem insequens? Posset illa videri critica, quia die quarto supervenit: verum ea, denotans saltim insequentem naturæ & causæ morbificæ luctam, non fuit critica, sed potius symptomata, naturæ impetu à genere nervoso ad alium locum, delata. Probatur:

(1) Quia est foetida & spumosa.

(2) Quia æger est admodum anxius, & vires ejus deiciuntur, nec percipit levamen;

(3) Quia efflorescentibus jam variolis materia producta ad cutem extraverti, non verò ad intestina derivari debuisse; adeoque hinc

hinc metus est, ne diarrhœa crescente æger variolis disparentibus detrudatur ad orcum.
Ex his ergo patet etiam

P R O G N O S I S.

Æger versatur in periculosissimo statu, ob ultima symptomata in principio status emergentia: nam variolarum excretio promovenda est. Jam verò si sistitur diarrhœa, periculum imminet, ne recrudescat epilepsia; si verò permittimus hunc fluxum, periculum est, ne variolæ iterum evanescant, aut ne excretio earum impediatur, & æger intereat.

C U R A.

Quoad Curam propter orgasmum massæ sanguineæ & lymphæ, qui oritur ab acido insigniter turbante massam sanguineam, hoc corrigatur vel absorbeatur. Quæ absorbent, sunt terra sigillata, cornu cervi, ut dictum: tribus addenda sulphurea antimonialia. Quæ resistivè agunt, sunt alcalia fixa & volatilia; de enim volatilibus salibus non possunt curari ægri, & utut instar ignis æstuent, non fugias tamen volatilia. Quando ægri maxime fuerunt inquieti, dedi liquorem cornu cervi succinatum, & quàm mirum redditi sunt quieti & placidi. Opiata saltem in principio addantur, ne impendant crisin. Ductio tamen motuum criticorum observanda est: Non enim opium impedit simpliciter excretionem criticam, sed tunc temporis, quando imminet excretionem criticam medicibus simul partibus organicis, cujus præconitur irritatio quædam à materia morbi, v. g. in purgatione per alvum &c. qui ellicatis, adeoque sensu eorum affecto, clauduntur per eas excretiones; & tunc opium sistit excretionem criticam quaslibet: aut fit tunc sine talium partium activo & motu, nec cursu per simplicem humorum alterum motum, speciatim tunc transcolatur, ut per urinam, aut sudorem, &c. & laudanum opiatum non impedit, inter alia potius impediencia symptomata sistendum movet crisin. (2) Subinde instant ægri anxii, quæ anxietates impediunt excretionem criticam naturæ motum: hoc ne fiat, tunc opiatum exhibeatur, quod has anxietates impedit, & tales excretiones promovet; hinc etiam in variolis pro scopo excretionis, in epilepsia, diarrhœa, &c. est opiatum: hinc in infantibus, ubi non possunt dare laudanum opiatum, hujus loco sufficit Theriaca, addito gr. j. ij. iij. &c. remediis. Interdum in infantibus sic

C. C. f. Δe (si adest malignitatis suspicio ad antimonialia fixa accedendo) *Δj.*

Θz Card. bened. gr. jv.

Myrrha

Theriac. ana gr. ij.

M. f. Pulvis pro una vel duabus dosibus, ratione ætatis.

Vel *℞. C. C. f. Δe Δj.*

Θ vol. C. C.

Viperar.

Theriac. ana gr. ij. M.

div. in 2. part. æquales,
pro infante 3. vel 4. annorum.

Gelatina cornu cervi est optima pro sistendo orgasmo nimio.

Quoad nitrata: usurpentur cautè, (quoad sitim,) quia alvum laxant, cujus fluxum disponere periculosum est; & melius est, habere alvum constipatam non nihil, quàm humidiores. Emulsionibus, quibus myrrha additur, præfertur illa Zwelfferi cum cortice citri, sub nomine Liquoris alexipharmaci in Pharmac. Reg. Zwelfferi pag. 209. Stercus equinum præsertim egregium est in præservandis faucibus in variolis; sistit enim æstum febrilem, excretionem per sudorem promovet, & alterando lympham fauces præcavet. Pulvis epilepticus antimonialis & liquor cornu cervi succinatus, suffecere mihi in cura epilepsiæ variolarum. Pro epilepsia datur infantibus unius anni gr. j. duorum gr. jss. cum ebore sine igne vel unicornu. Interdum vomitum movet, interdum copiosos secessus, interdum sudorem & somnum infert, & si non primâ vice epilepsiam frangit, tamen secundâ vice; si revertitur paroxysmus, liquor cornu cervi succinatus sufficit, qui ad gutt. viij. x. vel xij. epilepsiam infantum, in principio vel incremento variolis supervenientem, sistit. Et in specie in principio morbi libenter dedi hunc pulverem, quia copiosè subinde vel per vomitum vel per secessum evacuavit primas vias. Et posito, quod infantes non habeant epilepsiam; si tamen habeant anxietates, in talibus liquor cornu cervi succinatus me nunquam deseruit.

Mercurius dulcis est appropriatum in variolis, in principio & sine curæ propinandum.

Verum in nostro agro, cum quarto demum die, ubi jam efflorescerent variolæ, post hæmorrhagiam epilepsia supervenit, & alvi fluxus adfuit, quid agendum? Observandum: Diarrhœam hanc colliquativam, & quæ impedit prurptionem variolarum, esse sistendam; ne verò vel epileptici insultus, vel hæmorrhagia narium, vel symptomata facultatis animalis recurrant, diaphoresis sensilis promovenda: ob id terra sigillata cum diaphoreticis mista convenit: spumosa adeoque cum sit diarrhœa, effervescentes succos hæc simul

simul compefcit; ob id & corallia rubra simul addi poffunt. Ergò faltem

1. Acre vellicans in intestinis temperetur.

2. Orgafmus fuccorum effervefcentium, præcipitantibus corrigendus.

3. Cum dictis unà per fixa, fudoriferis volatilibus fociata, motus excretorius criticus ad peripheriam corporis adjuvetur.

4. Si quæ adfuerint anxietates & gravia fymptomata, quæ hos fcopos impedian, illa blandis opiatif vel theriacalibus amoveantur: etenim hæc in variolis egregia funt, præfertim pro fcopo diarrhœæ præfervandæ; ficut etiam pro expellendis variolis.

Pro primo ergò & fecundo fcopo conducit terra figillata, aut cornu cervi uftum, aut etiam creta, corallia, &c. Pro tertio proficua funt fixiora, maritata volatilibus, fale volatili viperarum, &c. Pro ultimo fcopo etiam laudanum opiatum fermentatum, adeoque hujus gr. j. infantibus pro 4. dofibus, vel theriacæ gr. j. vel ij. vel iij. vel extractum theriacale in fufficienti & debita, minimâ tamen femper dofi, aliis adduntur.

Hæmorrhagia autem, imprimis in adultis, vehementer interdum urget, in fpecie quibus non fecatur vena: ubi obfervetur, ne præpofterè motus fanguinis fiftatur, vel ftypticis aliorum redigatur. Meretur ergo notationem obfervatio Willifii de Febribus, qui beneficio bufonis fub axillis applicati curavit hæmorrhagiam, quod etiam valet in febribus malignis.

Interdum petechiæ junguntur variolis: Sic cuidam virgini petechiali laboranti præfcripsi medicamentum ex antimonio diaphoretico, pulpa citri &c. quo in continuo dolore curabatur, & petechiæ copiofæ prorumpébant; postmodum verò infigni hæmorrhagia corripiebatur: hujus verò mater fumpfit duos bufones, quos vivos contulit, & axillæ agræ alligavit, unde omnis hæmorrhagia ceffavit.

Alias Curam Anno 1675. & 1676. fequenti ordine inftitui: Nempe fi mox in principio, ubi infantes hoc morbo agrotare inceperunt, vel fecundo die vel quando præcedente die conquæfti fuerant, advocatus, ut plurimum principium curæ feci à fpecifica laxatione per Mercurium dulcem, nifi aliud obftiterit, vid. M. A. N. C. *Ann. 3. Obfervat. 9. pag. 13. & Obfervat. 56. pag. 93.* Adeoque pro ratione ætatis, infanti v. g. unius anni, dedi gr. j. pro bimulo gr. ij. trimulo gr. iij. & fic confequenter, cum paulula confervæ rofarum quantitate in forma boli, quia fic facilius deglutiunt; Si enim Mercurius dulcis in vehiculo calido per fe, præfertim in cochleari metallico, exhibea-

tur, periculum eft, ne metallo is adhæreat: fic quidam hinc plus, quidam minus laxati fuerunt; interdum vomuerunt, quod femper libentius vidi; interdum fine vomitu fimpliciter per alvum operabatur; interdum etiam planè nihil operatus fuit, pro conditione fcilicet fubjectorum; Ut itaque mercurius dulcis primarium fit variolis proficuum purgans: Ac in primo variolarum principio exhibitus, vel impedit omnimodam earundem invasionem, vel facit, ut facillimè & citò erumpant. Leviter acuari poteft cum pulvere jalappæ vel scammonio ꝑato, quatenus forfan aliquid faburræ primarum viarum, naturæ postmodum moleftum, tollunt. Alia Purgantia vitanda, utpotè facilè hypercatharfis moventia, & variolarum eruptionem turbantia; qualia exempla funefta ubivis obvia funt.

Sin verò morbus ftatim graviùs affligeret, & quidem mox cum virium prostratione, æftu, corporis jectigatione, ac convulfionum metu, tunc mox in primo principio dedi pulverem antiepilepticum antimonialem.

Cæterum principio quoque morbi præterlapfo, nunquam pulvere illo antimoniali vel Mercurio dulci amplius ufus fum; quin potiùs præreptâ occasione inftituendi laxationem, (à quibus omnibus, imò clyfteribus quoque, fub progrefſu morbi cavendum, vid. Riverius *Pr. l. 17. p. 187.* & Sydenham *de Morb. acut. pag. 187.*) infantibus interim & perfeverantibus illis fymptomatis circa primas vias, cum hypochondriorum & abdominis murmuratibus, aut tumore ejus tenſivo, &c. quæ funt prodromi epilepfie; ibi neceffitate coactus juffi blandum clyſma ex fimplicibus domefticis leniter emollientibus & abftergentibus injicere, v. g. ex lacte, vel jufculo avenaceo cum melle, &c.

Hinc præterlapfo morbi principio, ad attemperantia alexipharmaca, cum additis alcalinis accelfi; hinc juffi afſumere fequentes aut fimiles pulveres, c. g.

℞. C. C. f. Δc ʒj.

Myrrhæ gr. vj.

Theriac. gr. ij.

M. pro 2. dofibus.

℞. C. C. f. Δc ʒj.

Myrrh. gr. jv.

Θ vol. C. C. gr. iij. vel jv.

M. pro 2. dofibus.

℞. Pulv. bezoard. D. Mich. ʒj.

Θ is card. bened. gr. jv.

Myrrhæ gr. ij. M.

Et fic porro pro circumftantiarum ratione in incremento morbi, fecundo vel tertio die, dum æftus ante eruptionem puftularum & fymptomata primarum viarum urgent.

Puſtulis

Pustulis verò erumpentibus, vel dictis remediis institi, vel pro promovenda excretionem per emulsiones ex seminibus expulsvivis inà cum myrrha, cornu cervi, & unicornu ossili, &c. ordinavi, ita enim successivè me- useruperunt variolæ. Sed pustulis plenariè protuberantibus, adeoque in statu morbi um incipiunt extolli in medio, & ad suppu- tionem tendere, tunc præscripsi:

R. R $\overline{\text{Q}}$ i 3ij.

Ess. Myrrh. $\overline{\text{Q}}$ i sat. 3j. M.

olis gutt. 20. vel 30. pro infante 3. 4. & 5. an- num, pro circumstantiarum ratione, bis, vel quater intra 24. horas. Vel

R. R $\overline{\text{Q}}$ i 3ij.

Ess. Myrrh. c. ~ Θ * ci vinos. pa- rat. 3j. M.

olis gutt. 15. 20. & 25. bis, ter, quaterve diei & noctis spatio, pro ratione circum- stiarum, infanti trium, quatuor vel quin- annorum.

In declinatione autem morbi, cum ple- ssent in suppuratione variolæ, pro hac movenda, sæpe dedi pulverem lapillorum trorum cum pauxillo myrrhæ; ita nam- earum suppuratio promovetur, & restan- symptomata eradicantur.

His ita peractis, ubi crustæ iterum deci- ant, post binas vel tres septimanas à pri- morbi insultu, pro interna mundificatio- erum purgationem institui ex Mercurio , ne variolarum reliquiæ aut febres in- ittententes, aut alia mala, post se relin- t. Cum verò post perfectè curatas va- minis solcat laxare, pro stimulo eidem i. is. ij. vel iij. pulveris jalappæ addi pos- n conserva rosarum: sic v. g. pro in- . annorum

g dule. gr. v. vel vj.

♀ Jalapp. gr. ij. vel iij. M. f. Pulvis.

Idita conserva rosarum fiat Bolus, à su hauriantur aliquot cochlearia vehi- jusdam calidi.

m ad sistenda symptomata, in cursu obvenientia, quibus sequenti modo ritum.

mitus in principio urgentes nunquam scui, cum sic variolæ meliorem cur- quirant; Si autem sistendi sunt, opti- ant alexipharmaca, quibus extractum alc addi potest.

ctigationes autem corporis & anxietati- incipio urgentes, ratione quarum im- excretionis motus, tolluntur optimè acam, vel in robustioribus per gr. ss. d gr. is. pro aliquot dosibus, lauda- itè parati: quibus tamen non suffi- , confugiendum ad liquorem cor- iccinatum, dosi gutt. iij. jv. v. vj, &c. instantiarum varietate, in haustu

t. II. Pars 2.

potus ordinarii; ita quieti redduntur variolan- tes, & excretio pustularum promovetur.

Quodsi in principio aut incremento mor- bi epilepsia affligerit, tunc internè jam pulve- re antimoniali epileptico, jam liquore cornu cervi succinato, jam utroque, oprato cum successu usus fui. Externè simul pro dolore abdominis tensivo, in hujusmodi epilepticis insultibus ordinavi Linimentum ex olei de- stillati succini $\overline{\text{Q}}$ j. olei destillati spicæ gutt. v. excipiendo cum oleo nucis moschatae expres- so, aut corpore pro balsamo, quod regioni umbilicali & scrobiculo cordis inungendum jussi, idque aliquoties; sic enim epilepsia evanuit.

Si verò in incremento & statu morbi Diar- rhœa supervenerit, ut plurimum functa fuit, nisi infantes habitiores & succulentos, & qui sibi eam, præter causas internas, occasione vel potus nimii, vel frigidiusculi contraxe- runt, corripiat: pro hac compescenda, præ- fertim si cum murmurationibus abdominis, aut excretionibus alvi spumosis, venerit, quæ insignem motum effervescentiæ insi- nuant, ordinavi:

R. $\overline{\text{Q}}$ a sigill. minutim. $\overline{\text{Q}}$ i f. 3j.

Infundatur in quadrantem canthari cerevisiæ vel potus ordinarii; semper benè agitando wann sie wollen trinden / quò sic continuo aliquid ejusdem terræ ingurgitetur. Atque sic brevi post diarrhœa feliciter fuit sedata, & nullis aliis symptomatibus supervenientibus, sed potius pustulis egregiè protuberantibus.

Quodsi in statu morbi ob symptoma- tum syndromen vires ægrorum admodum fuerint prostratae, tunc nil melius esse obser- vavi tincturâ Coralliorum cum spiritu cordis cervi, vel aqua typhorum cornu cervi cum vino parata, in cochleari potus ad gutt. vj, viij, x, xij, &c. idque crebrius, propinata, pro infante trium annorum, vires restaurando & variolis succurrendo.

Quin &, si nimis sudoribus diffluent infantes, & fiant inde imbecilliores, opti- mum analepticum fuit haustulus vini Rhena- ni, vel panis similagineus mollis vino gene- roso intinctus, & ita exhibitus; aliàs non sum hoc in casu adeò liberalis in exhibendo vino, nisi ex dicta ratione ægri fuerint debiliores.

Porrò quodsi periculum oculorum va- riolantibus immineat, quæ duplicia sunt:

1. Ne variolæ ipsum oculi bulbum occu- pent.

2. Ne variolæ obsideant palpebras, qui- bus suppurantibus oculus non possit aperiri.

Ex primo periculum est perditionis visus omnimodæ; remanent enim cicatrices, quæ si bulbum attigerint, visum hebetant. Pro oculo- rum ergò præservatione optimum est, ut ma- ter, aut mulier quædam sana, masticer allium

[K k]

manè

manè jejuno stomacho, & halitum oris infantis oculis crebrius inspiret. Hoc crebrius repetito rarò periculum imminuit infantibus. Vel accipiat crocus, infundatur aqua foeniculi, hinc infusum hoc oculis instilletur. Vel ex ruta recenti contrusa vel conquassata exprimatur succus, qui per filtrum transmissus, & cum aqua quadam ophthalmica permistus, instilletur oculis.

Dein, oculis liberis quoad bulbum existentibus, palpebrarum cilia inviscantur, adeoque oculi aperiri nequeunt. Ne ergò sordes aciores intra oculos colligantur, & oculos erodant, sufficit blandum vel florum melilori, vel herbae malvae decoctum, in aqua factum, ac cum linteo oculis calidè applicatum. Malè autem à quibusdam lac applicatur, quia, cum crassum viscidum sit, & facile acorem contrahat, periculum est, ne oblinantur variolæ, & propter butyrosam substantiam sordidæ fiant Variolæ.

His irritis si oculi inquinentur, & post curatas variolas vel lippitudo, vel ophthalmia, vel hebetudo visus, &c. supersit, appropriatis ophthalmicis succurratur: sed simul nuchæ applicetur vesicatorium, vel si nec hoc suffecerit, claudatur, & pone aures bina vesicatoria applicentur. Nihil equidem vesicatoria faciunt præcisè ad oculorum curam, sed hujus curæ impedimenta removeant, qualia sunt sanguinis & lymphæ uberior affluxus, ut melius oculi curari possint per reliqua remedia; Parantur autem sequenti modo:

℞. Empl. vesicat. usit. p. j.

Cui admisceatur ana vel dimidia pars emplastri citrini, hinc linteo inductum nuchæ vel auribus applicetur; sic brevi post vesica excitatur, quæ aperta, copiosum serum fundit. Ut diutius aperta seruetur, sumatur emplastri de spermate ranarum quantum placeat, cui addatur quinta vel sexta pars dicti emplastri vesicatorii; ita enim stimulus adest, & foramina nequeunt consolidari, sed aperta manent; ab emplastro vero spermatis ranarum inflammatio impeditur.

Infantibus etiam aut puellis quidam ad præcavendam faciem à variolis, vesicatoria scapulis aut dorso solent applicare; non secus ac si variolæ in pustulas jam congestæ dispareant, aut variolæ promanantes in medio foveas acquirant, quod malum signum est, denotans earundem introrsum versus regressum, tunc vesicatoriis, carpo & genibus applicatis, hoc præcavetur.

Porro Tussis & Pectoris Affectus, quandoque supervenientes variolis, optimè curat Scabiosa, eaque nunc solitaria, nunc syrupus ejus aut hederæ terrestris, cum spiritu salis ammoniaci anisato mistus. Et cum plerique variolantes, si moriuntur, ut plurimum

suffocati intereant, quare sumus solliciti, & in cura variolarum faucium ac colli semper habeamus rationem: hinc etiam respirationis modum consideremus, & qualis sonus sub respiratione audiatur, attendamus; si enim respiratio fuerit celerior, anhelosa & minor, malum est; sin contrà æqualis, rara & magna, bonum; quod si verò respirantes stertendo obscurum sonum edant, periculosum est, & metus, ne in statu morbi suffocentur; & tunc volatilibus impetus & motus sanguinis promovendus.

Curavi superiori anno, sub primo insultu febris illius catarrhalis epidemicæ cum pleuritide notha, adolescentem sedecim vel octodecim annorum per mixturam, ex spiritu salis ammoniaci anisato & laudano opiato constantem; hinc ubi quarto die erumperent variolæ, consuetis remediis institi.

Ulteriùs grave & miserabile symptoma est Aphoma, variolis superveniens, ejusque duplex affligendi modus: vel enim ægri sonum neque edere vitiolaryngis, & nervorum recurrentium, vel formare vocem nequeunt; (2) Licet edant sonum, tamen eundem in loquelam formare nequeunt, quod fit vitio linguæ, quoad sui nervos motores paralytici passos. Prior casus non occurrit in Praxi, utut Hildanus *Cent. 6. Obs. 14.* eum observavit, apud quem etiam cura habetur: sed casus est rarus. Posteriores verò casus ipse observavi, ubi, præter interna volatilia antiparalytica, imprimis conveniebat essentia castorei, linguæ in parte prima circa frænulum crebrò affricata: Vid. etiam Horstii *Obs. in l. 1. Obs. 29.*

Tandem frequenter post variolas gravia alia supersunt symptomata, & interdum morbi chronici difficulter curabiles, v. g. ulcera quarundam parium, in specie in locis nervosis, occasione fermenti variolarum infixi enata, tinea capitis virulenta, &c. Pro hisce ergò malis eradicandis, si alio modo curari nequeant; in subjectis paulò robustioribus per salivationem Mercurialem cura erit optima, cum non secus atque in lue Venereâ post variolas pathemata partium nervearum solent esse supersticia, quibus Mercurius dulcis egregiè prodest; hinc ex collatione variolas infrequentium malorum & luis Venereæ, apparet, Mercurialia tam internè, quàm externè usurpata, futura egregia.

CASUS XXXVII.

PHTHISIS PULMONALIS.

Vir ætatis consistentis Medicum accedit, conqueritur de tussi continua, cum materie copiosæ rejectione. Materia, que rejicitur per os, est quandoque alba, quandoq̃ livida, quandoq̃ viridiuscula, absque fœtore,

fectore, & quæ aquæ injecta fundum non petit. Jungitur rauco crebrior, subinde remittens, ferè tamen continua. Ad oblatam mediocriter se habet, saporem tamen terribilem, nec facile explicabilem, cinereum quasi aut lignorum putridorum instar, mane vigilans in ore percipit. Urina erat bonæ consistentiæ, sed intensius tincta: pulsus celeres & frequentes, magnitudinis moderati: noctes propter tussim nonnihil inquietæ, & somni admodum interrupti, simul vero ac somno indulgere incipit, copiosis sudoribus diffluit, non leviter eum debilitantibus. Corporis constitutio antea habitior, & gracilior, partes extremorum carnea molles & flaccidæ, tempora collapsa, capilli defluunt; alvus quotidie respondet scio, sed liquidiora & fluidiora solent excreta. Ex levimoto virium imbecillitas, & respirationis difficultas superveniunt: utrique lateri quidem incumbere test; dextro tamen minus commodè, cum inia exasperari tunc sentiat. Diu est, quod successivè malum in principio neglectius progressum sit, facie jam quomodo Hippocratica apparente. Origini morbi scit nullam, nisi quod lites conjugum & jurgia domestica uxorem inter & eam, intercesserint.

RESOLUTIO.

Affectus est revera Phthisis, & quidem pulmonalis incipiens, sed jam in insigni inmento constituta, ab excoriatione pulmonum facta. Confunditur vulgò Phthisis Atrophia & Tabe; sed malè. Atrophia est, quando corpus non sufficienter nutritur: Tabes, quando corpus etiã nutritione jam facta decrescit & depauperatur. Tanc pertinet Phthisis, ubi ægri non solum cessant nutriri, sed jam nutriti decrementum patiuntur & emaciantur. Omnis in tabes oritur vel defectu vel vitio chyli; tu in inedia, chyli exhaustionem, &c. vitio supervenit variis modis, speciatim, modo vitiosus fit chylus vel errato stomachi vel sanguinis chylum depravantis, speciatimè per pus ex ulcere cujusdam partis oritur, unde sanguis chylum defœdat corrumpit. Unde non præcisè ad pulmonem restringenda est phthisis, observata enim non fuit ex ulcere jecoris, abscessu mesenterii, frequentius tamen ex pulmonibus corrumpitur. Hinc Medici frequentius istam phthisin vocant, quæ pulmonum vitio supervenit. Considerandum: an vera, an notha fuerit, quo puncto sæpe fallimur. Phthisis vocatur, præsertim ex viscerum, speciatim atriculi ratione: κατ' ἐξ ἑξιν pulmonalis vocatur, quæ fit ex erosione & exulceratione. II. Pars 2.

ratione pulmonum, quam insequuntur tussis, sputa varia, atrophia, &c. Notham eadem consequuntur symptomata sine tali erosione & exulceratione pulmonum: sic artifex quidam vescitur carne vervecinâ cum brassica, inde brevi post tussim siccâ crebriori, die & nocte pectus quatiente corripitur, successivè tandem fit humida, ejiciuntur copiosa viscida, mucosa, color faciei perit, acquirit faciem Hippocraticam, corpus emarcescit, durant hæc omnia ad biennium: omnibus remediis irritis tandem sub fortiori tussim aliquid duriusculi ex imo pectore sursum movetur & ejicit, quod erat parvum ossiculum acutum cum brassica deglutitum, sed aberraverat à via, & in asperam arteriam inciderat, ex quo omnia hæc symptomata enata. Hoc itaque rejecto intra paucas septimanas spontè iterum sanus, floridus vegetus & pinguis factus. Talis est phthisis notha absque erosione pulmonum. Plura exempla Phthiseos nothæ simul hinc inde observantur: Vid. Bartholinus Cent. 2. Hist. 27. qui observavit ex nucleo avellanæ in pulmones illapso tussim continuam cum phthisi, quo remoto fuit curatus æger; item in M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 31. pag. 58. & Ann. 3. Obs. 3. nec non Sylvius Pr. lib. 1. c. 24. In nostro casu vera est Phthisis, in qua tamen etiam est differentia. Quidam laborant perfecto ulcere pulmonum sine tussim, sputo, phthisi, &c. si nempe abscessus membranâ includatur, quem vocant Vomica pulmonum, vid. Kerckringius Obs. 72. Quoad phthisin hanc veram, ubi exulcerati sunt pulmones, sine tamen tabe corporis observetur; quod interdum sint vegeti corpore, floridi facie, quamvis pulmones sint exulcerati, & putrida fœtida rejiciantur: in talibus vis stomachi digestiva adhuc viget, & quamdiu hæc adest, à tabe sunt immunes: sicuti enim lac admodum convenit Phthisicis pro temperatura acrioris succi, tam sanguinis, quam puris; ita quamdiu ægris, ulceribus partium laborantibus, adhuc vis stomachi digestiva valet, iidem suggerit succum chylosum lacteum temperatum, & tamdiu sunt apparenter vegeti.

Causa proxima hujus phthiseos est lymphæ salso-acris, & muriatica facta, uti à Sylvio & Lindano dicitur, quæ certè in omni phthisi peccat. Semper verò considerandum: an ab interna alteratione, vel per se, vel occasione morbi cujusdam antecedentis, e.g. variolarum, pleuritidis, scorbuti, &c. an ab externa læsione, v. g. à contagio phthisicorum, spiritus nitri fumo inspirato, &c. malum inductum sit? Si verò per se orta, certi sumus, peccare lympham acrem salam, & massam sanguineam simili-

terasperiores & acriores factam, occasione stomachi non ritè digerentis, sed alimenta in similem muriaticum succum convertentis, & aliorum viscerum.

Causa remota est digestio stomachi vitiata.

Pars affecta seu subjectum radicationis est massa sanguinea crasis salsa muriatica, inquinans lympham, unde hæc causæ proximæ rationem obtinet: subjectum autem in hæsiōnis sunt pulmones jam excoriati quidem & exulcerati, utut exulceratio nondum in ulcus sordidum transierit; colligitur tamen postmodum ex sapore peregrino instar lignorum putridorum, quem ager exprimit, *Wie faul Holz* / corruptela cuiusdam visceris, & in specie in nostro casu pulmonum. Nondum verò est confirmatum ulcus, quia excretio materiæ variæ mucosæ non est pus, quod probatur: quia aquæ injecta non petit fundum, sed sputum tale provenit à lymphâ copiosiore effusa salsa: & viscidum illud est ex nutrimento, pulmonibus non appolito, sed proximè in pulmone eroso corrupto & alterato, unde lymphæ adjunctum ab aëre magis spumescit, & sic sputa leviora redduntur, hinc aquæ innatant. Observatum etiam puris sputum menstruum inordinatum sine phthisi: vid. M. A. N. C. *Ann.* 1. *Observ.* 94. *pag.* 223. Kerkringius in *Spicil. Observat.* 72. & Bartholinus *Cent.* 3. *Hist.* 17.

Phthisis pulmonalis in principio saltem tussis sicca affligit, hinc appetitus non nihil imminuitur, color faciei mutatur, & habitus corporis succi plenus flaccescit, quæ sunt signa phthiſeos incipientis. In confirmata manifesta sunt symptomata, admodum tussunt cum copiosæ materiæ plus minus purulentæ rejectione. Urina tinctorum est ex primariis signis; est enim sine sedimento, quod fit ex copia salis ejusque à latice urinæ imbibitione. Pulsus celer, frequens, quoties cum tussi, virium prostratione vel corporis emaciatione sine alijs febrium signis adest, & quò magis talis, eò magis desperatè habent ægri, & ut plurimum intereunt. Sudor nocturnus ferè est unum ex primariis signis phthiſicorum; subito enim atque dormiunt, tantum non sudoribus diffuunt, quando evigilant, sudor cessat, si iterum oculos claudunt, sudor reddit, præsertim fit post mediam noctem. Sudores autem hi nocturni in nostro casu obvi sunt emaciantes, non propriè colliquativi, utut tandem tales fiant: nam oriuntur ex nutrimenti chylosi, cum sanguine quidem per corpus distributi, sed apponi inepti vel non appositi, spontanea effluentia: unde dimittit massa sanguinea sub somno talem liquorem corruptum, qui tunc dormientibus spontè per cutim effluit, nec ita formatus est, ut per vias urinarias transeat. Quando igitur in-

cipiunt dormire, cessante imprimis in somno spirituum animalium impetu elastico, adeoque fibris cutaneis, & præsertim tendinosi musculis cutis minus tensis, sed mollioribus, relaxatis & flaccidioribus, sicque poris magis hiscentibus, & magis apertis, nutrimentum serosius spontè effluit; quando verò evigilant, sudor cessat. Interim etiam hi sudores sunt mali, emaciant corpus, illudque nutrimento frustratur, unde reliqui succi corporis longè acriores fiunt, hinc his sudoribus continuantibus, præter maciem corporis, sequitur tandem capillorum defluvium, quod signum est phthiſeos, cui si supervenit diarrhœa, moriuntur.

Quoad latus, vid. Salmuth, qui dicit *si lateri sano incubant ægri, anxii redduntur; si verò ægro, latus sanum adhuc suo officio fungitur*. Quoad phlogosin, ista, quam patiuntur Phthiſici, empyemati, ita habet, quod ægri percipiant, quandoque æstum ex pectore adscedentem. Deinde subinde maxima illius lateris, cujus pulmo exulceratus, ut plurimum rubet & calet, altera est pallida. Et curavi empyema cum ulcere pulmonum in parte sinistra, hinc etiam pulsus in parte sinistra fuit insigniter mutatus, ab illo in latere dextro.

Lympha est copiosa, glutinosa, viscida, &c. quia in erosione pulmonibus totum nutrimentum non assimilatur, sed foras eliminatur; prout verò plus minus corrumpitur; eò magis vel minus foetet, & à colore albido naturali recedit.

Phthiſici ut plurimum sunt fluxioris alvi, ratione cujus, præter causas alias, addenda est bilis corruptela, eaque salsa acris serosa, deficiens in oleositate balsamica & volatili acrimonia, adeoque insufficiens est chyli perfectioni, & fæcum secretioni, sed partim diluendo, partim stimulando intestina hujusmodi diarrhœam colliquativam infert. Ac phthiſici jam non nihil confirmati quidem, diarrhœam incidunt, ex constitutione fluxiliori, ipsis propria; unde etiam post clyſma injectum, aut lenè purgans assumptum, impetuosius ii moventur; quod ipsum cautelam injungit in proritanda phthiſicorum confirmatorum alvo, cum etiam juxta Hippocratem diarrhœa, post capillorum defluvium superveniens, mortem tabidis inferat; innuit enim insignem corruptionem omnium contentorum in nostro corpore. Conf. Sylvius *lib.* 4. *de Phthiſi*.

Quoad iram: illa, tanquam concausa, phthiſin & febres acutas infert hoc modo: scilicet sub ira fit insignis quorumvis humorum confusio, quod patet ex mutatione pulsus & alvi fluxu, non rarò eam sequente; hinc dum iidem confunduntur, fit eorum (1) acrior concursus, hinc insignis effervescencia, adeoque quan-

quandoque febres; imò (2) iuxta alios ex concursu mutuo succorum, unio eorum in salinam, sed acius, minus temperatum, ceu phthisicos & quamplurimarum agrotationum primariam causam & fomitem.

P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin: anceps est casus, quia phthisis hæc faciliè in confirmatam transire potest; interim melior spes affulget, quod in nostro appetitus quoddammodo adhuc conslet: Verùm aut diarrhœa supervenit, inde moriuntur, aut pedes oedematosi. Tussis remittens innuit vires prostratas non sufficientes movendo thoraci, unde cum creatu suffocatio potest supervenire. Vid. *elivius l.c.*

C U R A.

Quoad Curam phthisicos ex stomacho ita: incipiens faciliè curatur, si modò marè propinetur vomitorium, postmodum ita blanda salia, ut liquor terræ foliatæ tartari, spiritus nitri dulcis, mistura lapillorum cerorum cum aceto, & similia, & vespere tempore blandum opiatum propinetur.

Universalia hæc sunt frustranea, & minime talia, & ob id Lindanus dicit: stultum est axioma, ab universalibus inchoandas curationes; quia plurimi sunt morbi, in quibus magis nocumentum, quam utilitatem præbunt, utut, si primæ viæ in principio morundificentur, utile sit.

Vomitória quod attinet: equidem in his sunt optima, sed cautè administrentur.

In principio & progressu sint moderata: partim ob metum hæmoptyses, partim, specie hic, ob diarrhœam haud tutam; quia tales ægri à lenissimo remedio citim per inferiora purgantur. An emetivum debeat ordinari, ventriculi præscribit: quamdiu enim in stomacho fermentum nonnihil viget, & digestio

tutò vomitorium moderatum assuetum erit; quando verò digestio est destructa, vomitorium ex eo est periculosissimum, quia tunc nihil ordinario per se operatur illud, idque ideo, quod motum ventriculi suo modo vim emetivam actum non deducat; quin potius vires exinde sequuntur alvi dejectionis.

Enæsectio est particulare remedium.

Purgantia rarò in principio adhibentur, men laxa & primæ viæ munda optime sunt.

quæritur porro: an in nostro ægro is conducatur? Resp. Lac in phthisi datur solum pro scopo alimentoso, sed & medicamento, ut nempe illud dulci & butyrosa pinguedine temperet

acrimoniam muriaricam lymphæ & sanguinis, & corpus nutrire valeat. Interim quomodo illud ipsum lac pro scopo pulmonum erosorum conferat, non video; quin potius causam proximam, lympham scilicet acrem, respiciendo, conveniet idem lac non prius, nisi dyscrasia massæ sanguineæ & lymphæ alterantibus plus minus fuerit correctæ ex parte, speciatim in hoc casu per remedia ex lignis, quæ in phthisi illa, ac est nostra, quam Veteres ex defluxionibus derivarunt, pro temperando sanguine & lymphæ sunt optimæ: pro cuius scopi complemento, adjungatur lactis usus; aliàs enim intempestivè adhibitum plus nocet, quam prodest; & hoc etiam in nostro agro attendendum erit. Deinde etiam lac non prius convenit, quam ulcus pectoris prius fuerit purgatum, & à recrementis præternaturalibus evacuatum maximam partem; secus enim si nutritivum lac ingeratur, metus est, ne, stante pulmonum erosione, proventus puris uberior generetur, præsertim, cum teste Hippocrate, *impura corpora quò plus nutritiveris, eò magis læseris*: quod etiam locum habet in membris particularibus morbofis. Porro in lactis usu ventriculi ratio est habenda; lac enim facilius alteratur & corrumpitur; unde quamdiu ventriculus adhuc digerere nonnihil valet, nec nimis urget diarrhœa, lac tutò assumi potest; contra si ipsius digestio læsa fuerit, tunc ne magis lædatur æger, omittendum lac est; Tandem in lactis usu observetur, ne febris adsit plus minus intensâ; si enim febris tantillum præsens sit, cavendum nobis à lacte; mox enim in stomacho tali nidorem contrahit, & corrumpitur: si autem febris saltim lenta hæctica similis affluerit, tunc concedi potest.

In ulceribus pulmonum nocent acida speciatim vitriolica: sic quidam hypochondriaci debilitate pulmonum præditi, ex usu acidularum vel phthisici facti fuerunt, vel hydropici interierunt, externè verò acida nitrosa nocentissima sunt pulmonibus, temperata verò, ut tinctura vitrioli martis Zwelferi, spiritus nitri dulcis, &c. possunt concedi.

Quoad opiata: ea in phthisi sunt optima, sed accuratè observetur methodus medendi. Unde quæritur: an ea in nostro agro locum habeant? Dico quod non; quia jam facta est erosio pulmonum, qua stante, adeoque & sordium coacervatione, urgenda expectoratio; hæc autem cessante, unà cum tussi, periculum suffocationis ægro imminet, unde cum exhibitis opiatis excretio materiæ ex pectore sistatur, sufflaminato hac ratione motu partium organico, ac concurrente ipsorum spirituum animalium defectu, omittenda ea

[Kk] 3 erunt,

erunt, præsertim cum stante ulcere pulmonum excretio non debeat impediri, sed potius promoveri. Contrarium quidem loquuntur Practici, dicendo, quod tussim sistant: Verùm respondeo, distinguendo tempora: Nempe in principio & incremento phthiseos, quamdiu scilicet acrimonia lymphæ & tussis adhuc sicca urget, nondumque facta est erosio pulmonum, sed fieri incipit, opiata sunt optima. Temperant enim acrimoniam lymphæ ad asperam arteriam delatæ, & simul præternaturalem ejus motum ad asperam arteriam pulmones impediunt, & sic sensum irritationis sistendo tussim sufflaminant. Optime autem operantur, si misceantur cum lymphæ acrimoniam temperantibus, speciatim sulphureis & vegetabilibus gummosis. In statu minus commodè usurpari possunt; adeoque considerandum, quid magis urgeat? Prohibent opiata generationem sordium, & simul inhibent excretionem. Vesperti ergò potius quàm interdiu conducunt; vesperi enim materia generatur, & interdiu excernitur.

Inter opiata pilulæ de cynoglossa in desuetudinem abierunt, quia sunt ex crudis narcoticis compositæ; potius pilulæ de styrace Sylvii aut Schroëderi cum laudano opiato permisceantur, & vespertino tempore vel ante cœnam, vel post cœnam parcam sub introitu lecti usurpentur. Ulcus autem, antequam consolidetur mundificetur prius, pro quo scopo optima est nicotiana, hydromel, oxymel, &c.

In Cura ergò nostræ phthiseos, quæ vulgò à destillatione deducitur, observentur sequentes Indicationes:

1. Sanguinis dyscrasia falsa & lymphæ acrimonia corrigenda & temperanda.
2. Sordes in pulmonibus residentes per expectorationem removendæ.
3. Nocumentum pulmonibus inductum restituendum.
4. Simul etiam in omni tempore digestio prima integra servanda: pro quo ultimo scopo primario attendendo vomitorium, hinc blanda acidula, aromaticis juncta, quale est Elixir proprietatis vulgare, conveniunt.

Pro primo autem scopo conducunt speciatim temperantia sulphurea, vel quæ habent consistentiam pinguidiusculam temperatam: qualia sunt sulphur, flores sulphuris, antimonium diaphoreticum, antihecticum Poterii, succinum, thus, saccharum Saturni, pulvis Haly contra Phthisin, species di-Saturni Mynsichti, species di-Tragacanthæ frigida, semina frigida majora & minora. Quibus tamen palmam in principio morbi præripiunt decocta lignorum, vel solita-

ria, vel si jam latio pulmonum facta fuerit, adjunctis vulnerariis. Curiosam observationem habet Riverius *Cent. 1. Observ. 35. & 99. Cent. 2. Obs. 61. & 78. Obs. à Fomio Commun. 72.* de phthisi incipiente, per decoctum ligni guajaci curata. In tali ergò casu:

℞. *Raf. ligni Juniper.* ℥iij.
guajaci ℥i℥.

Macerentur per 24. horas, affusâ mensurâ unâ aquæ simplicis: manè ebulliant ad consumptionem medietatis, in fine adde

Pass. minconquass. ℥j. ad ℥i℥.

De colatura, per manicam Hippocraticam aliquoties trajecta, bibat æger manè & à meridie bonum haustum, sed sine sudore expectando. Vel:

℞. *Rad. Chinae in taleol. inc.* ℥ij.
raf. lign. guaj. vel *Sassafr.* ℥j.

macerentur per noctem in s. q. aquæ simplicis, v. g. ℔iij. manè infundantur vulneraria.

Item conf. Poterius *Cent. 3. Cur. 97.*

Cum his decoctis, nunc elixir proprietatis, nunc antimonium diaphoreticum, nunc antihecticum Poterii, nunc balsamus sulphuris, commodè potest usurpari, vel etiam, respectu nostri ægri, nunc expectorantia, nunc consolidantia vulneraria eidem decocto simul incoqui possunt, & tandem his usurpatis, lactis usus superaddatur. Si hæc suo functa sunt officio, demum ad lac accedendum.

Quibus etiam per accidens opem ferunt Opiata, nempe vespertino tempore, dum vel tussis nocturna, vel febricula vesperti urget. Conveniunt etiam in incremento phthiseos per accidens fonticuli & setacea ad lymphæ muriaticæ affluxum aliorum derivandum, vel in brachio, vel circa homoplasas; hæc verò in nucha applicentur: non quidem quod positivè aliquid valeant, sed saltem ut indirectè & à posteriori ulteriorem morbi progressum inhibeant. Quantum enim valeant hoc in casu, videatur in Hildano *Cent. 3. Obs. 38.*

Pro secundo scopo, sordibus nempe expurgandis, optima est Nicotiana, & post hanc hyssopus & Marrubium, in forma decocti vel syrupi, unâ cum mellitis blandioribus adhibita, præsertim cum & ipsum mel abstergat & expectoret; unde syrupus nicotianæ ex succo, juxta Quercetanum per residentiam paratus, bonus est; item infusum multiplex nicotianæ in aqua simplici per residentiam itidem factum expellit: vid. Magnenus de Tabaco, ubi multas formulas habet, interne tabacum nunc sub decoctorum, nunc electuariorum forma usurpandi.

℞. *Hb. salv.*
furd. ana M. j.

hyssop.

hyssop.

marrub. ana Mß.

Myrrh. cl. pulveris.

3ii diaphor. ana 3ij.

Cum f. q. *Mellis*, vel etiam cum *Pulpa passul. recens par.* f. Electuarium spissum: quod aspergatur tandem pro lubitu balsamo sulphuris, vel anisato, vel terebinthinato, vel myrrhisato.

Myrrha addenda est, quia ulceris sordidi progressum efficaciter inhibet; Ubi enim ulcus sordidum, & ubi sputum foetet, mel cum myrrha optimum est.

Pro tertio tandem scopo, nempe pulmonum noxa eluenda, consistit omnis curatio curanda phthiseos: Ita enim ponamus, quendam ex inspiratione halitus aquae fortis incurrisse phthisin pulmonalem: sanè, quia nobis deficit adaequatum mundificans & consolidans pulmonum, hinc ut plurimum catalogo morborum incurabiliū phthisin inferere necesse habemus. Equidem vulnerum decoctorum mille formulae prostant, & quaelibet anus singulare sibi aliquod servat: interim quemadmodum illa omnia eò collinant, ut pulmones consolident; ita in principio arrosionis bona quidem sunt, at in progressu eadem sunt imbecillia & frustranea.

CASUS XXXVIII.

PHTHISIS CUM FEBRE HECTICA.

*Tudiosus Theologiae, sanæ aliàs & laudabilis constitutionis, aliquando coneritur, quod utut aliàs fuerit robustus, tamen ex motu, & vel solo scalarum censu, virium debilitatem & respiratoris difficultatem percipiat: accedit et calor præternaturalis, quem impræ aliquot horis ab omni pastu in palmarum, cum faciei rubore & incalescentia persensit, qui tamen intensior post cæsse solet, quem comitatur sudor cois matutinus fluens tam largiter, ut o modo cum coercere queat. Negligit, fretus robore naturæ, sed interim idus faciei color perit, artus imbecilles, molliores & flaccidiores fiunt, apertus prosternitur, & saporem peregrinum subinde in ore, imprimis manè sursum, percipit: accedit superveniente hyssopula levis & inanis, in qua velli-
tauces & laryngem percipit, utut tussis, licet sæpius, nihil tamen excerp-
quin potius pectoris compressio & ha-
difficultas insigniter intendatur: ad-
vernū tempus, in quo levamen
sed mirè tussis intenditur, copio-*

sa rejicere incipit sputa, stertor dum decumbit sentitur, & capilli defluere incipiunt.

RESOLUTIO.

Affectus, qui in casu præsentis symptomatibus suis per plurimos, velut in tabella penicillo adumbratus, curandus proponitur, est incipiens Phthisis ex pulmonum exulceratione, eaque jam satis progressa, cui supervenit ordinarius comes febris lenta de Hecticarum genere. Affectus enim, etsi in principiis suis cognitu perquam sit difficilis, quum verò se nobis liberiori modo nudaverit, hinc dissimulari amplius non potest, cum de hoc minimè dubitare sinat calor præternaturalis, præprimis à pastu cum rubore & incalescentia faciei, cui si jungam sudores nocturnos copiosos, quid aliud, quam febrim hecticam indicant? quid debilitas virium insolita? quid respiratio difficilis, & gravitas illa thoracis sub scalæ adscensu? quid sapor peregrinus in ore & appetitus prostratus? quid tussicula primò levis, postmodum crudelior facta? quid exspuitio copiosa indicant, nisi quod tabificum anguem in corpore latentem alat? imò si insignem cladem virium, artusque imbecilliores & molliores perpendamus cum capillorum defluvio, res eò clarior erit, subesse nimirum Phthisin cum febre hectica jam conjunctam.

SUBJECTUM.

Phthiseos ratione subjectum est hinc pulmo, incipiens exulcerari cum aspera arteria à lymphæ acris: Hecticæ ratione & massa sanguinea inquinata vitio lymphæ & purulentia aliquali pulmonis. Focus seu sedes remotæ causæ investigandus est in stomacho.

CAUSA PROXIMA.

Causa proxima est vitium lymphæ acrioris seu falsioris muriaticæ, naturaliter humectantis & irrorantis asperam arteriam & pulmones.

Ab hac acriori (1) irritatur, excoriatur & tantum non nihil exulceratur aspera arteria, hinc tussis, & tandem pulmo, hinc excreta sputa, difficilis respiratio, &c. (2) ab eadem vitiatur sanguinis crasis, & fermentatio vitalis, hinc febris lenta: cui superveniens admixta purulentia pulmonum, reverà Hecticam secundariam seu symptomaticam infert.

Pulmones cur primario afficiantur in phthisi, causa est duplex:

1. Quia injuriis externis magis obnoxii sunt dum inspirando variè læduntur.
2. Quia si vitio stomachi phthisis, chylus & lymphæ acrior, dum venæ axillari infunditur, statim & primà vice cum sanguine per pulmones circulator, hinc & primario pulmones lædit.

Ex

Ex sanguinis crassi & fermentatione vitali læsis & spirituum in corpore defectus, & successivè virium debilitas supervenit; & quatenus simul non ritè in præcordiis effervescencia promoveretur, necessariò de difficili respiratione conqueritur æger, viriumque imbecillitate: malè quippe stante sanguinis fermentatione nec laudabiles generantur spiritus, unde, qui aliàs robustus, necessariò languidus fit. Sanguis itaque, dum sic viscida & salina acrimonia quadam fuit imbutus, nulla laudabilis ejus fermentatio speranda, sed vitiosâ suâ fermentatione inducit calorem febrilem acutum, non tamen intensum, nisi post pastum, quò semper æger calore & æstu majore affligitur, quem in facie & palma manuum imprimis perſentit, quatenus nempe ob assumpta alimenta chylus novus sanguini affunditur, qui exinde redditur fluxilior, & ob novæ materiæ præsentiam exasperatur fermentatio vitiosa, hinc post pastum aliquot horis, illo nempe tempore, quo digestionis opus ad finem perductum, imprimis autem post cœnam calor auctus percipitur. Hæc ipsa autem fluidior alimentorum pars, serum nutritium aliis dictum, cum ob suam visciditatem & salinam acrimoniam minus commodè assimiletur sanguini & partibus reliquis, hinc tempore nocturno sub specie sudoris copiosi per poros corporis confertim emanat, quibus sic stantibus necessariò postmodum floridus faciei calor perit, artus etiam imbecilliores, molliores & flaccidiores fiunt, cum & hi tam spiritibus, quàm rore nutritivo defraudantur, totique sic corpori debitus perit vigor.

Sanguis autem unde dyscrasiam suam nactus fuerit? & unde non minùs lymphæ corrupta? meritò hic quæritur. Arbitramur: illud esse ex primis viis, stomacho nempe & intestinis; in illo nimirum fermento stomachali sic dicto, in his autem succis ibidem hærentibus, bile nempe & succo pancreatico vitiosè constitutis; quibus postmodum saliva superveniens glutinosa & nimis salsa non parum momenti adfert; hinc non bonus chylus præparatur, nec in intestinis à succis, bile & succo pancreatico; illa quidem nimis inerte & viscida; hòc verò nimis acrisalio & glutinoso, perficitur, unde fermentatione læsâ, partiumque utilium ab inutilibus secretionibus depravatâ, læditur sanguificatio, nutritio partium, & spirituum vitalium generatio; unde augetur indies bilis, salivæ, succi pancreatici & lymphæ glutinositas & inertia, redditurque sic malum successivè gravius. Confirmat nos in hoc, ut credamus stomachum præprimis in causa esse, tam vitam ante actâ, quam symptomata: Prius quod attinet, vita nempe anteacta: hæc sat potens

fuit, tale quid inducere: Studiosus nempe fuit, studiis & curis nimis, iisque intensioribus deditus, quibus cruditas dicta natales suos debet; à studiis enim nimis spiritus animales exhausti, & alimentorum digestio læsa fuit, fermentum stomachale minus acidum, minus volatile, sed viscidum redditum, succusque pancreaticus nimis salus, muriaticus & viscidus factus, symptomatibus dehinc occasionem dedit, præprimis quod & probabile, quod fuerit juvenis sanæ constitutionis, fortassis plura & varia ingessit, nimisque fretus naturæ robore vixit, unde insigniter fermentum stomachi vitiatum fuit; & hoc vitiatum esse probabile reddunt symptomata: nam in nostro ægro appetitus insigniter est prostratus, ob fermentum stomachi vitiatum, & ob lymphæ salivalis nimiam salcedinem, hinc & impeditur debita fermentatio, dum etiam subinde peregrinum imprimis manè surgens perſentit saporem, qui non aliunde quam ex stomacho & infallibile cruditatis vitiosæ putridæ indicium, effluvia cum referant crasin totius concreti, ex quo exhalant.

Possent etiam hic sapor esse ex pulmonibus purulentiâ obrutis: sic si Hæctici saporem dulcem in ore habent, dum dicunt: *Es schmeckt mir alles süßlich*/ revera est ex pulmonibus purulentis; pus enim est salsum, quia ab alcali & acido fit: hoc jam si à pinguedine sanguinis obtemperetur, ejusmodi subdulcem acquirit saporem. Sic ego aliquando curavi Hæcticam & Phthysicam, quæ de ejusmodi sapore querebatur: præscripsi sal ammoniacum, & flores sulphuris: dicebat ægra, fetalem perſentisse saporem, ac qui est in pulvere præscripto; ratio enim est eadem: nam sal ammoniacum est salsum, cui si advenit pinguedo sulphuris, talis suboritur sapor subdulcis.

Putrida ergò talia, si in stomacho hæreant & chylo misceantur, deferuntur in sanguinem, hinc in pulmonibus hærent, sive in ipsis pulmonibus genita hos acrimoniâ suâ stimulant, & accedente frigore hyemali malum maximè exasperatur: nempe aëris asperioris inclementia irritando fauces & asperam arteriam occasionem lymphæ peccanti subministravit, ut circa loca dicta effusa uberius acrimoniâ suâ salsa eosdem lædere, excoriare, & successivè ad phthisin disponere potuerit; hinc necessariò tussis, in principio quidem levis & inanis, materiâ tunc existente adhuc tenui & subtili, minus cocta, Practicis dictâ.

Latere vitium in pulmonibus, ulteriùs indicat: quod æger sæpiùs tussiendo nihil excernat; si enim à causa externa solum illa tussis, tunc nihil commercii & molesti sentirent

tinent pulmones: sed quia hi laborant, videtur ac si vitium hic hærens stimulet laryngem ad tussendum.

Dum autem pulmones sæpiùs reiterato tussendi conatu irritati phlogosin quandam concipiunt, ac à lymphâ nimis acri & muriatricâ exulcerantur, & in abscessum abeunt, sic insignis halitus & respirationis gravitas exoritur, tussis exasperatur, & sputi copiosi rejectio supervenit, ad quam promovendam multum contulit aer vernalis, peregrinis exhalationibus turgidus: accedit dehinc stertor, dum decumbit, ob reiteratam nempe sæpiùs respirationem, & impeditam à lymphâ nimis glutinosa asperam arteriam obsidente, partim etiam fortassis ob puris in pulmonibus præsentiam. Tandem & supervenit capillorum deluvium, ad quod disponunt sudores nocturni, manifestum indicium phthiseos & atrohiæ jam perfectæ, massæ sanguineæ dyscrasæ, rorisque nutritivi inertie, quo rore præter partes alias & capilli destituuntur, ut sic constituto hoc necesse habeant defluere.

PROGNOSIS.

Eventum autem hujus morbi minimè osperum ominamur, sed planè dubium, & que magis, cum jamdum phthisis Hecticæ juncta: idcirco & difficilioris erit curatio, præprimis si perpendamus sudores minime coercibiles; tussim jugem pectus quasi laniantem, & tantum non lacerantem: quibus imitur non solum ulceris coalitio, sed & mensupervenientis sputi cruenti; si insignem tum cladem unâ cum capillorum defluxu minori, aliaque contra indicantia plura, in curatione vix conciliari possunt; si deest insignem appetitus prostrationem peramus, nihil nisi funesta ominari nos video. Interim tamen, ne planè illum quamvis omni spe reconvalescentiæ deim, ejus preces auscultemus, ut, si integrum restitui possit, saltem blandissimis, quæ citra virium offensam affe-
eniunt, infelix ejus spiritus, quantum eripoteff, prorogetur; fortassis enim, juvenis laudabilis constitutionis, accedat laudabili, de perfecta ei restitu-
gratulemur.

CURATIO.

Uram aggredimur innixam quatuor his rationibus.

Ut focus morbosus per legitimas vias ir, ventriculusque à saburra peccantur.

Lymphæ acrioris & viscidioris vitia cur.

Asperæ arteriæ & pulmonum læsio-
identur.

I. II. Pars 2.

4. Quibus peractis vel hectica spontè evanescet, vel, si supersit, emendanda.

5. Stomachi digestionem, quantum possibile, prospiciendum.

Pro quibus obtinendis legitima remedia ex fontibus Pharmaceuticis, & diæticis haurienda.

Pro priori ergò scopo commendatur vomitus, minimè autem Purgantia, quæ ceu summè nocentia fugiat: tabidi enim, phthisici & hectici etiam à lenissimo purgante quàm maximè purgantur, ut exindè etiam moriantur. Non inconveniens autem erit, ut Digestivum præmittat; hinc

℞. *Θ*ci* ʒj.

Antihect. Poter. ʒß.

M. f. Pulvis:

div. in 3. part. æqual. S.

Digestif. Pulver.

Præmisso hoc:

℞. *Tart. emet. Myns.* gr. ij.

Sacch. albiß. ʒß.

M. f. Pulvis: S.

Brech. Pulver.

Capiat cum regimine, quò sic materia peccans evacuetur, etiam pro ratione circumstanziarum suo tempore repeti potest, cum hoc commodi simul junctum habeat, ut promoveat expectorationem & excretionem purulentæ, si quæ adest, materiæ in pulmonibus hærentis. Sed cautè danda vomitoria, ne in nimia dosi dum propinantur, per inferiora etiam purgent; si enim post vomitoria propinata non per superiora purgent, etsi vomitorium etiam sit lene, sed per inferiora solum, ut plurimum est funestum signum, & intereunt ægri.

Præmisso vomitu, ut temperetur dyscrasia sanguinis, conveniunt medicamenta antiphthisica dicta, temperata, plus minus balsamica seu sulphurea, salium acrimoniam in lymphâ primariò mitigantia: hinc commendatum sibi habeat Pulverem Pectoralem D. D. Michaëlis cujus per aliquot dies continuatus sit usus, manè & vesperi in vehiculo appropriato; quod potest esse ros vitrioli, insigniter commendatus ad Hecticam, in specie, ubi nimius calor hecticus urgeat. Vel

℞. *Spec. diatreos simpl.*

dia-Tragac. ana ʒß.

ʒii diaphor.

Antihect. Poter. ana ʒij.

fl. ʒis ʒiv.

sacch. ʒni ʒj.

ol. dest. anisi gutt. xv.

M. f. Pulvis.

De quo æger bis vel ter in die tantum capiat, quantum cuspide cultelli detineri potest, manè in vehiculo calido, & à meridie in frigido: item vesperi sub introitu lecti:

[L1]

quò

quò tempore propter tussim, ut mitigetur, & acrimoniam, ut melius temperetur, non inconsultum videtur gr. ß. vel j. laudani opiatum addere, nisi excretio impediatur. Nec inconueniens erit, si in usum vocemus passulata & Decocta sudorifera ex lignis, optimè acrimoniam salinam temperantia: Hinc

℞. *Rad. Chinæ.*

liquirit. ana ʒj.

Ligni guajac.

Sant. rubri ana ʒß.

Cinnam. ʒij.

Contusa & infusa per noctem in MB in f. q. *¶ a simpl.* manè ebulliant ad tertiæ partis consumptionem:

tunc adde:

Passul. min. conquass. ʒij.

Leniter adhuc ebulliant & colentur:

D. S. *Heilender Lungen-Trank.*

In omni haustu detur vel balsamus sulphuris terebinthinatus, vel terebinthina cum vitello ovi dissoluta q. f. vel, quod optimum balsamus Saturni terebinthinatus.

Pro tertio scopo:

℞. *R. antiphthif. ʒij.*

D. S. *Dämpfende Tinctur.*

De qua 30. gutt. bis in die in vehiculo conuenienti (quod potest esse præscriptum jam decoctum) æger assumat.

Quò etiam pertinent Potiones Pectorales dictæ, item balsamum saturni terebinthinatum, item tinctura sulphuris vitrioli, &c.

Quibus præmissis, si adhuc sudores nocturni urgerent, dictis opiata miscenda; hinc

℞. *¶ heder. terr.*

Veron. ana ʒj.

Antihæct. Poter.

ʒii diaphor. ana ʒj.

Laud. opiat. gr. jv.

Syr. Nicotianæ

tussilag. ana ʒiij.

M. f. Potio.

Capiatur subinde cochleatim, interdum sub nocte.

Potius præscribenda ejusmodi remedia in forma pilulari, quæ assumendæ sub introitu lecti:

℞. *Antihæct. Poter. gr. xij.*

ʒii diaphor. gr. viij.

Laud. opiat. gr. j.

Cum f. q. *Bals. Peruv. f. Pilulæ.*

Pro quarto scopo, nisi Hæctica penitus cessaverit, sal ammoniacum cum antihectico Poterii eandem ulterius debellabit.

Ut autem quintò & stomachi rationem habeamus, simulque pulmonum læsionis; hinc cum malum nimis chronicum, non inconueniens erit vinum medicatum, quod recipit:

Hb. heder. terr.

scabios.

tussilag. ana M. j.

Flor. bellid.

primul. ver.

Veron. ana p. j.

Rad. liquirit.

Passul. min. ana ʒß.

sem. anisi ʒiij.

Cardamom.

Cinnam. ana ʒß.

Incis. & contus. includ. nodulo:

D. S. *Püschel im Wein.*

qui vel vino vel sero lactis infundatur, & subinde omni die bis haustulum hauriat æger, cui semper gutt. x. de balsamo Peruviano instillantur; sicuti etiam pro expectoratione meliori syrupus de hyssopo cum oxymelle squillitico sensim deglutitus non inconueniens erit.

Tandem diætâ probè nutritiva, mediocris tamen, sed strictè servanda instituat, ubi non inconueniens, si stomachi tonus iterum sit firmus, lactis curam instituere, sub qua assumat alimenta facilis digestionis, ova forbilia, carnes juniorum animalium: potus sit vel vinum medicatum præscriptum, vel serum lactis, minimè autem vinum. In reliquis rebus non naturalibus se moderatum præbeat.

CASUS XXXIX.

CACHEXIA SCABIOSA AD HYDROPEM INCLINANS.

Ancilla, aliàs succi plena & formosa, jam ab aliquot mensibus deformis admodum redditur, dum scabie laborat, ab alia ancilla per contagium contractâ, Scabies est humida, pustule late & ingentes, copiosum serum, præsertim in cruribus, hinc & reliquo corpore, fundentes, crura simul insigni tumore œdematoso ad genua usque turgent, manibus etiam tumidioribus existentibus. Conqueritur simul de sapore dulci & nauseoso, sic emphyndet immer einen süß-ekelen Geschmack im Munde / cum insigni siti continua, pro qua levanda cerevisiam secundariam bibit, quia primaria non bene sapiat; bene appetit, probeque comedit: interdum calidus halitus ex abdomine ascendere videtur, es kömmet ihr bißweilen wie ein heißer Qualm ausm Leibe: In abdomine subindè varias motiones & agitationes percipit, quod exinde nunc insigniter tumet, nunc denuò subsidet; facies est pallida & tumida, urina parcius emittitur, quolibet ferè manè vomitum jejuno stomacho patitur; menses inordinate fluunt, nunc

nunc intra 14. dies redeunt, nunc ultra mensium tempus deficiunt, bene dormit, &c.

R E S O L U T I O.

In nostra ægra primarius affectus est Cachexia; etenim omnia symptomata concomitantia ita se habent, ut etiam subinde sine scabie, in mulieribus præsertim, observata sint. Interim cachexiæ illi per accidens ex contagio supervenit Scabies humida, quæ in subjectis prædispositis, & quæ minus sanæ sunt constitutionis, longè gravior affligere solet, contractaque est per contagium corporale. Etenim contagiorum quædam volatilia, quædam fixa sunt: volatilia in febribus malignis obvia, contactu virtuali in distans operantur.

Pars affecta seu subjectum In hæfionis reverà est sanguis, hinc & lymphæ; quoad scabiem verò cutis: fomes autem mali seu subjectum radicationis in primis viis, nempe stomacho & bile later. Caterùm, quemadmodum fermentum acre scabiei extrinsecus haustum totum corpus inquinare valet, uti in ægra nostra; ita idem etiam fermentum sponte etiam suâ in ipso corpore ægri generatur: id quod fit speciatim ex insensibili ut plurimum transpiratione impedita, & intra cuticulam coercita, quæ naturâ suâ acris & salia ibidem defixa corrumpitur, & nunc inibi resolvitur in motum fermentativum, unde accescit, nunc verò in putredinem, unde alcali, sed in corpore vivente ut plurimum in acidum degenerat, & hinc pustulas ac fermentum scabiei contrahit. Hinc & balnea & sudores in talibus, mundificando partes cutaneas, promovendo transpirationem, & fermentum scabiosum ibi congestum eliminando, optimè conveniunt; hinc venæsectio & scarificatio nihil valet. Par ratio est in achoribus infantum, ex acido lactis sub cuticula defixo ortis, in tineæ capitis; hinc talia, præsertim tinea, tam frequenter variolas insequuntur, relicto sub tegmine cutis fermento variolarum.

Causa proxima affectus in nostra ægra est acidum viscidum, pingue, ex errore digestionis primæ in stomacho genitum, & hinc in primis viis coacervatum.

Causa verò remota est vitium bilis, ratione oleosæ suæ substantiæ nimis pinguis, & ratione partis salinæ minus acris & volatilis, existentis; unde & hæc functionibus debitis perficiendis non satisfaciendo turbat digestionem primam, ac ratione defectus hæmatoseos, sanguinis cruditates superveniunt. Nam certè multum bilis præstat in chylo, tam perficiendo quàm ad hæmatosin disponendo; unde plura phænomena, aliàs he-

patis intemperiei frigidæ deficienti sanguificationi adscripta, ordinariò fundata sunt in bilis inertia; hinc & isti affectus per amara, imprimis ex absinthio, corrigi solent.

Verùm quoad symptomata primaria, in specie in nostra, non secus ac quoque in morbis reliquis chronicis, cum colluvie serosa conjunctis obvia: ea inter se offert sapor dulcis nauseosus in ore. Jam ergò saporum ejusmodi incunabula sedulo in ægris scrutanda sunt, cum deducant illi nos sæpe ad causarum primarum cognitionem. Nempe sunt Dulcia mediæ naturæ inter amara & acida, & de utroque sale participant; ita tamen ut hæc ipsa, quæ aliàs subjectum falsum suggerunt, eo ipso, quò copiosiori oleo & pingui sulphure oblinuntur & inviscantur, etiam saporem dulcem repræsentent. Sic enim v. g. propriissimè dulcia, ut mel, passulæ, saccharum, nativâ dulcedine prædita, &c. de utroque sale, acido & urinoso, participant, sed simul copioso temperantur oleo: pingua sunt, hinc enim ex concursu horum salium concentratione copiosissimi olei temperatorum dulcia existunt, & tam facile fermentescunt; interim concentratione copiosi olei temperantur, non secus ac succi vegetabilium acidi, pinguioris naturæ existentes, per alcalia præcipitati in saporem tertium insipido-dulcem fatiscunt: nam succus ribium acidarum rubrarum expressus, cum lixivio salis tartari mistus, post effervescentiam liquorem mihi exhibuit saporis blandè dulcis. Unde in corpore nostro positiva dulcedo nunquam deprehenditur, nisi in bile, quæ primò gustu positivè dulcis est, utut postmodum sub hujus oleositate occultatum antea acidum prodiens, saporem amarum exhibeat: Nam qualibet amara participant de copioso alcali, sed intimè concentrato cum oleo; unde & qualibet resinæ, quæ nil aliud sunt, quàm salia volatilia oleosa, ab acido concentrata, plus minus amarescunt, prout ab oleo adjunctum alcali plus minus fuerit oppressum. Hinc olea destillata empyreumatica intensè amarescunt, propter sal volatile colliquatum cum pinguedine oleosa. Bilis ergò concurrens in corpore cum chylo acido-volatili, dat falsum tertium temperatum, plus minus dulce; sin verò acidum ipsum in subjecto viscido & pingui hæreat, concurratque bilis pinguior & iners, ex mutua unione efficit saporem dulcem nauseosum, stomacho inimicissimum, qui frequens occurrit. Hinc etiam ex nullo subjecto plus pituitæ viscidæ generari solet, quàm ex nimis pinguibus, in specie unà cum acidis assumptis, & vocatur vulgò pituita vitrea. In nostro ergò casu hic sapor est ex bile oleosa & acido viscido,

quæ unita & concentrata dant saporem dulcem nauseosum subpinguem. Concurrente itaque bile cum acido præternaturali, emergit motus fermentativus excessivus, quem sequuntur halitus isti dulces & calidi elevati, de quibus conqueritur etiam ægra nostra. Hinc ex isto concursu elevantur flatus copiosiores, & hinc concitantur in abdomine agitationes, inflationes & murmura. Imò exinde supervenit quoque horror cerevisiæ amaræ; nam hujus amarities lupulina agitavit & dissolvit viscidum acidum in stomacho & primis viis, sub qua actione oritur molestia quædam in stomacho ejusque fibris, hinc aversatio cerevisiæ amaræ.

Alterum symptoma nostram affligens, est Urinæ parcius excretio, eaque non præcisè fit ob vitium renum, transcolationi feri non sufficientium, sed ob hæmatoseos defectum, eamque propter perfectionem chyli à bile non sufficientem. Inde namque sanguis crudus & ineptus est dimittendi serum, scilicet ad hoc, ut ritè fiat feri secretio in renibus; multum confert affusio bilis & facta digestio pro perfectione chyli in primis viis: nempe sui affluxu cremorem chyli utilem separat ibidem à stercore & hoc ipso etiam hunc cremorem disponit, ut, dum in sanguinem abit, facilius de se mittat serum superfluum, & in renes seponat. Itaque non mirum, bile inerte utrumque claudicare. Adeò ergò verum est illud Helmontii *Tr. Sextupl. Digest.* effatum, dicentis: Fermentum fellis esse perfectivum cremoris, præservativum cruoris & corruptivum feri. Atque hinc est, quod in curis hujusmodi morborum chronicorum ab usu remediorum alterantium, amarificantium, vulgò Hepatica aperientia dictorum, etiam urinæ copiosius & intensius tinctæ, & copiosioribus sedimentis refertæ, emittantur; imò hæc spes reconvalescentiæ efflorescat.

Tertium symptoma hic obvium est Tumor pedum œdematosus, ad genua assurgens, & alii similes sub hujusmodi affectibus cachecticis, qui commodè quidem aliàs à sero seu lymphâ extravasata deducuntur. Interim scrupulus hîc urget, cur non solum pedes, sed etiam brachia talem humorem monstrent, & facies ipsa pallida sit? unde plus sub his tumoribus in affectibus ejusmodi cachecticis latet: nempe sub hujusmodi tumoribus adest fermentativa quædam turgescencia, in partibus carnosiss & musculosiss, quâ eadem sub nutritione sui depravata ita inflantur & intumescunt: nempe præsupposito hoc, quod in corpore succi nutritii, nunc sanguinei, nunc verò chylosi, requirant assimilationem cum partibus nutriendis, sanè si hæc propter læsam chylosin & hæmatosin cessat, nec debito

modo fiat, plures morbi particulares partium carnosarum superveniunt. Nam chylus acidoviscidus pinguis, nec à bile in primis viis perfectus, nec sanguini assimilatus, pro nutrimento ad partes distributus, fermentatione sui præternaturali turgescenciam flatulentam concipit, & ita tumorem œdematosum efficit; similiter ac pasta farinacea lentè fermentando ob glutinosam tenacitatem successivè in tumorem attollitur; hinc in talibus tumoribus quælibet evacuantia nil juvant, sed potius simpliciter alterantia amara & acria, alimenti depravationem corrigentia, quibus usurpatis, spontè iidem evanescent.

Tribus autem potissimum modis hi tumores œdematosi in corpore nostro sub cursu morbi generantur: primò nempe simpliciter ex abundantia feri, ita quidem, ut serum cum sanguine per vasa sufficienter nequeat hinc inde moveri, & communi circulo per vasa ferri, sed proprio motu sui deorsum vergit, & tumores excitat: secundus modus est, quando ex irritatione quadam in partibus nerveis supervenit fibrarum spasmus & constrictura, adeoque angustatis vasis sanguinis per poros partium transitus impeditur; sic enim tumores, nunc sanguinei, nunc occasione sanguinis constituti serosi, oriuntur; non secus ac in arthritico dolore & podagra supervenit circa articulos tumor, propter spasmum fibrarum nervearum circa articulos; Undè si tumor in podagra est sanguineus, dicitur *die warme oder hizege Sicht*; si est serosus, *die kalte Sicht*: sicut, dum dens dolet, supervenit tumor nunc sanguineus, nunc serosus: Et in talibus casibus, si partes tumentes tractentur per remedia aciora, aliàs fortiter discutientia, ut oleum Philosophorum, & olea nervina destillata carminativa, cò ipso, dum ab iis vellicantur partes nerveæ, tumores hi exasperantur: tertius modus est, quando adest vitiosa assimilatio nutrimenti partium, sive jam ipsa vitietur culpa fermenti localis in parte, sive culpa nutrimenti, ad assimilationem inepti. Prius optimè illustratur per ulcera; in quibus ex destructo fermento particulari nutrimentum proximum in pus, faniem, sordes, &c. mutatur; unde si ulcera maturè claudantur, & tantillum fermenti remaneat, ex hujus fermenti specialis corruptione tumor occupat partem successivè succrescens, & in ulcus renovatum terminans. Jam cogitemus, si vel occasione interna vel externa lædatur assimilatio nutrimenti & corrumpatur, quid exinde, nisi tales tumores œdematosi? Quod si verò ipsum nutrimentum ineptum sit, & crudum, chylusq; in specie viscidus, acidus & glutinosus ex digestionem prima læsa, tunc exinde fermentum partium particulare & nutrimenti assimilatio læditur;

hinc

hinc tumores superveniunt. Hinc quoque dantur venena, quæ assumpta partes solidas in tumorem elevant; imò in anasarca sub parco potu universum corpus tumorem oedematofum incurrit. In nostra autem ægra tumores oedematofini non sunt ex sero congesto, non ex vitio partis, nec ex vitio fermentorum particularium, sed propter nutrimenti crudassimilationem vitiatam; non secus ac pasta farinacea successive in tumorem attollitur: idque in specie in partibus corporis externis, quatenus hæ læsionibus aëris externi expositæ sunt; nam in tumoribus oedematofis pedum à frigore est oclusio pororum, unde & tales tumores per interna amaricantia optimè curantur. Pus est quasi lac quoddam sulphuris naturale, hoc est pinguedo seu oleum sanguinis; quod sub mutatione in pus ab alcali proprio dissolvitur, sed ab acido abscissus præcipitatur; hinc liquor salis subdulcis emergit.

Quartum symptoma affligens est Scabies humida: Ubi non differentia illa in siccam & humidam competit scabiei, ut tali; sed dicitur ea ita ratione subjectorum affectorum prædispositorum. Nutrimentum nempe partium proximum aquosius aut salso-acidius, aut saltem minus temperatum est: quamobrem istud nutrimentum ipsum promptius & copiosius corrumpitur, unde pustulæ majores faciem plorantes emergunt, & fit scabies humida, qualis ordinariò in subjectis cachectico-scorbuticis esse solet, quibus scabies indens fit longè sordidior: In quibus autem nutrimentum proximum est minus aqueum, à tinctura bilis magis balsamicum seu fo-volatile oleosum, in iis fermentum scabi se minus exferere potest, sed potius contratum afficit cuticulam, & scabiem crustam inferre valet. Scilicet idem est, ac in casibus Chirurgicis dicunt: *Er eine heilsame Haut* / quandoquidem in vulnera, etiam graviora, facile curantur: contra in alio vel leviuscula deteriora fi-

Et differentia hæc consistit in subjectis & partibus ratione nutrimenti: Habitio nempe, ubi cutis & partes ejusdem nutrimento plus minus balsamico seu salino-volatile oleoso imprægnata, eorum vulnera & era, & nunc magis nunc minus cacoëthea corrosiva evadunt pro nutrimenti affluxu; oque fundamentum simpliciter consistit in tinctura bilis balsamica; hinc enim est, & remedia vulneraria & ulceraria interna ordinaria sint de natura alcalina, minus oleosa; item quod nonnulla sub non possint ferre emplastra; alia minus. rit mihi similis casus in quodam puero, demorso, cui ex applicatione solius stri spermatis ranarum cutis inflamma-

batur, cum qua inflammatione copiosas pustulas serum plorantes ad magnitudinem em-plastri applicati. Id quod ordinariò evenit in scorbuticis: Nempe ab applicatione em-plastri solet cohiberi transpiratio, hinc contenta acefcunt, quæ cutem in pustulas elevant, & nutrimentum proximum corrumpunt. Sic novi quoque mulierem ischiadicam, & alioquin scorbuticam, cui idem obtrigit, ac pustulæ ab emplastro exacerbatae sunt. Prout ergò nutrimentum partium plus minus acre existit; & insensibilis transpiratio plus minus temperata; eatenus emplastra applicata, nunc profunt, nunc obfunt, præsertim ex pinguioribus parata; unde quorum transpiratio acrior, illis emplastra talia cutim in pustulas elevant; adeoque simpliciter in talibus removeantur emplastra, & saltem pulveres exsiccentes & acidum absorbentes inspergantur, ut crocus Martis ex vitriolo Martis cum sale tartari præcipitatus, & quatenus hic absorbet acidum, fit adstrictorius aluminosus, firmans partes, vel creta, lapis calaminaris, &c. Sic cum superiori ætate puer quidam scorbuticus erysipelas totius tibiæ incideret, ex emplastro imposito totius cuticula detrahebatur, & serum acre exstillabat cum insigni inflammationis gravamine: hinc si emplastra ulterius fuissent applicata, metus fuisset, ne gangrænam incidisset, unde eidem suasi pulveres, & præprimis simpliciter crocum Martis allegatum abhibere, qui acidum absorbendo, & fibras cutis stringendo, crustam & novam cuticulam induxit.

PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Cachexia jam præsens ut plurimum post se trahit perfectum hydropem, qui in nostra ægra metuendus, nisi maturè & providè malo occurratur.

CURA.

Quoad Curam, ægram hanc ita tractavi: Ea scilicet erat paupercula; propterea cum ante accessum meum jam purgata esset, hinc ex dicta theoria respiciebam potius ad acidum viscidum pingue & bilis inertiam, adeoque ad sequentia operam dedi:

1. Acidum corrigere.
2. Viscidum resolvere; &
3. Bilem ratione sui salis volatilis oleosi acuerè.

Hinc amaricantia tribus his scopis sufficientia credidi: Omnia enim amara ratione salis volatilis oleosi putredini resistunt, hinc nostram ægram beneficio absinthii maximam partem restitui; sicut hydrops solo absinthio curari potest, promovendo simul præterea urinæ fluxum. Unde in principio pro correctione acidi peccantis primarum viarum

[L1] 3 ordi-

ordinavi ipsi liquorem Martis solaris (aliàs enim acidum peccans castrasset omnia reliqua medicamenta,) ad gutt. 30. omni manè in vehiculo calido, donec ejus 3j. absumpta fuisset; cujus usu agra melius habuit, & sapor oris dulcis nauseosus evanuit, & urinæ fluxus copiosior evasit. Externè interim, pro ulcusculis scabiosis crurum manantibus, jussi imponi folia lapathi acuti recentia modicè contusa; ita & illa minus plorabant ferri, nec tumores incresebant, sed pustulæ ad sanitatem properabant. Dein suasi agræ decoctum, parandum ex radice lapathi acuti (ob scabiem,) fructibus cynosbati (pro cienda urina,) & herba absinthii ana, quod in aqua simplici factum omni manè calidè assumendum jussi, expectando sudorem, ubi etiam urina fluxit; imò ut hoc penetrantius esset, dedi ipsi spiritum absinthii urinosum per putrefactionem paratum, cujus 30. guttas prædicto decocto quotidie instillandas jussi pro sudore & urina: quibus per aliquot septimanas continuatis melius habuit patiens, sed nondum rectè. Post hinc præscripsi eidem vomitorium, ex quo miram saburram cum euphoria rejecit: quò facto repetiit decoctum ex solo absinthio & fructibus cynosbati ad aliquot dies: cum verò postmodum istud nausearet, parandam jussi saltem essentiàm absinthii cum spiritu vini infusi, deque hac quotidie, manè & vespèri, cochlear integrum assumpsit, instillatis unicuique dosi spiritus salis ammoniaci, gutt. 30. continuando ad aliquot septimanas. Absinthium quoque cum pane butyrato in omni pastu assumpsit, & sic integrè convaluit.

Externè verò pro tumoribus ordinavi aquam calcis vivæ, quâ probè calida pedes scabiosos sæpiùs abluit, & post calido linteo involvit, ut spontè exsiccentur, ita etiam pustulæ scabiosæ & tumores evanuerunt. Urina præprimis & aqua calcis vivæ optima sunt contra tumores tales, vel herba chelidonii majoris contusa imposita cruribus est egregia, vel folia laphathi acuti.

Tandem pro mensium defectibus, eorumque correctione, jussi parare pulverem ex

bacc. lauri p. iij.

Myrrhæ p. j.

& omni manè cuspides cutelli duos, in vehiculo calido assumere; sic ordinariò secuti sunt.

Præscribere aliàs pilulas Mercuriales cum extracto hellebori nigri soleo, pro acido viscido expurgando, & massa sanguinea purificanda, hoc modo:

Rx. Extr. helleb. nigr.

3ii dulc. ana gr. xv.

Troch. alband. gr. ij. vel *Extr. corund.* gr. j. ad j.

Cum f. q. Ess. fumarie f. Pilulæ pro una dosi.

Vel loco extracti hellebori nigri potest sumi extractum panchymagogum Crolli cum Mercurii dulcis ana gr. xv.

Tales pilulæ egregiæ sunt etiam in hemi-crania, scabie, lue Venerea, epilepsia, & similibus affectibus chronicis, speciatim in gonorrhœa virulenta; summam: ubi acidum viscidum, quoddammodo malignum, peccat.

Vel potest præscribi in forma boli ita:

Rx. Conf. fl. Persic. 3ß.

Extr. helleb. nigr.

3ii dulc. ana gr. xv.

Trochisc. alband. gr. ij. M. f. Bolus.

Pro scopo autem massam sanguineam in scabie per sudorem purificandi, hic magis adhibeantur salia volatilia, ut sal volatile cornu cervi, & sal volatile viperarum, adhuc nonnihil foetidum, quæ ad cutis usque peripheriam penetrant, massam sanguineam pervadunt, & vi alcalinâ saponariâ fermentum scabiei abstergunt; minus fixa conveniunt, sive terrea sive alcalia, quæ ultra primas vias non penetrant, quin porius operatione alterativâ in primis viis peractâ, per urinam potius eliminantur. Sic cum flores salis ammoniaci duplicis sint generis: nempe ipsum sal ammoniacum per se sublimatum; vel sal volatile, addito alcali, in forma liquida prolectum; hinc hoc, non verò illud, quod saltem falsum, adeoque diureticum est, usurpandum venit: Unde

Rx. C. C. f. De 3ß.

Θ vol. C. C. 3ß.

M. pro una dosi ad sudorem.

Vel *Rx. 7fl. samb. vel fumar. 3ij. vel ana 3j.*

*~ Θ * ci* 3ß. ad 3j.

Syr. Card. bened. 3ij. vel iij.

M. f. Potio pro una dosi, expectando sudorem.

Loco Misturæ hujus recipiatur *Essentia myrrhæ*, cum *~ u vini 7isato*, vel cum *R 7i*, vel cum *~ u * Θ ci vino*, parata;

Cujus dosis est 3ß. ad 3j. in vehiculo calido, præsertim cum taliter paratæ essentia cum omnibus aqueis sint unibiles.

Quodsi in ditiori persona mihi obvenisset casus hic, & ex officina Pharmaceutica debuisset curari, tunc præmissem (1) Digestiva Martialia, v. g. extractum seu solutionem Martis, cum succo pomorum factam, phlegmate paululum evaporato; vel tincturam vitrioli Martis Zwelfferi, vel pulverem cacheeticum Hartmanni, aut horum loco fixa & alcalina. His præmissis (2) vel vomitorium-

torium, vel purgationem per alvum, dedif-
sem ex Mercurio dulci, massâ pilularum de
ammoniaco, vel extracto panchymagogo,
cum extracto colocynthidis; & (3) pro mas-
sâ sanguineâ dyscrasia corrigenda volatilia
plus minus aromatica amara, propter in-
ertiam bilis, ut essentiam absinthii, vel suc-
cum ejus blandè inspissatum, vinum absinthi-
tes, vel vinum infusum ex absinthio, aliis-
que alterantibus herbis amaricantibus aro-
maticis (vulgò hepaticis apperientibus) vel
ipsam essentiam myrrhæ, vel essentiam li-
gnorum, vel spiritum carminativum, bis
aut ter in die à 3ß. ad 3j. sumendo, & aliquam-
diu continuando.

Cum his propter scabiem subinde simul
procurassem sudorem.

Quod Extrema præmissis præmittendis
ea inter excellit oleum tartari per deliquium.
Et quidem quæ externè scabiem aliosque cu-
tis affectus curant, ordinariò sunt triplicia:
nempe

1. De genere alcalium saponariorum &
abstergentium.

2. Sulphureorum; &

3. Mercurialium.

Alcalia positivè agunt, & saponariâ suâ
vi fermentum scabiei destruunt, & abster-
gunt; sulphurea verò pinguedine suâ id fer-
mentum obrundunt & destruunt; sicut Mer-
curialia omnium potentissimè operantur, &
tàm fermenta acida quorumcunque ulce-
rum, quam scabiei, destruunt. Ex his er-
gò varia remedia præscribi possunt: Nempe

I. Ex alcalibus prodest calcis vivæ aqua
polychresta, nunc per simplicem, nunc ve-
rò per repetitam aquæ infusionem, nunc
simplex, nunc cum sulphure parata, pro ab-
lutione manuum & pedum scabiosorum usur-
panda; ita purificando cutim potenter sca-
biem ea curat. Facit huc euporiston illud
commune, nempe lixivium coriariorum,
quod est lixivium falso-alcalinum admodum-
que acre: diluatur ergò cum aqua commu-
ni, & applicatum externè, aut pro lotionem
adhibendum, ferinam quoque scabiem cicu-
rat. Item spectant huc decocta stercoris gal-
linæ, vel fimi ovilli, quæ transcolentur,
& externè cum eo calidè laventur manus. Po-
test etiam incoqui radix lapathi acuti, quæ
postmodum præter lotionem etiam sub cata-
plasmatis forma potest applicari: Vid. Simon
Pauli in Quadrip. Botan. ubi de Laphatho acu-
to. Cæterùm hæc alcalia optimè sociantur
cum sulphuribus.

II. De genere sulphureorum profunt v.g.
flores sulphuris, aqua calcis vivæ, in qua sul-
phur trium decoctum. Ego sæpius utor
unguento albo camphorato, vel diapom-
pholygos cum floribus sulphuris misto, c. g.

℞. Ungu. alb. camp. vel diapomphol.
vel enul. ʒi.

℞. ʒi ʒij. ad iij.

Θ ʒi ʒi. ad ʒi ʒi.

Cum f. q. ol. Nicot. f. Linimentum.

Cum hoc Patiens calidè omni manè &
vesperi inungat articulos, talos, genua, carpos,
flexuras, cubita.

Cum Patavii agerem, ipse scabiosus red-
debar ex mutatione diætæ, & scabiem per
duos menses cum voluptate perferebam: ast
cum postmodum ob pruritum somnum inter-
turbaret, hinc post salis viperini usum recepi
Unguentum album camphoratum cum flori-
bus sulphuris & oleo hyperici, dicto modo:
quod linimentum tunc temporis multis quo-
que suasi cum successu.

Dicis: Linimenta sulphurea sunt suspe-
cta, quia observatum ab eorum usu scabiem
fuisse retropulsam, quod verum est; quippe
viscosa illa sunt, imprimis si universum cor-
pus perfricetur. Optimè ergò hinc additur
sal tartari, vel aliud alcali addatur, quod sul-
phur dissolvendo præcavet: quò minus ob-
linire cutim hoc queat; positivè enim fer-
mento scabiei occurrit, adeoque periculo
omni hac ratione medemur.

Vel si non sufficiat ejusmodi unguentum
aut delicatulis inimicum sit, tunc saltem
omni vespera illinantur dicta loca cum eo-
dem, & omni manè abluantur cum aqua
calcis vivæ, in qua sulphur commune deco-
ctum sit, ac spontè siccari permittantur. c. g.

℞. ʒi ʒi ʒi. vel ij.

ʒi comm. triti ʒij.

Mista coquantur probè & colentur,

Hoc decoctum quidem foetet delicatulis
quibusdam hominibus, sed bonum est; loco
cujus etiam sufficit solutio scoriarum reguli
antimonii in aqua, quæ filtrata pro curanda
scabie, & abluendis serpiginibus cutis, ulceri-
bus serpentibus, &c. egregia est.

III. Tandem ultimum remedium est
Mercurius vivus: ex quo cingulum sapien-
tiæ Rulandi paratum tutum est, modò debi-
tis cautelis gestetur: de quibus vid. Bartholi-
nus in Hist. Med. scilicet cingulum Mercuriale
peripheriæ hypochondriorum affigatur, ita
tamen, ut patiens hinc probè tectus incedat,
& omne externum frigus vitet, quin potius
motui studeat; secus enim imminet pericu-
lum gravioris morbi & interdum ipsius saliva-
tionis: ac vidi aliquem, qui post hujus præ-
posterum usum febre petechiali longè gravio-
ri correptus fuit. Interim tutissimus modus
est, ut hinc fiat aqua Hermetica Augenii,
quæ est, si

℞. ʒi vivi purif. ʒij.

ʒi comm. ʒi.

Agiten.

Agitentur probè, & ebulliant ad horam, hinc filtretur, & loca scabiosa abluantur.

Vel addi etiam potest huic decocto filtrato, dum adhuc calet, Mercurii dulcis ʒj, sicque hoc ipso lavari potest carpus & talus, ac in majori malo etiam cubitus & genua.

Vel R. $\nabla \Psi \alpha$ lbj.

η ii dulc. ʒj. vel ʒij.

Mista usurpentur.

Ubi quidem mercurius dulcis ab aqua calcis vivæ præcipitabitur in pulverem album; verùm nihil refert, sub usu probè agitur aqua.

Similiter potest etiam Mercurius dulcis in forma sicca supra dictis linimentis admisceri, nempe corundem ʒj. Mercurii dulcis ʒij. ad ʒiij. pro ratione circumstantiarum, & olei nicotianæ s. q. & ita circa articulos affricari, tegendo hinc probè corpus, & calidum conservando.

In scabie serina & ad lepram ferè accedente, quæ nullis cedit remediis, tunc, præmissâ sudatione per decoctum lignorum, nil melius est, quàm salivatio per Mercurium instituta. Interim præ cæteris tutissima sunt omnia alcalia, sal tartari & aqua calcis vivæ, quæ in tinea capitis infantum quoque proficua sunt: nempe oleo tartari per deliquium spongiola intincta hinc inde crustæ applicetur, ita corrigitur ejus acidum & crustæ decidunt: Vel

R. *Ol. amygd. dulc.* qu. placet.

Cum s. q. Θ ʒi vel *ol. ʒi* terendo
f. Linimentum:

Cui, si pediculi simul adfuerint, addatur olei destillati Spicæ ʒss. aut gutt. xij. ad xv.

Hoc linimento loca tinea illinantur, pediculi horrentes oleum spicæ, mirè fugantur, aut si non poterunt fugam capeßere, mori necesse est. Hoc factò lavetur caput cum cerevisia secundaria, in qua decocta sunt pisa, sic etiam tinea capitis ex voto evanescet.

Similiter, si habeant infantes serpigines, sal tartari soluto vel oleo tartari per deliquium intincta spongia, tangantur loca serpiginea, ex quo quidem supervenit ardor, pruritus, &c. sed tamen etiam squamulæ decidunt, nec ampliùs redit malum.

In retropulsa tandem scabie, vel si mox scabiem abegit æger per externa adhibita, neglectis universalibus, nil melius sunt Viperinis, v. g. carnearundem, pulvere, essentia viperarum, eaque in larga dosi aliquandiu usurpata: non secus ac quoque simus equinus, qui optimum est euporiston in potu ordinario assumptus, revocat eandem. Aliis tamen irritis imitemur Zacuti Lusitani consilium, quo cohabitationem in lecto aliqujus scabiosi suadet; nam etiam hac ratione scabiem revocatam fuisse observavit.

C A S U S X L.

CACHEXIA CUM IMMINENTE HYDROPE.

Vir robustus, sanus, & vegetus, vini potator strenuus, optimisque adfectus edulis, &c. aliàs hereditario parentum vitio interdum doloribus nephriticis, indeque pariori urinae profluvio, obnoxius, procedente ætate consistente conqueritur de superveniente subinde difficiliore, aut scalarum adscensu, juncta simul aliquali cordis palpitatione. Appetitus non ampliùs, ut aliàs, urget, contra sitis insigniter ingravescit. Comedit, sed dolore stomachi compressivo à pastu afficitur, facies pallet, subtumida redditur, imprimis circa oculos. Urina emittitur pauca, tincta insigniter, nonnihil turbida, lassitudo universi corporis supervenit. Interdum, dum vesperi lectum petit, pedes nonnihil tumidos, ad talos usque conspiciunt, qui tamen tumor, matutino tempore penitus discussus est. Donec vespere denuò augmentetur: sedita: ut post aliquot septimanas successive magis magisque adscendat. Tumor est mollis, digiti impressioni cedens, brevi tamen denuò protuberans.

R E S O L U T I O.

Uti aliàs vulgari proverbio ex ungue leonem, ita in hoc nostro agro, ex insigniter mutato corporis calore nativo, nempe pallore aliisque symptomatibus, non incongrue fortè Cachexiam, malum illud haud infrequens, cognoscimus. Quæcunque enim corporis & partium subcutanearum mutatio, à statu naturali in deteriorem, cachexiam ex vitiata nutritione dependentem, innuit. Quia verò pro qualitatis peccantis varietate modis etiam variis, harum partium subcutanearum læditur nutritio (unde plures cachexiarum observantur species) propterea unam certam ex his colligam, huicque affectui nomen suum propriè competens, imponam. Est ergò affectus noster nihil aliud, quàm Cachexia confirmata, cum imminente Hydrope ascite universali conjuncta.

Partem autem hujus affectus primariò affectam statuimus ratione cachexiæ partes solidas molliores carnosas, pariter ac nerveas; ratione vero imminentis Hydropis ascitis renes in suo officio nonnihil negligentes, & spiritus animales, corporis machinæ contenta liquida minus debite moventes. Prioris probationem suggerit urinae pauca & parca excretio, posterioris verò probatio ex partium

tium subcutanearum pallescencia clara atque manifesta est.

Cruditati autem massæ sanguineæ nimæ causæ proximæ nomen non immeritò imponitur, eaque dependet ex læsio fermento ventriculi.

Causa remota est digestio prima læsa, deficiensque ejus perfectio in duodeno à bile, cujus inertia ordinario fovet, & quosvis chronicos morbos magis exasperat. Massa autem sanguinea chylo nimis crudo repleta, partes potius infarciuntur, quam nutriuntur, propterea mox cachexiarum signa minus fallibilia, nempe pallor & tumor faciei, imprimis circa oculos, in promptu sunt. Imò plura & majora sub hocce digestionis errato urgent symptomata: Hinc Dominus noster æger cachecticus de difficiliore respiratione, cum aliquali cordis palpitatione simul juncta, sub incessu paulò concitatore, aut sub scalarum adscensu conqueritur. Sanguis enim crudus, in pulmonum vasis rarefaciendus, prætereaque crudis succis infarctus, difficulter per præcordiorum vasa circulatur, hinc quo celerius in reliquo corpore sub partium motu movetur, eo magis infarcit ac replet pulmones, quorum accidentium concursu difficilis respiratio, & irritato cordis musculo ejus palpitatio superveniunt. Quod verò dolorem stomachi compressivum à pastu affligentem attinet; vix etiam agnoscit causam, quàm fermentationem in stomacho impeditam, unà cum stomachi flacciditate, in quo jacent potius alimenta, quam ut ab eodem retineantur. Sitis verò insigniter urgens est à deficiente urinæ secretionem, indeque oriunda salis salis urinarii retentione, & cum sanguine ac reliquis succis, indeque saliva, permissione. Pauca & parca urinæ excretio quid aliud innuit, quàm imminuentem, imò jamjam incipientem, Hydropem ascitem? Deficiente enim chylosi naturali, massa sanguinea chylo crudorepleta à debita atque ordinaria spirituum generatione impeditur, unde successivè vires animales & vitales, corporis machinam hydraulicam ejusque contenta liquida moventes, deficiunt, nec sufficiunt movendis contentis propter horum copiam, ex impedita per renes & insensilem transpirationem excretionem coacervatis, quæ proprio ponderis & gravitatis motu deorsum ruere coguntur, & ita Domino nostro ægro cachectico hydropem pedetentim, ab inferis, nempe pedibus incipientem, adeoque universalem, efficiunt. Hinc enim Dn. æger primum magis vesperti quàm manè pedes nonnihil tumidos ad talos usque conspiciat, quia vesperti, spirituum impetu magis magisque languescente, ex virium aliquali defectu, & massæ sanguineæ serosioris & viscidioris labo-

riofiori & difficiliore circulo, hæc ipsa proprio impetu ac mole magis deorsum fertur, ac hinc difficilius adscendit, indeque impulsus in arterias factus in venis haud leviter imminuitur, ut difficiliore ex illis in has, ob id pleniores, respectivè fiat transitus, sub quo juxta osculorum extremitates sanguis spissior, & qui impetum moventem à corde impressum, & per arterias continuatum, facilius, quàm fluidius serum suscipit ac retinet, in venulas tandem ex arteriis intruditur, ipsum verò fluidius serum, plus minus viscidum, quâ data porta suoque impetu fertur, à sanguine secedit, ad inferiora, præsertimque circa talos, ubi notabilius languescit spirituum impetus, congeritur, quò etiam fibrarum vespertino tempore spasmo quasi affectarum, labes non parum facere potest, dum hac occasione pori simul occluduntur, & quivis ceteri meatus angustantur, adeò ut hoc ipso insensibilis transpiratio & sensibilis transsudatio magis impediatur; nocturno autem temporis intervallo, quia tunc, propter calorem lecti, fibrarum tensio remittit, & insensibilis transpiratio nonnihil aucta existit, sub validiori spirituum, vesperti delassatorum, impulsu rapidior magis sanguinis circulus, quò serositates evacuatae in vasa retruduntur, existit; unde pedetentim iterum tumor tempore appropinquante matutino evanescit, post aliquot verò septimanas magis magisque ad abdomen adscendere incipit.

Quod verò huic cachexiæ confirmatæ Hydrops ascites superveniat, non levem culpam, tanquam causâ remotissima, mereatur vitium hæreditarium parentum, nempe dolor nephriticus, & aliàs in his affectibus consueta pauca atque parca urinæ excretio, ægrum nostrum eò facilius ad hydropem disponens. Accedit etiam tanquam causâ remotissima ægri nostri intemperies, in specie ebriosa; nimia enim potus ingurgitatio partim hebetat chylosin, & consequenter etiam hæmatosin, partim etiam nimio potu & crebriore urinæ excretionem debilitantur renes, quò minus tandem sufficiat eorum fermentum.

Ordine jam pergendum ad Prognosin, ubi modus & tempus eventus hujus affectus nonnihil considerandum. Est autem nostra cachexia non incipiens, sed jam confirmata, & malum chronicum, difficilis atque tardæ, non tamen propterea nullius, curationis. Cum ergò cachexia sit confirmata, quæ jam ad ascitem declinat, & viscera, stomachus atque renes, etiam suo officio deficiant, periculum est, ne hydrops magis confirmatus tandem ægrum jugulet.

[Mm]

Ob

Ob id in Methodo medendi ante omnia attendendum:

1. Ut stomachus corrigatur, & ejus vitiata digestio, adeoque ejus in duodeno à bile perfectio emendetur, inhibendo ejus cruditatem: quod optimè hic præstant Martialia, post institutum vomitum propinata, ut nempe prius evacuentur succi vitiosi ex primis viis & massa sanguinea, difficilisque nonnihil corrigatur respiratio.

2. Emendetur massæ sanguineæ cruditas, & inde orta ejus dyscrasia, unâ cum inertia bilis: id quod præstant alcalia volatilia, & subjecta aromatica, in specie omnia amara, & acidum corrigentia & bilem acuentia.

3. Habeatur ratio imminentis hydropis ascitis, hinc usurpentur remedia crudos succos & massa sanguinea evacuantia; purgantia nempe & diuretica, de natura alcalina, sive sint salia fixa vegetabilium, sive salia volatilia animalium, imprimis bufonum, lumbricorum, &c. quæ omnia specificâ suâ alcalinâ virtute non tantum fermentum renum acuunt, sed etiam per urinæ copiosum fluxumordes recrementosas evacuant.

4. Denique symptoma illud cursu morbi urgens, & Hydropicis frequentissimum, nempe sitis, per convenientia remedia removeatur. Prodest autem hîc maximè Mastix in ore masticata & successivè deglutita, uti & nitrum purificatum potui ordinario additum. In omnibus enim remediis simul semper ad renes respiciendum, adeoque talia, quantum possibile, propinanda, quæ & urinæ fluxum promovere valent.

Pro primo ergò scopo præscribi possunt digestiva salina & tartarea, ad corrigendos succos in primis viis hærentes, & pro meliori evacuatione præparandos, v. g.

℞. *Lapill. str. præp.*

His digest. hyp. aa. ʒß.

M. div. in 2. part. æqu. S.

Digestiv. Salz.

Vel ℞. *Arcan. dupl. Myns.* gr. xv.

His Absinth. gr. vij. M. S.

Digestiv. Pulverlein auf einmal.

Vel ℞. *ʒi Blati Tacch.* ʒij.

His Absinth.

Lapill. str. præp. aa. scrup. j.

Ol. dest. Terebinth. gutt. vi.

M. f. Pulvis:

div. in 3. part. æqu. D. S.

Digestiv. Pulver auf 3. mal.

Hi & similes Pulveres, mucum viscidum incidentes, possunt aliquamdiu certis dierum intervallis usurpari. Vel si medicamenta talia digestiva in forma liquida alicui magis placeant:

℞. *Liqu. ʒæ sol.* ʒi ʒij. D. S.

Digestiv. Essenz 30. Tropfen auf einmal.

℞. *R Tart. acris, vel ex tart. ʒi ana calcinat. vel ex scor. reguli ʒii, ʒij.*

~ *ʒci ʒi. ad ʒiß.* M. D. S.

Eröffnende Tinctur.

Dosis 40. vel 50. gutt. bis vel ter in die, in vehiculo calido.

Quodsi quis ingratum nonnihil saporem minimè abhorreat, mistura aliqua ex gummi ammoniaco, in mucos incidendo admodum proficua, præscribi potest, v. g.

℞. *ʒ Menth.*

Rosar. aa. ʒj.

Cinnam. ʒvj.

G. ʒi in ʒo sol. ʒj.

His digest. hypoch. ʒj.

Syr. Menthe. ʒj.

M. pro 2. vel 3. dosibus.

Maximè prosunt Digestiva Martialia, ut post evacuationes debitas proximè fieri possit accessus ad Diuretica volatilia.

Præmissis ergò hisce Digestivis salinis, non inutile nec inconveniens erit, urgente præsertim respiratione difficili, & imminente tantum Hydrope ascite in hoc subiecto, propinare vomitorium aliquod, v. g.

℞. *ʒ Menth.* ʒvj.

Cinnam. ʒij.

Syr. emet. Ang. Sale ʒß. M. S.

Brech. Mixture auf einmal.

Vomitória autem pro circumstantiarum & individui ratione unâ alteravè vice reiterari, vel etiam omitti possunt.

Non inconvenienter etiam hîc Purgantia vel laxantia per inferiora præscribi possunt: Pilulæ nempe ex Extractis, utpote panchymagogo Crollii cum Mercurio dulci, ut & pilulæ ex massa pilularum de ammoniaco Quercetani, cum extracto Martis aliisque essentis paratæ, v. g.

℞. *Extr. panchym. Croll.* ʒj.

ʒii dulc. rite præp. gr. xv.

ref. Jalapp. gr. iij.

Cum *Ess. Fumar. compos.* f. Pilulæ.

Vel ℞. *MP. de ʒco Querc.* scrup. j.

Extr. ʒi sc. f. pom. scrup. ʒ.

scamm. ʒat. gr. ij.

Extr. troch. alband. gr. j.

Cum f. q. *R ʒli ʒis Zwelff.* f. Pilulæ.

D. S. **Eröffnende Purgier-Pillen.**

Tales omni octiduo reiterari, interpositis semper digestivis diureticis, debent. Vel

℞. *MP. hier. c. Agar.* vel *Tart. Querc.* gr. xv.

Diagryd. gr. jv.

Mag. g. de Peru gr. ij.

Cum f. q. *Tinct. Tart.* f. l. a. Pilulæ.

Purificatis ergò primis viis, post medicamentorum evacuantium usum, optimè conveniunt Martialia, ceu appropriata chronicorum affectuum remedia, v. g.

℞. *Tinct.*

℞. *Tinct. Oli &is Zwelffer.* ʒiʒ.
D. S. **Eröffnende oder alterirende Tinctur.**
dos. ʒj.

Vel ℞. *Liqu. &is Oar.* ʒj. D. S.
Eröffnende Tinctur, 20. bis 30. Tropfen.

Capiantur quotidie semel aut bis in die in vehiculo aliquo convenienti, vel cerevisia, & continuetur per aliquot septimanas.

Vel ℞. *Mag. &is aperit. Myns* ʒiʒ. D. S.
Eröffnende Essens 30. bis 40. Tropfen auf einmal.

Vel ℞. *Tinct. Tartari Martial.* ʒj. D. S.
Eröffnende Tinctur.

℞. ∇ *Fumar.*

Genist. aa. ʒiʒ.

Mag. f. Extr. Martis Myns. vel cum *succo pom.* ʒiʒ. ad ʒij.

M. pro Potione.

Capiat quotidie bis cochl. j. vel ij.

Quodsi alicui magis placeant medicamenta in forma pulveris, illi præscribatur sequens Pulvis:

℞. *Pulv. cachect. Hartm.* ʒij.

Corall. r. præp. ʒij.

M. f. Pulvis.

Div. in 4. part. æqu. S.

Eröffnende Pulver.

Sub horum verò Martialium usu, simul necesse est, interponantur nonnunquam laxantia, v. g.

℞. *G. &ci. ʒo sol.* ʒiʒ.

Aloes lucid. f. ros. gr. xv.

Resin. jalapp. ʒiʒ.

Extr. troch. alhand. gr. ij.

Cum *Tinct. Vitrioli Martis Zwelff.* f. *Pilulæ* pro 3. vel 4. dosibus, prout plus vel minus laxandum.

Habeatur nempe ratio individui, & singulis septimanis una capiatur dosis.

Eleganter etiam hic pro scopo laxandi usurpari possunt passulata; v. g.

℞. *Pulp. Passul.* per setac. traj. ʒij.

Extr. Martis c. f. pom. ʒj.

Rhabarb. el. ʒij. ad ʒiʒ.

Cum f. q. *Syr. ros. solut.* f. *Electuarium.*

Capiatur quotidie manè dosis magnitudine castaneæ.

Post usum verò Martialium usurpanda veniunt Diuretica, vel volatilia vel fixa, aliquamdiu continuanda,

℞. ∇ *amm. succin.* unc. j. D. S.

Alterirender Spiritus 20. Tropfen auf einmal.

bis vel ter in die.

℞. ∇ *carmin. de trib.* ʒj.

℞. *Tinctur. nephrit.* ʒiʒ.

Liqu. C. C. succin. ʒij. M.

Dentur pro Dosi 50. gutt.

Tom. II. Pars 2.

℞. *Tinct. nephrit. Ammel.* unc. ʒ.

∇ *Lumb. per ferm. f. putref.* vel ∇

∇ *e per putref.* ʒij. M. S.

Treibende Tinctur.

℞. *Tinct. Nephrit.* ʒij.

Tartari ʒj. Misc.

dos. 40. vel 50. gutt. Continuetur aliquamdiu.

℞. ∇ *Petrosel.*

Alkek. aa. ʒiʒ.

Malvat. Juniperin. ʒvj.

Tinctur. nephrit. ʒiʒ.

∇ *lumbr. festr. per putr.* ʒj.

Syr. de Canell. ʒvj. M.

℞. *&is finicolumb.* ʒiʒ.

stip. fabar. ʒj.

vol. bufon. vel *lumbr.* ʒiʒ.

M. div. in 6. part. æqu. S.

Harn-treibend Salz.

Manè & vesperi accipiatur dosis in jusculo cerevisiæ calidæ aut carnis bubulæ.

Vel ℞. *Arcan. dupl. Myns.* ʒj.

&is genist. ʒiʒ. M. D. S.

Sonderlich Salz.

Detur pro 2. vel 3. dosibus.

Tandem balsamum sulphuris terebinthinatum, vel juniperinum, commodè aliquamdiu continuandum venit.

Ut etiam symptoma illud, Hydropicis frequentissimum, nempe sitis, removeatur, prodest Mastix in ore masticata & successivè deglutita; ut & nitrum optimè purificatum potui ordinario additum, &c.

Præter hæc Interna, etiam Clysmata multis usibus Hydropicis inserviunt, præsertim quando flatus in intestinis urgent, e. gr.

℞. *Decoct. fl. Chamomill.* ʒvj.

∇ *hum.* unc. iij.

Elect. lenitiv. ʒvj.

Ol. dest. Terebinth. ʒj.

M. pro Clysmate.

CASUS XLI.

PLEURITIS VERA.

*V*ocatur Medicus ad mulierem plebejam 42. annorum, isque septimo demum decubitus sui die accedens, invenit eam summè debilem, tussi gravi affectam, & summo, simulque laborioso conatu viscida nonnihil cruenta, consistentiæ inæqualis tussiendo rejicientem, deque lateris dextri in costarum regione interna gravissimis doloribus punctoriis conquerentem. Dolores præfati prius sinistrum latus, & postmodum dextrum occupaverunt. Morbus cum gravi horrore, sine manifesta, quam referre posset, occasione eam prehendit, quem verò inscutus fuerat æstus insignis, continuus cum siti intensissima, & doloribus

[Mm 2] lateris

lateris exquisitissimis. Contrectans eam, Medicus frigida sudantem, cum extremis frigidis offendit; pulsus celer, frequens, parvus, debilis, durus, quinta quaque pulsatione intermittens: respiratio difficillima, ita ut omni momento suffocatura videretur, vox simul rauca, cor palpitabat, &c.

RESOLUTIO.

Affectus est Pleuritis vera; adsunt enim quinque symptomata, quæ ubi concurrunt, signa pleuritidis pathognomonica constituunt. Morbus autem est in statu.

Signa hæc, quibus Pleuritis vera cognoscitur, sunt (1) dolor, (2) febris, (3) pulsus, (4) respiratio, & (5) tussis. Dolor adest punctorius, circa costas nothas, pleuriticis proprius: febris acuta omni pleuritidi ordinaria etiam ante suppurationem: pulsus pleuriticis proprius celer, frequens, durus, vehemens & magnus; celer & frequens, ratione febris; non raro intermittens ob sanguinem certis in locis stagnantem, qui non plus debito formidandus; durus ratione inflammationis membranae. Quæstio est de pulsu serrato, quem quidam pathognomonicum signum pleuritidis æstimant, alii vero ceu figmentum rejiciunt: Lis est de lana caprina; serratus enim dicitur à modo afficiendi pulpam digitorum: quando enim pulsus est parvus, durus simul & celer percipitur, adeo ut per minima quasi punctula feriantur apices digitorum, vocatur pulsus serratus, & est complicatio pulsus celeris, frequentis & duri, quò frequentioris, eo magis serrati: Respiratio adest difficilis, quæ observatur in omni pleuritide, & est frequens & parva; quia non possunt sufficienter dilatare thoracem propter dolorem, quem tunc exasperant, quia verò est parva, eo est frequentior, ut, quod deficit in magnitudine, frequentia compensetur: Tussis adest humida, quia morbus est jam in statu; in primo principio vero, uti etiam in pleuritide notha, si adest, non nihil sicca est.

Pars affecta est pleura, quod testatur dolor punctorius circa costas interius perceptibilis. Sed quæritur hic: an pleura sola in pleuritide afficiatur? multi affirmant; pauci contrarium statuunt, dicendo; quod cum pleura observatus fuerit pulmo istius lateris etiam affectus. Conf. Platerus in *Praxi*, & Zecchi in *suis Consultationibus*, qui nunquam in pleuriticis mortuis pleuram observant sine pulmonum vicina partis inflammatione simultanea: Vid. & Schneiderus in *Disput. de hac materia*. Confirmant hoc tussis continua, & rejectanea ista copiosa per tussim, quæ sanè ex pulmonibus sunt; adeoque & pleuripneumoniæ ac pleuritidis per metastasin materiae facilis transmutatio, quæ

hos affectus in radice convenire pariter confirmat; sicut in nostra ægra pleuritidis partis sinistrae in dextram metastasis contigit. Metastases autem hujusmodi non sunt raræ, & fiunt vel partium non admittentium culpâ, vel humorum non invehentium vitio, i. e. Pleuritis nostra partis sinistrae translata fuit in partem dextram, vel vitio partis non admittentis, vel vitio succorum non invehentium. Partes ineptæ sunt, dum illarum pori & meatus angustiores succos non admittunt, aut retinent; unde quò solidior est pars, eò minus humorum & recrementorum morbosorum, decubitus obnoxia est; hinc etiam refrigerantia & adstringentia remedia dicuntur repellere, seu decubitus remove, quatenus adstringendo meatus, & condensando fibras partium, impediunt recrementorum decubitus. Vitio verò humorum contingit metastasis, dum hi nondum satis secreti aut fixati sunt; sic enim secreta pars, partem transeundo, huic adhæret. Quamdiu enim invicem permixti sunt, etiam vias angustiores permeare possunt; quando verò præcipitatio quædam facta est, præcipitatum hæret, alterum transgreditur; hinc tales depositiones fiunt saltem post coctiones & præcipitationes. In nostra ægra pleura & simul pulmonum latus dextrum, affecta sunt, quod testatur suffocatio imminens, & materiae recrementosa rejectio cum tussi, quæ subinde, simul ac ipsæ inflammationes internæ pariter ac externæ, est productum morbosum potius, seu morbus secundarius quàm primarius ex acido, ceu spina infixæ, inductus.

Scilicet unum saltem circa inflammationum Theoriam probè considerandum venit, nempe spina infixæ, quæ inflammationem excitat. Si digito infigitur spina, supervenit dolor, hinc spasmus, hinc inflammatio sequitur. Par ratio est quoad alias inflammationes, in quibus ut plurimum, si non semper, præsupponenda spina talis, inflammationem occasionaliter causans, ut eadem tandem secundariò superveniat. Hinc enim est, quod sæpius in eodem loco inflammationes recurrant, v. g. pleuritides recidivantes: in quo recidivæ puncto non sufficit simpliciter atonia partium ex inflammatione læsarum, utut & hæc multum tribuat, sed potius talis spinæ antea infixæ firmiores radicatae inhærent reliquiæ. Hujusmodi spina in pleuritide, non secus ac in aliarum partium inflammationibus, ut & in ipso erysipelate, ut plurimum est peregrinum acidum, partibus membranosis & nervosis inimicissimum, circa pleuram & pulmones depositum, quod pungendo eam & rodendo, occasionem inflammationi inferre solet. Hinc

in inflammationibus à causa interna natis, adeoque spontaneis, itemque externis, ulceribus & vulneribus curatis supervenientibus, ad acidum ut plurimum respectus habendus, quod hujusmodi inflammationes occasionaliter infert, & in quo enervando vertitur cardo modi legitime curandi inflammationes; unde inflammatio imminens maturè sistitur per spiritum salis ammoniaci; quod etiam locum habet in erysipelate, ubi spiritus sambuci & spiritus salis ammoniaci, invicem misti & illiti, evellendo spinam, certè sunt optimi.

Causa ergo proxima est acidum dolorificum pleuræ affixum, non secus ac spina infixa inflammationem (ob fibrarum nervearum contractionem, hincque ortam angustationem, & consequenter stagnationem cruoris,) inducens.

Quoad causas remotas ex omnes conspirant in eo, ut acido præternaturali ansam suggerant: Partium enim tonus læsus, per se inflammationem non infert; quamvis enim sanguinem non transmittat, saltem tamen varices vel aneurysmata infert, non inflammationem, nisi etiam ipse simul sanguis sit vitiosus; ita enim is inflammationem subire aptus est: contra utut ex læso partium tono sanguis etiam stagnet, non tamen is inflammatur. Spasmi fibrarum non oriuntur, nisi à vellicatione fibrarum, quæ est ab acido, fibris & membranis inimicissimo. Caterum nostra ægra Pleuritidem ex inquinato aëre epidemicè patiebatur, eoque ante breve tempus frigidum, sicco, aspero & penetrante, qualis in prædispositis facile malum pleuriticum inducere poterat, sicut etiam plures tum temporis pleuritide corripiebantur. Unde & dubito, an fieri possit, quod sanguis sero destitutus in motu suo cessans inflammationem concipere queat? præsertim cum videamus, lue Venereâ laborantes post salivationem Mercurialem perpeßam sanguinem venæsectione emissum & in vasculo congruatum, sine ullius feri vestigiis monstrare; quia omne serum mediante salivatione educum fuit, nec tamen unquam inflammatorios affectus incidere. Utut ergo serum multum ad fluxilitatem sanguinis conservandam conferat, tamen ipse sanguis, ceu liquor oleosus salinus, quamdiu calor in corpore viget, tamdiu in fluore continuo servatur ipse sanguis, liquor salinus oleosus seu pinguis, indequè calido liquabilis & mobilis; unde modò calor in eo debitus excitari, & ita ejus medio hic ipse in fluore debito conservari queat, vix de ejus inflammatoria stagnatione periculum subesse potest, sicuti aliàs quælibet subjecta pinguis, calori admota, liquescunt, utut in frigore coagulentur.

Casus similis extat in Disp. Wesneri sub præsidio D. D. Wedelii de Pleuritica ægra habitâ.

Porrò Tussis ægræ nostræ considerationem meretur: Nempe pleuritis quæcunque finitur vel per insensibilem resolutionem & discussionem, quæ methodus omnium est optima, hinc resolventia sudorifera hic sunt primaria; vel per materiæ coctionem, i. e. attemperationem; vel tandem per inflammationis suppurationem. Et coctionis quidem vox omnibus humoribus tribuitur, coctaque materia dicitur, quando temperata facta est, in pleuritide scilicet, quando quod exulceratur, temperatum est, nempe materia ex tenui moderatè crassâ, ex acri & aspera, insipida & temperata facta, ita ut nullam corporis partem possit afficere. Unde Pleuritis finitur per coctionem, quando copiosum sputum coctum ejicitur, vel intra diem septimum; vel intra decimum quartum, vel intra vigesimum primum; sputum est, quod rejicitur album, leve & æquale, oriturque rejectio hæc, quando ab irritatione pulmonum facta copiosior lymphæ per asperam arteriam in pulmones derivatur, quæ sanguinem extravasatum plus minus reïolutum dissolvit, imbibit, & ita in glutinosum quoddam concretum transmutat, quod tunc ejicitur. Hoc si fiat, dicitur materia cocta. Et quidem, quando facile materia rejicitur levis ea est, sicut æqualis, quando materia illa rejecta per totam sui substantiam & consistentiam uniformis existit; inæqualis, quando hinc inde est grumosa. Quod si ergo hæc sputa deficient, sint parca, inæqualia, cruda, ultra dies criticos in pleuritide continent, signum est superventuræ suppurationis, imprimis si duret febris; sicut & in nostra ægra materia cruda est, quia laboriose excernitur (2) est sanguis nolenta, & sic innuitur, sanguinem non esse alteratum (3.) materia est consistentiæ inæqualis *schlupferig* / hinc inde grumosa, est ergo sputum crudum; quæ omnia non significant ingruentem suppurationem, sed die septimo se præsentantia, morbum longum futurum innuunt; quamdiu enim tussis & rejectio cruenta urgent, nullum signum est suppurationis. Unde nec dolor præsens est à mutato sanguine in pus, & à concursu duorum salium, aliàs nec major dolor sperandus esset tempore suppurationis, quod falsum est; sed potius adest statim dolor in principio pleuritidis, antequam ea ad suppurationem tendit; hinc doloris ratio dependet partim à parte affecta, quæ est membrana pleura, & partim à causa efficiente, acido puta, vellicando & pungendo pleuram, unde spasmus & contracturæ superveniente dolor punctorius, quæ junctim acerbum talem dolorem inferunt.

[Mm] 3 • Sudor

Sudor in ægra nostra obvius erat syncopticus, ubi ipse ros nutritivus extillabat ex defectu spirituum exhaustorum.

Palpitatio autem cordis forsan hic est à grumis sanguinis in corde hærentibus. Pulsus quoque quinta pulsatione intermittit in ægra, quod phænomenon Pleuriticis frequens est. Et quidem intermittens pulsus nunc magis nunc minus periculosus est; frequens observatur in praxi, imprimis (1.) in pleuritide, in qua talis intermittens, cæteris paribus, est sine periculo; (2.) in magnis doloribus, in quibus nunc ordinatis, nunc inordinatis typis, intermittere notatur pulsus; in quibus tamen etiam, cæteris paribus, est sine periculo (3.) in hypochondriacis & scorbuticis, præsertim quando hi exacerbationes quasdam per modum paroxysmi patiuntur, tunc nunc per unam, nunc per plures pulsationes pulsus intermittit, etiam sine periculo; dum enim paroxysmus cessat, iterum fit æqualis; (4.) in febribus malignis, ubi omnium pessimum est signum. Cæteroquin pulsus intermittens in nostra ægra oritur ex inæquali, & plus minus interrupto sanguinis per cordis ventriculos motu. Et quidem, nisi conformationis vitium quoddam in vasis cordis, vel nativum, vel adventitium subsit, in sanguinis mutata consistentia & plus minus grumositate seipsum in suo motu per ebs impediens, malum hæere suspicor. In nostra ægra facilis est in statu, quia sanguis non solum in pleura, sed etiam pulmonibus stagnavit, unde facilius potuit supervenire.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosin ægra erat in desperato casu; Pleuritis erat in statu, materia erat cruda, suffocatio præsentanea, sudor frigidus, pulsus intermittens, & similia; unde in hoc casu ancipiti eandem saltem tentandi gratia curandam suspiciebam. Nam discussionis spes per insensilem transpirationem evanuerat, sicut & suppurationis nulla erat suspicio; quippe natura prostrata jamdum metus erat, ne vel sub insensibili discussione vel suppuratione interiret ægra. Curavi tamen eandem ita: Ad eam vocatus, cum omnia cruda adhuc apparerent, (aliàs ad expectorantia accessissem) nec vel coctionis vel suppurationis pleuritidis spes superesset (aliàs vulneraria in usum vocassem) periculum feci, an mediante sensibili resolutione & sudore discussionem instituere possem. Itaque in principio Curæ resolutionem & discussionem tentavi diaphoreticis appropriatis.

℞. *Aqu. fl. Papav. err.*

Card. bened. aa ʒiʒ.

Maxill. luc. pisc. præp. ʒi.

sal. vol. mandib. eorund. gr. xij.

Laud. opiat. ferm. gr. ij.

Syr. Scabiosæ unc. iʒ. M.

Cepit frequenter hanc mixturam cochleatim vespere, unde manè copiosissimus sudor cum levamine tanto supervenit, ut ægra quasi reviviscere videretur, & ipsemet miratus fuero, omnia scè symptomata fuisse levata, præter tussim, & materiæ crudæ rejectionem, pro cujus reliquiis temperandis præscripsi:

℞. *Scabiosæ*

Hyssopi aa. ʒiʒ.

*Θ * ci anis. ʒiʒ.*

Syr. scabiosæ.

Violar. aa. ʒiʒ. M.

Cepit cochleatim, ex cujus usu copiosius quidem rejecit ægra, at minori cum levamine; quin potius sub rejectione, & sic thoracis agitatione, anxietates repetebant, & dolores intendebantur, unà cum renovata difficili respiratione. Missis ergo expectorantibus, ad sudorifera iterum accessum feci; unde præscripsi:

℞. *Fl. Papav. errat. ʒiij.*

Lapill. ser. præp. ʒi.

Θ is vol. max. lucii pisc. gr. xv.

Laud. opiat. ferm. gr. iʒ.

Syr. scabios. ʒi. vel ʒiʒ. M.

Usurpavit hanc repetitis vicibus, & quidem sequenti modo variatam:

℞. *Fl. Papav. errat.*

Card. bened. aa. ʒiʒ.

Lapill. ser. præp. ʒi.

Salis vol. maxill. lucii pisc. gr. xv.

Laud. opiat. gr. ij.

Syr. Papav. errat.

scabios. aa. ʒvi. M.

Sic copioso sudore superveniente, penitus tandem resoluta fuit Pleuritis.

Convenit etiam dens aperi.

Exterius unguentum pleuriticum Mynsichti, quod habet ex Paracelso, oleum amygdalarum dulcium, cumini destillatum, balsamus sulphuris, cum unguento dialthæ loco dolenti mane & vespere illita; item spiritus salis ammoniaci, imposito desuper latere vel linteis calefactis. Ægræ nostræ pro dolore simul ordinabam:

℞. *Ungu. dialth. ʒi.*

ol. amygd. dulc. ʒiʒ.

destill. Cumin. scrup. j.

Camp. gr. ix.

M. pro Linimento.

Hoc ipsum sub præfato remediorum usu sæpius calidè pectori illinendum jussi, imponendo desuper laterem calefactum, vel lintea, & sic Pleuritis penitus cessavit.

Cæterum cum ægra subinde adhuc rejiceret sputa viscida glutinosa, hinc suasi, ut per moderatum succi raphani usum reliquias dissol.

dissolveret & tolleret. Si enim crebrius usurpetur hic succus sub expectorationis negotio, metus est, ne pleuritici diarrhoeam incidant, quod facillimè fieri potest. Verum mulier hæc erat paupercula, nec diætæ leges observare poterat, quin successivè hinc nunc tussis humida, nunc sicca, eam invaderet cum virium defectu & macie, unde periculum erat, ne phthisis pulmonalis superveniret. Hinc pro avertenda hac ordinavi:

℞. HB. Cherefol. rec.

hed. terrestr. rec. aa. pro lubitu.

Hæc (pro scopo vulnerario) simplicia incisa coquantur in cerevisia: hinc ter vel quater quotidie bonum haustum cepit, & ita tussis & omnia symptomata evanuerunt. Egregia sunt hæc duo simplicia in similibus pectoris affectibus.

Tandem & his cessantibus, cum adhuc sudores nocturni copiosissimi superessent, ita ut quotiescunque oculos clauderet, toties quasi sudore diffluxerit, quales sudores sunt colliquativi, & phthisicos ordinatio affligunt, tunc ordinavi:

℞. Antihect. Poter. gr. xv.

Laud. op. gr. iß.

M. Pro Pulvere.

Capiebat vespere post moderatissimam coenam sub introitum lecti, vel etiam bihoriò ante moderatissimam coenam, repetendo pulverem hunc aliquoties; ita & hi sudores colliquativi penitus discussi sunt, & mulier curata est.

Ubi notabile est, quod laudanum opiatum aliàs sit potens sudoriferum; in hujusmodi autem sudoribus colliquefactivis & phthisicorum & hecticorum compescendis ferè non est melius, sub somno assumptum.

Pleuritis autem finitur, quando inflammatio denuò discutitur, nunc criticè, nunc sine crisi, vel per coctionem, vel per suppurationem. Hinc ratione prioris principium curæ per diaphoretica & appropriata sudorifera debemus instituere.

Sin ergo per diaphoretica non cedat Pleuritis, materiæ collectæ coctio seu attemperatio mediante lymphâ, in materiam pituitosam transmutatâ, juvanda per concoquentia, & temperata dulcia, incrassantia, & expectorantia paulò acriora & acidiuscula. Oleum lini est peculiare euporiston in pleuritide, in principio & incremento, pro expectoratione; uti & oleum amygdalarum dulcium. Temperant enim acre acidum, & dissolvunt sanguinem ad congrumationem tendentem, simulque copiosè laxant alvum. Datur ad ℥iij. pro suppuratione autem nihil facit.

Si autem excretio, quæ ad viginti dies se extendit, & tussis non succedat debite, sed

inflammatio tandem ad suppurationem tendat tunc

1. rupto abscessu, quò natura vergit, pus evacuemus.

2. quando ad abscessum tendit, quod fit ferè post diem decimum quartum, Pro suppuratione promovenda conferunt Temperantia, vulgò Emollientia & Humectantia dicta.

3. factus abscessus curetur per consolidantia & purificantia seu vulneraria.

Posterius locum saltem habet in pulmonibus suppuratis. Omnis enim pleuritis, quæ pleuram saltem afficit, solummodò per resolutionem materiæ curatur. Observavit tamen Lindanus, quod quandoque pleura fuerit suppurata, & pus quasi paracentesi naturali exterius eduxerit natura, quod tamen rarissimum est.

In Pleuritide, ut tali, venæsectio est inutilis, interdum est nociva, modo Medicus maturè vocatus insistat diaphoreticis specificis, quando verò æger admodum plethoricus est, vel si est mulier, cui menses deficient, vel si febris est nimis impetuosâ, concedenda venit. Lindanus observavit pleuritidem ex venæsectione in parte affectâ in gangrenam abiisse, Hildanus in latere appposito exasperatam. Si revulsionis gratia debet institui, habeatur ratio pleuritidis ascendentis & descendentis. In ascendente secetur in pede, in descendente in brachio.

Quamdiu urget tussis & excretio, tamdiu non expectanda suppuratio.

Si ergò ad suppurationem tendere visa fuisset Pleuritis in nostra ægra, tunc pro ea promovenda contulissent primo Temperantia, interna & externa, inter quæ excellunt internè scabiosa, althæa, malva, viola, pasiflora, dactyli, ficus, jujubæ &c. quorum omnium usus esse potest sub forma decocti, ut horum medio salia acia in inflammatione, fermentativo motu concurrentia, temperentur ac resolvantur, & ita resoluta promptius uniantur in pus; temperata verò cum minoribus symptomatis cursum morbi peragant.

Pro suppuratione externè optimum est terebinthina cum vitello ovi.

Facta autem suppuratione melius est, ut abscessus sponte sua rumpatur, quam ut is violenter, vomitu e.g. clamore, sternutatorio vel motu fortiore apperiat, cujus ratio est, quod ex signis externis vix possimus esse certi de perfecta suppuratione. Ruptio hæc spontanea fit cum rigore, quam excipit insignis æstus febrilis, dolor, tussis, excretio, &c. Equidem pure facto, febris dolorque remittunt, sed an perfecta suppuratio adsit omni parte? Medicus perfectè cognoscere non potest;

potest; unde tutius est, expectare, nisi nimis diu ea procrastinetur, spontaneam ruptionem; aliàs enim abscessum nondum perfectè maturatum sequi solent ulcera longe pejora & magis sordida. Si nimis diu duret apertio; vel non succedat, nec fiat, symptomatis jam cessantibus, tunc arte aperiatur, ubi quandoque vomitus est bonus, sed lenis, non violentus, ne rumpatur vas. Quin potius pro ruptura sufficit clamor intensior, vomitorium, item sternutatio paulo fortior nec non stercora animalium; ita enim potus de stercore equino promovet ruptionem abscessus. Pus autem pleuritidis suppuratæ per varia loca, nunc nempe per urinas purulentas, nunc per diarrhæas purulentas, nunc per abscessum alterius membri externi, nunc per expectorationem purulentam, evacuat, ac fiunt omnes enarratæ evacuationes puris, mediante sanguine, per cor delati, cum etiam Paræus ulcera brachiorum, per urinas purulentas evacuata, observaverit, ita ut, quoties æger urinam purulentam redderet, minus puris in ulcere apparuerit. Sic mihi aliquando obvenit mulier pleuritica, ad quam, quarto demum die, in statu morbi constitutam vocatus cum eandem corpulentam ad sudorem nulla ratione disponere poteram, hinc pleuritis suppurata sponte per diarrhœam purulentam solvebatur, sicque pure copioso per alvum excreto ægra reconvalecebat, me nil interim agente, nisi quod clysmatibus subinde paulò acrioribus stimulare alvum & interne balsamicis ex myrrha, sulphure, benzoë, balsamo sulphuris, antimonialibus & similibus, puris acrimoniam temperarem, & hæc ratione, si quid restaret de ulcere, curarem.

Si ergò suppurata pleuritis, rupto abscessu per sputum purulentum se evacuare vult, conveniunt hyssopus, marrubium, helenium, crocus, radix ireos, cum blandè dulcibus & abstergentibus. Expectorationem optimè promovet nicotianæ decoctum vel syrupus ritè paratus per digestionem & repetitam infusionem, tam pro evacuando pure, quam præsertim pro ulcere pulmonum mundificando & expectorando. Vid. Epiphanius Ferdinandus in Histor. Med. qui Pleuriticos deploratos aliquoties mediante decocto & syrupo nicotianæ ritè paratis, per copiosam rejectionem sputi purulenti per os restituit. Præter syrupum, cum oxymelle aut cum aceto parandum, quo hoc ipso corrigatur virus emeticum latens, ad imitationem Quercetani egregiè convenit syrupus vel remedium ex multiplici infusione paratum, in quo tamen exulet saccharum. Unde recipit folia nicotianæ nostratis nonihil arefacta, infundit in aqua simplici, digerit in loco cali-

do; infusum leviter expressum novis affunditur foliis, digeritur iterum, ac denuò exprimitur, quod aliquoties repetatur, expressus liquor crebriore infusione paratus postmodum digeritur aliquamdiu in Mariæ balneo, à fecibus decantato additur oxymel, liquor supernatans decantatur, & vel cum melle vel cum saccharo ad consistentiam debitam redigitur, vel ita seorsim paulo sulphuratus per se asservetur ad usum. Nunquam remedia interna ex nicotiana sine aceto propinanda sunt. Potest etiam ex tempore nicotiana cum aliis infundi & decoqui pro scopo mundificandi. Præ cæteris quædam remedia in forma liquoris euporista habet Magnenus Tractatu de Tabaco. Ex tempore præscribi potest ita:

℞. *Hb. hyssopi*
scord.

Nicot. nostr. aa. M. j. vel ij.

rad. Enul. ℥ij.

Acori nostr. ℥j.

Coqu. in l. q. *∇ simpl.*

Colatura clarificata edulcoretur

c. l. q. *Syr. Nicot. Querc.*

Detur pro scopo expectorandi, & purulentias resolvendi.

Paracentesis in ægra nostra non videtur locum habere, quia suspicio est, vomicam latere in substantia pulmonum, unde frustra ea fuisset; si verò, rupto abscessu fluctuasset in thorace super diaphragmate pus, paracentesis proficua fuisset. Aliud enim est vomica, aliud empyema.

Pro mundificando ulcere & consolidando, ubi semper temperetur acrimonia puris, conveniunt balsamica, sulphur & sulphurea, antimonialia, balsamus sulphuris, &c. quæ pus optimè temperant, & uberiores ejusdem proventum præcavent. Terebinthina ulcus consolidat & mundificat. Præ cæteris tamen in vomica pulmonum egregia sunt decoctum radices chinæ, item ligni sassafras; quidam addunt santalum, &c. cum quibus vulneraria incoqui possunt. Ter in die, manè jejuno stomacho, à meridie post prandium, & tandem sub ingressum in lectum, capiatur bonus haustus, cui addatur subinde dosis vel antihæctici Poterii, vel antimonii diaphoretici, vel balsami sulphuris terebinthinati vel anisati. Lignorum hæc decocta commendantur ab Arcæo in Tr. de curandis vulneribus capitis; item ab Hildano ad præcavendam phthisin. Interim non opus est, ut æger ab usu lignorum horum fudet. Spiritus nitri dulcis antipleuriticum est optimum, speciatim, ubi simul urget febris; ubi verò mitior febris est, salia volatilia usurpentur; in principio tamen pleuritidis ferè melius operantur partes terreæ animalium.

CASUS

CASUS XLII.

INFLAMMATIO HEPATIS, CUM FEBRE SYMPTOMATICA.

*M*ulier deliciis dedita, sed quæ citra notabilem causam mensium imminutum fluxum hæcenus passa fuerat, deambulans ante portam tempore verno, domumrediens, cœnans, sub introitu lecti patitur horrorem, & rigorem satis gravem, quem per horam durantem excipit æstus totius corporis ingens, cum siti, sapore amaricante in ore, gravi cephalalgia, &c. simul dolor adest in hypochondrio dextro, gravans insigniter, & pondere quasi premens in ejus profundo; respiratio est difficilis, & admodum anhelosa, supina jacet, nulli lateri commodè & citra respirationis impedimentum incumbere potest: tussis subinde repetens, sed planè inanis, aut in qua interdum pauca viscida ultimo conatu rejiciuntur, vexat: pulsus, Medico vocato, percipitur magnus, frequens, celer, quasi undosus; urina crassa, turbida, obscura, abdomen murmurat, alvus minus respondet, nares subinde stillant sanguine. Vocatur Medicus tertiâ die vesperi pro Cura.

R E S O L U T I O.

Affectus præsens, quin inter febres continuas comitatas essentielles magis acutas referri queat, nihil omninò dubito. Nimirum videtur mihi omninò probabile, ex primitiis hæc febrilibus, & connexis symptomatis, febrem hanc esse cum inflammatione hepatis conjunctam.

Pars itaque affecta erit duplicis generis:

1. tota massa sanguinea, cui salia illa à se invicem diversa, & acidum, præprimis viscidum, febrium causa proxima materialis, & unde fiendi eorum modus dependet, inhærent.

2. erit hepatis obstructio, & inde dependens dolor, tumor & inflammatio in parte ejusdem, uti opinor, sima seu concava:

Causas quod respicit, primò proxima materialis nulla & hicalia erit, quam acidum vitiosum plus minus viscidum, turgescientiam massæ sanguineæ, ejusque motum fermentativum, sapore suo austero ac maximè peregrino, turbans. Et quidem vitium hoc esse ab acido, patet ex eo, quod ægra subinde mensium difficultatem, & fluxum eorum imminutum, citra aliam notabilem causam, passa fuerit hæcenus. Quod utique signum est, vitium non hære in viis, per quas iidem evacuantur, sed in ipso sanguine inepto ad turgescientiam sui, propter acidi viscidum impedimentum.

Tom. II. Pars 2.

Causæ proximæ formalis vices hic gerunt spiritus vitales.

Cæterùm Causæ etiam remotæ in casu nostro satis evidenter expressæ, symbolum suum conferre videntur. Nam primò quod attinet victus rationem, deliciis instructam, & negligentius observatam, hæc utique omnium consensu fecunda mater hujus mali existit, & ad producendum hocce morbi genus, & febres qualvis, multum potest; quia fermenti digestivi naturalem crasin turbare, ejusque loco in primis viis, tanquam fomite radicationis omnium ferè febrium, vitium digestionis primæ producere valet. Huc etiam suo modo spectare posset deambulatio ante portam tempore verno, circa quod exhalationes vaporosæ ex terræ gremio copiosius adscendunt, efficiente id potissimum solis calore, compactam hucusque superficiem terræ iterum referante, quò faciliè fieri potuit, ut frigus illud hocce tempore adhuc satis grave, subjecto huic foemineo fuerit nocivum.

Quantum ad symptomata: primò sitis, & amaricans in ore sapor, aliam fortè causam non agnoscunt, quàm acidum viscidum, & humores in primis viis latitantes, qui sibi invicem contrariantur, ita, ut concursu suo effervescentiam & calorem formaliter febrilem excitent, hincque sapore suo salso-acri rosionem orificio ventriculi sinistro inferant, fugaque spirituum, & consequenter sitis, seu appetitus potus, nec non sapor amaricans in ore propter alcali bilis ibidem prædominans, ex eodem fonte provenire mihi videntur. His ita præsuppositis, individuus febrium comes subsequitur, cephalalgia, puta, quæ per consensum, vitato scilicet sic ventriculi tono, ejusque humore fermentativo, exinde resultat. Dolor verò in hypochondrio dextro gravans, & insigniter pondere quasi premens, in ejus profundo potissimum, innuit hepar malè affectum. Solet enim lege quasi naturæ in partibus inflammatis res ita contingere, ut data partis cujusdam obstructione, à viscida & plus minus glutinosa materia, aut alia causa inducta, statim etiam detur partis ejusdem tumor, stupefactio, & emortua quasi actio, adeò ut pondere suo quaquaversum hinc & inde ruat, & pressurâ suâ cæteris partibus dolorem aliquem gravativum inferat, laxatis scilicet aut dilatatis saltem ejusdem ligamentis ac subligaculis. Fit etiam, ut pars una alteri per connexionem sit unita, hinc simul partes aliæ in consensum sæpius trahuntur, uti & hic videre est. Nimirum epar mediante ligamento lato diaphragmati, tanquam potissimo respirationis organo connectitur, quorum consensus

[Nn] etiam

etiam in statu naturali nil damni infert, nec unum alterius actionem turbat. At inflammato hepate, quia pondus necessariò gravius propter stagnationem sanguinis contrahit, & maiorem molem exinde acquirit, motus diaphragmatis respiratorius simul ab ejus pondere læditur; dum scilicet diaphragma plus iusto inferiora versus trahitur, fit ut impediatur thoracis dilatatio, propter connexum firmissimum diaphragmatis cum costis spuris, æque ac veris, & consequenter respirationis negotium haud parum incommodi exinde contrahat & patiatur; de qua difficultate respirandi & tussi crebra, sed inani, propter defectum materiæ excernendæ, & à solis convulsionibus, agra nostra ex dicta jam causa meritò conqueritur.

Spektat etiam huc, & eandem agnoscit causam, quod Pateriens nostra nullo lateri commode, & contra respirationis impedimentum, incumbere possit. Nam dextro, si lubet acquiescere lateri, moles epatis tumens comprimatur eò magis versus diaphragma, & quia hæc corporis pars per se sensus exquisitissimi est, nil mirum, quod hoc ipso decubitu dolor eò magis augeatur. Lateri verò sinistro quare non possit incumbere, vix nisi per consensum intimiorem lienis cum epate, nec non à diaphragmatis motu convulsivo, licebit deducere.

De cætero pulsus hoc in casu id videtur habere peculiare, quod irritatis ab acido nervis, nec non membranis arteriarum, motus spirituum undosus deprehendatur, quibus medianibus sanguis aliàs turgescens per arterias undarum instar pellitur, quod bonum signum est, quia sudorem jamjam imminere annunciat. Urina turbida, crassa & obscura, bono nos jubet esse animo, quia robur naturæ ostendit, & aliqualis coctionis signa præ se ferre videtur. Abdominis murmura, & alvi adstrictio nihil, præter acidum in arundine intestinorum hærens, uti & bilis inertiam, sui causam habent. Nempe acidum viscidum à bilis inertia enatum, dum latera eorundem incrustat, fecibus transitum, glutinis instar, denegare videtur, easque iusto diutius retinere facit, hinc induratio earundem, & tandem difficilis admodum excretio. Quod posterius respicit; hæmorrhagiam scilicet narium; fit hæc ut plurimum cum levamine ægri, & videtur mihi hujus symptomatis causa consistere in strictura fibrarum lateris male affecti, unde postmodum dependet sanguinis stagnatio, & tandem stillicidium jam dictum per nares: quod in febribus malignis, si guttatim per nares exeat, pessimum est signum; sin in copia, salva res est.

P R O G N O S I S.

Quod reliquum est, videtur mihi morbus hic maximè periculosus, præprimis autem propter inflammationem hepatis conjunctam, quæ ut plurimum solet esse lethalis, quia facili negotio in abscessus degenerat & mortem comitem habet.

C U R A.

Curatio institui posset hoc modo:

1. Acidum vitiosè viscidum, & quæ hinc proveniunt cætera massa sanguineæ vitia, corrigantur, & quantum possibile, blandè evacuentur.

2. Dolor, tumor & inflammatio hepatis, quæ hic potissimum attendenda veniunt, sedentur & discutiantur.

3. Symptomata urgentia mitigentur.

Pro prima Indicatione equidem emetica hoc in casu vix ex usu fore mihi persuasum habeo. Itaque potius sensim atque sensim acidum quæ infringunt, & visciditatem ejus dissolvunt, præmissa venæsectione in brachio, & hinc in pede, in usum vocanda erunt. Hæc inter adhiberem ego nitrum antimoniatum, arcanum duplicatum, sal tartari essentificatum, cremorem tartari, nec non terrea absorbentia, uti sunt: dens apri præparatus, antimonium diaphoreticum, lapilli cancerum præparati, corallia rubra præparata, elixyr proprietatis sine acido, liquor terræ foliatæ tartari, & omnia antipleuritica, præsertim camphoratis mista.

Formula possunt esse tales:

℞. *Crem. Zi s. Pulv. hepat. rub. ʒi.*

Corall. r. præp. ʒi. M. D. S.

Zertheilend = Pulverlein/ Messer Spigenweise zu nehmen.

℞. *Elix. propr. f. acido ʒij.*

~ cochlear. ʒss. M. D. S.

Reinigende Tropffen.

guttæ 30. pro dosi.

Nec dubito, quin Purgantia lenia per inferiora ex massa pilularum de tribus Russi, aut ammoniaco Quercetani, hic locum possint habere, ut scilicet acidum istud insensibiliter evacuetur. Quo etiam spectat pulvis Comitæ de Warwich, de Tribus, e.g.

℞. *Diagr. ʒat. aut ref. ʒab. gr. viij.*

ʒii diaphor. gr. v. ad vj.

Crem. ʒi scrup. j. M.

Secunda Indicatio plus nobis negotii faceret, si situm saltem partis affectæ spectes, internè itaque & externè res erit gerenda.

Internè liquor cornu cervi succinatus, salia volatilia, & spiritus nitri dulcis, utramque faciunt paginam. Vel

℞. *Mixt. simpl. ʒi. D. S.*

Schweiß. Tropffen/ jedesmal 60. zu nehmen.

℞. ~ ①

℞. *Qi dulc.* vel *Clyff. miner.* ʒij.

Rfl. bellid. ʒj. M. D. S.

Kühl-Tinctur ins Trinken.

Huc etiam spectare possent amara quævis, Epatis, ut dicunt, anima; hinc semper internè & externè aliis, ceu appropriata socianda:

℞. *Ess. Cent. min.*

Absinth. aa. ʒij. M. D. S.

Leber-Tropffen 30. biß 40. auf ein mal.

Externè Linimenta & Epithemata discutientia, & ardorem compescentia, conveniunt, e.g.

℞. *Ungu. di Alth.* ʒß.

Ol. Absinth. ʒij.

destill. Anethi scrup. j.

Camph. gr. ix.

M. pro Linimento.

Inter Epithemata eminet Spiritus vini blandè camphoratus. Vel

℞. *∇ hyoscyam.*

Nymph.

Prunell.

Plantag. aa. ʒiß.

Camph. c. ~u *vini sol.*

Qi depur. à ʒij.

M. f. Epithema.

applicandum crebriùs calidè.

Potest etiam fieri sacculus interpassatus ex sequentibus.

℞. *Fl. Chamomill.*

Melil.

sambuc.

Verbasci aa. M. j.

Rosar. r. p. ij.

Hb. Malv.

Atriplic. aa. Mß.

Sem. Anisi

Fœnic.

lini aa. ʒß.

Incisa & contrusa. D. S.

Kräuter zum Säcklein äußerlich warm aufzulegen.

Vel potest etiam fieri Decoctum cum aqua endiviæ, addito aceti q. s. pro Epithemate, calidè applicando.

Si in scirrhum degeneraverit inflammatio:

℞. *Empl. de Cicut.*

Ran. Vig. c. ʒio.

Malax. c. ol. Absinth. destillato:

induc. super alutam.

Siverò in pus abierit:

℞. *∇ fl. Acac.*

Card. bened.

Fumar. aa. ʒj.

Acet. destill. vel rutac. ʒvj. ad ʒj.

Lapill. Or. præp. ʒj.

ʒii diaphor. ʒi.

M. f. Potio.

Pro hepatis suppurati abscessu murtificando:

Tom. II. Pars 2.

℞. *Hb. scolopendr.*

Fumar. aa. M. ß.

Rad. Acetos. ʒj.

Cichor. ʒvj.

Fl. Papav. errat.

bellid. aa. p. ij.

Coqu. in f. q. *∇ æ fontanæ:* Colat. ʒviii. adde *Syr. rubi idæi* ʒij.

~ *Qi dulc.* q. s. pro suavi acore:

M. D. S. **Reinigender Kühl-Trank offters davon zu nehmen.**

Cætera symptomata, quia sunt effectus saltem & productum morbosum, sublatâ causâ spontè cessabunt.

CASUS XLIII.

HÆMOPTYSIS.

Vir ætatis consistentis, & functionis publicæ ratione, vitam agens sedentariam, utut sub juvenili ardore inquietus, pariter ac gulæ indulgentissimus fuisset, post leviculam præcedente intussim, cum difficili paulò anhelitu junctam, sputa cruenta emittere, & sanguinem floridum copiosè excernere satagit. Sponte malum remittit, post tertium tamen ferè mensem ex inopinato, prægressa anhelitus aliquali difficultate, levi screatu, copiosum sanguinem floridum & nonnihil spumosum, emittit, idque aliquoties, malo denuò cessante. Repetunt hæc sæpius, & abque etiam tussis conatu, nunc brevioribus nunc longioribus periodis. Sanus alias & incolumis semper fuerat, nisi quod ulcus quoddam, in parte tibiæ dextræ internæ, paulò supra malleolum, thaleri præter propter magnitudine & figura, superficiale tamen tantum gestaverat, quod copiosam plorasset saniem, cum locorum vicinorum aliquali pruritu. Consolidari hoc sibi ab empirico, molestiarum diuturnarum pertæsus, curaverat, ex quo antea commode habuit. Nunc pro sanguinis ista excretionem à Medico consilium & curam petit.

RESOLUTIO.

Affectus est Hæmoptysis ab ulcere in tibia clauso.

Pars affecta est vasculum pulmonum arteriosum.

Causa proxima est diabrosis, hoc est, erosio vasculi cujusdam arteriosi in pulmonibus; quicquid in contrarium alii dicant. Nam ex pulmonibus sanguinem excretum esse, demonstrant omnia symptomata, dolor & præprimis spumæ, in quas non saltem serum, sed & sanguis, ceu liquor aquoso oleosus, ab aëre reciprocante

attollitur, præsertim cum adhuc calidus est: siquidem notum est, oleum, & omnia subiecta oleosa & pinguis calida, agitata impensè spumescere, & quoquid pinguius est, eò magis spumescit: ita cerevisia magis spumescit, quam coventum & acerum, quod quò magis est à generoso vino, eò magis spumescit, sicut & sapo aqua solutus etiam in spumas abit. Unde sicut olea quæcunque in frigore coagulata in calore spumescunt, ita sanguis, seu liquor saponarius, per motum aeris rarefactus abit in spumam: sicut & observavi mulierem quandam, quæ copiosum sanguinem unâ vice spumofum floridissimum ad aliquot uncias expectoravit, qui sepositus, postmodum in sero suo natabat. Ex quo patet, non ratione vehiculi aquei seu feri, sed ratione oleosa & viscida substantiæ, fieri spumas, adeoque, quando spumescit serum, debet id chylo pingui, qui agitatus in spumam abit.

Cæterum observantur hæmoptyses periodicae, & non-periodicae: Hæmoptyses periodicae ut plurimum sunt salubres, si moderatae sint; ita namque hæmorrhoides & menses suppressi per sputa cruenta fuisse soluta, testatur Thiermayerus *Consil. lib. 2. pag. 24.*

Causa remota in nostro ægro fuit sanguinis serosioris acrioris uberior collectio, occasione vitæ sedentariæ, in qua minor diaphoresis, & ob ulcus cruris, seu apertum fonticulum, occlusum: quibus occasionibus sanguis serosior & acrior coacervatus, facile per viam consuetam evacuari potuerit.

In ulceris hac consolidatione duo sunt consideranda:

1. ipsum fermentum ulceris, sanguinem inquinans; scilicet posito, ulcus non rite mundificatum fuisse.

2. serum acre istud, quod sub saniei forma, tanquam ex fonticulo, antea copiosè emanaverat, quod non solum ab ulcere, tanquam productum morbosum, originem habuisse, sed etiam sui ipsius natura acre falsum fuisse pruritus vicinorum locorum innuit.

Et quidem fermenti parum restitasse, quin potius maximam partem istud deletum fuisse, ex eò suspicio est, quod recidivam ulceris non passum sit; secus enim ulcus non potuisset consolidari, aut etiam odor ejusmodi in ulcere relictus, novum ulcus produxisset, qua ratione ulcera ad ossa usque penetrantia, illaque cariosa reddentia vel centies curata, centies quoque recidivant, ob tantillum fermenti ossi jam infixi, difficilius extirpabilis, & nutrimentum partis affluens corruptentis, imò cum æger noster post ulceris consolidationem diu benè se habuerit; hinc planè nulla suspicio est de ulcere sed po-

tiùs suspicandum est, quod solummodo ab ulcere occluso fuerit oborta Hæmoptysis, quatenus impedita per ulcus occlusum ichoris evacuatione retentus is & coacervatus regurgitando ad massam sanguineam eandem inquinavit, successivè vasorum pulmonalium aliquod eroserit, & hæmoptysin intulerit.

Sed porro quæritur; unde illud serum falsum fuerit enatum? Resp. Causam remotissimam esse mutatum vitæ genus, quod multum habet in recessu: æger enim primò in juventute, propter malam diætam & gulositatem nimiam, fermenta viscerum debilitavit & hebetavit, multaque recrementa ex mala diætâ coacervavit: quicquid tamen tunc temporis coacervatum, partim ejecit per exercitia, partim retinuit, quæ postmodum, ubi sub consistente ætate vitam sedentariam egit; dicta recrementa coacervata nec per sudorem, nec per urinam amplius exclusit, rodendo in tibia partes, sponte in tale ulcusculum proruperunt, & illud intulerunt, per quod, seu cribrum quoddam, dicta excrementa coacervata fuerunt expurgata; eò autem obturato materia affluens alio in loco sibi viam parare, sicque erodendo vasa pulmonum hæmoptysin inferre potis fuit. Et loca ejusmodi parallela, ubi itidem ex ulceribus ejusmodi spontaneis curatis vel asthma, vel hæmoptysis vel phthisis supervenerit, vid. in Rhodio *Cent. 2. Observ. 65.* item Thiermayero *Consil. lib. 2. pag. 85. & 24.* Sculteto in *Observ. Chirurg. 57.* ubi introducit quendam, qui ex ulcere crurum inveterato occluso in grave asthma cum ulcusculis pectoris incidit, in ulso verò fonticulo evasit: Vid. etiam Horstius in *Observat. pag. 448.*

Hactenus dicta nos ducunt ad ulcera sponte enascentia, & fonticulos artificiales. Nempe non rarum est, spontè ejusmodi ulcera oriri hinc inde, speciatim in cruribus & tibiis, ubi muscoli absunt; & talia post morbos acutos supervenientia in corporibus puris & ægrorum, quorum massa sanguinea temperata est facile curantur, contra eadem difficillimè curantur; v. g. suppono jam, duos pungere culicem in tibia tempore æstivo, uterque locum punctum scalpit; tunc sanè alter contrahit ulcusculum, quod secundo die sanatur, alter verò inflammationem in illa parte, hinc ulcus, contrahit; Ubi fundamentum hujus diversitatis non hæret in efficiente externa, scilicet culice, nec in parte affecta sed simpliciter in succi affluentis ad partem punctam & scalptam, diversitate, pro cujus conditione etiam variant. Nempe ulcera ejusmodi spontanea,

pre-

præsertim tibiæ ordinariò sequuntur corruptelam internam & dyscrasiam succi chylosi nutritivi, ejusque vehiculi, feri puta, ad partes nerveas delati. Et in partibus sanguineis quidem rarò talia ulcuscula spontanea efflorescunt: sanguis enim pinguedine sua corrigit acrimoniam illius succi efficientis ulcera; contra eadem saltem circa articulos, loca tendinosa, &c. ut plurimum efflorescunt.

Jam queritur: in quonam hæc dyscrasia succi chylosi nutritivi, ad cutem & partes nerveas delati, consistat? Resp. Dyscrasia hæc consistit partim in ejus subtili acrimonia acido-salsa, partim in facili ad corruptelam promptitudine. Acrimonia ejus dependet ab errato digestionis primæ, facilis ad corruptionem promptitudo ab inertia fermenti fellei, non rite perficientis chylum. Nempe ratione digestionis primæ læsæ, chylus ineptus fit ad sui assimilationem, simulque is spiritum partis nutriendæ enervando, hanc disponit facile ad gangrænam, quæ semper spiritum partis, sive insitum sive influum, enervatum præsupponit. Ratione verò inertie bilis, chylus acrior & acidior factus in digestionem stomachali, non sufficienter corrigitur neque ab oleo bilis ritè imprægnatur; quâ bilis conditura balsamica deficiente chylus ad sui corruptelam promptus est, eamque nunc fermentalem, unde ulcus & pedes oedematosi, nunc putredinalem, unde gangræna. Illustrant horum oedematum causam communia effata, quibus eadem à vitio hepatis deducuntur vulgò; quæ si interpretemur de bilis inertia, vero stant illa talo. In hujusmodi ergò locis facillimè degeneratus hic succus rodendo ulcus excitat. Quod verò bilis inertia hic accusanda, patet à posteriori, quia talia oedemata pedum curantur, non secus atque ipsa quoque ulcera spontanea, per remedia amaricantia, vulgò hepatica dicta, quæ præter vim deterisivam primarum viarum, bilem inertiozem acuunt & corrigunt: Hinc concludendum est; talia exorta esse ex bile inerti. In talibus ergò subjectis, ubi spontanea ulcera efflorescunt, in cura respiciendum non tam ad ipsum ulcus, quam ad fomitem potius ipsius morbosum, à quo illud fovetur: sic namque ulcera talia facile consolidantur, utut cum detrimento ægri; quod faciunt metallica absorbentia, Martialia, Saturnina, aut aliis irritis Mercurialia, quorum illa absorbendo acidum ulceris, acquirunt saporum aluminosum, ex quo firmantur pori, ut cesset affluxus uberior fanici; simili ratione, ac ipse saturnus calcinatus attactu aceti fit dulcis adstringens; sed, ut dixi, fit cum detrimento ægri; coacervato enim hac ratione sero acri, mille malis ægrum mulctat.

Cæterum signa, quæ vitium non esse in ulcere, sed in succo chyloso affluente, qui ulcus foveat, demonstrant, sunt duo:

(1) si ægri cutis non benè ferre valet emplastra propter exorientes vesiculas & alia incommoda, nisi sint temperatissima ex metallis, & non glutinosa, (ut emplastrum de spermate ranarum) secus enim in parte pustulæ, saniem plorantes, sequuntur, quod ipsum succum acidiorum in corpore sive corpus impurum & cachochymicum denotat:

(2) si materia, quam plorant ulcera, copiosior, aquosior & acrior existat; si copiosior est quam probabiliter pro nutrimento partis affluit; si est acris, aquosa, & consequenter ichor, non verò pus, signum est, ulcus non peccare, sed ipsos succos affluentes degenerare & corpus caco-chymicum esse.

Si ergò hæc ulcera spontanea & antiqua tibiæ aut crurum curanda sunt, ad fomitem prius respiciendum est, adeoque considerandum: an fomes & origo hujus degenerati nutrimenti corrupti possit removeri, antequam claudantur, an non? si enim removeri potest vitium primarum viarum, corrigatur & consolidetur ulcus; si verò à priori malum corrigi nequeat, periculosum est occludere ulcus tale, quia aliàs varia mala pectoris, & ordinariò dyspnœa, aut asthma, hæmoptylis, item capitis, nunc paralytica, apoplectica, & carotica mala &c. facile subsequuntur, quæ aperto ulcere sponte denuò cessant. Cum itaque viderent Practici, quod per hujusmodi ulcera spontanea à variis malis præcaveantur ægri, ceperunt cogitare ulceribus artificialibus seu Fonticulis, mediantribus quibus evacuarentur isti succi morbofi in corpore existentes, quia tamen à priori juvare non possunt.

Fonticuli autem, tanquam ulcuscula artificialia, excitandi non sunt, nisi (1) in affectibus illis, quorum causæ materiales à priori removeri nequeunt; ita enim v.g. dyscrasia chylosi succi & massæ sanguineæ, ob hebetata nimis fermenta, à priori corrigi & removeri non potest. (2) fonticuli conveniunt in affectibus non acutis, quippe in acutis, ubi fonticuli tarditatem expectare non possumus, vesicatoria sunt meliora; contra chronici, iique confirmati, si à priori incurabiles sunt, fonticulos requirunt. (3) melius conducunt fonticuli iis, qui jam incrementis sunt ætatis, quàm senilis; & qui vitam desidiosam aut luxuriosam agunt, sicque ob deficientem potestatem vitalem digestio prima non corrigibilis est, cum præsertim quotidie ex desidia & luxuria magis accumulentur excrementa, quàm ut ea emendari queant. (4) conveniunt fonticuli in ulceribus

partium chronicis, sive ægri talibus ulceribus obnoxii sint, sive eadem metuantur: siquidem ita v. g. Lindanus testatur, quendam ulcere gravissimo in inguine ferè desperato laborantem inustione fonticuli in femore postmodum facile sanatum abiisse. (5) locum habent fonticuli in morbis à serosa colluvie vulgò derivatis, sive jam serum istud aut ejus contenta chylosa peccent, sive particulare partis vitium subsit in nutritione: ubi prioris exemplum habemus in nostro casu; sicut posterioris observavi in victore, viro aliàs sano, qui tumorem circa cubitum monstrans, nil inde incommodi habebat, nisi quod ipse tumor lunæ motum, nunc increcendo nunc decrecendo, observaret, cum dolore nocturno; quod malum hariolor contraxisse illum ex partis contusione, unde quia difficulter curari potuit à priori, cum supra cubitum fonticulum excitandum jubere, nullum dictorum malorum afflixit eundem amplius. (6) melius etiam mulieribus conveniunt, quàm maribus, iisque præsertim vel naturalem vel præternaturalem mensium defectum patientibus, quibus altero in femore inuratur fonticulus; mares enim magis sunt laboriosi, unde major per poros corporis transpiratio, quàm mulieribus: interim secundariò iidem quoque maribus profunt. (7) Rarò infantibus applicantur fonticuli, nisi in gravioribus malis, speciatim ophthalmia; quò tamen in casu saltem usque ad pubertatis annos permittuntur, tunc iterum occludi possunt, quo hac ratione natura adfuescat mensium effluxui; sic semen virile, vel menstruum, spontè ea mala curat. Conf. M. A. N. C. *Ann. 3. Observat. 18. & Observat. 156. pag. 273. & Obs. 214. p. 383. & 396. item Ann. 4. & 5. Observ. 117. pag. 128.*

Quoad locum autem fonticulorum: consideretur is vel in genere, vel in specie. Ita in genere in legitima fonticulorum adhibitione non inconsultum est, si observentur regulæ revulsionis, aversionis & derivationis, cum etiam per circulum sanguinis eò ferantur succi; interim tamen derivationibus paulatim faciendis magis, quàm subitanæ evacuationi revulsoriæ, fonticuli conveniunt. Loca autem specialia sunt varia, uti notum, in tibiis, brachiis, scapulis, & nucha; ubi alii etiam in bregmate administrare fonticulum jubent, hicque modus in Italia usitatus est: interim is usus mihi semper inutilis fuit; dum enim Itali ad os cranii usque cauterium adigentes, capitis affectibus consulere volunt, facile inflammationem cranii & membranarum cerebri procurare possunt, unde puto dictum locum non habere præferentiam à brachio, vel nucha, nec ibidem ad-

ministrare fonticulum, ulli autor ero. Interim in cephalalgis scorbuticorum diuturnis in cranio excitati proficui quod fuerint, vid. M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 81. pag. 138.*

Quoad prognosin hæc consideratur vel in, vel extra proxiysmum. In paroxysmo quidem periculum est, ne æger vel suffocetur, ob copiam sanguinis extravasati vel grumescantis, vel syncopen incidat à nimia sanguinis evacuatione. Extra paroxysmum verò duo mala metuenda sunt, unum ratione affectæ partis, quod est phthisis; cum enim id, quod peccat, vasculum quoddam pulmonum, hinc etiam horum substantiam poterit erodere; alterum ratione causæ antecedentis metuendum est hydrops ascites imminens ex succorum nutrientium acrimonia, qui eò certior erit, si urina minus largè reddatur; phthiseos verò prodromus erit, si tussis extra paroxysmum quoque nimis afflixerit.

Quoad Curam; hæc est vel in, vel extra paroxysmum. Cura in paroxysmo urgetur ratione affectus; extra paroxysmum ratione causæ antecedentis.

In paroxysmo ergò

1. Sanguinis excretio per os, hujusque ad præcordia impetus sistatur.

2. Si quid ejus grumosi superest circa pulmones, dissolvatur & evacuetur.

Sistunt autem sanguinem

1. Quæ motum ejus aliorum divertunt, adeoque venæsectio ratione affectus immediate urgentis erit optima, quam jubet ægri nostri vita sedentaria, & aliàs luxuriosa, quæ deficientem per poros transpirationem indicat; unde instituat venæsectio in pede ceu loco remotissimo, pro revulsione; vel etiam, si volumus in loco superiore evacuare sanguinem, in brachio, præmissis tamen scarificatis cucurbitulis, in eodem loco, pro aversione particulari, seu derivatione.

2. Similiter sistunt sanguinis motum, quæ eum temperant, & moderatè incrassant, unde semen hyoscyami præ aliis singulare est specificum ad hæmoptysin: hinc notum est, electuarium Helidæi Paduani, cujus basis est semen hyoscyami, nec non tinctura sulphuris vitrioli, quæ si cum tinctura lapidis hæmatitis miscetur, se præcipitant, adeoque non satis adstringent. Cæterum sperniola Crollii rectè ad scrup. j. non verò ad grana aliquot, præscribitur, cum tutò ea ad drachm. ß. exhiberi queat. Aliàs ad quaslibet hæmorrhagias sistendas commendatur quidem bufo: interim distinctio hic ratione causarum facienda; siquidem bufo magis confert in casibus, quando ex anastomosi, ex solo imperu sanguinis, ejusque turgescencia & ebullitione febrili, ex supposita juxta Helmontium archi-

incandescencia & furore, sputa hæc ori-
ur, præsertim ex causa maligna, adeo-
etiam in febrium malignarum hæmor-
giis: ast in casu, ubi solutio continui, ex
lione vasculorum, qualis in nostro casu
sens quoque est, vel læsionibus ab extrâ,
in fossa thorace, minus valent. Quin-
tius hic egregium effectum præstabit cen-
todium seu polygonum simplex, quippe re-
is aquæ ferventi infusum & ebullitum, &
axillis alligatum, mira facit: potioris erit
æctus, si recens contundatur, aceto vini
pergatur, axillisque applicetur, nam &
ratione stringitur effluxus sanguinis: vid.
non Pauli in Quadrip. Botan., qui lau-
t succum centinodii cum vino ad vom-
in cruentum, vid. etiam Wedelius qui re-
t: mulierem plebejam hæmorrhoidum
ixu laborantem beneficio centinodii, axil-
subligari, se curasse. Egregius quoque
hoc in casu pulvis sympatheticus, quem
pertum olim D. Michaelis testatus est;
nippe hic hæmoptoicum simpliciter bene-
cio huius pulveris curavit, jubendo, ut
ger sputum cruore tinctum eidem immitte-
et, ut tandem phthisi superveniente, ex
elicto sanguine grumoso, interiret.

Pro secunda intentione, nempe ad san-
guinis grumos relictos solvendo, sperma-
teri, lapilli cancerorum, trochisci de carabe,
tem de terra sigillata, radix rubiæ tinctorum,
& ex ea paratum Crapp. &c. optimè conve-
niunt.

Extra paroxysmum autem causæ antece-
dentes sunt removendæ, ut harum tollatur
impetus & efficacia, ne eæ denuò sputum
inferre queant. Dictum fuit, mutatum vi-
tæ genus & coacervationem succorum acido-
salinorum crudorum, intulisse erosionem, &
sic hæmoptysin.

1. Ergo vitia succi chylosi & feri acio-
ris & asperioris falso-acidi corrigenda, & eo-
rum ulterior collectio præcavenda.

2. Ea collecta maturè evacuanda.

3. Læsiō pulmonibus inducta in tempo-
re consolidanda.

Adeoque ratione primæ Indicationis
imprimis necesse est, ut præter diætā mo-
deratā, & quantum possibile, corporis
exercitium medicamenta amaricantia, dige-
stionem primam promoventia, & bilis bal-
samum acuentia, hincque lac & lacticia,
crebrius usurpentur, quæ lacticia eò ma-
gis urgenda sunt, quo magis acrimonia suc-
corum urget. Lac autem esto vel caprillum,
vel bubulum: quod eò melius erit, si antea
simplicia vulneraria huic incoquantur, ut
duplici scopo satisfiat. Virentur acria, falsa,
vinum, incandescencia.

Secundo scopo nempe collectorum re-

crementorum maturæ evacuationi, tam per
sudorem, quàm per urinam, satisfacit au-
ctus corporis motus, insensibilem transpira-
tionem insigniter promovens; qui tamen, si
non respondeat voto, ad fonticulum, seu
ulcus artificiale, naturali priori analogum
fiat accessus. Quæritur autem; ubi fonticu-
lus sit apperendus? an in pede sanato & affe-
cto? an verò in sano? Respond. in pede sa-
nato excitandum esse, persuadet hoc, quod
motus naturæ jam eo vergat, aut quoque
quod pes sanatus ex ulcere antea manante
non ad affectionem leucophlegmaticam in-
clinet, sed adhuc plus minus similis sano sit:
si vero ex antea manante ulcere ad leuco-
phlegmatiam iste pes inclinet, aut spiritus
pedis affecti insitus enervatus sit, adeoque
pes mollior magis albicans, flaccidior, &c.
inde factus, aut rubeat; hinc, ne in isto
fonticulo is ad gangrænā disponatur, vel
magis minusque pes affligatur, & ad œde-
matosam constitutionem perducatur, tali in
casu melius est in pede opposito & sano fon-
ticulum excitare.

Tandem tertio læsioni pulmonum ex
erosione consolidandæ profunt vulneraria;
inter quæ nobilissimum est cherefolium, &
hedera terrestris, in qua habetur, quicquid
desideratur ratione pulmonum, in decocto
cum cerevisia, vel in conserva, vel in succo
propinata pro scopo expectorandi, nec non
erosione & continui solutione consolidanda
& curanda.

Notetur, bellidem esse nobile vulnera-
rium & diureticum, tam in decocto, quàm
succo expresso, pro scopo dissolvendi gru-
mos sanguinis, & ad vias urinarias eum de-
ducendi, atque hinc etiam ruptis, & ab alto
devolutis; item asthmaticis ex subitanea co-
agulatione sanguinis, laudari. Verum atten-
datur jam; quid ejus tinctura præstet: Etenim
dum phlegma vitrioli floribus dictis affundi-
tur, quæritur; cujus vi tinctura illa opere-
tur? an ratione bellidis? quod vix concede-
re possum: quid enim tantillus ejus color,
beneficio spiritus vitrioli, qui adhuc in phleg-
mate est, extractus, & ad guttas 40. exhibi-
tus, præstare in hoc casu poterit? quin po-
tius vix tinctura hinc locum habebit, ex eo,
quod vitriolum pulmonibus sit inimicum.
Interim tinctura allegata in isto sputo cruen-
to, & hæmorrhagiis aliis, locum habebit,
quæ ab orgasmo vel motu nimio massæ san-
guineæ dependent; quippe has optimè vi-
triolacea sistunt; unde etiam Petrus Castel-
lus, oleum vitrioli in aqua urticæ, ad spu-
tum sanguineum aliasque hæmorrhagias ex
tali causâ enatas, laudat.

℞. ▽ *Cherefol.*

scabios. aa. ʒiſs.

el. dia-

el. diascord. Frac. ʒiij.

☿æ sigillat.

ebor. f. Δc aa. ʒß.

Syrup. de ros. sic. parum.

M. f. Potio.

Ulceræ crurum cacoëthea & antiqua spontanea, nunc sunt manantia, nunc simul sordida & profundiora: hæc enim præter saniem, quam plorant, simul sordes etiam in ulcere profundius habent reconditas, & ideo curatu sunt satis ardua; illa verò saltem sunt superficialia. In genere hæc ulcera respuunt emplastra, quia exasperantur, sed requirunt saltem metallica absorbentia, sine morfu exsiccantia, quæ absorbent acidum, hinc eo absorpto texturam adstringentem aluminosam acquirunt, hinc fibræ & nervi stringuntur, & sic ulcera curantur. Talia sunt aristolochia rotunda, minium, &c. Interim hæc excellit crocus martis per præcipitationem.

Si verò ulcus est sordidum, huic croco Martis præmittatur unguentum digestivum exterebinthina & vitello ovi; cui tamen addatur, & vel simul parum de myrrha, vel extracto aristolochiæ rotundæ; post hæc crocus martis inspergatur sine emplastro. Interim tamen per talia crura ulcerata subinde detrimentum patiuntur spiritus insiti, undè faciliè ad oedemata vel gangrænam inclinant; Ut ergo his occurratur, externè fiat litus cum spiritu vini camphorato, etiam si interdum inflammatio erysipelacea imminet; nam etiam ipsi erysipelati medetur vel solus hic spiritus vini camphoratus, vel cum essentia croci adhibitus.

Interne verò, cum agnoscant fomitem altius radicatum, simul conveniunt amara balsàmica, speciatim myrrhata, aristolochia & similia, crebrius & diutius usurpata. Si hæc non sufficiant, pro fonte ulcerum exsiccando, optima sunt decocta lignorum, per sudorem corpora exsiccantia, cum rasura ligni juniperi & ejus baccis, quod si nec his cedant, optimum est, ut modo viscerum tonus constet, instituatursalivatio Mercurialis, quæ suum officium optimè præstabit, cujus medio etiam pessima ulcera spontè consolidantur.

C A S U S XLIV.

NEPHRITIS.

*M*ulier juvencula, vini potui dedita, post levem horripilationem, corripitur crebris vomitibus materiæ variæ, quibus superveniunt tormina abdominis vaga, cum alvi occlusionem, incalcescit sub vespere: cæna parca per vomitum rejecta, nox inquieta, cum subreptantibus levibus passionibus hystericis, & præcor-

diorum vagis anxietatibus, quæ omnia matutino insequente tempore ita exasperantur, ut vix lecto exsurgere audeat. Ad sunt dolores lancinantes & stimulantur circa regionem pubis, urinam excernit crebrius, sed parcius, naturaliter quidem constitutam, minùs tamen, quam solebat, temperatam; sed à meridie eadem intense & obscure tincta, sanguine quasi imprægnata, wie dicke braun oder schwarz Bier / observatur. Crebrior simul urget, frustraneus licet, alvi excernendi conatus. Ad sunt dolores dorfi & lumborum, partim acuti terebrantes, partim obtusi gravantes & contundentes, quos sensibiliores percipit sub aliquali corporis agitatione, aut quando se erigere nititur. Intra tres vel quatuor dies, menstruum expectat purgationem. Consilia sunt varia pro cura. Propinant quædam mulierculæ aquam hirundinum cum castoreo, quam per vomitum mox rejicit, à meridie pedetentim symptomata remittunt, & mitiora sunt, nox insequens mediocris, sed circa meridiem omnia exasperari incipiunt, iisdem modis, atque pridie factum fuerat. Consulitur Medicus, qui accedens, pulsus in omnibus moderatum, celerem tamen & durum, observat.

R E S O L U T I O.

Affectus est nephriticus, ubi voce nephritidis in genere intelligitur affectus renum dolorosus, κατ' ἐξοχήν, licet de renum inflammatione ea prædicetur; non secus ac pleuritis, itemque hepatitis, accipi pro inflammationibus harum partium solent.

Cæterum datur Nephritis nunc calculosa à calculo, nunc salina, aliàs notha, ut plurimum scorbutica, in qua salia corrosiva circa renes coacervata, rodendo & lancinando partes ipsorum membranosas nerveas, pathemata calculosis familiaria, exactè inferunt, quasi calculus adesset; ita ut etiam quandoque urina supprimatur, absque ulli licet calculi præsentia, saltem propter spasmus dictarum viarum; uti ante annum observavi in viro, simili nephritide correpto, qui dolores gravissimos in lumborum regione cum vomitibus continuis, anxietatibus præcordiorum, colica, urina suppressa, &c. patiebatur, sine ullo tamen calculi vestigio; quam nephritidem ex iracundia, tanquam causa remota, contraxerat; ipse æger aliàs scorbuticus erat. Similes nephritides non sunt raræ, ac vid. de his Dravizius Artic. von dem Scorbutischen Nieren = Weh. Porro observantur etiam Nephritides ulcerosæ, ubi nempe dolores continui lumborum saltem ex abscessu renum affligunt, quale exemplum habet Barbette in Praxi, allegans

gans nephriticum, in quo alter ren consumptus fuit inventus. Sic etiam non rarò gonorrhœa virulentâ confirmatâ laborantes tali nephritide nothâ cum ardore in lumbis laborant, ut nec incumbere dicto loco, nec bene erecti incedere queant, & tales optimè curantur per saturnina, ut tincturam antiphthificam, & saccharum Saturni: quemadmodum etiam sine his causis Forestus *lib. 24. Observat. 1.* tantum renum dolorem observavit, ut syncope superveniret, curatum per decoctum chamomillæ vulgaris in cerevisia factum.

Pars affecta sunt renes: indeterminabile tamen, uter ren affligatur? & an alter? an uterque? Nempe primariò afficiuntur membranæ internæ spissiores, nempe pelvis & ejus tubulorum; hinc per consensum ureteres: est enim horum continuus tractus, unde communia patiuntur symptomata.

Interim de calculo præfenti in ægra nostra certi planè non sumus, nec adjuncta symptomata certificant, dolorem esse à calculo; sed saltem est probabilis conjectura: quippe potest affligere dolor talis ex abscessu renum, item ex sale scorbutico; non secus ac quoque ex ipso calculo; unde cum ferè omnes hi dolores quoad curam coincidunt, ponamus, esse à calculo dolorem, cujus ille frequentissima causa esse solet; non tamen videtur magnus, quia dolor est acutus & sæpius recurrens: nam magni calculi continuum obtusumque dolorem durantem inferunt; contra qui parvi, sæpius recurrentem quidem, at atrociorē, & maxima symptomata, quia quandoque angulum acutum & cuspidem gerunt. Sic memini me calculos vidisse minores quidem, graviter tamen affligentes, idque saltem ex eo, quod habuerint ad latera cuspidem, crudelissima illa symptomata causantem. In nostra ægra duplex dolor se offert: calculosis proprius ordinarius obtundens, aut obscure gravans; & extraordinarius, acutè terebrans: quorum ille est à renibus, horum nempe membranarum firmiore & densiore textura, quia minus acuti sensus est. Nervi enim & spiritus animales influere inde determinati sunt ad sensum vel acutum vel obtusum præstandum, adeoque saltem instrumenti proximi membranacea culpa est; tenuis & subtilis à membrana subtilissima est, v. g. in oculis; econtrâ densa, rigida, aut firmior, minus est sensibilis, quia non facile mobilis: unde cum renum membrana minus sensibilis sit, adeoque minus mobilis ab objecto, hinc dolor obtusus ille: acutus aut terebrans si adfuerit, talis suspicionem præbet calculi acuti & angulosi, ratione cujus partim scindit, partim pungit; qui quandoque mictum cruentum inducit, ex vasculis nempe capillaribus laxis, scindendo

Tom. II. Pars 2.

nempe & pungendo membranas & vasa capillaria.

Porro nephritici, antequam dolores sensibiles in lumbis percipiant, per unum vel duos dies symptomata varia, tormina colica, vomitus, nauseam, &c. ex renibus affectis patiuntur, quod sæpius observavi. Interim tamen etiam omnia hæc symptomata, sensibilem in lumbis vellicationem antecedentia, sunt reverà ex calculo; quæ ipsa tamen nunc immediatè junguntur cum dolorosis symptomatis in renibus, nunc præcedunt illa, idque tunc imprimis, quando calculus vellicat quidem renes, dolor tamen ex vellicatione natus nobis non est sensibilis; spasmus & vomitus adesse possunt, donec procedat eò usque, ut etiam dolores graviores & molestia superveniant. Unde cauti simus hoc in passu in diagnosi; non enim valet hoc: *Er kan sich büßen* / ergo non laborat nephritide. Non negamus tamen, etiam dolores renales alia quæcunque symptomata sæpius præcedere. In affectibus autem nephriticis, etiam ratione symptomatum, non rarò typum quasi tertianæ observare solet hic dolor, quod jam annotavit Sanctorius in *Meth. Vitandi Error. &* Helidæus Paduanus, imò ipsemet observavi in calculoso tertio semper die exasperatos fuisse dolores, denuo remittentes.

Causa ergò proxima totius nostri affectus est contractio spasmodica, ob vellicatas membranas renum. Causa autem vellicans potest esse calculus, quem simul promover instans menstruatio; quippe sub qua mulieres ad calculum dispositæ, ordinariò pejus circa renes habere solent. Interim quoad nervorum distributionem conf. Willisius *Tabul. XI. in Anat. Cerebri.*

Omnia autem hæc symptomata à dolore & spasmodica contractione deduci queunt; nam comes omnium dolorum est partium contractura convulsiva. Modus fiendi est hic: scilicet impressionem istam sensibilem, quæ consistit in motu vehementiore, in renibus factam, mox per continuatum nervorum & eorum fibrarum tractum usque in cerebrum, insequitur concitatio spirituum ad ista loca motus, hincque tensio & spasmus partium membranacearum ex motis spiritibus ad locum sensationis. Adeò intimè spasmus & dolor connectuntur, ut subinde pro iisdem habeantur: & quidem spiritus moventur non solum ad furculum istum, sed, si continetur vellicatio, etiam in cæteros ex isto plexu oriundos nervos; unde omnes partes connexæ cum istis nervis spasmò convelluntur, adeoque tam multiplex partium affectio. Hinc per

[O o]

acci-

accidens occasione horum spasmodorum, quandoque supprimitur urina citra calculi licet præsentiam: idque vel simpliciter à fibrarum nervearum renalium strictione, & pororum eorum clausura, vel etiam ureterum fortiori contractione, utpote qui crispatis urinæ, & aliorum aliàs facilem transitum impediunt. Eandem societatem nervorum quoque agnoscit renescimus. Quò pertinet, quando viri nephritici retractionem istius testiculi subinde patiuntur, qui respondet reni affecto, ita, ut non tantum sursum ad os pubis usque retrahatur testiculus, sed etiam jam intra corpus abscondi observetur, ideò quod musculus cremaster convulsivo motu affectus testem sursum & ad abdomen retrahat.

Hæc omnia sufficiunt nobis pro confirmatione affectuum ex spasmodis & convulsionibus partium fibrosarum derivandorum: scilicet

1. Vomitus licet interdum urgeat, antequam dolor nephriticus in lumbis percipiat, tamen oriri à vellicatione & spasmo renum, utut respectu nostri non sit sensibilis;

2. Colicos & iliacos virorum dolores, ut plurimum esse à convulsione intestinorum, cum ordinariò in calculo renum superveniant tormina colica.

3. Non secus ac hysterica pathemata esse dolores intestinorum, à spasmodis enatos, cum mulieres nephriticæ ordinariò fiant hystericae, & ad passiones hystericas dispositæ nephritide superveniente gravius affliguntur.

4. Alvi clausuram oriri simpliciter ex spasmodis intestinorum, & motu eorum naturali peristaltico impedito; qualis alvus clausa ordinariò nephriticos vexat.

5. Omnes dolores parturientium & menstruantium à spasmodis esse, unde mulieres gravidæ facile patiuntur abortum superveniente nephritide; item tormina nephritica simulare interdum dolores parturientium.

Causa remota est duplex: nempe

1. Acidum in primis viis congestum, idque vel calculum inferens, vel renes aliàs afficiens.

2. Menstrui sanguinis impetus; nam sub hac instante menstruatione dolores tensivi & obtusè gravantes, circa regionem lumborum ad pubem usque pergentes affligere solent; unde etiam hæc symptomata affligentia intendere potuit, quia vasa jam circa dicta loca turgescere magis, & hinc istas molestias exasperare valent.

P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin; uti in chronicis; ita etiam in hoc casu, non dantur determinatæ prædictiones. Si enim calculus subsit magnus, & dolores aliaque symptomata diutius continuant, tunc certò supervenit epilepsia, propter

continuos spasmos, in gravidis abortus. Sic curavi feminam ad 17. dies suppressione urinæ laborantem, cui tamen semen violarum propinando, medebat, ita ut cum impetu urina dicto die cum epilepsia proflueret; post secundum autem mensem recidivam patiebatur lethalem. Si ergò calculi sunt majores, inæquales, acuti, &c. & sequatur simul mictio cruenta, tandem exulceratio renum oriri potest. Minus hic periculosum est, quia foemina non est gravida.

C U R A.

Quoad Curam: In Paroxysmo

1. ante omnia spasmi membranarum & ureterum dolorifici tollendi, qui nisi fuerint sublatis, diuretica, & omnia alia frustra & cum nocumento adhibentur: hinc, quamdiu spasmi urgent, impossibile erit calculum promovere; unde etiam illo tempore à diureticis abstinendum, ne iritemus crabrones. Spasmi autem tollunt anodyna, tam vegetabilia; ut opiata, quàm mineralia, ut sulphura metallica, quæ fixa, cum raræ sint aves, proinde saltem sulphura antimonialia, sive sit vulgare sulphur antimonii citrinum cum aqua forti parabile, sive etiam cinnabaris antimonii, adhibeantur; imò loco cujus & cinnabaris nativa est egregia contra morbos convulsivos: Vid. in Ludovici Pharmacia.

2. Calculi excretio promovenda, sublatis prius spasmodis.

Pro hoc scopo conveniunt remedia diuretica salina, nitrosa plus minùs prolapiæ, quippe quæ & calculum remonent, & diffringunt. Si quæ alia in diffringendo calculo aliquid valent, certè sunt nitrata, tam fixum, quàm volatile, hinc spiritus nitri dulcis, qui calculum interdum attrivit, item nitrum volatile artificiale quasi ammoniacale, quod fit ex mistura spiritus nitri, & spiritus salis ammoniaci ad punctum saturationis, coagulatur blandâ evaporatione sine crystallisatione, & evadit exinde nitrum ammoniacale, sed revera nitrum inflammabile volatile. Liquor etiam hic filtratus sine inspissatione exhiberi potest in Paroxysmo.

Vomitiva autem in Paroxysmo sunt nocentissima, extra Paroxysmum verò pro præservatione calculi sunt optima, annotante Hildano *Observat.* 61. Cent. 5. Sic etiam Purgantia propriè dicta, in Paroxysmo exulcent, & saltem in ejus principio, si opus fuerit, lenientia & blanda laxantia, primas vias abstergentia, usurpanda. Necessè tamen est, ut semper in nephritide alvus sit aperta, non quidem pro scopo nephritidis curandæ, sed ut abdominis symptomata & alia mitiora reddantur, ut & per consensum renes stimulentur pro emittendo calculo: quod obtinebitur.

1. Per

1. Per clysmata terebinthinata, quæ in Paroxysmo optima:

R. *Decoct. Carmin. vel flor. Chamom. in*
comm. 3vj. vel vij.

ole human. 3iij. vel iv. adde

• *Terebinth. c. vitell. ovi sol. 3ß.*

, (vel *ol. Terebinth. gutt. aliquot.*)

Vel fiant etiam clysmata ex urina humana sola cum melle mista, quibus addatur decoctum quoddam blandè carminans vel imprægnatum cum aliquot guttis olei destillati terebinthinæ.

Juxta hæc 2. blanda Laxativa sunt adhibenda, v. g. passulæ minores laxativæ, & passulata; vel emulsiones seminis violarum, quæ nephrocatharticæ sunt, præscribi possunt, v. g.

R. *Sem. Violar. purp. 3iij.*

Papav. alb. 3j.

Cum f. q. ∇ *alkekengi* f. Emulsio: adde

Lap. Percar. præp. 3j. vel eorund. &
lapill. Sr. præp. aa. 3ß. Misc.

Vel pro blando absterfivo renum & primarum viarum in principio Paroxysmi:

R. *Tart. Glati gr. xv.*

His genist.

Scamm. 4at. aa. gr. iij.

Misc. pro Pulvere.

Detur mane in vehiculo calido.

Aurum fulminans per præcipitationem cum spiritu salis ammoniaci, & sine edulcoratione ad usum adhibitum, mirabiliter interdum à gr. iij. ad iv. v. vel vj. laxandi vim habet sine molestia, & flatuum impetum sistit, fecesque nigerrimo colore tingit. Cum tamen sit aurum corporale, magis mirum est, quod solutio auri cum spiritu salis tam insignes habeat effectus instar acidularum. Nempe

R. *Solutio Oi purgati facta in aqu. R. &*
atur cum Rio vivo, atum edulcoratur, & hinc blando de ad evaporationem
Mercurii ustuletur; tunc calx præfata de
novo solvitur à ~u His, optimè tamen
rectificato, in liquorem aurei coloris.

Solutio hæc ægro propinatur in vehiculo calido primo die ad gutt. v. secundo ad vj. hinc vij. porro quarto die viij. ix. & sic gradatim cum diebus ascendendo.

Vires habet insignes, primum quidem nauseas excitat, hinc continuata mirabiliter primas vias abstergit, mucum tenacissimum dissolvit, & aliquoties instar purgationis alvum laxat, fecesque tingit aterrimo colore. In morbis chronicis hæc solutio dicto modo continuata idem præstat, quod magna quantitas acidularum. Sapor est acidus, & non nihil austerus, à mutatione texturæ spiritus salis cum auro concurrentis, hinc abstergit, sed adstringendo fibrasque firmando tonum

Tom. II. Pars 2.

partium insigniter restaurat, & primas vias mirabiliter evacuat. Primus, qui hujus solutionis mentionem facit, est Gläuberus in *dem Trost der See-fahrenden* / ubi multa garrit de spiritu salis, & hac solutione.

Pro spasmodicis coërcendis Cinnabarina & Opiata in Paroxysmo etiam sunt optima. Summatim nervum, Paroxysmo nephritico succurrendi, docet Ludovici pag. 449. in *Pharm.* qui moderatè præcipitantia, diuretica, cinnabarina & opiate miscenda suadet, pro nimia atrocità in Paroxysmo nephritico; v. g.

R. *Lapill. Sr. præp. 3j.*

Cinnab. nativ. depur. vel Cinnab. 3ii
Scrup. 3ß.

Laud. op. ferm. gr. ij.

M. f. Pulvis pro dosi.

Sal volatile succini in principio ob nimiam diuresin non suadeo.

Cæterum cum his internis externè simul pro eodem scopo blandè sistendi spasmos & tensiones partium nervearum abdominis, partim pro laxandis primis viis, Balnea & Inseffus commodè etiam instituantur, ad dicta symptomata optima; blande enim afficiendo partes nerveas spasmos tollunt, & viis laxioribus redditis calculum promovent, præmissis prius internè vel blande anodynis, vel antiepilepticis, vel blandis diureticis, v. g. essentia urinaria anodyna ad gutt. xxx. quibus balneum ad hypochondria usque inseffum, opem fert; sicut post balnea inunctiones etiam lumborum in usum vocari poterunt, quæ in leviori malo, unà cum internis, sufficere possunt. Interim oleum destillatum succini & spicæ, non sola, quia nimis penetrantia & aciora eadem, genus nervosum sensibilius afficiunt; sed misceantur cum blandis temperantibus & anodynis, v. g. cum petroleo, quod externè illitum umbilico etiam mirè laudatur in affectibus nephriticis, vid. Panarollus *loc. cit.* Porro olea dicta destillata misceri poterunt cum unguento anodyno Mynsichti, vel oleo expresso hyoscyami, vel unguento dialthæ, verbi gratiâ:

R. *Petrol. alb. 3iß.*

Ol. Papav. expr. 3j.
destill. succ. 3ß.

M. pro Litu,

regioni umbilicali & lumbis applicando, sub egressu è balneo.

In more positum est quibusdam, ut mulieribus nephriticis sanguinem evacuent, vel etiam cucurbitulas scarificatas applicent, & quidem quandoque cum successu; sic enim sæpè secutus est fluxus mensium adeoque dolores lumbares remiserunt; hinc ad horum imitationem in habitioribus & plethoricis, vel quibus instant menses,

[Oo 2] & quæ-

& qualibet symptomata exasperantur, non inconsultum, si, cæteris respondentibus, blandè mittatur sanguis in brachio; sicut actu fluentibus, sed non sufficienter in pede.

Aliàs pro scopo diuretico in paroxysmo nitrosa vel hujus profapia: conveniunt, ut nitrum volatile, spiritus nitri dulcis, sal firmi columbini, spiritus carminativus, tinctura Ammelungii, item remedia lumbricalia: quæ omnia, quò magis sunt nitrosa, cò magis pro scopo diuretico conveniunt. Similiter etiam spiritus tartari, ceu congener vino, præ reliquis convenit, quia suspicio est, quod ægra calculum contraxerit ab usu vini; tartarea enim acidum vinosum optimè absorbent, & promptissimè resolvunt, adeoque hinc podagricis alcalia ex tartaro volatilia commendanda sunt, ceu peccans acidum absorbentia, illudque per vias urinarias eliminantia.

Extra Paroxysmum autem à potu vini abstineat, tinctura nephritica usurpetur, & succus betulæ, qui nitrosus est, & fortiori destillatione dat sal volatile nitrosum. Alvus servetur aperta.

Pro præservandi scopo conveniunt quidem diuretica omnia, sed quia non semper satisfaciunt, potius eligantur, speciatim renibus appropriata, & vi balsamicâ fermentum renum in naturali statu conservantia; non enim in assumptis ut sic, non in acido consistit Lithiasis, sed in fermenti renum corruptione, quâ occasione acidum calculum coagulat. Talia ergò, quæ dictum fermentum in naturali statu conservant, sunt salia volatilia oleosa, aliàs balsamica dicta, ex terebinthina, junipero, succino & similibus, ut Malvaticum juniperinum, rob juniperi, balsamus sulphuris terebinthinatus; quæ omnia inter præcipitantia balsamica sunt optima, renibus singulariter dicata, quæque istam dispositionem calculosam tollunt & emendant. Juxta hæc convenit succus betulæ; quem destillatione fortiori sal volatile nitrosum exhibere, relatum est mihi, & in hoc consistere crasin aquæ betulæ Martialis seu Majalis: Sic sal volatile nitrosum, liquor terræ foliatæ tartari cum spiritu salis ammoniaci mistus, tinctura tartari, & nephritica, spiritus carminativus, crebrius usurpari possunt.

CASUS XLV.

STRANGURIA cum PODAGRA.

Vir ætatis consistentis, nephriticis & podagricis affectibus crebrius obnoxius, urgente intenso hyemis frigore, contrahit tussim ingentem & validam, crebrius pectus concutientem, ejicit pauca

saltem & viscida, locum ubi tussis excitatur, monstrat antè in collo, in Capite asperæ arteriæ: accedit levior invasio podagrica circa manum dextram, & cubitum sinistram & genu sinistram. Vocatus Medicus præscribit spiritum salis ammoniacicum dimidio spiritus cochleariæ ter, manè, à meridie, & vesperi, sub introitum lecti, ad gutt. 40. sumendum; exinde podagricus affectus cessat, sine sensibili superveniente evacuatione: Hinc secunda vel tertia die gravis dolor in lumbis, cum intensissimo vesicæ dolore, supervenit, ita, ut continuum mingendi conatum admodum dolorosum percipiat, paucam tamen urinam emittat.

RESOLUTIO.

Affectus primarius est Stranguria, ad plures dies durans, qualis in senibus non raro observatur vitio urinæ, vesicâ ipsâ in fonte.

Pars affecta est vesica urinaria, speciatim sphincter & urethra: nam uti subinde tota vesica dolet ex retentione nimia urinæ, distendentis eam: ita in specie urethra & sphincter ab eodem acido rodi & affici solet: unde cum sphincter admodum sensibilis sit, hinc is subjectum immediatum statuendum erit.

Causa proxima est acidum vitiosum, in specie arthriticum, quod in urina observabile dolorosam stranguriam in nostro ægro excitat; ubi tamen quæritur, quomodo acidum id ad vias urinarias deriveretur? Scilicet æger noster est arthriticus, seu in quo acidum specifici saporis rodit partes nerveas circa articulos, unde usu spiritus salis ammoniaci & cochleariæ cessat quidem podagricus affectus, & supervenit stranguria; sed quæritur: quomodo? Si enim acidum adhuc præpolluit, quare non arthetica pathemata revivixerunt aut continuarunt? Resp. Spiritu isto salino urinoso volatili sal acidum podagricum correctum fuit in tantum, non in totum; ejus tamen ope resolutum fuit acidum, partibus nerveis tendinosi antea infixum, adeoque in motum concitatum, hinc à sero absorptum, & quaquaversum per universum corpus distributum fuit. Cum verò acidi textura non nihil immutata fuit à spiritu isto volatili urinoso, & sapore suo jam acido-salfo ita confirmata, ut sero involutum faciliè per poros renum penetrare valuerit, serum sale isto acido onustum ibidem percribratum, & ad vesicam delatum, sphincterem & urethram rodendo, cum euphoria reliquorum symptomatum stranguriam induxit. Ac hinc quoque dolor lumborum hic jungitur, qui reverà nephriticus est, ex eodem acriori sale mem-

membranulas renum rodente & convellente, ortus. Scilicet conspirant mutuo in calculosa radice efficientis ratione podagra & nephritis, adeoque & ut plurimum junguntur, hinc & easdem fere remotas insequuntur causas & sequuntur specialissime vini acidioris, vulgo dicti tartarei abusum, hinc in confirmata podagra ut plurimum etiam adest nephritis calculosa.

Solet equidem interdum insensibiliter causa peccans in arthriticis discuti, & hinc dolor & tumor disparere; aut si non insensibiliter, tamen saltem sensibiliter, transudare: sed ob causae procatacticae vim, in agro nostro densatis à frigore externo ambiente contentis corporis nostri succis, & firmitus conniventibus poris, per vias urinarias acidi illius salini aeris facta fuit excretio, quod alias vel per insensibilem transpirationem, vel sensibiliter fuisset eliminatum, quemadmodum alias diaphoresin imminutam sequitur excretio diuretica aucta. Notum enim est, diaphoresin & diuresin in multis conspirare, ut unum alterum subinde sublevert.

Ex his tanquam porissima elicio: sedulo observandum esse, quam egregia sint diuretica, tam & quidem primario pro praeservatione, ut salia vitiosa acida sub sapore falso eliminantur, quam pro curatione podagrae, & potissimum arthritidis vagae, praemissis praemittendis, tam in incremento & statu, quam etiam in declinatione paroxysmi. Nulla nempe evacuatio solet esse melior, quam per appropriata diuretica: & quidem haec speciatim alcalia volatilia, facile acidi attacku in salsa, praesertim nitrosa, abeuntia: qualia sunt spiritus salis ammoniaci, spiritus carminativus de tribus, qui nitrosae nonnihil profapiae, adeoque egregie diureticus, tam praeservativè, quam curativè conducibilis. Praeservativè quidem novi aliquot exempla, qui ex uberiori vini ingurgitatione oriundam ebrietatem & varia mala huius spiritus carminativi usu sibi praecaverunt, quatenus urinam movet; unde nil novi, acidum podagricorum, ut plurimum vinosum, huius ope eliminari. Similiter spiritus lumbricorum terrestrium, uti omnia lumbricalia excellent, inter diuretica podagrae dicata, qui etiam non solum in arthritide vaga, in qua praemissis diureticis fixis, arcano duplicato, &c. est nobilissimus, sed eadem lumbricalia remedia etiam in fixa podagra, tam in quam extra paroxysmum, sunt selecta. Imò pari ratione etiam scarabaei, speciatim unctuosi, *die blauen Mayen-Käfer* / in podagra sunt nobiles, per copiosas urinas operantes, ut ut cum dolorosa stranguria conjuncta podagram sanent: Vid. Borellus *Centur. 4. Observat. 73.* quo loco habetur secretum ali-

quod, ex horum scarabaeorum balsamo conficiendum. Ex fixis nobile est arcanum duplicatum Mynsichti in & extra paroxysmum.

Quoad Causam remotam: ea duplici sensu considerata, nempe vel ratione causae materialis, seu fomitis morborum, vel ratione causae efficientis, fomitem illum moventis: scilicet praesupponitur quidem acidum vitiosum errato primae digestionis enatum, unde de causa materiali non sumus solliciti; sed saltem de causa procatactica seu remota efficiente, movente fomitem morbosum, est imprimis quaestio. Haec in nostro agro fuit inclementior aer hybernus, qui primò pro ratione acrimoniae, irritantis ac laedentis fauces, tussim excitavit, simul tamen quoque poros cutis ad arctiorem stricturam sui (non omnimodam clausuram) disposuit, hinc faucibus vellicatis, & tussi excitata, porisque conniventibus, varias metastases acidi vitiosi, tanquam causae materialis morbosae, quae ubique vellicando impetu spirituum moventium, & conformatione organorum mechanica, hinc inde mora & commota fuit, donec ea tandem per vias urinarias fuit excreta. Movebatur ergò prius ad fauces, hinc tussis; postmodum articulos affligebat, hinc podagra; postea resoluta, mediante spiritu salis ammoniaci & mediante sanguinis circulo ad vias urinarias delata, & tanquam per cribrum transcolata, in vesica stranguriam excitavit, praegressis interim ex motu lymphae, occasione pororum strictorum deviante, paroxysmis podagricis. Et hoc evidens est exemplum vagantis fomitis morborum apud podagricos.

Sic in agris metastasis haec maxime familiaris est: nempe observanda venit imprimis arthritidis differentia, quae nunc recens est, nunc inveterata; adeoque illa exinde minus; haec verò magis fixa seu circa articulos incuneata existit. In recenti ergò, & ad duos annos extensa, acidum praeternaturale, specifici tamen saporis, saltim rodit tendines, & loca circa articulos nervea, hinc etiam saltem superficiali rosione mobilis adhuc, & subinde hinc inde nonnihil vagans, observatur, non secus ac arthritidis vaga scorbutica, quae cum recenti illa in pluribus convenit. Econtrà inveterata est, quae jam synoviam articulorum occupavit, & ipsos adeò articulos saltim atrocius affligit, quin imò ipsis locis nerveis se insinuando, ipsum partium nutrimentum peregrino sapore inficit, & spiritus ita continuo plus minus vellicat, aut saltim levi occasione ad novam irritationem excitat; unde tumores tanquam productum morbosum superveniunt. Recens podagra facile curabilis est, eidemque vel saltem lacticia me-

deri possunt; inveterata difficulter: in illa locum habet medicatio, quæ exprimitur per illud vulgare, *das Podagra zuruck treiben*; in inveterata vero hoc falsum est, quippe quæ non potest loco dimoveri, nisi novi fomites superveniant; utut tale quid obtinere ægris videatur. In recenti podagra interdum variæ metastases observantur materiæ morbificæ, potissimum ab usu præpostero topicorum, & hinc varia nocumenta eos affligunt; sicut id mercator quidam hic locorum in itinere Hamburgensi expertus est: Is enim podagra recenti affectus; à balneatore quodam sibi emplastrum, ex spermate ranarum, cera & cerussa confectum, imponi passus est, unde brevi post quidem podagra cessavit, sed hinc correptus est torminosa diarrhœa insigni, cum appetitu dejecto & virium prostratione. Adhibitis remediis restituitur in tantum, ut appetitus rediret, sed diarrhœa ultra dimidium annum perstabat. Sanè hoc in casu occasione fomitis podagrici, intempestivè regurgitantis, fermentum bilis ita vitiatum fuerat, ut ratione debitæ perfectionis chyli deficientis diarrhœa illa nocturna supervenerit, stomacho antea sano. Non secus victor aliquis, cessante paroxysmo podagrico, asthma vexabatur, quod podagra redeunte cessavit. Imò alius podagra inveterata afflictus, instante paroxysmo gravissimos dolores ossis sterni, maximasque angustias præcordiorum, patiebatur, nocturno saltem tempore, & quidem omni nocte, præprimis affligentes, nisi beneficio aut theriacæ, aut laudani opiati eisdem præcaveret, superveniente verò podagra, dolores sterni atrociores cessabant; paroxysmo verò podagrico curato dolores sterni majori cum atrocità redibant, & hoc propter metastasin: unde etiam hic mavult podagricum dolorem, quam sterni pati, si electio daretur. Utut itaque incommoda sit metastasis, commodum tamen est fieri metastasin acidi podagrici, quæ fixum in uno loco crasin massæ sanguineæ admodum vitiat; licet non negandum, quod aliquando periculosa sit metastasis podagræ ob dyscrasiam sanguini minitantem, quæ nonnulli quoque, palpitatione cordis & dyspnœa superveniente, moriuntur.

Cæterum fomes morbosus in podagra primario generatur occasione erratorum in digestionem primam; hinc imminente paroxysmo circa stomachum quoque & primas vias tragœdia luditur, nempe appetitus dejectus, angustia præcordiorum, donec tandem paroxysmus podagricus superveniat, qui quamdiu durat, tamdiu iterum fames & appetitus constant. Atque hinc est, quod extra paroxysmum exactissimè diæta observanda, alias maxime exasperatur dolor,

similiter fere ac apud vulneratos fieri solet. Quanta enim digestionis primæ tam in quam extra paroxysmum, sit ratio habenda, ex simili illustrari potest: Nempe ponam ægrum, cætera sanum, in capite vel pede, loco præsertim nerveo graviter vulneratum; hic certe si sub cura vulneris vinum potet, aut acetum comedat, in toto corpore est sine nocumento, & tamen brevi post in loco vulnerato major dolor & ardor, pulsus auctus cum inflammationis metu & omnium symptomatum exasperatione supervenit. Par ratio est in podagra, speciatim confirmata; quando verò vinum illud lapillis cancerorum temperatum propinabitur, erit remedium propter vim alcalinam talibus ægris maxime proficuum. Par ratio est, si ægri podagra crebrius obnoxii extra paroxysmum vinum largius bibant, statim altero die revocant paroxysmum, acido vini non rite digesto vel correcto; sicut vulneratis qualibet acida hostilia sunt.

Quoad Prognosin: Stranguria non diu durans est sine periculo; & licet tolerabilius malum podagrâ, interim tamen graviolem metum exulcerationis vesicæ suggerit.

Quoad Curam: In methodo medendi semper consideretur naturæ motus, adeoque huius insistant vestigiis sedulo Medicus; quamdiu enim illa stat aut sedet, non potest eam Medicus meliorare, idque propter idiosyncrasiam in unoquoque ægro singularem, à priori eidem imperscrutabilem: Sic enim ponamus duos podagricos, alterum sputum cruentum, alterum stranguriam patientem; sanè in utroque variant indicationes. Cæterum idiosyncrasia hæc tam ad contentos corporis nostri succos, adeoque horum crasin, quam etiam continentes partes solidas, & harum conformationem mechanicam, quæ in omnibus subjectis quoad porulos & meatus minimos suam differentiam patitur, imò ad mutuam harmoniam & proportionem extendenda est: Sic in nostro ægro propter acidi specialem configurationem cum porulis renum fit stranguria, in aliis hæmoptysis & sic porro. Quia ergò speciales naturæ motus considerandi, & in nostro ægro peccet acidum podagricum, sed quod laudabili conatu per vias urinarias excernitur, utut ibidem per accidens dolorem inferat, sequentes observandæ Indicationes.

1. Acidum peccans podagricum temperandum.

2. Motus iste materiæ laudabilis per vias urinarias promovendus.

3. Hinc post aut extra paroxysmum fomes materiæ peccantis, acidi vitiosi erratum, si quis superest, removendus, & ejus regeneratio in primis viis præcavenda.

Unde

Unde cum ad hunc ægrum ante tres annos, tussi adhuc urgente, vocatus, eaque adhuc sicca, parum verò humida, ab acrimonia lymphæ nata, vestigiisque leviculis podagræ circa articulos affligentibus; præscripsi:

℞. ▽ *scabios.*
Mentha aa. ʒiʒ.
 ~ *Θ *ci anis.* ʒiij.
fl. ʒis ʒʒ.
Syr. scabios. ʒvj.
 M. f. Potio.

His interdum, in specie vespertino tempore, gr. j. ad gr. iʒ. laudani opiatum addendum iussi. Hæc portione repetita tussis evanescebat, sed invasio podagræ exasperata fuit, pro qua lenienda ordinavi.

℞. ~ *Θ amm.* ʒij.
Cochlear. ʒj. Misc.

Dedi ad gutt. 30. 40. ter in die, manè, à meridie & vespèri, semper, quantum possibile, aliqualem sudorem expectando, verum æger sudare nequibat, ob stricturam pororum cutis à frigore antecedente obductam, hinc & continuato spiritu, sic cessantem podagram stranguria excepit, repetente insimul insigniter tussi, ex acido resoluta ad asperam arteriam delato orta; unde præscribebam, pro lymphæ acidæ acri temperanda, & urina promovenda:

℞. *Amygd. dulc. ambr.* ʒʒ.
sem Violar. purp. ʒii.
Papav. alb. ʒiʒ.
 Cum f. q. ▽ *æ alkekeng.* f. Emulsio ad ʒvj.
 vel vij. adde
Lapill. ʒer. præp. ʒj.
 M. edulcoretur parum.

Optimè contulit, & urina fluxum promovit; ideo ter vel quater reiterabatur, cum plenaria ferè ægri convalescentia.

Insuper pro derivando acriori sero per alvum, si quod superesset, præscripsi hoc blandum laxans, quia æger facilis erat solutionis:

℞. *Conf. Rosar.* ʒʒ.
ʒi ʒlati gr. viij.
Ref. Jalapp. gr. v.
 M. f. Bolus.

Unde ex usu hujus sexies vel septies crevit per alvum, & ita penitus convaluit æger.

Cæterum vomitorium fuisset hîc pestilentissimum, quia naturæ morum impedivisset in nostro casu, contra si stranguria illa nimis contumax sponte vel errato interno vel externo fuisset prognata, concessissem vomitorium. Resinæ purgantes autem quò magis per pingua solvuntur extra corpus, eò melius intrò purgant intra corpus. Hinc si-

mili ratione ex iis possunt parari emulsiones purgantes suavissimæ pro delicatulis, ex. gr.

℞. *Sem. Melon. exc.* ʒʒ.
Mag. Jalapp. gr. vij. ad ʒʒ.
 ▽ *Rosar.* ʒj.
 f. l. a. Emulsio:
 adde
Scamm. ʒat. gr. ij.
 ▽ *Cinnam.* ʒij.
 ~ *Rosar. scrup.* ʒ.
Syr. Rosar. q. f.
 M. D. S.

Purgier-Milch.

In Stranguria aliisque quamplurimis vitiis, à lymphæ acri ortis, glycyrrhiza egregia est, temperans acrimoniam urinæ; unde ea vel in Decocto, vel in succo inspissato, propinari potest. Similiter cortices aurantium nobiles sunt, unde pro stranguriâ ordinavi.

℞. *Pulv. cort. Aurant.* ʒiʒ.
Lapill. Percar. præp. ʒʒ.

(quorum loco etiam lapilli cancerorum præparati, aut testæ ovorum calcinatæ conveniunt)

Ol. destill. cort. Aurant. gutt. jx.
 Cum paucis *Saccharo* f. Pulvis pro tribus dosibus.

Horum vehiculum sit vinum dulce, quia acidula vina non conveniunt, aut vinum, in quo silices candefacti contusi sæpius extincti sunt; sic enim vinum fit obtusè salsum, adeoque diuretica vi insigniter pollet. Dulcia vina alcali & oleo copioso turgent, hinc non diu durant.

Porrò rapæ recentes, pariter & exsiccata, tam in lymphæ quam urinæ affectibus, optimæ sunt: de quibus vid. Gabelchoverus in Observ. item conf. Crato in Consil. & Sylvius in Praxi: sicuti eadem quoque in tussi, tam stomachali quam pectorali, occasione inclementioris aëris enata, omnia ex rapis præparata sunt egregia, conf. Forestus lib. 5. *Observat.* 4. qui gravissimâ stranguriâ laborans, usu foliorum malvæ cum syrupo violarum convaluit. Sic itidem violæ præ cæteris nobiles & specificæ sunt in affectibus urinaris, quarum vis specifica cum concentrata sit in earum semine, hinc optima est ex hoc parata emulsio seminis violarum; est enim terebinthinata nonnihil naturæ, hinc acorem temperatum continet. Insuper non cedit violis hypericon, & hujus semen, quippe quod digitis contritum, & odorem & saporem terebinthinæ refert; unde in specie electuarium ex semine hyperici & conserva florum violarum laudatur maximè à Zapatha in sua Clave Medicinæ, pro præservatione à nephritide. Facit huc etiam conserva florum Malvæ, quæ in dysuria & stranguria laudatur

ab Amato Lusitano & Hœchstedtero *Dec. 6. cap. 2. in schol.*

Quodsi æger in ætate juvenili constitutus, & visceribus & stomacho adhuc salvis gauderet, acidulæ convenirent; si verò æger senex esset, & tono viscerum debiliori, & fibrarum vesicalium læso, laborasset, tunc ordinassem potius thermas, quarum infessu vitia urinaria corriguntur. Id quod in Syn-dico quodam Dresdensi ante aliquot annos expertum audiui, ubi hic quidem jejunus semper optimè se habuit; simul autem ac in prandio vel cœna tantillum biberet, & quidem potum calidum, intensissimum dolo-rem in vesicæ regione & cervice sensit, cum continua & diu perdurante stranguria. Interim urina ejus non erat purulenta, nec lactea, sed pinguedine tantilla supernatante prædita. Hic ergo aliis omnibus irritis, ad aliquot annos usurpatis, tandem per ther-mas curatus fuit, & ultra biennium benè exinde habuit. Audiui tamen, superiori æstate malum recrudescere voluisse, quod pro-pter inertiam bilis in senibus facile fit; hinc in iis stranguria difficilis est curatu. Adeò ergo senes, dysuria difficili laborantes, pos-sunt dimitti ad thermas. Aliàs etiam Lin-dani euporiston in stranguria est balsamus de Capaibe, vel balsamus Indicus albus, ad guttas aliquot in Decocto petroselini, egre-gium simplex est, & omnes vires balsami Pe-ruvianii, in gradu tamen excellentiori, ob-tinet; unde præter hoc, quod in gonorrhœa virulenta insignis virtutis sit, speciatim etiam, ubi jam vesica ex continuata stranguria ali-quam exulcerationem jam passâ, conveniet. Borrax denique, subjectum quidem alcali-num, temperatum tamen, uti menses pel-lit, ita quoque urinam, & ejusdem acrimoniam temperat. Tandem optima omni-um remedia cancrina præ cæteris sunt etiam egregia, ut succus expressus, &c. plurimis Indicationibus satisfaciencia: speciatim

ix. Cancros binos:

Contunde in mortario, & exprime suc-cum; qui misceatur cum ∇ , vel cerevisia, vel vino, & pro duabus dosibus propinetur ægro.

Ordinarium etiam euporiston in excoria-ta vesica, solet esse, si recipiatur Oleum Amygdal. dulc. cum Syr. de Althea Fernelii, & lapillis *sr.* præparatis.

In excoriatione autem & exulceratione vesicæ etiam conveniunt balsamica sulphu-reæ, balsamus sulphuris, terebinthinatus & succinatus.

Externè excellit axungia hirci, cum oleo destillato terebinthinæ mista, & umbilico re-gionique pubis illita; nec non lac continua-

to usu bibitum in magis confirmato malo, quod diætâ ordinariâ nequit curari, impri-mis caprillum, maximè proficuum est.

Præservativè in hujusmodi affectibus ne-phriticis, aliisque urinariis, & podagra, ex-cellunt tinctura nephritica, spiritus carmina-tivus, clysti compositi urinosi, & spiritus sa-lis ammoniaci.

CASUS XLVI.

EPILEPSIA HABITUALIS.

*P*Uella nobilis, 10. vel 11. annorum, aliàs sana & optimè constituta, jam ab aliquot septimanis, ex hypochondrio sinist-*stro* obscure dolente, subinde præcordia anxie admodum affici percipit, & somnet *ihre auß der linken Seite / und macht Herzens Angst /* ita, ut hinc subito sensus & motus voluntarius cessent, membra econtra varie expandantur & movean-tur, digiti ac brachia nunc inflectantur, nunc rigidissimè extendantur, subinde ja-centi universum corpus arcuatim attolli-tur. Durant hæc nunc per quadrantem, nunc per dimidiam horam, unde denuò ad se quasi rediens, de nullo nisi artuum las-situdine, conqueritur; sæpius, etiam ci-tra manifestam causam, tales paroxysmi redeunt, ipsa interea mæstâ præter mo-rem, & lachrimabunda existente: dor-mit bene, large comedit, quin & cessan-te paroxysmo, subinde potum & aliimen-ta postulat. In paroxysmo, dum odora-tior balsamus naribus admoveatur, omni-um sensuum & internorum functiones re-stituuntur, partium miro isto motu ad-huc affligente, subito vero ac removetur balsamus, istæ sensuum functiones iterum cessant. Ingruente paroxysmo semper mo-tum prævium in hypochondrio sinistro percipit, quò ad anteriora præcordiorum accedente, præfata ingruunt symptoma-ta, ipsâ quid secum interea fiat? nesciâ.

RESOLUTIO.

Epilepsia est, & quidem ad imitationem Willisii dicenda Habitualis, ad differentiam accidentalis seu symptomaticæ, qualis v.g. in variolis aliisque febribus malignis, nec non in parturientibus, per accidens obser-vatur.

Quoad fomitem morbosum seu subje-ctum causæ morbificæ, observandum; in morbis internis quamplurimis, quasi spontè natura enatis, duplicem causarum haberi ra-tionem, causæ nempe efficientis, & mate-rialis. Illius efficacia, ubi speciatim & ma-gis particulariter se exerit, motu & effectû præternaturali, morbi subjectum dicitur.

Hujus

is verò sedes primaria ubi est, aut ratione
nis, aut ratione radicationis seu inhaesio-
aut ratione afficiendi modi, est subje-
a causæ seu fomes morbosus, seu subje-
n morbi radicationis. Hinc in casu præ-
i efficiens proxima est spirituum impetus:
ota est vellicatio partis nerveæ sensilis,
as occasione iste motus excitatur; unde
tes motu isto spirituum præternaturali affe-
subjectum morbi sunt: sed materia ista
da, quæ vellicat, est materialis causâ, quæ
n hæreat in splene, hic fomes sive subje-
m causæ materialis est. Causâ remota ad
teriale disponens est error digestionis
mæ. Quod si causâ materialis eandem oc-
pet partem, quæ morbo speciatim affligi-
, per essentiam erit; si in alio loco, mor-
per consensum species enascitur.

Subjectum autem radicationis seu fomes
orbosus in nostro casu, quærendus est in
pochondrio sinistro; quod indicant adjun-
a eidem symptomata. Cæterum quæri pos-
t; an intestina? an verò lien accusandus sit?
x colo provenire talia symptomata, non
robabile est, eò quod in hysteriis, colicis
chypochondriacis morbis, imò in infanti-
us, in quibus tamen omnibus causâ proxi-
na in colo residet, talia phænomena non
observentur. Unde potius lien hic conside-
andus est, qui reverà in præsentī casu materia-
is causæ subjectum & fomitem morbosum in
e continet, & quidem ratione suorum ner-
vorum insigniorum, in splene affecto gravi-
ter irritatorum, quæ ratione in spasmos abri-
piuntur; unde & reliqui ex plexu istorum
nervorum affecti surculi in similes spasmos
abeundo graves morbos convulsivos concit-
ant, quorum communicationem videb. *in*
Anat. Nerv. ex Willisii Tab. II. ubi conside-
rationem meretur plexus mesentericus late-
ris sinistri primus, ex quo nervi splenis &
stomachi insignes & copiosi originem du-
cunt: atque ex hoc plexu deducendus est
consensus splenem inter & stomachum ob-
servabilis.

Affectus tales splenis aliàs non rari sunt,
qui tamen hic non confundendi sunt cum coli
pathematibus, adhuc crebrioribus. In colo
enim dolores sunt magis dolentes, speciatim
punctorii & lancinantes; cum contrà in lie-
nis affectibus talia non, sed dolor gravans,
obtusus, & simul nonnihil contundens, ra-
rius etiam pulsatorius, observetur. Utrique
affectus, utut non sint tam causâ, quàm
quandoque effectus seu productum morbo-
sum materiale, nihilominus tamen fomes
morbosus subinde inibi se affligere potest; un-
de ibidem latitans, & altius radicem gerens,
istorum affectuum Paroxysmos nunc exaspe-
rare, nunc variis symptomatis multipliciter

variantes reddere potest, fomite in primis
viis, hinc mesenterii glandulis, præsertim
hærente.

Porro splenis pathemata multiplicia esse
possunt, præter vitia conformationis & tu-
mores, præsertim scirrhus inde natos, im-
mis fermenticij vitia respectu chronicorum
morborum, & ejus peregrini saporis, pre-
babilissimè acido-austeri varii, multiplices
morbosos effectus inferre valent, prout ab
eodem nunc præterfluus sanguis, nunc distri-
buti eò surculi nervosi magis vel minus affli-
guntur. Adeò ergò in nostro casu splen po-
tissimùm affectus videtur, quod & doloris ra-
tio, & situs partis affectæ in Paroxysmo, item
connexio lienis cum stomacho, persuader.

Interim quæritur: quâ ratione affectæ
partes in hypochondrio sinistro dolorosæ exa-
ctius discernendæ sint? Resp. ex doloris præ-
sertim ratione affectam partem determinan-
dam esse: nempe splene affecto dolor im-
mis gravativus, obtusus, & quasi nonnihil
contundens, rarissimè pulsatorius, observari
solet; colo verò læso obvius est dolor fixus,
pungens, interdum quasi terebrans, & vali-
dè distendens; sicut tandem intestino tenui
laborante interiùs magis dolor lancinans, la-
cerans, rodens, & plus minus pungens, adest.

Ex his ergò dolorum modis cum cæteris
circumstantiis facilè de Parte affecta certiores
esse possumus. Præ cæteris pro splene affe-
cto militat etiam, quando affectus qui in hy-
pochondriis fomitem habent, occasione ani-
mi pathematum, iræ, terroris, tristitiæ, mœ-
roris, pavoris, &c. ex commotione nervo-
rum lienis & stomachi, exasperantur. Ratio
est, quod insigniores nervos splen habeat,
quorum occasione splen juxta & cor insignem
habent connexionem, hinc etiam ordinariò
dictis animi pathematis viscera illa affici so-
lent. In Praxi observavi, quantum animi
pathemata valeant, ubi puellam ex casu ab
alto, terrore, &c. epilepticam factam vidi.
Imò nil novi est, mulieres ex sola tristitia
diuturniori, splenis in specie vitia, cum sen-
sibili tumore ejusdem, & sensu doloris istius
loci, incurrere, qui affectus difficillimè cu-
rantur. Sit ergò fomes morbi in splene.

Subjectum autem primarium morbi sunt
fibra nervorum motrices, ex quibus univer-
sum systema nervosum est contextum. Uti
enim ex subjectum sunt sensus & motus, ita
quidem, ut in externis sensibus passivè ma-
gis, contrà in motu magis activè se habeant;
ita & eadem fibra præternaturalis motus
convulsivi sunt primum subjectum, sive istæ
nunc in longum & latum extensæ membranæ
speciem & figuram referant; sive eadem
mutuò congestæ, & secundum sui longi-
tudinem in rhombum distributæ, &

carne pro firmiore robore firmata, muscu-
um exhibeant: Conf. Steno in *Myolog. Sub-*
jectum verò *Causa* est *Lien*.

Materialiter ergo considerata causa hæc
remota hujus epilepsiæ est acidum in primis
viis genitum, & fermentum lienis inquinans;
formaliter verò eadem est, quatenus hostile
est nervoso systemati, quod in hypochondriis
vellicando ad spasmos concitat occasionaliter.
Etenim acidum peccare, ex appetitu
constat, quod ægra extra Paroxysmum benè
comedit; sicut aliàs ægri tales probè appe-
tunt & comedunt, promptequè digerunt;
ubi tamen hoc observabile est, quod quam-
diu epilepsiâ habituali affectis appetitus con-
stet, vel intendi videatur, tamdiu in incre-
mento aut statu constitutus sit morbus; &
quò magis increseat appetitus, eò magis in-
creseat morbus, & difficulter curetur, quod
observavi in ancilla, *welche wol ein Hauf-*
backen Brodt aufgefressen hätte; contra
ubi cessaverit appetitus, vel arte vel naturâ,
sine ullis aliis gravioribus symptomatis, signum
est, stare morbum, aut etiam declinare.

Formalitas causæ materialis est sapor pe-
regrinus, nervoso generi inimicus: præter
quem probabile etiam est, non quidem copu-
lam explosivam accedere spiritibus animalibus
in partibus externis, sed massam sangui-
neam ipsos magis, quàm par est, efficere
elasticos, quæ vis elastica in motibus talibus
spontaneis corporis animalis, & corporum
non animatorum, in quamplurimis conside-
ratione dignissima est.

Adeoque causa efficiens proxima est im-
petus spirituum animalium elasticus auctus;
sicuti remota vellicatio nervorum in splene.

Jam verò quoad spirituum animalium
impetum elasticum, in artubus epilepticorum
observabilem, notandum; probabile esse,
in epilepsiis confirmatis, præter massæ san-
guineæ & splenis vitia, etiam subesse spirituum
animalium asperiores crasin, cujus vi tales
ægri fiunt insomnes, sine imbecillitate tamen,
hinc tam robusti adeò sunt in Paroxysmo.

Quoad tristitiam & moerorem ægræ: hæc
acidum peccans originem agnoscunt; hinc
enim, uti per se subinde melancholicos red-
dere solent homines, ita & hic omnia ista sym-
ptomata inferre valent. Cæterum, quod bal-
samo odoratori naribus admoto ægra ad se
redeat, convulsivis tamen motibus artuum
in eodem tenore manentibus, remoto verò
balsamo mox in antiquam syncopen corruerit,
hujus rei ratio deducenda est ex majori
impressione objecti externi, puta balsami, in
partem seu objectum sensorium. Objecta
enim externa fortius afficiunt spiritus anima-
les in corporibus cerebri striatis & corpore
calloso, hinc sensus externi & interni re-

deunt, spiritibus reliquis ab inordinario sui
impetu mediante externo impulsu fortiori re-
vocatis; iisdem interea, qui ad spinalem me-
dullam recidunt, in inchoato semel impetu
persistentibus.

Quoad Prognosin: Nostra epilepsia habi-
tualis, per consensum hypochondriorum af-
fligens, ordinariò transit in melancholiam
hypochondriacam, speciatim si tandem
somnia deficere incipiat, quæ tandem abit in
maniam, quam subinde insequitur fatuitas,
imò interdum etiam hanc excipit denuò Fu-
ror. Sic enim ante triennium sub cura habui
puerum novem annorum curandum, qui
epilepsiâ habituali per plures septimanas la-
boraverat, ita, ut decies, imò duodecies in
die, Paroxysmum pateretur, noctu suavi-
ter dormiens; contrà manè evigilans, do-
lorem in hypochondrio sinistro sentiebat,
recurrentibus sæpius denuò Paroxysmis, ve-
speri autem optime se habebat. Interim cu-
ravi hunc pulvere epileptico antimoniali,
sed eò ipso temporis puncto, quo non redi-
bat epilepsia, ridiculam patiebatur melan-
choliam; quando verò post aliquot septima-
nas epilepsia redibat, mens etiam redibat.
Alioquin, quod ægra in Paroxysmo ab ob-
jecto externo facile moveatur, optimum
signum est; innuit enim hoc spirituum anima-
lium motum, facile in ordinem revocan-
dum. Et posito etiam, difficile fore cu-
ram artificialem, puro tamen, si supervene-
rit legitima menstruatio, eam perfectè cura-
tum iri; interim metus est, ut citra remedio-
rum usum non superveniat menstruatio, un-
de maturè Medicus ad menses provocandos
sit intentus.

Quoad Curam: ea sequenti ordine sus-
cipienda, ut

1. acidum nervos vellicans in primis viis
& locis vicinis prius corrigatur, alias aut fru-
strà aut nocivè laboratur; quippe purgantia
& vomitoria acidum hocce sincerum vix eva-
cuare solent, sed ab eo potius castrantur &
figuntur: imò si acidum hoc non prius cor-
rectum, purgationibus vel vomitoriis cama-
rina movetur, & pathemata exasperari solent.

2. Idem acidum correctum per vomitum
& alvum evacuetur, aliquoties pro re nata
repetendo.

3. Lienis affectio seu vitium internis &
externis removeatur.

4. Si quid restitat fomitis morbofi aut sa-
poris specifici, appropriatis epilepticis delea-
tur, quibus adjungantur simul volatilia.

5. Anodynus, tam vegetabilibus quàm
mineralibus, puta cinnabarinis, effusus spi-
rituum motus compescatur.

Pro primo scopo conveniunt absorbentia
fixa hypochondriaca, terrea, & alcalina,
præter-

certim Martialia; quibus hinc volatilia angenda; alias enim volatilia primâ vice pata, occasione motus acrioris cum acieccante, solent subinde exasperare symptomata.

Quoad secundum scopum, impossibile sine vomitu, interdum etiam repetito, es affectus curare, & fomitem radicitus illere. Nec obstat puellæ nobilis constitio delicata, cum infantes præ adultis faciōmant; ut taceam, hujusmodi subjecta leptica, in quibus acidum peccat, optimè re vomitoria, quæ inter primatum ducunt imonialia, & quidem in dosi insigni. Sic cui aliquando sub cura puellam decem anrum, quæ sub somni vigore semper epilepâ corripiebatur, huic ergò dedi vomitum ordinarium, adulto aliàs sufficiens; Verum hoc parum operabatur, quippe malum at exsplene, imò mater illius etiam spleneia; unde præscripsi eidem dosin eandem um dimidia, atque sic demum effectum eratum obtinuit: Similiter alii adolescenti rdinavi quatuor grana tartari emetici, imò ex, sine effectû; præmissis autem absorbenibus, & sale digestivo hypochondriaco, aliquamdiu demum post granorum 6. tartari meticiici usum suprâ, & aliquoties infra purgatus: non secus epileptico melancholico gr. v. tartari emetici, & gr. ij. extracti trochicorum alhandal, exhibere coactus fui; præmisso per octo dies sale digestivo hypochondriaco, & vix vomitum potui excitare.

Inter Purgantia verò rectè helleborus niger, & ex hoc parata remedia, hincque Mercurius dulcis, excellunt. Optimè autem cum vitello ovi resolvuntur resinæ purgantium, addendo huic aquam cinamomi; ita enim sufficiens administrari potest purgatio. Et dedi aliquando mulieri, non facilè mobili aliàs, ʒß. resinæ jalappæ cum vitello ovi solutæ, unde illa ultra 10. vices vomuit, unâ cum aliquot secessibus.

Indicatio tertia absolvitur internè absorventibus, potissimum Martialibus, spleni suomodo dicatis, & hinc tartareis volatilibus penetrantibus, & solventibus appropriatis. Præ omnibus in his splenis affectibus commodè emplastrum de ranis Vigonis cum Mercurio duplicato in subjectis robustioribus leni imponitur, sive tumeat sive non.

Scopus quartus requirit specifica, quæ inter eminent antimonialia sulphurea fixa & cinnabarina, ceu mediæ consistentiæ, v. g. cinnabaris nativa, à Cratone magnes epilepsiæ vocata, &c. In quorum tamen usu observandum, quod cum salibus volatilibus juncta sint convenientissima in epilepsia idiopathica magis & accidentali, non æquè in habituali: quibus specificis semper laudanum

Tom. II. Pars 2.

opiatum aliaque opiata correctâ addantur. Sed fiat cum distinctione: nempe in epilepsia habituali Paroxyfmi recurrunt nunc vagè, nunc periodicè: si in habituali periodicè, aut certis temporibus, aut etiam certis imminentibus signis, aut aliis symptomatis notabilibus recurrat Paroxyfinus, tunc commodè Paroxyfmo instante, i. e. mox ante ejus insultum, specificis opiata, & anodyna maritari possunt, tali enim modo per specifica sistitur Paroxyfinus, & per opiata impetus spirituum tollitur: si autem epilepsiæ habitualis Paroxyfinus vagè affligerit, & sine speciali symptomatum certorum prænuncio, opiatis non est locus, cum tales ægri ad melancholiam inclinantes eorum usum magis stupidi reddi soleant.

Sed quæritur: An etiam antimonium crudum in substantia assumptum in epilepsia conveniat? Affirmat Ludovici, idque ex relatione alterius, qui ad gr. ij. vel etiam iij. cum aliis præcipitantibus combinando propinavit sine vi emetica. Notum est, antimonium quacunque ratione per ignem tractatum, nunc tam in substantia, quàm in infuso, nunc emeticum, nun catharticum, nunc sudoriferum esse; sicut etiam ipsum antimonii fumum esse cathartico-emeticum, testantur M. A. N. C. *Ann. 3. Observat. 270.* nec mirum est: nam fumus ille nil aliud est, quàm flores antimonii. Interim, quemadmodum illud in substantia ad gr. ij. vel iij. exhibitum parum & sine sensibili effectû operatur; ita quod in excessiva dosi datum sensibilem effectum habiturum sit, dubium non est. Nam etiam antimonium crudum in aqua decoctum aliqualem vim laxandi exhibet; unde puto, vino Rhenano infusum, illud similiter laxaturum esse. Aliàs antimonium crudum in substantia exhibere, minùs consultum videtur; ut ut enim ex minera illud fustum, sulphure suo volatili maximam quoad partem privatum sit, tamen adhuc metus est, ne aliquid veneni arsenicalis connexioni sibi habeat. Antimonium crudum equidem in majori dosi brutis exhibitum, diversimode ea afficit, dum porcos mirè saginat, & lardo pingui circumvestit, imò contra varos vel lepram porcorum, porcis pro dosi ad ʒß. fursuribus admistum, laudatur; non secus ac Hippiatri ejusdem ʒlj. ad ʒiijß. in haustu vini equis propinant, quos hinc exercendo cursu ad sudorem disponunt, liquidaque per alvum eos ejicere faciunt; item hujus ʒj. avenæ permista equos leviter purgat: Vid. *Transact. Philos. Anglic.*

Præceteris tamen in nostro casu, quando per consensum partis alicujus affligit

[Pp 2]

epi-

epilepsia, tam adultos, quam infantes, omnibus specificè commendo viscous, speciatim corylinum, pòstiliaceum, & tandem quercinum; Dantur tamen in magna dosi à 3ß. ad 3j. in forma pulveris continuato usu. Ita namque ante triennium experimentum feci in rustica, virgine adhuc, quæ ab octo annis quotidie aliquoties Paroxysmum epilepticum incurrerat, cui proin, cum ritè fluentibus mensibus, ordinavi vomitorium generosius, quò ipso varia & copiosa excrevit: pòst experimentandi gratiâ viscum corylinum ei exhibui, quo ter vel quater repetito ita cessarunt Paroxysmi, qui aliàs mediam horam durabant. Hæc Virgo, quoties instare Paroxysmum concluderet, toties prodromum illius in latere sinistro sentiebat, & quoties percipiebat eundem recurrere, sumebat hunc pulverem, *damit sühlete sie / wie wann es niederdrückte.* Utut autem ab usu hujus pulveris ultra tres menses sanata extitisset, postmodum tamen supervenit morbus malignus contagiosus quo interiit. Similiter biennium est, ex quo offerebatur mihi pauperula filia virgo, quam à tenera ætate usque ad 17. annum epilepsia afflixerat; huic itidem dedi, præmisso vomitorio ex tartari emetici gr. vj. pulverem hunc visci corylini, hinc pòst hunc pulverem, sub introitum lecti assumptum, incepit ah hora 9. vespertina usque ad horam 2. pomeridianam diei sequentis dormire, quod miratus fui. Aliàs dicta ægra erat simul melancholica, & alternis diebus ferox, semper tamen per plures menses sine omni ferè somno, unde epilepsia & melancholia augebantur, surgebat tamen ab hoc remedio mitis cum euphoria. Utut autem melancholica adhuc esset, tamen, continuato pulvere, cessabat ita epilepsia, ut saltem omni novilunio rediret, ipsa plus minus melancholica existente. Melancholia autem illa, existente epilepsia miti, incrementum sumpsit, adeò ut subinde maniaca redderetur, ex qua etiam postmodum ex superioribus ædibus desiliendo, fracto cranio, interiit. Sic D. *Schleich* per literas mecum nuper communicavit, se pulvere visci corylini mulierem epilepticam ab aliis Medicis relictam, feliciter curasse.

Juxta hunc viscum laudo etiam stercus pavonis, quod uti ad vertiginem, ita etiam ad epilepsiam, singularissimum est remedium.

Ligatura hypochondriorum non semper laudanda; nam qui positivè dolent in hypochondriis, non possunt eas ferre ob dolorem, si autem epilepsia afflixerit, per consensum abdominis, & quidem ex inferiori mesenterii plexu, ex utero, &c. fomes epilepsiae assurgere videatur, tunc optimæ sunt.

Sic clysmata in ægra nostra quoque sunt proficua, acriora tamen & acuata cum aqua benedicta, vel syrupo emetico ex antimonio indupla vel tripla dosi.

In Paroxysmo salia volatilia macra, v. g. spiritus salis ammoniaci, spiritus cornu cervi purus, &c. naribus applicata, multum habent in recessu: nam volatilia oleosa non semper & viri & mulieres possunt ferre; qui verò ea possunt ferre, potest ipsis addi castoreum. Modus est talis: infunditur scilicet spiritum salis ammoniaci aut cornu cervi Castoreum, & indatur vitro longi & angusti colli, quod digito clausum admoveatur candelæ, ut probè incalescat spiritus, & vapor penetrantissimus naribus excipitur; singulare etiam est remedium pro excitandis hysteriis. Vomitus autem in Paroxysmo epileptico est quidem optimus, sed difficillimus: præstat potius omninò desistere, & jam incrementis Paroxysmi impetum sustinere; nisi in epilepsia diuturniori, & casu desperato; quin potius frictionibus & litibus excitentur ægri, qui etiam in apoplexiæ Paroxysmo graviore sunt optimi. Si non cessare velit affectus, potest concedi foniculus.

CASUS XLVII.

EPILEPSIA à CONTUSIONE CAPITIS.

*M*ulier consistentis ætatis in dividenda hereditate materna cum fratre insignia fovet dissidia, quæ in tantum exacerbantur, ut tandem à fratre ebrio misere verberibus tractaretur, qui imprimis caput pavimento allidit, & lapidibus istud contundit, pedibus eam conculcat, & imprimis hypochondria ejus calcitrando petit (*stößt sie mit Füßen an die Seiten*) ipsa exinde insigniter debilitata, domum deferretur, tractatur à Chirurgo, per noctem ita jacet semidormiens & vigilans, insigniter loca contusa dolent, ante meridiem supervenit vomitus biliosus & secessus cruentus sanguinis grumosi. A meridie caput tumere, artus, manus, pedesque graviter convelli incipiunt, oculi contorquentur, labia hinc inde deducuntur. Unde ab adstantibus perterritis vocatur Medicus pro cura, qui accedens caput ægre tumidum deprehendit, eamque cruenta exspuentem observat. Pulsus est celer, frequens, vehementia & magnitudine moderatus.

RESOLUTIO.

Fratrum gratiam raram esse, præsens, hocce triste satis visu & horrendum auditu spectacu-

lum ostendit, propter meum & Tuum modò enatum. Affectus verò ex tali edia enatus uno nomine vocatur Epilepsia nata à sanguine grumoso, intra crani-ollectedo, effuso, propter contusionem ex-um,

Pars affecta à causa proxima est principium nervorum, cujus à sanguine grumoso tionem sequitur epilepsia.

Pars affecta verò à causa remota sunt um cum membranis contentis, à con-ne læsæ, & sanguinem stillantes, qui nescit successivè. Vomitus saltem est otoma secundarium, insequens affectas ibranas cerebri, adeoque ipsi accidenta-pervenit.

Pars affecta verò ratione epilepsiae sunt : nerveæ, propriè tamen musculi ex his : contexti.

Causa proxima hujus epilepsiae materialis extravasatus sanguis, in & circa membra- cerebri stagnans, & sui hostili præsentia, & acido vellicante, ad epilepticas con-ones principium nervorum cogens.

Causa proxima verò epilepsiae formalis apidus atque impetuosus spirituum ani-um motus : quando enim à causa aliqua rna, ictu nempe fortiori, irritantur par-erveæ, statim in loco irritationis subtilis terrima fibrarum motio & vibratio ori-quæ etiam usque ad cerebrum continua-

hinc quia unà cum motis fibris etiam i simul moventur, & consequenter et- i spiritus impetuosè in musculos partium unt, hinc quamprimum ad caput ægræ ræ perveniunt, mox tremere incipit, ad sculos verò oculorum delati spiritus, eos è torquent, simul ac etiam alia in mem-manus nimirum & pedes cum impetu flu-eadem mox graviter convellere incipiunt. rritatione autem membranarum nervo-um stomachi, quia una eademque mem-na & labia & ventriculum investit, mul-riam labiorum hinc inde deductionem de-o.

Causas remotas quod concernit : partim amationis capitis, partim etiam epilep-e supervenientis nullæ aliæ in hoc casu in-eniuntur, quàm injuriæ istæ externæ, nem-e allisio capitis in pavementum, ejusque cum ipidibus gravis percussio, ut & horrenda um pedibus conculcatio, & imprimis hy-chondriorum calcitratio.

Ut tandem etiam recto quasi tramite ad rognosin hujus horrendi casus progredia-ur, dicimus malum hocce plurimis scate-periculis; quantitas enim sanguinis & qua-as loci, nempe capitis, in quo effusus uis, maximè malum periculosum effici-t : quando enim maturè sanguinis grumi

non statim per convenientem diaphoresin vel alia resolventia discutiuntur, metus subest, ne in lethale capitis abeat empyema.

Methodum verò medendi quod attinet, & remedia huic affectui utilia : cò respicien-dum, ut

1. grumi sanguinis extravasati per con-venientia vulneraria vel alia resolventia dis-solvantur, & per convenientes vias quanto-cyus evacuentur.

2. ut epilepsiae simul insigniter urgenti appropriatis succurratur.

Pro priori ergò scopo clyisma imprimis præscribatur : hinc vena maturè secetur in brachio. Ad sanguinis autem grumosi reso-lutionem conveniunt imprimis vulneraria quædam, in specie rubia tinctorum, & hinc paratum *Crapp* / in aceto ebullitum, ut & symphytum majus, scabiosa, hypericon, &c. v. g.

R. Rad. rubie tinct. præp. 3ß.

Ebulliat in l. q. *Aceti*:

Colatura capiatur pro 2. dosibus, & æger in lecto se probè contegat, sudoremque expectet.

Vel si cui sapor iste minus placeat:

R. ▽ Cherefol. ʒij.

Acet. vini acerr. ʒß. ad 3vj.

Lapill. ser. pulv. ʒi.

ʒii diaphor. ʒj.

Syr. card. bened. 3vj.

Misc. capiatur cochleatim.

In specie pro secundo scopo :

R. ▽ Ceras. nigr.

lil. convall.

Meliss. aa. ʒj.

Acet. rutac. 3vj.

Lapill. ser. præp. ʒj.

Cinn. ʒii scrup. j.

⊖ vol. succin. gr. xij.

Syr. fl. Tunica 3vj. M.

Item juxta clysmata repetita etiam:

R. ▽ Cherefol. ʒj.

Ceras. nigr.

lil. convall. aa. 3vj.

Ess. fl. hyperic. ʒß.

*⊖ *ci ʒj.*

Lap. ser. præp. ʒß.

Syr. de beton. ʒj.

M. pro Potione.

Capiatur cochleatim.

R. ▽ Menth.

Cherefol. aa. ʒiß.

Acet. vini ʒj.

Lapill. ser. præp. ʒj.

Corall. rubr. præp. ʒj.

Cinn. ʒii ʒß.

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. Card. bened. 3vj.

M. pro 3. dosibus.

[iPp] 3

R. Lapill.

R. *Lapill. 3r. præp. ʒj.*

ʒii diaph. scrup. j.

Myrr. el. gr. xij.

Laud. opiat. gr. ij.

M. pro 2. dosibus.

In victu utatur crebrius cherefolio minutim inciso in jusculis, pro multiplici scopo:

C A S U S XLVIII.
APOPLEXIÆ GRADUS
LEVISSIMUS,
 seu
INSULTUS APOPLECTICUS,
HABITUALIS
 tamen.

Vlr in decreſcente ætate, & ultra 70. annos jam conſtitutus, aliàs ſanus, ſed inordinate, minusque regulatæ, utut non lautæ, diætæ adſuetus, aliquando cum ſociis extra urbis portas ambulans, ſubitò corruit, ſine ſenſu & motu, totus pallidus; ab adſtantibus denuò excitatus, quid ſecum actum ſit? ferè neſcit; debilitatus tamen admodum, & ob anhelitus difficultatem aliquoties deſidere coactus, denuò intra civitatem revertitur. Interjectis aliquot ſeptimanis, cum interea ſemper commodè ſe habuiſſet, templum petens ſimili ratione ex improviſo corruit denuò, ſed baſanis & aquis analeptiſis reſectus, domũ lento gradu repetit. Aliquoties hoc accidit denuò, donec usq; eò ingravēſceret malum, ut extra privatos parietes vix liceat ipſi verſari, quin ex levi corporis motu, mox & omnimodà anhelitus interceptione, & ſimultaneà caligine oculorum affectus, forti impetu non tam corruere, quàm proſterni videatur, ſenſu & motu carens: hinc & tabernam ſuam mercatoriam aliquando ingrediens, ex ſimili corporis proſtratione, naſum tam fortiter menſe allidit, ut mediam ejus oſſeam ſubſtantiam ſine ſui perceptione doloroſa perſtringeret.

R E S O L U T I O.

Affectus eſt inſultus apoplecticus. Verùm cum hujus multiplices ſint differentiæ, eæque graduales, ratione cujus nunc magis nunc minus fortis eſt: proin hic affectus ſaltem eſt leviſſimus gradus apoplexiæ; & quidem apoplexia non tam accidentalis quàm habitualis, idiopathica & eſſentialis, quæ ſæpiùs recurrit, & fomitem altiùs radicum habet in corpore, & quidem ratione ſubjecti non tam cerebri, quàm cerebelli vitio enata.

De cætero præmonendum quoque, in præſenti caſu affectum apoplecticum non vi-

deri ſolitarium eſſe, ſed comitatum forti ſyncope; quæ ambo ſymptomata equidem in multis conveniunt, & ferè ſemper conjuncta obſervantur, ubi ſyncope eſt ſubitanea virium vitalium obnubilatio & ſuſſlaminatio, in qua pulſus & reſpiratio primariò læſa ſunt; ſicut contrà repentina virium & ſpirituum animalium, item ſenſus & motus interceptio, apoplexiæ nomine venit, in qua pulſus plus minus adhuc præſens eſt, reſpiratioque illæſa. Scilicet æger noſter ingruente malo affligebatur primitùs reſpiratione interceptâ, hinc circa cor anguſtias inſignes percipit, hinc ſcotomia, & tandem corruit: adeòque principium mali ſenſibilis videtur eſſe interceptus cordis motus, & ceſſans ſanguinis circulus; hinc ſpiritus vitales, & conſequenter etiam animales, deficiunt influere, & poſtmodum occasione cerebri & ſpirituum animalium affectorum primò ſyncope, poſt inſultus apoplecticus, ſupervenit. Motus verò cordis, ſanguinis per pulmones & ſpirituum, interceptur denegatis ſpiritibus cor moventibus.

S U B J E C T U M

Itaque Subjectum primarium non eſt tam cerebrum, quàm cerebellum, ſpiritus pro motu cordis non transmittens.

Cauſa proxima ceſſantis motus cordis & ſanguinis per pulmones hoc loco videtur eſſe influxus ſpirituum animalium denegatus; ab his enim quilibet motus naturalis primos inſtinctus accipit, adeòque in illis ſenſibilium omnium objecta terminantur, indeque cognoscendi actus ſiunt: id quod proprio ſuæ expansionis motui indefeſſo & ordinato adſcribendum puto; hinc ſpiritibus animalibus cor moventibus interceptis, & ſimul reſpiratione ſublata, ſyncope, & conſequenter tandem inſultus apoplecticus perfectus, ſupervenit. Imò ſub primo paroxyſmi impetu aliquid convulſivi concurrere videtur, dum æger non tam corruit, quàm proſternitur: ſcilicet ceſſante cordis motu, & urgente reſpirationis defectu, in univerſo corpore moleſtia inſignis, aut ſaltem præternaturalis irritatio exoritur; unde ſpiritus in cerebro impetu tacto quaquaverſum prouunt, & ita corpus convulſivo impetu proſterni faciunt. Principium ergò mali in cerebello hæret, cujuſmodi ſyncopes, jam olim Carolus Piſo Tract. de Colluvie ſeroſâ mentionem fecit ubi narrat, eam eſſe ex nervo cordis affecto; ſicque veterum ſyncope cardiaca cum apoplexia à quamplurimis confunditur, nata nempe ex ſubitanea ſtaſi ſanguinis in pulmonibus, nunc vitio ſanguinis, nunc vitio cordis, ſanguinem non moventis, quæ ſyncope cardiaca in quamplurimis cum apoplexia con-

Noſtra

Nostra ergò apoplexia ex vitio cerebelli quod prævio cordis motu intercepto tantam perfectam apoplexiam infert, erit de re apoplexiarum privativarum, nempe negato spirituum ex cerebello vel irradiatione motu; seu ex causa materiali propria.

Quoad causam materialem remotam, tuum è cerebello irradiationem impetum ea hinc imperscrutabilis est; potest per illam esse vitio conformationis, aut vici sanguinis serosi, aut lymphæ, aut denique spirituum; sed de nullo horum certa est haberi cognitio ex casu. Sub motu enim corporis, sub quo sanguis concitatur, & spiritus in impetum feruntur, nascitur paroxysmus; de causa remota tam nulla est conjectura. Potest quidem suspicio de materiali lymphæ vitio, irros cerebri; sed quod lymphæ non possit vitiosa, probat subitanea paroxysmi cessatio. Potius aliquid vaporosum, seu tu, juxta Willisium, spiritus animales, & cerebellum quasi convellens, advertitur; hincque tales ægri non tam curare, quam prosterni, & impetu simul in convulsivo affligi videntur.

P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin: in nostro ægro est periculosus; ex crebrius enim repetitis multibus fortior tandem apoplexia metuenda est, quæ vel ex improvise ægrum jugum vel in paralyin, vel paraplegiam alterius terminat, si mitior fuerit.

C U R A.

Quoad Curam hanc ita institui: scilicet in æger tempore hyemali de hoc malo afflicte conquereretur, extra paroxysmum, mensis recidivam, de præservatione potissimum vellet esse sollicitus, ipseque de causa nota planè dubius hærerem, propterea saltem pro præservatione remedium, omnibus suis conveniens, neutri tamen nocens, ordinandum duxi; hinc ad volatilia accessum, adeoque prophylaxin attendens, cum ipsam ad vernum tempus differendo, ordinavi:

℞. *Θ*ci*

C. C. essentif. aa. drachm. ij. M.

Capiebat quotidie bis vel ter gutt. 30. ad 2. manè in vehiculo calido, à meridie autem & sub introitum lecti in frigido.

Unà cum hoc ordinavi sequens balsamum nervinum:

℞. *Ol. destill. succini* drachm. j.

Macis

Caryophyll. aa. scrup. j.

Mista subigantur cum *Ol. expr. nuc. mo-*
nate in consistentiam Balsami: quò manè

& vesperi tempora, vertex & nucha, cum regione stomachi inungebantur.

Sic ab his medicamentis paroxysmus non tam crebrò nec atrociter affligebat.

Appetente verò tempore vernali, præmissa digestivo salino, ordinavi Purgationem Mercurialem, ex extracto panchymagogo Crollii, Mercurio dulci, & extracto trochiscorum alhandal pro stimulo; & sic ab horum usu pluries excrevit, & cum egregio levamine. Hinc istam purgatione præmissa ordinavi internè præservativè electuarium sequens:

℞. *Ficum pingue minutim incis.*

No. iv.

Sem. sinapi contus. ʒj.

Card. pulveris. ʒij.

Cum s. q. *Syr. fl. Tun. & lil. convall.* s. Electuarium.

De quo omni manè capiat quantitatem castaneæ majoris, jejuno stomacho, desuper sorbendo quantum placet de jusculo calido.

Externè autem simul sequens emplastrum, capiti rasò applicandum, præscripti:

℞. *Empl. de ran. Vig. c.* ʒio q. s.

Malaxa c. s. q. *Bals. Peruv.* in vitello ovi dissoluti, induc super alutam, fiatque Emplastrum cephalicum absque syndone, continuo sub mitella parva gestandum, cum usu præfati balsami.

Sic hætenus intra menses tres nil sensit, & benè se habuit, ut spes sit, continuato usu horum remediorum apoplexiam imminuentem præcaveri posse. Et cum corpus esset exsuccum, macrum, rugosum, hinc inutilem duxi fonticulum, quem, si habitior fuisset, aliàs in brachio suasissem, vel vesicatorium nuchæ aut pone aures admovissem. Semen autem sinapi egregium est remedium in affectibus soporosis pro præservatione, quod etiam matutino tempore assumptum in apoplexia & vertigine levamen affert. Imponendum autem emplastrum curavi malaxari cum Balsamo Peruviano, in vitello ovi dissoluti: Etenim balsamus hic per se est admodum viscosus, glutinosus, & peripheriam corporis incrustat; sed cum vitello ovi dissolutus fit dilutior, imò maximè acris & penetrans, qui aliàs est acriusculus. Insuper imperavi emplastrum hoc de ranis Vigonis cum Mercurio imponi calvitiei capitis, quod neminem terreat: Mercurius enim vivus in cephalalgis, cephalæis & hemicraniis, ubi suspicio est, causam peccantem materialem firmitus esse impactam, miræ est efficacis, dissolvens istas mucilagines, & penetrans quæcunque glutinosissima obstacula, mihi que est in frequenti utu in his casibus. Potest nunc

nunc malaxari cum oleo destillato succini, nunc oleo destillato foetido tartari.

Cæterum in paroxysmo, quoad excitationem, non solis externis volatilibus, scilicet spiritu salis ammoniaci vel urinæ, naribus applicandis, debet insisti, sed tutò etiam liquida blanda & spirituosà volatilia subinde possunt infundi, imò debent; caute tamen: utut enim ejusmodi ægri positivè deglutire nequeant, tamen spontè talia liquida defluunt, unde etiam merus suffocationis nullus est, modo leniter instillentur, aut cochleari paulò profundius ea infundantur, ut ita asperam arteriam prætervehantur. Quodsi autem excitari nequeat apoplecticus, tunc demum ad sternutatoria datur accessus: Item frictiones linguæ & palati instituantur, partim ut amissa vox & deficiens loquela restituatur; sicut in aphonia exterius larynx & aspera arteria tractanda sunt, quò illius paralysis cesset.

Venæsectio in nostro casu locum non habet repugnante subiecti conditione.

Potio ægro excitatò pro corroborandis spirituum expansionibus, sequenti modo præscribenda est:

℞. ▽ *Menth.*
Lil. convall. aa. ʒij.
Cinnam. ~nos. ʒvj.
 ~ *Ceras. nigr.* ʒiij.
Liqu. C.C. succin. ʒ. ij.
 ⊕ *vol. cran. hum.* ʒj.
Ol. dest. Cinnam.
Caryophyll. aa. gtt. iij.
Syr. salviae, vel *fl. tunicae* ʒj.
 M. f. Potio.

Quæritur: An hic vomitus in paroxysmo institui potuisset? Resp. Vomitus post paroxysmum mox institutus, dum ad se redire videtur æger, esset optimus: sed repugnat fiendi modus; quia paroxysmus semper incipit cum sensibili respirationis interceptione, adeoque metus est, ne vel in vel declinante paroxysmo, forti isto vomendi conatu, renovetur, vel interceptio anhelitus intendatur, atque suffocatio immineat: Et nisi hæc obstitissent, vomitorium in declinatione paroxysmi fuisset optimum. Adhæc, quia vomitoria aliàs ordinariò in hujusmodi subiectis in majori dosi præscribenda sunt, & ordinaria eorum dosi nil operatur, propter insensibilitatem partium; hinc cautus est in nostro casu illorum usus. Aliàs vetulæ, aliquando apoplectico insultu correptæ, præscripsi tartari emetici grana sex cum aqua cerasorum nigrorum infundenda, & felici operatione ipsa facilè paroxysmo levabatur. Loco ergò vomitorii, si paululum præsertim protrahatur paroxysmus; potius clyσμα acre & fortiter stimulans nostro ægro convenit in

paroxysmo; partim decocti substantiam infundendo cum s. q. syrupi de succo salviæ; partim magma ex decocto clysmatis residuum, seu species ex decocto clysteris residuæ cataplasmatibus instar abdomini supersternere jussi. Species ingredientibus sint colocynthis, aut infusum antimoniali, in specie nicotiana.

Post vomitum crebrius de vino hauriat, in quo vegetabilia nonnulla aromatica, alias nervina & cephalica dicta, præsertim rosmarinus, infusa sunt.

Paroxysmo ita finito, aut jam declinante penitus, ubi reliqua fuerint præstita, nec aliquid obstat, consultum est, sudorem imperare & expectare, eumque interdum repetitum, ubi præter remedia spirituosà & volatilia v. g. spiritus volatiles ad 30. guttulas, quædam fixa, speciatim cinnabaris antimoni, item aurum diaphoreticum Poterii, sunt optima, quia uti febris, sic apoplexia, sine sudore non tutò curatur. Capiantur in vino aromatizzato, aut potius in sequenti vehiculo:

℞. ▽ *fl. salv.* ʒij. l. iij.
Lil. convall. c. V. ʒj.
 ~ *Ceras. nigr.* ʒvj.
Syr. de beton. ʒiij. M.

Extra paroxysmum potest præscribi talis Pulvis digestivus exspecificis:

℞. *Tart. Plat.* scrup. j.
 ⊕ *s. vol. C. C.* gr. v.
succini gr. iij.
 M. f. Pulvis: D. in duplo.

Hinc usurpetur purgatio per inferiora.

Semen sinapi mistum cum calce viva, affundendo aquam simplicem, destillatione exhibet spiritum volatilem urinosum singularem, qui totam sinapi crasin obtinet, quique pariter quotidie usurpari potest: nam planè egregius est in soporosis affectibus.

Quodsi æger corpulentior fuisset, tunc fonticulum vel etiam vesicatorium in nucha aut pone aures extra paroxysmum adhibere suasissem, vel præservandi gratia, vel in paroxysmo pro irritatione. Verùm hic non suadentur propter rationem dictam.

CASUS XLIX.

ARTHRITIS VAGA SCORBUTICA.

*M*ulier floridæ ætatis, corpulenta, succi plena, gulosa, temperamenti sanguineo-ferosi, aliàs sana, conqueritur de lassitudine omnium artuum, nonnihil lancinante, quam aliquot abhinc diebus insequitur tumor cruris dextri circa talum, item circa genu, dolens & lacerans insigniter, concolor tamen partibus vicinis, motum cruris quemvis inhibens; adest

adeſt ſimul calor totius præternaturalis, moderatus tamen, & ut vocant, vaporofus, unicum madore corporis continuo, pulſuque magno, celeri, frequenti, molli, quaſi undoso; urinae craſſe, turbidae cum ſedimento lateritio. Sequenti die anxietates præcordiorum ſuperveniunt, tormina & tumultus abdominis, reſpirationis difficultates, eademque veſperâ & alterum crus ſimilimodo ſimilibusq; in locis cruciari incipit. Tumores circa artus ingentes, admodum dolentes. Nox inquieta, manè peſſime ſe habet, in brachio ſiniſtro vage ſeu variis in locis torqueri incipit, manus tumida admodum, digiti inflati, immobiles, ſine alia ſenſibili alteratione. Agra eſt anxia, ſubinde animo deficit, caput admodum dolet, ipſa ſudore calido madet, nullo modo ſe movere valet, quia quolibet, tantillo etiam licet motu, dolores exaſperantur. Appetitus nullus, alvus clauſa, ſitis intenſa, &c.

RESOLUTIO.

Affectus eſt Arthritis vaga ſcorbutica, apparenter ad arthritidem futuram fixam inclinans, quæ articulos ſpeciatim occupat; cum vagâ quoque muſculares pariter ac articulares partes affligantur.

SUBJECTUM.

Duplex ſubjectum in hoc morbo eſt attendendum: nempe Radicationis, ratione fomitis ſeu cauſæ materialis, & Inhæſionis, ubi fomes materialis efficaciam ſuam & vim ſpeciatim exerit. Reſpectu ergo arthritidis vagæ radicationis ſubjectum eſt maſſa ſanguinea, dyſcrasia ſcorbuticâ affecta; ægrota enim noſtra eſt ſanguineo-ſeroſa: ſicut ſubjectum denominationis ſeu inhæſionis ſunt loca articulorum partibus nerveis, ſpeciatim tendinibus, cincta.

CAUSÆ.

Cæterum Cauſa hujus arthritidis vagæ ſcorbuticæ proxima materialis eſt ſal acidum vitioſum ſpecifici ſaporis, qui ſapor adhuc admodum intricatus eſt, quoad ſpecialem ſui explicationem. Interim hoc ipſum ſal quibuscumque reliquis partibus, tam continentibus quam contentis, ſine ſenſibili illarum læſione non eſt ſociabile, & ſpeciatim ſapore acido generali eſt partibus nerveis inimiciſſimum. Hoc ergo mediante lymphæ & ſanguine ſeroſiore ad loca nervea circa articulos advectum pungit, vellicat & lancinat, ibidemque rodendo dolorem, cum nutrimento partis proprio efferveſcendo, vel etiam fibras ſtringendo, hinc per accidens anguſtatis vaſis & poris ſtagnationem cauſando, tumorem & reliqua ſymptomata producit. Tumorem enim in talibus ægris ſuperveniens non eſt cauſa affectus articularis, neque præciſe oritur ex affluxu humorum, ſed

Tom. II. Pars 2.

potius eſt productum morboſum, inſequens dolorem; qui ſi abeſſet, partes non intumeſcerent, non ſecus ac denegata ſpina denegatur tumor. Porro tumor iſte nunc eſt calidus, nunc frigidus: In agra noſtra eſt frigidus oedematofus, partibus nempe vicinis concolor, **die falte Sicht**; ubi differentia non quaerenda eſt in humore affluente, ſed in acido rodente: quod ſi fuerit acius & volatilius, tumorem calidum rubicundum, eryſipelati ſimilem, inferit, **die hige Sicht**: contra ſi idem acidum fuerit mitius & temperati⁹, in ſpecie in ſubjecto magis ſucculento, tunc tumor ædematos⁹, vel ſi ſubjectum ſucculentum non ſit, partibus vicinis ſaltem concolor emergit. Atque hinc ratione iſtius acidi tumor eryſipelaceus longè atrocior dolore ſolet eſſe ſtipatus; ſicut e contra frigidus minus dolet, ſed diutius perdurat, & tardius curatur. Tumor ergo ſit, quatenus occasione doloris vellicantur & corrugantur fibræ, ſicque ſpaſmo afficiuntur, in parte affecta; unde humorum tranſeuntium motus & circulus impeditur, hinc eorum ſtagnatio & tumor. In his autem tumoribus jam factis non putandum eſt, eoſdem ex humoribus eò confluentibus præciſe oriri, ſed non parum forſan intenditur ab ipſo humore in parte ſtagnante per modum turgelcentiæ: quippe turgelcens ille cum acido peccante tumore ejulmodi mollem, & quaſi flatulentum ſolet inferre; quod de pluribus tumoribus poteſt dici. Acidi hujus vehiculum eſt ſerum, quod defertur cum lymphæ ad articulos, adeoque arthritici crebriori urina & ſudore optimè præſervantur pariter & curantur, illa quidem extra, hoc in Paroxyſmo. Noſtra agra continuo madet, habet pulſum undolum, qualis obſervatur in iis, qui ſudant: quo ergo magis ſudant, eò melius habent; ſicut e contra, quo minus ſudant tales, eò diuturnior erit morbus. Hinc etiam arthritici confirmati commodè per ſalivationem Mercurialem cæteris paribus tractari poſſe, annotat Kerkringius in *Obſervat.*

Medium ſecretionis hujus ſalis ſcorbutici ex maſſa ſanguinea eſt impetus quidam febrilis; nam agra, prægreſſa laſſitudine, patitur aliqualem calorem totius, utut moderatum & vaporofum, cum tamen præternaturalem, occasione ſuccorum in primis viis à debita craſi degenerantium, & vitioſe in ſe agentium, enatum; quem comitantur præcordiorum pathemata, hinc ſuperveniunt pulſus, calor, ſudor, & præcipitatio ſalis acidi, & protrufio ad articulos.

Nempe in omni articulari morbo doloroſo eoque tam fixo quam vago

1. Semper obſervatur febricula, plus minus intenſa, à principio morbi uſque ad ſtatum perdurans, ſub quo iterum evaneſcit.

[Qq]

2. Sem-

2. Semper & ordinariò tam veram quàm vagam arthritidem pathemata quædam circa primas vias solent præcedere, aut comitari, adeò quidem, ut quis, si sine causa manifesta cessat appetitus cum nausea, sudore suppresso, certus sit de Paroxysmo instante, utut in statu successivè redeat appetitus, urgentibus intereà doloribus.

Febris hæc est varia: est enim nunc continua lenta, febris catarrhali similis, omnique vespera exacerbatur; nunc instar febrium intermittentium, quæ nunc cum, nunc sine notabili horrore increfcit.

Insuper observandum, quod arthritis nunc sit fixa, nunc vaga: arthritis vaga scorbuto est ptopria; fixa tantum est sine scorbuto: omnis tamen fixa in principio ferè plus minus vaga observatur; sicut contrà vaga confirmata tandem fixa evadit. Et quò fixior est arthritis, eò facilius postmodum irritatur, & difficilius curatur; e contra quo magis vaga, eò difficilius irritari potest, curatu tamen facilis existit. Utriusque autem differentie ratio consistit in eo, quod in vaga acidum scorbuticum peregrinum saltem se insinuet superficialiter in partibus nerveis; e contra in fixa penitus istis infixum hæreat, nec post Paroxysmum finitum spicula talia instar spinæ locis sint infixa, hinc quæta illa extra Paroxysmum levi occasione, terrore, ira, &c. motu partes in motum ciere, & etiam sine febrili impetu Paroxysmum arthriticum renovare possunt. Conf. Rhumelius *in scriptis*, qui distinguit arthritidem in hæreditariam, nodosam & solutam: ac hæreditariam vocat, cujus character à parentibus implantatur; nodosam autem, ubi sinovia ab acido podagrico primò in cretam, postmodum in corpus calciforme quasi coagulata conspicitur; sicut tandem solutam, in qua acidum adhuc in lymphæ fluctuat, & partibus nondum infixum est. Harum nodosam & hæreditariam simpliciter incurabiles esse dicit; solutam aliquo modo curari posse, putat.

Quoad Causam occasionalem: ex casu patet, ægram fuisse gulosam, unde ex chylicatione læsa, & inde orta cruditate acida symptomata in primis viis atrocia, anxietates nempe præcordiorum, abdominis tormina, appetit^{us} prostratus, alvus clausa, &c. deducuntur, haud tamen exclusâ illâ causa universali Willisii *Tr. de Scorbuto*, aëre scilicet.

P R O G N O S I S.

Arthritis præfens vaga in se est sine periculo, modo ritè tractetur; aliàs metus est, ne rigiditatem aut contracturam membrorum circa articulos inferat propter acidum corrugans partes nerveas vel coagulans sinoviam, hinc immobilitas membrorum; unde

etiam interna, quæ peccans acidum concentrant, figunt, repellunt, &c. vitanda.

C U R A.

In Paroxysmo hæc Indicationes locum habent;

1. Succorum in primis viis effervescencia, adeòque hinc natus impetus febrilis, appropriatis absorbentibus cum diaphoreticis compescatur, præsertim cum madida semper sit ægra; propter diaphoresin enim Paroxysmus fit mitior, quò magis sudant, eò citius cessat malum, & minus torquentur.

2. Symptomata circa præcordia & primas vias appropriatis volatilibus tollantur.

3. Dolores leniantur, & tumores artuum resolvantur & discutiantur, acidum rodens, tam internis quam externis, moderate anodynus, removeatur.

Hinc præmittantur, si opus fuerit, venæsectio & clysmata, quæ hoc in casu, ubi murmura abdominis, & præcordiorum symptomata obvia, sunt perquam proficua, applicentur: quibus, si aciora velimus, qualia in nostro casu requiruntur, addatur ℞j. ad ʒß. olei destillati terebinthinæ. Vel, si adsit Indicatio, etiam pulvis laxativus ex tartaro vitriolato cum aliquot granis scammonii sulphurari vel extracti trochiscorum alhandal propinetur. Potio passulata scorbuticis conveniens est. Antimonium diaphoreticum cum resinis junctum est egregium, liquor terræ foliatæ tartari, cum dimidia parte spiritus salis ammoniaci mistus, dosi gutt. 30. 40. 50. &c. dat egregium digestivum.

Istis præmissis, pro primo scopo conveniunt pulveres ex arcano duplicato Mynsichti, antimonio diaphoretico, bezoardico minerali, cinnabari antimonii aut nativa, auro diaphoretico, &c. semper insistendo madori, & continuando tamdiu, quamdiu nempe durat principium morbi, & symptomata febrilia sunt præsentia.

Pro secundo scopo adhibeantur volatilia, v.g. spiritus salis ammoniaci, carminativus, lumbricorum terrestrium, tartari, cochleariæ, &c. unà cum repetito clysmatum usu usurpandus est. Volatilia autem non usurpentur, nisi præmissa fuerint salia fixa, aut terrea absorbentia, sal acre scorbuticum temperantia: aliàs ex horum concursu cum sale scorbutico phlogoses, effervescencia & similia solent observari. Cicuretur ergò acidum illud per Martialia, figatur per alcalia fixa, per terrea & marina, temperetur per arcanum duplicatum, tunc ad volatilia fiat accessus.

In doloribus spasmodicis scorbuticis & hystericis præscribatur sequens potio.

℞. ʒ.

R. ▽ *Menth.*

Puleg. aa. ʒiʒ.

Ess. Castor. ʒiij.

Liqu. C. C. succin.

~ *Θamm.* aa. ʒj.

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. cort. Aurant. ʒʒ. M.

Tandem pro tertio scopo usurpentur volatilia interna, & externa discutientia, moderatè anodyna. Spirituosa externa ut partibus dolentibus affricata, utut bona sit, omnibus tamen non conducunt, quia non rarò acidum quietum in motum concitando Paroxysmum vel revocant, vel dolores exasperant, forsàn propter effervescentiam in causa materiali peccante in parte affecta. agis conducunt paregorica blanda & lumicalia. Sic enim hætenus curavi virum, qui habuit dolores arthriticos in genu, cum quali rubore erysipelaceo, cui optimè infert emplastrum de spermate ranarum, in copioso saccharo Saturni mistum. Præritâ septimanâ cum denuò & optimè ambulare posset, pro spina parti infixâ evellenda dinavi aquam arthericam ad extrâ, cum spiritu salis ammoniaci mistam, ut hujus illinitione Paroxysmus præcaveretur, optimeque bebat per quinque vel sex dies: sed ecce! usu hujus spiritus recrudescere Paroxysmus, & continuato spiritu semper intensior bat, unde denuò emplastrum diaphoreticum jussi applicandum. Adeò ergò ubique idiosyncrasia respicienda.

Extra Paroxysmum:

Curato verò sic Paroxysmo, sub universali declinatione propinanda remedia ex pino, vel potius pinastro, quæ est genuina arbor scorbatica & articularis. Præfertur tamen essentia pini decoctum strobilorum pini in ana cerevisiæ & aquæ communis simul, g. ita: R. horum strobilorum ʒʒ. ad minimum; coqu. in aquæ & cerevisiæ ana Mens. ʒ. medietatem, additis sub finem passulis pro rato sapore, pro dyscrasia sanguinis scorbutica emendanda, & balsamo artuum quasi revolvendo, & tandem sale scorbutico corrigendo. De colatura bibatur omni manè & vespere bonus haustus calidè, & expectetur semper desuper in lecto blandus sudor. Tinctura vitrioli Martis Zwelfferi est delicata, & imprimis mulieribus præscribenda.

Ad recidivam præcavendam tandem cura lactea ad aliquod tempus continuanda, & strictè observanda. Lac enim est optimum arthriticorum præservativum, & salithetico & scorbutico peccanti appropriatum: sed observetur legitimus usus. Usurandum autem

1. non nisi specificis & universalibus præ-

Tom. II. Pars 2.

missis, adeòque conveniet id pro colophone curæ, ne recidivet.

2. extra Paroxysmum saltem, quando nempe symptomata remittunt, & æger in statu apparenter sano est; quo tempore lacticia diu continentur.

3. primæ viæ priùs sint mundatæ, ut rectè Hippocrates præcipit; aliàs corrumpitur, & caseum hinc inde deponit in primis viis, hincque ex hujus viscido symptomata exasperantur.

4. stomachus adhuc valeat in digerendo, quo nempe lac in hoc individuo assimilari queat; secus enim in mucum degenerat.

5. in lac, sive usurpetur simplex, sive cum radice chinæ decoctum, instillantur aliquot guttæ spiritus salis ammoniaci, cochleariæ, vel alius scorbutici: vel simul usurpentur elixyr proprietatis, cum spiritu salis ammoniaci vel spiritu quodam scorbutico paratum. Quidam tamen hypochondriaco-scorbuticus ex usu lactis, cum radice chinæ decocti, in pertinacem obstructionem alvi incidit, non autem hoc contingit, si lacte solo cum spiritibus cochleariæ & spiritu salis ammoniaci usi fuerint. Adeò ergò probè observanda cuiusque idiosyncrasia erit.

Hinc singulis mensibus conveniunt pilulæ aloëticæ Glassianæ, quæ sunt substantia aloës mucilaginosa, separata à substantia resinosa, quarum hæc iners, imò internè usurpata visciditate suâ hæmorrhoides ciet; contra mucilaginosa substantia in aqua solubilis extrahi eadem potest, præsertim si menstruo illi addatur parum aceti scyllitici; ita pilulæ hæc ante coenam No. v. vj. vij. ad viij. assumptæ, altero die manè bis vel ter laxant alvum, & inter usuales in morbis chronicis primatum obtinent. Interim observavi ex harum usu in muliere plethorica, cui naturaliter menses deficiebant, pariter affectus hæmorrhoidales excitatos fuisse; sicut in aliis binis scorbutica & hysterica, quæ ex in turbas in primis viis passæ. Melius ergò specificatur mucilago illa, attenuando eandem per sal tartari, seu universale corrigens purgantium, quod ad aliquot grana menstruo aqueo additum extrahit mucilaginem melius, inspissandam dein, hinc etiam in pilulas redigendam. Vel etiam addatur massa pilularum earundem parum tartari vitriolati, v. g. illius scrup. j. hujus gr. xij. sic enim sine ullo symptomatum superventu in usum vocari poterunt. Unde qui eandem pilulas, chronicis affectibus laborantes, possunt ferre, usurpent eas omni menstruo spatio semel aut bis, pro scopo mundificandi primas vias, idque imprimis, quando morbus à priori radicitus evelli nequit, sed per epicrasin

[Qq 2]

eva-

evacuandus: extracto etiam hellebore nigri specificari possunt, ut fiant pilulæ usuales pro scorbutico - hypochondriacis; sicut pulvis rhabbarbari cachectico-ictericis; & qui viscidioribus succis abundant, illis addatur gummi ammoniacum in vino vel aceto solutum & inspissatum, vid. Ludovici *de sale tartari volatili*, & in *Pharmacia*.

Tandem diuresis non negligenda. Copiosior urinæ fluxus, ac largior sudor, imprimis manè, præservativa sunt Podagricorum: per urinam curantur extra Paroxysmum, per sudorem in Paroxysmo.

De salivatione instituenda vid. Kerkringius in *Specilegio*.

Arthriticam nostram curavi ita: Vocatus ad eam, cum esset *ivraçna*, gulosa, &c. hinc pro tumoribus, & febrili impetu mitigando, venæsectionem institui in brachio, cui aliàs erat adsueta, idque cum levamine factum. Neque enim hæc omittenda est in hisce casibus, præsertim ubi suspicio adest sanguinis vel suppressi vel coacervati, quemadmodum pariter largam venæsectionem in virgine simili modo affecta, & ultra dimidium annum menses non habente, institui.

Hæc præmissâ, propter symptomata præcordiorum præscripsi clystma emolliens, cum sale tartari paratum, cum levamine. Insequenti autem die ordinavi sequentes pulveres:

℞. *Arcan. dupl.* ʒ.

ʒii *diaphor.* aa. scrup. j.

Laud. op. ferm. gr. ij.

M. f. Pulvis pro 2. Dosibus.

Hinc ex hujus unius usu sudor copiosus erupit; cumque antea saltem crura dolore & tumore affecta fuissent, etiam brachia dolere & tumere incepere: interim continuavi hunc pulverem die altero in decocto strobilorum pini cum passulis parato; post verò superveniebant insignes passionēs hystericae, quibus confirmabar, hæc symptomata supervenire occasione impetus febrilis; hinc omisso decocto ordinavi clystma sequens:

℞. *Spec. carmin.* M. iij.

ʒi *s tartari* ʒj.

Coqu. in f. q. *æ communis*:

Colat. ʒix. adde

Elect. de bacc. lauri unc. j.

Ol. destill. succ. ʒss. ad. ʒj.

Vitell. ovi No. j. M. f. Enema.

Hoc applicatum fuit cum levamine, præsertim cum simul internè omni bihorio assumerentur gutt. 30. liquoris cornu cervi succinati; quorum usu passio hysterica evanuit. Hinc pulveres modo laudatos iterum usurpare jussi: sed ne nauseam excitarent, decoctum strobilorum pini omisi, & saltem in potu ordinario, cui spiritus cochlearia instillabatur, usurpare jussi. Item loco priorum pulverum sequentem ordinavi:

℞. ʒii *diaphor.*

Arcan. dupl. aa. scrup. j.

Cinn. ʒii gr. xv.

M. pro 2. dosibus.

expectandò desuper blandum sudorem.

His pulveribus manè & vesperi interponebatur internè pro anxietate præcordiorum, lipothymia, &c.

℞. *carmin.* ʒss.

Cochlear. ʒss. M.

Dosi gutt. 30. bis vel ter in die capiebantur, toties, quoties lipothymia imminerent, & sanè hinc statim levamen circa præcordia percepit.

Externè locis tumentibus imposuit lumbricos vivos, donec moriebantur, cum levamine sensili. Imò in fine morbi usurpavit crebrius spiritum salis ammoniaci pro reliquiis massæ sanguineæ corrigendis, & sic convaleuit.

Sed superiori anno hoc ipsum malum recurrebat, hinc mox post venæsectionem, præmissâ blandâ laxatione, cum minus urgent symptomata febrilia, accessum feci ad spiritum salis ammoniaci, bis quotidie ad gutt. 30. 40. continuandum, quia aberat febris. Externè, cum deficerent tunc temporis lumbrici, jussi usurpare spiritum salis ammoniaci cum calce viva paratum, mistum cum aqua articulari & spiritu tartari. Sed nihil conducebat, potius dolores augebat. Hinc mutando consilium ordinavi emplastrum diaphoreticum:

℞. *Tacamah.* ʒss.

Empl. diaphor. Myns. ʒvj. vel ʒj.

Malax. c. f. q. ol. destill. ʒi *fætidi*:

Inducatur super linteam, applica circa genu, manus, &c.

quod dolorem levabat, & ita sanam demum dimisi ægram.

CASUS L.

DELIRIUM MELANCHOLICUM HYPOCHONDRIACUM.

Mulier mediæ ætatis, aliàs sana & sæcunda, ordinariâ periodo menstrua fundens, ab aliquot mensibus recurrente subinde palpitatione cordis affligi cepit, enata sine manifesta causa. Tristior quoque præter consuetudinem, anxia subinde & suspiciosa, nescia ob quam rationem evadit; solitudinem amat, consortia aliarum fugit. Pressus examinata, de capite nonnihil conqueritur quasi obnubilato, ita, ut sibi quasi semiebria videatur, das Haupt sehr so düselt und wübelich / wie dumm: Somnus deficit, aut dormire saltem incipiens, ex tetrīs insomniis subito cum terrore expergiscitur. Appetitus mediocris, interdum nullus, sitis nulla, alvus clausa, murmura & rugitus pererrant abdomen: pulsus

ulsius vehementes, tardi, vari, magnitudine moderati, subinde inæquales obervantur. Aliquando præter morem hiirior evadit, ridet, & ancillis suis mià liberalitate pretiosa sua donat cimelia: bjurgata ob id à marito, mirè contristatur, lachrymatur acerbè, ut vix persuasionibus quibusvis luctus fisti queat. Hinc velius quidem habet, sed sub novi- & pleiluniis exasperatur nonnihil affectus. Urina est tenuis & pallidior.

R E S O L U T I O.

Affectus est Delirium Melancholicum, &que speciali nomine hypochondriacum leò dicendum, quod murmura abdominis, & palpitationes cordis hoc confirmant.

Subiectum malè affectum seu patiens, & mul causa, in hoc affectu coincidunt, suntque spiritus animales, utut diverso respectu: ibiectum scilicet patiens sunt hi spiritus, uatenus in propria natura considerati, nec tē & in debita crasi generantur, nec debito motu in cerebro agitantur. Causæ autem proximæ rationem quoque iidem habent respectu animæ rationalis, quæ intuitu spirituum vitiosorum, horumque motus, formandæ conceptus & phantasmata, deliro modo errat, aliàs cum corporis nostri actionibus nil commercii habet, nisi quod eas moderare queat, quod patet ex convulsionibus. Atteroque de anima rationali nihil cognovimus præter solum nomen; & Cartesius animam nominans substantiam cogitantem, non dhibet ejusdem definitionem; sed potius inctionem. Hanc igitur aliis in suo genere clinquimus.

Causa adeòque proxima respectu delirii sunt spiritus, qui itidem subiectum sunt respectu corporis. Etenim deliriorum fundamenta saltem in spiritibus quærenda sunt. Iii quidem derivant melancholica deliria ex ene, pro cuius sententiæ confirmatione adducunt partim istud Hipocratis: *quibus vena in hypochondrio pulsatur, mente laborant & egrotant*; quo loco intelligendæ sunt arteriæ spleneticiæ circa lumbos obviæ. Deinde adducunt & hoc pro corroboratione, quod ægri melancholico-hypochondriaci sub paroxysmo pathemata splenica observent. Verum dico contrarium, ejusmodi ægros in principio mali nullum ferè habere vitium splenis; benè autem in malo confirmato, in quo nunc splenis tumidi, nec obscure tumoris, nunc pulsantis vitium subest, quod testatur obscurus ejus pulsus, dolor, & durities. Distinguendum ergò inter ipsum morbum, & productum morbosum. Interim ubi adhuc est, an splen affectus tunc corporis causæ & fomitis, an saltem producti

morbosirationem habeat? pari ratione ac in febre quartana, ubi in principio splen non est affectus, successivè licet dein lien & hepar afficiantur.

Quoad Causam remotam; ea investiganda est ex hypochondriis, nempe vitiatâ digestionem. Cum ergò ex hypochondriis massa sanguinea infecta sit, & spiritus ex vitio massæ sanguineæ geniti sint causa deliriorum, quæritur (1) quid sit temperamentum corporis; & (2) quomodo mores istud sequantur?

Quoad prius autem, temperamentum investigandum est in constitutione massæ sanguineæ; sequela verò morum ad corporis temperamentum fundamentum habet in constitutione cerebri, & spirituum animalium ex sanguine genitorum. Utriusque autem effata in se verissima; quod mores sequantur temperamentum corporis, comprobant eunuchi & equi castrati. Interim ea intelligenda non sunt de temperamento corporis elementalî, quippe quod & viventibus & mortuis est commune, sed vitali, viventibus proprio, & formaliter in sanguine & volatilifatis spiritibus influis consistente, unde varietates corporum in nutritione, generatione & actionibus animalibus; itemque proprietates in actionibus dependent, originaliter ex semine & conditione spirituum utriusque sexus genitalium derivandæ. Adeòque sanguis hic vivus pro sui minimorum miscela multiplici, & diversâ textura, & multiplici exinde enascentium spirituum habitudine, oriri facit diversitatem temperamentorum. Hinc v.g. quorum sanguis, & consequenter reliqui corporis succi, sale volatili oleoso uberiùs turgent, & hinc in uberiùs fellis incrementum facilè conspirant, tales cholericî seu biliosi, hinc calidi, sicci, macri, &c. esse dicuntur, & ratione spirituum taliter constitutorum, & ratione texture fibrosæ cerebri in teneritudine, mollitie, flexibilitate, &c. consistentium, agiles, activi, inconstantes, vagabundi, &c. esse solent; contra, quorum sanguis & reliqui succi minus de sale prædicto participant, sed ubi sanguis densior, spissior, & minus resolvable existit (qui effectus aliàs in sanguine ab acido sunt,) in talibus reliqui succi rigidiores, asperiores & acidiores deprehenduntur; hinc frigidi, sicci, aridi, duri, &c. sunt, & ratione texture spirituum & fibrillarum cerebri duriorum & rigidarum, sicci, aridi, graves, tardi, meditabundi, & obstinati sunt. Porro quorum sanguis temperatus est, utroque horum extremorum, volatili ac dulci oleo, istis intermixto quasi dulcificatus est, hi sanguinei vocantur, & ratione proprietatum corporis calidi, humidi, carnosî, sani; ratione

tione verò mollitici & blanditici, texturæ blandæ fibrillarum cerebri & spirituum jucundi, hilares, ingeniosi, comes, & moderatè graves observantur. Tandem, quò sanguis magis adhuc temperatus est, idquè ab uberiore chylo dulci & probe digesto, tales phlegmatici dicuntur, suntque ratione proprietatum corporis humidi, frigidi, obesi & succulenti & corpulenti; sicut ratione mollioris texturæ fibrillarum cerebri, & ratione spirituum, ingenii obtusioris, tardioris, in actionibus lenti, torpidiores, &c. Quodsi autem chylus aquosior extiterit, ex conditione digestionis primæ læsæ & uberioris lymphæ corpus inundantis copia, illi phlegmatico-serosi esse solent. Breviter: Tot sunt temperamentorum varietates, quot individua; pro ductu enim spirituum animalium animæ rationalis conceptus format, hinc clima, sexus, ætas, & vitæ genus, temperamenta admodum variant. Dum verò à multis quatuor saltem statuuntur, fit hoc ex hypothese quatuor elementorum. Pro usu Practico sufficit Temperamenta ex acido & urinoso deducta, commodè applicasse.

Dixi supra, considerata esse in nostro casu: (1) primas vias; (2) massam sanguineam; & ut (3) ipsi spiritus animales sint subiectum & causa proxima. Etenim hi in homine subsunt regimini animæ rationalis, huicque illi varia phantasmata obtrudunt, ratione quorum etiam proximæ causæ rationem hic habent. Jam verò consideretur (1) palpitatio cordis & pulsuum varietas (2) capitis perturbatio (3) obstinatio firma in semel concepto deliro phantasmate. Et quidem palpitatio cordis vel immediatè ab acido cordi inimico & vellicante, oritur; vel ipse sanguis ab eodem ad facilem grumositatem disponitur, hinc faciliè irretitur intra valvulas cordis, undè convulsivè moventur cordis muscoli irritati, i. e. palpitant. Hinc melancholici etiam citra palpitationem cordis habent pulsus admodum inæqualem, speciatim quinta vel sexta qualibet pulsatione intermittentem, sine periculo tamen; quod dici non potest, si contingit in febribus acutis, & speciatim, quando ejusmodi melancholici fixi & attenti sunt in semel concepta cogitatione, ordinariò pulsus intermittentem præ se ferunt, pulsus ipso aliàs raro, tardo, magno, & subinde vehementi existente. Quoad capitis dolorem: sanè hic non est lancinans, aut lacerans, aut pulsans & frontem affligens, sed solummodò perturbatum est caput, quasi ebria sit (*Sie sagen: der Kopf sey ihnen so wüste; er thue ihnen zwar nicht so heftig wehe; es sey nur / als hätten sie einen halben Rausch.*) Et talis capitis perturbatio alvo clausa magis

affligit; quando verò solvitur, caput minus perturbatum est, sed magis serenum ipsis videtur, istudque etiam, antequam delirent. In hoc autem phænomeno non concipi debet vaporum adscensus, sed caput simpliciter dolet ex hypochondriis, ob nervosi generis consensum; quod patebit considerantibus resinas acres purgantium, quæ dum adhuc rugis stomachi adhærent, statim conqueruntur de cephalalgia circa frontem, sine ullo fumorum adscensu. Unde pari ratione hic à fomite morbofo in hypochondriis cap. afficitur.

Quoad pertinaciam hujusmodi ægrorum circa unum objectum; hæc commodiùs poterit explicari ex temperamentorum diversitate in melancholicis paulò ante explicata. Nempe in hujusmodi melancholicis, & inde natis deliriis, cerebrum suo modo sub sui nutritione à sanguinis conditione vitatur ita, ut fibrillæ cerebri rigidiores propter nutrimentum rigidum, duriores, minusque flexiles existant, hinc spiritus in semel concepto tramite obstinatè pergunt, & continuò motu iisdem vestigiis insistant, unde ut plurimum obstinatus est animus, & continuatio circa idem objectum, & tales sunt, qui dicuntur melancholici. Econtra sanguinei sunt vagi & mobiles, ob facilem fibrillarum ex blanda mollitie plicaturam & variam, indeque multiplices tramites; quamobrem valent spiritus, idque eò magis, quò magis & ipsi volatiles & in se mobiles fuerunt. Quorsum etiam confert spirituum ipsorum conditio, suo modo non nihil fixorum.

P R O G N O S I S.

Deliria melancholica in genere sunt extra periculum vitæ; metus tamen est, ne continuata maniam inferant.

In nostro casu, quia malum est recens, & sine insignioris cujusdam animi pathematis occasione natum, & in muliere, cui menses fluunt, curabile est; & quidem non tam difficulter, ita, ut nec mania supervenientis metus subsit. Verùm si deficerent, vel morbus hic contingeret in muliere ætatis decrepæ, vel ex graviore animi affectu, esset malum inveteratum, tunc difficulter curaretur; imò metus mania cresceret.

C U R A.

Quoad curam; quia fomes & nidus omnium melancholicarum est in primis viis, hinc

1. fordes harum acidæ corrigendæ erunt, & fomes sordium acidarum & viscidarum eliminandus: quorum illud præstant Martialia præsertim & Saturnina, itemque salia falsa nonnihil nitrosa, ut arcanum duplicatum, & sal hypochondriacum.

2. massæ sanguineæ dyscrasia acida melancholica corrigenda volatilibus, præfer-

calinis, & appropriatis temperan-

. Spiritus animales quibuscunque mo-
iati, in debitum motum revocandi, &
tam rationem mens restituenda, per
iata & camphorata.

am inter evacuantia universalia excel-
1) digestiva, (2) vomitoria majori dosi
ita, cum ordinaria nihil faciat, sed sal-
lvum blandè moveat, adeoque in du-
ssi, vel adhuc semissi, exhibeantur, &
tis vicibus: siquidem impossibile est,
e vomitorio delirantes melancholicos
e; qui, quò magis delirant, eò magis
toriiis opus habent, iisque locus esto.
rbentia & alterantia salina, quæ abster-
, sunt v. g. sal hypochondriacum, vel
um duplicatum (ad somnum omninò
sarium hujusmodi ægros disponens)
subjungantur vomitoria. Porro alvus
ndeat; quò magis enim soluta est, eò
s talibus caput est affectum, adeoque
sit aperta, & somnus, quantum possi-
inducatur; sunt enim ordinariò
rves, & sic delirium exasperatur. Inte-
amen, quoad opiata, sumus cauti, non
remus, nisi præmissis vomitoriis; aliàs
somniais turbulentis vexantur, & magis
fiunt.

Quemadmodum autem vomitoria ma-
n dosi aliquid, ordinariâ verò nihil,
ant; ita purgantia per inferiora non
antur in his ægris, vel, si movent, fit cum
re & sine ulla euphoria; quin potius blan-
xantia & abstergentia sunt optima, ut
rus vitriolatus cum aliquot granis cujus-
stimulantis. In vomitoriis ex tartaro
tico loco sacchari potest addi tartarus, &
arcanum duplicatum, ad gr. vj. viij. vel x.
nim vomitus & secessus promoventur.
eò helleborus niger optimus est pro scopo
ificè alterandi magis, quàm purgandi;
sertim si ipsi virus laxans auferri queat,
eremus remedium alterativum optimum
nisse affectibus, quod fiet optimè per sal
tari, item si fermentari possit cum succo
loniorum instar opii, ad quam tamen eun-
m non potui redigere; Vid. interim Hoff-
annus in Clave Pharm. Deodatus in Panth.
ygiast. & Thiermayer in Consil. & Resp. qui
mercurium dulcem in ejusmodi casibus com-
endant; quod non approbo, sed potius
venit in affectibus, ubi acidum in subje-
o viscido hæret; minus in acido acriori.
nde etiam Mercurialia non semper in affe-
bus scorbuticis conveniunt, quibus ex
re sunt hostilia, quique ut plurimum con-
cti sunt cum melancholia in nostris regio-
bus: magis ergò Mercurii dulcis loco con-

venit gummi ammoniacum in aceto solu-
tum, & extractum hellebori nigri.

Præmissis digestivis & vomitoriis ad
Martialia accedendum, nempe tincturam
Martis ex solutione cum succo pomorum,
quæ concinnior ita paratur:

Succus pomorum affunditur limaturæ
Martis, solutio hinc inspissatur ad consisten-
tiam essentiae, desumendo scilicet phlegma,
ne situm contrahat: quæ aut filtrata, aut per
tempus se ipsam depurans, asservatur pro
usu.

Dosis est cochl. i. & quidem in his ægris
melior, quàm tinctura vitrioli Martis Zwelf-
feri, quæ hic inermis est.

Optimum autem est sal Martis composi-
tum: nempe

℞. *Crem. Tart.*

℞ *olis* *œis* aa. part. æqual.

Mista solvantur in ∇ fervida, & coqu. ad
mellaginem; tandem exsicca in loco conve-
nienti, sic salinum corpus flavescens evadit,
cujus dosis est ℞j. ad ʒss. imò ℞ij. & optimum
est in hujusmodi affectibus.

Coralliata hic optimè profunt, circa quæ
consideretur

1. concretum eorum terreo - alcali-
num; &
2. color eorundem rubeus.

Quoad prius: conveniens est in destru-
endo acido, hinc alterativi vicem obtinet, si-
cuti e contra ratione tincturæ hujus aut sulphu-
ris, corallia commendantur à Paracelso spe-
cificè ad deliria, serenando spiritus. Dici-
tur naturæ esse solaris tinctura ritè parata, &
ad corrigenda spirituum vitia, ab eodem
laudatur.

Pro massa sanguinea autem corrigen-
da, præmissis evacuantibus & Martialibus,
continuato usu alcalia volatilia sunt opti-
ma, imprimis clyssus compositus urino-
sus, & spiritus carminativus, præfer-
tim quando hi ægri simul palpitatione cor-
dis laborant, & anxietates adsunt; sicuti
etiam camphora, præmissis alterantibus pri-
mas vias respicientibus, nunquam omitten-
da est, quippe quæ specificam vim habet
ægros delirantes ad somnum disponendi:
imò cum eadem immediatè quasi alteret spi-
ritus quoscunque influos, hinc in maniacis
& Melancholicis, itemque febribus malignis,
etiam commendatur.

Semper tamen in cura ratio habenda mo-
di & occasionis, quibus primitus morbus enat⁹
fuit: si à causâ externa, mœrore, curis, terro-
re, &c. remedia parum valent, spiritibus ferè
solùm, aut saltem primariò alteratis; unde
nutrientia, humectantia, analeptica, &c.
optima: sin verò à causâ interna, contento-
rum

rum vitio cum splene plus minus affecto, remediis agendum est.

CASUS LI.

**GONORRHOEA VIRULENTA,
CUM TUMORE TESTIS
OEDEMATOSO.**

Studiosus juvenis Veneri subinde indulgens, petit consilium Medicum propter insignium cruciatum, quem patitur sub urinae emissionem in radice penis, asserit simul, continuo, guttatim licet, proflueret ex membro praefato materiam tenuem, flavescentem, interdum simul nonnihil spissiusculam, dolorem in glande excitantem: quae glans rubet & tumet insigniter cum paraphimosis, simulque in consiniis ejus & praeputii parva hinc inde ulcuscula adjunt, pus acre fundentia, & impense dolentia. Evanuerunt haec symptomata aliquamdiu, nescio quibus adhibitis; sed ecce! recurrunt de novo, & comitem sibi adsciscunt praeter ceteris, qui nunc urget, dextri testiculi tumorem, quo ter & amplius testiculum socium superat, acerbissime dolentem, dolore tamen nec pulsatorio nec pungente, sed misere contundente & distendente: qui dolor, cum acerbis cruciatibus ad lumbos usque protendatur, scrotum in isto latere & ipsum simul tumet, ac rubet, ipsa lumborum regio calere & fervere videtur.

RESOLUTIO.

Affectus est Gonorrhoea virulenta, junctum cum tumore testis oedematoso & scirrhus nonnihil, orta ab impuro coitu. Gonorrhoea enim alia est benigna, quae, praeter alias causas, non raro etiam excitatur a nefanda masturbatione, imprimis statim in pupertatis annis, cum & haec difficillima sit curationis; sic vi relaxando orificia vesicularum seminalium & prostaticarum liquor geniturae sponte effluit; vel etiam cathetere male immisso. Interim ex observatione habeo, duo remedia in Suecia, plures annos hoc malum passio, profuisse: nempe tincturam sulphuris vitrioli vel antiphthisicam, ad gutt. 40. omni mane in vehiculo calido; & omni meridie circa quintam trochiscos de carabe ad 3ß. observando strictam dietam: alia gonorrhoea est maligna, qualis praesens.

Quoad Partem affectam: laborant in genere in nostro casu partes genitales: testis dexter ratione tumoris dolorosi, vesiculae seminales, & ratione gonorrhoeae primario ipsae tandem prostatica glandosa, quae in his subjectis magis vel minus exulceratae sunt.

Causa proxima est acidum virulentum

Venericum, quod peccare docet Sylvius sufficienter in Tr. de Lue Venerea: sed acidum hoc est specifici saporis, qui a priori nondum est cognitus, quod ut plurimum per contactum communicatur. Interim tamen hoc acidum massam sanguineam relinquit ferè intactam, hinc plerique lue Venerea affecti sunt admodum vivaces; inquinat tamen hoc speciatim succum chylosum nutritivum, & hinc lympham, adeoque illius ratione partes nerveas potissimum afficit lues Venerea, hinc nocumentum magis in partibus extimis, sicut etiam ossibus, minus in interioribus percipitur, cujus lymphae ratione speciatim affliguntur partes glandulosae, hinc frequentiores sunt nasi, oris, faucium &c. exulcerationes, bubones, ulcera in bubonibus, & alia loca glandulosa inquinata. Porro acidum hoc sub forma contagii suscipitur ab extra, nec sponte illud generatur; quin potius lues Venerea triplici modo se propaget: nempe vel congressu, quando genitalia infecta, & ulceribus Venereis obfessa; hinc mulieres admodum Venereae, si modo genitalia sint sana, non inficiunt; bene tamen, si ulcera sint in vagina uteri: vel salivam per pocula: vel lecto. Et quidem congressus est familiarissimus & facillimus inficiendi modus. Quod verò lectum & poculum attinet: sanè non semper hisce propagatio fit, sed differentia observanda: nempe tunc pocula sunt suspecta, quando lues Venerea usque eò jam est progressa, ut ulcera faucium & oris, vel genitalium graviora aut cacoethea intulerit; tunc enim promanans purulentia ex his ulceribus contagiosa evadit, & salivam hujus inficit, quae poculis adherens ab alio hausta eundem inquinat; non secus ac scabies se per fermentum quasi multiplicat, & contagium propagat. Pari ratione cum lectis procedit: etenim nisi infectus ulceribus partium externarum laboret ita, ut sanies aut purulentia sordida veneno Venereo inquinata hinc inde stragulis adherant, sanè alius accumbens infici non potest; qui vero his inquinatis ejusmodi stragulis utitur, facillime potest inquinari. Similiter, modo mulier concumbens ulcera gallica in vagina uterina non foveat, mas incubus non inquinabitur. Adeo ergo mediante vehiculo puris seu saniei ex ulcere vel oris, vel partis cujusdam extimae fermentum Venericum se multiplicat: alio modo non rarum est, quod parentes vel nutrices Venereae lacte inquinant infantes; quia enim habent lac admodum corruptum, etiam infantes simili contagio inquinare valent; non secus, si parentes, aut horum alter, lue Venerea confirmata laborantes, infantem genuerint ab utero matris pariter lue Venerea affectum, quale exemplum

Gonorrhœa Maligna cum Tumore Testis Oedematoso. 313

observat Hildanus: & ipsemet in Nosocomio Patavino puellam quadrimulam, hac lione Gallicam vidisse, asserere possum. rûm quidam concumbentes cum infene tam facîle inquinantur à contagio

Veneri, pro præservatione ante conium assumunt olei destillati terebinthinæ v. vel vj. sic vis acidi Veneri impeditur, & vias urinarias iterum educitur; non

ac Magnenus *Tract. de Tabaco* post cessum genitalia, in specie urethram, succo vel decocto tabaci mox lavanda

Uterius acidum hoc virulentum, sub visceri, fixioris, minusque volatilis fori urethram derivatum, hinc ulterius ad prostatas glandosas, quas rodendo gravit, simulque in his exulceratis lymphæcarum inquinavit, & acriorem & aciem effecit, hinc ex prostaticis ulceratis & a ista corrosiva symptomata, in emissione urinæ obvia, oriuntur. Nam si exulcerant prostata, non possunt non ab urina effluente acri falsa irritari & dolere, ut utrites sanè has læsiones non percipiant: non fissura labiorum ex aeris inclementia in urina illita mordet, sana autem labia non mordet; sicut scabies etiam fordidaenti lotionem cum urina sanatur, sed indolet propter loca exulcerata, ab urina irata. Eadem etiam lymphæ acidior faub sui effluxu intra præputium & glans: insinuando, simpliciter non absterfa non hærens, exulcerare valet suâ acrimonia fermenti scabiei. Nam visciditas aris est subjectum acidi illius Gallici, etiam dolent præputium & glans, hinc & intumescunt, quæ si in ægro nostro fuissent, inflammationem & gangrænam induxissent. Nempe fundamentalis cursgonorrhœæ in ablatione istius fermenti & partium affectarum validâ absterfionssistit; hinc balsamica & diuretica optima. Quod si autem intempestivè immatur fermentum hoc acidum, tunc ulterius in corpus se insinuando, tanperfectam luem Veneream infert.

Quoad tumorem testiculi: in hoc non ad materiam corruptam, quàm solum ad fermentum acidum Venereum corpens, respiciendum est: hoc enim succum se multiplicans nunc vehiculo lymphæ aptæ ex prostaticis excernitur, nunc verò etur, retentum necessariò per continuamateriam alterabilis tractum istius medio illivè pergit ad ipsum usque testiculum, ut liquorem seminalem in vasis deferen-

simili ferè ratione atque aquam per lallaneas successivè pergere, & se infundere progredi videmus; vel sicut odorom. II. Pars 2.

fundi vasis acetosus copiosum lac infusum penetrat pederentim, totum inquinat, coagulat, & ad sui corruptionem disponit; vel sicuti contagium scabiosum extremo digito haustum, totam manum, postmodum totum corpus, successivè inficit. Acidum ergò hoc fermentum malignum, ad testiculorum alterum penetrans, materiam genituræ inficit, & ad visciditatem & consistentiam præternaturalem redegit; hinc ejus deficiens distributio, hinc collectio, hinc tumor testiculi, dolor acerbus, obscureque pulsans, & ad lumbos usque protensus, quorum tamen hunc non percipit æger noster. Interim si pulsatorius dolor augeatur, signum est tumorem testiculi ad inflammationem pergere.

Continuatio autem doloris tensivi ad lumbos usque non in vasis spermaticis simpliciter quærenda est, ut ut hæc, cum iis appendatur testis, suo modo aliquid simul tribuere valeant; hinc enim, dum tales ægri erecti sunt, vel incedere volunt, dolor iste pondere testiculi magis intenditur; contra optimè jacere possunt: ergò suo modo testis tumefactus aliquid quidem hic confert; speciatim tamen partim in nervo, ex intercostali mox infra renes ad testem derivato, de quo vid. Willisius *Tab. 11.* partim in membranis istis, à peritonæo natis, quæ vasa spermatica ubique includunt, & extra abdomen ad testes usque descendunt cum iis, ut ex Anatome patet, per horum continuitatis consensum & aliqualem spasmus, doloris istius tensivi deorsum trahentis, ad renes usque continuatio quærenda est.

Quoad fervorem aut ardorem renum: sanè hic ordinariò in gonorrhœa virulenta confirmata obvius est, in incipiente non item: ex acido virulento Gallico successivè sursum ad renum regionem, sive cum lymphâ ex testibus, sive cum sanguine delato, eò perveniat, membranosa circa renes loca afficiens, & ita dolorem istum rodentem & ardentem (dicunt *es brennet*;) qui ab acido, intensius membranosa loca rodente, oriri solet, originem ducit: qualis ardor aliis in locis observabilis, sine motu febrili incedens, sed, ut ita dicam, imaginarius; quippe, quando acida fortius rodunt loca membranosa, ardor inducitur: sic v. g. quando quidam spiritus acidus rectificatus, incidit in extimam nostram cutim, tunc sensum percipimus quasi scintillæ ardentis, dependentem ab acido cutim vellicante: pariratione in locis intimioribus membranosis acidum quoddam insignius rodens sub sensu ardoris solet percipi. Ac habeo sub cura aliquem, qui circa vesperam patitur insignem ardorem stomachi, superveniente aliquali vomitu acidissimi saporis, quo acido rejecto cessat: hic certè ardor est ab acido, fortius rodente ventriculi membranas;

[R r]

unde

unde talem ardorem extinxi per saturnina, ut saccharum saturi, tincturam antiphthificam, & similia, quæ acidum in corpore obvium imbibunt, & sic, ut dicunt, refrigerant.

Quoad Prognosin: urinæ suppressio ab urethræ coalitu non nisi in malo ulterius progressio metuenda.

In præsentī casu æger extra periculum, speciatim vitæ, quidem versatur; sed periculum est, ne fermento Gallico ulterius pergente, ipse lues Venereâ perfectâ corripatur undiquaque, quod non rarum est.

Itaque, ne superveniat lues Venerea, Cura non differenda, quam in præsentī ægro sic institui: Vocatus ad hunc ægrum, cum jam scirem ejusdem genium, ante omnia, quia colocynthis post Mercurium est appropriatum corrigens acidi Venerei, interius eidem ordinavi pilulas Mercuriales appropriatas ex extracto panchymagogo Crollii vel hellebori nigri, & Mercurio dulci, qui est alexipharmacum luis Venereæ, cum trochiscis alhandal. Semper enim in his remediis ad virus specificum luis Gallicæ respiciendum, adeoque appropriata Mercurialia pro illo coercendo simul adhibenda.

Cum his unâ externè ad discutiendum tumorem scroti & testiculi recti, qui erat ruber, unde metuebam inflammationem & gangranam, ordinavi:

℞. *pulv. far. fabar.* ℥iij.

sem. Cum. ℥ss.

Coqu. in f. q. poscæ seu ∇ æ & ∇ ti, ad consistentiam Cataplasmatidis:

adde

Lithargyr. pulveris. ℥j. M.

Hoc cataplasma calidè irrigatum poscæ, tumori & dolenti scroto applicabatur, cujus usu crebrius per diem & noctem continuato, dolor mitigabatur, & tumor imminuebatur.

Postmodum ordinavi:

℞. *Bals. ∇ is tereb.* ℥iij.

Propinabantur quotidie gutt. xij. bis in die.

Item pro externo litu scroti & testis affecti.

℞. *Bals. ∇ is Rul. ad extra c. ol. nuc. par.* ℥iij.

Ungu. dialth. ℥ss.

Ol. destill. Cum. ℥j.

M. pro Linimento.

Calidè aliquoties in die illinivit partem affectam, ita maximam partem tumor & reliqua symptomata evanuerunt.

Cum autem post resolutum tumorem testis adhuc durus & magis magnitudine auctus, quàm alter sanus superstes, esset.

℞. *G. ∇ ci c. aceto sol.*

Empl. de Cic. ana q. f.

Malax. c. f. q. *ol. dest.* ∇ i, vel loco hujus cum oleo destillato ligni guajaci foetidi.

Inductum super linteam densum vel alu-

tam applicabatur loco affecto, omni biduo vel triduo id renovando; & sic beneficio hujus mox omnis durities penitus discussa fuit.

Cæterum mox in principio applicassem, sed metu inflammationis ab hoc abstinui, Emplastrum Vigonis de ranis cum Mercurio aliàs in tumoribus & bubonibus Venereis incipientibus præstantissimum, malaxatum cum oleo destillato succini: sed dubius eram, an possim genitalibus immediatè applicare? nam Mercurius me deterruit, cum infestus sit virtuti genitali, & impotentes reddat, sicut elucescit ex Panarollo *in Observ.* ubi quidam ad extinguendos pediculos pubis litu Mercuriali usus fuit, quo factus penitus fuit impotens. Sed abstinendo à litu hoc, & illinendo genitalia oleo destillato spicæ, pediculi sublatis sunt, & brevi tempore rediit virilitas.

Cæterum extractum hellebori nigri est antesignanum omnium purgantium, evacans & corrigens causas quorumcunque morborum chronicorum, ipsiusque luis Venereæ: quinimò quemadmodum inter blanda purgantia excellunt aloë & rhabarbarum; ita inter propriè sic dicta helleborus, extractus cum menstruo non oleoso, sed aquoso, quia magis salina est hæc radix, hinc infusum ejus in aqua anisi, acuta cum paucis oleo tartari per deliquium, egregium est; vel etiam infusum cum alia aqua factum, acutata cum liquore terræ foliatæ tartari. Dictus helleborus larvatur à Paracelsō sub Dauræ nomine. Similiter Mercurius dulcis nunquam omittendus est in morbis Venereis purgandis; non enim hætenus datum est cognoscere remedium magis appropriatum alexipharmacum istius acidi Venerei, quàm Mercurium. Scrupulus autem subest: an Mercurius is vel dulcis sublimatus, vel præcipitatus in usum vocari debeat? & an concursu acidi Venerei reviviscat? Nego: Equidem Mercurius sublimatus hostilis naturæ nostræ est ob spiritum salis concentratum: Interim hunc corrigit additio Mercurii vivi; Merus ergo hic vanus est de Mercurii præcipitati dulcis revivificatione ab acido Venereo, cum, antequam penitus saturari, & à copiosissimo ac acerrimo acido in Mercurii sublimati corrosivitate abire possit, centies jam expurgatus sit: (2) ad hæc Mercurius sublimatus longè ponderosior est vivo Mercurio, unde hujus multum, illius parum, respectu molis corporeæ est in Mercurio dulci. (3) In Mercurio dulci Mercurius sublimatus corrosivus dilutus, & temperatione particularum acidarum antea concentratarum admodum enervatus est. Adhæc (4) Mercurius dulcis ad ℥iij. successivè propinatus sine ulla noxa movet salivam, quæ noxa aliàs à paucis granis Mercurii subli-

solimati observatur, item facilius salivationem movet, si cum vitello ovi assumatur.

Bonum etiam est Antimonium per inferiora purgans: sed rara avis est, quia semper hoc subiecto per inferiora, in illo seu alio et superiora operatur. Interim modi præparandi id ad inferiora optimè haberi possunt: aceto & sale tartari, quippe utraque figunt: immutant antimonii particulas sulphureas priores & volatiliores catharticas; quarum maturâ energiâ in stomacho vomitus extatur: quâ verò fractâ æger saltem per alvum purgatur: e. g. fit ex nitri tartari & antimoniana: quæ exactè pulverisata & mixta detonentur in crucibulo; sic scorix & relius emergent: hinc scorix solvantur in aqua simplici, & filtratur, filtratum successivè præcipitatur per acetum vini simplex, stent vicem aliquamdiu, antequam filtrentur, postmodum pulvis remanens edulcoratur, & exhibetur ad gr. ii. vel iij. Par ratio est, si pro opo præcipitandi recipiatur solutio calida tartari crudi albi, & instilletur solutioni scoriarum, sicque pulvis edulcoratus ad gr. jv. v. exhiberi potest. Interim tutior modus ille, qui fit cum sale tartari: nempe butyro antimonii ex antimonio selecto parato, & robè aliquoties rectificato, ut fiat instar aquæ limpidæ (quod impetratur in cella) statim instilletur solutio salis tartari probè tritati, donec saturetur: Habito saturationis incto, præcipitatum quod est, mediante tro separetur; ita emergit antimonium nonnihil flavescens, quod probè cum aqua calida sæpiùs edulcoretur; sic habetur antimonium per inferiora saltem purgans, & mitemodum operans.

Infusum cantharidum cum vino etiam bonum remedium est, de quo encheirisis hæc observanda, ut pauca quantitate cantharides insignem copiam Vini Rhenani infundantur, non autem in spiritum vini, & postmodum quædam guttæ huius alio recente vino primum pro usu temperentur: & quidem optimè; quia in hoc est acidum vinosum tartarum, seu tartarus vini volatilis, corrigens omnihil, temperando suo modo & interveniendo sal cantharidum volatile acerrimum, quod aliàs urinam ita exacuit, ut etiam exulceret vesicam. Corrigi autem in acido videmus in vesicatoriis, quando ex cantharidibus cum ficibus parantur, quæ solent ordinariò æteris paribus longè aciora magisque causticæ esse, præistis, quæ eiuſdem cum fermento, imprimis cum aceto, mistis parantur.

Si ulcera penis altius progrediuntur, adhibendum mixturis pro adiectione aliquid Mercurii dulcis, seu correctoris acidi specifici. Os piz in gonorrhœa benigna, quæ non est ex nituræ abundantia, specifici meretur nomē.

Tom. II. Pars 2.

Quando phimosis etiam adest, aqua calicis vivæ cum saccharo saturni est egregia.

Quod altius progressa sit gonorrhœa virulenta, signum est, quando simul glandulæ inguinales intumescunt. Non sunt quidem perfecti bubones Venerei, sed saltem glandulæ inguinales intumescunt, pro cuiusmodi glandulis intumescuntibus optimum est emplastrum de ranis Vigonis cum Mercurio paratum, Mercurium nunc in simplici nunc duplici dosi addendo: vel loco huius recipiatur emplastrum quoddam usitatum ex g. *co, vel simpl. vel compos. cui addatur ʒ vivi qu. placet.

Balsamus Saturni terebinthinatus est optimus; sed præparatio difficilis. Saccharum Saturni minutissimè teratur, & quidem simul cum oleo terebinthinæ, & hinc in digestionem blandam ponatur; sic oleum rubescit, & saporem dulcem blandè adstrictorium acquirit: Interim non omne saccharum hoc modo solvi potest: Vid. Hoffmannus *Thef. lib. 3. cap. 13. pag. 251.*

Si autem quis laboret lue Venereâ perfectâ, & quidem inveteratâ, in qua, præter gonorrhœam virulentam, dolores nocturni ostocopi affligunt, itemque efflorescunt hinc inde gummata, vel etiam pustulæ rubræ in facie, &c. ex quibus apparet, malum esse confirmatum; In tali statu pro cura hi observandi sunt scopi:

- (1) Ut corrigatur acidum Venereum.
- (2) Ut dissolvatur viscidum, seu subiectum istius acidi.

Adeoque præmissâ blandâ laxatione Mercuriali per alvum, ad Decocta blandè sudorifera lignorum accedendum, unâ cum crebriori infessu in semicupio. Decoctum poterit esse sequens:

R. Raf. ligni sancti ʒiij.
Cort. ejusdem ʒiij.
Rad. Sarsæ parill. ʒij.
Raf. ligni Sassafr. ʒj.
ʒii vivi in pet. lig.
ʒii crudi in pet. lig. ana ʒvj.

Infund. in ∇ comm. Mens. vj.

Macera per 24. horas in MB. hinc coqu.

ad remanent. tertiæ partis:

Colatura Detur.

R. Residuum Decocti prioris:

Infund. in ∇ comm. Mens. x.

Macera per 12. aut 24. horas:

Decoqu. ad consumpt. tert. partis:

in fine adde

Passul. min. conquass. ʒij.

sem. Coriandr. cont. ʒj.

Cinnam. ʒiij.

Coletur, D.S.

Ordinari-*Transf.*

De priori decocto sudorifero omni manè

[Rr 2]

calidè

calidè \mathfrak{z} ij. vel \mathfrak{z} iv. vel v. vel vj. fumantur, dein expectando in lecto blandum sudorem: quò factò, surgat & postmodum comedat, abstinendo tamen ab acidis: à meridie ingredia-
tur balneum aquæ dulcis calidæ, insidendo eidem ad collum usque, quamdiu lubet, hinc coënet; sub introitum autem lecti eandem dosin prioris Decocti sudoriferi capiat & dormiat, sine sudore. Manè sequenti bibat iterum haustum calidi Decocti, expectando denuò sudorem; à meridie autem ingredia-
tur balneum, sicut vesperi, repetat Decoctum sine sudore, hocque per octiduum continuet, ut mediante sudore & balneo dissolvantur succi viscidiores & glutinosi, ceu subiectum acidi specifici; sic dispositis hisce succis glutinosis, facilius redditur cura mercurialis salivatoria sequens. Interim tempore intermedio hauriatur potio ordinaria antea dicta, quories placuerit de die.

His continuatis denuò purgetur corpus pilulis Mercurialibus paulò fortioribus, ut magis extinguatur acidum Venereum. Tandem fiat progressus ad salivationem Mercurialem. Adhibetur autem vel internè vel externè. Usus ejus est, ut infringatur acidum specificum luis Venereæ, & dissolvatur & attenuetur magis adhuc viscidum illud, tanquam subiectum acidi, sive idjam sub forma gummatum appositum fuerit, sive sub forma lymphæ adhuc fluidæ involutum sit. Cæterum, cum Mercurius excitet salivationem, per accidens etiam curat luem Veneream, non verò per se, quia Mercurius etiam eandem in sanissimis excitat.

Modus salivationis est triplex:

I. Per interna Mercurialia, sive sint sublimata, sive præcipitata:

Observetur: quò minus ab acidis tractatus fuerit \mathfrak{g} , eo meliorem esse ejusdem usum; hinc \mathfrak{g} dulcis, arcanum corallinum, &c. sufficiunt;

II. Per externa, nempe per inunctionem, quando nempe ægri illinuntur cum linimento terebinthina & oleo laurino: quibus additur pro lubitu Mercurius vivus, in mortario lapideo probè subactus, inungendo in loco calido plantas pedum circa talos & genua per biduum, deinde etiam circa carpum & cubitum; imò in pertinaciori malo vel difficiliore salivatione interdum spina dorsii etiam inungatur. Linimentum hoc per 2. vel 3. dies continuetur, pro ratione nempe majoris vel minoris copię Mercurii vivi, vel etiam prout celerior vel tardior sequitur salivatio; teneriores tamen non adeò diu ita cruciari debent; in densioribus autem subiectis diutius hoc necesse est.

III. Tandem administrantur quoque suffitus ex trochiscis, qui ex variis, & præcæteris ex cinnabari constant, iique in conopeo, prominente saltem capite. Verùm hic modus est omnium pessimus, nec suadendus.

Cæterum à salivatione ægri conqueruntur de dolore circa fauces; parotides & lingua intumescunt, saliva copiosè prodit, gingivæ protuberant, dentes vacillant, lingua in laterali loco, ubi ductus salivales sunt, ordinariò exulceratur, fauces rubent dolentque, difficulter deglutunt, & nisi sedulò Chirurgus fauces inspiciat, & os eluat, ulcera oris depascentia oriuntur. Saliva, quæ initio prodit, est tenuis, cui succedit viscidior, & tandem viscidissima & foetida, & maximè tenax, adeò ut baculo mediante ad ulnas usque protrahi possit; ægri interim fiunt languidi & emaciantur. Alimentum esto jusculum non salitum ex avena, cum vitello ovi; potus autem sit cerevisia calida; quò plus enim comedunt ægri, cò plus salivant, unde parcius tales cibandi sunt, quia omne alimentum corrumpitur, & in salivam vergit; unde Mercurius non acidum Venereum, sed alimentum aggreditur. Salivatio hæc per 8. vel 14. dies, imò interdum per 21. dies præterpropter, pro ratione constitutionis ægri, aliarumque circumstantiarum, continuari solet. Si adfuerint ulcerationes illæ à salivatione, spontè consolidantur; si gummata, evanescent; si adfuerint pustulæ, spontè decidunt, quod signum est sufficientis salivationis; sin verò hæc evanescere nolint, signum est, nondum sufficienter factam fuisse salivationem. Porro cessante salivatione, potissimum si remissior fuerit, denuò corpus pilulis Mercurialibus expurgetur, maximè si sub salivatione alvus clausa fuerit, ut, quicquid vel Mercurii vel sordium extiterit in corpore, eliminetur. Postmodum denuò ad sudorem progrediendum, hinc decoctum superius sudoriferum omni manè denuò propinandum, expectando desuper sudorem post mediam horam, vel in lecto, vel in conopeo, in quo insit vel ferramentum ingens candefactum, vel aliquot lateres, vel silices majores exactè candefacti, super quos infundatur aqua calida; sic enim vapor exhalans, & corpus ægri ambiens, sudorem facit largum. Continuat hoc nunc omni die, nunc alternis diebus, per 8. vel per 12. aut 14. dies, ut omne virus extra corpus penitus eliminetur, & curæ finis imponatur. Interea corpus emaciatum magis magisque nutrirī incipiet, &, cessante potu lignorum, diætā ordinariā uti poterit.

CASUS

CASUS LII.

MENSIIUM DIFFICULTAS.

Mulieri difficultate mensium actu fluentium doloribus vagantibus & lancinantibus in omnibus artubus, iisque orbuticis, uti & hystericis abdominis pathematis afflictæ, cum scotomiis & Syncope, ita ut ab adstantibus moritura putaretur, ordinavi sequentem Mixturam:

R. ∇ fl. samb. \mathfrak{z} ij.

Ess. Castor. \mathfrak{z} ss.

~ Cochlear.

Θ *ci ana \mathfrak{z} j.

Lapill. Sr. præp. \mathfrak{z} ss.

Syr. cort. aurant. \mathfrak{z} vj. M.

Hauriebat cochleatim, unde insecuto dore longè melius habuit.

R. Ol. destill. spicæ.

succin. ana \mathfrak{z} j.

Mista illinantur scrobiculo cordis, plantis pedum, & aliquod guttæ vertici.

Ast cum ex mœrore & tristitia ob obitum mariti graviter affligeretur, cum summa rium prostratione, & aliquali anastasia, sic gte: Sie fühle kein Glied / und sey inner kalt / præscribendam:

R. ∇ Menth.

fl. samb. ana \mathfrak{z} ss.

Ess. ligni sassafr. \mathfrak{z} ij.

~ Θ *ci \mathfrak{z} j.

Cochlear. \mathfrak{z} ss.

Syr. seclotyrb. \mathfrak{z} ss. M.

Profuit equidem: sed propter inquietudes, diurnas pariter & nocturnas, ut & antates, præscribendam pulverem.

R. Lapill. Sr. præp. gr. xv.

Θ vol. succin. gr. vj.

Myrrh. gr. ij.

M. f. Pulvis.

Hinc melius habuit.

CASUS LIII.

SUFFOCATIO HYPOCHONDRICO-SPLENETICA, HYSTERICA ALIAS DICTA.

Mulier mediæ ætatis, subinde etiam citra manifestam causam, interdum ex prægressa iracundia aliquali, interdum ex dulcium esu, interdum ex terrore, &c. occurrit anxietates præcordiorum, ipsi explicabiles, es wird ihr so weichlich nbs Herß: quibus mox copulantur scotomie leves, hinc vomendi conatus gravis, sed inanes, ast omnia symptomata re exasperantes: superveniunt enim

hinc borborygmi & murmura abdominis vaga, interdum cum lancinantibus, levibus licet, abdominis doloribus: permutantur hæc invicem, ita his urgentibus, donec præcordiorum anxietates mitescant, his vero recurrentibus, illa abdominis pathemata ferè cessant: complicatur respiratio difficilis cum his turbis, ita ut circa hypochondriacas regiones se stringi quasi ac inde respirationem sufflaminari sentiat. Dolor obtusus, gravativus, contundens, perquam molestus, sæpius in profundo hypochondrii sinistri percipitur, qui sub istis turbis exasperari unà observatur. Malis his gravius urgentibus, syncope interdum supervenit, cum sensuum & motus corporis abolitionibus, adeo, ut mortue instar non raro aliquamdiu jaceat. Sinistrum latus totum, cum brachio & pede interdum in paroxysmo quasi stupet, interdum verò tenduntur manus & pedes, & violenter exporriguntur. Ructus subinde edit in paroxysmo. His & similibus, nunc diutius, nunc brevius, durantibus, redit successivè ad naturalem statum, appetitu dejecto, siti aucta, omnium partium lassitudine, aliquamdiu adhuc affligentibus, &c.

RESOLUTIO.

Utut affectus præsens epileptici cujusdam insultus, ex splenis vitio oriundi, speciem primâ fronte præ se ferre videatur, attamen quia notum, idque experienciâ creberimâ observatum est, quod Passiones hystericæ tandem, atrocibus stipatæ symptomatis, invadant sexum sequiorem, ideoque & hic affectus atrocissimus, qui est Strangulatus uterinus vulgò dictus, Suffocationis Hypochondriaco-Spleneticæ nomine dici omnino merebitur.

Pars affecta primaria, respectu convulsionum non, prout vulgi quidem fert opinio, erit uterus, qui hac in parte insons, sed potius plexus nerveo-lienaris, qui convulsus, ratione consensus tam continuitatis quàm contiguitatis cum aliis partibus vicinis, tantas in corpore nostro excitat turbas: deinde respectu acidi seu effervescentiæ vitiosæ succi pancreatici & biliosi erit continuus intestinorum tractus.

Causæ proximæ formalis efficientis vices sustinet depravatus & perturbatus spirituum animalium motus, qui hic primariò in plexu nerveo lienari, ab acidi austeri pontici inimicâ vellicatione irritati, in motus varios anomalous & inordinatos concitantur.

Ratione causæ materialis in passione hystERICA & symptomatis ejusdem peccat primariò acido-austerum, quod demonstratur

[Rr] 3 ex cau-

ex causis remotis, uti hîc ex dulcium esu, quatenus nempe dulcia facilè cum acido austero fermentationes præternaturales concipiunt & accescunt; unde flatus & pathemata reliqua abdominis etiam in casu nostro proximè dependent, ac derivanda veniunt.

Causas inter remotas eminent animi pathemata, uti & hîc iracundia saltem levis, quatenus nempe per hanc insignis humorum omnium in corpore nostro contingit confusio & orgasmus, quò ipso etiam simul in actum deduci potest dictum modò acidum austerrum, & hinc quæ dependent, varii generis symptomata: Deinde inter alia sibi maximè nociva, & affectui huic quæ ansam præbent, refertur etiam terror, quatenus nempe hic vel maximè prosternit spirituum motus naturales & ordinarios, nec sanguinis circulum humorumque corporis nostri, plus minus impedit ac sistit, &c.

Nimirum fomes omnis mali primariò hæret in acido austero, quod acidum, datâ causâ procataracticâ, vitiosæ effervescentiæ suæ motu innumeras ferè, imò inexplicabiles ipsis ægrotis, subinde infert molestias, quod & hîc fieri, nemo forte inficias ibit. Nempe ab acido hoc, in primis viis dum adhuc est, tempore invasionis proximè deducendæ veniunt anxietates illæ præcordiorum, quatenus scilicet acidum pancreatis austerrum cum bile vitiosè effervesceat, ex qua effervescencia tertius aliquis sapor insipidus & inexplicabilis resultat, hinc rectè dicit ægra nostra: *Es werde ihr so weichlich umbs Herze.* Cui postmodum anxietates illæ præcordiorum junguntur, propter orificium ventriculi malè exindè affectum, & variis spasmodis exagitatum, hinc vomendi conatus graves, sed propter materialis cujusdam causæ defectum inanes, motibus tamen hisce gravibus reliqua symptomata mirè exasperantes.

Continuato sic convulsivo intestinorum motu, accedunt flatus, ab acido austero effervescente enati, qui conclusi, ac variè agitati, tumultuoseque aberrantes borborygmos, murmura & sonitus repræsentant, interdum cum lancinantibus ab acidi rosione abdominis doloribus.

Quod verò permutentur inter se invicem, ob nervos plures, ex uno plexu diversimodè distributos, fieri existimo; prout enim hi modò huc, modò illuc pergunt, ita etiam pathemata in partibus diversis variant, adeò ut nunc in præcordiis, nunc verò in abdomine, dolores varii generis percipiantur.

Devehimur itaque nunc continuo hoc tractu spasmodico ad plexus mesentericos, & lienares in specie, propter dolorem obtusum, gravativum, &c. in profundo hypochondrii sinistri perceptibilem, quorum consensus

cum reliquis partibus dum est maximus, hinc fit, quod convulsis hisce nervis, simul in consensum rapiantur etiam nervi paris vagi & intercostalis, unde ex connexione nervorum varii convulsivi motus diaphragmatis & thoracis difficillimam reddunt respirationem, adeò ut hypochondria stringi quasi videantur. Hinc etiam propter variè turbatum spirituum animalium motum scotomiæ, spasmique quoque insignes cordis muscoli, unde ejus systole, & per consequens syncope cardiaca, cum sensuum & motus cujusvis abolitionibus, adeò ut mortuæ instar jaceat ægra nostra aliquamdiu. Supervenit his sinistri totius ferè cum brachio & pede stupor, interdum quoque tenduntur manus & pedes, & violenter exporriguntur, quod epileptici aliquid esse, & paraplegiæ speciem præse ferre, omninò videtur. Nimirum motus naturæ dum fit ad extrâ, continuâ scilicet spasmodicâ contractione nervosi generis, etiam externæ partes in varios gestus & motus concitantur, quatenus nempe acidum rodens tendinibus musculorum varias inducit molestias, spiritibusque animalibus motum plus minus liberum intercipit. Malum autem hoc, quia cum syncope, sensuum & motus cujusvis abolitionibus est conjunctum, mihi non videtur periculi expers, & nisi maturè ei occurratur, facili negotio posse in Epilepsiam habitualement, & consequenter lethalem degenerare.

Unde Curatio ejus meo judicio posset institui hoc modo:

1. Acidum vitiosum corrigendo & alterando, nec non flatuum proventus inhibendo.
2. Convulsionibus & spirituum motus inordinatos sistendo.

In paroxysmo externè naribus admoveatur sequens mistura:

R. ~ Oxi vol. ʒi.

Ess. Castor. vel asæ fet. ʒß.

M. D. in vase angustioris orificii.

Vel insuffletur naribus pro excitanda ægra sternutatorium aliquod forte ex pipere longo, helleboro albo, pyrethro, & castoreo, sed cautè; sternutatoria enim subinde malum reddunt gravius, & epilepsiam excitant genuinam, ideoque non, nisi in paroxysmo aut desinente, aut graviore.

Pro doloribus spasmodicis abdominis sedandis & flatibus discutiendis applicetur clystma:

R. Spec. carminat. M. ij.

rad. levist.

bacc. lauri ana ʒvj.

sem. anisi.

fenic. ana ʒij.

Incis. & contus. coqu. in f. q. Væ fontana:

Colaturæ lbj. adde

Elect.

Suffocatio Hypochondriaco-Splenetica, Hysterica &c. 319

Elect. de bacc. lauri ʒiſſ.

Castor. ʒj.

Ol. destill. bacc. Juniperi
terebinth. ana. ʒj.

M. f. Clyſma pro duabus doſibus:

Umbilico imponatur ſequens:

Rx. Empl. matric. de galb. ʒv.

Theriac. Andr. ʒij. vel ſaltem ʒj. ut
emplatri conſiſtentiam retineat.
Malaxa c. ol. destill. ſuccin. & ſpicæ,
induc. ſuper *alutam* in forma con-
ſucta.

Pudendis etiam poſſet applicari, vel cum
ombace, vel litus forma, ſuaveolens ali-
quod:

Rx. Balſ. apopleſt.

Styrac. liquid. ana ʒſſ.

Zibethi gr. iij. M.

Balſamus hic, utur non ſit remedium cu-
atorium, ſaltem tamen eſt derivatorium,
pro ſpirituum motu inordinato refrænân-
o. Interne

Rx. ʒ fl. chamomill.

famb.

Puleg. ana ʒj.

hirund. c. Caſtor. ʒiij.

Liqu. C. C. ſuccin. ʒiſſ.

Eſſ. Caſtor. ʒj.

Laud. hyſter. gr. ix.

Syr. cort. aur. ʒij.

M. D. S.

Stillend Träncklein widerß Reiſſen.

Dofis cochl. ij, expectando madorem ſeu
andum ſudorem. Vel

Rx. Matr. perlar. præp.

Cran. hum. ſine igne.

Cinn. ʒii ana gr. xv.

ʒ vol. ſuccin.

Camph. ana ʒſſ.

Laud. opiat. gr. ij.

M. pro 2. doſibus,

in ʒ *hirund. c. Caſtor.* porrigendis.

Extra paroxyſmum pro metu recidivæ
declinando:

Rx. ʒ hyſſopi

Meliſſ.

Puleg.

antiſcorb. ana ʒvi.

ſol. & c. ſucc. pom. ʒiij.

~ Cochlear. ʒiſſ.

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. ſcelotyrb. For. ʒiij.

M. D. S.

Præſervirend Träncklein alle Morgen
und Abend 2. biß 3. Löffel voll
zu nehmen.

el *Rx. Liqu. ʒis ʒar.* ʒiij.

ʒæ ſol. ʒi ʒiſſ.

M. filtretur R rubra. D. S.

Sonderliche Tropffen 8. biß 10. pro doſi.

Deinde acidum blande ſubducentibus
& reſolventibus res erit agenda:

Rx. G. ʒci in ʒo ſol. ʒſſ.

ʒli ʒis gr. v.

Extr. Caſtor. gr. iij.

Troch. alhand. gr. iij, vel *Extr.* gr. iſſ.

Cum *ol. destill. ſuccin. f. Pilulæ:*

D. S.

Pillen auff einmal.

Vel fiat nodulus blande laxans & alterans:

Rx. Com. abſinth.

ſumm. cent. min.

Hb. Meliſſ.

Puleg. ana Mſſ.

rad. gentian. ʒj.

Zedor. ʒſſ.

helleb. nigr. crud. ʒiij.

esulæ non præp. ʒiſſ.

Fol. ſennæ ſ. ſt. ʒj.

• Coſti Arab. Veri. ʒiij.

ʒ ʒi. ʒſſ.

Incif. & contuſ. includ. nodulo.

D. S.

Püſchel in Wein zu hängen.

Rx. Empl. de Nicot.

ran. c. ʒii duplo ana. q. ſ.

Malax. c. ſ. q. ol. ʒi ſætid, aliquoties
ſuper C. C. uſtum rectificati.

Applicetur ſine ſyndone.

C A S U S LIV.

HÆMORRHAGIA UTERI.

Mulier juvenis 23. annorum, ſucci ple-
na, habitus corporis mollioris & car-
noſi, ſexto geſtationis menſe gravida, occaſio-
ne terroris patitur abortum; ipſa in omni-
bus mediocriter ſe habente, convaleſcit.
Jam, cum frigori externo incautiùs ſe ex-
poſuiſſet, quartâ ab abortu ſeptimanâ, poſt
graves dolores abdominis lancinantes, &
ad pudenda evagantes, copioſa ſuperve-
nit uteri hæmorrhagia. Sanguis, qui
primò prodit, floridus & eleganter tin-
ctus eſt, poſt aliquot dies idem fluxus eo-
dem modo continuat, ſed ſanguis, qui
profluit, tenuior & ſeroſior exiſtit, diu
nocturne profluens: cum quo hoc ſimul
patitur incommodi, ut ſubinde lancinan-
tes graves abdominis adſint dolores, ad
ilia qui protenduntur, quos ordinariò
major ſanguinis excipit impetus. Ipſa,
cum ultra 5. hæc pertuliſſet ſeptimanas,
imbecillis admodum & pallida fit, ſitis
intenditur, appetitus ceſſat, & maculæ
crebriores purpureæ, quæ crura aliàs &
brachia tinxerant, undique evaneſcunt.
Varia tentat pro levando malo, ſed quæ-
libet

libet frustra. Ipsa ergo anxiosa urget remedium. Vetula consilium suggerit, ut capiat folia quercus, eaque aquæ ferrariorum incocta clysteris forma utero injiciat & ita fluxum sistat: sed ipsa gravioribus doloribus abdominis deorsum tendentibus afficitur. Supervenit cephalalgia insignis, cum scotomia, quoties caput attollere tentat.

RESOLUTIO.

Affectus est Uteri Hæmorrhagia, in qua spiritus impetum facientis quidem vis ac vigor ubique, & naturali & præternaturali in statu, probè considerandus venit. Hic enim, uti primus sæcundat ova, ut exinde fiant corpora, & in corporis structura maximè activus est; ita & postmodum in corpore vivente omnium actionum, tam naturalium quàm præternaturalium, unicus & primarius autor est. Sed hoc ipsum intelligendum est non exclusivè, quasi contenti succi, & partes corporis continentes organicæ, simpliciter & purè passivè se haberent, ita ut dictus spiritus impetum faciens, ceu elater in automato nostri corporis, unà cum reliquis rotulis, & partibus organicis ceu instrumentis, & partibus liquidis cum succis fundamentalibus operationes suas exferat. Recte, dicunt: hunc spiritum esse elaterem, sed tamen, uti spira & elater ceteras rotulas requirit & conformationem organicam, ita & hic etiam requirit & partes organicas tanquam instrumenta mechanica, & succos tanquam fundamentales liquores nostræ machinæ. Hinc dictus spiritus sanguinem circulariter moveri cogit, sed mediante organica cordis & vasorum structura: Idem spiritus spasmos varios excitat, sed mediante fibrarum certa mechanicâ texturâ, & mediante irritatione partis cujusdam sensilis: Idem spiritus hæmorrhagias excitat, sed mediante vel anastomosi, vel diæresi vasorum, ab acrioribus humoribus facta; hinc scorbutici hæmorrhagiis admodum obnoxii non tam præcise spiritus moventis vitio, quàm sanguinis serosi acrioris culpâ; hinc ruptis vasis in abortu, aut incisus iis in vulnere, idem spiritus movet sanguinem, sed vitio organi, non impetu proprio: sicut idem spiritus foetum pellit non vi propriâ, sed mediantibus spasmis uteri. Scilicet plausibiliter magis quàm scientificè proponuntur talia, & nominalem cognitionem, non verò realem scientiam, faciunt. Unde ex omnibus his Practica Indicatio nulla hauriri potest.

Pars affecta in genere est uterus, subintelligendo simul vaginam ejusque vasa, ita tamen, ut ille non sit constitutus in statu naturali, sed quatenus ex prægresso abortu insignem læ-

sionem præternaturalem passus est. Nam certum est, quod sæminæ longè periculosius laborent sub abortu, quam sub partu legitimo; hinc frequenter mulieres ab abortu planè steriles factæ sunt, imprimis si primipara abortum patiat, læso tono uteri, & viriatâ conformatione membranarum. Unde prægresso abortu læsus est uterus ob violentam placentæ avulsionem, præsertim, quia factus est abortus sexto gestationis mense, ubi magis adhæret, hinc ordinariò sub abortu, sicut ægra nostra, graviores hæmorrhagias uteri patiuntur, quàm sub verò partu; qualis fluxus nimius non raro etiam fit in nono gestationis mense abortientibus; &posito, quod post abortum non tanta hæmorrhagia sequatur, primâ tamen menstruatione à partu gravius eandem experiuntur, propter violentam placentæ avulsionem. Accedit, quod ægra nostra suscepit frigus externum, quod utero, ex avulsione placentæ jam dum læso, ceu parti membranaceæ & nerveæ admodum hostile extitit, multo magis quia jam læsus est speciatim isto tempore, quò aliàs reditum menstruorum naturalem expectavit; quæ tria non possunt non gravem uteri hæmorrhagiam inferre.

Ex hoc sponte sequitur Causa proxima, quæ, præsupposito ~u vitali & animali, tanquam elatere nostræ machinæ, copiosior inde sanguinem ad uterum movente, est primariò læsio & irritatio ipsius uteri, eaque speciatim tempore ordinariæ menstruationis contingens, unde irritatio vehementior, occasione cujus, cum sanguis circa uterum spontè evacuari debet, ceu spinâ quadam, inductus est concitator spirituum impetus, hinc fibrarum & partium vicinarum spasmus & crispatura, adeoque sanguis violenta retentio, tandemque per vasa antea lacerata uberrima excretio facta fuit. Accedit & hoc, quod ægra in principio quidem sanguinem floridum, sed postmodum serosiorum & aquosiorum excreverit, quod innuit, ipsam ægram sanguine minus consistente, sed aquosiori & serosiori, forsam labe scorbuticâ inquinato, præditam fuisse, adeoque interveniente abortu sub tali spirituum impetu sanguinem & ipsum serosum, cessante etiam stimulo, per aperta vasa spontè effluxisse. Scilicet in diuturniore menstruatione considerata est vel sensilis circa uterum irritatio, occasione cujus ceu spinæ circa uterum infixæ, vel habitudo sanguinis serosâ acriorque, ratione cujus etiam spontè effluit sanguis, & coalitionem vasorum impedit; inter quæ duo semper unum observavi in hæmorrhagia uteri, tam menstruali, quàm lochiali. Ac apud nostram utrumque occurrit; quippe adest stimulus sensilis

filis ex utero læso à frigore, hinc tales dolores lancinantes, ad inguina usque prodeunt, perferunt, quos sequitur uberior sanguineffluxus, in quo casu dicunt: *es zeucht it nach dem Schoosse* / quia eundem tales dolores occasionaliter excitant: quod verò magis exasperetur hæmorrhagia, fit propter um sanguinem serosiores & aquosiores. ne frequenter in difficili menstruatione ta dolores lancinantes etiam in lumbis & regione umbilicali oriuntur, qui junctim ad interna descendunt. Ipsi dolores parturientum sunt spasmus uteri, circa os sacrum firmiter annexi, ratione quorum tales dolores iunguntur mulieres sub partu.

Hujus irritationis aliàs variæ sunt causæ; ne enim vellicat uterum frigus externum, ne aliquid retentum, quale in puerperis et, vel frustulum secundinæ, vel membranæ cujusdam tantillum, ubi secundina adfit utero, eidem adhuc annexæ; nunc retri sanguinis grumi, qui talem hæmorrhagiam inferre possunt; nunc ulcus in vagina, aut orificio ejusdem interno; nunc exiatio in loco quodam uteri, à sanguine iori facta, & similia: quæ omnia ex causis ecedentibus colligantur.

Fœtus si debet esse septimestris, semper beat vestigium imperfectionis, vel circa iculas, vel circa ungues. Ordinarium tus tempus est, quando non à vice ordinamenstruatio debuisset instare: Nam sub ipore partus est idem motus in massa sannea, & spiritibus, qualis est in menstruanis periodo seu accessu. Excitatur hic imus etiam occasione uteri, à fœtu grandiorritati.

Quoad Causas remotas, à quibus uterus itur & irritatur: illarum hic duæ se offe-

1. Nempe abortus vasa dilacerans; hinc
2. Susceptum post hunc frigus.

Quoad abortum; ille occasione terro-
qui una est ex frequentissimis causis abor-
fuerat inductus, ubi sub terrore, sup-
esso quasi spirituum animalium impetu, re-
catus uterus non amplius fœtum retinet;
in & hic syncope quasi correptus, & viribus
stitutus, spontè deorsum ad uteri orificium
ergit, *es senket sich in den Schooss*: fœtus
gò in minus convenienti situ constitutus,
erum afficit, cumque, licèt sedatâ terro-
impressione, vellicando irritat, hincque
ntractivus ejusdem nisus expellendi, adeo-
e fœtus exclusio, supervenit; imò hanc
itur violenta placenta abruptio, & læsio
rum uteri majorum, qui læsus etiam cò-
onitur, ut postmodum levi occasione
trahibilis reddatur, & in novum spasmum
citetur, atque his ex causis abortum mul-
Tom. II. Pars 2.

tò atrociores hæmorrhagiæ comitantur, quàm in ordinario partu.

In nostro casu omnia symptomata fue-
runt leviora, exacerbata tamen occasione fri-
goris, quod ipsum susceptum utero mem-
branoso & nerveo admodum hostile, quod
in utero antea læso & facile in nixum convul-
sivum irritabili facile vulnus quoddam antea
factum refricavit, hinc symptomata exacer-
bata, sicque tempore præsertim ordinariæ
menstruationis, dolores lancinantes abdo-
minis, ab irritatione spasmodica, postmodum
hæmorrhagia, accelerati sunt. Nam non
saltem parturientibus frigus nocet, ubi post
partum sanguine in grumos coagulato, ejus-
demque excretionem sufflaminatâ, abdominis
uterique inflationem incidere eadem obser-
vantur, ut putent, se adhuc gestare infan-
tem, quod à solo post partum admissio aëre
fit, unde lochia impediuntur; sed etiam, si
abortientes aut menstruantibus frigus obrepit,
mille malis illas mulctat; sicut in his sangui-
nem coagulando, hujus effluxum sistit. Inte-
rim tamen, utut frigus impediatur excretionem
sanguinis, in ægra tamen nostra frigus, irri-
tando uterum, fluxum ejus promovit; ubi
in causa est conditio sanguinis aliâ: sicut enim
eo in statu, ubi sanguis actu fluit & naturaliter
est constitutus, facile grumescit à frigore ac-
cedente, & sic ejus excretio sistitur; ita si is
non actu fluat, interim tamen in via est ad
uterum, tunc uterus à frigore irritatus ube-
riorem patietur sanguinis affluxum, præser-
tim si hic fuerit serosior, cumque largius
profundet.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosin; ea est satis anceps;
etenim & curari ægra potest citra imminens
vitæ periculum: sed & profusissima facta hæ-
morrhagia etiam vitam ipsam cum sanguine
de facili exhaurire valet. Interim si illa facile
poterit sisti, facilius quoque aderit spes re-
convalescentiæ; sin verò diutius duraverit,
tunc, prægresso œdematoso tumore pedum,
de hydrope certi esse possumus. Aliàs nul-
lum periculum imminet.

CURA.

Quoad Curam: in ea unicum hoc ur-
get; nempe ut sistatur nimius sanguinis pro-
fluxus, quod peragitur per sequentes Indica-
tiones: si

1. Irritationes sensus circa uterum, &
consequenter vicinas partes membranosas, le-
niatur; cessante enim stimulo, velut spinâ
evulsâ, cessabit impetus spirituum animalium,
& consequenter nimius affluxus sanguinis ad
uterum.

2. Si utero inductæ læsiones sensiles cor-
rigantur, quæ molestiæ uterum afficientes sunt
partim violentæ læsiones utero inductæ ab

[Ss]

abor.

Observavi tamen in hæmorrhagia nimia, huic non cedere liquorem Martialis, qui vi suâ vitriolicâ nimium men- & lochiorum fluxum sistit & adstringit, ficientem vi Martiali excitat. De priori ota est; de posteriori multa curiosa ob- vi experimenta: & quidem nimix hæ- thagiæ cura, beneficio liquoris hujus: Martis solaris præstita, est sequens: ex quædam ingenua patiebatur nimium orum fluxum, etiam ubi jam puerpe- ferè esset sublatum, & ipsa tenellum nu-; hinc feci experimentum, & hujus li- is gutt. xij. ad xv. per aliquot dies jussi as- ndas; hinc factum, ut strictus fuerit is, fluxusque cessaverit.

Cæterum præter hæc interna, simul & na in usum vocanda sunt, eaque specia- quia dolores abdominis graviter lanci- es adsunt, à quibus intenditur fluxus, onsensum uteri & membranarum cum bus vicinis simul convulsis. Jam verò illa nec adstringentia, nec quoque re- rantia, prout quidem communiter ad- ntur, quæque saltem in uteri hæmorrha- ex anastomosi vasorum, aut orgasmo inis enata, locum inveniunt; quin is in nostro casu propter læsum uterum da aromatica, utero amica, quæque estum irritationis sensum blando sui at- sopiunt, & hinc spasmodorum & excre- s impetum tollunt, adhibenda sunt; i quoque ratione ac vomitum nimium nè aromaticis sistimus, stomacho ap- priatis & gratis applicatis; adeoque ap- anda regioni umbilicali emplastrum ma- le de galbano, vel emplastrum ex taca- aca, &c. malaxata cum oleis vulgaribus, nomillæ & anethi, per infusionem & ionem paratis, non destillatis; hæc enim is acria sunt. Vel etiam convenit em- rum illud, quod alias ad quovis uteri res expertum est:

2. *Galbani.*
Terebinth. ana ʒj.
sevi Cerv.
Adip. Porc. ana ʒvj.

Liquefacta invicem, illinantur calidè umbilicali regioni, & locis vicinis, im- pondo desuper laterem blandè calefactum, uteri dolores sisti possunt.

Vel horum loco simpliciter Theriaca plastriformâ umbilicali & hypochondrio- i regioni imponatur; nam etiam hac ra- tie hæmorrhagia ægræ nostræ sistetur.

Tom. II. Pars 2.

CASUS LV.

CHLOROSIS INCIPIENS CUM VO- MITU INVETERATO MATUTINO, ET TETANO CERVICIS.

*M*ulier 32. præter propter annorum, formæ aliàs integræ, constitutionis sanæ, vegetæ ac succi plenæ, natione Ita- la, postquam per 12. annos marito sano ac robusto nupta feliciter cum eodem vixisset, & aliquot liberorum mater facta fuisset, illo sibi per mortem intempestivè crepto, incidit paulò post in vomitus enor- mes, periodicè singulis diebus apparente aurorâ invadentes, perque duas horas durantes, tanto quidem cum impetu, ut hoc cessante cervicis tendines adeò ten- derentur, ut quasi tetano correpta per aliquot horas non sine dolore multo illius partis & totius capitis torqueretur. Ipsa antea floridæ faciei evadit nonnihil pallida, ipsis etiam labiis nativum colo- rem perdentibus. Mala hæc jam per in- tegrum annum eam mirum in modum cru- ciarunt, mensibus semper ordinatim, li- cet nonnihil parcius, fluentibus. In ab- domine ac circa hypochondria rectè se ha- bet. Plures Medicos consuluit, pluri- morum consilia collegit; frustrâ omnia ha- bñus, quicquid etiam remediorum ad- hibitum fuerat.

RESOLUTIO.

Affectus noster est saltem Incipiens chlo- rosis, ex qua tandem posset fieri perfectâ. Primariò autem affligit vomitus cum tetano cervicis. Chlorosis autem est species cachexiæ, à qua illa differt ratione fomitis morbofi primarii, qui in chlorosi investigandus est in genitalibus, si non testibus præcisè, saltem utero & prostaticis glandulosis: in cachexia autem vel in stomacho, vel in felle, vel alio loco.

PARS AFFECTA.

Pars primariò affecta in nostra ægra sunt genitalia, ubi & radix mali. Probant hoc an- tecedentia, nempe ægra vidua est, natione Itala, & habuit antea maritum robustum. Interim ratione symptomatum affligentium sedes est stomachus & primæ viæ, quatenus nempe hæ partes vel mediante sanguine vel lymphâ inquinamento illo corruptivo sunt in- fectæ, unde vomitus, tetanus cervicis, &c. Et quidem cum vomitus hoc in casu diutur- nus affligat, ultra annum jam durans, proin- de ejus causæ, quarum duæ dantur, quæren- dæ sunt vel in vitio aliquo conformationis stomachi, vel partium vicinarum, vel in mensi- bus non ritè se habentibus; ceteræ enim præ- ter has causæ, v. g. chylosis læsa, possunt dare

[Ss 2] vomiti-

vomitum diuturnum, sine præsentaneo ægri periculo. Et quidem quoad priorem causam: sanè vomitum admodum diuturnum observavit Barbette ex corruptione & iphacelo pancreatis ob consensum stomachi: sicut ex herpete stomachi idem symptoma notavit Pannarollus *Pentec. 1. Observ. 43.* nec non ex genuino steatomate, utrumque orificium ventriculi obsidente, Rhodius *Cent. 2. Obs. 63.* Vomitus ex pyloro scirrhus vidit Salmuth *Cent. 1. Obs. 20.* ex ulcere Hildanus *Cent. 5. Obs. 36.* ex fistula Schneiderus *de Catarrh. special. pag. 439.* ex gangrana Balonius *lib. 1. Consil. 43.*

In vomitu ergò contumaci, asserente Bartholino *in Exequ. Hepatis*, semper considerandum est, an scirrhus aliquis aut simile quid in stomacho aut circa pylorum hæreat, malum dictum inferens? omnes enim ventriculi morbi organici, v. g. tumores, vulnera, ulcera, &c. ad vomitum stimulant.

Quoad posteriorem causam, ea hic locum invenit; in nostra enim ægra nulla sunt vitia conformationis. Interim tamen mensium vitia suspicionem præbent radice morbo, quæ procedit ex genitura vitio.

Igitur Causa proxima non est chylus latus, quin potius hic erit effectus & productum morbosum, qui vi morbi vitium contrahit: v. g. sicuti in gravidis superveniunt crebri vomitus, quorum causa proxima chylus corruptus non est, sed chylus corrumpitur, quatenus stomachus malè afficitur; ita etiam hic, nisi stomachus malè haberet, etiam chylus pravus non rejiceretur. Causa ergò proxima nostro in casu est corruptio & vitium genitura muliebri.

Causæ remotæ sunt.

1. Deficiens Veneris exercitium.
2. Tristitia.
3. Itala, quæ natio reliquis est salacior.

Dum verò Veneri adlucta subito eandem desuescere cogitur, tristitia supervenit, unde omnes excretiones sistuntur, hinc genitura antea excretæ corruptio infertur, & dein per consequens ex genitura illa retenta & alterata plus minus corrupta, vitiata stomachi digestio, & hinc chyli corrupti rejectio supervenit.

Observetur autem, quod casus hic desumptus sit ex *Valetud. Deodati pag. 171.* cui similes alii passim prostant, v. g. Hildano *Cent. 4. Obs. 32. pag. 316.* ubi allegat moniales, subinde ejusmodi vomitibus continuis obnoxias; non secus ac quoque viduæ salaciores, vitæ aliàs adjectæ, idem fatum experiri solent.

In hoc ergo casu proximè accusanda venit aura aliqua virulenta seu singulariter corrupta, ex genitalibus exspirans. Nam cum

notum sit, quod in statu naturali aura quædam genitalis sub pubertatis annis tam masculos quam foemellas singulariter immutet, ut in orgasmum Venerium ferantur, qualis aura etiam orgasmum in ipsis brutis, v. g. cervis, certo tempore concitat; quidni ergo similem auram ex genitura corrupta elevatam præternaturaliter corpora quoque nostra alterare & immutare probabile sit? adeoque peccat aura genitura corruptæ, non autem ipsa genitura; quippe quæ semel circa genitalia elaborata, non amplius potest retrocedere, propter pororum certo modo figuratorum impedimentum, quia per eas vias, per quas liquor secerendus fuit ingressus, non potest retrogredi, cum pori spectent intrò foras, & ad instar valvularum se habeant, quæ omnium humorum excretioni dicatarum in corpore nostro lex est, quod nempe nunquam ii per ea loca, quibus semel intrarunt, regredi observentur. Jam verò pari ratione genitura ista elaborata in partibus dum hæret, & justo tempore non excernitur, non potest tota regredi propter conformationem pororum dictam: ergò saltem ex eadem corrupta, subtilissima quædam aura seu substantia odoris ad instar retrogreditur, & in corpus distribuitur, idque fit vel mediante sanguine per venas, vel mediante lymphâ, quæ ex genitura utriusque sexus retrocedere observatur per venas & vasa lymphatica. Per utrumque horum aura talis ex genitalibus potest resurgere, & in corp⁹ nostrum distribui.

Ac locus quidem, unde elevatur aura illa virofa, potest esse vel ovarium, seu testes muliebres, vel ipse uterus, vel denique prostata glandosa. In ovario, notante hoc Kerckringio, non est suspicio, quod genitura possit coacervari, quia retrocedit per tubas ad uterum, & menstruo tempore foras excernitur; suspicio potius est, quod sit liquor ille seminalis, qui aliàs foemellas ad libidinem stimulat, & tam in prostaticis glandosis, quàm in glandulosa uteri substantia hæret. Et mulieres, dum maximam percipiunt titillationem, saltem percipiunt voluptatem circa prostaticas glandosas, quæ tunc lympham tenuem plorant, non autem percipiunt voluptatem in interioribus uteri. Liquor hic vocatur genitura, auramque illam in corpus exspirat, quæ subtilis & virofa existit, & dat dicta pathemata.

Jam porrò quaeritur: qualis aura illa fuerit? Resp. retentum liquorem illum seminalem, debite functioni genitali aliàs inservientem, non manere in statu naturali, sed ad modum reliquorum humorum excernendorum retentorum alterari vel in melius vel in pejus. In meli⁹ non, quia jam est elaborat⁹, ergò in pejus, & quidem hoc modo: scilicet cum genitura illa mulierum, non sec⁹ ac virorum, naturaliter dependeat à chylo, ita tamen, ut sit spirituosa, specia-

speciatim spiritibus animalibus perfusa, hinc, illa diutius nimis retentâ, spiritus disperguntur & pereunt, unde materia relicta spirituum defectu ad corruptelam, putredini proximam, vergit; sub qua putredine inchoata, dum emergens alcali volatile agit in oleum seu lingue, oritur hinc odor praviter foetens seu virosus; hujus odoris existentiam hirci, à Venere diutius abacti, confirmant, utpote, qui nisi crebrius ad Venerem admittantur, alium odorem virosam spirant, ex inchoata genitura putredine. Ex tali odore canes invicem cognoscunt, an canis alter sibi obveniens mas vel foemina sit? hinc foemellæ odore suo Venereo procos alliciunt. Certum ergo est, foemellas sub libidine insignem odorem spirare ex genitalibus versus interiora corporis, quò insigniter alterantur. Dita ergo genitura corrupta aura, quia instar odoris se habet, hinc etiam subtilissima & activissima est, adeoque rectè fermentativa vocari poterit. Fermentorum enim hæc natura est, ut in minima etiam mole maximè sint activa & alterativa, & in mole, secundum quam instar odoris se habent, summè efficacia, adeo, ut post lumen & lucem nil magis activum & penetrantius in natura occurrat, quam odores; unde eosdem per lumen & lucem explicat Kerkringius *Spicil. Anat. pag. 39.* Hinc Helmontius fermentorum naturam, activitatem & volatilitatem, ex odores explicat, quatenus scilicet nil magis activum est, quam minima ista, quæ odifera sunt. Interim fermenta illa sæpè odores cæcos vocat idem, per quos intelligit subtilissima effluvia, instar odoris quidem agentia, nulli tamen sensuum organo receptibilia: Sic enim e.g. quando quis naturaliter abhorrens feles, intrat in conclavem, ubi recondita est felis ipso nescio, mox pothymiam & sudores frigidos experitur, & mirabiliter alteratur, propter minutissima felis effluvia: hinc non suspicandum est, in rebus naturaliter esse fermentum adeo visibile, transmutans serum sanguinis in urinam, sed illud saltem se habere instar odoris: sicut etiam fermentum stomachi non est liquor quidam, sed subtilissimus halitus seu spirituosus acidus odor. Quantum ergo odores valeant, testatur tantillum moschi vel ambrae, quo chirothecæ impregnantur, quò tam mirè alterantur quædam foeminae hystericæ: sic quædam, juxta Amatum Lusitanum non possunt ferre odorem rosarum, &c.

Jam quæritur: quomodo hoc faciant odores? Resp. quatenus in iis integra misti crasis sub tam minima mole concentrata latet, sub sulphure nempe à sale volatili resoluta & explicata; sunt enim nihil aliud, quam sulphur concreti sale volatili resolutum. Ita si-

quidem odor castorei, omne, quod in castoreo reperitur, continet; & odor alienus vas imprægnans, omne vinum aut aliud contentum inficiendo corrumpit & alterat: non secus ac aceti cæcus odor lac insulsum transmutat: sicut contra vasa vinaria sulphuris fumo imbuta vinum à corruptione præservant: simili ratione minimum contagium illud, quod à Venerea lue ex genitalibus, &c. in corpus sanum derivatur: qualis odor est, qui ex manu aut chirotheca unius scabiosi in non scabiosam transfertur. Quæ omnia illustrant, similem quasi hircosam auram in nostra ægra, ex genitalibus per sanguinem aut lympham refluendo in massam sanguineam distributam, inquinando corpora nostra, originem posse esse variorum effectuum: adeoque sæpe minimum est, quod in morbis causæ morbificæ rationem habet, cujus texture corruptione & distractione subinde morbi curantur.

Dixi supra: miasma affluere ex genitura corrupta minima aliquod, & sub minima sui mole integrum corpus inquinare. Jam ergo quæritur: in quonam specialis salinæ volatilis oleosa auræ differentia consistat, ob quam in specie in nostra ægra stomachus vellicetur & vomitus excitetur? Respond. Fit hoc, quod ipsum fermentum ventriculi consistat in odore quodam acido, unde, sicut nil magis ventriculo gratum est, quam blandum acidum; ita eidem quæcunque, & per consequens aura & odor putridus geniturae corruptæ infestus est: quod experimur etiam circa loca putrida obambulantibus, *da einem bald umbs Herz so weichlich wird.* Si ergo tale quid nobis à rebus extra corpus constitutis obvenire potest, quidni & idem à corruptis in nobis contentis sperandum esset?

Sed dubium occurrit: quare speciatim matutino tempore vomitus superveniat: Interdiu, dum comedit ægra, noctu modice se habet, vesperi pariter, & dormit: at dum vesperi, chylo non ritè digesto, superingeruntur alimenta nova, manè hinc evigilans vomit, quia stomachus cruditatibus nidorosis, ex ingestis non ritè digestis, repletus est, unde irritatur pylorus à cruditatibus, & constringit: postmodum evacuatis excrementis aut recrementis stomachi, interdiu se melius habet: Capit igitur alimenta, quæ sub quiete nocturna iterum corrumpuntur, unde vomitus repetit, & sic porro. Hæcque tragœdia quotidie peragitur, canque miserè exercet.

Pallor ex defectu spirituum & alimentorum ob continuum affectum oritur.

Quoad Tetanum, ægra nostræ molestum; ille nil aliud est, quam spasmus musculorum cervicis, caput flectentium, & per quendam

consensum ob generis nervosi nimiam irritationem, hinc circa principium nervorum ex spinali medulla afflictorum: non secus atque ex eodem fonte cephalalgia, affectus convulsivi & paralytici, derivandi non raro sunt. Dolet ex violenta strictura & crispatura tendinum.

RESOLUTIO.

Quoad Prognosin: malum anceps & difficile curatu est, præsertim cum illud jam per integrum annum duraverit; unde metus est, ne suppressio mensium, hinc melancholia uterina, aut furor uterinus, item chlorosis perfecta, superveniat. Nullum aliàs vitæ periculum metuendum, nisi ægra ex tetano in gravem epilepsiam, sub qua interire possit, incidat: Itaque ocyus curanda.

CURA.

In Cura ergò hæ Indicationes locum habent.

1. Ante omnia vitium liquoris seminalis, & auræ hinc derivatæ corrigatur.

2. Massæ sanguineæ & lymphæ crasis vitata blandis purgantibus & diaphoreticis emendetur.

3. Si quid noxæ in stomacho & primis viis supersit, iisdem debitis remediis maturè prospiciatur.

Quoad 1. Opiata potius nocebunt, quàm proderunt in nostra ægra. Quemadmodum autem hic nocebunt; ita excellet camphora, quia in specie egregia est contra odores quoscunque morbosos fermentativos, ex putredine ortos. Cæterum, cum camphora sit sal volatile oleosum concentratum, ideò ob homogeneam naturam, se faciliè cum simili aura miscet, & putredinem hujus corrigit: quale ex fuligine oleum, camphoræ odorem spirans, parari quoque potest: sic retulit mihi Boyle, se aliquando casu ex fuligine parasse oleum, camphoræ quoad odorem simile; imò accepi ab ipso sal volatile oleosum maritimarum, quod camphoræ odorem repræsentavit.

Quæritur aliàs inter Autores de vi camphoræ antiveneræ, eamque negat Scaliger *Exercit.* 104. *sect.* 14. cui contrariatur Tachenius in *Hippocr. Chymico*: Lossius tamen in *Observat.* 16. *lib.* 3. refert exemplum virilitatis extinctæ solo camphoræ odoratu crebro. Ego autem camphoram non tam extinguendi, quàm refranandi impetus Veneræ virtute pollere puto, afficiendo scilicet immediatè spiritus animales influos, & vim generativam; ratione cujus potestatis etiam in deliriis prodest, & quandoque somnum, inebriando quasi, concitat. In nostra ergo ægra potuisset exhiberi tam in substantia, quam in potu ordinario, si crebrius incensa

in eo exinguatur, qualiter usurpatam contra furorem uteri proficuum fuisse testatur in Epistola quadam *Cent.* 2. ad Bartholinum Horstius Junior. In substantia verò exhibetur sub pulveris forma, unà cum nitratis & saccharo saturni: e.g.

℞. *Arcan. dupl. Myns.* vel *Di&ial.* 3ij.
Sacch. hni. vel potius *Cryst. min. hni.*
 ~u *Di* vel *acuat.* 3j.
Camph. ʒj. ad ʒss.
 M. f. Pulvis.

Capiatur pro 6. vel 8. dosibus manè & vesperi sub introitum lecti.

Interea ægra simul potu ordinario dista ratione camphorato utatur.

Pertinet huc etiam succus cydoniorum præsertim in affectibus stomachi à mensium oppressione.

Cum his etiam consultum esset, ut in principio larga venæ sectio, eaque repetita, institueretur, quippe quæ sæpè in affectibus Veneræis magnum habuit usum, notantibus Hildano in *Observat.* pag. 316. & Foresto *lib.* 28. *Observ.* 17. in *Scholio*. Quod confirmant vomitus mulierum gravidarum continui, sæpè ad 2. & 3. mensem usque affligentes, quique omnium optimè venæ sectione curari solent, omni quartâ septimanâ eam repetendo, & quidem menstruali tempore, & ad ʒss. sine noxa.

Cum his non inconsultum est inurere fonticulos coxis, non secus ac heic fonticuli in cruribus supra genua excitati prodesse, in specie si ægra ejusmodi nubere nequeat, vel nolit amplius nubere. Loco cujus etiam cucurbitulæ sacrificatæ, seu vicariæ venæ sectionis, substitui possunt, in pedibus tantum usurpatæ.


Præterea in initio curæ non inutilis foret purgatio, cum selectu instituta; adeoque præ cæteris hic convenirent helleborina & Mercurialia, nempe Mercurius dulcis, egregiè in ejusmodi affectibus confert, quippe qui simul visciditates maximè incidit, & crudos succos facit fluidos; nec vi putrefactivâ & colliquativâ succos corporis nostri afficit; quod probant recrementa, post hujus usum reddita, nunquam ita, ac quidem post assumpta purgantia ex vegetabilibus foetentia. Ergo

℞. *Extr. helleb. nigri* gr. xv. ad ʒj.
ʒii dulc. ʒss. vel gr. xv. ad ʒj. imò ʒss.
Scamm. ʒat. gr. ij. vel iij.
 Cum s. q. *ol. Camphor.* f. l. a. Pilulæ pro una doli.

Quibus propinatis altero vel tertio die venæ sectio administrari potest.

Remedia ex camphora & nitro mirè conveniunt; quibus porrò addendus est liquor verno tempore ex salicibus junioribus incisis colle-

collectus. Liqueur autem salicis detur omni mane & vespere pro lubitu, qui hic singulare quid in recessu habet, pro impetu Venereo, in sexu sequiori imprimis refranando; unde & idem in furore uterino specificum est. Adhuc conveniunt quoque succinata, si præsertim affectus convulsi urgeant, aut horum progressus impediri debeat, internè & externè adhibita, ut liquor cornu cervi succinatus, item oleum destillatum succini, magisterium, essentia, &c. præmissis universalibus. Myrrha etiam & myrrhata ad putredinem propter vim balsamicam non incongrua sunt.

Tandem nec Externa hic omittenda sunt, ut illa tam mensium & liquoris seminalis retentionem laxent, quam hujus corruptionem inhibeant, applicanda vaginæ uterinæ per instrumenta ac remedia commoda. Nempe primus autor talis instrumenti est Rhumelius *in seinen Deutschen Schriften* / & post eum Glauberus, quorum uterque jubet, instrumentum hoc  ligneum, superiori parte perforatum, loco pessorum veterum adhibere: & quidem ita, ut bombax cum liquore appropriato aliquo penetrante, v.g. spiritu salis ammoniaci cum calce viva, affusoque modico spiritu vini, parato, imprægnatus includatur, sicque instrumentum illud oleo aliquo, ut Chamomillæ, &c. vaginæ uteri intrusum, quò diutius, eò melius, retineatur, ut per foramina instrumenti se insinuet. Et sanè insignem hujus usum osmet vidi in juvenculis, defectu mensium, ut fluore albo, aut lochiis suppressis laborantibus, item in pruritu Venereo. Cæterum hic liquor specificari potest per myrrham, vel cecinum, vel camphoram. Sic aliud adhuc constat instrumentum, idque efficacius longe, estque illud phiole oblongi & tenuis colli, cujus capitulo drachmæ aliquot liquoris ejusdem volatilis appropriati, v.g. spiritus salis ammoniaci, infunduntur, hinc collo nteis obvoluto, & vaginæ uteri intrusæ, catulum phiole lenioris ignis carbonibus vel arenæ calefactæ imponatur, ut incaleseat, & spiritus atque sal volatile magis ætuetur, exitum quærat, & potentiùs penetret. Halius enim adscendentes resolvendo, incidendo, corrigendo, ac demum educendo humores noxios, ibidem stabulantes vel contentos, optimè operabuntur.

CASUS LVI.

RETENTIO LOCHIORUM, CUM URINÆ SUPPRESSIONE, ET DOLORIBUS POST PARTUM.

Mulier partu perquam laborioso, in

quo ab obstetrice ruditer tractata, filium enititur, quem difficilis & tarda secundinarum, earumque frustulatum discerptarum, exclusio sequitur. Hinc lecto imposita, altero mane graves abdominis lancinantes, & ad pubem usque protensos dolores patitur, repetitis, iisque crebrioribus vicibus recurrentes, similes partus doloribus. Dolet simul acerbissimè circa pubis regionem, ita, ut præ dolore tantum nonejulare cogatur. Lochia parvè fluunt, loturæ carniū similia, eaque pauca, urina difficulter redditur, tandemque penitus supprimitur. Ponderis sensum in abdominis regione hypogastrica intrinsecus sentit, versus genitalia prementis. Tertiâ demum die vocatur Medicus, qui ægram, præter enarrata, frigidiusculè circa extrema & frontem sudantem, cum ructu & singultu offendit, simulque pulsum celerem, frequentem, magnitudine & vehementia moderatum, durum nonnihil deprehendit.

RESOLUTIO.

Affectus præsentaneus est complicatus, cujus primarius morbus est Retentio lochiorum, secundarius suppressio urinæ, quibus accidentariò Dolores post partum superveniunt: quæ inter tamen lochiorum suppressio omnium periculosissima est.

Ratione retentionis lochiorum Pars affecta est speciatim uterus; ratione urinæ suppressionis vesica; & ratione dolorum partes vicinæ membranosæ cum nervis contiguae, quæ ex sensu molestiæ irritantur, hinc dolores lancinantes ex earum spasmò oriuntur.

Fundamentum totius rei consistit in uteri irritatione, quatenus secundina ob sui putredinem irritat. Frustula enim secundinæ relictæ potiùs nimiam hæmorrhagiam uteri, quam suppressionem lochiorum inferunt, quibus nempe ad corruptionem putredinalem labentibus uterus ab objecto tali molesto irritatur, crebriùs convellitur, & sanguinem aliàs fluentem enormiter effundit: quales casus sæpiùs observavi, & confirmat Sylvius in Praxi. Et sanè par ratio hic est cum mola post partum retenta, quæ uterum etiam ad nimium lochiorum fluxum disponit, observante Amato Lusitano *Cent. 7. Curat. 54.* aut quando foetus mortuus retentus, aut aliud quid præternaturale in utero retentum, infert copiosam uteri hæmorrhagiam ante partum, quale quid observavit Riverius *Cent. 3. Observ. 24.* item quando foetu, speciatim ex terrore matris, dum adhuc gravida est, debilitato, subinde gravis hæmorrhagia infertur, ut adeoque verissimum sit illud vulgare: impossibile scilicet esse,

esse ut foetus, apparente ejusmodi hamorrhagiâ uteri, bene se habere queat. Aliàs mulier nostra difficili partu filium enixa est, & secundinæ difficulter & tardè separata sunt, sub qua frustulatim contingente, & tardiore secundinarum extractione, necessariò diuturniorem moram traxit in sella, unde necessariò aër ambiens inclementior uterum ingressus, occasione frigoris lochiorum sanguinem ad sui grumescentiam disposuit, hincque suspicio nascitur, ex sanguinis præprimis grumis in utero collectis mulierem omnia mala contraxisse: Ut adeoque Causam proximam irritantem arbitrer, esse sanguinis grumos in utero relictos, à quibus irritetur uterus, unde dolores spasmodici, quales sub partus tempore adsunt.

Causa Remota est frigus aëris externum, sub partu laborioso & tardiore secundinarum exclusionem ab utero susceptum. Nempe notum est, nil puerperis hostilius esse, tam in quàm post partum, frigore aëris ambientis, aut potu frigidiori assumpto: utraque enim ratione affecto utero puerperis mox grumescencia sanguinis introducit, & consequenter lochiorum fluxus suppressitur; atque ab his grumis ortus est postmodum sensus ponderis, prementis regionem hypogastricam, quod observavi aliquoties. Nuperrimè ex hac causa quædam mulier patiebatur sensum ponderis prementis saltem in regione hypogastrica, quæ symptomata tamen post resolutionem & evacuationem grumorum sanguinis evanescebant. Porro hi ipsi sanguinis grumi non solum faciunt sensum ponderis in utero, sed huic etiam molestiam, quâ ipse irritatus dictos dolores, quos sub ipso partus labore observamus, patitur: revera enim iidem sunt dolores in & post partum, differunt saltem ratione temporis & subjecti inferentis, quippe post partum ab alia occasione oriuntur; in partu autem à foetu causantur. Interim quoad essentialem fiendi modum, utriusque conveniunt, oriundi simpliciter ex uteri impetu convulsivo seu spasmo, quo ex ambitu ad centrum contrahitur, sub qua contractione omne quod retinet, ad exclusionem disponitur.

Confirmat hæc in specie sudor frigidus circa ea loca, ubi sanguinis grumi hærent, observabiles nempe in regione hypogastrica, quales quid etiam foetum mortuum gerentes patiuntur. Interim ejusmodi frigidus sudor etiam, si malum ulterius progreditur, circa extrema apparet.

Tandem sanguis loturæ carniū similis evacuatus, est saltem serum, à grumis sanguinis secretum, sanguine tamen nonnihil tinctum.

Retentionis autem urinæ in nostro casu

causa proxima est læsio genitalium circa extrema loca, ex rudi & imperita manu obstetricis facta; quale quid frequentitè accidit, ita, ut nunc dilaceretur collum vesicæ, unde incontinentia urinæ incurabilis; nunc verò pudenda externa, aut vagina uteri læduntur, unde hæ partes à partu difficili intumescunt.

In nostro casu probabile est, vaginam uteri circa insertionem meatus urinarii fuisse læsam, adeoque hinc tumefactam, qui tumor occasione aëris frigidi suscepti majus incrementum cepit: cui accedit, quod lochiis suppressis ipse tumor accreverit, ac ita urina suppressa fuerit, præsertim cum quoque ex nostra observatione interdum ipsa lochia occasione urinæ suppressæ suppressi queant. Ex hoc ergo tumore cervicis vesicæ etiam consequenter urina retenta & dolor acerbus oritur circa regionem pubis, si cervix vesicæ læsa & tumida istum dolorem asperiores reddit. Ex his ergo, quando nempe ex læsione externa, hinc tumore & frigore, impeditur sphincteris vesicæ apertura, & urinæ emissio, fit, ut spasmi uteri ulterius continuentur, & sphincter vesicæ convulsivi quid patiat, hinc suppressio urinæ intenditur. Dum autem partibus istis totius uteri, dolore lancinante contractis, conatus & motus ejectorius efficitur, non stringitur, sed ampliatur orificium uteri inferius: similis hic est motus, ac quando alvum exoneramus, stringitur superius intestinum rectum, inferius verò ampliatur, podex; vel quando urinam mittimus, tota vesica contrahitur, orificio hujus libero manente; aut quando vomiturimus, totus ventriculus contractus impetu facto superius orificium pandit: sic uterus ubique circa centrum contrahitur, sed ita, ut omnes lineæ ad orificium terminari videantur; hinc uteri orificium ante partum clausum, per partus dolores ex uteri contractione hincere & aperiri solet.

Frequens etiam est, quod mulieres à partu tumidum abdomen retineant, quasi adhuc unum foverent foetum, in acceptis ferendum vel aëris frigori externo, vel potui frigidiori hausto, & vix curabile est, nisi maturè fiat, aut alius demum partus superveniat, & tumorem illum solvat.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: periculosum malum est, obructus & singultus: imò ratione suppressionis lochiorum metus est, ne febris acuta superveniat; sicut ratione urinæ suppressæ vigiliæ & motus convulsivi, aliaque graviora symptomata metuenda. Interim spem curationis facit, quod adhuc prodeat aliquid lochiorum sub forma loturæ carnis; innuit enim adhuc orificium apertum;

item quod dolores post partum adsint, ut innuunt spirituum motum ad uterum, moventes nifum excretorium lochiorum.

C U R A.

1. Cura:

1. Lochiorum excretio promoveatur; artim stimulantibus moderatè aromaticis, le volatili oleoso turgidis, & utero nervo- ex frigore suscepto læso amicissimis; par- in sanguinis grumos resolventibus. Di- um: stimulantibus moderatè aromaticis; im sola stimulantia non sufficiunt. Quò agis stimulat, eò magis dolores abdomi- s lancinantes intenduntur sine successe, quia nguis est ad sui excretionem ineptus. Un- : simul propter frigus externum susceptum, erum nervosum lædens, moderatè aroma- tica, sale volatili oleoso turgida, usur- anda: quibus si addantur sanguinis grumos solventia, facilis sequitur lochiorum excre- o.

2. Urinæ excretio promoveatur blandè mulantibus, & aromaticis discutientibus, opoter tumorem, læsionem, frigus susce- um, &c.

3. Dolores, si urgent nimii, blandissi- è sistendi, non autem penitus sopiendi sunt; as enim motus constrictorius uteri, & san- inis grumosi ejectorius cessabit. Interim nen, ne dolores nimii persistant, mitigan- quodammodo erunt.

4. Urgenti symptomati, nempe virium ostrationi, maturè succurrendum.

Pro excretionem lochiorum excellunt ut- irimùm amara salino-urinosa, eaque tam latilia quam fixa, ut myrrha, quæ est ex timis specificis; hinc crocus, cinamo- um, borra, &c.

℞. *Borrac.* ʒss. ad ʒij.

Myrrh. el. gr. xvj. ad ʒj.

M. pro 2. dosibus,

In ∇ *Cinam.* sumendis.

Conveniunt item colocynthis correctæ, r sal tartari: Helmontius dicit, colocyn- idis vis venenosa si corrigatur, fieri exinde medium ad morbos chronicos egregium. artum autem & lochia pellenibus reme- is semper spirituosæ, ut aqua cinnamomi, &c. ddantur, uti rectè Lindanus monet. Oleum estillatum Heraclinum Rulandi, destillatum x ligno coryli per descensum, sed legitimo mpore scisso, Rulando in quibusvis affe- ibus convulsivis est egregium medica- ientum; in specie foetum mortuum pellit: co hujus non inconvenienter oleum ligni xi, ceu mirabile anodynum, propè dixe- n narcoticum, vel oleum destillatum succi, potest substitui.

Pro grumis resolvendis conveniunt la- li cancerorum propter vim traumaticam; Tom. II. Pars 2.

item Decoctum artemisiæ in cerevisia, addito croco. Mulieres recipiunt cerevisiam calidam, & crocum addunt largiter, & est egregia ad pellenda lochia & menses; nam etiam Rive- rius lethalem uteri hæmorrhagiam ex abusu croci excitatam, in *Observ. allegat.* habet.

Tinctura antimonij ex scorij reguli ejus- dem à ʒss. ad ʒj. est egregia, vid. Angelus Sala.

Ego puerperam nostram sic curavi: Sci- licet primitus ut promoverentur lochia, peni- tus ferè suppressa, præscripsi:

℞. *Borrac. Venet.* ʒss.

Myrrhæ gr. xvj.

Croci ʒss.

Mista div. in 2. part. æquales.

Primam dosin cepit manè; alteram au- tem, quia erat nauseosa, evomuit. Vespè- ri ob id præscripsi:

℞. *Θis card. bened.*

Artemis. ana ʒss.

Borrac. Ven. ʒss. Misc.

div. in 2. part. æqu.

Primam dosin cepit vesperi, alteram à media nocte.

Interim cum his internis externè ordina- vi litum sequentem.

℞. *Ol. Cheirin.* ʒss.

destill. Cumin.

bacc. Junip. ana. ʒj. M.

Quò calide crebrius locum à regione umbi- licali ad pubem & regionem hypogastricam illinendum jussi; hinc post primam dosin pulveris assumptam sub vesperam satis com- modè profluxere lochia, quæ tamen inse- quentibus diebus penitus iterum supprime- bantur, cum ventris tumore, intensoque dolore, durus erat tactui venter, sudorque frigidus supervenit, hinc collegi, sanguinis adesse grumos in utero, pro quibus solvendis:

℞. ∇ *Cherefol.*

Matricar. ana ʒss.

Acet. vini acerr. ʒvj.

Lapill. Sr. præp. ʒj.

Myrrhæ gr. xv.

Laud. opiat. gr. iß.

Syr artemis. ʒvj. M.

Capiat hanc portionem sæpius cochlea- tim, probè agitando.

Cum usu hujus Potionis simul externè se- quentes facculos, repetitis vicibus calidè ab- domini applicandos, præscripsi:

℞. *Hb. absinth.*

fl. Chamom. ana M. iij.

Hb. matricar. M. ij.

rad. angel. ʒij.

sem. 4. cal. maj. ana ʒij.

bacc. junip. ʒss.

Concisa & contusa includ. sacculis duo- bus, qui ut dixi, repetitis vicibus abdomini

[T r]

calidè

calidè applicabantur, præmissò præfato linimento, unà cum ista mistura internè usurpanda. Hinc sanguis benè dissolutus, copiose evacuatus est, ægraque bene purgata. Habet etiam usum hæc mixtura in vulneratis à casu ab alto, aliisque vulneribus, sanguine grumoso: in specie post partum egregiè convenit mulieribus, tam promovendo lochia à partu resistentia, & sanguinis grumos dissolvendo, quàm vi vulnerariâ consolidando læsionem utero inductam, imprimis quando suspicio lacerationis aut gravioris circa extimam regionem læsionis adest, & multiplici experientiâ confirmatus commendo.

Superiori ætate mulieri cuidam per tres dies & noctes gravissimo partu laboranti, & tandem foetum mortuum excludenti, atque post partum, cum graviter partes uteri essent læsæ, & urina non contineretur, lochia simul supprimerentur, & sanguinis grumi nascerentur, dictam Misturam felici cum successu dedi; sed sexto die superveniebat purpura alba, cui hæc mixtura propter additam myrrham egregiè profuit, utut acetum sulciperet, nullo tamen, propter lapillos cancerorum, impedimento erat. In hac puerpera, cum adhuc urina supprimeretur, pro hujus promotione ordinavi illud experimentum Foresti:

R. Hb. Parietar. M. ij.

Chærefol. Miß.

Incisa coqu. cum f. q. ∇ .e ad consistent. pultis: adde

Butyri rec. non salit. ʒij.

Ol. scorpion. ʒiß.

dest. terebinth. ʒiß.

M. f. Cataplasma.

pectini calidè applicandum, quo copiosè fluxit □.

Præ cæteris puerperis conveniunt lapilli cancerorum & reliqua remedia ex canceris, propter vim vulnerariam, juxta Helmontium *Tr. Lithias.* qui eadem cancerina matribus ex partu læsis commendat. *Tinctura Coralliorum* cum spiritu cordis cervi puerperis in virium prostratione & multis casibus conveniens est remedium, imprimis ubi suspicio febris malignæ, ut & vini generosi odor & potus egregius est ad refocillationem, modo non frigidum bibant puerperæ, quin potius illud generosum subtepidè haustum lochiorum fluxum egregiè promoveret, & vires partu fractas reddit, simul tamen imminuit lactis abundantiam. Hinc nutricibus non dandum vinum propter lactis defraudationem; sæpius enim observavi, nutrices conductitias, si quando occasione datâ vinum hauserint, etiam parùm, lactis defectum ad aliquot dies passas fuisse.

Cum vires sint prostratæ, & ægra nostra

malum patiatur occasione grumorum sanguinis, venæsectio vix locum habebit; quin potius solvendi erunt grumi. Quodsi autem adesset suspicio febris ardentis supervenientis, ægraque simul constitutionis habitioris fuisset, tunc illi à posteriori prævenire possumus venæsectione in pede administrata; hæc enim cum myrrhæ crebriore usu interno pro lochiis pellendis est egregia; uti nuper observavi in fœmina, partu octavo foetum mortuum abortiente, cui supervenerunt angustiae præcordiorum, æstus, sitis, &c. cum lochiorum suppressione; unde suasi eidem venæsectionem in pede, & statim sub ipso actu venæsectionis denuò lochia redibant, quæ sub fluxu, myrrham internè exhibendo, promovebantur. Et hæc quidem venæsectio in lochiorum suppressione cum febre ardente, aut cephalalgia graviore conjuncta, instituenda est longè melius in pede, quam in brachio.

Pro doloribus post partum urgentibus detur decoctum chamomillæ vulgaris cum corticibus aurantium, quamvis sit nonnihil nauscosum, additis ad stimulandum myrrha & artemisia; quæ tam pro purificando utero post partum, quàm mensibus pellendis optima est, crebrius usurpata, saltem vulgari ter decocta. Cortices granatorum alcali continent instar gallarum: quando ergò operantur in his casibus, fit per accidens. Quò etiam pertinet propter myrrham & aloën elixyr proprietatis; utri & essentia castorei, atque foetidæ, myrrhæ, &c. conveniunt, præparatis cum spiritu salis ammoniaci vinoso paratæ, qui optimè subjecta resinosa solvit in essentias. Remedia, quò magis alcalia sunt, eò potentiùs lochia promovebunt.

Externè fofus & sacculi calidi ex aromaticis in doloribus, ex spasmis partium nervearum natis, sunt optimi: imponantur illito priùs hypogastrio oleo destillato succini & baccarum juniperi. Angelus Sala in *Tern. Bezoard. cap. 22. pag. 224.* commendat nodulum seu pessum ex foliis persicarum, cum pulvere hellebori nigri paratum, & cum f. q. tranguanthæ exceptum. Sed an persicarum, speciatim exsiccatæ, tanta vis sit adscribenda, dubitatur; quin potius effectum tribuo radici hellebori nigri, cujus pulvis ad ʒß. in forma noduli vaginæ uterinæ inditus mirificè stimulat menses & lochia. Ad hujus imitationem vid. Zwelfferus in *Pharm. Reg. pag. 139.* Jubetur aliàs oculus leporis, mense Martio capti, secundum Riverium in *Praxi* cum pipere asservatus, applicari vertici, vid. Hamel, & D. Major in *Tr. de Inund. Vertic. §. 6.* non secus ac quoque his adstipulatur Macasius in *Prompt. Mater. Med. P. 5. c. 34. §. 15.* Interim operandi modum se nescire fateretur

fatetur Hamel, & nos cum eo: contra de calore anguillæ partum promovente dictus Hamel contrarium habet, utut Helmontius, Panarollus & Boyle in *Phil. Experiment.* testentur, hoc jecur ex omnibus specibus ad partum promovendum optimum esse. Et posito, ejusmodi specifica interdum fallere, ob tot intervenientes circumstantias alias, etiam optima remedia frustrantes; non tamen specificorum existentia inde omnino neganda: Sic enim radix jalappæ est purgans, ut huic vel alteri melancholico frustra promeretur. Insulsa ergo est opinio & objectio, non est remedium specificum, cur? quia non semper juvat: Quemadmodum num in majoribus negotiis; ita etiam hinc minima circumstantia usum medicamenti specificum turbare potest, mille licet alias experimentis probati.

Præ cæteris suffitus ex colocynthide & coriis reguli antimonii, vel suffitus ex urina utrefacta, leni etiam calore mox avolat acerrimum sal volatile, injiciendo urinæ siliem candefactum, vel ferramenta candefacta; aut affundendo eandem lateribus, & tunc per infundibula sal volatile sub forma vaporis in uterum excipitur, & in lochiis & mensibus suppressis erit magnatum virium. In recenti urina elevatur phlegma, & magma visco-urinosum remanet, in quo sal volatile in oleo concentratum est. Instrumentum Glauberi in casu nostro nobile est.

Tandem clysmata acriora, partim renovando feces in intestinis, partim per consensum contiguitatis stimulando simul, partim irritando uterum, partum difficilem promovent; quin imò admodum conducunt etiam illa pro lochiis stimulantibus, uti rectè annotat Timæus von Büdenfleec.

CASUS LVII.

FEBRIS LACTEA.

Mulier juvencula, secundâ vice puellamenixa, optimè à partu se habet, & cum primâ vice ipsa lactasset foetum, ast hac secundâ vice laboris pertæsa, nutritici negotium committit: sed die à partu nona, die Saturni, mediâ nocte intensè corripitur æstu, cum siti & cephalalgia, atque anxietate, mammae, antea lacte moderatè repletæ, immensum tument & turgent, dolent insigniter, & indurantur. Appetente aurorâ, prædicta, præter mammarum, symptomata evanescunt per levem sudorem, superstite saltem insigni virium prostratione, appetitque dejecto. Vocatus Medicus die

Tom. II. Pars 2.

Solis, præter externa, mammis imponenda, præscribit tanquam sudoriferum pro febre & pellens pro lochiis.

R. C.C. f. Δe ʒß.

Myrrhæ gr. viij.

Θis absinth. ʒß.

M. pro 2. dosibus.

A meridie horâ tertiâ capit unam dosin, unde omnia supra dicta redeunt symptomata, simili cum ferocia perdurantia ad mediam noctem, quò tempore alteram assumere debet dosin pulveris, dubitat tamen, an hoc facere debeat? Insequente die lune melius habet, mammae minus dolent, lac per papillas effluit, nox insequens quieta, unde etiam die Martis optimè habet: sed à meridiæ hora quinta gravi corripitur horrore, per horam durante, insequitur æstus gravis per aliquot horas, mamma sinistra intumescit de novo, induratur, dolet insigniter, post mediam noctem remittunt symptomata febrilia, mammae affectibus eodem tenore durantibus. Die Mercurii bene se habet, ut & die Jovis: sed hoc ipso à meridie eodem tempore rigor & æstus cum reliquis symptomatibus redeunt, dextra simul mamma induratur, tumet, dolet, & speciatim tumor durus, magnitudine ferè instans ovi gallinacei in ima mammae parte paulò profundius tactu percipitur, post mediam noctem symptomata cætera remittunt, mammarum saltem pathemata affligunt; ægra ipsa fatetur, appropinquante Paroxysmo se prius aliquid in mamma percipere.

RESOLUTIO.

Probabilissimum videtur, Affectum primarium esse Febrim lacteam, per accidens typum tertianæ observantem. Scilicet variant subinde hæ ipsæ febres lacteæ, partim ratione idiosyncrasiae subjectorum, & partim varietate caularum externarum, ita ut illæ non semper præcisè tertio vel quarto die à partu inchoent, & septimo mediante sudore finiantur; sed frequentius evenit, ut etiam die septimo vel nono demum invadant, præsertim illas foeminas, quæ non ipsæ lactant, & in quibus non uberior est lactis excretio ex uberibus, ut plurimum atrociora adsunt symptomata, major æstus, major dolor tenlivus, circa humeros, & major cephalalgia circa occiput, & similia accidunt. Evenit, uti dictum, ut tardius superveniant, quando mulieres ipsæ non lactant, & tunc sine insigni impetu lac ad mammas affluit, donec paulatim sic congestum & coacervatum in massa sanguinea,

[Tt 2]

nea, talem febrem lacteam causetur; superstes tunc lochiorum fluxus ut plurimum supprimitur, si febris lactea paulò fuerit intensior, nec redit, nisi ardore febrili profligato; sudore paulo largius fluente, spontè & successivè tandem evanescit. Stante enim lochiorum fluxu semper mitior est febris lactea.

Quoad Causam; hæc febres lacteæ, si ad quoddam genus febrium referri debeant, referenda sunt quodammodo ad classẽ lymphaticarum febrium, ita quidem, ut in glandulis mammarum sub chyli lactei separatione vel lymphæ vel sanguis, dum refluent, à fermento glandularum mammarum in lactis separatione certam alterationem patiantur, adeoque sic alterata refluencia in reliqua massa sanguinea febrem lacteam mediantibus spiritibus animalibus excitent. Quod cò facilius in nostra agra evenire potuit, quia ipsa erat juvenula delicata, & primo puerperio ipsamet lactaverat suum fœtum; unde tubulis mammarum amplioribus & magis laxatis redditis, hoc secundo puerperio lactationem nutrici committens, fecit, ut mammae spongiosiores & laxiores uberius lac imbiberint, quod congestum, non tamen satis evacuatum, occasionem intensiori febre lacteæ, & tardius, porrexit.

Interim per accidens lactea hæc tertianæ intermittentis typum observat, cum agra ante febris lacteæ insultum non nihil jam ad intermittentem esset disposita, quia felici à partu liberata sanissima, & voracior solito fuit, ut ipsa fatente in uno pastu sextuplo plus ciborum quàm aliàs assumeret: quò excessu per septem dies commissio, facile vestigia aliqua febrilia crudiatum à prima digestionem imprimis, & fermentum acidum febrile, concipi potuit, quod consequenter per febrem lacteam excitatum, per accidens typum tertianæ nostræ febre lacteæ impressit; ut ut casum similem observasse me, aut legisse uspiam, non meminerim. Si verò dicatur, quod laboret tertianâ symptomaticâ per lactis coagulationem derivata, potest defendi & illustrari ex Schraderi illa Observatione in suis *Observat. Anatomico-Præcticis* pag. 228. ubi introducit puerperam sanam occasione Paroxysmorum febrilium febris tertianæ, grumos lactis & coagulationem in mammis passam fuisse; levior tamen febris hæc esse solet.

Interim cum non rarò mulieres paulò habitiores medio gestationis tempore sine ullis supervenientibus symptomatis febrilibus lac in mammis congerant, nihilominus tamen post partum febrem lacteam supervenientem patiantur, dubium enasci hinc posset, quænam hujus rei causa sit? quo loco obiter etiam annotandum, curiosum esse, ratione

temporis partus sanas mulieres, ante imprægnationem ordinarias menstruationes patientes, sub decima menstruatione, numerando ab eâ, quam ultimâ vice ante imprægnationem expertæ sunt, fluxum menstrualementem, ordinariò parere: quod prognosticon rarò fallit, præsertim in sanis; ac tempus hoc coincidit cum calculo quadraginta septimanarum, itemque mensis noni fine, & decimi principio. Ex quo concludo: sub partus tempore, & post idem, similem fere turgescentiæ motum in massa sanguinea contingere, qualis est sub menstruationis muliebris negotio, & ex hoc motu sanguinis fermentativo etiam lochiorum fluxus, & pathemata quædam abdominis sub illo, itemque lacteæ febris symptomata, deducenda esse, imprimis cum febris lactea intensior lochiorum fluxum supprimit, quæ non fluunt, nisi ætus febrilis defuerit.

Dolores partus sunt à spasmis uteri, firmiter annexi osli sacro.

In casu nostro mentio fit, quod mammae immensum tumeant, doleant, turgcant, & indurentur. Circa hoc notetur: interdum mammam universam instar lapidis indurescere; interdum verò nodulum durum in una saltem ejusdem parte observari: ubi universalis duritiei causa minimè à lacte derivanda; benè tamen particularis tumoris causa ordinariò est lac, alicubi in glandulis coagulatum hærens, reliquâ mammae parte existente flaccidâ & molli: sic quoque durities & tumor universalis in mamma faciliè percipiuntur, nisi quando ea dolet ac inflammatur; dolens enim statim indurescit, & quidem ista durities non præcisè est à repletionelactis, sed potius sequitur dolorem à convulsione fibrarum in mammis enatum: nam quando ob dolorem fibræ mammarum spasmoticè stringuntur, vasa hinc angustantur, sanguis stagnat, & succedit inflammatio.

Ulteriùs fit in relatione casus mentio remedii, à cujus primæ doseos usû pessimè habuit agra, ut ut scopus illius fuerit, blandâ diaphoresi sufflaminare impetum febris lacteæ, & beneficio myrrhæ promovere lochiorum fluxum, ut sic mitior reddita fuisset febris. Hic faciliè posset aliquis seduci, ubi audit, ex usû pulveris recruduisse symptomata. Verum hoc per accidens factum est; institit enim tunc temporis debitus Paroxysmus tertianæ. Adeò ergò non mox terreatur quispiam, & à scopo desistat, ubi videt, agrum ex remedii præscripti usû pejor se habere: Ergò secundam dosin assumpsit cum euphoria.

Aliàs febris nunquam supervenit lacti coagulato, nisi post aliquot septimanas hoc in pus

pus degenerarit, & inflammatio dolens supervenerit. Coagulatur autem lac ordinatim ab acido, utut frequenter etiam ab ira & errore, hocque non tam à causis externis, verum etiam in insomnino terribili, excitato. Ac duplex lactis coagulati status notatur; nunc simplex sine sensibili inflammatione adacta accidit; nunc verò, præsertim à terrore aut iracundia, lactis coagulum enatum in erysipelas, i. e. inflammationem erysipelatam, adjunctam habet, visui patentem; ratione cujus posterioris longè cautiùs in cura procedendum est; & ante omnia erysipelas tollendum, hinc emplastris lactis grumus solvendus.

RESOLUTIO.

Quoad Prognosin: febris hæc lactea est sine periculo, sive lactea sit, sive tertiana; Item in lactea intensiori, tardiusque superveniente, cautus sit Medicus, ne ob incuriam, lochiis præprimis suppressis ex toto vel ex parte facilè ea degeneret in febrem continuam ardentem, nunc benignam, nunc magnam plus minus, adjunctam quem habeat puritatem aut purpuram; & quoad coagulationem lactis, ne abeat tandem in abscessum mammarum.

CURA.

Quoad Curam:

1. Tertiana febris fixis sudoriferis, vulgo præcipitantibus dictis, additis simul lochia mulantibus, compescenda.

2. Lac in mammis coagulatum dissolvendum, & effluxus ejus promovendus est.

Quoad primum; lochia simul in fluxu bito sedulo conservanda: quò magis enim supprimuntur, eò intensior fit febris lactea, eò magis indurescunt mammae; contra eò largius illa fluunt, eò etiam mitius urget hæc.

Ratione lactis itidem secundò annotatum: modò illud ex papillis effluat, si sponte, sive jam suctu foetus, sive alia ratione emulgeatur, bonum est: quamvis enim hoc fit, tamdiu lactis vitio obnoxio, & ita facilè majus periculum præcave potest, accedente scilicet aciditate destruta, appetitu sic simul cessante, & in specie lochiis rirè fluentibus.

Cæterum in cura febris notetur: quod volatilia, licet sint maximè proficua pueris, imprimis in lochiorum affectibus & passionibus hystericis, reliqua tamen symptomata simul sunt consideranda: si enim magis febris lactea, vel in hac æstus, cephalalgia, &c. urgent, tutiùs fixis insistimus tam volatilibus; aliàs enim his ipsis massam sanguineam insigniùs agitando, & magis solvendo, facimus, ut ea magis adhuc fervescat, & reliqua symptomata exaspe-

rentur. Potiùs ergò in nostra ægra adhibenda sunt fixiora, ex animali & minerali regno, utut volatilibus pro scopo dissolvendi lactis grumos etiam locus erit, tam internè quàm externè.

Quoad lactis coagulum: interiùs diaphoretica & resolventia, tam fixa quàm volatilia, lactis grumos dissolvunt, semper impetando sudorem. Spiritus salis ammoniaci à ʒß. ad ʒi. in tali casu egregius est. Pro scopo autem impediendi lactis proventum, quoad externa, alfine communiter applicatur; Laudatur à Pauli cataplasma, in aceto decoctum: suspectum autem hic mihi ideò erit, quia metus est, ne acerum lac coagulet: quà ratione etiam illud emplastrum Riverii, ex farina fabarum cum oxycrato, quòd adeò in testium & glandulosarum partium tumoribus extollit, metuens acidum ingrediens, lac coagulans, horreo semper. Potiùs externa resolventia ac discutientia, imprimis emplastrum de galbano crocatum Mynsichti, nò obstat febris, sunt optima, cum sacculo oryzae calidè applicatum; item etiam emplastrum spermatis ranarum maturè applicatum facit, ut leviter mulieres a lacte affligantur; impedit enim lactis coagulum, & facit, ut lac meliùs fluat, & mitius decurrant symptomata, sed in progressu morbi dicta non sufficiunt. Præstamus hoc quoque per lochiorum fluxum, item per parcam diatam.

Interim delicatam hanc agram curavi hoc modò: Post usum dicti pulveris, cum denuò instaret paroxysmus, sive cum ex improviso denuò superveniret die Martis, die Mercurii, cum simul doleret mamma sinistra, & dura esset, præscripsi sequentem spiritum, calidè inungendum:

℞. — Θ * ci c. Ψ par. ʒß.

Eff. Croci ʒiij. M.

Item ℞. Empl. de galb. croc. Myns. q. s.

Malax. c. ol. destill. si foetido;

Inducatur super linteam vel alutam, in medio perforandam, pro papillæ protuberantia.

Spiritus ille tepidè calefactus, spongiola illinebatur mammae, & post applicabatur de super emplastrum allegatum calidè. Si oleum tartari destillatum foetidum ferre nequeant, loco ejus substituatur aut oleum Philosophorum, aut oleum destillatum terebinthinæ, hinc desuper imponebantur sacculi, oryza vel avena vel milio ad pollicis crassitiem referti, iique, quantum fieri potest, calidissimi. Repetebantur dicta remedia ter quotidie, illinendo primò spiritum, & hinc emplastrum & sacculos probè calidos applicando, intermedio tempore hos probè calefactos sæpiùs renovando. Ita horum usu nodulus ac tumor lactis coagulati in dextra

[Tt] 3 mam-

mamma evanuit, pariter ac sinistra quoque mamma imminuta est.

Interim cum die Jovis superveniret paroxysmus, ante invasionem præscripti sequentem pulverem:

R. Lapill. Br. præp. ℥j.

℞is absinth. gr. xij. M.

Quem cepit ægra horâ unâ ante paroxysmum, cujus usû non rediit paroxysmus, & sic aliquoties usurpando hunc pulverem, convaleuit.

Quoad hanc methodum curandi mammas: neminem terreat volatilis penetrantia spiritus salis ammoniaci. Nam si maturè is usurpetur cum dicto emplastro & sacculis, continuato usû, quotidie ter vel quater dicto modo repetendo, certò certius omnes isti nodi & grumi curabuntur brevi tempore: Si verò tardiùs vocetur Medicus, ubi in duriorum grumum jam condensatum fuerit lac, adeoque hoc non possit solvi, tunc si non potest præcaveri suppuratio & abscessus mammarum, tamen usus ejusdem spiritus & emplastri hoc habet commodi, ut longè citius, & minori cum dolore suppuretur materia, quàm aliàs emollientibus fieri consuevit.

Quod si verò hæc febris citiùs vel tardiùs protracta, ex lactis coagulati regurgitatione, vel lochiis suppressis ex toto vel ex parte, in continuam ardentem benignam vel malignam abierit, nunc absque nunc cum pleuritide, nunc unâ cum purpura rubra, vel etiam alba insequente, aliter procedendum erit. Scilicet rigorem per horam insequens æstus continuus, cum dolore lateris cujusdam in pectore pungitivo, plus minus atroci ac continuo, & adjuncta tussis sicca per diem unum vel alterum, pleuritidem subesse innuit; quæ, si vera est, sætandem cum sputi rejectione mucosa per tussim manifestat. Hinc potiones sudoriferæ appropriatæ ex liquore cornu cervi succinato, sale volatili mandibularum lucii piscis, spiritu theriacali, vel cornu cervi camphorato, cum extracto croci, additis fixis absorbentibus, propinentur, pro sudore leni excitando; nunc mucis resolvendi attenuatione successiva, hincque expectoratione promovenda, additis imprimis aqua & syrupo florum papaveris rhæados. Tempore somni auri diaphoretici Poterii dosis, aut maxilla lucii piscis, aut lapilli cancrorum, vel cinnabaris antimonii, vel specificum cephalicum, exhibeantur. Decocto item cremoris ptisanæ arenæ calidè assumpto, hæc secudentur, vinumque interea interdicitur.

Externè spiritus vini camphoratus calidè, loco dolenti, applicetur aliquoties de die & nocte, impositis sacculis calidis ex herba absinthii, chamomillæ Romanæ, floribus Sambuci, &c.

Expectoratione probe factâ, finis curæ imponatur per potionem quandam ex vulnerariis herbis, additis lapillis cancrorum, ac spiritu salis ammoniaci anisato vel succinato.

Purpura si post potionem sudoriferam ex volatilibus procedat ac sese manifestet, cum emulsione expellente ex semine aquilegiæ, napi, cardui benedicti vel Mariæ, citri, nasturtii, sinapi, additis fixis absorbentibus, ulterius urgenda; de nocte verò pro somno blando conciliando cinnabarina, additis fixis absorbentibus, exhibenda, ac tandem, si bene succedant omnia, tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi, mista cum ana spiritus antiscorbutici, reliquum successivè expellendum, corpusque in continuo madore blando conservandum; vinumque ex parte concedendum pro refocillatione virium. Alvus suppressa in hisce affectibus, suppositoriis ex sapone vel melle cocto cum sale gemmæ aut globulis moschatis in adfuetis, aliàs cautè in hysterics, stimulanda.

Purpura quælibet, in specie alba, retrocedens, à causâ præsertim externa, in specie frigore vel potu frigido, serè semper exitium importat, in specie si denuò prodiens cum maculis purpureis vel lividis comitata sit; hinc enim sudore colliquativo ac frigido vires resolvuntur, ægrique tandem suffocati intereunt.

C A S U S LVIII.

SUBLUXATIO VERTEBRARUM DORSI.

Juvenis robustus & vegetus, tinctori ab officio, conqueritur aliquando manè evigilans de difficili respiratione, quæ in regione circa costas inferiores impediatur: Adest simul hypochondriorum tensio, & dolor tensivus, quasi cingulo omnia ibidem coercerentur, ita tamen, ut repleta & turgida ipsi ibidem omnia viderentur (dicit: es sey im Weichen alles voll und spanne ihn daselbst so sehr.) Surgens, corpus non æquè commodè inflectere potest, quin palus quasi dorso infixus videatur. Negligit hæc per aliquot dies, sed contumaciter eadem perdurant. Appetitus prostermitur, nausea supervenit, vires labascunt, alvus constipatur, abdomen murmurat, hypochondria magis inflari videntur, &c. tandem vagi æstus & phlogoses superveniunt, interdum extremorum refrigeratio cum sudore frigido circa frontem & tempora, adsunt anxietates præcordiorum insignes, & lipothymia quoque subinde imminet, pulsus celer, frequens, durus, vehementiâ & magnitudine moderatus.

RESO-

RESOLUTIO.

Affectus est species luxationis vertebrarum dorfi, quam non esse luxationem propriam, patet ex defectu paralyseos. Est ergo in specie subluxatio saltem earum, quæ quandoque, utut in se levis, neglecta, interdum maxima & atrocia infert symptoma-

Germanis dicitur *das Verbrechen / das Beheben*; quæ inter tamen non nisi gradualis differentia intercedit. Cæterum minima peccata subinde sunt maximorum morbum autores: id quod palam fit ex præsentia affectu, quo ter ita ægros afflictos vidi, ut erdotem advocandum jussèrunt, metuentes vitæ pausam.

Dupliciter autem minimum peccatum est inferre maximum morbum: vel enim tenuis tantillum corporis nostri contenta cit; vel quatenus in continentibus partitexturam conformationis lædunt: quibus endum, quando utraque simul à præteritali objecto alterantur. Prioris modumplum exhibet contagium tantillum borum malignorum, pestis, &c. sicut trā ratione sanitatis id declarari potest ex olei destillati cinamomi, intimiora corpus penetrando, idem alterantis: imò et ex propinatione aquæ ejusdem spirituosyncopticos quasi in vitam revocantis. Huius exemplum, supponendo machinam talem corpus nostrum esse, adeoque in suo defectus pati posse, suggerunt arena renibus stabulantes, quæ afficiendos, quas turbas in toto corpore non exciunt hinc interdum ex punctura aciculæ, læsionum nervum, mors insculta; non secus ac ex ictu vespæ aut etiam viperæ, vid. Pauli recbasī de Febr. Malignis. Ut itaque num putemus, in magnis morbis quoque causam materialem subesse, potius maximos morbos minima habere.

Causa ergo Proxima affectus nostri est o situs seu subluxatio thoracis inferiorum vertebrarum, pro cuius meliore intellectu observandum:

Vertebras jungi immediatè per gynglimon ratione processuum; mediatè verò amenta, paulò tamen laxiora, eadem sentia.

Musculos dorfi, spinarum nempe & simum, suos tendines distinctim semivertebras dorfi derivare, ipsisque an- & insertos esse.

Intra singulas vertebra paria nervos odire ex spinali medulla.

Utut per gynglimon vertebræ sibi uniantur, cartilagine tamen intersillas, in statu naturali molles, flexilacilè tractabiles esse.

Causa remota est conatus ponderis elevati.

Symptomata superveniunt sequentia: Spasmi circa hypochondria (dicebat *es spannet / und ist mir alles voll*) ab irritatis ob dislocationem nervis intra vertebra prodeuntibus, & ad dictas partes externas protensis. Nervi imprimis, & intercostales & paris vagi, hinc inde cum aliis nervis per plexus junguntur; unde facillè occasione unius vellicati, & hinc ex spirituum impetu in spasimum contracti, alius simili modo affici potest, unde symptomatum propagatio. Difficilis adest respiratio, partim quod diaphragma, partim quod musculus peritonæi afficiantur spasmo. Palus infixus videtur, quod vertebræ luxatæ super cartilagine propter luxationem non possint moveri, quia obsistunt processus; unde noster æger corpus flectere nequit. Appetitus prostratus est ex luxatis vertebris propter consensum nervorum. Phlogoses vagæ ob succorum diversorum in primis viis effervescentiam, unde curandæ sunt per absorbentia. Refrigeratio extremorum, lipothymia, sudores syncoptici frigidi, &c. propter nervos, atque spirituum turbatum influxum, & interdum denegatam irradiationem insequuntur. Pulsus durus adest, quia spasmo corripiuntur membrana.

Observationem meretur:

(1) Quod in loco subluxato, ex ligamentorum tendinumque, & cæterarum partium mollium, contorsione, & vitiato situ, necessariò pororum situs & figura quoque vitiatur, sicque naturalis sanguinis circulus nonnihil turbetur & impediatur, indeque succi nutritii per poros harum partium debita distributio plus minùs vitiatur, qui exinde colligi, & mora diuturnâ facillè corrumpi potest.

(2) Circa dorfi vertebra sinoviae rationem habendam esse, quæ etiam illinit vertebra earumque interstitia pro motu aliquali promovendo, stagnando facillè colligitur & successivè corrumpitur in loco luxato: ob id interdum malo diutius durante, post restitutionem, *nach dem ziehen* / tumor aliquis observatur in regione spinæ dorfi posteriori, subdurus, partibus vicinis concolor, tactu dolens, &c. quapropter post repositionem luxationis sudorifera, & remedia in sanguine grumoso familiaria sunt propinanda, ut aut præcaveatur, aut jam factus discutatur, ne inflammationem causet.

Quoad Prognosin: si malum diutius duret, & accrescat, vel tetanos, vel opisthotonos, aut etiam propter lipothymiam repentem mors supervenire potest.

In Cura saltem requiritur Repositio & Firmatio, de qua vid. Sennertus. Cum verò in

in omni luxationum specie, imprimis malo graviore, impedimenta, v. g. inflammatio, &c. non raro interveniant, repositionem ejusdem partis luxatæ & repositæ firmationem impediunt; proinde quæritur: quodnam illorum prius agendum? Resp. In malo leviori mox repositionem administrandam, in graviore verò ad meliorem & repositionem & firmationem præmittenda erunt dicta impedimenta removentia. Adeoque conveniunt discutientia, acidumque corrigentia ut hirci non castrati torrefactus sanguis, cum teste Helmontio omnium animalium castratorum vires longè inferiores sint, quam non castratorum; item remedia cancrina, sanguinem stagnantem resolventia. Mihi, sive præmissâ repositione luxationis, sive post hanc, in usu est hæc formula:

*Rx. Lapill. Sr. præp. ʒi.
ʒii diaph. ʒi. ʒß. M.
div. in 2. part. æquales:*

Quarum singula dosis in binis cochlearibus aceti propinanda, expectando sudorem. Vel

*Rx. Lapill. Sr. præp. ʒi.
ʒis absinth. gr. xij. M.
div. in 2. part. æquales:*

D. S.

Zertheilend = Pulver.

Nec inconcinnum est vulgi experimentum illud, dum recipiunt Crapp, ex radice rubiæ tinctorum, resolvens humores congrumatos, vid. Schroederus in Append. Pharmac. quod ebullitum in aceto pro decocto, propinant ægro ad resolvenda impedimenta, in casu ab alto, & in talibus luxatis est egregium. Imò etiam ipse spiritus salis ammoniaci crebrius assumtus ad 40. gutt. scopo huic satisfacit, atque egregiè est diureticus.

Repositionis cæteroquin ratio in hoc consistit, ut, cum subluxatio vertebrarum dorsii non tam antrorsum nec retrorsum, quam solummodò lateraliter fiat, ubi nempe in juncturæ modo per gynglimum vitiatur situs, unde vertebræ saltem sunt contortæ, non luxatæ, manuum ægri attractione, pone dorsum diducantur vertebræ hoc modo subluxatæ, diductæ moveantur, ut ita naturaliter denuò se excipere, & mutuò coire possint.

Frequens malum est infantibus Luxatio vertebrarum, qui phlogosès inde patiuntur. Mulierculæ exploraturæ, an infantes subluxati quoad vertebrae sint, eosdem pedibus ad anum reflexis manibus continent, & humi sedentes genu dextro oculum sinistrum admovent, & sinistro dextrum; vel infantes abdomini reponendo, manum dextram aptant calceario sinistro, & sinistram dextro; quæ ubi respondere sibi exacte viderint, de subluxatione nullum omen concipiunt.

Post factam repositionem, in qua partes luxatæ extendendæ, eadem firmandæ sunt. Nempe uti in genere pars semel luxata ob violentiam, ligamentorum & tendinum extensionem, facilè denuò reposita sede suâ excidit; ita parili ratione & hic in contorsione vertebrarum dorsii locum habet; unde quidam vel levissimâ occasione hoc malum incurrunt: quod ut præcaveatur, optimum erit firmare, & in naturalem tonum restituere partem semel læsam. Pro loco ergò firmando convenit vinum tepidum, vel solum, vel cum floribus hyperici decoctum, vel petroleum album, balsamum peruvianum, largiter spinæ dorsii, præcordiis & hypochondriis calidè inungatur; Vel

Rx. Pingu. hircin. ʒß.

Petrol. ab. ʒi.

M. S.

Salbe zum Rücken.

Item *Rx. Ungu. hircin. ʒß.*

Ol. destill. Menth. ʒi.

Macis ʒß.

M. S.

Magen-Sälblein.

Quæ tamen si non sufficiant, imponatur spinæ dorsii transversim emplastrum ex tacamahaca, malaxatum cum f. q. Balsami Peruviani, aut olei cujusdam destillati nervini, permittendo idem ad aliquot dies noctesque.

Tandem etiam ante repositionem proficuum maximè observavi exhibitum spermæ ceti, mistum cum croco, in vehiculo cerevisiæ calidæ.

In lipothymiis autem & variis anxietatibus hypochondriorum & præcordiorum, reliquisque symptomatis vagis, nil melius est, quam spiritus carminativus de tribus.

F I N I S

COLLEGII CONSULTATORII.

MICHAE.

MICHAELIS ETTMULLERI
Philosophiæ & Medicinæ Doctoris, Professoris Publici
Lipsiensis, ac Facultatis Medicæ Adfessoris,
CASUS & OBSERVATIONES.

Scabies fœda. Arthritis. Sudor. Intertrigo. Hydropis metus.

Viro scabie fœda laboranti præscripsi Anno 1672.

℞. *Ess. viperar.* ʒß.

— *Cochlear.* ʒi. M. Dosis 40. guttæ bis in die.

Cum omnia essent egregie expulsa, & superveniret arthritis cum gravi & continuo dolore admodum molesto:

℞. *Magist. Corall. c. succ. citr.* ʒi.

Laud. op. ferment. gr. i. M. D. in 2 plo. inde omnis suppressus fuit sudor.

℞. *Ungu. alb. camph.* ʒvj.

Fl. ♀ ʒiij.

⊖ ʒiß.

c. f. q. ʒo *nicotianæ* F. l. a. Unguentum.

Tum balneum ∇ dulcis quoad pedes commendabatur, ex decocto baccarum juniperi, abstergantur pustulæ arefactæ. Anno secunde sudatio cum vexabat in clunibus, & eoriebatur Intertrigo. Hinc

℞. *Ungu. alb. Camph.*

diapomph. ana ʒvj.

Fl. ♀ ʒij.

Ceruss.

Zutia ana ʒi.

— *sigill.* ʒij. c. f. q. ʒo *nicot.* F. linimentum.

sudores & pustulas & excoriationes citra; item ob pedes scabie prave defœdatos netum hydropisicos ob aliqualem pedum do-rem.

℞. *sem. violar.* ʒß.

Camph. gr. vj. c. f. q. ∇ *petrosel.* F. l. a. Emulsio, ad ʒv. adde

— ⊖ ʒi. Edulcoretur M. pro urin-

omovenda & ita sero derivando.

Essentiam absinthii cepit quotidie & con-

in haustu cerevisiæ consueta.

Cum superius unguentum non satisfac-

Ungu. alb. camph. ʒvj.

Fl. ♀

— *dulc. ad extr.* ana ʒiß.

Tom. II. Pars 2.

c. f. q. ʒo *nicotianæ* F. unguentum, & continuetur usus absinthii in omni potu.

Lotio pedum continuetur cum decocto baccarum juniperi & herb. chamomill. vel rosmarini in lixivio.

Postmodum pro sudoribus istis circa clunes & femora præsertim molestis & sub alimenti digesti distributione infestantibus tollendis simulque stimulanda urina:

℞. *Liqu. ♂* ʒß.

D. 20. guttæ omni mane, per aliquot septimanas: Exinde primis septimanis levamen sensit, & sudores isti imminuti fuerunt.

II. *Angustie præcordiorum. Vomitus. Flatus.*

Studiosus ex ira & corporis motione angustias præcordiorum intolerabiles, vomitus continuos cum bile, & alvi quasdam dejectiones cum copiosissimis flatibus & sudore frigido ex orgasmo bilis oleosæ patiebatur.

℞. ∇ *fumar.*

fl. sambuc. ana ʒiß.

cinam. ʒß.

diascord. Fracast. ʒiß.

— *diaph.* ʒß.

— ⊖ *dulc.* ʒi.

Syr. fl. calend. ʒvj. M. Cochleatim hauriat, & stomachali regioni fermentum novum cum + subactum applicet: profuit optime.

Sed cum altero die similia & plane deteriora redirent symptomata, cum vomitu bilis porraceæ, viridissimæ, & amarissimæ cum crudelissimis anxietatibus; ad hanc bilem copiosam præcipitandam:

℞. *Crystall. præp.*

magist. corall. cum succ. citr. ana ʒi.

— ⊖ *coagul.* ʒß. M. pro 2. dos.

Mire profuit.

Postridie eadem symptomata crudeliter recurrunt, per totam noctem durant, ut mane in periculo mortis esse videretur, cum hæmorrhagia narium satis copiosa: præscribo præcordiis imponendum scutum stomachale ex tacamahaca & potionem loco julebi:

[Uu]

℞. ∇

℞. ▽ *fumar.* ʒiʒ.
cinam. ʒʒ.
diascord. Fracast. ʒij.
 ℞ *bellid.* ʒi.
 ~ Ⓞ d. ʒʒ.
Syr. acetos. citr. ʒʒ. M.

Item ad provocandum sudorem:

℞. ʒ. *diaph.* ʒʒ.
Cinnab. ʒ gr. viij.
 Ⓞ vol. C. C. gr. v.

Camph. gr. ij. M. Egregie sudavit, cum euphoria: Continuata fuit eadem portio, & post mediam noctem simili pulvere sudor egregie cum insigni levamine continuatus fuit.

Supervenit copiosa hæmorrhagia narium subinde recurrens, ut nonnisi difficillimo cum labore possit sedari: pro sit ergo clamorosa & flatibus abdominis

℞. *Flor. papav. rhæad.* Mʒ. irroretur
 c. f. q. ~ Ⓞ p. *camp.* Infund. in
 ▽ f. tʒj. stent in digestionem ad extractionem
 ℞, Colaturæ adde

Syr. de jujub.
corall. Quercet.
cort. aurant. ana ʒj.

~ Ⓞ d. q. f. pro grato sapore. M.
 Profuit dum blando madore corpus perfudit.

III. Dolor Convulsivus præcordiorum, abdominis, hypochondriorum, lumborum, crurum.

Puellæ dolore convulsivo, præcordiorum, abdominis, hypochondriorum, lumborum & crurum correptæ, *daß es ihr den Bauch ganz einzog /* seu; *welche eine innerliche schwere Noth hatte /* item alii puellæ 9. annorum, simili morbi genere laboranti præscripti:

℞. *Magist. Corall. c. succ. citr.* ʒʒ.

Castor. gr. iij.

laud. hyss. gr. ix. M. F. c. f. q. Ess. L.
Sassafras Pilulæ N. xxiv. de quibus capiebat iix. quoties immineret Paroxysmus, cum levamine: item:

℞. *R. aperit.* ʒij.

~ *cochlear.* ʒi. M. D. 30. guttæ bis in die.

Cui misturæ etiam Ess. castorei quandoque sociebatur.

℞. ʒo *castor.* ʒʒ.

dest. succin. ʒj.

spicæ ʒʒ. M. pro illinendo abdomine & præcordiis.

IV. Apoplexia.

Apoplexiam, eamque in hemiplegiam terminantem vitio circa principium nervorum oborto natam illustrat manifesto casus Studiosi lue & æa affecti. Hic Anno 1677. sæviente hyeme à Chirurgo per salivationem

plem curatur, hac finita, urgente adhuc frigore foras prodit, & exinde implacabilem cephalalgiam, occiput saltem in regione cerebelli & principium nervorum occupantem incurrit. Dolor vesperi oriebatur, per integram noctem durans, ita ut æger subinde præ dolore pilos evelleret, interdum mediocriter habebat, appetitus nullus, stomachus subinde, quasi eructari vellet, commovebatur, cum singultuoso quodam imperu. Tentabam varia, omnia frustra; Theoria erat: salivationem factam non sufficientem, quin tenuiori humore maligno evacuato viscidiorum & crassiorum acidum malignum succum fuisse relictum, ut in motu superiora versus constitutum, qui externi frigoris occasione concentratus & condensatus circa principia nervorum hæserit fixus, forsitan & ʒio comitatus. (Usurpaverat enim Arcanum Corallinum) Cum per 4. septimanas multa tentata fuissent, & interea temporis aliquoties æger, præsertim mane imminuta cum voce, ita ut aliquot saltem verba pronunciare posset, & stupore mentis internorumque sensuum defectu sed breviter transeunte fuisset observatus, subito summa debilitate virium corripitur, ut levi cum sensu & motu ita jaceret, & tandem totius lateris dextri hemiplegia corripere: Instituti hinc Vomitus, frictiones, &c. sed quoniam effectus erat non adeo fortis, intra aliquot septimanas per remedia spirituosæ, volatilia & per victum analepticum successive restituitur, ipso dolore successive evanescente in capite, æger surgit, bene habet, & intra 4. septimanas pancreaticæ vivit. Sed cum aliquando matutino tempore incautius frigido aëri se exposuisset, & gravi ira incanduisset, subito sequente nocte omnium sensuum & motus summa debilitate cum aphonia corripitur, & hinc toto sinistrolatere, forti hemiplegia afficitur: ita ut nec verbum proferre, nec deglutire, nec pedem aut manum sinistri lateris movere posset, ipsa facie spasmico cynico deformata: debilitas virium summa, appetitus nullus, sitis intensæ, subversio stomachi: Difficilior longe, quia intensior erat hic affectus, quam prior: tandem tamen (nulla tunc nec ante nec post cephalalgia observabili, quæ post primam hemiplegiam omnis successive evanuerat) magno labore primo loquela & deglutitio, item pedis motus redeunt, successive etiam brachii, ipso ægro denuo nunc bene comedente, sine ullo sensuum etiam internorum vitio. In hoc ægro à viscido acido & eo principium nervorum fuisse affectum, unde primo cephalalgia, hinc utraque hemiplegia successive fuerit orta, manifestum est.

Cura in eo consistebat, ut propinarentur Decocta Lignorum cum ~ Ⓞ*.

Liquor

Liquor C. C. succinatus.

Vomitoria & purgationes & les.

Emplastrum de ranis cum & malaxat. c. o. dest.
Sassafras.

V. S. in brachio.

Post primam hemiplegiam

R. ∇ Ceras. nigr. \mathfrak{z} ij.

apopl. usit. \mathfrak{z} j.

Liqu. C. C. succinat. \mathfrak{z} ij.

Conf. Alkerm. \mathfrak{z} ib. M.

Item litus cum spiritu vini extremorum
& nuchæ.

Inunctiones articularum cum oleis bal-
mifque nervinis.

Post secundam hemiplegiam eadem in-
beriori dosi & frequentiori repetitione:
em infusus seu balnea repetita cum forti ad-
modum sudore, ex cubili formicarum aquæ
coctis: Hinc litus:

R. o. dest. terebinth. \mathfrak{z} ib.

junip. \mathfrak{z} ij.

succin. \mathfrak{z} ib.

mac.

menth. ana \mathfrak{z} j.

Petrol alb. \mathfrak{z} ij. M.

Item cum sæpius hæc fuissent continua-
per aliquot septimanas, tandem balneum
decoctione herbarum cephalicarum nervi-
um usurpavit.

V. Apoplexia.

D foeminam affectu ex Apoplexia &
Epilepsia quasi mixto correptam voca-
præmissa venæ sectione (utur hoc non
a, sed ordinaria ratione faciebat) in bra-
o præscripti potionem cum syrupi eme-
Angeli Salæ \mathfrak{z} vj. cepit sine alteratione; de-
ordinavi ejusdem syrupi \mathfrak{z} ij. cepit etiam
alteratione, permansit in eodem statu;
dem adhuc \mathfrak{z} ij. ejusdem dedi in pauca
ione, ut successive propinent, & sic tan-
i aliquoties supra & infra purgata fuit.
ro de prima portione aliquid deperditum
è, cum ex ore aliquid interdum efflue-
ad minimum tamen \mathfrak{z} j. ad \mathfrak{z} ix. Syrupi
a bihorium accepit, nec adeo insigniter
de purgata fuit.

*Æstus. Pavores in somno. Dolor ab-
dominis. Purpura alba.
Vermes.*

Sanus 6. annorum laboraverat morbillis,
& jam aliquot septimanas erat sanus, sed
to in ingentem æstum cum pavore in
10, & dolore abdominis incidit.
inc die 3. Julii.

R. Magist. Corall. c. succ. citr. gr. xij.

Cinnab. \mathfrak{z} gr. vj.

Castor. gr. iij.

Laud. ferment. gr. iib. M. pro 2. dos.

Tom. II. Pars 2.

In vehiculo appropriato, cum ægri leva-
mine.

Die 4.

R. Spec. decoct. carmin Mij.

Θ \mathfrak{z} ij.

Coqu. inf. q. ∇ f. Colat. \mathfrak{z} iv. adde

Elect. de baccis lauri \mathfrak{z} ij.

o. dest. succin. gr. iv.

vitell. ov. N. j. M. pro clysmate.

R. ∇ fœnic.

rub. id. ana \mathfrak{z} ib.

magist. corall. c. succ. citr. gr. xv.

Cinnab. \mathfrak{z} gr. vj.

Laud. ferment. gr. ib.

Syr cort. aurant. \mathfrak{z} ib. M.

Cum suspicio esset, à casu ab alto infantem
periculose læsum esse,

R. ocul. \mathfrak{z} .

corall. r. ppt. ana \mathfrak{z} j.

\mathfrak{z} diaph. \mathfrak{z} ib. M. pro 2. dos. propi-
nandis in aceto.

Cum postmodum purpura alba se ostenderet,
præscripti

R. R Corall. cum ~ cord. C. \mathfrak{z} ib.

D. S. 12. bis 20. Tropfen.

Cum paululum recessisset

R. \mathfrak{z} diaph. \mathfrak{z} ib.

myrrh. gr. ij. M. propinetur in po-
tu gelatinæ C. C.

Cum de doloribus ventris conquereretur, fie-
retque de novo anxiosus

R. Liqu. C. C. succin.

D. S. ad 12. gutt. pro dosi.

R. R Corall. antiscorb. \mathfrak{z} ib.

In suspitione vermium:

R. Aloes hepat. \mathfrak{z} ij.

fell. tauri q. l. ad consist. unguenti
cum vesica porcina umbilico imponendi.

VII. Tumor mammarum à lacte.

Puerperæ mox post partum ratione mam-
marum & lactis copiose affluentis præ-
scripsi.

R. Cera alb. puriss. \mathfrak{z} iv.

G. galb. in \mathfrak{z} sol. \mathfrak{z} ij. Liquefactis in-
vicem super ignem adde spermat. cet \mathfrak{z} ij. In-
corporentur probe, addendo sub finem Spi-
rit. Vini parum: inducatur mistura super lin-
teum F. Emplastra N. ij. Hinc aliquot diebus
interjectis

R. R Corall. antiscorb. \mathfrak{z} ij. D. 30. gutt.
ter in die.

Post 18. dies cum aliquot noctes horro-
rem per integram horam semper habuisset
anticipantem, & tandem mamma sinistra
fortiter tumida cum ardore & dolore fieret,
ut metus esset Erysipelatis, cui alias fuerat ob-
noxia, accedente excandescencia cum ancilla,
præscripti d. 10. Julii 1672.

[Uu 2]

R. \mathfrak{z}

℞. ♂ *diaph.* gr. xv.
Cinnabaris ♂ gr. vj.
 ☉ *Volat. C. C.* gr. v.
myrrh. gr. j. M. pro sudorifero;
 Mammis iussi applicare lintea Rob sambuci
 illita, quam calide ferre poterat, eaque subin-
 de renovare.

VIII. *Mammæ pueri recens nati lacte
 turgide.*

EJus puerulo recens nato, mammæ tur-
 gebant lacte, ut subinde hoc exprimen-
 dum foret, quod cum sæpius fieret, factum
 est, ut tandem ex compressione nimia in-
 flammatio & parvus abscessus fieret.

IX. *Arthritis vaga scorbutica.*

Viro arthritide vaga scorbutica aut saltem
 affectu catarrhali simili totius affecto
 præscripsi:

℞. ▽ *fumar.*

fl. sambuc. ana ʒiʒ.

~ ☉*

cochlear. ana ʒʒ.

Arcan. dupl.

♂ *diaph.* ana ʒj.

Laud. hyst. gr. v.

Syr. de canella ʒvj. M. pro 2. dosibus
 expectando sudorem.

℞. *Succini ppt.* ʒj.

myrrh. el. gr. iv.

laud. hyst. gr. vj. M. F. pulvis sub in-
 troitu lecti capidus.

Cum pes doleret, & in talo insignis esset
 cruciatus, imponebat lumbricos vivos, cum
 aliquali levamine, & optime profuit; pedi-
 luvium item commendabatur ex lixivio
 comm. cui incoctæ erant baccae juniperi.

Eidem post iracundiam nimiam subinde
 fumendum iussi:

℞. *Ebor. f.* Δ ʒj.

hepatic. rab. ʒʒ.

Laud. op. ferment. gr. jv. M. pro 4
 dosibus, quas valde laudavit:

X. *Morbilli.*

Puer 2. annorum cum dimidio, morbil-
 lis afflicto præscripsi.

℞. ♂ *diaph.* gr. xvij.

myrrh. gr. iv. M. pro 2. dos.

In potu gelatina C. C. dabatur.

℞. *sem. napi*

aquileg.

Card. B. ana ʒʒ.

c. f. q. ▽ *scabios. F. l. a.* Emulsio, cui adde

C. C. f. Δ.

♂ *diaph.*

unicorn. fossil. ana gr. vj. Edulco-
 retur; hæc aliquoties fuit repetita: tandem

℞. R *Corall. Sassafr.* ʒij. D. dos. 20.
 gutt. eleganter profuit.

XI. *Morbilli: Vomitus: Diarrhæa.*

Puellæ morbillis affectæ 1. anni cum 9.
 mensibus idem pulvis pro 1. dosi, eadem
 emulsio, & gelatina fuit ordinata. Præterea
 propter vomitus & diarrhœam

℞. *Magist. Corall. c. f. citri*

☉ *sigill.* ana ʒʒ. M. pro 2. dos.

℞. *Theriac.* ʒiʒ.

☉ *dest. caryoph.*

macis ana gr. xv.

nucist. express. ʒʒ. M. inunge.

XII. *Vermes. Abdominis tumor.*

Puero 3. annorum abdomine tumente, fa-
 cie pallida & fame continua vexato in
 suspicione vermium præscripsi.

℞. *pulv. ad vermes ex* ☉ ʒij.

cathol. purg. gr. v. M. pro 2. dos.

Unde evacuatus fuit nonnihil, sed absque
 vermibus; Hinc pro infarctu vasorum lacteo-
 rum tollendo:

℞. ~ *Carminat. de Trib.* ʒiʒ.

☉* *anis.* ʒʒ. M.

XIII. *Morbilli.*

Sponsa cum morbillis gravissime laboraret,
 qui post emulsionis usum copiosissime
 erumpebant, & die sexto sponte cum horro-
 re & stupore recurrebant.

℞. ▽ *fl. sambuc.*

fumar. ana ʒiʒ.

cord. H. Saxon. ʒvj.

♂ *diaph.* ʒj.

bezoard. Min. ʒʒ.

specif. cephal. gr. xv.

Syr. de canell. ʒj. M. Capiatur coch-
 leatim, unde incipiebant redire. Vesperi
 cum alius vocatus esset Medicus, præscripsim:

℞. *bezoard. Or.* ʒʒ.

Magist. ung. alc. ʒʒ. M. pro 3. dos.

℞. ▽ *menth.*

fumar.

scorzon. ana ʒj.

~ *cochlear.* ʒj.

♂ *diaph.* ʒj.

magist. corall. c. succ. citr.

specif. cephal. ana ʒʒ.

Syr. cort. aurant. ʒʒ. M. optime
 profuit: nam hæc potio copiosam purpuram
 expulit:

XIV. *Diarrhœa torminosa cum metu dy-
 senteriae affecto.*

Studiosus diarrhœa torminosa cum metu
 dysenteriae affectus.

℞. ♂ *diaphor.* gr. xij.

☉ *sigill.* gr. vj.

Laud. hyst. gr. v.

☉ *dest. macer.* gr. ij. M. capiat vesperi.

Altero die

℞. ▽ *menth.* ʒiʒ.

+ *fl. sambuc.* ʒvj.

diascord.

diascord. Fracast. ʒiʒ.
magist. corall. c. succ. citr. ʒj.
figill. gr. xv.
Syr. Cydon. ʒvj. M. pro 3. dosibus.

Dietertio

ʒ. *theriac.* ʒj.

ʒo *destill. junip.* ʒʒ.

macis gtt. v. M. pro umbilico

& stomacho illinendo.

ʒ. *pulv. hepat. viper.* gr. xv.

Crystall. præp. ʒʒ.

Laud. hyss. gr. vj. M. pro dosi.

XV. *Hemicrania scorbutica.*

Vir laborabat hemicrania scorbutica pertinacissima, omnia, quæ commendantur, erant frustranea, etiam vesica nuchæ applicata, & mille alia; Commendavi acculos aromaticos, Emplast. de ranis cum, quod malum exasperabat, præscripsi

ʒ. ʒo *Cast.* ʒʒ.

hyoscyam. express. ʒʒ. M. sed frustra. Tandem

ʒ. *ʒil. convall. c. V.* ʒj.

ʒ camph. crocat. ʒʒ.

ʒ *rad. zedoar.* ʒiʒ. M. Applicetur pe cum petiis intinctis, quod successive osuit.

XVI. *Abundantia lactis.*

Ræservationis gratia imposui Alsinem viridem, contusam, probè calefactam in fol. caulium. Cum jam adesset, posternum sudoriferum appositum est Emplast. de spermate ceti Mynsichti, & desuper culi ex oryza, qui probe calefacti subinde sexies per diem impositi & lac resolverunt, libertim ex papillis emanare fecerunt, conato sudore, donec evanescerent.

XVII. *Luxatio vertebrarum. Sputum sanguinis.*

Ir Juvenis ex luxatione vertebrarum patiebatur sputum sanguinis, summam prostrationem, appetentiam abolitam, æstum capitis, tussim continuam, inanem, cum dolore hypochondriorum sinist. punctorio, uno verbo prava symptota. Hinc

ʒ. *Ocul. ʒ. præp.* gr. xv.

ʒ *diaph.* ʒʒ.

myrrh. gr. v.

laud. ferment. gr. ij. M. Sumatur laustu vini pro sanguine congrumato recondo, expectando sudorem, & optime ait. Inde

Succini præparat. gr. xij.

ʒl. ʒ. ʒʒ.

myrrh. gr. iv.

laud. ferm. gr. ij. M. pro 2. dos. ve-

speri & mane sumendis. Cum autem omnia essent exasperata, & æger pessime se haberet, ex supra enarratis symptomatibus, & superveniret respiratio difficilis cum stercore.

ʒ. *sperm. cet.* ʒj. Capiat in cerevisia calida.

ʒ. *ʒl. chamom.* Mij.

herb. chærefol. Mj.

baccar. junip. ʒvj.

ʒ *Tart.* ʒj.

Coqu. in f. q. ʒf. Colat.

ʒ. ʒix. adde

Elect. de baccis lauri ʒvj.

ʒo *dest. bacc. junip.* ʒj.

vitell. ov. N. j.

ʒ *gemme* ʒj. M. pro clysmate propter alvum obstructam & dolorem hypochondriorum.

ʒ. *Sperm. ceti* ʒij. D. pro 2. dos. quæ tussim nocturnam siccam omnino sedarunt.

XVIII. *Asthma.*

Seni asthmatico cum copiosa mucilaginum rejectione præscripsi.

ʒ. *ʒ hyssop.*

menth. ana ʒiʒ.

asthmat. ʒʒ.

ʒ *cochlear.*

ʒ * *ana* ʒj.

Syr. nicot. ʒvj. M. pro potione cochleatim haurienda; Profuit optime: Porro

ʒ. *Sperm. cet.* ʒij.

ʒo *dest. caryoph.*

anis. ana gt. ij. M. pro 3. dosibus ad expectorationem promovendam.

XIX. *Abdominis motus convulsivus.*

Mulier post curatam febrem per ʒo dest. juniperi supervenit gravis dolor abdominis gravativus cum retractione umbilici interiora versus. Hinc

ʒ. *ʒ menth.* ʒiʒ.

ʒ * *ʒʒ.*

Laud. hyss. gr. v.

Syr. cort. aurant. ʒij. M. Tum po-

tio passulata laxativa propinabatur; Et cum superesset dolor in abdominis regione hypogastrica & tumor instar parvi farciminis, applicandum iussi

ʒ. *G. * in * solut.*

Empl. de galbano ana q. f.

Malaxetur cum f. q. ungu. de althea comp. F. Emplastrum irrorandum cum ʒo philosophorum, optime contulit, & ita curata est. Alvus in talibus clausa & obstructa esse solet, ita quidem ut nec purgantia nec clysmata quicquam operentur. Ergo tunc decoctum passulatum propinetur, quod optime prodest: & ubi jam omnia sedata fuerunt, in usu absinthii & absinthiacorum aliquandiu persistendum. Hujusmodi tormina & dolo-

[Uu] 3 res

res sunt revera convulsi, quales nempe paresin inducere valent.

XX. *Cholera sanguinea.*

Hortulanus foci cholera sanguinea simili fere atque Panarolus recenset conflictatus, assumsit R & adstr. ex & præcipitato in præparatione tart. Olati Tachenii, gutt. xij. ad xv. singulis bihoriis in vehiculo vini tepidi, unde substitit fluxus: usurpavit juscula calida, bibit cerevisiam calidam, & rectus quietus omnino in lecto decubuit; Sub vesperam

R. *Lap. hæmat. præp.* ℥j.

Magist. corall. c. f. citr. ℥ss.

laud. byst. gr. v. M. irroretur primo

✕ hinc misceatur vino, stent per dimidiam horam, hinc unà propinentur; optimo cum successu.

Sed cum idem Hortulanus interjectis tribus quatuorve septimanis denuo conquereretur de angustis præcordiorum, puncti-
bus gravissimis in scrobiculo cordis, & hypochondriis, quasi lapis in & sub umbilico jaceret, cum difficillima respiratione; præscripsi primopotionem ex g. ammoniaco, sed sine fructu; subjunxi decoctum fennatum, cum cremore Tart. quod aliquoties laxavit alvum. Hinc

R. R & *aperit.* ℥ij.

~ *anis.* ℥j. M. dos. 50. vel 60. guttæ; unde convaluit.

XXI. *Diarrhœa.*

Vir diarrhœa affectus assumebat

R. ∇ *plantag.* ℥ij.

cinam. cydon. ℥ss.

✕ ℥vj.

diascord. ℥j.

δ *diaph.* ℥j.

Syr. Cydon. ℥ss. M.

XXII. *Diarrhœa.*

Similis mistura Salinum, Chirurgum, gravi diarrhœa decumbentem restituit:

R. ∇ *menth.*

scord. ana ℥ss.

cinam. ℥ij.

✕ *vini* ℥vj.

Theriac. Andromach. ℥ss.

bezoard. min. ℥j.

Syr. rub. id. ℥ij. M.

Hinc vitella ovorum dura cum aceto fuerunt assumpta; item præmissis istis cum remitteret malum, Elixir proprietatis acidum profuit optime. Interpolatis vicibus etiam clystma ex lacte & similibus ordinatum propter gravissimum tenesimum bene conferebat.

XXIII. *Icterus flavus.*

Puer 12. annorum gravi ictero laborans flavo totum corpus mire tingente cum

tumore abdominis ad tactum renitente, pedibus etiam vesperi nimis tumentibus, alvo satis fluxili, siquidem bis vel ter quotidie liquida flavissima rejiciebat; hinc usurpavit ali-quamdiu Ess. absinthii quotidie bina cochlea-ria in haustu potus ordinarii, hinc purgatus fuit per potiunculam cum g. ammoniaco, unde copiosam mucilaginem viscidam seinel evomuit, & aliquoties, optimo cum successu dejecit: quo facto

R. *Ess. absinth.* ℥ss.

~ Θ * ℥ij. M. quotidie 60. vel 70. guttaster assumsit per aliquot septimanas, & ita curatus fuit.

XXIV. *Lues Venerea.*

Germanus in Italia factus Gallus assumsit

R. ∇ *Olat.* ℥j.

ocul. d. præp.

Θ *volat. viper.* ana ℥ss. M. pro 6. dosibus per triduum sumendis. Hinc

R. *Ext. Cathol.*

g *dulc.* ana gr. xv.

Extr. troch. alhand. gr. ij.

c. f. q. Ess. lign. F. pilulæ; unde sexies vel septies evacuavit crassa, quotidie sub digestivorum usu vesperi hora ante cœnam ingrediebatur balneum ∇ tepidæ, insidebat per semihoram præter propter. Purgante adhuc una vice repetito.

R. *Empl. de ran. cum* g ℥ij. linteo obdu-ctum imponebat tibiis dolentibus circa locum, ubi gummatum aliquot vestigia apparebant.

His ita præmissis Chirurgus dedit glia salivatoria? nempe g quendam cum ~ Θ forsan præcipitatum coloris flavi; dabat in principio 3. tum 4. tandem 5. grana, remittendo denuo, donec 19. grana assumeret, mane in pruno arefacto cocto, hauriendo desuper jusculum calidum; primis diebus insequeretur vomitus cum insigni molestia, post omnes vomitus cerevisia secundaria eluebat os, ne aliquid gle in faucibus hærendo ulcera oris pertinacia & periculosa inferret: sed cum cessarent vomitus, æger successive salivabat, in principio pessime se habens, conquerebatur de præcordiorum angustis & satis salivabat, sed quando salivatio non rite succedebat, rotulas ex g dulci cum gummi tragacantha factas sub lingua tenebat, quæ promte promovebant salivationem. Cessante hac salivatione, postquam 14. dies eam continuaverat, & bene se demum habebat, potiones sudorificas ex lignis cum g vivo & δ crudo assumsit, hauriendo omni mane in lecto rectus ℥vj. ad viij. unde prima die alvus bis laxabatur, sequentibus sudoribus reliquis largiter, ita ut 8. vel 10. vicibus cum probe sudasset, curi absoluta esset. Sed cum non perfecte esset curatus,

Hinc

Hinc die 20. præscribo

℞. ▽ *cherefol.* ʒj.

ceras. nigr.

lib. convall. ana ʒvj.

Ess. hyperic. ʒʒ.

~Θ* ʒi

ocul. 3 præp. ʒʒ.

Syr. de beton. ʒj. M. Cochleatim as-

sumsit cum levamine & ob præcordiorum anxietatem & respirandi difficultatem &c. secta à meridie in brachio vena & ʒij. saltim evacuatae sunt egregio cum levamine. Vesperī rediens eam bene se habentem offendo, fluxus menstruus redire cœpit, utut saltem 14. essent dies, quod cum habuerit: potiunculam continuabat, & cherefolium minutim concisum cum jusculo carniū assumit, felici cum successu ad mediam noctem dormivit, post hanc vigil, sed citra ullum symptoma, vel ardorem, &c.

Die 21. copiose fluebant menses; dolor capitis nucham occupabat, continuavit potionem & jusculum cherefoliatum.

Die 22. bene se habebat, evanuerat omnino febris, conquerebatur solum de gravissimis doloribus brachii dextri, lancinationibus cum decoloratione macularum lividarum. Ergo

℞. *Spir. Vini camphor.*

formicar ana ʒvj.

▽ *artic. adextr.* ʒiij. M. inungebatur post fricaturas brachium, quod valde conducebat, menses pure fluebant.

Die 23. bene se habebat, menses remittebant; continuabat Potionem & inunctionem; sicque sensim convaleuit.

XXVII. Febris maligna. Cephalalgia.

Agrypnia. Colica. Epilepsia.

ANno 1673. d. 4. Januarii vocatus ad Nobilem, febre maligna correptum cephalalgia gravi, siti contumaci, ad epilepsiam alias inclinantem, & ex quocunque dulcium esu colicam spasmodicam incurrentem, præscripsi:

℞. ▽ *scord.*

scorzon. ana ʒj.

cord. H. S. ʒʒ.

ʒ *diaph.*

Cinnab. ʒ ana ʒj.

Θ *volat. viper.* ʒʒ.

succin. gr. vj.

Syr. fl. calend. ʒʒ. M. cepit pro tribus vicibus, sed absque sudore. Hinc

℞. *Gelat. C. C.* ʒj. infundendam potui ordinario, qui erat ▽ cum dimidio Vino & succo citri.

℞. *Spec. decoct. carmin.* Mijj.

Θ ʒj. *Coqu. in f. q. ▽ f.*

Colat. ℞. ʒix. adde

Elect. lenit. ʒj.

ʒo *dest. succini* gr. xiv. M. pro clymate: probe ter fuit evacuatus. Vesperī

℞. C. C. f. Δ. gr. xiv.

Cinnab. ʒ. gr. vij.

Θ *volat. succin.* gr. iix.

Camph. gr. ij. M. usurpavit absque sudore.

Die 5. cum nox fuisset tolerabilis & in □ crassa ac foetida scorbuti signa apparerent, & malignitatis nullus superesset metus, mucumque viscidum ejiceret æger

℞. ▽ *menth.*

hyssop. ana ʒj.

~ *cochlear.* ʒj.

arcan. dupl. gr. xv.

~Θ *dulc.* gr. xij.

Syr. nicot. ʒʒ. M. Sumisit cochleatim: horas 3. ante paroxysmum febrilem ardentem, præscripsi

℞. Θ ʒt.

arcan. dupl. ana gr. xij.

camph. gr. ij. M. F. pulvis; qui circa caput sudorem gravem prolicuit, unde & paroxysmus horam integram postposuit, & brevior minusque ardens fuit: verum propter cephalalgiam applicandum præscripsi

℞. ▽ *fl. sambuc.* ʒj.

anethi ʒʒ.

apopl. usit. ʒʒ.

camph. gr. ij. M. pro Ephithemate: cum euphoria.

Die 6.

℞. Θ ʒt.

arcan. dupl. ana ʒʒ. M. capiat hora ante paroxysmum. Sed per 3. horas anticipavit hic, unde nihil actum fuit.

Die 7. bis modo præscriptum pulverem sumisit: paroxysmus hora quarta lenis & brevis rediit; sed hoc die & sequente nocte 7. ad 8. dejectiones liquidas habuit: Hinc

℞. *arcan. dupl.* gr. xv.

magist. corall. c. succ. citri ʒʒ. M.

Assumat ante paroxysmum, qui eodem modo rediit propter agrypniā aliquot noctium.

℞. *Ungu. somnif. usit.* ʒʒ.

ʒo *papav. expr.* ʒj. M. illinat. temporibus.

Die 9.

℞. Θ* ʒʒ. pro 2. dosibus.

Die 10.

℞. ▽ *Card. B.* ʒj.

~Θ* ʒʒ.

Syr. card. ben. ʒij. M. Paroxysmus remisit.

Die 11.

℞. *Ess. ʒ Or.* ʒij. D. sumisit 20. guttas ante meridiem, à meridie potionem.

Die 12. nihil agebatur.

Die

Die 13.

℞. *Elixir. propriet.* ℥ij. Sumſit 30. gt.

tem

℞. ꝑo *chamom.* ʒi.

philos. ʒß. M. pro inungendo o dolente: Pro ſtomacho tandem rectifi- do nunc Elixir ſtomachale Proprietatis, e poſt ſingulos paſtus Elixir menth. cum ꝑ dulci ſumſit.

Singulare erat in hoc ægro, quod ipſe, ut bat, ad colicam paſſionem, & epilepticos tuſ inclinabat, qui graves paroxyſmos in- ant; Colicam quidem patiebatur, quo- ſulcia quæcunque & qualiæcunque come- : Epilepſia verò corripiebatur, quo- ut terrore aut ira afficeretur; Interdum nque malum coincidebat, ita ut ex dul- eſu mox pateretur colicam, i. e. eſ
hn im Leibe / um den Nabel herum/
denn ſichs krümbte / unde etiam ſem- iqualem dolorem percipiebat in regio- edia umbilicali, etiamſi cætera ſanus:
eſ ihn nun ſo vertiere im Leibe / und
ſam herum lieſſe / ſo fähme es ſachte
/ alſo / daß er endlich nicht wiſſe /
in geſchehen / und ſomit denn der Pa- nus epilepticus: Wegen dieſer pathe- n truge er allemal einen Gürtel um
zib / daß er / ſo bald er was von der
merckte / heſſtig zuſammen zog /
ſo verwehrte / daß eſ nicht ſo arg
: Affectus hic ſimillimus erat paſſio- rerum hystericæ; adeo ut ſi fuiſſet mu- omnes dixiſſent, ſie hätte Mutter- vehrung. Unde etiam curam in-

per Martialia.

per Volatilia.

per Opiata v. g. Laudanum Hyste-

per Emplaſtrum ex Galbano umbili- rovendum.

abſoluta cura geſtavitaliquandiu Em- n hoc & continuavit aliquando Liquo- Orem, unde diu citra ullum affectum i vel Epilepticum vixit: cum quo ſo- iam vel ~ ꝑ simplicem, vel ani- ui poſterior etiam in Paroxyſmo Co- n inconveniens erat.

XXVIII. *Phthiſis.*

ſioſus Phthiſicus perfectus & aſthmati- continuo ſuffocandus Die 11. Januar.

Spermat. Ceti ʒi. D. in Cereviſia

~ ꝑ *anif.* ʒi. D. 12. ad 15. guttæ.

▽ *hyſſop.*

cinnam. ana ʒij.

aſthmat. ʒij.

Oxymell. ſcill. ʒiß. M. ſumat coch- r noctem.

n. II. Pars 2.

Die 12. *Sperma ceti* cum ſpiritu ꝑ *anif.* reiteratum. Item

℞. ▽ *hyſſop.* ʒiv.

G. * in * ſol. ʒi.

Syr. de hyſſop. ʒiß. M.

Die 13. continuabatur ſpiritus & ultima potio, ſed moriebatur.

XXIX. *Malum Hypochondriacum. Me- lancholia hypochondriaca. Vertigo.*

JUvenis 21. annorum laborans malo hy- pochondriaco, unà cum incipiente mè- lancholia hypochondriaca, in ſpecie cum vertigine afflictuſ tam jejunuſ quam in ſpecie poſt paſtuſ ſinguloſ graviter. Præmiſſo vo- mitu ad malum hypochondriacum

℞. R ꝑ *Oris* ʒij.

~ *cochlear.* ʒi.

Camphor.e gr. vj. M. doſ. 50. guttæ bis in die. Hæc ipſa bis vel ter repetita fuit; Uſurpabatur enim una euphoria, exinde alvuſ quotidie bis, interdum ter aperta fuit, excre- ta nigra, hypochondria libera facta: Hinc pro Vertigine admodum moleſta & ſtudia turbante

℞. *Pulv. ſem. ſinap.* ʒß.

ſænic.

cumin. ana ʒi.

Cubebæ. ʒiv. M. F. Pulvis, de quo ſemper bihorio ante paſtuſ cepit cul- telli bonam cuſpidem, ſed fruſtra: Hinc

℞. *Elix. menth.* ʒiij.

~ ꝑ d. ʒiß. M. de qua mixtura poſt ſinguloſ paſtuſ cepit cochleare, ſed fruſtra: Tandem

℞. *Petrolei albi* ʒij. Huiuſ cepit in ſi- ne ſinguli paſtuſ 6. ad 8. guttas, in ultimo hauſtu; eaque inunxit leviter præcordia, id quod optime profuit, utut ſubinde ruſtuſ in- duceret.

XXX. *Vertigo.*

A D imitationem huiuſ alii juveni vertigi- noſo dedi præmiſſo vomitu

℞. *Conſerv. menth.* ʒi.

ſalv. vel anthoſ ʒß.

petrol. alb. ʒiß.

c. ſ. q. *Syr. menth.* F. Electuarium, de quo mane q. ſ. cepit, bono ſucceſſu. Cui altera vice ꝑ volatil. ſuccini gr. xv. admiſcui.

XXXI. *Tuſſiſ chronica pertinax. Hyper- cathariſis. Hystericæ paſſio.*

F Oemina tuſſi chronica pertinaci afflicta præſcripſi:

℞. *Laud. hyste.* gr. v.

G. * c. in * ſol. ʒß.

Aloëſ lucid. gr. iij.

Extr. troch. Alb. gr. ß.

c. ſ. q. *Eſſ. ſalv.* F. Pilulæ, quas aſ-

[Xx]

ſumſit

sumsit vesperi hora una ante coenam, bene dormivit, mane aliquoties alvum deposuit, vomuit semel & sana evasit.

Aliquot septimanis interjectis eadem pilulæ eodem modo usurpatæ dederunt vomitus nimios, hypercatharsin torminosam, cruentam, passiones hystericas atroces; Hinc contra hypercatharsin

℞. *Corall. rub. præp.*

C. C. ust.

℥ *diaphor.*

☞ *figill.* ana gr. vij.

Laud. hyst. gr. iv. M. F. pulvis & facculi ex floribus verbasci & chamom. in lacte bulliti applicati fuerunt podici.

Ad hystericas passiones vero Elixir uterinum D. Mich. in vino crebrius usurpavit, expectato sudore; quod profuit insigniter.

XXXII. *Æstus nocturnus febrilis. Orthopnœia. Diarrhœia.*

VIr corripiebatur æstu febrili ingenti, suffocatione & orthopnœia, mucum copiosissime rejiciebat, & diarrhœam patiebatur nocturnam.

℞. *menth.*

scabios. ana ʒiʒ.

bugloss. ʒj.

℥ *diaphor.* ʒi.

Syr. de jujub.

nicot. ana ʒi.

~ *Ⓢ dulc.* q. s. pro grato sapore. M. bene profuit, sudorem copiosum & horridam mucii viscidii rejectionem promovit: propter acerbos dolores punctorios in hypochondrio dextro videbatur esse ex hepate, qui sufflaminabant respirationem, & non permittebant decubitus in latus dextrum.

℞. *o Chamomill.* ʒj.

destill. cum in. ʒj.

Croci ʒi.

Camphoræ ʒʒ. M. illinatur frequenter, super imposito latere nonnihil calente. Pro æstu compescendo nocturno

℞. *Antihæc. Poter.*

Ⓢ *st.* ana ʒʒ.

facchar. ʒ gr. vj. M. F. pulvis. D.

Cum omnia symptomata remisissent penitus intra 7. dies, saltem quod vesperi usque ad mediam noctem copiosissima rejiceret sputa viscida, quæ ex visceris forsan alicujus corruptela & digestionem vitiata oriri putabantur, ordinavi:

℞. *Herb. heder. str. rec.*

Chærefol. rec. ana Mj.

Concil. Coqu. in Mens. i. Cerevis. ad $\frac{1}{4}$ consumit. de hoc decocto bibat ter in die, mane, in prandio, & ante coenam bonum haustum; & in jusculis frequenter capiat chærefolium.

XXXIII. Febris tertiana.

Fœmina 63. annorum laborabat tertiana intermittente, Paroxysmi quotidie 6. ad 7. horas anticipabant, frigus paucum, æstus ingens, debilitas virium insignis, ante Paroxysmum subinde vomitus:

℞. *tart. Glac.* ʒʒ.

Scammon. ʒi. gr. ij.

Troch. alband. gr. ʒ. M. F. pulvis, qui ad 8. vices copiose evacuavit, sed cum summa virium prostratione, & cum immineret novus Paroxysmus, hinc pro temperando æstu & roborandis viribus, simulque febris mitiganda

℞. *acetos.*

rub. Idæi ana ʒj.

succicitri ʒvj.

Theriac. Andromach. ʒʒ.

℥ *diaph.* ʒj.

Syr. rub. idæi ʒvj. M. Febris evanuit in totum: sed remansit ariditas oris, cum dolore punctorio sub costis nothis lateris sinistri:

℞. *scabios.* ʒij.

Ⓢ gr. xv.

Antihæc. Poter. gr. xij.

Laud. ferment. gr. j.

Syr. de jujub. ʒvj. M.

XXXIV. Æstus.

Infans gravi æstu afflictus, post meridiem quotidie repetente accepit

℞. *Syr. cichor. cum rhab.*

de spina cervin. ana ʒiʒ.

ocul. s. ppt.

C. C. f. Δ ana ʒʒ. de quo dimidium sufficienter purgavit; præmissio die præcedente clysmate carminante:

℞. *Arcan. dupl.* gr. xij.

C. C. f. Δ vel ʒ diaph. gr. vj. M. hic pulvis aliquot diebus continuatus omnem æstum sustulit; Item

℞. Ⓢ ʒʒ.

Arcan. dupl. ʒj. M. pro 2. dos.

XXXV. Dolor nephriticus. Dyspnœa, Tussis.

Vir nephritico dolore, dyspnœa, & tussi noctu saltem & cum dorso incumbere affligentibus graviter decumbens cum stertore, ita tamen ut nihil rejiceret, Interdum satis bene se alias habens assumit:

℞. *scabios.*

menth. ana ʒj.

asthmat. ʒʒ.

~ Ⓢ ʒj.

Laud. op. ferment. gr. ij.

Syr.

Syr. de alth.

jujub. ana ℥iij. M. F. Potio, quæ egregie contulit. Interdium lapides & addebantur. Tussis & dyspnœia fere nulla, dolores remissi. &c.

XXXVI. *Dolor & tumor mammae.*

Fœmina cum ablactaret infantem, R. *℥ diaph.* ℥j. *myrrh. el.* gr. vj. M. F. Pulvis, affumat & expectet sudorem; sed prius ex utraque mamma lac in prunas candentes nonnihil emulgeat; Fecit hoc saltem ex una mamma, unde & eadem omne lactis incrementum prævenit; sed cum in altera jam senicæatum lac nihil emulgeri pateretur, otu aquæ tepidæ illud nonnihil resolutum liquantulum emulsit: sed cum nullus furor ex pulvere superveniret, & dolor ac tumor mammae cum sensu grumi lactis coagulati durarent

R. *G. **

Empl. de galban. crocat. ana. M. & mammae imposuit, fovendo crebro cum nteis calidis, & ita successive evanuit.

XXXVII. *Struma.*

Artor struma in collo ex utraque laryngis parte laborans molli, non aut levissime dolente, nisi fortius comprimatur, una in difficili respiratione:

Præmissis Vomitorio ex syrupi emetici ℥ss. inde copiose evacuatus accepit pro uitæ viscidæ resolutione *⊕** ℥iij. de quo otidie capiat bis, mane & vespere, quantum cultri cuspis capere possit. Hinc

R. *Pulv. rad. jalapp.* gr. xvj.

Crem. *♀* gr. xij.

Extr. troch. alhand. gr. j. M. unsexies purgatus fuit; Hinc

R. *Empl. de Galb. Croc.* part. ij.

*G. * in * sol.* part. j.

Malaxetur c. f. q. *℥* philosoph. inducantur erlinteum. F. Emplastrum in forma transacta, applicetur calide, ita ut omni mane vespere digitis simul bene comprimat strumam. Hujus usu aliquoties repetito emolli quidem struma magis, sed non imminuta est, propterea

R. *Empl. de ran. cum* *℥* q. f. F. Emplastrum: assumendo simul interne *~⊕** ad gutt. 40. semel aut bis quotidie, viduo omne acidum.

Applicato hoc emplastro gravis dolor oco strumæ exortus fuit, & hinc inde ulæ pure albo refertæ proruperunt, qui apertis etiam copiosum pus effluxit, uno post bidui usum emplastrum seposuit, & tum mundum ulculculis imposuit, un-

de brevi eadem consolidata fuerunt; & apparuit, cuticulam saltem & cutim hinc inde dictis ulculculis affectam fuisse; unde denuo oppositum idem emplastrum per medium discissum, & utrinque ad laryngis latera applicatum, ne immediate huic superimponendum fuisset, quod sine dolore aut exulceratione successive insensibiliter detumescere fecit. Arbitror ergo, potius ista ulculcula ex aliquali reactione hujus emplastri cum priori ex gummatibus confecto orta fuisse.

XXXIIX. *Struma.*

Similis tumor in collo sceminæ curabatur mox applicando & illinendo frequentius balsamum *⊕* terebinthinatum.

XXXIX. *Febris ardens infantis.*
Tussis.

Infans quatuor annorum feбри quasi ardente, non tamen continua laborabat, cum tussi gravi.

R. *Syr. nicotian.*

emet. ana ℥j.

▽ menth. ℥ss. M. Egregie phlegmata copiosa evacuavit. Hinc

R. *▽ acetos.*

scorzon. ana ℥iij.

⊕ *℥t.* ℥ss.

C. C. f. Δ

℥ diaph. ana gr. xv.

Syr. pap. alb.

cort. aur. ana ℥iij. M. capiat vespere & noctu cochleatim.

Altera vespere pro temperandis humoribus acrius effervescentibus.

R. *Sem. nap.*

card. Ben. ana ℥iij.

amygd. dulc. ambr. ℥j.

c. f. q. ▽ scabios. F. Emulsio adde

C. C. f. Δ ℥j.

℥ diaph. ℥ss. Edulcoretur, capiat cochleatim.

Sequenti vespere tertia

R. *▽ scabios.*

cinam. borrag. l. cydon. (propter alvum laxiorem) ana ℥j.

℥ diaph.

magist. Corall. c. f. citr. ana gr. xv.

~⊕ *d. gt.* xvj.

Syr. papav. alb.

succi scabios. ana ℥iij. M. Capiat cochleatim, hac nocte & sequente die: inde quarta vespere, cum admodum debilis esset, continuante æstu insigni

R. *℞ Corall. c. ~ Cord. Cerv.* ℥ij. Dos. gt. x-xv. capiantur in Cerevisia, vespere

[Xx 2]

& post

& post mediam noctem. Mane optime se habuit, & bona insecuta sunt Calcyonia; restitente sola tussi, cibum etiam egregie simul appetebat.

Hinc pro tussi sedanda

℞. ▽ *scabios.*

hyssop. ana ℥j.

cinam. cydon.

Syr. violar. ana ℥iij.

℞. ☉. *anis.* ℥j. M. cochleatim capiat: & post Spiritus huius solius gt. xv. bis in die assumit.

XL. *Apoplexia: Hemiplegia.*

Foemina Apoplectica erat, & hinc mox latere toto sinistro hemiplectica fiebat: Vocatus vesperi die 6, hor. VI. mox præscribo potionem ex volatilibus & spirituosus cephalicis una cum clysmate acris; item balsamum ex oleis destillatis cephalicis, huic præmisso vomitorio 3li die Solis ordino V. S. in brachio opposito & potionem ex volatilibus & spirituosus carminativam. Die 2

℞. 8 *vit.* gr. ij.

resin. scammon. gr. iv.

Conserv. fl. tunic. ℥iij. pro bolo.

℞. *Pulv. lil. convall.* ℥j.

rad. helleb. alb. 3j.

℞. dest. *caryoph.* gt. iv. M. pro sternutatorio forti.

℞. ▽. *lil. convall.*

ceras. nigr.

menth. ana ℥j.

℞. *ceras. nigr.* 3vj.

☉ *volat. C. C.* gr. xv.

Zing. 8 3j.

Syr. rub. Id. 3j. M.

℞. *Petrol. alb.* 3ij.

℞. dest. *spicæ.*

lavend.

major. ana 3j.

succin. 3ij. M.

℞. *Spir. Vin. Camph.* 3iij.

lumbr. astr. per se destill. 3iij.

Ess. castor. 3vj. M. Primum spiritus hic affricetur, post balsamus inungatur.

℞. *Extr. helleb. nigr.* gr. xvij.

troch. alb. gr. iv.

Castor. 3ß.

℞. dest. *succini* q. s. pro Pilulis.

℞. *Ras. L. Sassafr.* 3ij.

Herb. rorismar. rec. Mij.

bacc. junip. rec. 3ij.

Coqu. in ▽ & vini ana lbss. in cucurbita cum alembico.

Colat. & destillationi adde

℞. *junip.* 3iv.

☉ 3iij.

Syr. flor. tun. 3iij. M. Hanc potio-

nem bis ad imitationem Poterii hausit, quotidie ter, & sudavit.

℞. *Liquor. C. C. succin.* 3ß. D. 40. gutt. aliquando ad 3j. hausit sine insigni alteratione, adeo robusta erat & vegeta.

℞. *G. Tacamah.*

Galban. ana q. s. *Malax. c. s. q.* 8o dest. *succini* F. Emplastrum applicetur collo, à regione dorsi. Pediluvium ex nervinis ▽ s. incoctis quotidie fervide bis usurpatum, optime pedi profuit. Hinc

℞. *Sem. Sinapi* p. j.

bacc. junip. rec. p. ij.

Contus. infundantur in s. q. V vel ~ juniperini: post digestionem tam cum ipso spiritu, quam magmate residuo fricentur membra.

℞. *Specif. Cephal.* gr. xv.

succin. ppt. 3ß.

☉ *volat. succin.* gr. v. M. pro pulvere, qui quater vel quinquies fuit repetitus. Postmodum

℞. ▽ *Ceras. nigr.* 3vj.

~ *theriac.* 3ß.

☉ *diaphor.* 3ß. M. Capiat vesperi una vice: bis hoc modo usurpavit: Primis duabus vicibus anxietatem quandam in præcordiis percepit, item tussim siccam subinde eam stimulantem; hinc calor quidam sensilis in universo corpore erupit, quem levis sudor secutus fuit: Tertia vice pulverem accepit, hora nocturna tertia, unde per 4. horas optime dormivit, & sudore largo perfusa fuit, & optime quoad cætera se habebat; & ex omnibus etiam volatilissimis assumtis talem sensilem operationem nunquam atque ab hoc pulvere percepit. Sed cum metueret sumtus:

℞. *Bals. Δ*

8o dest. *succin.* ana 3j. M. de quo omni mane in jusculo gt. viij. à meridie de solo 8o succini gt. vj. accepit una cum externis. Postmodum frequenter usurpavit *Liqu. C. C. succin.* ad 40. gt. externo usu ~ ☉ c. ♀ paratum, quo bis in die inuncta est largiter. Sed brachium erat immorigerum, & in specie circa scapulam dolebat, seu summitatem humeri: ibi semper post irrigationem & frictionem ~ ☉ c. ♀ desuper inungebatur pinguedine anserina; nunc sola, nunc 8o dest. compos. nonnihil fortificata. Cæterum cum flaccesceret brachium & dolor ostoropus quasi adesset, cum tendinum renitentia, quando flecebantur, metuebam atrophiam & similia symptomata. Inde volebam præscribere:

℞. *Pin-*

℞. *Pingued. hum.* ℥iij.
anferin.
o castor. ana ℥ij.
petrol. ℥ss.
o dest. junip.
succin. ana ℥ij.
spice ℥ss.

Pinguedinibus cum oleo castor. lento Δ quefactis addantur reliqua, & F. unguen-
 um: sed nolebat. Contra hunc tamen bra-
 m. dolorem usurpavit balsamum peruvia-
 um, illinendo locum humeri dolentem fre-
 quentius una cum V cum euphoria, nisi sub
 titationibus tempestatum. Pro dolore ve-
 capitis saepe molestō omni mane capiebat
 - Θ* ad gutt. 30. in iusculo jejuna cum le-
 mine.

XLI. Apoplexia.

A Ne illa quædam insultu apoplectico ta-
 cta erat mox a medio nocte: Accedens
 me illam Hora viii. carnosam, admodum
 ram facie & membris, quasi sanguis un-
 ue stagnaret, offendi, membra difficilli-
 & saltem brachia aliquoties movebat, de
 ma præcordiorum anxietate tremula voce
 querebatur, innuendo scrobiculum cor-

Hinc præscribo vomitorium in paulo
 infiori dosi aliquoties, sed non adeo infi-
 ter purgabatur, supra & infra; circa ve-
 am vena secabatur in brachio, & præ-
 si misturam est ~ Θ* ceu basi cum
 : Regioni vero stomachi applicabatur lin-
 n spiritu vini probe calide imprægnatum,
 ne sæpius reiterabatur. Accedens altero
 ne, eam paulo meliorem offendi, jussi
 em remedia continuare; vesperi satis co-
 a hæmorrhagia narium eam corripit;
 e accedens in eodem statu eam offendi ad-
 rubicundam; hinc cum hæmorrhagiam
 rvassem, non obstante V. Sectione, jubeo
 n in crure opposito brachio, in quo V. S.
 ut facta, circa talem venam incidere;
 te sequente supervenit fluxus mensstruus;
 : continuato usu ~ Θ* interno, cum
 posito semel pulvere laxativo, & exter-
 spiritu vini intra octiduum convaluit. Et
 hac ancilla corpulenta, sed staturæ bre-
 ast robustæ naturæ ultra duplicem venæ-
 tionem adhuc hæmorrhagiam narium &
 i provocavit.

XLII. Catarrhus.

Um Liqueor C. C. succinatus adeo egre-
 gium sit ad affectus catarrhales reme-
 , ad ejus imitationem commode in for-
 ~ C. C. & Θ volat. succini præscri-
 ir; Sic Avia dimidii lateris dolore ex
 his & defluxionibus à lymphâ acri &
 afflicta cum successu præscripsi:

℞. ∇ *lil. convall.*
serpill. ana ℥i ss.
Ess. L. sassafr. ℥iij.
 ~ C. C. ℥i ss.
 Θ *volat.* C. C. ℥j.
succin. ℥ss.
 C. C. *ust.* ℥ss.
Laud. op. ferment. gr. i ss.

Syr. de beton. ℥vj. M. F. Potio capi-
 at cochlearia duo, omni hora, donec sudor
 prorumpat, tunc cesset, & postmodum suc-
 cessive pergat. Caput inungat o dest. suc-
 cini in vertice.

XLIII. Pleuritis.

F Oemine pleuritice utur ~ pleuriticus
 D. Michaelis cum ∇ fl. sambuci egregie
 juvaret, tandem tamen mistura cum Θ vo-
 lat. mandibularum lucii piscis remabsolvit.

XLIV. Pleuritis.

V Ir gravi pleuritide correptus pulsum ha-
 bebat semper post tres pulsationes inter-
 mittentem: octavo die vocatus præscripsi:

℞. ∇ *papav. rhæad.*
scabios. ana ℥i ss.
 & *diaphor.* ℥ss.
Syr. nicot.
scabios. ana ℥vj.

~ Θ *anticol. dulc. q. s.* M. bis usur-
 pavit: prima vice sensibile levamen quidem
 percepit, sed altera vice mire recrudit mor-
 bus, ut moribundus videretur omnibus, &
 quidem semper circa vesperam angebatur
 morbus, præcedente gravi rigore, insequen-
 te vehementissimo æstu, sub quo & delirus
 & summe debilis evadebat, unde decimo die
 præter propter præscribo:

℞. *Sem. Card. Ben.* ℥iij.
c. ∇ papav. rhæad. & scabios. ana ℥i ss.
 F. Emulsio adde: *Mandib. luc. pisc.* ℥ij.
 Θ *volat. mandib. luc. pisc.* gr. xij.
 Edulcoretur saccharo: Mire profuit.

XLV. Pedes œdematosi & ulcerosi.

Asthma. Tussis. Sudor
nocturnus.

V Ir pedibus œdematosi & ulcerosis &
 asthmate gravi cum tussi aliquali, &
 sudore nocturno & c. affligebatur, qui ante in
 alio loco febre ardente graviter conflictatus fuit:

℞. *Liqu. & Or.* ℥ss. Dos. 30. gutt. mane.
 ℞. ~ Θ* *anis.* ℥ss. D. dos. 40. gutt. à
 meridie & sub introitu lecti continuati hi ali-
 quandiu.

℞. *Rad. armor. rec.* ℥ij.
angel.
acor. ver.
ireos flor. ana ℥j.

[Xx] 3

— nostr.

—nostr. rec. ʒiʒ.

Herb. rorism.

menth.

salv. ana Mj.

Fol. fenn. f. f. ʒi.

galang. ʒiij.

cinam. ʒi.

passul. ʒvj. M. pro nodulo.

Cui bis vini mensuram affudit, & primitus bis, postmodum semel in die haustum assumptum, purgavit & in specie asthmatis egregie succurrit.

R. ʒo *dest. menth.*

anis.

junip. ana ʒʒ. dos. gt. x. in haustu istius Vini. Pro pedibus tumentibus in specie vesperi, si interdum ambulasset, vel stetisset, duris, rubicundis, sublividis

R. ~ ʒ * c. ʒi. quo pedes sub introitu lecti & mane surgens inungat, crebro in loco calido, tibialia mox induendo; sic optimi redditus sunt. Continuavit interne semper spiritum pectoralem.

XLVI. *Laetis alteratio post terrorem.*

Retulit mulier juvenula, quod cum lactaret infantem & catellum, in puerperio, graviter perterrita, ita ut affectus mammarum timeret, mox catello porrexerit mammam, qui ex sueto lacte postmodum correptus fuit epilepsia gravi; propinavit ob id eidem mithridatium, unde cum per tres horas fortiter dormivisset catellus, evigilans sine omni noxa ulterius fuit.

XLVII. *Raucedo. Tussis sicca. Febris catarrhalis.*

Anno 1674. puer 3. annorum conflictatus subitanea raucedine, hinc tussi sicca creberrima, & tandem febre nocturna ac vespertina catarrhali

R. ∇ *scabios.*

veron. ana ʒiʒ.

Syr. de Eryfino ʒi.

scabios.

violar. ana ʒvj. M. hauriat cochleatim.

R. ∇ *veron.*

scabios.

Syr. scabios.

eryf. ana ʒvj.

~ *pectoral.*

succin. ppt. ana ʒʒ. M.

R. *Liqu. C. C. succin.* ʒiij. dos. 12. guttae in cerevisia.

XLIIIX. *Febris puerperæ. Cephalalgia. Hypochondrii dolor.*

Puerpera 20. dierum irâ percita incidit subito in gravissimum rigorem, quem

intensissimus æstus, cephalalgia, dolor hypochondrii dextri, &c. sequebantur. Hinc vesperi

R. C. C. f. Δ

ʒ *diaph.*

Ⓢ *ti ana* ʒʒ. M. pro 2. dosibus.

R. ∇ *fl. sambuc.* ʒiij.

Ⓢ *volat. C. C.* ʒʒ. M. pro vehiculo.

Altero mane

R. ∇ *rub. idæi* ʒiij.

scabios. ʒi.

ʒ *diaph.* ʒi.

Syr. acetos. citr. ʒi.

~ Ⓢ *dulc. q. f. M.*

R. *Ungu. dialth.* ʒʒ.

ʒo *amygd. d.* ʒiij.

dest. cumin. ʒʒ.

camphor. gr. vj. M. pro linimento ad latus dolens.

R. *Papav. alb.* ʒiij.

c. ∇ *nymph. & fl. jamb.* F. Emulsio adde.

Croci ʒʒ. M. pro Epithemate frontis.

XLIX. *Febris petechialis.*

Juvenis 14. annorum corripiebatur febre maligna petechiali, principium erat cum dolore aliquali abdominis, crebriori alvi fluxu, succedente pederentim virium prostratione, siti intensa, & appetitu dejecto, & vomitu. Vocatus die sexto die Jovis eundem febre ardente correptum invenio.

R. ∇ *rub. idæi.*

scabios. ana ʒiʒ.

ʒ *diaph.* ʒiij.

Syr. rub. idæi ʒi.

Camph. gr. vij.

~ Ⓢ *dulc. q. f.* M. capiat de die.

Die Veneris

R. Ⓢ *ti.* ʒi.

C. C. f. Δ ʒʒ. M. Nullus sudor, sed sex alvi dejectiones:

Die Saturni

R. *Decoct. hord. c.* C. C. ʒʒ.

Gelatin. C. C. ʒi.

Syr. rub. idæi ʒiʒ.

~ Ⓢ *dulc. q. f.* pro Julebo quem hauriat, quando placet, interjectis his pulveribus:

R. ʒ *diaphor.* ʒʒ.

Zing. ʒ

C. C. f. Δ ana gr. xv. M. pro 2. dos.

Die Solis vesperi

R. ∇ *scord.*

rub. idæi.

cord. H. Sax.

Ⓢ *rub idæi ana* ʒi.

diascord. Fracast. ʒiʒ.

ʒ *diaphor.* ʒi.

bezoard.

bezoard. min. gr. xij.

Syr. rub. idæi ʒi. M. pro 2. dof.

Die Lunæ ratione virium

℞. ▽ *rub. idæi* ʒij.

cord. H. Sax. ʒi.

succi citri rec. ʒvj.

ʒ *diaph.*

magist. Corall. c. f. citr. ana gr. xvj.

Conf. alcherm. ʒß.

Syr. acet. citr. ʒi. M.

Die Martis

℞. ▽ *scabios.*

rubi idæi ana ʒiß.

✱ *rub. idæi* ʒvj.

ʒ *diaph.* ʒß.

bezoard. min. gr. xij.

Syr. rub. idæi ʒvj. M.

Die Mercurii

℞. ▽ *scabios.*

rub. idæi ana ʒi.

Cinam. ʒvj.

Conf. Alcherm. ʒß.

Gelat. C. C. ʒvj.

bezoard. Min. gr. xvj.

⊖ *volat. succin.* ʒß.

Syr. card. ben. ʒvj. M. repetatur alio-
totes; hæc potio omnium optime succes-
s. Hisce continuatis aliisque simillimis
ndem convaluit; non potui autem toto
orbi decursu vel guttulam sudoris elicere,
l saltem alvus singulis 24. horis, bis vel ter,
inde quater erat fluida: Potus erat Cere-
ia secundaria, cum succo citri & gelatina
C., addebatur interdum aliquantulum Vini.

Postquam convaluisset hic juvenis, pau-
post quinque personæ, filia adulta, 2. pue-
& binæ ancillæ eodem affectu laborarunt:
nquerebantur omnes de gravi & continua
phalalgia, lassitudine, & dolore contun-
ate omnium artuum, *alle Glieder thaten
en wehe* / sudabant ex medicamentorum
, sed non nisi coacti, & optime connecti, ma-
que in principio, minus in incremento, vel
1; appetitus plane prostratus, ne odorem
rentorum ferre poterant; potus non nisi
evisia secundaria; ut plurimum alvus ob-
cta, ægrypnæ, hinc deliria & convulsio-
imminentes, lingua arida & squalida,
lor mediocris, sub vesperam subinde exa-
batus: Insistebam vestigiis Sylvii, putans
⊖ vol. acri enervante lympham, aut hu-
saltem inertia vitio aeris hybernici humidi
epidi oriundâ, hos morbos oriri, ob id
piatis compositionibus temperatis eas cu-
os putavi, quæ inter diascordium Fraca-
i, citrata, & ⊖ vol. succini; hinc ʒlia fixa
atum obtinuerunt.

specie ancillæ in principio

℞. *Theriac.* ʒij.

ʒ *diaph.* ʒß.

⊖ *absinth.* ʒj. M. c. f. q. syr. acetos.
citri pro 2. dof. quæ capiantur in cochleari
✱ vini, unde copiosus sudor emanavit: da-
batur ancillæ cum actu fluere mensēs, sine
nocumento, aliquoties repetitum fuit, lar-
go insequente sudore: postmodum creber-
rimo usu hujus electuarii, die noctuque istud
capiendo, & sudorem expectando convalue-
runt.

℞. *Conserv. pulp. Citr.* ʒiß.

diascord. Frac. ʒiß.

ʒ *diaph.* ʒj.

c. f. q. succi citri. F. Electuarium D.

sæpius repetitum optimo cum successu. Imo
omnibus reconvalescentibus ancilla junior
istis ministrans præmissio vomitorio ad con-
tagium eliminandum solo hujus Electuarii
usu convaluit.

Virgini vero & pueris, licet illi quinto
die fluxus mensium integra septimana matu-
rius obtingeret, inter alia præscripti in prin-
cipio:

℞. ▽ *scabios.*

scorzon. ana ʒiß.

rub. idæi ʒi.

Ther. Androm. ʒij.

ʒ *diaph.* ʒj.

Syr. card. ben. ʒß. M.

℞. ▽ *Cord. Cerv.* ʒij.

cinam. ʒß.

succi citr. ʒi.

ʒ *diaph.* ʒß.

bezoard min. gr. xv.

Syr. rub. idæi ʒß. M.

℞. ▽ *rub. id.*

scorzon. ana ʒij.

✱ *rub. id.* ʒi.

diascord. Frac. ʒij.

ʒ *diaph.* ʒj.

bezoard. min. ʒj.

syr. acetos. citr. ʒß. M.

℞. *Decoct. L. sassifr.* ʒiß.

succ. citr. ʒiij.

diascord. Frac. ʒiij.

ʒ *diaph.* ʒiß.

bezoard. Min.

Zing. ʒ ana ʒß.

Syr. acetos. citr. ʒiß. M.

℞. ▽ *scabios.*

menth. ana ʒi.

cinnam.

Gelatin. C. C. ana ʒß.

ʒ *diaph.*

C. C. f. Δ ana ʒj.

⊖ *volat. succin.* ʒß. ad. gr. xv.

Syr. card. ben. ʒß. M.

℞. *Decoct. C. C.* ʒix.

Gelatin. C. C. ʒiß.

ʒ *diaph.* ʒj.

bezoard. Min. ʒß.

⊖ *volat.*

☉ *volat. succin.* ʒß.
Syr. acetos. citr. ʒiß. M.

In summa virium prostratione virginis.

℞. ☐ *scabios.* ʒi.
cord. H. Sax. ʒvj.
cinnam. ʒiij.

Conf. Alchem. ʒß. ad ʒi.
 ☉ *volat. succin.* ʒß. ad gr. xv.
Syr. rub. id. ʒß. ad ʒvj. M.

L. Cancer mammae.

Nutrici filii cacochymicæ, in dextra mamma prope papillam tumorem parvum rubicundum, durum, intus simili quantitate protensum, nisi quod punctiones quasdam in eo interdum sentiret, habenti, metu occultati forsitan canceri, applicavi præmisso sudorifero

℞. ʒ *diaphor.* ʒi.
 ☉ *card. ben.* ʒß. M.

Istius linimenti, quod alias in mamma foeminae cujusdam usurpaveram, & habetur in Hildano Lib. vj. Obs. 75. nisi quod loco succi geranii sumendum præceperim succum semper-vivi maj. utrobique felix erat successus: Hic insensibiliter disparuit tumor, qui in ista levi facta suppuratione & foraminulo superveniente sanabatur. In nutrice optime succedebat negotium; sed cum in profunditate adhuc aliquod tuberculum videretur latitare, applicandum jussi Empl. de ranis Vigonis cum ʒ optimo cum successu.

LI. Febris puerperæ. Erysipelas mammae. Purpura alba.

Puerpera cum ex terrore nocturno, gravi frigore & insequente æstu affligeretur, subsequente sudore, & superveniente erysipelate mammae

℞. ʒ *diaph.* ʒß.
specif. cephal. gr. xij.
 ☉ *card. ben.* ʒß. M. pro 2. dosib. Bene sudavit, cum euphoria: it.

℞. C. C. f. Δ ʒß.
 ʒ *diaph.* gr. xij.
 ☉ *card. ben.* ʒß. M. pro 2. dosibus.

Et cum repeteret semper paroxysmo quodammodo similis altero quolibet die, cum dolore tensivo dorsi & cephalalgia, eadem vel similia ante paroxysmum usurpata tandem malum cessare fecerunt.

Mammæ impositi sunt flores sambuci aridi, Spiritu Vini irrorati, quam calidissime.

Applacata quoque fuerant nunc ante, nunc post paroxysmum clysmata: Aliquando pro temperando æstu:

℞. ☉ ʒi. gr. xv.
 ʒ *diaphor.* ʒß. M. unde in paroxys-

mo æstus levis, vel nullus, sed frigus paulo intensius.

Tandem cum excretio quædam hinc inde quasi purpuræ albæ se ostenderet:

℞. C. C. f. Δ ʒi.

Lap. bezoard. or. gr. xij. M. capiat, quantum lata cuspis cultelli recipit in Rob Sambuci, idque repetitis vicibus, hoc optime contulit, & eam tandem sanavit.

LII. Catarrhus. Tussis. Narium Obstructio. Ischuria.

Infanti 3. septimanarum catarrho in naribus, harumque obstructione afflicto, item tussi, & copioso muco viscido in stomacho obruto, adeoque stertenti præscripti:

℞. ʒ *amygd. dulc.*
irin. ana ʒß.
dest. major. gt. viij. M. pro naribus.
 ℞. *Syr. nicot.*
hyssop. ana ʒiß.
emet. ʒi. M.

Item ℞. *Syr. nicot.* ʒiij.
spin. cervin. ʒij.
emet. ʒi. M. optime profuit.

Ob aliqualem ☐ defectum pubes illinebatur ʒo Scorpionum.

LIII. Æstus. Pavores nocturni. Epilepsia.

Puero 1½ anni gravi æstu, siti, & pavoribus nocturnis, hinc & repetito Paroxysmo Epileptico afflicto præscripti:

℞. ʒ *epil.* ʒl. gr. ij.
Ebor. f. Δ. gr. viij. M. pro 2. dosibus. Sequebatur vomitus, somnus & quies.

℞. *Ungu. Epil. ex ʒo ricini* ʒi. Illinatur regioni umbilici, & scrobiculo cordis.

℞. *Hb. & fl. Chamom.* Mj.

☉ ☐ ʒi. M.

Coq. in l. q. ☐ Colat. ʒiij. adde
Mell. ros. ʒiij.

ʒo *dest. succin.* ʒß. M. pro clysmate cum vitello ovi.

Nisi suffecissent, ad Liqu. C. C. succin. confugissem, qui in infante alio 5. septimanarum in æstu, torminibus abdominis & metu imminentis epilepsiæ ad gt. iij. in lacte nutricis interdum usurpatus optime profuit. Cui malo incipienti præscribebam:

℞. ☐ *Ceras. nigr.* ʒi.
Syr. spin. cervin. ʒiij.
ocul. ʒ. ppt.
CrySTALL. ppt. ana ʒß.
 ☉ *volat. C. C.* gr. vj. M. Cepit subinde.

LIV. Febris catarrhalis. Calor nocturnus.

Vetula 60. annorum, cum aliquandiu gravedine laborasset, corripitur tussi gravi,

tavi, cum intensissimo corporis æstu post
nam & duram horripilationem; tussis
rebra, inanis, respiratio difficilis, ut dice-
t: *Es sey ihr ein Steckfluß gefallen*; quan-
tilocum à tussi irritatum, monstravit scro-
culum cordis: Erat tum hyems intensa, &
assabantur febres catarrhales similes; præ-
scribo:

R. ∇ *scabios.*

menth. ana \mathfrak{z} ss.

~ Θ * \mathfrak{z} i.

Laud. op. gr. ij.

Syr. de Eryfino \mathfrak{z} vj. M. Capiat subin-
: Percepit aliquale levamen, sed rejicere
equam vix potuit.

dino clyisma ordinarium; hinc

R. ∇ *scabios.*

menth. ana \mathfrak{z} ss.

~ Θ * \mathfrak{z} i.

fl. $\frac{1}{4}$ \mathfrak{z} ss.

Laud. op. gr. ijss.

Syr. scabios. \mathfrak{z} ss. M. Mire laudavit
e potiunculam ab effectu: *es habe ihr
e Lust gemacht/ ob sie gleich nichts aus-
gerissen*: calor erat remissus, tussis maxi-
n partem pacata; erat quam pronissima
affectus hypochondriacos seu hystericos,
e dulcia suadere non poteram, quorū sapo-
abhorruit. His ita omnibus bene percu-
saltem sitis & calor nocturnus admodum
stus erat, erat enim scorbuticus.

Arcan. dupl. \mathfrak{z} ij.

\mathfrak{z} *diaph. \mathfrak{z} i.* M. pro 3. dosibus.

LV. *Casus gravis à traha.*

It die à casu gravi à traha septimo gravif-
simis torminibus alvi & præcordiorum
stis, ita ut jamjam suffocaturus videre-
sine vestigio læsionis vel externæ vel in-
corripitur. Hinc die 8vo præscribo:

∇ *menth.*

chærefol. ana \mathfrak{z} ss.

~ Θ * \mathfrak{z} i.

\mathfrak{z} *dest. cumin.*

anis. ana gutt. iij.

Laud. ferment. gr. ij.

Syr. card. ben. \mathfrak{z} vj. M.

clyisma carminans cum \mathfrak{z} *dest. succin.*
præscriptum: his mire alleviatus & re-
is fuit; tandem

~ Θ * *simpl.*

anis. ana \mathfrak{z} ij. M. dos. 50. gutt. qua-
lic.

I. *Vomitus. Sitis. Amaror oris.*

liosus inconvivio bene saginatus, sed
igni iracundia affectus, subsequen-
tibus continuis corripitur vomiti-
fastidio & nausea insigni ab omnibus
sitis intensa, cerevisia sapit, & reti-
om. II. Pars 2.

netur in stomacho, prætereaque nihil: os ari-
dum, molestissimo amarissimoque sapore in-
fectum; die octavo præter propter

R. ∇ *menth. \mathfrak{z} ij.*

cinam. \mathfrak{z} vj.

succicydon. \mathfrak{z} i.

~ Θ *dulc. q. s.* M. egregie contulit:
Vomitum & sitim compescuit; Aliquoties
reiterabatur.

R. Θ \mathfrak{z} t. \mathfrak{z} i.

arcan. dupl. \mathfrak{z} i. M. pro 3. dos.

Sed cum sitis & amaror adhuc continuaret

R. *Elix. Propr. \mathfrak{z} ij.* Dos. 40. gutt. mane ad
temperandum oleum bilis & fastidium carnis
tollendum.

R. *hepat. rubr.*

ebor. f. Δ ana gr. xvij. M. Detur in 4plo.

Omni die à meridie hora quinta capiat: opti-
me profuit imprimis hic pulvis ad laxandam
alvum:

R. *Decoct. tamarind. \mathfrak{z} v.*

Succi citr. rec. \mathfrak{z} i.

Syr. rub. id. \mathfrak{z} ss. M.

LVII. *Æstus infantis. Epilepsia. Abdo-
minis durities & inflatio. Diarrhœa.*

Tenesmus.

PUella \mathfrak{z} $\frac{1}{2}$ annorum gravissimo æstu, sed
nonnihil vago & brevi post imminenti-
bus convulsionibus epilepticis affecta, cum al-
vo crebrius laxa & appetitu omnino prostrato

R. *C. C. f. Δ gr. xvj.*

\mathfrak{z} *diaph. gr. xij.*

myrrh. gr. iv. M. pro 2. dosibus.

R. *Sem. card. ben. \mathfrak{z} ij.*

aquileg.

nap. ana \mathfrak{z} i.

c. f. q. ∇ scabios. F. Emulsio, adde

C. C. f. Δ \mathfrak{z} ij.

Ess. myrrh. tartarif. \mathfrak{z} ss. M. Edulcoret.

R. *R Corall. c. ~. cord. cerv. \mathfrak{z} ij.* D. \mathfrak{z} 2.
ad 20. gutt. Mire profuit.

Sed non diu duravit, pro abdomine in-
durato, inflato & dolente nonnihil

R. \mathfrak{z} *dest. chamom. \mathfrak{z} ij.*

dest. cumin. \mathfrak{z} i.

anis. \mathfrak{z} ss. M. inungatur abdomen.

Sed cum die sexto gravis superveniret
diarrhœa, cum omnimoda virium prostratio-
ne, pulsū celerrimo & frequenti; indebat
cerevisiæ vitellum ovi ad duritiem coctum
cum nuce moschata:

R. \mathfrak{z} *figill. \mathfrak{z} ss.*

magist. Corall. c. f. citr. gr. xij.

\mathfrak{z} *dest. anis. gt. ij.* M. pro 2. dos.

Externe theriaca in forma emplastri sto-
macho & vicinis locis imponatur: Item cum
diutius sederet super latrina, & putarem esse
affectum tenesmodem, cum excrementa li-
quida cum impetu flatuoso prodirent, &
etiam sonitus & borborygmi vel adstantibus

[Y y]

fac. e

facile perceptibiles adessent, crebro injiciendum curavi clyisma ex Lacte cum melle: unde optime habuit: item

R. ~ $\textcircled{\text{D}}$ *d. anticol.* ʒij. D. dof. 8. vel 12. gutt. in haustu Cerevisiæ, subinde continuata hæc, pulveres, spiritus, & clysmata aliquanndiu, tandem valetudinem restituerunt. Cum his adhibitis convalesceret successively, sed lassitudinem, in specie vespertinam cum exæstuatione insigni corporis illo tempore perciperet, aliis irritis:

R. *Vini infus. Croc. Metall. absinth. filtr.* ʒij. D. mane vomuit sexies varia, cum euphoria, hinc crebrius dederunt cremorem Tart. mane in jusculo.

LVIII. *Febris ardens pueri. Murmura abdominis.*

Puer 3¹/₂ annorum corripiebatur febre continua ardente gravi, forsitan ex iracundia nimia, cum vomitu nimio primis diebus affligente. Hinc

R. ∇ *rub. id.*

scabiosf. ana ʒj.

succ. citr. rec. ʒʒ.

Diascord. Fracast. ʒj.

δ *diaph.* ʒj.

Syr. rub. id. ʒʒ. M. subinde cochlearim detur, sed respuit cum vix unum alterumve cochleare assumsisset; Hinc cum immorigeruseffet, ratione medicamentorum, attamen crebri flatus & murmura adessent:

R. ~ $\textcircled{\text{D}}$ *d.* ʒj. D. gr. iix. ad x. in haustu potus ordinarii, aliquoties in die, hinc reiteratis clysmatibus tandem cum hoc spiritu repetito convaluit.

LIX. *Acupunctura in digitis.*

ANcilla mea apicem digiti indicis in manu dextra aculaserat, non æstimavit, sed aliquot diebus interjectis horridum dolet totus digitus, tumet apex dolore pulsatili, insigni, manus tota & dimidium brachium calore ardenti insigni torquentur: applicavit Emplastrum Helmontii non sine levamine; digiti læsi primò articulum, hinc totam reliquam manum dolentem involvit linteis probe intinctis in ∇ Ψ recentem, unde symptomata remissa; pomodum cutim aperiendo in apice digiti, copiosus sanguis crassus & purulenta materia exiit; continuavit solam ∇ Ψ (metuebam gangrænam) & omni mane & vespere similem materiam evacuavit, donec videretur cavitas subuisse, hinc abscissa cuticula extrema satis crassa, ingens cavitas, nova tamen cuticula denuo tecta apparuit, in summitate saltem digiti foraminulum, cruentum, acutissime dolens apparuit, applicavi oleum seu balsamum

vulnerarium cum bombace, involvendo linteum mundum, & in reliquis continuando ∇ Ψ , sicque præter meam spem convaluit.

LX. *Tussis. Arthritis. Dysuria.*

Vir conflictatus tussi contumaci, chronica, primitus ex inclementiore & contracta cum adjuncta vel saltem superveniente arthritide, aliquali & nephritide

R. ∇ *scabiosf.*

menth. ana ʒiʒ.

~ $\textcircled{\text{O}}$ ** anisf.* ʒij.

Liqu. C.C. succin. ʒj.

Laud. op. gr. iʒ.

Syr. scabiosf. ʒj. M.

R. ∇ *scabiosf.*

papav. rhoead. ana ʒiʒ.

~ *pector.* ʒiij.

fl. Δ ʒij.

Syr. scabiosf. ʒj. M.

R. ~ $\textcircled{\text{O}}$ ** ʒij.*

cochlear. ʒj. M. 30. guttæ bis vel

ter in die: ut ad aliqualem sudorem disponatur. Sed hoc cessante superveniebat gravis dysuria & repetita insignis tussis, ex sale per sudorem discutiendo, ad vias urinarias detrufo.

R. *Amygd. d. ambrosf.* ʒʒ.

sem. violar.

papav. alb. ana ʒij.

c.f.q. ∇ alkekengi F. Emulsio ad ʒvj. adde

Lap. percar. ʒj. Edulcoretur parum.

Bene contulit: Repetita est aliquoties. Ad derivandum acrius serum per alvum

R. *Conserv. ros.* ʒʒ.

tart. $\textcircled{\text{O}}$ lat. gr. viij.

res. jalapp. gr. v. M. Erat enim facilis solutionis & naturâ laxioris alvi.

R. *Decoct. ras. L. Sassafr.* ʒiv.

Syr. rub. id. ʒiʒ.

succ. citr. q. f. M. pro aliquali debilitate & temperanda siti matutina.

LXI. *Purpura rubra.*

Puerpera purpura rubra correpta cum febre continua mediocri, sed ingenti prostratione virium & acerba cardialgia, sensu quasi constrictorio circa scrobiculum cordis acerbissimo die à partu octava accepit

R. *C.C.f. Δ* ʒʒ.

δ *diaph.* ʒj.

myrrh. gr. vj. M. pro 2. dosibus.

R. ∇ *fl. sambuc.*

card. ben. ana ʒiʒ.

carminat. ʒiij.

succi citri recent. ʒj.

δ *diaph.*

magist.

magist. corall. c. f. citr. ana ʒß.

Syr. pap. alb. ʒj. M. Applicetur infimul Emplastrum parvum ex tacamahaca c. ʒo Uccini malaxatum. Quod aliquoties contulit; sed cum secunda vice reiteraretur acua est potio cum ~ cochleariæ ʒß. sed non deobene, quia mador corporis sensim cessavit, & purpura minus constans cuti adhærebat; imbecillis admodum fiebat puerpera, & in specie præcordiorum angustia summam vexabant, frequentius vomituriens erat. Hinc

R. Sem. napi,

aquileg.

card. ben. ana ʒj.

myrrh. gr. ix.

c. f. q. ▽ card. ben. F. Emulsio, adde C. C. f. Δ ʒj.

ʒ diaph. ʒß. Edulcoretur parum.

Mire contulit, expulit madorem & copiosam purpuram, & præcordiorum angustias omnes penitus levavit, & discussit, ob id iter repetita est Emulsio.

XII. *Pedum tumores œdematosi. Dolor vagi. Scorbutus.*

Omina tumore œdematoso pedum, doloribus lancinantibus gravissimis nominimprimis ingravescens, doloribus & moribus partium vagis cum coloratione poris totius scorbutica, maculis insigni cum aliquali protuberantia hinc inde presens afficiebatur. Inter varia iminis melius conduxisse visa sunt:

1. *Arcan. dupl. ʒiv.*

ʒ diaph. ʒj.

ʒo dest. menth. gr. vj. M. pro 4. dosi capiat mane in lecto expectando sudore.

LXIII. *Arthritis vaga.*

Tr arthritis vaga laborans assumit:

R. C. C. f. Δ

arcan. dupl. ana ʒj.

ʒ diaph. gr. v. M. qui pulvis optime sit, item decoctum strobilorum pini, nodo paratum: *Nimm diese Zäpflein gleich so viel frische Wacholder-Beer / eide und stosse alles klein / thue halb so / als davon eins ist / gestosne Wursel da darzu / gieß darauf heiß Bier 2. Kan- laß auf dem Ofen eine Nacht wohl n / denn koe es / biß der dritte Theil n verbracht / davon Abends und Vor- einen Trunk gethan / und wenns ich / drauf geschwigt / man kan auch / die Species genug gekocht / ein paar kleine Rosinen / so zerquetst / hinein / und denn erkalten lassen.*

[om. II. Pars 2.]

Omnium optime videbatur proficere ʒ diaph. ʒle, crebrius & aliquandiu usurpatum.

LXIV. *Contusio.*

Servo ab equo insigniter compresso & exinde leviori contusione & tumore insigni, una cum tumore & saggillatione oculi afflicto præscripsi:

R. Ocul. ʒ. pptor. ʒiß.

ʒ diaph. ʒß. M. pro 2. dosibus in aceto assumendis expectato sudore.

R. Rad. symphit. maj. ʒßß.

figill. Salom. ʒiij.

Hb. chamom.

melil. ana Mij.

Farin. faen. græc.

fabar. ana ʒjß. M. Coqu. bi-

na vice, saltem primo medietas, hinc altera: & in forma Cataplasmatism applicetur. Quo facto ad reliquias tumoris & suffusionis in brachio discutiendas

R. ▽ artic. ad Extr. ʒiij.

~ ⊖ * c. ♀. ʒj. M. Illinatur brachium post aliqualem frictionem, & imponatur de super Emplastrum Helmontii. Repetantur hæc, donec omnia disparuerint.

LXV. *Mamma mirabilis Juvenis.*

Juvenis 17. aut 18. præter propter annorum patitur tumorem mammae dextræ insignem, intensissime dolentem, sed periodicum: nempe quando Luna crescit, successive mamma intumescit, donec sub plenilunio turgidissima fiat, tumor palmarum manus latissimæ circumferentiam æquat per circulum, protuberantia vero admodum prominet, intensissime dolet, & nihil à naturali colore mutata apparet, sine ardore aut æstu, aut rubore; cutis nitida, tenera & candida conspicitur, saltem sub tumoris incremento venæ carulescentes, in naturali tamen situ magis conspicuæ sitæ sunt, sed non aliter ac si mulieri mamma nimio lacte turgeret; Corripitur simul subinde Epilepsia, mamma interea sinistra in naturali statu semper immutata, aliorum virorum instar permanet, humilis æqualis & depressa. Dum plenilunium præterit, etiam dolor remittit, mamma fit minor, flaccida, pendula, mollis instar mulieris; quæ jam semel aut bis puerum ablatavit, rotundioris tamen nonnihil figuræ, indolens, donec superato novilunio modo citata redeant symptomata. Epilepsia tamen vaga est, & non præcise ex mammae vitio dependere videtur, quia hac correpto propinant Ram Dnæ cœruleam, adeoqueREAM, [Yy 2] qua

qua assumpta sequitur vomitus, indeque mali remissio. Patitur ab octo jam præter propter annis hoc malum, ita tamen, ut successive in tantum exasperatum fuerit: nihil ex mammis usquam excretum fuit. Occasio mali fuit, quod puer adhuc perulans, nescio quo casu à vetula in dictam mammam fuerit calcitratus; Constitutionis erat teneræ, macilentus, & exsuccus, puer adhuc nephriticis tentatus fuerat affectibus; Mortuo tandem hoc ægro & epilepsia interemto 4. vel 5. diebus à plenilunio, aperio cadaveris mammam affectam, eamque jam flaccidam denuo, facile aperta per crucem cute, separo à subjecto musculo pectorali, sine præsentia ullius vasis insoliti, nisi quod sub axillis, ubi thoracica & intercostalia superiora vasa ad mammam derivantur, hæc plus solito & debito magna & crassa, ut sic dicam, seu ampla, sanguine naturaliter referta conspicerentur; glandulæ axillares denudatæ nullum commercium peculiare cum mamma habere videbantur; Mamma ergo in totum abscissa seorsim examinata instrata erat tenui pinguedine flava; ipsum vero parenchyma ejus seu tota substantia hinc inde per medium discissa tota glandulosa erat, compacta ex puris putis glandulis, invicem contextis, quibusdam seorsim pisi magnitudine existentibus. Substantia hæc glandulosa, aliis glandulis naturaliter constitutis simillima, candida, glabra, tenera, sed admodum copiosa: vasorum quorumcunque aut naturalium aut p. n. nec in mammæ superficie, nec in substantia, nec in cute investiente nullum vestigium: simillima erat uno nomine mammæ muliebri, nisi quod pinguedo admodum parca adesset: de cætero systema erat glandulosum & copiosissimum & optimæ notæ.

LXVI. *Gonorrhœa virulenta.*

B Inos Studiosos gonorrhœa probabiliter virulenta ex coitu impuro contracta cum dolorosissima mictione, pure profluente & parvis ulcusculis in glande & ejus radice laborantes curavi:

℞. *Extr. panchymag.*

℞ *dulc.* anagr. xv.

Extr. troch. alb. gr. ij.

c. f. q. s. o. dest. terebinth. F. Pilulæ.

℞. *Balsam. ♀ terebinth.* ʒij. D. 15. ad 20. gutt. bis in die.

℞. ∇ ♀ ʒij.

plantag. ʒj.

Aloes epat. ʒß.

Mell. ros. ʒvj. M. pro injectione in penem cum parva syringa, aliquoties in die instituenda.

℞. *Ungu. diapomph.* ʒiij.

℞ *dulc.*

aloes ros. anagr. xv.

Mell. ros. q. s. M. F. linimentum pro ulcusculis illinendis intra glandem & præputium.

℞. *Empl. de Ranis c.* ʒ ʒvj. D. imponatur glandulis circa inguina nonnihil tumefactis.

Ut penitus tandem purificetur Massa sanguinea

℞. ʒ *bezoard.*

Cinnab. ʒ ana ʒj. M. pro 6. dosibus.

Et si quid superest glandularum tumefactarum o. dest. succini illinatur.

LXVII. *Epilepsia ex terrore.*

R Ustica octo annis epilepsia conflictata, ita ut interdiu pariter atque noctu Paroxysmis crebrius, interdum 6. vel 7. vicibus intra nycthemeron corriperebatur subito in templo pariter ac domi brevi denuo evanescente Paroxymo, &c. Huic præmissio Vomitorio ʒli, (nam alia rusticorum emetica nihil profecerant,) dedi de Visco corylino, quo assumpto pulveretenus & aliquoties repetito, Paroxysmi omnino evanuerunt, & intra 14. & plures dies non ingruerunt: & quoties sentiebat ingruentem Paroxysmum, quod fiebat: *wenn es erst in der linken Seite grübelte* / assumebat aliquantulum de dicto pulvere & subito omnis commotio cessabat, *es drückt so hübsch nieder* / dicebat; & non poterat malum se exerere, sed tandem evanuit; Post aliquot septimanas ipsa reddebatur ægrotæ, febre laborans, una cum ancillis aliis rusticis, in quo affectu malum rediit. Epilepsia talis reddita fuerat ex terrore, &c.

LXIX. *Epilepsia.* •

V Irgo Epileptica 17. vel 18. annorum à decem annis hoc malo conflictata misere & simul horribiliter, pauperrima simul: Contraxerat affectum ex percussione gravi, varia pertulerat, & perpeffa erat, etiam fontes Hornhusanos biberat; omnia tamen frustra: in specie circa novilunia horride vexabatur, ex improvviso malo repetente; item circa plenilunia, sed circa hæc tamen mitius: mediis temporibus parcius, item rarius, dum non esset epileptica, ante Paroxysmum quasi erat maniaca, post Paroxysmos cessantes melancholica, donec mens rediret, & negotia sua prudenter tractaret; sed dum redire volebant Paroxysmi, morosa & maniaca, hinc epileptica, & tandem melancholica reddebatur; omnibus his aliquot diebus plus minus durantibus.

Sub Novilunio ergo die 25. Maji An. 1674 gravissimis corripitur Paroxysmis Epilepticis; roga-

rogatus ego præscribo digestivum & hinc vomitorium 3le ex 7 emetico, ad gr. IV. unde varia copiosa instar spermatis ranarum tandem per inferiora excrevit: sed cum nihilominus atrocitas morbi perstaret, & ipsa lassata insigniter furibunda adhuc simul esset, in specie cum per 12. dies & noctes nihil dormiverat, dedi de pulvere visci corylini præter propter 3j. ad 3iβ. dividendo in 4. partes æquales; dedi primam dosin hora octava matutina, unde post horam quæta & placida reddita fuit, malum cessavit; secundam dosin dedi hora 2. pomeridiana, quæta mansit, tertiam dedi vesperi hora nona, unde cepit dormire, & gravi stertore somno sepulta, ab ista hora nona usque ad horam secundam pomeridianam alterius diei, & ita 18. horas dormivit: expergescens diu de paroxysmo nil amplius sensit, utut promiscue nunc pavoribus nocturnis, nunc maniacò affectu per intervalla corripereetur; interea dedi Liquorem 7 Orem, omni mane 20. ad 30. guttas, à meridie vero hora quarta dosin pulveris corylini: erat bibula, simulque insigniter famelica: cum hæc ad 2. vel 3. septimanas ita continuasset

℞. 7 Blat. gr. xv.

Scammon. 4t. gr. j.

Extr. troch. alb. gr. vj. M. Sed

nihil operatus fuit ne minimam dejectionem, & ne ullam quidem corporis commotionem; acido ejus omnia hæc corrodeute, & figente; ob id

℞. 7 Emet. gr. iij.

Scammon. 4t. gr. j. M. capiat mane.

Quo facto cum bene esset purgata, omni mane unum vel duo cochlearia sumsit de solutione seu lixivio cinerum clavellatorum, à meridie vero semper 3j. de pulvere visci corylini, sed his non conferentibus cum insana admodum rederetur, præmissò Vomitorio eodem cicur evadebat, cum vorax esset:

℞. Limat. 7 3j. Capiat mutuo mane de hoc pulvere bonam dosin & altero de cineribus clavellatis.

LXIX. Leucophlegmatia.

Viro Potatori Leucophlegmatia laboranti cum medicamenta in parva dosi respiceret, præscripsi sequens decoctum, per urinam operando maxime proficuum.

℞. Rad. rec. bryon. 3j.

asari 3β.

Θ 7 3iij. Infund. inf. q. 7 f. Stent in loco tepido per noctem, mane adde

Rad. Vincetoxici 3j.

Comar. absinth. Mj.

Flor. bellid. Mβ.

Bacc. junip. 3vj.

sem. fœnic.

anis. ana 3ij.

Conc. Cont. infund. & coqu. simul. Colaturæ 1b ij. adde

~ Θ *

R nephrit. ana 3iij.

Syr. de hyssop. 3iij. M.

De hoc assumsit æger quotidie ter, mane, meridie, & sub introitu lecti bonum haustum, ita ut uberiori urinæ profluvio factus fuerit sanus.

LXX. Icterus.

LABORABAT quidam pertinacissima alvi obstructione cum colica intensissima, cui icterus & febris continua superveniebant, hiæque lethales: Ab obitu dissectione facta, adverterunt fellis vesiculam grandem, & confertissimam, infimumque porum viscida pituita penitus obstructum, adeo ut post abscissionem hujus ductus biliarii ne gutta quidem bilis proflueret, quia hæc ibi contenta crassissima atque tenacissima erat.

LXXI. Peripneumonia.

MELANCHOLICO cuidam Peripneumonia laboranti cum dolore gravativo pectoris, difficili respiratione & capitis atque oculorum dolore, præscripsi in incremento morbi:

℞. Conserv. heder. 7 str. 3j.

8 diaph. 3β.

Θ volat. succini.

Bals. Peruv. ana gr. v.

c. syr. scabios. q. f. F. bolus.

Cum citra manifestam causam aliquot noctes insomnes duceret:

℞. Conserv. flor borrag. 3j.

Conf. Alchem. gr. xv.

Θ volat. succin. gr. iv.

Laud. op. gr. iβ.

c. syr. papav. q. f. F. bolus.

Ordinabatur etiam ~ Θ * cum ~ carminativo mistus.

LXXII. Hæmoptoe. Phthisis.

STUDIOSUS gravi hæmoptoe laborabat, cum ex aliquot annis tussi humida, spiritu minus libero, nativa corporis constitutione aliisque similibus ad phthisin esset dispositus.

℞. 7 plantag. 3iij.

Cinam. 3iij.

✱ vini 3β.

Corall. rubr. præp. 3ij.

7 sigill. 3β.

Laud. op. gr. iij.

Syr. myrtin. 3iij. M.

Cujus usu sputum cessavit. Hinc pro reliquiis grumosis resolvendis

℞. 7 Chærefol. 3iij.

[Y y 3]

✱ vini

✱ vini ℥iij.
Lap. ʒ. 3j.
ʒ diaph. gr. xv.
Syr. scabios. ʒβ. M.

His præmissis.

℞. Ras. santal. rubr. ʒj.
L. saffr. ʒβ.

Macer. per xij. Hor. in ∇ com. ℥vij.

Coqu. ad consumptionem ℥ββ.

adde Herb. heder. ʒstr.

veron.

Com. hyper. ana Mij.

sem. fœnic. 3vj.

Passul. min. conquass. ʒj.

Coqu. ad reman. ℥iv, circa finem adde

Rad. liquir. ʒiij.

De colatura capiebatur bonus haustus mane, à meridie & sub introitu lecti. Unde malum sævire desiit, ægro bene se habente, saltem quod calor quasi hæcticus ab omni pastu cum tussi moderate humida & copiosissimis sudoribus nocturnis etiam sub primis somni horis superessent. Hinc ad demulcendum calorem

℞. Lap. ʒ. præp.

Antihæc. Poter. ana ʒβ.

Corall. rubr. præp. ʒj. M. pro 2. dof.

ob sudores nocturnos

℞. Lap. ʒ. præp.

Antihæc. Poter. ana ʒβ.

Arcan. duplic. ʒij.

Laud. op. ferm. gr. v. M. D. pro 4. vel 5. dosibus Hor. v. præter propter sumendis.

LXXIII. Lues Venerea.

JUvenis 20. annorum non adeo purus à Lue ʒea, conqueritur de macie, siti intensa antemeridiana, saliva glutinosa, imbecillitate virium, anxietate præcordiorum, appetitu admodum dejecto, doloribus cruris, imprimis, sudore copioso matutino, calore p. n. per noctem affligente, manus & extrema insigniter interdiu frigebant, ☐ turbida, subinde copiosis Θbus ruffis scorbuticis vitro adhærentibus imprægnata. **Er sahe gang schwindsichtig aus.** Aliis irritis dedi Liqu. ʒ sol. ʒ ʒβ. ad 40. gutt. mane in haustu jusculli, 20. à meridie Hor. v. in haustu cerevisiæ frigida, unde melius longe habuit: Continuavit hunc ad 2. septimanas.

℞. Rad. Chinæ in taleolos concis. ʒβ.

Liquirit 3vj.

santal. rubr. ʒiij.

Infund. in ∇ com. ℥vi. Stent in digestionem per ϑ in MB. mane adde

Passul. min. conquass. ʒβ. Coque Alento, vase cooperto ad remanentiam ℥iv. de quo quotidie capiat bonum haustum bis; mane & à meridie; unde adhuc melius habuit. Hinc

℞. Rad. Chin. ʒβ.

Ras. L. Saffr. ʒj.

Rad. Liquir. 3vj.

santal. rubr. ʒiij.

Infund. in ∇ com. ℥vj. Stent in MB. per ϑ mane adde

Passular. min. ʒiij. Coqu. lento Δ ad remanentiam ℥iv. Capiat eodem modo & addat semper R ʒ gutt. xx. Continuetur per aliquot septimanas; Quamdiu his decoctis usus fuit, semper in fine pastus cochlearj. de passulis minoribus comedit; quæ optime contulerunt.

LXXIV. Febris intermittens quotidiana.

PUer annorum 2½ febre intermittente quotidiana vespertina graviter satis laborans accepit:

℞. Ebor. f. Δ gr. vj.

ʒ Epil. ʒl. gr. iβ. M. accepit bihorio ante paroxysmum; Vomuit, rigor evanuit, ætus ingens perduravit. Hinc

℞. Arcan. dupl. ʒβ.

ʒ diaphor. gr. v. M. Capiat bihorio ante paroxysmum. Calor mitis per noctem; Repetito hoc pulvere aliquoties febris evanuit. Post usum denique Liqu. ʒ sol. ʒ curatus fuit. Qui alio tempore liquor præmisso vomitorio solus cum curavit, capiendo bis in die. Hinc

℞. ʒ jalapp. gr. iij.

tart. Glac. gr. vj. M. optime contulit.

LXXV. Epilepsia.

INfans 4. annorum epilepticus assumsit:

℞. Pulv. epil. ʒl. gr. j.

Ebor. f. Δ gr. iij. M. Vomuit.

℞. Fl. chamomill. Mj.

Θ tart. ʒβ.

Coqu. in f. q. ∇ f. Colat. ℞. ʒiij. adde

Mell. rosat 3vj.

ʒo dest. succin. gr. vj. M. pro clymate.

℞. ∇ rub. idæi ʒβ.

C. C. f. Δ ʒj.

ʒ diaph. ʒβ.

Syr. ʒ succ. rub. Id. q. f. M. Bis hoc propinatum fuit.

℞. ∇ poeon. ʒβ.

Syr. poeon. 3vj.

R ʒ ʒij. M.

℞. C. C. f. Δ

specif. Cephal. ana gr. xij.

Bezoard. Or. gr. viij. M. pro 2. dof.

Optime profuit ista potio, hinc reiterata fuit. Denique Liqu. ʒ sol. ʒ gt. xxx. bis de die datæ sunt. Urina sic secuta horrida. Hypochondria inungebantur butyro rubro.

LXXVI.

LXXVI. *Febris Tertianæ Scorbuticæ.*

Vir propensus ad febres, easque scorbuticas, in principio Mensis Octobris 1668. sentit calorem quendam p. n. post pastum, unde cum continuare videretur idem, sequente die venam aperiendam curat, unde calor multum auctus fuit, noxque successit inquieta; Mane vocatus febris omnino erat liber, nescius qualis futura esset, præscripsi:

℞. *Hepat. rubr.* ʒj.

Ebor. s. Δ ʒʒ.

ʒ *diaph.* ʒj. M. pro 2. dosibus. Accipit has die ʒ & ʒ sine sensu febris, alvo existente aperta, die h cum esset novilunium

℞. *Pulv. rad. jalapp.* ʒj.

Cremor. tart. ʒʒ.

ʒo *dest. succin.* gr. iij. M.

Unde sexies purgatus fuit cum torminibus. Die o post pastum redit febris sine gravi horrore, cum ingenti calore, per iv. Hor. insequente copioso sudore; Altero mane duos habebat secessus fluidos: Hinc ob febrim scorbuticam præscribo:

℞. *Panaceæ Holsat.* ʒij.

Θ *absinth.*

ʒ *diaphor.* ana ʒj. M. pro 2. dos. mane & vesperi. Nocte sequente sudor spontaneus prorupit; à meridie expectabat paroxysmum, □ optimam habebat nubeculam, sed erat satis rubra:

℞. ∇ *febrifug. usit.* ʒj.

℞ *bezoardicæ.* ʒʒ.

∇ *cinam.* ʒj.

Syr. scelotyrb. Forest. ʒij. M.

Febris non redit. Nullus sudor, nec aliud quid inde secutum, ipse convaluit & pro stomacho usurpavit:

℞. *Ess. menth.*

absinth.

~ *cochlear.* ana ʒj. M. D. 30. gut.

LXXVII. *Mictus cruentus.*

Curavi aliquando virum mictu cruento laborantem, ex acrimonia feri scorbuticæ nato propinando trochiscos de Carabe cum lapillis Cancrorum præparatis, & paucis saccharo h. Sed ut ut hæc juvarent insigniter, constantiam tamen sanitatis conciliavit Liquor o Oris ad guttulas xv. omni mane ad aliquot dies assumptus & continuatus.

LXXIIX. *Dolores pedum.*

Vir quidam enormi dolore pedum affligebatur, qui sine ulla manifesta causa, sine ullo apparente externo in parte læsa signo &c. per longum tempus ultra dimidium annum enormiter eum vexabat. Omnibus autem medicamentis incassum adhibitis suavis cujusdam amici sibi apportandos curat quosdam lapides, qui in thermis reperiuntur, eos-

que probe coquit in ∇ simpl. in coctura ista balneat pedes, idque sæpius, unde ipsi iidem intumescunt; nihilominus continuat balneum hoc diutius, quo tandem factum, ut non tantum tumor, sed etiam dolor successive omnino evanuerit, ægerque perfecte curatus fuerit. Foras similia balnea artificialia fieri possent ex Ψ cum ʒc in ∇ decoctâ, secundum manuactionem Zwelfferi *Mantiss. Spargyr. p. 401.*

LXXIX. *Hemicrania.*

Dolor hemicranicus acerbissimus ex aure affecta & tumore post aurem, optime aliis irritis discussus fuit per sacculos binos parti affectæ & nuchæ applicatos, ex flor. chamom. Herb. majoran. semin. cumini, nigellæ &c. cum succini suffitu, & quam calidissime admotos; vertex inungebatur o succini; & sudor expectabatur.

LXXX. *Dolores artuum scorbutici.*

Foemina laborabat doloribus artuum scorbuticis diuturnis, semi-paralyticis, præsertim nocturnis, cum affectibus faucium & tonsillarum.

℞. *Ras. L. juniper* ʒij.

sassafr. ʒj.

Strobyl. pini junior. recent. concis. ana Mij.

Herb. ror. marin. Mj.

Incisa minutim macerentur in ∇ simpl. lbvj. stent in MB. per noct. mane Coqu. ad ʒ Colat. D. pro haustu matutino sudorifero, præmissis universalibus.

℞. *Ess. L. sassafr.* ʒij.

myrrh. ʒj. M. D. 40. guttæ.

Item usurpabatur fons ex lixivio Coriariorum cum □ hum. crebrius:

℞. ∇ *articul. ad extr.* ʒiʒ.

~ Θ * c. Ψ ʒvj.

lumbr. terrestr. c. Θ volat. ʒij. M.

LXXXI. *Vulnera ab urso infligta.*

Ancillæ ab urso graviter læsa & lacerata præscripsi:

℞. ∇ *menth.*

cherefol. ana ʒiʒ.

* ʒj.

ocul. ʒ ppt. ʒj.

Corall. rubr. ppt. ʒj.

Cinab. ʒ ʒʒ.

Laud. op. gr. iij.

Syr. Card. ben. ʒvj. M. pro 3. dos.

℞. *Lap. ʒ ppt.* ʒj.

ʒ *diaph.* ʒj.

myrrh. el. gr. xij.

Laud. op. gr. ij. M. pro 2. dosibus.

℞. *tart. Glat.* gr. xij.

ocul. ʒ gr. iij.

scamur.

scamm. Δ t. gr. ij.
Troch. Alhand. gr. j. M.

- ℞. ∇ *scabios.*
chærefol. ana \mathfrak{z} ss.
* *vini* \mathfrak{z} vi.
ocul. \mathfrak{S} \mathfrak{z} ij.
Corall. rubr. \mathfrak{z} j.
~ *theriac. Camph.* \mathfrak{z} ijj.
Syr. heder. \mathfrak{S} str. \mathfrak{z} ss. M.

LXXXII. *Febris ardens. Abdominis tumor.*

PUero 5. Annorum in febre ardente imminente ex intermittente quotidiana per vini emetici \mathfrak{z} ij. profligata, cum calor hecticus & tandem tumor abdominis quasi tympaniticus cum insigni corporis macie superesset, ad pituitam viscidam incidendam & lacteorum infarctus resolvendos ad imitationem Sylvii & Barbette præscripti:

- ℞. ∇ *menth.* \mathfrak{z} ss.
*G. * in ** *sol.* gr. xij.
tart. Glat. gr. vj.
Extract. troch. Alhandal gr. β .

Syr. ros. \mathfrak{z} ij. M. pro dosi. Mirum dictu, quam tenacem & vitream eduxerit pituitam, sine molestia copiose:

- ℞. ~ Θ * \mathfrak{z} ss.
R \mathfrak{z} ss. M. 20. vel 30. guttæ in hau-
stu vini mane & à meridie

℞. *Decoct. carminat. usit.*

\square *puer.* ana \mathfrak{z} ij.
ferment. comm. \mathfrak{z} i.

Mellis puri \mathfrak{z} ss. M. pro Clysmate omni mane injiciendo continuo per unam alteramve septimanam.

- ℞. *Ungu. dialth. Comp.* \mathfrak{z} ss.

\mathfrak{S} o *lil. alb.* \mathfrak{z} ij.

later. \mathfrak{z} ss.

dest. cumin. \mathfrak{z} i. M. Inungatur totum abdomen mane & vesperti cum prædictorum usu. Item

- ℞. R \mathfrak{z} *ex scoris* \mathfrak{z} ij. Capiatur ut supra cum dictis.

- ℞. *Arcan. duplic.* gr. xv.

Extr. troch. Alb. gr. β . M. F. pulvis.

- ℞. ∇ *rub. idæi* \mathfrak{z} vi.

Syr. emet. gr. xv. M. Hinc excessivus vomitus: sed optimus, utut fere fatalis.

LXXXIII. *Malum Ischiaticum.*

JUvenis Nobilis malo ischiatico affectus insigniter, præmissa V. S. in brachio cum se movere non posset,

- ℞. \mathfrak{z} *diaphor.*
bezoard. Martial. ana \mathfrak{z} ss.
 \odot *diaphor.* gr. v. M. subinde repetendo.

- ℞. ∇ *serpill.*
menth.
fl. sambuc. ana \mathfrak{z} j.

~ Θ * \mathfrak{z} ss.

off. microcosm. ppt. \mathfrak{z} ij.

\mathfrak{z} *diaphor* \mathfrak{z} j.

Laud. op. gr. iij.

Syr. Card. ben. \mathfrak{z} vi. M. continuando sudorem.

- ℞. *Picis naval.* \mathfrak{z} ij.

fl. \mathfrak{z} .

terebinth. ana \mathfrak{z} ij.

succin.

mastich. ana \mathfrak{z} j. M. pro Cerato applicando loco dolenti.

- ℞. ~ Θ *

Liquor. C. C. succin. ana \mathfrak{z} ss. M. D. 30. guttæ pro dosi, ter in die.

- ℞. ∇ *artic. adextr.* \mathfrak{z} ss.

~ Θ * c. Ψ \mathfrak{z} vi. M. pro usu externo.

- ℞. ∇ *articul. adextr.* \mathfrak{z} ij.

~ *juniper.* \mathfrak{z} j.

Bals. Peruv. in vitell. ov. solut.
 \mathfrak{z} ijj. M.

LXXXIV. *Epilepsia Uterina.*

FOEminina insigniter epileptica præmissis potionibus ex castoreo & Θ *volat. C. C.* & succinatis, laud. hysterico, item clysmatibus injectis carminantibus, item impositis Emplastris matricalibus, omnibus aliis irritis

- ℞. *pulv. Epil.* \mathfrak{z} l.

Ebor. f. Δ ana gr. vj. M. pro 2. dosi.

Cepit unam vesperi, & cum mediocriter se haberet, graviter exinde ægrotare cœpit, vomituriebat; Epilepsia eam prehendebat sine pulsu, jam moribunda videbatur, sacerdos ultimam benedictionem jam dixerat; ast brevi post supervenientibus aliquot secessibus (nam eodem die clyσμα applicatum fuerat à meridie) omne malum evanuit, quæta facta & omnia symptomata totius corporis & capitis in momento evanuerunt, nihilo præter solam lassitudinem tensivam superstitè, mirabilem stupebam mane sequente effectum, eumque constantem: Et recordor, quod puer gravissima Epilepsia correptus aliis irritis eodem pulvere, sub eadem dosi accepto mirabile levamen & morbi ad aliquot dies quietem persenserit.

LXXXV. *Febris aucta ardens. Epilepsia Lunbrici.*

PUer 4. vel 5. annorum febre quasi aucta ardente conflictatus præmissa potione cum dialcordio

- ℞. *pulv. epil.* \mathfrak{z} l. gr. iß.

Ebor. f. Δ gr. iij. M. D. propter imminentes insultus Epilepticos, & convulsiones varias, cum certis intervallis fieret inquietus cum insigni phlogosi, item simul admodum somnolentus esset, mox evigilans mane pæteret

teret potum, & continuo nares vellicaret & foderet, simulque de abdominis dolore conquereretur, ob id in suspicionem vermium incidi. Hinc

℞. *Aloës Epat.* ʒj. subigatur cum s. q. felis tauri ad consistentiam unguenti, adde
 ʒo *Colocynth.* ʒß. M. pro linimento cum vesica suilla umbilicali regioni admovento, quod expulit altero die lumbricum.

℞. *Elix. Propr. c. Rhabarb.* ʒij. D. 25. gutt. bis in die.

℞. *Conserv. ros.* ʒß.

ʒ *dulc.* ʒj.

resin. jalapp. gr. ij.

c. s. q. Syr. ros. sol. F. bolus, qui vomitum ingentem, aliquot secessus, cum euphoria effecit.

LXXXVI. *Malum hypochondriacum.*

Idea curæ mali hypochondriaci hæc esto.

1. ℞. *Liqu. ʒ. sol. tart.* ʒvj. D.

2. ℞. *Vomitorium.*

3. ℞. *R. ʒ. ʒ. Zwelfferi* ʒvj. D.

4. ℞. *Potionem passulatam pro vehiculo aliorum in alvo contumaci.*

5. ℞. *ʒ ʒ Compos.* ʒij. D. pro 6. dosibus.

6. ℞. *Liqu. ʒ. ʒ. ʒvj.* D.

7. ℞. *ʒ Carminat. de Trib.* ʒß. D. gutt. 30. in potione passulata.

LXXXVII. *Tussis Chronica.*

Puella 6. annorum tussi chronica cum febre, omni vespera graviter affligente, præcordiorum anxietate, phlogosi vaga & tensione colli quasi opisthotona conflictata, laborabat:

℞. *Pulv. epil.* ʒl. gr. jß.

Ebor. s. ʒ. gr. ij. M. Vomuit quinques cum euphoria sensibili, nox quieta, cum tussi.

Altera vespera exacerbato malo:

℞. *ʒ scabios.* ʒij.

cinam. ʒß.

Gelat. C. C. rec. ʒvj.

ʒ *diaph.* gr. xv.

Syr. pap. alb. ʒß. M. Cum omnia remitterent:

℞. *ʒ ʒ anis.* ʒij. D. 25. guttæ bis in die.

LXXXVIII. *Cachexia.*

Idea Curæ Cachexiæ incipientis puellæ:

℞. *tart. ʒ. ʒ.*

ʒ absinth. ʒß. M. pro digestivo; quod excipiebat potio gummea; tum Laxans: hinc

℞. *Liquor. ʒ. sol. tart.* ʒß. D.

℞. *R. ʒ. ʒ. Zwelfferi* ʒß. D.

Sequebatur purgatio cum Pilulis de G. * & ʒ dulci. Hinc vinum aromaticatum medicatum: Tandem

℞. *ʒ ʒ ʒ.* D. omni mane guttæ 30.

Tom. II. Pars 2.

LXXXIX. *Infans post partum non sufficienter purgatus.*

Infans 4. dierum, post partum non sufficienter purgatus, anhelus, alvo obstructa, insigni corporis ardore, inquietudine, crebris pavoribus; uno nomine jam superventu imminentis epilepsiæ moriturus.

℞. *ʒ fulmin.* gr. j.

ʒ ʒ. gr. ij. M. Propinetur in ʒ ceasarorum nigrorum; Injiciebatur clyisma ex decocto fl. chamomillæ addendo parum lixivii vulgaris, & mellis. Prima vice saltem æstum temperabat, quietem conciliabat, & insigne commodum afferebat, sine sensibili excretionem. Post tres horas propinabatur denuo eodem modo; unde optime se habebat infans; sed post 6. demum horas cum etiam clyisma injectum retentum fuisset diutius, bis copiosas, horridas, grumulentas, ex nigro virides fæces cum egregia euphoria exturbavit.

XC. *Palpebrarum coalitus.*

Vir quidam utroque oculo suffusus, palpebras semper oculo obductas & clausas tenuit, easque nullus Medicus aperire potuit, nisi quidam surdus Empiricus, ex Turcia veniens, qui herbam petroselini virentem in magma contusam die & noctu superposuit, & oculi palpebræ vel resolutæ vel tumefactæ, vel ardoribus quasi siccatæ denuo paucos post dies sua sponte apertæ sunt, & huc usque apertæ manent, quæ alias aliquot annos ante clausæ erant.

XCI. *Dolor nephriticus nothus. Ischuria.*

Vir gravissimis abdominis torminibus affligebatur, aderant vomitus rari, graves præcordiorum anxietates, alvus obstructa, dolor in dorso & lumbis; suspicio erat doloris nephritici nothi, causa movens fuerat iracundia. Typum habebant dolores tertianarium nocturnum.

℞. *Spec. emoll.* Mij.

ʒ tart. ʒij.

Coq. in s. q. ʒ. Colat. ʒix. adde *Terebinth. c. vitell. ov. solut.* ʒß.

mellis ʒvj. M. pro clymate.

℞. *Petrol.* ʒij.

ʒo *dest. succin.*

cumin. ana ʒß.

Ungu. dialth. ʒvj. M. pro inungendo dorso & lumbis crebrius, interdum etiam abdomine: Renovatum sæpius, quia feliciter operabatur:

℞. *Laud. hyster.* gr. v.

Extr. castor. gr. v.

c. s. q. balsami ʒ terebinth. F. Pilulæ,

[Zz]

Item

Item cum supprimeretur urina

℞. *Ruephrit.* ʒij. D. 50. guttæ. Hinc
□ fluxit.

Ob præcordiorum anxietates

℞. *Empl. de Tacamah. q. s.*
Malax. c. s. q. bals. Peruv. D.

℞. *Sem. violar.* ʒijj.

papav. ʒj.

c. s. q. ∇ Alkekengi. F. Emulsio, adde
Ebor. s. ∆ ʒß. M.

℞. *Passul. min. laxativ.* ʒß. D.

Ob immanes convulsivos dolores:

℞. *Cinnab. 8*

Lap. percar. ana ʒß. M. D. in 2 plo.

Bene contulit.

℞. *Theriac.* ʒj.

Bezoard. min.

Θ stipit. fab. ana ʒß.

c. s. q. Syr. menth. F. bolus in coch-

learibus duobus aceri assumendus, expectando
sudorem.

XCII. *Ulceræ narium.*

VIr ulcere narium in utraque ala interne
cum sanguinis, puris, & crustarum pro-
ventu, laborabat. Curatus fuit per folia Ni-
cotianæ recentia contusa seu leviter conquis-
sata, utrinque naribus immissa, & cum ali-
quot horas ita retinisset, applicavit

℞. *Unguent. alb. camphor.* ʒijj.

balsam. ∆ adextr. ʒj. M.

Quorum usu continuato convaluit.

XCIII. *Ozæna.*

Virgo laborabat ozæna:

℞. *Gl. ad albed. calcin.* ʒß.

dissolv. in

∇ *majoran.*

lil. convall. ana ʒj.

Filtrentur per chartam D. pro usu externo.

℞. ∇ *plantag.* ʒijj.

~ *vini* ʒijj.

8 *sublimat. pulveris.* ʒß. M.

Usurpetur cum penicillo: sed acius & non-
nihil dolorosum fuit.

℞. ∇ *majoran.*

plantag. ana ʒß.

Mell. ros. ʒvj.

~ *vini* ʒijj. M.

Insuffletur ex vola manus. Profuit.

XCIV. *Odontalgia.*

FOEmina laborabat odontalgia cum tu-
more rubro malæ insigni, & huius gravi
lancinante dolore; Præscripsi lac, quod bul-
liat, & tepide ori admoveatur, seu in ore
contineatur; Externe

℞. *Theriac. Androm. q. s.*

Θ absinth. ʒj. M.

inducatur super linteam, F. Emplastrum.

℞. *G. tacamahac. q. s.* liquefactum malaxe-
tur copiose *c. balsauo Peruv.* inducatur su-

per linteam, irroretur ʒo dest. junip. vel ʒo pa-
pav. express. D.

XC V. *Raucedo.*

VIr subito incidebat in raucedinem ex fu-
mo tabaci hostili inspirato; Juvabat
aliquatenus Syrupus violarum, aderat fere
aphonia, aut saltem sonus obscurissimus:

℞. ∇ *scabios.* ʒijj.

asthmat. ʒj.

Syr. de hyssop. ʒijj.

erysim. ʒvj.

~ *Θ * anis.* ʒiß. M. D. cochleatim.

XC VI. *Phthisis.*

Ancilla valde phthifica idque ex vitio dix-
tæ, & inspiratione aeris tetri in locis sub-
terraneis cum tussi materiæ putridæ & foetidæ,
dolore capitis, anorexia, febricula, &c. cura-
ta est primum per vomitorium oxysacchari
emet. A. Salæ, cujus effectus felicissimus fuit,
copiosissima & putridissima materia ex pulmo-
nibus evacuata; unde rarior tussis, liberior
respiratio, appetitus auctior, doloris capitis
omnimoda remissio, Hinc

℞. *herb. chæresol.*

heder. terrestr. ana Miß.

Concis. coqu. in f. q. ∇ adde

Passul. min. ʒß. Decocto fervidissimo
infunde *Herb. nasturt. contus.* Mj.

succi heder. terrestr. expr. ʒj. M. F.
potus, de quo ob facilem acescentiam sæpius
repetendo mane assumat bonum haustum, je-
juno stomacho, cum Elix. Propr. gutt. xx. Ho-
ra v. pomerid. iterum bonum haustum, cum
pulveris sequentis ʒß.

℞. *Ocul. 8 præp.*

rad. aron. non præp. ana ʒj.

ircos Flor.

sem. papav. alb. ana ʒß.

maslich. ʒj. M. F. Pulvis.

His addatur suffitus cum succino, & thure,
ore excipiendus; Quodsi dolor capitis vel
etiam catarrhi repetant, vertex inungatur
cum ʒo dest. succini. Hoc ad tempus conti-
nuato loco pulveris hujus

℞. *C. C. subtiliss. raspat.* ʒj.

Antihed. Poter.

Magist. Corall. c. succ. citr. ana ʒß. M.

Eodem modo usurpabatur; Unde symptoma-
ta remittebant, sed sudores continui nocturni
admodum eam vexabant, & emaciabant. Post
paravit decoctum ex comis hyperici, cum her-
ba persicaræ, & loco illius decocti usurpavit,
ex quo bene se habuit, nisi quod diarrhœa eam
deprehenderet; post octiduum ergo eo inter-
misso incepit dietam lactis, quotidie mane &
à meridie bonum haustum assumendo, con-
tinuavit per 10. dies, sed ob nimios sudores &
ob strictam dietam, quam observare non po-
terat, eam intermisit; postmodum tamē
cessantibus symptomatibus convaluit.

XC VII.

XC VII. *Pleuritis.*

Mulier corpulenta 50. annorum & succi-plena gravi pleuritide corripiebatur, cui cum per sudorem nihil, neque etiam per sputum evacuaretur, supervenit tamen naturæ beneficio die XI. copiosa sed simul foetidissima diarrhoea, materiae purulentæ teterri-mæ, qua per x. & plures dies continuante cum sensili alleviatione sic sanabatur. Præcave-bam simul, nephthifica fieret, per pulveres ex Antihectico Poterii, myrrha, oculis ☉, & diaphoretico, &c. item cum balsamo ☿ terebinth. Elixyr Propr. raro propinabam, quia hoc semper diarrhoeam suscebat, ut necesse esset, eam denuo provocare clysmate.

XC IIX. *Empyema.*

Retulit Parisiis D. Bonedelot. quod ali-quando empyema durer ad x. annos, & quod materia empyicorum aliquando inspisse-tur, & condensetur in materiam crassam in-star mellis, nec febris semper adsit, nisi tunc, quando pus adhuc in fermentationis consistit motu, sed cessante fermentatione cesset simul febris. Idem retulit, fuisse juvenem vulne-ratum ense in pectus, indeque factum empy-sicum, cum hectica, macilentum, &c. sana-tum tamen; Sed ei totum crus dextrum ad-modum fuisse ponderosum, & aliquantisper tumidum; seque hinc dixisse, pus ex pectore in hoc pede accumulatum esse, unde suasu suo chirurgum in pede infra genu incisionem fecis-se, sed nihil effluxisse, ipsum vero in alio pedis loco simile tentasse, & exinde Pintam puris eduxisse, cum jam fere xiv. menses à vulnera-tione abiissent.

XC IIX. *Empyema.*

Nobilis quidam ex casu ab alto & sputo cruento fiebat empyicus, in tota me-dietate thoracis sinistra, ita ut facta apertione inter costas incredibilis copia puris tandem proflueret; Potus erat cerevisia infusione vul-nerariorum temperatorum per fermentatio-nem imprægnata, item potus interdum seu decoctum vulnerarium cum pauco melle, de quo pro lubitu, vel pro medicamentorum ve-hiculo usurpabat. Omni mane

℞. *Elix. Propr. s. f. d.* 3℔.

℞ 3℔. M. D. 40. guttæ.

vel ℞. *Ess. myrrh.* 3℔.

succin. compos. 3℔. M. D. 40. guttæ. omni vespere bihorio ante cœnam & sub introitu lecti quantitatem castanei vel ju-glandis de hoc Electuario assumsit:

℞. *Conserv. ros. rubr.* 3℔.

heder. ☿ str. 3℔.

Extr. ☿ 3℔.

Lap. ☉. præp.

Antihect. Poter. ana 3℔.

c. f. q. Syr. papav. rhæad. F. Electua-rium. Vel

Tom. II. Pars 2.

℞. *Conserv. scord.* 3℔.

ros. rubr. 3℔.

Extr. ☿ 3℔.

pulv. scord. 3℔.

Lap. ☉. 3℔.

c. f. q. Syr. scord. F. Electuarium.

Denique

℞. *Conserv. scord.*

ros. rubr. ana 3℔.

Extr. ☿ 3℔.

Lap. ☉. præp. 3℔.

& diaph. 3℔.

c. f. q. Syr. papav. rhæad. F. Electua-rium.

Pro Expectoratione:

℞. ☿ *hyssop.*

chærefol. ana 3℔.

asthmat. 3℔.

Oxymell. scyll. 3℔.

Syr. nicot. 3℔.

emet. 3℔. M.

Cum quibus ☿ ☉ * anis. bene contulit.

C. *Tussis Infantis. Tormina. Æstus.*

Infans unius fere anni robustus, torosus, & vegetus tussi Epidemica cum æstu gravi & insigni virium prostratione, siti continua, anorexia, &c. laborabat.

℞. *Pulv. epil.* 8℔. gr. ij.

Ebor. f. 4 gr. ij. M.

Vomit & admodum debilitatus fuit. Hinc

℞. ☿ C. C. *succinat.* 3℔. D. iix. guttæ pro dosi aliquoties, cum tormina simul & æstus gravis superveniret, præter clysmata

℞. *ocul. ☉. præp.* 3℔.

Crysell. præp. 3℔.

pulv. epil. 8℔. gr. jss. M. pro 2. dos. inde quietem recuperavit. Item

℞. C. C. *s. f.* 4℔.

Corall. rubr. præp. gr. vij.

☉ *card. bened.* gr. iv.

pulv. epil. 8℔. gr. jss. M. pro 2. dos. Bene contulit. Reliquias Elixir propr. f. ☿ do excussit.

C I. *Tussis Infantis. Epilepsia.*

Sic puella eodem morbo, sed cum gravi Epi-lepsia affecta anni 1½.

℞. *pulv. epil.* 8℔. gr. ij.

Ebor. f. 4 gr. vj. M. pro 2. dos. Item

Liquor C. C. succinatus dabatur. Externe pro hypochondriis

℞. ☉ *chamomill.* 3℔.

dest. cum in. 3℔. M.

Gelatina C. C. dissolvatur in potu & propi-netur.

C II. *Febris catarrhalis. Febris tertiana. Hectica.*

Puer x. annorum febre catarrhali, coryza & tonsillarum tumore affectus cum tussi, &c.

[Z z 2]

℞. ☿

℞. ∇ *scabios.* \mathfrak{z} j.

Liqu. C. C. succin. \mathfrak{z} ℔.

— Θ * *anis.* \mathfrak{z} j.

Syr. violar. \mathfrak{z} ℔. M. sudet. Vespere ingruente æstu

℞. ∇ *scabios.* \mathfrak{z} j.

hyssop. ana \mathfrak{z} ℔.

— Θ * *anis.* \mathfrak{z} j.

Syr. papav. alb. \mathfrak{z} vi. M. capiat pro lubitu cochleatum. Altera vel tertia vespera

℞. *Succin. catarrhal.* gr. xij.

\mathfrak{z} *bezoard.* gr. vj. M. Capiat subinde succum raphani cum saccharo. Cum fuerit febris fere curata, intermittens quotidiana & hinc tertiana vesperi superveniebat cum horrore aliquali & hinc æstu repetente.

℞. Vomitorium vesperi ante Paroxysmum exhibendum. Sed ob metum hæcticæ

℞. *Arcan. duplic.*

Antihæct. Poter. ana gr. xv. M. D. pro 2. dos. mane & vesperi ante Paroxysmum.

℞. Θ *card. bened.*

Arcan. dupl. ana gr. vij. M. sumatur vesperi ante Paroxysmum. Hæc repetita adhuc semel & iterum, tandem ex usu pilularum Glassianarum convaleuit.

CIII. *Asthma Convulsivum. Scorbutus. Phthisis.*

FŒmina ex terrore & iracundia reddita ægra, debilis, tussiebat valde, vomebat, de dolore dorsi lumbari querebatur, inclinabat ad phthisin insigniter, erat admodum scorbutica:

℞. — \bigcirc *dulc.* \mathfrak{z} ij.

cochlear. \mathfrak{z} j. M. D. 40. gtt. bis in die.

De Asthmate quali convulsivo ex dorsi media regione interscapulari oriundo conquerebatur, & halitum subinde supprime

℞. *Arcan. duplic.* \mathfrak{z} ℔.

Cinnab. \mathfrak{z} \mathfrak{z} j. M. pro 2. dos.

In Cerevisia usurpet — cochleariæ. Hoc ipsum aliquoties reiteratum egregie contulit, & eam restituit. Ob metum phthisicos suali præservatorie, ut decoctum hederæ terrestris & chærefolii cum passulis pararet, cui infunderet herbam nasturtii q. f. & caperet subinde.

CIV. *Dolor vulvæ.*

FŒmina dolore vulvæ acerbo cruciata, ita ut ejularet, explicabat eundem, *esrisse sie in der Geburt* / urina libere sine sensu effluebat.

℞. *Lap. percar.*

Cinnab. \mathfrak{z} ana \mathfrak{z} ℔.

Laud. op. gr. ij. M. D. in vehiculo calido. Hinc

℞. *Herb. absinth.*

menth. ana Mj.

Flor. chamom. Mij.

Herb. hyosc. M℔.

Baccar. juniper. \mathfrak{z} ℔. M. Coqu. in lacte, & applicentur regioni pubis in sacculo crebrius. Optime hæc contulerant. Alias varia tentavi, pro dolore eradicando, sed nullum adeo atque hoc contulit.

CV. *Febris lactæa. Purpura. Hysterica passio. Furunculi. Laryngis tumor.*

Puerpera tertio à partu die conqueritur de calore febrili, mediocri, erat debilis, pulsus parvus, celer & nonnihil inæqualis.

℞. \mathfrak{z} *diaphor.* \mathfrak{z} j.

myrrh. elect. gr. v. M. D. in 2 plo.

Capiat vesperi & post mediam noctem, sed ingruente nocte angustia præcordiorum accedunt, forsan uberiori lactis proventu urgente.

℞. *sem. Card. bened.*

napi ana \mathfrak{z} ℔.

Flaved. cort. Ont. \mathfrak{z} ij.

c. f. q. ∇ *fl. sambuc.* F. Emulsio, adde

C. C. f. Δ \mathfrak{z} ℔. Edulcoretur parum.

Die quarto

℞. *Flaved. cort. citr. rec.* \mathfrak{z} ij.

Contus. in mortar. adde

Sem. card. bened. \mathfrak{z} ij.

napi.

aquileg. ana \mathfrak{z} j.

myrrh. elect. gr. xvi.

c. f. q. ∇ *fl. sambuc.* E. Emulsio, adde

C. C. f. Δ \mathfrak{z} ij.

\mathfrak{z} *diaphor.* \mathfrak{z} j. M. Edulcoretur parum. Nox erat inquieta, æstus gravis cum siti. Hinc die quinto

℞. *Arcan. dupl.*

pulv. bezoard. Mich. ana gr. xv. M.

D. in calido vehiculo; & in potu dissolvit crebro gelatinam C. C. & calide bibat. Melius visa fuit se habere vesperi.

℞. *Pulv. bezoard. Michael.*

Arcan. duplic. ana \mathfrak{z} ℔. M.

D. pro duabus dosibus, ante coenam & post mediam noctem: Æstus gravis à nona vespertina usque ad tertiam, à noctis medio sitis immensa, somnus nullus. Die sexto

℞. *Bezoard. Mich.*

arcan. dupl.

\bigcirc \mathfrak{z} *t.* ana \mathfrak{z} ℔. M. Repetit æstus, & omnimoda virium omnium prostratio: sitis inexhausta: imminentes quodammodo convulsiones.

℞. \mathfrak{z} *bezoard. Mich.* \mathfrak{z} ℔.

Cinnab. \mathfrak{z} . gr. xij.

Θ *volat. C. C.*

succin. ana gr. ij. M. Capiat tempore prandii, cum appetitus semper penitus esset prostratus. Vespere

℞. C.

℞. C.C. Or. ʒj.

‡ bezoard.

Cinnab. ʒ ana ʒß.

⊖ volat. C.C.

succini ana gr. ij. M. pro 2.

dof. vesperi & post mediam noctem.

Die septimo aliquale purpuræ circa pectus se offert vestigium: æstus moderatus. Mane similis pulvis; vesperi idem, sed sine volatilibus:

℞. R Corall. antiscorb. ʒß. dof. 40. guttæ vesperi & mane, sub hora x.

Die octavo purpura uberius comparuit, æstus hac nocte nullus: Tinctura bis interdum usurpata fuit; & vesperi similis pulvis: post dimidiam noctem eadem Tinctura. Nox sequebatur bona, æstus nullus, purpura copiosa.

Die nona eadem; sed à meridie sponte debilitatur, vesperi pulvis ordinabatur sequens:

℞. C.C. Or. ʒß.

‡ bezoard. gr. iix. M. à media nocte tinctura. Nox siti & æstu denuo gravis.

Die decimo Tinctura eadem & pulvis vesperi. Nox bona; purpura prurit.

Die undecimo mane commode habens bibit cerevisiam non rite defæcatam, sed agitatione dolii feculentius conturbatam; unde cardialgia, vomitus, tumultus abdominis, secessus liquidi repetiti, & pathemata hysterica excitantur.

℞. Tinct. Corall. antiscorb.

Liqu. C.C. succin. ana ʒj. M. ʒo. guttæ pro doli, bis vel ter eodem die, unde mediante sudore remiserunt dicta symptomata: vesperi

℞. ‡ bezoard. gr. xij.

magist. corall. c. succ. citr. ʒß. M.

Nox quieta, sed ob agitationem corporis & humorum præcedentis diei à media nocte ad tertiam usque matutinam æstus cum siti ingentes redeunt, quæ mane cessant, ipsa satis commode habente.

Die duodecimo Tinctura ista mista reiterata est, circa meridiem redit gravis æstus, cum intensa cephalalgia:

℞. ‡ bezoard. gr. xij.

Cinnab. ʒ gr. viij. M. reiteretur ante & circa noctem R coralliorum antiscorbutica.

Die decimo tertio: nox mediocris sine æstu, sed cum siti; reiteretur R antiscorbutica.

Die Decimo quarto circa mediam noctem anxietates præcordiorum, hinc æstus gravis insequabatur, mane mediocriter se habebat. Continuata est tinctura, & ut in promptu aliquid habeatur.

℞. C.C. f. Δ ʒj.

⊖ card. bened. gr. xij.

‡ diaph. gr. vj. M. pro 2. dof.

Die decimo quarto: nox erat quieta, vires mediocres, æstus nullus, sitis adhuc nonnihil intensa; à meridie purpura alba se manifestavit: Hinc

℞. C.C. f. Δ ʒß.

⊖ card. bened. gr. ix.

‡ diaphor. gr. v. M.

Sed cum crebri furunculi eam affligerent, his applicavit emplastrum Helmontii, cum aperti essent, per balsamum Peruvianum consolidavit & ad consolidationem perduxit. Cum vero circa laryngem ex conatu partus tumor duritie mediocris, reliquis locis concolor prominens enatus esset, wie ein kleiner Kropff:

℞. Empl. de Ranis c. ʒ applicetur aliquoties.

CVI. Puerperæ dolor regionis hypogastricæ.

Fœmina 4. septimanis à partu, cum semper optime se habuisset, incidit in gravissimum dolorem circa hypogastricam regionem dextram, ita ut misere ejularet, exinde graviter æstuarer, sudaret &c.

℞. Cinnab. ʒ ʒj.

⊖ artemis. ʒß.

myrrh. cl. gr. vj.

Laud. op. gr. ij. M. pro 2. dof. præmisso clystere, unde egregium levamen percipit: Hinc

℞. Ess. myrrh.

hyperic. ana ʒij. M. 40. guttæ pro dosi, bis vel ter in die, egregie contulit, & menses redierunt, & levata fuit.

CVII. Tormina infantis. Purgatio infantis omissa.

Infans 3. dierum inquietus, ejulans, torminibus afflictus, nec rite à partu purgatus

℞. Ⓞ fulmin. gr. j.

C.C. f. Δ gr. iij. M. pro 2. dosibus, in vehiculo sequenti:

℞. Syrup. de Spina Cervin ʒij.

Pulv. passul. ʒß.

ocul. ʒ ppt. ʒß.

Diluatur c. f. q. v scabios. M. D. aliquot parva cochleatia, cum pulvere; idque repetatur per aliquot dies, bene contulit.

CVIII. Tussis. Phthisis.

Mulier tussi ultra 3. septimanas conflictabatur eaque ex stomacho; percipiebat enim titillationem & vellicationem circa scrobiculum cordis; tussis erat crebra, rejiciebat varia, viscida & terro sapore inquinata, respiratio difficilis, & dextro lateri incumbens omnia fere graviora videbantur; Principium aderat phthifcos.

[Z z] 3

℞. Succ.

℞. Succum raphani rec. expressum cum saccharo, q. v. capiat subinde, pro resolvenda mucagine stomachi,

℞. *menth.*

Syr. emet. ana ℥ss. M. copiose supra & infra evacuavit, Eodem vesperi

℞. *Flor.* ℥j.

myrrh. gr. ix.

laud. op. gr. ij. M. capiat hora una ante cenam.

℞. *Flor.* ℥j.

Antihel. Poter. ana ℥ss.

Laud. ferment. gr. ss.

℞. *dest. anij.* gr. ij. M. vesperi capiat.

Interdium crebrius decoctum raparum exsiccatum hauriat, pro lenienda lymphā acri, simulque excoaratione stomachi inchoata levanda. Sed cum profusi sudores nocturni continuo emanarent, iique phthisici, eamque insigniter macerarent,

℞. *Antihel. Poter.* ℥j.

Laud. op. ferment. gr. j. M.

Capiat vesperiantepastum, Vel

℞. *Antihel. Poter.* gr. xv.

fl. ℥ss.

Extr. croc. gr. j. M.

Reperit tales pulveres aliquoties & omni mane simul de Elix. stomach. Michael. 40. gr. Sed cum nihilominus tussis & stomachi labes &c. instanter continuarent;

℞. *Scord.* Mij.

Salvia Mj. pulveris. minutim adde

fl. ℥ss.

c. f. q. mellis puri F. Electuarius spissum, de quo capiat crebrius in die pro lubitu: Non incongruum hoc erat, sed cum propter dulcedinem & fermentescibilitatem mellis interdum murmura aut tormina, aut acris ardoris sensus inferrentur, jussi ut vesperi sub introitu lecti capiat de pulvere ocul. ℥. ppt. q. pl. & ita aliquandiu continet.

CIX. Febris maligna.

V Ir febre malignissima ex prægressa ira & conversatione in nosocomio contracta affectus cum cephalalgia, præmissa noctu V. Sone: mane

℞. *scord.*

cordial. Herc. Sax vel rub. id.

ana ℥j.

C. C. f. Δ. ℥ss.

Cinnab. ℥j.

℞. *volat. C. C.* gr. viij.

succini gr. iv.

Laud. op. ferment. gr. iij.

Syr. fl. tunice ℥vj. M. pro 2. dos. accepit, bene sudavit, longe melius habuit: vesperi:

℞. *bezard. Sennert.*

Unicorn. ver. ana ℥j.

bezard. Or.

℥l. anagr. vj.

M: pro 2. dosibus, & capiat simul interdum istam misturam.

℞. *scord.*

fl. sambuc.

rub. idæi ana ℥j.

℞. *rub. idæi* ℥vj.

diascord. Fracast. ℥ij.

Syr. acetos. citr. ℥ss. M. sudavit, dormivit, optime habuit. Mane pro stomacho:

℞. *Empl. Tacamahac.* item Clystima &c.

CX. Febris maligna.

V Ir juvenis febre maligna correptus præsentibus jam Convulsionibus:

℞. *scorzon.*

scord. ana ℥ss.

cinam. ℥ss.

Cinnab. ℥. gr. xv.

bezard. Or. ℥j.

℞. *volat. viper.* gr. viij.

Conf. Alcherm. ℥ss. M.

Item ℞. *fl. sambuc.*

card. bened. ana ℥ss.

cinam. ℥ss.

Cinnab. ℥j.

bezard. ℥l. ℥ss.

℞. *volat. viper.* gr. vj.

Syr. de hyssop. ℥ss. M.

CXI. Colica.

V Ir juvenis corripiebatur torminibus alvi gravissimis, circa & infra regionem umbilicalem, simul subinde præcordia occupante, *es wolte zuweilen das Herze abdrücken* / alvus pertinaciter clausa, umbilicus interiora versus retractus, abdomen externo contactu durum, nec erectus stare poterat, hinc etiam urinæ emissio difficilis, miserabilis erat status: Hinc die ☉

℞. *Laud. hyss.* gr. v.

scammon. ℥t. gr. iij.

Ocul. ℥ ppt. ℥ss.

Sed frustra.

℞. *Passul. min laxativ.* ℥ss. D. Sed frustra, etiam si alias bene operatæ fuerint; Unde circa vesperam:

℞. *Arcan. duplic.* gr. xv.

scamm. ℥t. gr. iij.

troch. alhand. gr. j. M. sub noctem aliquot sedes, sed sine levamine. Hinc die ☽

℞. *spec. carminant.*

emoll. ana Mij.

℞. *℥j.*

Coqu. inf. q. v. Colat. ℥ix. adde

Elect. lenitiv. ℥j.

mell. ros. ℥ss.

℞. *dest. succin.* gr. x.

vitel.

vitell. ov. N. j. M. pro clysmate;
aliquantulum sed parum profuit: vesperi

℞. ▽ *fenic.*

menth. ana ʒiʒ.

— ⊕ * ʒi.

Ess. opii ʒʒ.

Syr. cort. aur. ʒʒ. M.

Item ℞. ʒ. *chamom.*

cumin. ana ʒij.

dest. anis. ʒi. M. Inungat abdomen
induratum. Nox paulo quietior, sed mane
omnia recrudescunt dolorifica symptoma-
ta. Unde die ʒ

℞. *Empl. de Galban. q. s.*

Malax. cum s. q. ʒ. dest. succin.
inducatur super alutam F. emplastrum pro
umbilico: Et cum æger postularet, ut bene
aperiretur alvus, Die ʒ

℞. *Passul. min. laxat.* ʒʒ.

⊙ *fulmin.* gr. v. M. unde post ali-
quot horas xi. fere secessus habuit. Hinc ve-
speri

℞. *Sev. hircin.*

Ungu. potab. rubr. ana ʒi.

Liquefacta misceantur; inungat largiter ab-
domen, quod emollitum nonnihil fuit cum
euphoria. Ad convulsivum dolorem si-
stendum die ʒ

℞. *Cinnab. ʒ ʒi.*

Laud. op. gr. iij. M. repetitum hoc
bis, etiam sequente die semper cum egregio
levamine. Die ʒ

℞. ʒ. *rapar.*

lini ana ʒv. M. pro clysmate: egre-
gie contulit, multa viscida evacuavit, cum
levamine; unde pulvis cinnabarinus assum-
tus noctem quietam intulit. Item — ⊕
dulg. anticol. ad ʒij. pro 2. dosibus assumtus su-
dorem expectando non fuit inconveniens.

Tandem cum certus essem factus per
clysma, quod mucago acida in recessu pec-
caret, licet aliquoties quotidie excerneret li-
quida: Die ʒ

℞. ▽ *menth.* ʒi.

*G. * in ʒ sol.* gr. xv.

♀ *Glat.* gr. vj.

scammon. ʒt.

troch. Alband. ana gr. iʒ.

Syr. ros. solut. ʒij. M.

Exinde ʒ. vicibus excrevit cum levamine
plenariò.

Æger alias sæpius levi de causa erat ob-
noxius huic affectui; abundabat forti acido,
unde & laxantia parum operabantur; Erat
colica spasmodica, excitata occasione au-
steri acidi, insigniter viscida. Cum post ali-
quot dierum intervallum subinde vestigia
quædam recurrerent, mane liquor. ʒ. Or. ad
gr. xx. à meridie — ⊕ * gtt. xxx. aliquandiu
hausit cum optimo levamine.

CXII. *Tussis stomachalis.*

VIr difficili respiratione, anxietate præ-
cordiorum, tussi crebra, viscidissimæ
materiæ rejectione, subcruentæ, dolore cir-
ca hypochondrium sinistrum, ubi olim con-
tusionem passus fuerat, pulsu celeri, frequen-
ti, & debili affectus, ita ut abscessu latente in
latere sinistro laborare videretur, inter alia
præmissis clystere:

℞. ▽ *hyssop.*

menth. ana ʒiʒ.

asthmat. ʒvj.

— *G. * c.* ⊕ ʒv.

Syr. nicot. ʒi.

emet. ʒij. M.

Pro expectoratione capiat cochleatim;
hoc aliquoties reiteratum copiosa admodum,
& horrida ejecit. Hinc purgans blandum cum
pilulis de * *Quercet.* & 4. saltem secessus mo-
vit. Sed exinde gravis æstus, præcordiorum
anxietas, tussis, & excretio materiæ per os
recruduerunt periculose: Ob id

℞. *Decoct. hord. cum rad. liquirit.* tʒʒ.

Syr. nicot. ʒij.

— ⊕ *c. G. ** ʒʒ.

⊕ *dulg.* ʒi. M.

Bibat pro lubitu: unde omnia symptomata
remiserunt. Cum restet tussis sicca perquam
molesta:

℞. ▽ *menth.*

scabios. ana ʒi.

asthmat. ʒij.

Syr. violar.

diacod. Mont. ana ʒʒ.

fl. ʒ. ʒʒ. M.

Reliquum perfecit Elixyr Propr. & post-
modum balsamus sulphuris.

CXIII. *Tussis.*

VIr tussi stomachali pertinaci laborabat,
Aliis irritis:

℞. *MP. de hierac. Agar.* gr. xij.

*G. * in ʒ sol.* ʒʒ.

Extr. troch. Alband. gr. iij.

c. s. q. Ess. sassafras F. Pilulæ.

℞. *succini præp.* ʒi.

ʒ *diaphor.* ʒʒ.

myrrh. elect.

⊕ *volat. succini* ana gr. v.

Laud. op. gr. iij. M. Capiat hora an-
te coenam. Profuit.

℞. ʒ *diaphor.* ʒi.

⊕ *volat. succin.* ʒʒ.

myrrh. elect.

fl. benzoës ana gr. v.

Laud. op. gr. ij. M.

CXIV. *Tussis stomachalis.*

Similia fere in forma pilulari præscripsi ve-
tulæ, tussi & catarrho fere universali
scor-

scorbutico laboranti præmissis repetito usu
~ C. C. & scarificationibus.

℞. *succin. præpar.* ʒss.

⊖ *volat. succin.*

myrrh. ana gr. v.

Extr. Croci gr. ij.

Laud. op. gr. j.

c. f. q. *Syrup. papav. errat.* & ʒo *dest. succini* F. Pilulæ.

Capiebantur bihorium ante coenam. Pro-
fuerunt.

CXV. *Anorexia. Nausea. Sitis. Tumor
Pedum oedematosus. Scorbutus.*

Foemina laborabat anorexia & fastidio
nauseante cum siti matutina insigni & in-
terdum inani & quasi singultiente vomendi
conatu. Sudores pomeridiani insigneserant,
frigidi, interdum cordis tremores, tumor
pedum oedematosus & alterius erysipelaceus;
urina pauca, crassiuscula, nonnihil turbida ad
rubedinem inclinans.

℞. *Arcan. duplic.* ʒj.

⊖ *absinth.* vel

centaur. min. ʒj. M. pro 2. dosib.

Quod crebrius repetitum fuit.

℞. *Passul. min. laxativ.* ʒss. D.

℞. *Liquor. ♂ Or.* ʒij.

Sed hic minus contulit; ob id intra tridu-
um cessavit. Hinc mane semper propter sym-
ptomata stomachi & primarum viarum:

℞. ~ *Dulc.* ʒij.

cochlear. ʒj. M. 40. gutt.

A Meridie propter scorbutum

℞. ⊕ ʒij. D. dos. 40. gutt. Aliquan-
diu continuavit. Hinc usurpavit mane se-
rum lactis, ~ ⊕ a meridie. Postmo-
dum usum lactis caprilli matutinum ad ali-
quot septimanas continuavit; & omni pastu
40. guttæ de ~ ⊕ ʒss cepit. Interea sub-
inde passulas laxativas usurpavit, & pro dige-
stivo ante has.

℞. *pulv. cachect. Hartm.* ʒss. D. Post-
modum pro medicina domestica

℞. *Pulp. passul. minor.* ʒij.

rhab. el. ʒij. M. capiat interdum
dosin juglandis, & spiritum istum omni pastu
sedulo. Si sitis urgeret matutina, commo-
dum præscripsi decoct. rad. chinæ Timæi ad si-
tim scorbuticorum gratum. Erat in radice
scorbutica, sed cum tali succorum in primis
viis dyscrasia, ut acidum falsum scorbuticum
ubique in lymphæ cum bile oleosa nimis &
pingui dominaretur; unde etiam subcontra-
riis remediis subinde curanda veniret; con-
traxerat malum ex lauta nimis diæta, & defi-
ciente motu: Decoctum Chinæ fuit tale:

℞. *Rad. Chin. intaleol. incis.* ʒss.

liquirit. ʒvj.

santal. rubr. ʒij.

Conc. Cont. Infund. in ∇ comm. ʒvj.
Stent in MB. per ʒo Mane adde Passul. min. ʒss.
Coqu. lento Δ ad remanent ʒiv. M. D.

CXVI. *Verbera. Alvi retentio.*

Foemina sana cum esset, sed ab alia mu-
liere graviter verberibus læderetur, in
capite illusione in lapidem, ita ut aliqua vul-
nera exinde acquireret, quin etiam concu-
lacione cum pede in hypochondrio sinistro
male læderetur &c.

℞. *Spec. carminant.* Mij.

Herb. absinth. Mj.

Rad. levistic. ʒvj.

Coqu. in f. q. ∇ f. *Colat.* ʒix. adde

Elect. de bacc. lauri

lenitiv. ana ʒvj.

⊖ *gemmæ* ʒss. M. pro clysmate.

℞. ∇ *chærefol.*

scabios. ana ʒss.

⊕ *vini* ʒvj.

ocul. & ppt. ʒj.

Cinab. ʒ ʒj.

Syr. scabios. ʒvj. M.

Die xi. Maji

℞. *Fl. chamom.*

menth. ana Mj.

Rad. angel. ʒj.

pyrethr. ʒvj.

⊖ ʒss.

Coqu. in f. q. ∇ f.

Colat. ℞. ʒix. adde

Elect. de hier. cum agar. ʒj.

ʒo *dest. succin.* ʒj.

vitell. ovor. N. j. M. pro clysmate.

℞. *Liqu. C. C. succin.* ʒij. D. S:

Haupt- Spiritus

℞. ∇ *Ceras. nigr.*

lib. coruall. ana ʒss.

Syr. hyssop. ʒj. M. S.

Wasser zum Spiritu.

Cum admodum tussiret, & subinde varia, in
specie cruenta tussi rejiceret;

Die xij. Maji.

℞. ∇ *scabios.*

hyssop. ana ʒss.

~ ⊕ *anis.* ʒj.

Syr. diacod. Mont. ʒvj. M.

Die xv. Maji

℞. ♀ *Blat.* gr. xv.

scammon. ʒt. gr. ij.

Troch. Alband. gr. ʒ.

ʒo *dest. caryoph.* gt. iij. M.

Die xvi. Maji

℞. ∇ *chærefol.*

hyssop. ana ʒss.

⊕ *vini acerr.* ʒvj.

ocul. & ppt. ʒj.

Syr. card. ben. ʒvj. M.

Cum creberrimæ æstuationes speciatim
noctur-

nocturnæ & hinc diurnæ cum rigore interdum obvenirent molestæ cum alvi suppressione.

Die XVII. Maji.

℞. *Arcan. duplic.* ʒß.
Magist. Corall. c. f. citr. ʒj. M. pro 2. dosibus.

℞. *Arcan. duplic.* ʒij.
Antihæct. Poter. ʒj. M. pro 2. dos.

℞. ʒt. ʒij.
Antihæct. Poter. ʒj. M. pro 2. dos.

℞. ʒt.
Arcan. dupl. ana ʒß.
ʒ diaph. gr. viij. M. repetatur crebrius.

℞. *Passul. min. laxativ.* ʒij. D. capiat sæpius.

Cum nihilominus ardores paroxysantes eradicari nequirent, quin nocturni præsertim persisterent adhuc, ipsæque simul conquerebatur de dolore intenso, simulque tumore insigni in hypochondrio sinistro, quæ a calcitracione sub verberatione acceperat; ob id ad eradicandum fomitem primarum viarum, cum reliqua symptomata coindicarent

℞. *Syr. nicot.* ʒi.
▽ menth. ʒß. M.

℞. *Petrol. alb.* ʒß. D. pro hypochondrio. Multa evacuavit, varia, mucosa supra & infra, licet subinde recurrerent.

Die XXX.

℞. *▽ chærefol.*
hyssop. ana ʒiß.
Syr. card. ben. ʒvj.
succ. rub. idæi ʒj.
ʒ diaphor. ʒj.
— ʒ dulc. parum. M.

Die XI. Junii

℞. *▽ acetos.*
plantag.
menthæ ana ʒj.
cinam. ʒß.
✱ vini ʒvj.
Corall. rubr. ʒj.
ocul. ʒ. ppt. gr. xv.
Syr. plantag. ʒj. M.

Sed a vomitu isto cepit alvus pertinaciter claudi, quæcunque laxantia, passulata, gummata, sine fructu hauriebat, clysmata stimulantia, ʒlia, ex oleis incassum adhibebantur, aut enim retinebantur penitus, etiam suppositoria, aut sine ulla permiscela excernebantur iterum. Ita in re penitus desperata, abdomine indurato, & tumido, simulque admodum doloroso existente.

Die XIV. Junii

℞. *▽ menth.* ʒi.
ʒo amygd. dulc. ʒvj.
ʒ vivi bene purgati ʒiij. Hausit sine

alteratione.

Die XV. Junii

Tom. II. Pars 2.

℞. *▽ menth.* ʒiß.

ʒ vivi purgat. ʒiij.

▽ cinam. ʒiij. M. Vesperti

℞. *Decoct. fl. chamom.* ʒiij.

▽ benedict. ʒij.

ʒo gemm. ʒj. M. pro clysmate, sed omnia frustra.

Die XVI. Junii potio hæc Mercurialis hausta, sed frustra. A Meridie

℞. *▽ menth.* ʒj.

cinam. ʒß.

Syr. ros. solut. ʒvj.

ʒo vivi purgat. ʒv. M. hausit: Externe

℞. *Axung. anser.* ʒiij. D. Inungat abdomen. Die XVII. Junii.

℞. *Lact. bubul.* ʒviij.

Terebint. invitell. ov. dissol. ʒß.

ʒo tart. ʒiij. M. pro clysmate pro 2. vic.

Potio ʒlis proxima denuo præscripta; hausta mane, & iterum de novo hausta vesperti, ita ut jam Ibij. medicinales ʒii in corpore haberet, unde & varios motus in corpore perciperet, sed alvus clausa manebat. Unde etiam eodem die infusus ordinatus.

℞. *Herb. ʒ flor. chamomill.* Mvj.
malv. recent. Mij.

Flor. sambuc. Mij.

Baccar. lauri ʒiij. M. Coquantur, continuando interea semper litum abdominis cum axungia anserina.

Die XIIIX. eadem ordinabantur, item clysmata; ʒ semper pertinaciter in corpore manebat.

Die XIX. & XX. eadem; hoc tempore dolebat collum, intumescebant gingivæ, vacillabant dentes, & ex ʒ vivo retento salivatio supervenire incipiebat, unde pro faucibus & collo leniendis

℞. *Mell. rosac.* ʒi.

Syr. violar. ʒß. M.

Pro abdomine

℞. *Ungu. de arthanit.* ʒj.

ʒo diacolocynth. Querc. ʒij. M. inungatur abdomen.

Die XXI. Junii cum eadem adhuc persisterent, & ultra octiduum ita ʒ vivus in eadem hæreret, pro fecibus duris & tumore in colo hypochondrii sinistri emolliendis simul

℞. *Empl. de Cicuta.*

G. ✱ in ✱ solut. ana q. f. Malax. c. f. q. ʒo tart. destill. inducantur super alutam. D.

Die XXII. Junii.

℞. *Decoct. spec. emoll.* ʒix.

ʒo Ciner. clavell. ʒij.

Mell. depurat. ʒiij. M. pro clysmate reiterato. His & similibus factum est, ut pedetentim solveretur alvus, scybalis lapidis instar induratis, prodeunte simul successive ʒio vivo, in pauca licet una vice quantitate; ob id pro faucibus:

[Aaa]

℞. *Syr.*

✚ vini ℥iij.
Lap. ʒ. ʒi.
ʒ diaph. gr. xv.
Syr. scabios. ʒss. M.

His præmissis.

℞. Ras. santal. rubr. ʒi.
L. saffsafr. ʒss.
Macer. per xij. Hor. in ∇ com. ℥viij.
Coqu. ad consumptionem ℥biß.
adde Herb. heder. ʒss.
veron.

Com. hyper. ana Mij.
sem. fœnic. ʒvj.
Passul. min. conquass. ʒi.

Coqu. ad reman. ℥biv, circa finem adde
Rad. liquir. ʒiij.

De colatura capiebatur bonus haustus
mane, à meridie & sub introitu lecti. Un-
de malum sævire desiit, ægro bene se habente,
saltem quod calor quasi hæcticus ab omni
pastu cum tussi moderate humida & copiosis-
simis sudoribus nocturnis etiam sub primis
somni horis superessent. Hinc ad demulcend-
um calorem

℞. Lap. ʒ. præp.
Antihæct. Poter. ana ʒss.
Corall. rubr. præp. ʒi. M. pro 2. dos.
ob sudores nocturnos

℞. Lap. ʒ. præp.
Antihæct. Poter. ana ʒss.
Arcan. duplic. ʒij.
Laud. op. ferm. gr. v. M. D. pro 4.
vel 5. dosibus Hor. v. præter propter sumen-
dis.

LXXIII. Lues Venerea.

JUvenis 20. annorum non adeo purus à
Lue ʒea, conqueritur de macie, siti in-
tensa antemeridiana, saliva glutinosa, imbe-
cillitate virium, anxietate præcordiorum, ap-
petitu admodum dejecto, doloribus cruris,
imprimis, sudore copioso matutino, calore
p. n. per noctem affligente, manus & extre-
ma insigniter interdum frigebant, □ turbida,
subinde copiosis Θbus ruffis scorbuticis vi-
tro adherentibus imprægnata. **Er sahe ganz
schwindlich aus.** Aliis irritis dedi Ligu.
ʒ fol. ʒss. ad 40. gutt. mane in haustu juscu-
li, 20. à meridie Hor. v. in haustu cerevisiæ
frigida, unde melius longe habuit: Conti-
nuavit hunc ad 2. septimanas.

℞. Rad. Chinæ in taleolos concis. ʒss.
Liquirit ʒvj.
santal. rubr. ʒiij.

Infund. in ∇ com. ℥bvi. Stent in digestio-
ne per ϑ in MB. mane adde

Passul. min. conquass. ʒss. Coque
Alento, vase cooperto ad remanentiam ℥biv.
de quo quotidie capiat bonum haustum bis;
mane & à meridie; unde adhuc melius ha-
buit. Hinc

℞. Rad. Chin. ʒss.
Ras. L. Saffsafr. ʒi.
Rad. Liquir. ʒvj.
santal. rubr. ʒiij.

Infund. in ∇ com. ℥bvj. Stent in MB. per
ρ mane adde

Passular. min. ʒiij. Coqu. lento Δ
ad remanentiam ℥biv. Capiat eodem modo
& addat semper R ʒ gutt. xx. Continuetur
per aliquot septimanas; Quamdiu his deco-
ctis usus fuit, semper in fine pastus cochlearj.
de passulis minoribus comedit; quæ optime
contulerunt.

LXXIV. Febris intermittens quotidiana.

PUer annorum 2½ febre intermittente
quotidiana vespertina graviter satis la-
borans accepit:

℞. Ebor. f. Δ gr. vj.
ʒ Epil. ʒl. gr. iß. M. accepit biho-
rio ante paroxysmum; Vomuit, rigor eva-
nuat, æstus ingens perduravit. Hinc

℞. Arcan. dupl. ʒss.
ʒ diaphor. gr. v. M. Capiat biho-
rio ante paroxysmum. Calor mitis per no-
ctem; Repetito hoc pulvere aliquoties febris
evanuit. Post usum denique Ligu. ʒ fol. ʒ
curatus fuit. Qui alio tempore liquor præ-
missio vomitorio solus eum curavit, capien-
do bis in die. Hinc

℞. ʒ jalapp. gr. iij.
tart. ʒlat. gr. vj. M. optime contulit.

LXXV. Epilepsia.

INfans 4. annorum epilepticus assumpsit:

℞. Pulv. epil. ʒl. gr. j.
Ebor. f. Δ gr. iij. M. Vomuit.

℞. Fl. chamomill. Mj.
ʒ tart. ʒss.

Coqu. in f. q. ∇ f. Colat. ℞. ʒiij. adde
Mell. rosat ʒvj.

ʒo dest. succin. gr. vj. M. pro clyf-
mate.

℞. ∇ rub. idæi ʒss.

C. C. f. Δ ʒi.

ʒ diaph. ʒss.

Syr. ʒ succ. rub. Id. q. f. M. Bis hoc
propinatum fuit.

℞. ∇ pocon. ʒss.

Syr. pocon. ʒvj.

R ʒij. M.

℞. C. C. f. Δ

specif. Cephal. ana gr. xij.

Bezoard. ʒr. gr. viij. M. pro 2. dos.

Optime profuit ista potio, hinc reiterata
fuit. Denique Ligu. ʒ fol. ʒ gt. xxx. bis de
die datæ sunt. Urina sic secuta horri-
da. Hypochondria inungebantur butyro
rubro.

LXXVI.

LXXVI. *Febris Tertianæ Scorbuticæ.*

Vir propensus ad febres, easque scorbuticas, in principio Mensis Octobris 1668. sentit calorem quendam p. n. post pastum, unde cum continuare videretur idem, sequente die venam aperiendam curat, unde calor multum auctus fuit, noxque successit inquieta; Mane vocatus febri omnino erat liber, nescius qualis futura esset, præscripsi:

℞. *Hepat. rubr.* ʒj.

Ebor. s. Δ ʒß.

ʒ *diaph.* ʒj. M. pro 2. dosibus. Accepit has die ʒ & ʒ sine sensu febris, alvo existente aperta, die ʒ cum esset novilunium

℞. *Pulv. rad. jalapp.* ʒj.

Cremor. tart. ʒß.

ʒo *dest. succin.* gr. iij. M.

Unde sexies purgatus fuit cum torminibus. Die ʒ post pastum redit febris sine gravi horrore, cum ingenti calore, per iv. Hor. insequente copioso sudore; Altero mane duos habebat secessus fluidos: Hinc ob febrem scorbuticam præscribo:

℞. *Panaceæ Holsat.* ʒij.

⊖ *absinth.*

ʒ *diaphor.* ana ʒj. M. pro 2. dos. mane & vespere. Nocte sequente sudor spontaneus prorupit; à meridie expectabat paroxysmum, ☐ optimam habebat nubeculam, sed erat satis rubra:

℞. *∇ febrifug. usit.* ʒj.

R bezoardicæ. ʒß.

∇ cinam. ʒj.

Syr. scelotyrb. Forest. ʒijj. M.

Febris non redit. Nullus sudor, nec aliud quid inde secutum, ipse convaluit & pro stomacho usurpavit:

℞. *Ess. menth.*

absinth.

~ *cochlear.* ana ʒj. M. D. 30. gut.

LXXVII. *Mistus cruentus.*

Curavi aliquando virum mistu cruento laborantem, ex acrimonia feri scorbutica nato propinando trochiscos de Carabe cum lapillis Cancrorum præparatis, & paucio saccharo ʒ. Sed ut ut hæc juvarent insigniter, constantiam tamen sanitatis conciliavit Liquor ☉ Oris ad guttulas xv. omni mane ad aliquot dies assumtus & continuatus.

LXXIIX. *Dolores pedum.*

Vir quidam enormi dolore pedum affligebatur, qui sine ulla manifesta causa, sine ullo apparente externo in parte læsa signo &c. per longum tempus ultra dimidium annum enormiter eum vexabat. Omnibus autem medicamentis incassum adhibitis suasu cujusdam amici sibi apportandos curat quosdam lapides, qui in thermis reperiuntur, eos-

que probe coquit in ∇ simpl. in coctura ista balneat pedes, idque sæpius, unde ipsi iidem intumescunt; nihilominus continuat balneum hoc diutius, quo tandem factum, ut non tantum tumor, sed etiam dolor successive omnino evanuerit, ægerque perfecte curatus fuerit. Forsan similia balnea artificialia fieri possent ex Ψ cum ʒc in ∇ decoctâ, secundum manuactionem Zwelfferi *Mantiss. Spargyr. p. 401.*

LXXIX. *Hemicrania.*

Dolor hemicranicus acerbissimus ex aure affecta & tumore post aurem, optime aliis irritis discussus fuit per sacculos binos parti affectæ & nuchæ applicatos, ex flor. chamom. Herb. majoran. semin. cumini, nigellæ &c. cum succini suffitu, & quam calidissime admotos; vertex inungebatur ʒo succini; & sudor expectabatur.

LXXX. *Dolores artuum scorbutici.*

Fœmina laborabat doloribus artuum scorbuticis diuturnis, semi-paralyticis, præsertim nocturnis, cum affectibus faucium & tonsillarum.

℞. *Raf. L. juniper* ʒijj.

sassafr. ʒj.

Strob. pini junior. recent. concis. ana Mij.

Herb. ror. marin. Mj.

Incisa minutim macerentur in ∇ simpl. ʒvj. stent in MB. per noct. mane Coqu. ad ʒ Colat. D. pro haustu matutino sudorifero, præmissis universalibus.

℞. *Ess. L. sassafr.* ʒij.

myrrh. ʒj. M. D. 40. guttæ.

Item usurpabatur fons ex lixivio Coriariorum cum ☐ hum. crebrius:

℞. *∇ articul. ad extr.* ʒiß.

~ ⊖ * c. Ψ ʒvj.

lumbr. terrestr. c. ⊖ volat. ʒijj. M.

LXXXI. *Vulnera ab urso inflicta.*

Ancillæ ab urso graviter læsæ & laceratæ præscripsi:

℞. *∇ menth.*

chærefol. ana ʒiß.

* ʒj.

ocul. ⊖ ppt. ʒj.

Corall. rubr. ppt. ʒj.

Cinab. ʒ ʒß.

Laud. op. gr. iij.

Syr. Card. ben. ʒvj. M. pro 3. dos.

℞. *Lap. ⊖ ppt.* ʒj.

ʒ *diaph.* ʒj.

myrrh. el. gr. xij.

Laud. op. gr. ij. M. pro 2. dosibus.

℞. *tart. Glat.* gr. xij.

ocul. ⊖ gr. iij.

scam.

scamm. ℥t. gr. ij.
Troch. Alhand. gr. j. M.
 ℞. ▽ *scabios.*
 chærefol. ana ʒiʒ.
 + *vini* ʒvj.
ocul. ℥ ʒij.
Corall. rubr. ʒj.
 ~ *theriac. Camph.* ʒij.
Syr. heder. ʒʒr. ʒʒ. M.

LXXXII. *Febris ardens. Abdominis tumor.*

PUERO 5. Annorum in febre ardente imminente ex intermittente quotidiana per vini emetici ʒij. profligata, cum calor hecticus & tandem tumor abdominis quasi tympaniticus cum insigni corporis macie superesset, ad pituitam viscidam incidendam & lacteorum infarctus resolvendos ad imitationem Sylvii & Barbette præscripti:

℞. ▽ *menth.* ʒʒ.
*G. * in + sol.* gr. xij.
tart. Blat. gr. vj.
Extract. troch. Alhandal gr. β.

Syr. ros. ʒij. M. pro dosi. Mirum dictu, quam tenacem & vitream eduxerit pituitam, sine molestia copiose:

℞. ~ Θ* ʒiʒ.
 R ʒ ʒʒ. M. 20. vel 30. guttæ in haustu vini mane & à meridie

℞. *Decoct. carminat. usit.*

□ *puer.* ana ʒij.
ferment. comm. ʒi.

Mellis puri ʒʒ. M. pro Clysmate omni mane injiciendo continuo per unam alteramve septimanam.

℞. *Ungu. dialth. Comp.* ʒʒ.

℥o *lil. alb.* ʒij.

later. ʒiʒ.

dest. cumin. ʒi. M. Inungatur totum abdomen mane & vesperti cum prædictorum usu. Item

℞. R ʒ *ex scoris* ʒij. Capiatur ut supra cum dictis.

℞. *Arcan. duplic.* gr. xv.

Extr. troch. Alb. gr. β. M. F. pulvis.

℞. ▽ *rub. idæi* ʒvj.

Syr. emet. gr. xv. M. Hinc excessivus vomitus: sed optimus, utut fere fatalis.

LXXXIII. *Malum Ischiaticum.*

JUENIS Nobilis malo ischiatico affectus insigniter, præmissa V. S. in brachio cum se movere non posset,

℞. ʒ *diaphor.*
bezoard. Martial. ana ʒʒ.

⊙ *diaphor.* gr. v. M. subinde repetendo.

℞. ▽ *serpill.*
menth.
fl. sambuc. ana ʒj.

~ Θ* ʒiʒ.
off. microcosm. ppt. ʒij.

ʒ *diaphor* ʒj.

Laud. op. gr. iij.

Syr. Card. ben. ʒvj. M. continuando sudorem.

℞. *Picis naval.* ʒij.

fl. ♀.

terebinth. ana ʒij.

succin.

maslich. ana ʒi. M. pro Cerato applicando loco dolenti.

℞. ~ Θ*

Liquor. C. C. succin. ana ʒiʒ. M. D. 30. guttæ pro dosi, ter in die.

℞. ▽ *artic. adextr.* ʒiʒ.

~ Θ* c. ♀ ʒvj. M. pro usu externo.

℞. ▽ *articul. adextr.* ʒij.

~ *juniper.* ʒj.

Bals. Peruv. in vitell. ov. solut.
 ʒij. M.

LXXXIV. *Epilepsia Uterina.*

FOE MININA insigniter epileptica præmissis potionibus ex castoreo & Θ *volat. C. C.* & succinatis, laud. hysterico, item clysmatibus injectis carminantibus, item impositis Emplastris matricilibus, omnibus aliis irritis

℞. *pulv. Epil. ʒl.*

Ebor. f. Δ ana gr. vj. M. pro 2. dosi.

Cepit unam vesperti, & cum mediocriter se haberet, graviter exinde ægrotare cœpit, vomituriebat; Epilepsia eam prehendebat sine pulsu, jam moribunda videbatur, sacerdos ultimam benedictionem jam dixerat; ast brevi post supervenientibus aliquot secessibus (nam eodem die clyσμα applicatum fuerat à meridie) omne malum evanuit, quæta facta & omnia symptomata totius corporis & capitis in momento evanuerunt, nihilo præter solam lassitudinem tensivam superstite, mirabilem stupebam mane sequente effectum, cumque constantem: Et recordor, quod puer gravissima Epilepsia correptus aliis irritis eodem pulvere, sub eadem dosi accepto mirabile levamen & morbi ad aliquot dies quietem persenserit.

LXXXV. *Febris aucta ardens. Epilepsia Lunbrici.*

PUER 4. vel 5. annorum febre quasi aucta ardente conflictatus præmissa potione cum diafcordio

℞. *pulv. epil. ʒl.* gr. iʒ.

Ebor. f. Δ gr. iij. M. D. propter imminentes insultus Epilepticos, & convulsiones varias, cum certis intervallis fieret inquietus cum insigni phlogosi, item simul admodum somnolentus esset, mox evigilans mane perteret

teret potum, & continuo nares vellicaret & foderet, simulque de abdominis dolore conquereretur, ob id in suspensionem vermium incidi. Hinc

℞. *Aloës Epat.* ʒi. subigatur cum f. q. fel-
lis tauri ad consistentiam unguenti, adde
℞. *Colocynth.* ʒß. M. pro linimento
cum vesica suilla umbilicali regioni admo-
vendo, quod expulit altero die lumbricum.

℞. *Elix. Propr. c. Rhabarb.* ʒij. D.
25. gutt. bis in die.

℞. *Conserv. ros.* ʒß.

℞. *dulc.* ʒi.

℞. *resin. jalapp.* gr. ij.

c. f. q. *Syr. ros. fol.* F. bolus, qui vo-
mitum ingentem, aliquot secessus, cum eu-
phoria effecit.

LXXXVI. *Malum hypochondriacum.*

Idea curæ mali hypochondriaci hæc esto.

1. ℞. *Liqu. ʒ. fol. tart.* ʒvj. D.

2. ℞. *Vomitorium.*

3. ℞. *R. ʒ. ʒ. Zwelfferi* ʒvj. D.

4. ℞. *Potionem passulatam pro vehicu-
lo aliorum in alvo contumaci.*

5. ℞. *ʒ. ʒ. Compos.* ʒij. D. pro 6. dosibus.

6. ℞. *Liqu. ʒ. ʒ. ʒ.* ʒvj. D.

7. ℞. *ʒ. ʒ. Carminat. de Trib.* ʒß. D.
gutt. 30. in potione passulata.

LXXXVII. *Tussis Chronica.*

Puella 6. annorum tussi chronica cum fe-
bre, omni vespera graviter affligente,
præcordiorum anxietate, phlogosi vaga &
tensione colli quasi opisthotona conflictata,
laborabat:

℞. *Pulv. epil.* ʒl. gr. jß.

Ebor. f. Δ gr. iij. M. Vomuit quin-
quies cum euphoria sensibili, nox quieta,
cum tussi.

Altera vespera exacerbato malo:

℞. *ʒ. ʒ. ʒ. ʒ.* ʒij.

cinam. ʒß.

Gelat. C. C. rec. ʒvj.

ʒ. *diaph.* gr. xv.

Syr. pap. alb. ʒß. M. Cum omnia re-
mitterent:

℞. *ʒ. ʒ. ʒ. ʒ.* ʒij. D. 25. guttæ bis in die.

LXXXVIII. *Cachexia.*

Idea Curæ Cachexiæ incipientis puellæ:

℞. *tart. ʒ. ʒ.* ʒß.

ʒ. *absinth.* ʒß. M. pro dige-
stivo; quod excipiebat potio gummea; tum
Laxans: hinc

℞. *Liquor. ʒ. fol. tart.* ʒß. D.

℞. *R. ʒ. ʒ. Zwelfferi* ʒß. D.

Sequebatur purgatio cum Pilulis de *G. ʒ. & ʒ*
dulci. Hinc vinum aromaticatum medica-
tum: Tandem

℞. *ʒ. ʒ. ʒ. ʒ.* ʒß. D. omni mane guttæ 30.

Tom. II. Pars 2.

LXXXIIX. *Infans post partum non suf-
ficienter purgatus.*

Infans 4. dierum, post partum non suffi-
cienter purgatus, anhelus, alvo obstru-
cta, insigni corporis ardore, inquietudine,
crebris pavoribus; uno nomine jam super-
ventu imminens epilepsiæ moriturus.

℞. *ʒ. ʒ. ʒ.* gr. j.

ʒ. *ʒ. ʒ. ʒ.* M. Propinetur in ʒ ce-
raforum nigrorum; Injiciebatur clystma ex
decocto fl. chamomillæ addendo parum lixi-
vii vulgaris, & mellis. Prima vice saltem
æstum temperabat, quietem conciliabat, &
insigne commodum afferebat, sine sensibili
excretionem. Post tres horas propinabatur de-
nuo eodem modo; unde optime se habebat
infans; sed post 6. demum horas cum etiam
clystma injectum retentum fuisset diutius, bis
copiosas, horridas, grumulentas, ex nigro
virides fæces cum egregia euphoria extur-
bavit.

XC. *Palpebrarum coalitus.*

Vir quidam utroque oculo suffusus, pal-
pebras semper oculo obductas & clau-
sas tenuit, easque nullus Medicus aperire po-
tuit, nisi quidam surdus Empiricus, ex Tur-
cia veniens, qui herbam petroselini virentem
in magma contusam die & noctu superposuit,
& oculi palpebræ vel resolutæ vel tumefactæ,
vel ardoribus quasi siccatae denuo paucos post
dies sua sponte apertæ sunt, & huc usque
apertæ manent, quæ alias aliquot annos ante
clausæ erant.

XCI. *Dolor nephriticus nothus.*
Ischuria.

Vir gravissimis abdominis torminibus af-
fligebatur, aderant vomitus rari, gra-
ves præcordiorum anxietates, alvus obstru-
cta, dolor in dorso & lumbis; suspicio erat
doloris nephritici nothi, causa movens fuerat
iracundia. Typum habebant dolores tertia-
narium nocturnum.

℞. *Spec. emoll.* Mij.

ʒ. *tart.* ʒij.

Coq. in f. q. ʒ. *ʒ. ʒ. ʒ.* ʒix. adde
Terebinth. c. vitell. ov. solut. ʒß.
mellis ʒvj. M. pro clysmate.

℞. *Petrol.* ʒij.

ʒ. *dest. succin.*

cumin. ana ʒß.

Ungu. dialth. ʒvj. M. pro inungendo
dorso & lumbis crebrius, interdum etiam ab-
domine: renovatum sæpius, quia feliciter
operabatur:

℞. *Laud. hyst.* gr. v.

Extr. castor. gr. v.

c. f. q. *balsami ʒ. ʒ. ʒ.* *terebinth.* F. Pi-
lulæ,

[Zz]

Item

Item cum supprimeretur urina

℞. *R. nephrit.* ʒij. D. 50. guttæ. Hinc
□ fluxit.

Ob præcordiorum anxietates

℞. *Empl. de Tacamah. q. s.*
Malax. c. s. q. bals. Peruv. D.

℞. *Sem. violar.* ʒijj.

papav. ʒj.

c. s. q. ∇ Alkekengi. F. Emulsio, adde
Ebor. s. ∆ ʒß. M.

℞. *Passul. min. laxativ.* ʒß. D.

Ob immanes convulsivos dolores:

℞. *Cinnab.* ʒ

Lap. percar. ana ʒß. M. D. in 2plo.

Bene contulit.

℞. *Theriac.* ʒj.

Bezoard. min.

Θ *stipit. fab.* ana ʒß.

c. s. q. Syr. menth. F. bolus in cochlearibus duobus aceti assumendus, expectando sudorem.

XCII. Ulcera narium.

VIr ulcere narium in utraque ala interne cum sanguinis, puris, & crustarum proventu, laborabat. Curatus fuit per folia Nicotianæ recentia contusa seu leviter conquassata, utrinque naribus immissa, & cum aliquot horas ita retinisset, applicavit

℞. *Unguent. alb. camphor.* ʒijj.

balsam. ∆ adextr. ʒj. M.

Quorum usu continuato convaluit.

XCIII. Ozæna.

Virgo laborabat ozæna:

℞. *Ob. ad albed. calcin.* ʒß.

dissolv. in

∇ *majoran.*

lil. convall. ana ʒj.

Filtrentur per chartam D. pro usu externo.

℞. ∇ *plantag.* ʒijj.

~ *vini* ʒijj.

q̄ *sublimat. pulveris.* ʒß. M.

Usurpetur cum penicillo: sed acius & non-nihil dolorosum fuit.

℞. ∇ *majoran.*

plantag. ana ʒiß.

Mell. ros. ʒvj.

~ *vini* ʒijj. M.

Insuffletur ex vola manus. Profuit.

XCIV. Odontalgia.

FOEmina laborabat odontalgia cum tumore rubro malæ insigni, & huius gravi lancinante dolore; Præscripsi lac, quod bulliat, & tepide ori admoveatur, seu in ore contineatur; Externe

℞. *Theriac. Androm. q. s.*

Θ *absinth.* ʒi. M.

inducatur super linteum, F. Emplastrum.

℞. *G. tacamahac. q. s.* liquefactum malaxetur copiose *c. balsauo Peruv.* inducatur su-

per linteum, irroretur o dest. junip. vel o papav. express. D.

XC V. Raucedo.

VIr subito incidebat in raucedinem ex fumo tabaci hostili inspirato; Juvabat aliquatenus Syrupus violarum, aderat fere aphonia, aut saltem sonus obscurissimus:

℞. ∇ *scabios.* ʒijj.

asthmat. ʒj.

Syr. de hyssop. ʒijj.

erysim. ʒvj.

~ Θ **anif.* ʒiß. M. D. cochleatim.

XC VI. Phthisis.

ANcilla valde phthifica idque ex vitio diætæ, & inspiratione aeris tetri in locis subterraneis cum tussi materiæ putridæ & foetidæ, dolore capitis, anorexia, febricula, &c. curata est primum per vomitorium oxyfacchari emet. A. Salæ, cujus effectus felicissimus fuit, copiosissima & putridissima materia ex pulmonibus evacuata; unde rarior tussis, liberior respiratio, appetitus auctior, doloris capitis omnimoda remissio, Hinc

℞. *herb. chærefol.*

heder. terrestr. ana Miß.

Concis. coqu. in s. q. ∇ adde

Passul. min. ʒß. Decocto fervidissimo infunde *Herb. nasturt. contus.* Mj.

succi heder. terrestr. expr. ʒj. M. F. potus, de quo ob facilem accescentiam sæpius repetendo mane assumat bonum haustum, jeuno stomacho, cum Elix. Propr. gutt. xx. hora v. pomerid. iterum bonum haustum, cum pulveris sequentis ʒß.

℞. *Ocul. & præp.*

rad. aron. non præp. ana ʒj.

ircos Flor.

sem. papav. alb. ana ʒß.

maslich. ʒj. M. F. Pulvis.

His addatur suffitus cum succino, & thure, ore excipiendus; Quodsi dolor capitis vel etiam catarrhi repetant, vertex inungatur cum o dest. succini. Hoc ad tempus continuato loco pulveris huius

℞. *C. C. subtiliss. raspat.* ʒj.

Antihel. Poter.

Magist. Corall. c. succ. citr. ana ʒß. M.

Eodem modo usurpabatur; Unde symptomata remittebant, sed sudores continui nocturni admodum eam vexabant, & emaciabant. Post paravit decoctum ex comis hyperici, cum herba persicariæ, & loco illius decocti usurpavit, ex quo bene se habuit, nisi quod diarrhœa eam deprehenderet; post octiduum ergo eo intermisso incepit diætam lactis, quotidie mane & à meridie bonum haustum assumendo, continuavit per 10. dies, sed ob nimios sudores & ob strictam diætam, quam observare non poterat, eam intermisit; postmodum tamen cessantibus symptomatibus convaluit.

XC VII.

XC VII. *Pleuritis.*

Mulier corpulenta 50. annorum & succi-plena gravi pleuritide corripiebatur, cui cum per sudorem nihil, neque etiam per sputum evacuetur, supervenit tamen natura beneficio die XI. copiosa sed simul foetidis-sima diarrhoea, materiae purulentæ terribi-mæ, qua per x. & plures dies continuante cum sensibili alleviatione sic sanabatur. Præcave-bam simul, nephthifica fieret, per pulveres ex Antihectico Poterii, myrrha, oculis ☉, & diaphoretico, &c. item cum balsamo ☿ te-rebinth. Elixir Propr. raro propinabam, quia hoc semper diarrhoeam sistebat, ut necesse esset, eam denuo provocare clysmate.

XC IIX. *Empyema.*

Retulit Parisiis D. Bonedelot. quod ali-quando empyema dureret ad x. annos, & quod materia empyicorum aliquando inspisse-tur, & condenseretur in materiam crassam in-star mellis, nec febris semper adsit, nisi tunc, quando pus adhuc in fermentationis consistit motu, sed cessante fermentatione cesset simul febris. Idem retulit, fuisse juvenem vulne-ratum ense in pectus, indeque factum empy-sicum, cum hectica, macilentum, &c. sana-tum tamen; Sed ei totum crus dextrum ad-modum fuisse ponderosum, & aliquantisper tumidum; seque hinc dixisse, pus ex pectore in hoc pede accumulatum esse, unde suasu suo chirurgum in pede infra genu incisionem fecis-se, sed nihil effluxisse, ipsum vero in alio pedis loco simile tentasse, & exinde Pintam puris eduxisse, cum jam fere xiv. menses à vulnere-ratione abiissent.

XC IX. *Empyema.*

Nobilis quidam ex casu ab alto & sputo cruento fiebat empyicus, in tota me-dietate thoracis sinistra, ita ut facta apertione inter costas incredibilis copia puris tandem proflueret; Potus erat cerevisia infusione vul-nerariorum temperatorum per fermentatio-nem imprægnata, item potus interdum seu decoctum vulnerarium cum pauco melle, de quo pro lubitu, vel pro medicamentorum ve-hiculo usurpabat. Omni mane

℞. *Elix. Propr. f. ad.* 3℔.

℞ 3℔. M. D. 40. guttæ.

vel ℞. *Ess. myrrh.* 3℔.

succin. compos. 3℔. M. D. 40. guttæ. omni vespere bihorio ante cœnam & sub introitu lecti quantitatem castanei vel ju-glandis de hoc Electuario assumsit:

℞. *Conserv. ros. rubr.* 3℔.

heder. astr. 3℔.

Extr. ☿ 3vj.

Lap. ☉. præp.

Antihect. Poter. ana 3℔.

c. f. q. Syr. papav. rhæad. F. Electua-

nium. Vel

Tom. II. Pars 2.

℞. *Conserv. scord.* 3℔.

ros. rubr. 3℔.

Extr. ☿ 3℔.

pulv. scord. 3℔.

Lap. ☉. 3℔.

c. f. q. Syr. scord. F. Electuarium.

Denique

℞. *Conserv. scord.*

ros. rubr. ana 3℔.

Extr. ☿ 3℔.

Lap. ☉. præp. 3℔.

☿ diaph. 3℔.

c. f. q. Syr. papav. rhæad. F. Electua-

nium.

Pro Expectoratione:

℞. ☿ *hyssop.*

chærefol. ana 3℔.

asthmat. 3℔.

Oxymell. scyll. 3vj.

Syr. nicot. 3℔.

emet. 3℔. M.

Cum quibus ☿☿ anis. bene contulit.

C. *Tussis Infantis. Tormina. Aëstus.*

Infans unius fere anni robustus, torosus, & vegetus tussi Epidemica cum æstu gravi & insigni virium prostratione, siti continua, anorexia, &c. laborabat.

℞. *Pulv. epil.* 8℔. gr. ij.

Ebor. f. Δ gr. iij. M.

Vomit & admodum debilitatus fuit. Hinc

℞. ☿ C. C. *succinat.* 3℔. D. iix. guttæ pro dosi aliquoties, cum tormina simul & æstus gravis superveniret, præter clysmata

℞. *ocul. ☉. præp.* 3℔.

Crystall. præp. 3℔.

pulv. epil. 8℔. gr. jss. M. pro 2. dos. inde quietem recuperavit. Item

℞. C. C. *f.* Δ 3℔.

Corall. rubr. præp. gr. vij.

☿ *card. bened.* gr. iv.

pulv. epil. 8℔. gr. jss. M. pro 2. dos. Bene contulit. Reliquias Elixir propr. f. ☿ do excussit.

CI. *Tussis Infantis. Epilepsia.*

Sic puella eodem morbo, sed cum gravi Epi-lepsia affecta anni 1 1/4.

℞. *pulv. epil.* 8℔. gr. ij.

Ebor. f. Δ gr. vj. M. pro 2. dos. Item

Liquor C. C. succinatus dabatur. Externe pro hypochondriis

℞. ☿ *chamomill.* 3℔.

dest. cumin. 3℔. M.

Gelatina C. C. dissolvatur in potu & propi-netur.

CII. *Febris catarrhalis. Febris tertiana. Hæctica.*

Puer x. annorum febre catarrhali, coryza & tonsillarum tumore affectus cum tussi, &c.

[Z z 2]

℞. ☿

℞. ∇ *scabios.* \mathfrak{z} j.
Liqu. C. C. succin. \mathfrak{z} ℔.
 $\sim \Theta * \text{anis.}$ \mathfrak{z} j.
Syr. violar. \mathfrak{z} ℔. M. fudet. Vesp̄eri in-
 gruente æstu

℞. ∇ *scabios.* \mathfrak{z} j.
hyssop. ana \mathfrak{z} ℔.
 $\sim \Theta * \text{anis.}$ \mathfrak{z} j.
Syr. papav. alb. \mathfrak{z} vi. M. capiat pro lubi-
 tu cochleatum. Altera vel tertia vespera

℞. *Succin. catarrhal.* gr. xij.
 \mathfrak{z} *bezoard.* gr. vj. M. Capiat subinde
 succum raphani cum saccharo. Cum fuerit fe-
 bris fere curata, intermittens quotidiana &
 hinc tertiana vesper̄i superveniebat cum hor-
 rore aliquali & hinc æstu repetente.

℞. Vomitorium vesper̄i ante Paroxysmum
 exhibendum. Sed ob metum hæctica

℞. *Arcan. duplic.*
Antihæct. Poter. ana gr. xv. M. D. pro
 2. dof. mane & vesper̄i ante Paroxysmum.

℞. Θ *card. bened.*
Arcan. dupl. ana gr. vij. M. sumatur
 vesper̄i ante Paroxysmum. Hæc repetita ad-
 huc semel & iterum, tandem ex usu pilularum
 Glassianarum convaluit.

CIII. *Asthma Convulsivum. Scorbutus.* *Phthisis.*

FŒmina ex terrore & iracundia reddita
 agra, debilis, tussiebat valde, vomebat,
 de dolore dorsi lumbari querebatur, inclina-
 bat ad phthisin insigniter, erat admodum scor-
 butica:

℞. $\sim \Theta$ *dulc.* \mathfrak{z} ij.
cochlear. \mathfrak{z} j. M. D. 40. gtt. bis in die.

De Asthmate quasi convulsivo ex dorsi me-
 dia regione interscapulari oriundo conque-
 rebatur, & halitum subinde supprime

℞. *Arcan. duplic.* \mathfrak{z} ℔.
Cinnab. \mathfrak{z} \mathfrak{z} j. M. pro 2. dof.

In Cerevisia usurpet \sim cochleariæ. Hoc
 ipsum aliquoties reiteratum egregie contulit,
 & eam restituit. Ob metum phthisicos suasi
 præservatorie, ut decoctum hederæ terrestris
 & chærefolii cum passulis pararet, cui infunde-
 ret herbam nasturtii q. f. & caperet subinde.

CIV. *Dolor vulvæ.*

FŒmina dolore vulvæ acerbo cruciata, ita
 ut ejularet, explicabat eundem, *es risse sic*
in der Geburt / urina libere sine sensu
 effluebat.

℞. *Lap. percar.*
Cinnab. \mathfrak{z} ana \mathfrak{z} ℔.
Laud. op. gr. ij. M. D. in vehiculo ca-
 lido. Hinc

℞. *Herb. absinth.*
menth. ana Mj.
Flor. chamom. Mij.

Herb. hyosc. M℔.

Baccar. juniper. \mathfrak{z} ℔. M. Coqu. in
 lacte, & applicentur regioni pubis in sacculo
 crebrius. Optime hæc contulerant. Alias
 varia tentavi, pro dolore eradicando, sed
 nullum adeo atque hoc contulit.

CV. *Febris lactea. Purpura. Hysterica pas-* *sio. Furunculi. Laryngis tumor.*

Puerpera tertio à partu die conqueritur de
 calore febrili, mediocri, erat debilis,
 pulsus parvus, celer & nonnihil inæqualis.

℞. \mathfrak{z} *diaphor.* \mathfrak{z} j.
myrrh. elect. gr. v. M. D. in 2 plo.
 Capiat vesper̄i & post mediam noctem,
 sed ingruente nocte angustia præcordiorum
 accedunt, forsân uberiori lactis proventu ur-
 gente.

℞. *sem. Card. bened.*
napi ana \mathfrak{z} ℔.
Flaved. cort. Ont. \mathfrak{z} ij.
 c. f. q. ∇ *fl. sambuc.* F. Emulsio, adde
C. C. f. Δ \mathfrak{z} ℔. Edulcoretur parum.

Die quarto

℞. *Flaved. cort. citr. rec.* \mathfrak{z} ij.
 Contus. in mortar. adde
Sem. card. bened. \mathfrak{z} ij.
napi.

aquileg. ana \mathfrak{z} j.
myrrh. elect. gr. xvi.
 c. f. q. ∇ *fl. sambuc.* E. Emulsio, adde
C. C. f. Δ \mathfrak{z} j.
 \mathfrak{z} *diaphor.* \mathfrak{z} j. M. Edulcoretur parum.
 Nox erat inquieta, æstus gravis cum siti. Hinc
 die quinto

℞. *Arcan. dupl.*
pulv. bezoard. Mich. ana gr. xv. M.
 D. in calido vehiculo; & in potu dissolvat cre-
 bro gelatinam C. C. & calide bibat. Melius
 visa fuit se habere vesper̄i.

℞. *Pulv. bezoard. Michaël.*
Arcan. duplic. ana \mathfrak{z} ℔. M.
 D. pro duabus dosibus, ante cœnam & post
 mediam noctem: Æstus gravis à nona ve-
 spertina usque ad tertiam, à noctis medio sitis
 immensa, somnus nullus. Die sexto

℞. *Bezoard. Mich.*
arcan. dupl.
 Θ \mathfrak{z} t. ana \mathfrak{z} ℔. M. Repetit æstus,
 & omnimoda virium omnium prostratio:
 sitis inexhausta: imminentes quodammodo
 convulsiones.

℞. \mathfrak{z} *bezoard. Mich.* \mathfrak{z} ℔.
Cinnab. \mathfrak{z} . gr. xij.
 Θ *volat. C. C.*
succin. ana gr. ij. M. Ca-
 piat tempore prandii, cum appetitus semper
 penitus esset prostratus. Vesp̄eri

℞. C.

℞. C.C. Or. ʒj.

‡ bezoard.

Cinnab. ʒ ana ʒß.

⊖ volat. C.C.

succini ana gr. ij. M. pro 2.

dof. vesperi & post mediam noctem.

Die septimo aliquale purpuræ circa pectus se offert vestigium: æstus moderatus. Mane similis pulvis; vesperi idem, sed sine volatilibus:

℞. R Corall. antiscorb. ʒß. dof. 40. guttæ vesperi & mane, sub hora x.

Die octavo purpura uberius comparuit, æstus hac nocte nullus: Tinctura bis interdum usurpata fuit; & vesperi similis pulvis: post dimidiam noctem eadem Tinctura. Nox sequebatur bona, æstus nullus, purpura copiosa.

Die nona eadem; sed à meridie sponte debilitatur, vesperi pulvis ordinabatur sequens:

℞. C.C. Or. ʒß.

‡ bezoard. gr. iix. M. à media nocte tinctura. Nox siti & æstu denuo gravis.

Die decimo Tinctura eadem & pulvis vesperi. Nox bona; purpura prurit.

Die undecimo mane commode habens bibit cerevisiam non rite defæcatam, sed agitatione dolii feculentius conturbatam; unde cardialgia, vomitus, tumultus abdominis, secessus liquidi repetiti, & pathemata hysterica excitantur.

℞. Tinct. Corall. antiscorb.

Liqu. C.C. succin. ana ʒj. M. ʒo. guttæ pro doli, bis vel ter eodem die, unde mediante sudore remiserunt dicta symptomata: vesperi

℞. ‡ bezoard. gr. xij.

magist. corall. c. succ. citr. ʒß. M.

Nox quieta, sed ob agitationem corporis & humorum præcedentis diei à media nocte ad tertiam usque matutinam æstus cum siti ingentes redeunt, quæ mane cessant, ipsa satis commode habente.

Die duodecimo Tinctura ista mista reiterata est, circa meridiem redit gravis æstus, cum intensa cephalalgia:

℞. ‡ bezoard. gr. xij.

Cinnab. ʒ gr. viij. M. reiteretur ante & circa noctem R coralliorum antiscorbutica.

Die decimo tertio: nox mediocris sine æstu, sed cum siti; reiteretur R antiscorbutica.

Die Decimo quarto circa mediam noctem anxietates præcordiorum, hinc æstus gravis insequabatur, mane mediocriter se habebat. Continuata est tinctura, & ut in promptu aliquid habeatur.

℞. C.C. f. Δ ʒj.

⊖ card. bened. gr. xij.

‡ diaph. gr. vj. M. pro 2. dof.

Die decimo quarto: nox erat quieta, vires mediocres, æstus nullus, sitis adhuc nonnihil intensa; à meridie purpura alba se manifestavit: Hinc

℞. C.C. f. Δ ʒß.

⊖ card bened. gr. ix.

‡ diaphor. gr. v. M.

Sed cum crebri furunculi eam affligerent, his applicavit emplastrum Helmontii, cum aperti essent, per balsamum Peruvianum consolidavit & ad consolidationem perduxit. Cum vero circa laryngem ex conatu partus tumor duritie mediocris, reliquis locis concolor prominens enatus esset, *wie ein fleiner Kropff*:

℞. Empl. de Ranis c. ʒ applicetur aliquoties.

CVI. Puerperæ dolor regionis hypogastricæ.

Fœmina 4. septimanis à partu, cum semper optime se habuisset, incidit in gravissimum dolorem circa hypogastricam regionem dextram, ita ut misere ejularet, exinde graviter æstuarer, sudaret &c.

℞. Cinnab. ʒ ʒj.

⊖ artemis. ʒß.

myrrh. cl. gr. vj.

Laud. op. gr. ij. M. pro 2. dof. præmisso clystere, unde egregium levamen percipit: Hinc

℞. Ess. myrrh.

hyperic. ana ʒij. M. 40. guttæ pro dosi, bis vel ter in die, egregie contulit, & menses redierunt, & levata fuit.

CVII. Tormina infantis. Purgatio infantis omissa.

Infans 3. dierum inquietus, ejulans, torminibus afflictus, nec rite à partu purgatus

℞. Ⓞ fulmin. gr. j.

C.C. f. Δ gr. iij. M. pro 2. dosibus, in vehiculo sequenti:

℞. Syrup. de Spina Cervin ʒijj.

Pulv. passul. ʒiß.

ocul. ʒ ppt. ʒß.

Diluatur c. f. q. ∇ scabios. M. D. aliquot parva cochleatia, cum pulvere; idque repetatur per aliquot dies, bene contulit.

CVIII. Tussis. Phthisis.

Mulier tussi ultra 3. septimanas conflictabatur eaque ex stomacho; percipiebat enim titillationem & vellicationem circa scrobiculum cordis; tussis erat crebra, rejiciebat varia, viscida & terro sapore inquinata, respiratio difficilis, & dextro lateri incumbens omnia fere graviora videbantur; Principium aderat phthiseos.

[Zz] 3

℞. Succ.

℞. Succum raphani rec. expressum cum saccharo, q. v. capiat subinde, pro resolven- da mucagine stomachi,

℞. ▽ *menth.*

Syr. emet. ana ℥ss. M. copiose su- pra & infra evacuavit, Eodem vesperi

℞. *Flor.* ♀ ℥j.

myrrh. gr. ix.

laud. op. gr. ij. M. capiat hora una an- te coenam.

℞. *Flor.* ♀

Antihel. Poter. ana ℥ss.

Laud. ferment. gr. ss.

℞. *dest. anij.* gr. ij. M. vesperi capiat.

Interdum crebrius decoctum raparum exsic- catarum hauriat, pro lenienda lymphā acri, simulque excoaratione stomachi inchoata le- vanda. Sed cum profusi sudores noctur- ni continuo emanarent, iique phthisici, eam- que insigniter macerarent,

℞. *Antihel. Poter.* ℥j.

Laud. op. ferment. gr. j. M.

Capiat vesperi antepastum, Vel

℞. *Antihel. Poter.* gr. xv.

fl. ♀ ℥ss.

Extr. croc. gr. j. M.

Repetit tales pulveres aliquoties & omni mane simul de Elix. stomach. Michael. 40. gr. Sed cum nihilominus tussis & stomachi labes &c. instanter continuarent;

℞. *Scord.* Mij.

Salvia Mj. pulveris. minutim adde

fl. ♀ ℥ij.

c. f. q. mellis puri F. Electuarium spif- sum, de quo capiat crebrius in die pro lubitu: Non incongruum hoc erat, sed cum pro- pter dulcedinem & fermentescibilitatem mel- lis interdum murmura aut tormina, aut acris ardoris sensus inferrentur, jussi ut vesperi sub introitu lecti capiat de pulvere ocul. ℥. ppt. q. pl. & ita aliquandiu continuet.

CIX. Febris maligna.

V Ir febre malignissima ex prægressa ira & conversatione in nosocomio contra- cta affectus cum cephalalgia, præmissa noctu V. Sone: mane

℞. ▽ *scord.*

cordial. Herc. Sax vel rub. id.

ana ℥j.

C. C. f. Δ. ℥ss.

Cinnab. ℥ ℥j.

⊖ *volat.* C. C. gr. viij.

succini gr. iv.

Laud. op. ferment. gr. iij.

Syr. fl. tunicae ℥vj. M. pro 2. dof. ac- cepit, bene sudavit, longe melius habuit: ve- sper:

℞. ℥ *bezoard. Sennert.*

Unicorn. ver. ana ℥j.

bezoard. Or.

℥l. anagr. vj.

M: pro 2. dosibus, & capiat simul inter- dum istam misturam.

℞. ▽ *scord.*

fl. sambuc.

rub. idaei ana ℥j.

⊕ *rub. idaei* ℥vj.

diascord. Fracast. ℥ij.

Syr. acetos. citr. ℥ss. M. sudavit, dor- mivit, optime habuit. Mane pro stomacho:

℞. *Empl. Tacamahac.* item Clystma &c.

CX. Febris maligna.

V Ir juvenis febre maligna correptus præ- sentibus jam Convulsionibus:

℞. ▽ *scorzon.*

scord. ana ℥ss.

cinam. ℥ss.

Cinnab. ℥. gr. xv.

bezoard. Or. ℥j.

⊖ *volat. viper.* gr. vij.

Conf. Alcherm. ℥ss. M.

Item ℞. ▽ *fl. sambuc.*

card. bened. ana ℥ss.

cinam. ℥ss.

Cinnab. ℥ ℥j.

bezoard. ℥l. ℥ss.

⊖ *volat. viper.* gr. vi.

Syr. de hyssop. ℥ss. M.

CXI. Colica.

V Ir juvenis corripiebatur torminibus alvi gravissimis, circa & infra regionem umbilicalem, simul subinde præcordia occu- pante, **es wolte zuweilen das Herze ab- drücken** / alvus pertinaciter clausa, umbi- licus interiora versus retractus, abdomen ex- terno contactu durum, nec erectus stare po- terat, hinc etiam urinæ emissio difficilis, miserabilis erat status: Hinc die ☉

℞. *Laud. hyss.* gr. v.

scammon. ♀ t. gr. iij.

Ocul. ℥ ppt. ℥ss.

Sed frustra.

℞. *Passul. min laxativ.* ℥ss. D. Sed frustra, etiam si alias bene operatae fuerint; Unde circa vesperam:

℞. *Arcan. duplic.* gr. xv.

scamm. ♀ t. gr. iij.

troch. alhand. gr. j. M. sub noctem aliquot sedes, sed sine levamine. Hinc die ☽

℞. *spec. carminant.*

emoll. ana Mij.

⊖ ♀ ℥ij.

Coqu. inf. q. ▽ f. Colat. ℥ix. adde

Elect. lenitiv. ℥j.

mell. ros. ℥ss.

℞. *dest. succin.* gr. x.

vitel.

vitell. ov. N. j. M. pro clysmate;
aliquantulum sed parum profuit: vesperi

℞. ▽ *fœnic.*

menth. ana ʒiʒ.

~ ⊖ * ʒi.

Ess. opii ʒʒ.

Syr. cort. aur. ʒʒ. M.

Item ℞. ʒʒ. *chamom.*

cumin. ana ʒij.

dest. anis. ʒij. M. Inungat abdomen
induratum. Nox paulo quietior, sed mane
omnia recrudescunt dolorifica symptoma-
ta. Unde die ʒ

℞. *Empl. de Galban. q. s.*

Malax. cum s. q. ʒʒ. dest. succin.
inducatur super alutam F. emplastrum pro
umbilico: Et cum æger postularet, ut bene
aperiretur alvus, Die ʒ

℞. *Passul. min. laxat.* ʒʒ.

⊙ *fulmin.* gr. v. M. unde post ali-
quot horas xi. fere secessus habuit. Hinc ve-
speri

℞. *Sev. hircin.*

Ungu. potab. rubr. ana ʒj.

Liquefacta misceantur; inungat largiter ab-
domen, quod emollitum nonnihil fuit cum
euphoria. Ad convulsivum dolorem si-
stendum die ʒ

℞. *Cinnab. ʒ* ʒj.

Laud. op. gr. iij. M. repetitum hoc
bis, etiam sequente die semper cum egregio
levamine. Die ʒ

℞. ʒʒ. *rapar.*

lini ana ʒv. M. pro clysmate: egre-
gie contulit, multa viscida evacuavit, cum
levamine; unde pulvis cinnabarinus assum-
tus noctem quietam intulit. Item ~ ⊕
dulg. anticol. ad ʒij. pro 2. dosibus assumtus su-
dorem expectando non fuit inconveniens.

Tandem cum certus essem factus per
clysma, quod mucago acida in recessu pec-
caret, licet aliquoties quotidie excerneret li-
quida: Die ʒ

℞. ▽ *menth.* ʒj.

*G. * in * sol.* gr. xv.

♀ *Glat.* gr. vi.

scammon. ʒt.

troch. Alband. ana gr. iʒ.

Syr. ros. solut. ʒij. M.

Exinde 5. vicibus excrevit cum levamine
plenariò.

Æger alias sæpius levi de causa erat ob-
noxius huic affectui; abundabat forti acido,
unde & laxantia parum operabantur; Erat
colica spasmodica, excitata occasione au-
steri acidi, insigniter visci di. Cum post ali-
quot dierum intervallum subinde vestigia
quædam recurrerent, mane liquor. ʒ Or. ad
gt. xx. à meridie ~ ⊖ * gtt. xxx. aliquandiu
hausit cum optimo levamine.

CXII. *Tussis stomachalis.*

VIr difficili respiratione, anxietate præ-
cordiorum, tussi crebra, viscidissimæ
materiæ rejectione, subcruentæ, dolore cir-
ca hypochondrium sinistrum, ubi olim con-
tusionem passus fuerat, pulsu celeri, frequen-
ti, & debili affectus, ita ut abscessu latente in
latere sinistro laborare videretur, inter alia
præmissis clystere:

℞. ▽ *hyssop.*

menth. ana ʒiʒ.

asthmat. ʒvj.

~ *G. * c. ⊕* ʒv.

Syr. nicot. ʒj.

emet. ʒij. M.

Pro expectoratione capiat cochleatim;
hoc aliquoties reiteratum copiosa admodum,
& horrida ejecit. Hinc purgans blandum cum
pilulis de * Quercet. & 4. saltem secessus mo-
vit. Sed exinde gravis æstus, præcordiorum
anxietas, tussis, & excretio materiæ per os
recruduerunt periculose: Ob id

℞. *Decoct. hord. cum rad. liquirit.* ʒʒ.

Syr. nicot. ʒij.

~ ⊕ *c. G. ** ʒʒ.

⊕ *dulg.* ʒj. M.

Bibat pro lubitu: unde omnia symptomata
remiserunt. Cum restet tussis sicca perquam
molesta:

℞. ▽ *menth.*

scabios. ana ʒj.

asthmat. ʒij.

Syr. violar.

diacod. Mont. ana ʒʒ.

fl. ʒ ʒʒ. M.

Reliquum perfecit Elixyr Propr. & post-
modum balsamus sulphuris.

CXIII. *Tussis.*

VIr tussi stomachali pertinaci laborabat,
Aliis irritis:

℞. MP. *de hiera c. Agar.* gr. xij.

*G. * in * sol.* ʒʒ.

Extr. troch. Alband. gr. iij.

c. s. q. Ess. sassafras F. Pilulæ.

℞. *succini præp.* ʒj.

ʒ *diaphor.* ʒʒ.

myrrh. elect.

⊖ *volat. succini ana* gr. v.

Laud. op. gr. iij. M. Capiat hora an-
te coenam. Profuit.

℞. ʒ *diaphor.* ʒj.

⊖ *volat. succin.* ʒʒ.

myrrh. elect.

fl. benzoës ana gr. v.

Laud. op. gr. ij. M.

CXIV. *Tussis stomachalis.*

Similia fere in forma pilulari præscripti ve-
tulæ, tussi & catarrho fere universali
scor-

nocturnæ & hinc diurnæ cum rigore interdum obvenirent molestæ cum alvi suppressione.

Die XVII. Maji.

℞. *Arcan. duplic.* ʒß.

Magist. Corall. c. f. citr. ʒj. M. pro 2. dosibus.

℞. *Arcan. duplic.* ʒij.

Antihel. Poter. ʒj. M. pro 2. dos.

℞. ʒt. ʒij.

Antihel. Poter. ʒj. M. pro 2. dos.

℞. ʒt.

Arcan. dupl. ana ʒß.

ʒ *diaph. gr.* viij. M. repetatur crebrius.

℞. *Passul. min. laxativ.* ʒij. D. capiat sæpius.

Cum nihilominus ardores paroxysantes eradicari nequirent, quin nocturni præsertim persisterent adhuc, ipsæque simul conquerebatur de dolore intenso, simulque tumore insigni in hypochondrio sinistro, quæ a calcitracione sub verberatione acceperat; ob id ad eradicandum fomitem primarum viarum, cum reliqua symptomata coindicarent

℞. *Syr. nicot.* ʒj.

▽ *menth.* ʒß. M.

℞. *Petrol. alb.* ʒß. D. pro hypochondrio.

Multa evacuavit, varia, mucosa supra & infra, licet subinde recurrerent.

Die XXX.

℞. ▽ *cherefol.*

hyssop. ana ʒiß.

Syr. card. ben. ʒvj.

succ. rub. idæi ʒj.

ʒ *diaphor.* ʒj.

~ ʒ *dulc. parum.* M.

Die XI. Junii

℞. ▽ *acetos.*

plantag.

menthæ ana ʒj.

cinam. ʒß.

✚ *vini* ʒvj.

Corall. rubr. ʒj.

ocul. ʒ. ppt. gr. xv.

Syr. plantag. ʒj. M.

Sed a vomitu isto cepit alvus pertinaciter claudi, quæcunque laxantia, passulata, gummata, sine fructu hauriebat, clysmata stimulantia, ʒlia, ex oleis incassum adhibebantur, aut enim retinebantur penitus, etiam suppositoria, aut sine ulla permiscela excernebantur iterum. Ita in re penitus desperata, abdomine indurato, & tumido, simulque admodum doloroso existente.

Die XIV. Junii

℞. ▽ *menth.* ʒj.

ʒ *amygd. dulc.* ʒvj.

ʒ *vivi bene purgati* ʒij. Hausit sine alteratione.

Die XV. Junii

Tom. II. Pars 2.

℞. ▽ *menth.* ʒiß.

ʒ *vivi purgat.* ʒij.

▽ *cinam.* ʒij. M. Vesperti

℞. *Decoct. fl. chamom.* ʒij.

▽ *benedict.* ʒij.

⊕ *gemin.* ʒj. M. pro clysmate, sed omnia frustra.

Die XVI. Junii potio hæc Mercurialis hausta, sed frustra. A Meridie

℞. ▽ *menth.* ʒj.

cinam. ʒß.

Syr. ros. solut. ʒvj.

ʒ *viv. purgat.* ʒv. M. hausit: Externe

℞. *Axung. anser.* ʒij. D. Inungat abdomen.

Die XVII. Junii.

℞. *Lact. bubul.* ʒvij.

Terebinth. invitell. ov. dissol. ʒß.

⊕ *tart.* ʒij. M. pro clysmate pro 2. vic.

Potio ʒlis proxima denuo præscripta; hausta mane, & iterum de novo hausta vesperti, ita ut jam ʒij. medicinales ʒii in corpore haberet, unde & varios motus in corpore perciperet, sed alvus clausa manebat. Unde etiam eodem die infusus ordinatus.

℞. *Herb. & flor. chamomill.* Mvj.

malv. recent. Mij.

Flor. sambuc. Mij.

Baccar. lauri ʒij. M. Coquantur, continuando interea semper litum abdominis cum axungia anserina.

Die XIIIX. eadem ordinabantur, item clysmata; ʒ semper pertinaciter in corpore manebat.

Die XIX. & XX. eadem; hoc tempore dolebat collum, intumescebant gingivæ, vacillabant dentes, & ex ʒ vivo retento salivatio supervenire incipiebat, unde pro faucibus & collo leniendis

℞. *Mell. rosac.* ʒj.

Syr. violar. ʒß. M.

Pro abdomine

℞. *Ungu. de arthanit.* ʒj.

ʒ *diacolocynth. Querc.* ʒij. M. inungatur abdomen.

Die XXI. Junii cum eadem adhuc persisterent, & ultra octiduum ita ʒ vivus in eadem hæreret, pro fecibus duris & tumore in colo hypochondrii sinistri emolliendis simul

℞. *Empl. de Cicuta.*

G. ✚ in ✚ solut. ana q. f. Malax. c. f. q. ʒ tart. destill. inducantur super alutam. D.

Die XXII. Junii.

℞. *Decoct. spec. emoll.* ʒix.

⊕ *Ciner. clavell.* ʒij.

Mell. depurat. ʒij. M. pro clysmate reiterato. His & similibus factum est, ut pedetentim solveretur alvus, scybalis lapidis instar induratis, prodeunte simul successive ʒio vivo, in pauca licet una vice quantitate; ob id pro faucibus:

[Aaa]

℞. *Syr.*

℞. *Syr. viol.* ʒiʒ.

Mucilag. tragacanth. ʒʒ. M. repetatur subinde, Prodit sic pedetentim & clysmatis & unguentis dictis adjutus, donec die xxix. Junii noctu ex improvise lectum copioso xio vivo repletum, observaret; unde pro alvo aperta servanda & xio ulterius eliciendo, fauces adhuc graviter affligente Die III. Julii

℞. *Lact vaccin.* ℥ij.

mell. ros. ʒiv.

Θ *ciner. clavell.* ʒʒ. M. pro clysmate. Sed cum adhuc xii superessent vestigia,

℞. ʒ *bezoard. Sennert.* ʒj.

bezoard. Or. ʒʒ. M. Vomitus copiosa materiae viscidæ creberrimus supervenit.

℞. *Rad. helen.* ʒij.

fenic. ʒiʒ.

Coqu. in ℥ijʒ. ∇ *com.* ad casum pollicis; Colatura D. unde sudor secutus copiosus, & facies prodeuntes magis quam alias splendentes, a xio prodierunt, & ita reliquum, quod superfuit xii eliminatum fuit: cepit etiam semper aliquid foliorum auri.

CXVII. *Diarrhæa infantis. Febris ardens.*

INfans febre ardenti cum diarrhæa gravi torminosa & gravissimis deliriis affectus, malum contraxerat ex præcedente mala diæta, speciatim ex potu continuo **Brenhan Scherpn**; forsitan aliquid contagii supervenerat: Excreta erant liquida, intense flava, subviridescencia, & cum sonitu ejiciebantur, subindeque grumulenta apparebant. Fluxum ergo colliquativum ex acri alcalino fermento & febrem malignam ex eadem causa suspicabar; appetitus plane nullus, aliis quibusdam præmissis:

℞. *C. C. f. Δ* ʒj.

∇ *sigill.*

ʒ *diaphor.* ana ʒʒ. M. pro 2. dosibus in Vino capiendis.

℞. ∇ *fl. sambuc.* ʒijj.

cinam. ʒʒ.

✱ *vini* ʒvj.

diascord. Fracast. ʒiʒ.

∇ *sigill.* gr. xv.

ʒ *diaphor.* ʒʒ.

Syr. card. bened. ʒʒ. M. Melius exinde habuit.

℞. *Troch. de Carab.* ʒj.

Magist. Corall. c. f. citr. gr. vj. M. capiat in Vino.

Bene profuit: Externe propter dolorem:

℞. *Theriac.* ʒij.

∞ *dest. macer.* ʒj.

chamom. ʒʒ. M. illinant scrobiculo cordis & regioni umbilicali. Sed cum

nihilominus omnia symptomata in pejus recrudescerent, in metu dysentericæ:

℞. *Troch. de Carab.* ʒj.

Magist. Corall. c. f. citr.

ʒ *hepat. viper.* ana gr. xij. M. pro 2. dosibus in vino Rhenano capiendis. Item ad alcali acre figendum & convulsiones præcavendas:

℞. *Troch. de Carab.* ʒj.

Bezoard. Min. ʒʒ.

Cinnab. ʒ gr. vj. M. pro 2. dosibus in Vino capiendis. Item

℞. ʒ *diaphor.* ʒj.

bezoard. min.

Crystall. ppt. ana ʒʒ.

Laud. ferment. gr. j. M. pro 2. dosibus. Item ℞. *Troch. de Carab.* ʒj.

bezoard. Or. gr. iv.

∞ *gr. vj.* M. pro 2. dosibus.

Tandem ad figendum melius; cum æstus urgeret, excretiones vero remitterent, cum impetu tamen flatuoso adhuc emitterentur:

℞. ∞ *dulc. anticol.* ʒij. D. gutt. xv. in haustu cerevisiæ quater in die.

CXIX. *Epilepsia. Purpura. Hypochondriacum malum.*

Puerperæ alias hypochondriacæ & epilepsiis internis & exinde externis obnoxia cum purpuræ eruptione: Post potionem ex seminibus cum myrrha dedi

℞. ∇ *succ. pæon.*

fl. sambuc. ana ʒiʒ.

ʒ *secundin.* ʒij.

Syr. rub. id. ʒvj. M. Item

℞. ∇ *fl. sambuc.*

card. bened. ana ʒiʒ.

ʒ *secund.* ʒj.

borrac. Venet. ʒij.

Syr. rub. idæi ʒvj. M. Ad laxandam alvum ordinata fuit potio passulata anti-hypochondriaca cum euphoria. Cum Paroxysmus spasmodicus rediret, cum gravi agitatione & violento subsultu in hypochondrio sinistro:

℞. *Laud. hyst.* gr. v.

Extr. castor. gr. iij.

myrrh. cl. gr. iv.

c. f. q. essent. croci. F. Pilulæ acceptæ cum euphoria, & cum gravis ac copiosus sequeretur sudor, purpura eo copiosius prorupit. Hinc

℞. ∇ *fl. sambuc.*

card. bened. ana ʒij.

℞ ʒ ʒij.

Θ ʒj.

Syr. rub. id. ʒj. M. Capiat subinde pro lubitu. Hinc

℞. ℞ *℥l. & Zwelfferi* ʒijj. D. 40. gutt. pro dosi:

dosi: Hæc & alvum laxam servavit, & hypochondriaca pathemata refranavit. Item

℞. *Rtart.* ʒij.

ʒ ʒi. M. 40. guttæ.

Cum ex iracundia redire vellet Paroxysmus, atque jam delirium adesset:

℞. *card. bened.*

fl. sambuc.

puleg.

ceras. nigr. ana ʒi.

cord. Herc. Sax.

meliss. c. vino ana ʒvj.

matr. perl. ppt. ʒij.

bezoard. ʒr.

ʒl. ana ʒi.

Syr. meliss.

card. bened. ana ʒi. M.

Item pro capite roborando:

℞. *Bl. cephal.* ʒi. D. 30. gutt. in vehiculo calido: Alio tempore: ●

℞. *succ. pæon.*

ceras. nigr. ana ʒij.

Cranii hum. ppt. ʒij.

dent. hippopot. ppt.

Unicorn. ver. ana ʒi.

Syr. papav. alb. ʒvj. M.

CXIX. *Febris petechialis. Hemorrhagiarium.*

PUella febri petechiali graviter correpta cum jam efflorescerent copiosæ petechiæ, gravi & pertinaciter corripitur narium hæmorrhagia, pro qua sistenda iussu capere duos bufones vivos, quos contusos seu conquisitos sub axillis utrinque applicet, cum linteo, quo facto subito omnis hæmorrhagia sedata fuit, & puella ex continuato usu Electuarii ex conserva pulpæ citri cum theriaca convaleuit. Sed brevi post cum stomachum nimis onerasset alimentis, gravissimæ anxietates præcordiorum & æstus intensissimus recurrebant; hinc iussu, ut vomeret usu Syrupi emetici, & dictum Electuarium aliquandiu continuaret, & sic denuo convaleuit.

CXX. *Purpura alba. Urinæ suppressio.*

PUerpera 6. ad 7. dierum æstu & virium debilitate cum imminente purpura alba & urinæ suppressione conflictata

℞. *fl. sambuc.*

card. bened. ana ʒiʒ.

C. C. f. Δ ʒʒ.

ʒ *diaph.* ʒi.

bezoard. Min. gr. xij.

Syr. card. bened. ʒʒ. M. capiat cochleatim, pro lubitu; æstum compescuit, sudores movit, purpuram expulit largiter.

℞. *Ungu. alth.* ʒij.

ʒo *scorpion.* ʒi.

philos. ʒʒ. M. Illinatur pubi, quod

Tom. II. Pars 2.

urinam probe fluere fecit, sed postmodum frustra, ita ut ad biduum nihil urinæ amplius conspexerit; Lochiis adhuc moderate tinctis fluentibus. Hinc

℞. *Sem. violar. purpur.* ʒij.

C. f. q. *alkekengi & fl. sambuc.*

F. Emulsio, adde

C. C. f. Δ ʒi.

ʒ *diaphor.* gr. xv. Edulcor. parum M.

Hujus usu & sudor permansit, & alvus aperta fuit, & lochia cruenta de novo fluxerunt, & largiter & postmodum recte profluxit.

CXXI. *Partus difficilis. Lochia suppressa. Purpura alba.*

IN difficillimo partu aliquot dierum pro doloribus nothis sed frustraneis sedandis

℞. *menth.*

artemis. ana ʒvj.

cinam. ʒij.

~ *zedoar.* ʒiʒ.

magist. corall. c. f. citr. ʒʒ.

Syr. papav. ʒij. M. hausit subinde, sed levamen medioere: Hinc

℞. *Borrac. Venet.* gr. xv.

myrrh. gr. iix.

cinam. gr. vj. M. capiat in haustulo

vini: exinde dolores omnes parturientis remiserunt; ipsa fuit quieta facta, a sella puerperi surgit, lectum petit, sed interruptim quiescit. Cum vero altero die dolores repperent gemini

℞. *matricar.* ʒij.

cinam. ʒʒ.

borrac. venet. ʒʒ.

myrrh. ʒi.

~ *vol. succin.* ʒʒ.

Syr. Canell. ʒij. M. pro duabus dosibus: sed frustra.

℞. *Ungu. dialth.* ʒʒ.

ʒo *dest. succini* ʒi. M. Inungatur abdomeni; sed frustra. Hinc

℞. *lil. albor.*

puleg. ana ʒi.

~ *fulig.* ʒij.

ʒ *secund. ppt.* ʒi.

Syr. de canell. ʒiʒ. M. pro 2. dos. frustra.

Tandem maximo licet, & summo cum conatu parit: Post partum 4. dierum & 5. noctium lassata continuo æstu & gravissima siti corripitur: Hinc

℞. *fl. sambuc.*

card. bened. ana ʒiʒ.

C. C. f. Δ

ʒ *diaph.* ana ʒi.

bezoard. min. gr. xv.

Syr. rub. id. ʒvj.

~ *dulc.* ʒi. M. capiat cochleatim.

[Aaa 2]

Mitiga-

Mitigabantur nonnihil symptomata, sed cum lochia non rite fluere, & non obscure metuerem lationem variam circa genitalia, cum & urinam retinere non posset, sed hæc insensibiliter proflueret

℞. ∇ *puleg.*
fl. sambuc. ana \mathfrak{z} ss.

✚ *ini* \mathfrak{z} vi.
ocul. 3. *pulv.* \mathfrak{z} ij.
bezoard. min. \mathfrak{z} j.
myrrh. el. \mathfrak{z} ss.

Syr. artemis. \mathfrak{z} ss. M. capiat cochleatim sapius pro lubitu. Factum cum euphoria, & aliquoties reiteratum: sed quarto die supervenit purpura alba: Hinc

℞. C. C. *f. Δ* \mathfrak{z} ss.
 \mathfrak{z} *diaph.*
bezoard. min. ana \mathfrak{z} ss.

myrrh. gr. \mathfrak{v} j. M. pro 2. dos. cum euphoria, interdum gelatinam C. C. immittebat potui; quin & ob urgentem sitim interdum serum lactis depuratum probe potabat, absque ulla sensibili noxa: pulvis aliquoties reiteratus.

CXXII. *Asthma convulsivum. Podagra.*

Vir crebrius arthriticus Mense Septembri sensim incipit affligi dolore acuto, rodente, & misere vellicante, in anteriore pectoris regione, apparenter in imo sterni loco, adeoque exacte in præcordiis. Cum cessaret dolor, supererat summa virium prostratio, cum anhelitu celeri, parvo, crebro, ita ut erectus sedere & respirare cogeretur; sed insensibiliter evanescabant hæc omnia; sed redibant omni nocturno tempore; interdum bene se habebat, vespere vero & ingruente nocte redibat Paroxysmus, hora circiter 9. aut 10. interdum citius: continuabat ita per noctem, usque ad matutinam 4. vel 5. tunc insensibiliter & pedetentim omnia denuo evanescabant. Varium erat malum, nunc gravius nunc levius, nunc diutius, nunc brevius durabat; interdum & leviter licet interdum affligebat, sed raro: cum aliquandiu ita hoc malo fuisset conflictatus, Podagra supervenit, unde istud malum in præcordiis cessavit, & aliquandiu, cum etiam dolor podagricus sensim remitteret, satis bene habebat, sed cum data occasione gravi iracundia fuisset percitus, idem malum circa præcordia æque atrociter ac antea rediit, aliquandiu duravit, donec etiam pedetentim evanesceret. Inter varia usurpata præ cæteris proficua fuere

℞. \sim Θ * \mathfrak{z} ss. D. 50. gutt. bis in die.

℞. *Ruephrit.*

\sim Θ * ana \mathfrak{z} ij. M. D. eodem modo.

℞. *Gelatin. C. C. rec.* \mathfrak{z} ss. D. Hæc in statu Paroxysmi dabatur, & cum maxime urgeret malum; subinde levamen afferebat.

℞. *G. Tacamah.* \mathfrak{q} . *f. Malax.* \mathfrak{c} . *f. q.* \mathfrak{z} o *tart. dest.* inducatur super alutam, applicetur loco antè affecto, cum aliquali euphoria: Item ingruente Paroxysmo:

℞. C. C. *f. Δ* \mathfrak{z} ss.

Mithridat. \mathfrak{z} j. M. propinetur in Vino, & hoc non raro Paroxysmi levamen attulit. Tandem pulvis laxativus ex *tart. Glato* cum scammon. & troch. Alhandal. copiose satis evacuando contulit.

Sed haud diuturna quies; subsequente enim anno mala eadem redeunt, i. e. interdum bene se habet, edit, bibit, laborat, noctu vero ingruente, dum corpus reponit asthmaticus Paroxysmus pedetentim supervenit, hinc nisi suffocari vult, lecto exilire, fenestras aperire, & ita liberiores auras capere cogitur: durat hoc usque ad 1. vel 2. horam a media nocte; tunc enim successive malum remittit, ita ut circa tertiam horam lectum repetere, & usque in altum diem dormire, si velit, possit; tentata varia, omnia absque fructu, præ cæteris opiata palliando nonnihil malum aliquid profecerunt, v. g. Mithridatii vespertinus usus, vel

℞. Θ * *anis.* \mathfrak{z} ss.

Ess. Opii \mathfrak{z} ss. M. dosis 40. guttæ à cœna, hæc si usurpata fuerunt, malum levarent, non eradicarunt; sed cum ultra annum spatium ita conflictatus fuisset, supervenit autumnali tempore podagra & gonagra, eaque admodum vehemens, hinc omnia præfata symptomata penitus cessant, ipse per aliquot septimanas quietus, in quantum tamen dolores permittebant, in lecto jacebat, die & nocte dormiens quocunque tempore illud dolores permitterent; nullum asthma, nullum priorum malorum vestigium; sed cum per aliquot septimanas podagra in statu fuisset, remittente sensim malo, redeunt antiqua pathemata, dolor rodens circa inferiores sterni partes, anxietas circa istum locum, & suffocatio nocturna imminens. Certum ergo est 1) pathemata illa esse convulsiva, 2) eadem a podagræ occasione oriri, 3) podagram vix esse ullibi adeo fixam, quæ non sit mobilis, & ex uno loco in alium transportabilis.

CXXIII. *Ira.*

Intricatus & difficilis erat morbus viri ex iracundia in corpore antea cacochymico excitatus; in quo & pulsus varie & inordinate intermittens, appetitus prostratus, alvi in principio crebrior solutio, summa virium prostratio, in progressu morbi sudores imprimis circa caput cum superveniente gravi æstu, faucium squalore & tremore & con-

& convulsiva artuum agitatione; variis tentatis præ cæteris profuerunt remedia ex gelatina C. C. cum Antihectico Poterii, item Julebus flor. rosarum cum $\sim \frac{1}{4}$, qui crebrius repetitus fuit, assumptus præsertim ingruente nimis æstu, & cum his tandem $\sim \Theta$ *bis quotidie capiendo.

CXXIV. *Cruditæ acida.*

Virgo laborabat tussi sicca inordinate recurrente, mensibus non adeo ordinatis, paucis, lentis, vix intra 8. septimanas profluentibus, atrophiam incipiente; color faciei floridus peribat, tormina abdominis contorsiva tum menstruationis, tum alio tempore urgebant, præsertim post acidorum usum, appetitus erat bonus.

Est affectus complicatus, oriundus ex cruditate acida & hinc nata pituita vitrea: Hinc & vomitu arte provocato talia copiosa fuerunt rejecta. Data est R. Θ l. Θ Zwelfferi $\frac{3}{4}$ ß. aliquandiu continuetur: Hinc Vomitorium; item Extr. Θ cum succo pomorum ad 30. gutt. mane. Hinc

R. MPil. de * Θ j.

Castor. gr. v.

$\frac{1}{2}$ Θ lat. gr. vj.

Extr. troch. Alhand. gr. ij.

c. f. q. \circ dest. terebinth. F. Pilulæ.

Hiscæ aliquandiu continuatis & subinde repetitis

R. Bals. Δ terebinth.

anis. ana $\frac{3}{4}$ j.

\circ dest. succini $\frac{3}{4}$ ß. M. D. xij. guttæ mane.

CXXV. *Coryza. Tussis Epidemica. Febris Catarrhalis.*

Ratione coryzæ optime contulit inunctio frequens narium cum balsamo apoplectico l. \circ dest. anisi præservative & curativè. Ratione verò tussis opium eandem præcavit, & ingruentem mature mitigavit. Febricula catarrhalis levabatur per sudorem.

R. ∇ scabios. $\frac{3}{4}$ j.

Liqu. C. C. succin. $\frac{3}{4}$ j.

Ess. opii $\frac{3}{4}$ ß.

Syr. scabios. $\frac{3}{4}$ j. M. Capiat vesperi

stomacho fere vacuo, & expectetur sudor: alias in incremento tussis cum adhuc vespertina & nocturna & fere sicca esset:

R. ∇ scabios. $\frac{3}{4}$ j.

asthmat. $\frac{3}{4}$ j.

Syr. pap. alb. vel diacod. $\frac{3}{4}$ j. M.

addebatur interdum & $\sim \Theta$ * anisatus. In statu morbi vero & cum viscida collecta rejicienda essent:

R. ∇ Hyssop. $\frac{3}{4}$ j.

asthmat. $\frac{3}{4}$ ß.

\sim G. * cum Θ $\frac{3}{4}$ j.

Syr. nicot. $\frac{3}{4}$ ß. M. Item succus raphani recens cum saccharo.

CXXVI. *Das Webethun.*

Æ Gri conqueruntur

1. De difficili respiratione, quasi cingulum costas succingeret.

2. De repletionem præcordiorum.

3. Subinde hypochondriorum tumor flatulentus supervenit.

4. Corpus incurvare nequeunt, sed quasi palus dorsum occupat.

5. Tandem æstus & phlogoses superveniunt, interdum crebriores.

6. Subinde vagæ præcordiorum anxietates, sudores frigidi imminentes Syncopes adsunt, imprimis in malo confirmato.

7. Interdum si subluxatio sit nonnihil inferior, simul de anxiosa abdominis tensione conqueruntur.

R. Ocul. Θ præp. $\frac{3}{4}$ j.

$\frac{3}{4}$ diaphor. $\frac{3}{4}$ ß. M. pro 2. dos. capiendis in cochleari \dagger . expectando sudorem.

R. Grapp. ebulliat in \dagger . decoctum capiatur calide, expectet sudorem.

R. $\sim \Theta$ * $\frac{3}{4}$ j. D. 40. guttæ.

R. Arcan. Duplic. $\frac{3}{4}$ j.

$\frac{3}{4}$ diaphor. $\frac{3}{4}$ ß. M. in æstu.

R. Ocul. Θ præp. $\frac{3}{4}$ j.

Zz. $\frac{3}{4}$ ß. M. D. sæpius.

R. ∇ papav. rhocad. $\frac{3}{4}$ j.

Maxill. luc. pisc. $\frac{3}{4}$ ß.

$\frac{3}{4}$ diaph. $\frac{3}{4}$ j.

Θ volat. maxill. luc. pisc. $\frac{3}{4}$ ß.

Syr. papav. alb. $\frac{3}{4}$ j. M.

R. Liqu. ∇ fol. $\frac{3}{4}$ ß. D.

R. R Θ l. Θ Zwelffer. $\frac{3}{4}$ ß. D.

R. Petrol. alb. $\frac{3}{4}$ j. D. Externe & spinæ locum dolentem & præcordia ac hypochondria inungat.

R. Tacamahac. q. f. Malax. c. bals. Peruv. F. Emplastrum, imponatur lumbis, ubi dolor, vel alia impedimenta, vel regioni præcordiorum ad angustias mitigandas.

R. \circ lumbric. ∇ str. $\frac{3}{4}$ j.

petrol. alb. $\frac{3}{4}$ j.

Chamomill. $\frac{3}{4}$ ß.

dest. cumin.

juniper. ana. $\frac{3}{4}$ j. M.

CXXVII. *Erysipelas scorbuticum.*

Viro Erysipilate scorbutico laboranti præscripti:

R. C. C. f. Δ $\frac{3}{4}$ j.

$\frac{3}{4}$ diaphor.

Θ Card Ben. ana $\frac{3}{4}$ ß. M. pro 2. dos.

Externe ramenta corticis sambuci exterioris & interioris cum creta applicabat: postmodum

R. ∇ Camphor. $\frac{3}{4}$ j.

$\sim \Theta$ * anis. $\frac{3}{4}$ ß.

sambuc. $\frac{3}{4}$ j. quo calide ter vel quater de die locus affectus illinebatur: Hinc interne

[Aaa] 3

R. R

℞. R 3ij.

Eff. myrrh.

— Cochlear. ana 3j. M. Dosis 40.
guttæ ter in die.

CXXIIX. *Gonorrhœa virulenta. Præputii Fissura & Tumor.*

IN Studioſo gonorrhœa virulenta laborante cum alia nil proficerent, quia inveteratum erat malum:

℞. *Bals. Copaivæ* 3ij. Dosis 5. guttæ bis in die: cuius uſu demum convaluit: Item

℞. *Bals. 4 terebinth.* 3ij.

Copaivæ 3j. M. Dosis 12. vel 15. guttæ. Pro ſiſſuris autem & tumore præputii

℞. *Unguent. diapomph.* 3ß.

ad 4 p. d. 3j. M.

CXXIX. *Variole.*

STudioſus, juvenis, robuſtus, bilioſus, plethoricus &c. Die Mercurii à meridie inſigni refrigeratione corporis corripitur, nox inquieta, mane inſignis ardor, facies rubet, oculi ſulgent, ſitis intenditur, eſt anxius, vomit ſubinde &c. Die 4 à meridie vocatus venam ſecare permitto; hinc pro 2. doſibus potionem theriacalem præſcribo: primam vomitu mox rejicit, alteram retinuit: ſed mane inſequente aliquot vomitus recurunt; æſtus, anxietas, materiæ viſcidæ reſectio: ſitis clamorosa intenditur. Hinc

Die 2

℞. ① 8t 3ij.

bezoard. min. 3j.

Camphor gr. iv. M. pro 2. doſib.

Primam vomitu rejicit, comite muco, alteram à meridie retinuit; ſed ſymptomata intenduntur, bibit Conventum: Hinc

℞. C. C. f. Δ 3j.

bezoard. min. 3j.

③ *volat.* C. C. gr. vi.

Laud. op. ferment. gr. iß. pro 2.

Doſibus poſt coenam & mediam noctem ſumendis. Ordinatus ſimul julebus ex inſuſione ſorum; nox bona, mane melius ſe habuit, largiter ſudavit. &c.

Die 5

℞. C. C. f. Δ 3ß.

bezoard. min. gr. xvj.

③ *volat.* C. C. gr. vj. M. pro 2. doſ.

Mucus copioſus obſidebat fauces, pro quo eluendo & Chirurgus gargarizando & ipſe Cereviſia ſecundaria ſibi eluendo ſuccurrebat. Veſperi

℞. C. C. f. Δ 3j.

bezoard. min. 3ß.

Laud. op. gr. ß. M. Nox bona, ſudat largiter.

Die ⑥ apparentibus minutulis puſtulis

℞. C. C. f. Δ 3ß.

bezoard. min.

④ *ſigill.* ana gr. iix.

myrrhæ cl. gr. vj. M.

Item veſperi

℞. C. C. f. Δ gr. xv.

bezoard. ② gr. ix.

③ *volat.* C. C. gr. iv.

Laud. op. gr. ß. M. Copioſe hinc inde prorumpere incipiebant, ægro continuo ſudante.

Die 7

℞. *Eff. myrrh.* 3ij. Doſ. 40. gutt. bis in

Die. Veſperi

℞. C. C. f. Δ 3ß.

④ *diaph.*

myrrh. ana gr. iix.

③ *volat.* C. C. gr. iij.

Laud. ferm. gr. ß. M. capiat hora ſomni.

Id quod ſemper ob noctes quietas & ſudationes repetitum fuit, cum euphoria.

Die 8

℞. C. C. f. Δ 3ß.

myrrh.

bezoard. min. ana gr. vj. M. pro doſ.

Veſperi pro nocte

℞. ⑦ *ſcabios.* 3j.

Eff. myrrh. 3ß.

C. C. f. Δ 3j.

bezoard. min. 3ß.

Laud. ferm. gr. ß.

Syr. Card. Ben. 3ij. M.

Die 9 eadem.

Die 10 pro ſuppuratione promovenda:

℞. *Ocul. ⑤ præp.* 3ß.

C. C. f. Δ 3j.

③ *Card. Ben.* gr. viij. M. pro 3. doſ.

Veſperi

℞. ⑦ *ſcabios.* 3vj.

Ocul. ⑤ præp. 3ß.

myrrh. gr. vj.

③ *Card. Ben.* gr. ij.

Laud. op. gr. ß.

Syr. ſcabios. 3iß. M.

Quibus ita convaluit. In fine Pilulæ Extr. panchymag. cum 8 dulc. ordinatæ.

CXXX. *Aſthma humidum. Tuſſis.*

Aſthma humidum materiæ copioſæ viſcidæ cum tuſſi gravi, anxietatibus recurrentibus &c. à mucilagine ſtomachum occupante in ſcœmina curatum fuit:

1.) Per ſuccum raphani, qui optime profuit.

2.) ℞. ⑦ *hyſſop.* 3ij.

aſthmat. 3ß.

G. * in 4 ſolut. 3ij.

Syr. nicot. 3ß. M. Egregie reſolvit & 5. copioſas ſedes eſſecit.

3.) Propter anxietates periodice ex ſtomacho

cho quasi recurrente: *R. ~ Carmin. de trib. ʒß. D. 30. guttæ.* Bene contulit; dum anxietates omnes sustulit.

4.) Propter excoriationem & inflammationem inguinum ex urina cum tussi semper profluente, dolorosam & periculosam:

R. Mucilag. sem. psyllii cydonior ana ʒij.

lapid. calamin. præpar.

sacchar. ʒ

ceruss. lotæ

tutia præpar. ana ʒi.

camphor. gr. xvj M. pro unguento.

egregie profuit. Conf. oblerv. Plateri p. 221.

CXXXI. *Febris ardens.*

Viro febre ardente laboranti præscripsi:

R. ʒ fontan. ʒß.

rub. idæi ʒij.

R fl. bellid. ʒij.

Gelat. C. C. rec. ʒij.

Syr. rub. idæi ʒvj. M. pro Julebo reſectivo.

R. C. C. f. Δ ʒß.

Bezoard. Min. ʒj.

Θ volat. C. C. gr. vj.

Laud. op. gr. ij. M. pro 2. doſibus nocturnis. Item

R. pulv. bezoard. Mich. gr. xv.

Θ volat. C. C.

viper. ana gr. ij. M.

Unde ſudoribus ſpontaneis tantum non diſſuebat:

In ſtatu morbi & cum peſſime ſe haberet, veſperi:

R. ʒ rubi idæi ʒij.

cinnam. ʒß.

Gelat. C. C. rec. ʒj.

Bezoard. Or. gr. xv.

Conf. Alchem. ʒj. M. egregie profuit.

CXXXII. *Splenis vitium. Epilepſia.*

Virgo ſplenetica, hinc nonnihil melancholica, tempore ſomni epileptica nonnihil, annorum 13.

R. pulv. Epil. ʒl. gr. iijß. Capiat ſub introitu lecti. Præmiſi vero R ʒl. Zwelfſeri ʒß. Doſ. ʒß. - ʒj. Item

R. ʒ ʒlat. gr. xv.

Scammon. ʒt. gr. ij.

Troch. Alhand. gr. j. M.

Item Vomitoria ex Syrupo Emetico. His ita promiſcue præmiſſis & paroxyſmo ſedato, pro ſplene

R. Liqu. ʒ Or. ʒß. D. 20. guttæ.

R. Empl. de ranis c. ʒ Malax. c. f. q. ʒo deſt. ʒ fætid. applicetur regioni ſplenis cum euphoria.

CXXXIII. *Scorbutus.*

PUero 5. annorum ſcorbutico præſcripi:

R. R tart. ʒiß

ʒ ʒß. M.

R. ʒ menth. ʒij.

Syr. emet. gr. iix. M.

R. ʒ dulc. gr. vj.

Conſerv. roſ. ʒj. M.

R. R ʒl. ʒ Zwelfſer. ʒß. D. 20. guttæ bis in Die.

R. Arcan. duplic. ʒj.

Ebor. f. Δ ʒj. M. pro 3. Doſibus.

R. Eſſ. myrrh. c. ~ Θ par. ʒij.*

~ cochlear. ʒj. M. doſ. 20. gutt.

R. ʒ menth. ʒß.

*G. * in + ſol. gr. iix.*

tart. ʒlat. gr. iv.

Scamm.

troch. Alhand. ana gr. ʒ. M.

Tandem Elix. Propr. f. +d. aliquoties in ſeptimana fuit propinatum.

CXXXIV. *Menſium Suppreſſio. Icterus. Tumor pedum œdematoſus.*

Fœmina menſium obſtructione ultra 9. menſes laborans (vitium contraxerat ex uſu carnis ſuillæ fumo indurata, & acetarii tempore fluxus largiori) hinc icterica facta cum tumore pedum œdematoſo inſigni, appetentia dejecta, anguſtiis præcordiorum & dolore ſtomachi enormi compreſſivo.

Dedi primum Diſſeſtivum ex tart. ʒlat. & Θ abſinthii, à cujus uſu repetito crebriores alvi dejectiones paſſa fuit, croceas, non ſecus ac ſi remedium laxativum aſſumiſſet; nam & alvus continuo fluida erat. Hinc Vomitorium ʒle; cujus uſu copioſa viſcida rejecit. Tum

R. Θ ʒ compoſ. ʒij. Capiat per 3. Dies.

Dein potio ex gummatibus propinabatur, Θ iſtud ʒ comp. in præcordiorum anguſtia & dolore ſtomachi compreſſivo erat optimum.

R. ʒ hamatit.

Θ ʒ Comp. ana ʒß. M. pro 3. doſ. matutinis.

R. ~ Θ ʒij. D. 30. gutt. à meridie & ſub introitu lecti. Continuentur iſti pulveſes aliquandiu, & cum ~ Θ* miſcendam juſſi Rm. nephriticam. Tandem melius ſucceſſit*

R. Chelidon. major. ʒij.

Hb. ſabin. ʒj.

bacc. junip. ʒiß.

paſſul. min. ʒj.

Coqu. in. f. q. ʒ ferrar. Capiantur bis in Die, mane & veſperi bonus hauſtus; potus hic optime contulit, & icterum curando & œdemata crurum: unde aliquoties de novo repe.

repetitus & reiteratus fuit. Cum ergo in totum restituta esset, quod mensium fluxus adhuc sileret:

℞. *bacc. lauri.* ʒj.
myrrh. ʒß.

Croci ʒi. M. Capiat omni mane de hoc pulvere largam dosin. Sed nec borax omittenda fuisset.

CXXXV. *Cardialgia. Scorbutus.*

Fœmina per tres menses gravis corripitur intensissimo dolore circa spinam dorsi in regione stomacho opposita, eoque compressivo, lancinante ad scapulas usque ascendente cum gravi omnium assumptorum vomitu; putabam esse cardialgiam, junctam cum aliquali vertebrarum subluxatione.

℞. *Empl. matricar. de galb.*

G. tacamah. ana q. s. malaxet. c. bals. peruviano, & applicetur regioni dorsi dolenti: bene profuit.

℞. ∇ *chærefol.* ʒij.
✱ *vini* ʒß.
ocul. ʒ ppt. ʒi.
Land. ferment. gr. j.

Syr. artemis. ʒij. M. capiat cochleatim: omnia sic parata. Sed die tertio ex improvise crudelissime redeunt isti dolores &c. Hinc

℞. R ʒi.

Ess. opii ʒi. M. Cepit ter frustra. Hinc Vesperi.

℞. *Ruephrit.* ʒi.

Ess. opii ʒi. M. Cepit, unde aliquale levamen sensit. Sed in summis angustiis oculorum ʒ pulverem assumpsit: unde dolores remittunt; sed tunc abdomen occupare incipiunt, tandem pedetentim quiescunt. Sed tertio abhinc die iterum recrudescent, & ita tertianorum typum repræsentant. Suspiciabar ergo, aliquid de scorbuto latere, cum urinæ simul turbidæ, rubræ, cum sedimento copioso incarnato conspicerentur, ob id

℞. R *Corall. antiscorb.* ʒij. D. 40. guttæ pro dosi: hujus repetito usu non redierunt symptomata, & ipsa convaluit.

CXXXVI. *Asthma. Tumor pedum oedematosis.*

Eine Frau hatte bisher kurzen Athem gehabt / wenn sie ein wenig gegangen war / das Gesicht ward roth / und war ihr alsdann ihr die Brust vorne zu eng wäre / wenn sie nun wieder ruhig ist / verziehet sich es wieder. Einmahl kömte ihr jehling in der Nacht / da sie gang aussenbleibt / und cum celeri, parva, frequenti respiratione keine Luft hohlen kan / und wolte alle Augenblicke ersticken. Ingruebant mala hæc sine sensibili causâ externa,

remittebant paroxysmi sine materiæ rejectione: *wiewohl sie extra paroxysmum etwas auswirft.* Vocatus ergo mane in isto paroxysmo:

℞. ∇ *hyssop.* ʒij.
asthmat. ʒß.

~ Θ * ʒß.

Syr. hyssop. ʒij. M. Capiat cochleatim: cum sensibili levamine. In ipso paroxysmo habuerat dejectionem liquidam, quasi laxativam, a qua melius habuerat; unde vesperi ordino clystera, quod parum tamen profuit; portionem continuare jussi, cujus usu optime habuit. Hinc

℞. ~ Θ * ʒij.

anis. ʒi. M. 40. guttæ ter: cum levamine. Sed cum ab isto paroxysmo tertia die commode haberet, & mediocrem scalam ascendisset, nocte insequente omnia exasperantur, sed usus istus portionis omne malum sustulit; ast sine expectoratione: præsertim quando dejectio aliqua liquida superveniret, mox melius habuit. Hinc præscripsi MPil. de * *Quercet.* cum parvo stimulo: harum usu vomuit mucosâ & aliquoties per secesum evacuata fuit, continuando spiritum.

Malum remisit insigniter, non tamen semper tuta fuit ægra, quin subinde recidivam plus minus intensam pateretur: ob id pro usu domestico

℞. ∇ *asthmat.* ʒß.

~ Θ * ʒi. M. Hoc pro lubitu in vehiculo ∇ scabiosæ, quoties paroxysmus urgeret, capiebat, cum levamine; Sed cum ne sic quidem penitus tolleretur malum,

℞. *Bals. terebinth.* ʒij. Capiat x guttulas in vehiculo cerevisiæ calido mane, frigido à meridie: idque aliquandiu continuavit. Hujus usu cepit copiosâ admodum mucosâ rejicere per sputa & os, mane & tota die, ne sic tamen penitus cessantibus paroxysmis, unde noctu præsertim præfatum spiritum subinde repetere necesse habuit.

Paulò post dicta mala omnia atrocissime redeunt, omni nocte sub introitu lecti; dum paulatim declinavit, redit paroxysmus gravissimus, quo tenduntur præcordia, hinc occultum spasmus in corpore pati videbatur. Declinat paroxysmus ingruntè mane, sub fine tussis crebra & laboriosa cum aliquali mucî rejectione supervenit:

℞. ∇ *hyssop.* ʒij.
asthmat. ʒß.

~ Θ * ʒi.

Syr. nicot. ʒvj. M. Capiat cochleatim: modice profuit. Hinc

℞. ∇ *scabios.*
hyssop. ana ʒi.
asthmat. ʒß.

Liquor. C. C. succin. ʒi.

Syr.

Syr. nicot. 3ß.

emet. 3ß. M. S. Rösende Mixtur:

parum profuit.

Cum alvus pertinaciter esset clausa:

R. Passul. min. laxat. 3vj.

Tart. Bl. 3ß.

Scamm. 4t. gr. ij. M. profuerunt egregie, mox insequabatur bona. Hinc aliquot diebus interjectis

R. Arcan. dupl. 3ß.

Corall. rubr. præp. 3j. M. pro 2. dosibus. Nil profecit.

R. MPil. de Ammoniac. Querc. gr. xvi.

q. dulc. gr. xij.

Scamm. 4t. gr. j.

Extr. troch. Alband. gr. 3.

c. f. q. Ess. fumar. F. Pilulæ S. Parier-

Pillen / optime profuerunt: Nox insequens bona. Hinc imposterum omni vespera sub introitu lecti hora x. capiat præservationis gratia:

R. Tart. acris 3iß.

Ess. op. 3ß. M. Dos. 40. guttæ in haustulo cerevisiæ: quoties hoc assumebat, toties levissima patiebatur Paroxysmi vestigia, somno bono insequente, & ipsa melius se habente; sed cum 14. post dies aliquando studio huius usum intermitteret, repetiit crudelis Paroxysmus, cum verò eandem reiteraret tincturam, Paroxysmus non apparuit.

Cum vero pedum circa talos superveniret tumor mali ominis

R. R. c. succ. pom. 3iij.

Ess. asthmat. 3ij.

~ Cochlear. 3j. M. 40. guttæ pro dosi.

Mane & a meridie Item

R. Elix. propr. f. 4d. 3ij.

Tart. acris 3iß. M. 30. guttæ pro dosi.

Item

R. Elix. Propr. f. 4d.

~ 0 * anis. ana 3iijß. M. dos. gutt. 40. mane; & vesperi semper usum opiatae tincturæ continuando.

R. Extr. helleb. nigr. gr. xiv.

q. dulc. gr. xij.

Scamm. 4t. gr. j.

Extr. troch. Alband gr. 3.

c. f. q. Ess. castor. F. Pilulæ; a quarum usu bis vomuit, sponte cum euphoria, & aliquoties per secessum laxata fuit; unde & illa vespera Essentiæ illius opiatae usum intermisit, & placidam noctem experta est, quod alias nunquam factum, quin potius, quoties tentandi gratia usum illius intermitteret, toties gravi Paroxysmo nocturno affligeretur. Hinc

R. Elix. Propr. f. 4d.

~ 0 * anis. ana 3iijß. M. Dos. omni mane 40. guttæ, & sub introitu lecti, data est tinctura opiata: Inustus etiam fuit, ne quid

Tom. II. Pars 2.

intentatum relinqueretur, fonticulus in brachio sinistro.

Curiosum erat, quod nullos odores perferre posset, quin potius, quocunque odore sensibilibiter offenderetur, ita ut etiam odorem bacillorum fumigerorum perferre non posset, cum & horum odore mox angustiam præcordiorum & suffocationis imminens periculum experiretur; unde suavi odorem castorei subinde naribus admotum, quo ipso nonnihil recreabatur, semper autem de loco spiritum intercipientem rogata, cincturam diaphragmatis ostendebat, ibi imprimis constringi se, & anteriora pectoris occupari & angustari asserbat: aliquando commode satis per plures dies se habuerat, sed vesperi pediluvium ex decocto florum chamomilla & serpilli parat, cuius usu mire offendebar, ita ut insequente nocte gravem pateretur Paroxysmum, vix sequente die integro sopiendum, dubio casu, an pediluvium qua tale, an vero potius suavitas odoris magis eam offenderit, quod posterius probabilius existimo: Hinc

R. Elix. Uterin. Croll. 3ij. Dos. 30. guttæ, omni mane, vesperi Opiatum continuando. Sed haud adeo commode hoc ferre poterat, quin post aliquot dierum usum illud omittendum fuit; adeoque

R. ~ 0 * anis. 3iij. D. 40. guttæ: omni mane; sed sub introitu lecti

R. ~ 0 * anis. 3iijß.

Ess. opii 3ß. Dos. 30. guttæ. Horum usu continuato per aliquot septimanas, repetitis etiam illis pilulis, sed absque vomitu operantibus, utcunque satis bene habuit. Aliquando cum his præscripsi:

R. Empl. de nicot. p. ij.

G. * in 4 sol. p. j. Malax. c. f. q. 0 cappar. Inducantur super alutam, applicentur hypochondrio sinistro; huius usu anxietates præcordiales cum inde dependentibus symptomatibus remiserunt, sed respiratio difficilis adhuc urgebat, adeo ut repetentes anxietates non satis explicabiles per opiata, item per emplastrum auferrentur: Sed dum adhuc difficilis, indeque crebra & parva urgeret nonnihil respiratio, præscripsi Electuarium ex sinapi cum ficibus, mihi alias usitatum; sed absque effectu aut alteratione ulla, quin potius absoluto hoc electuario, nescio qua occasione, Die x. Martii vesperi gravis Paroxysmus asthmaticus ex improvviso supervenerit, cum consuetis, sed jam per aliquot septimanas non expertis anxietatibus, durabat integram noctem, & tota sequente die, ob id a meridie vocatus

R. Ebor. f. 4

Corall. rubr. ppt. ana gr. vij.

q. Epil. 8l. gr. jß. M.

[Bbb]

Hujus

Hujus usu intra 1² horæ spatium mitigatus fuit insigniter Paroxysmus, & per bihorium & ultra satis quietam se gessit; sed brevi post eadem molestia redire visæ sunt, pro quibus debellandis sub introitu lecti eundem pulverem assumpsit; Hinc brevi post omnia mitigata fuerunt, & nox moderata fuit.

Sequenti die ordinavi passulas minores laxativas, unde semel bene evacuata fuit; sub introitu vero lecti cum ipsum denuo assumpsit pulverem, & exinde quietissimam & optimam noctem habuit, sine anxietate & respirationis difficultate: item altero abhinc die denuo pulverem hunc sub lecti introitu assumpsit, & placide per binas vel ternas horas dormivit, evigilans tota madore copioso undique perfusa fuit. Sed cum post aliquot dierum cursum denuo pessime haberet, speciatim ex anhelitus difficultate, & abdominis anxiiis molestiis, etiamsi hætenus omni vespera opiatum liquidum atque adeo per plures septimanas continuasset, ob id ad convulsivam respirationis interceptionem respiciens dedi pulveris visci Corylini ʒi. bis, cujus usu mane & a meridie assumpti, utut post quemlibet ejus usum gravem & anxiam circa præcordia & diaphragma perciperet alterationem, optime habuit, respirationis difficultas remissit, optime per noctem dormivit; altero die iterandum pulverem & partem ejus unam a meridie capere jussi, sed minus levabat. Ordinavi ob abdominis ingruentia Symptomata pilulas gles, sed saltem dimidiata dosi, unde ter copiosissime sine ullo gravamine laxata fuit; sed mediocriter exinde habuit, pedibus successive ad genua usque intumescens, quin etiam procedente sensum ulterius intumescens etiamsi urinæ sufficientem quantitatem emitteret, tandem moriebatur quasi hydropica.

CXXXVII. *Melancholia hypochondriaca.*

PUella 7. annorum incidit in affectum, quem pro Melancholia hypochondriaca habebam; nam & mater ejus huic obnoxia fuerat. Extra lectum quidem morabatur, sed appetitus penitus erat prostratus, mox a meridie gravi æstu corripiebatur, qui per noctem fere usque ad diluculum durabat, & sine sudore terminabatur, ipsa interdiu mœsta, tristis, mœrens & apparenter debilitata erat, pulsus continuo febrilis, sitis intensa, etiam noctu eadem torquebatur, labiis tunc aridis, & siccis existentibus; appetente vespera circa horam quartam dormire incipiebat, profunde admodum, & quietè, sed noctu somnus erat inquietus, loquebatur varia, delira, subinde plorabat admodum, excitata & interrogata, quare? nesciebat, &

hæc ita quotidie per plures dies fiebant; Remedia erant: Liqueur. ʒ. sol. tart. ʒss. pro dosi bis quotidie per 3. dies continuatus, hinc Syrupus emeticus ʒss, qui tamen solum per inferiora laxabat, hinc Liqueur. ʒ. ʒ. 5. guttæ bis in die, mane in vehiculo calido, a meridie in frigido, per plures dies: simul hypochondrio sinistro Emplastrum de Nicotiana admovebatur; Hæc optime contulerunt, unde Syrupus Emeticus tunc vomitum inferente ipsa denuo evasit, & Cura sic absoluta fuit.

CXXXIIX. *Asthma. Vomitus.*

FOEmina conqueritur primario de asthma, ita ut sub aliquot passuum motu mox penitus suffocanda videatur; Tussis nulla aderat, & parum viscidissimi, sed raro, idque matutino saltem tempore rejiciebat, ex stomachi scilicet cruditate natum; Asthma erat siccum, dicebat enim: *Der Achem werde ihr zu kurz/ als wenn vorne alles zugeschnüret wäre:* appetitus penitus deficiebat, quicquid comedebat, sapore non consueto erat infectum. Cerevisiam quamcunque horrebat, Coentum summo cum desiderio deglutiebat, sitis erat continua, præsertim antemeridiano tempore: gustus intense amarus continuo linguam occupabat; alvus clausa, minus, nisi stimulata officium faciebat, somnus plane nullus, per plures septimanas, etiam sine manifesta causa: Noctu magis affligebat respiratio, & molestissima præcordiorum anxietas; Pedes torpidi, difficulter mobiles, graves, semper fere frigidi, urina crudissima, pallida, tenuis.

Die 25. Aprilis

℞. *Passul. min. laxat.* ʒss.

Tart. Glut. gr. xv. M.

Die 26.

℞. *menth.* ʒi.

asthmat. ʒij.

*G. * in ʒ. sol.* ʒi.

tart. Glut. ʒss.

Scamm. ʒt.

Extr. troch. Alhand. gr. j.

Syr. pomor. ʒiij. M.

Die 27. & 28.

℞. *Arcan. dupl.* ʒij.

absinth. gr. vi.

spec. diatr. piper. ʒi.

Socest. anis. gr. ij. M. pro 2. dos.

Die 29.

℞. *Passul. min. laxat.* ʒv.

Arcan. dupl. gr. xij.

Extr. troch. Alb. gr. ij. M. Copiose

evacuavunt.

Die 2. Maji.

℞. *carmin.* ʒij.

Liqu. C. C. succin. ʒi. M. 40. guttæ quater in die.

℞. *Empl.*

R. *Empl. de Tacamah. Malax. c. balsa-*
mo Peruv. Sed hæc omnia frustra.

Die 3. seqq.

R. *Bals. terebinth.*

anis. ana ʒj. M. 15. gut. in vehic.

R. *∇ Cord. Herc. Sax.*

scabios. ana ʒj.

asthmat.

Syr. nicot. ana ʒʒ. M. Continuavit
per plures dies balsamum, cum aliquali eu-
phoria. Subinde vesperi Rm opii cum ana
Ess. theriacal. propinavi, sed fere frustra

D. 6. simul cum dictis:

R. *Herb. absinth.*

menth.

spec. carmin. ana Mj.

⊖ *Ciner. clavell.* ʒij.

Coqu. in f. q. *∇ simpl.*

Colat. ʒix. adde

Elect. hier. c. agar. ʒj.

Syr. emet. ʒʒ.

M. F. Clysma pro 2. dof.

Continuavit simul *Elix. Propr. & balsam.* Δ

D. 7. R. *Elix. Uterin. Croll.* ʒij. Dof.
30. gutt. bis in die, frustra.

D. 8. & seqq. radicem ari recentem minu-
tim incisam bis vel ter cepit quotidie.

Tandem D. 12. Vomitorium & Clysma
præscriptum est, quod mucum mediocre
evacuavit.

Die 14.

R. *Arcan. duplic.* gr. xv.

⊖ *absinth.* gr. iij.

Extr. troch. Alband. gr. ij. M. Copio-
sa, varia, mirabilia excrevit cum admiratione
omnium.

D. 15. vesperi pro symptomatibus mitigandis

R. *Cinnab. & ʒʒ.*

Laud. hyft. gr. v. cum balsamo Peruv.

F. Pilulæ pro 2. dof. sed nulla quies; Circa me-
diam noctem crebra tussis fatigavit pectus;
Hora 3. vero superveniunt vomitus continui,
cum summo conatu, viscida ejicit, hincque
quælibet assumpta: Durarunt hi conatus usque
ad x. vespertinam sequentis diei: aderant simul
leves convulsiones brachiorum & digitorum,
& insomnium declinans mox quasi perterrefa-
cta expergiscebatur: pro quibus vomitibus
sistendis

R. *∇ menth.* ʒij.

succ. cydon. ʒj.

~ *Theriac. campb.* ʒij.

Syr. pap. alb. ʒij. M. sic sistebatur
pedetentim vomitus

D. 17. seqq.

R. ~ ⊖ * *anis.* ʒʒ. 40. guttæ in Cerevi-
sia quater de die capiat. Hujus usu primo dol-
ebat brachium sinistrum, sed noctes sequentes
erant quietiores, cum aliquot horarum
somno. Urina cocta & tincta sanorum similis

Tom. II. Pars 2.

reddebatur; copiosa purpura in collo, brachiis
& trunco efflorescebat, admodum pruriens,
vellicans, & lancinans, cum omnium sympto-
matum remissione, ita ut & rediret appetitus,
& extra lectum utut debilis aliquandiu com-
morari potuerit. Sic morbus in declinatione
esse videbatur.

Sed dum aliquot diebus interjectis nihil
ominus superiores præter spem redirent an-
xietates, superiora revocare remedia consul-
tum arbitratum fuit.

D. 26. Pulvis superior laxativus ordinatus
fuit, qui aliquoties, nec tamen tantum, nec
toties evacuavit. Die 27.

R. *Cinnab. & ʒʒ.*

Laud. hyft. gr. v. M. pro 2. dof. Exin-
de eadem symptomata, ac supra, vomitus
nempe insignes, cum violento conatu, con-
vulsiones capitiscum collo, ita ut caput quie-
tum continere, nec jacens nec se erigens pos-
set: quin successivis vicibus nunc in dextrum,
nunc in sinistrum latus violenter contorque-
retur, & insignes præcordiorum angustiae
prioribus istis non æque similes adessent. Hinc

D. 28. Ordinata potio superior pro sistendo
vomitu, quæ etiam suum fecit officium, item

R. *∞ dest. lavend.*

majoran.

caryoph.

menth. ana ʒʒ.

Corp. pro bals. q. s. M. pro inungenda
nucha & scrobiculo cordis.

D. 29. pro viribus

R. *R Corall. c. ~ Cord. Cerv.* ʒij.

~ *Carmin.* ʒʒ. M. pro 3. dof.

Sed cum cordis dolores & angustiae acerbissi-
me eam assiligerent:

R. *∇ menth.*

ceras. nigr. ana ʒvj.

~ *theriacal.* ʒij.

Ess. bals. Peruv. ʒj.

Syr. fl. tunic. ʒij. M. capiat cochlea-
tim.

Item ordinatum fuit vesicatorium am-
plum in nucha. Sed aliquot abhinc dieb⁹ mors.

Ex Casus historia & variis supervenienti-
bus Symptomatis judicavi, esse asthma con-
vulsivum, natum ex principio nervi interco-
stalis & paris vagi p. n. affecto, adeoque a se-
ro acri vellicato, cujus ad peripheriam cor-
poris sub purpuræ facie translatio & excretio
cutanea aliqualis ipsi levamen attulit; sed
cum nihilominus fomes mali in cerebro per-
tinaciter stagnaret, concussum idem princi-
pium nervorum, & agitata materia morbosa
sub vomitus conatibus vellicando acrius istos
nervos primo difficilem respirationem, post-
modum crudeles istas cardialgias excitavit;
Confirmant hanc hypothesin 1) asthma siccū;

[Bbb 2]

2) quod

2) quod olim conquesta fuerat de dolore obscuro & in profundo occipitis. 3) quod caput continuo sudore diffunderet, reliquo corpore aut sicco aut frigido existente. Fomes mali erant cruditates primarum viarum, quibus moerore ac tristitia ob filios accedebant.

C X X X I X. *Morbus Hungaricus.*

Spasmius extremorum.

Chirurgus die 30. Maji, alias sanus Ungaris medetur febre Ungarica correptis per gargarisationes oris, sed ob foetorem, quem fauces cujusdam eructabant, nausea & tadio afficitur; hinc male habere successive incipit, donec die 3. Junii 5, circa meridiem domum redux decumbere cogitur; Conqueritur de insigni cephalalgia, aestu immenso, siti, faucium glutinositate & muco copioso, quem rejicit per os, imo cum aliquali vomendi conatu, vires erant prostratae, alvus satis fluida. Hinc vesperi post horam quartam praescribo:

℞. ∇ *menth.* 3ij.

Syr. emet. 3ß. M. S. *Brech = Safft.*

Cum crebrius vomuisset, & copiosa viscida rejecisset, simulque aliquoties alvum deposuisset, a coena praescribo:

℞. ∇ *rub. Id.* 3ij.

cinam. ~f.

~ *theriac.* ana 3ij.

succ. cydon. 3vj.

bezoard. min.

3 *diaph.* ana 3j.

Syr. pap. alb. 3vj. M.

pro 2. dosibus.

Die 4. Junii mane cum eadem urgent symptomata.

℞. ∇ *fl. sambuc.* 3ij.

cinam. 3ß.

succ. rub. id. 3j.

C. C. f. Δ 3ß.

bezoard. min. 3j.

Syr. papav. err. 3ß. M. pro 2. dos.

Appetente vespera omnia amaricabant.

℞. ∇ *fl. sambuc.* 3ij.

menth. 3j.

C. C. f. Δ 3ij.

bezoard. Or. 3ß.

Camph. gr. iv.

Syr. papav. alb. 3j.

~ *theriac. q. f.* M. pro 2. dos.

Omnia eadem, fauces liccae, aridae, ☐ fulgida, cruda.

Die 5. Junii mane

℞. ∇ *fl. sambuc.* 3j.

menth. 3ß.

C. C. f. Δ 3ß.

bezoard. Or. 3j.

Θ *volat.* C. C. gr. vj.

Camphor. gr. ij.

Syr. fl. tunic. 3ij. M. pro una dosi.

Die eodem vesperi

℞. ∇ *scorzon.* 3iß.

menth.

card. ben. ana 3ß.

C. C. f. Δ 3ij.

bezoard. Or. 3j.

Θ *volat.* C. C. 3ß.

Camphor. gr. iv.

Syr. fl. tun. 3ß. M. pro 2. dosib.

Die 6. Junii

℞. R *bezoard.* gtt. 50. mane & a meridie in haustu potus ordinarii: vesperi heri praescripta ordinata fuerunt. Die eodem cum alvus admodum fluida esset, & circa stomachi regionem admodum doleret;

℞. 30 *dest. menth.* 3j.

rut. 3ß.

macis gt. v.

stomach. Craton. 3j. M. illinatur crebrius. Die 7. omnia eadem, mane & a meridie R *bezoardica* assumeretur eodem modo. Reiterabatur etiam oleum stomachale, Potus vero ordinarii Mens. 3. instillavit:

℞. R *fl. bellid.* 3iß.

Chyff. 3j. M. A meridie cum pessime haberet, & modo dicta tinctura penitus fuisset exhausta, res desperata esse videbatur. Hinc

℞. ∇ *rub. Id.* 3ij.

C. C. f. Δ 3ij.

bezoard. Min. 3ß.

Camph. gr. iv.

Conf. Alcherm. 3j. M. pro 2. dos. his assumtis & somnus & universalis sudor per totum corpus fluvii modo erupit, cum insigni virium prostratione, sed pulsus in maiorem & tardiolem mutatione, praegressus erat sudori insignis horror, post mediam noctem.

Die 8. Junii

℞. ∇ *rub. Id.* 3ij.

C. C. f. Δ 3ß.

bezoard. Min. 3j.

Camph. gr. ij.

Conf. Alcherm. 3j. M. pro 2. dos.

Die 9. Junii cum optime haberet, a meridie dolor insignis articulos manus, cubiti, humeri & digitorum prehendit, ita ut rigidi quasi fierent, quin & spasmio quodam convelleretur maxilla inferior, & praesertim similis dolor spasmodicus colli partem posteriorem & hinc laryngem occuparet. Id quod pro bono signo habebam: Hinc

℞. ∇ *Ceras. nigr.* 3ij.

~ *theriac. camph.* 3ij.

C. C. f. Δ 3j.

Cinnab. 3 gr. xij.

Bezoard. Or. 3ß.

Conf. Alcherm. 3j.

M. pro 2. dos.

Item

Item

R. *Herb. absinth.*

menth. ana Mj.

fl. Chamom. Mij.

⊖ *Ciner. clavell.* ʒij.

Coqu. in f. q. ∇ simpl. Colat. ʒviii. adde.

Elect. hier. c. agar. ʒj.

Syr. emet. ʒi. pro clymate.

Pro larynge verò extrinsecus illinendo

R. ʒ. *Castor.*

lumbr. ʒssr. ana ʒij.

dest. succin. ʒß. M.

Hinc cum horum usu omnià symptomata remitterent,

R. ∇ *rub. Id. ci.*

menth. ana ʒi.

~ *theriac. campb.* ʒi.

C. C. f. Δ ʒi.

bezoard. Min. gr. xij.

Conf. Alcherm. ʒi. M. pro 2. dosibus.

Die 11. Junii repetita fuit eadem potio

Die 14. Junii

R. *Antihet. Poter.*

Ebor. f. Δ ana ʒß. M. Capiat vesperi.

Mane vero assumsit Elixir. Propr. gutt. xx. & ita continuando convaluit.

Sed cum gravissime appetitu urgente in diæta delinqueret, & varia ingurgitaret: Hinc recidivam Die 17. ejusdem morbi patitur, ob id

Die 18. præscripsi Vomitorium supra ordinatum, unde pluries supra, copiosa viscida cum levamine cephalalgiae rejecit: vesperi

R. ∇ *fumar.* ʒiiij.

~ *theriacal.* ʒiß.

Gelat. C. C. rec. ʒj.

bezoard. Min. ʒij.

⊖ *volat. C. C.* gr. vj.

Syr. pap. alb. ʒvj. M. pro 2. dosibus:

sudavit inde copiosius, interim viscida denuo vomuit.

Die 19. cum æstus, anxietates, cephalalgia, squalor, amarities oris & appetitus dejectus urgeret:

R. R. *fl. bellid.*

Clyff. ʒ ana ʒij. D. 50. gutt. in dimid.

Mens. Cerevisiæ.

R. ∇ *fumar.*

Card. Bened. ana ʒj.

~ *theriacal.* ʒj.

C. C. f. Δ ʒß.

Bezoard. Min. ʒj.

⊖ *volat. C. C.* gr. ij.

Syr. fl. tun. ʒiiij. M. pro 2. dosibus.

Unam cepit mane, sudavit; Melius habuit; A meridie ingens æstus hora III. rediit. Hinc

R. ∇ *fl. sambuc.* ʒj.

~ *theriac. campb.* ʒß.

C. C. f. Δ.

bezoard. Or. ana gr. xv.

Campb. gr. iiij.

Conf. Alcherm. ʒiß. M. Hæc potio cum illius adhuc superstitie medietate capiat hora 6. & media nocte: Tempora inungantur pinguedine vitulina; ex prioris usu insignes anxietates, cum delirio supervenerunt; quas solvit copiosissimus sudor, cum interrupto somno, per noctem durans, unde symptomata qualibet remiserunt, saltem quod insignis adesset virium prostratio.

Die 20. præmissa jusculo illam alteram potionis medietatem hausit: unde copiosus sudor per totum diem fluxit, meliusque longe habuit: sed summe debilitatus erat: vesperi manus & brachia, item maxillas dolor & spasmus, sicut supra, denuo occupabat: unde potiunculam ex Cinnabari & similem superiori, sed mitiorem dedi, unde melius die sequente habuit.

Reliquum Curæ absolvit

R. R. *Corall. Antiscorb.* ʒiß.

~ C. C. ʒß. M.

Dosis gutt. 30. bis in die; hujus ope copiosa purpura universum tinxit corpus, & ita convaluit.

CXL. Febris Quartana.

Mulier occasione terroris quartanâ affecta cum insigni dolore gravativo & lancinante in hypochondrio sinistro, revera splenetico circa tempus solstitii æstivi: pro Cura.

R. ʒ. *Cacheet. Hartm.* ʒj. M. pro 3. dos. pro digestivo.

Hinc imminente jam quarto paroxysmo, dedi vomitorium, & declinante paroxysmo.

R. ∇ *menth.* ʒi.

~ ⊖ * ʒß.

Syr. Card. Bened. ʒi. M.

Postmodum

R. *Liqu. Or.* ʒß. Dos. 15. guttæ bis in Die. Item pro regione splenis Emplastrum de nicotiana ordinatum fuit, & omni intermissionis die præfatus liquor fuit assumptus, quin etiam die paroxysmi, mane, à meridie verò tres horas ante paroxysmum

R. *Ocul. & pp.* ʒij.

sacchar. ʒ. gr. xiv.

Cum altera vice ante paroxysmum hic pulvis esset assumptus, non rediit febris: Unde & Emplastrum renovatum, & liquor continuatus fuit; & pulvis ante paroxysmum assumebatur, sicque evanuit febris.

CXLI. Morbilli.

Puero 2. vel 3. annorum morbillis graviter cum lenteria decumbenti præscripsi cum successu:

R. ∇ *menth.* ʒiß.

cinam.

[Bbb 3]

✚ *rosac.*

✱ *rosar.* ana ʒß.
diascord. Fracast. ʒi.
 ʒ *diaph.* gr. xv.
Syr. de jujub. ʒvj. M.

Alias ancillæ adultæ:

℞. ∇ *scorzon.*
scabios. ana ʒiß.
 ʒ *diaph.* ʒß.
 C.C. f. Δ ʒi.
 Θ *vol. viper.* gr. xv.
camphor. gr. vj.
Syr. flor. calend. ʒi. M. pro ʒ. dof.

CXLII. Diarrhœa.

Infans 1½ anni diarrhœa cum æstu & excretis nonnihil sanguinolentis corripiebatur:

℞. *pulv. hepat. viper.* gr. xvj.
 ☞ *sigill.*
rad. torment. ana ʒß.
Theriaca gr. ij. M. pro 2. dosibus.

Capit in vehiculo sequente:

℞. ∇ *plantag.* ʒi.
menth. ʒß.
cinnam. ʒi.
 ~ *theriac.* ʒij.
Syr papav. alb. ʒi. M.

Item

℞. ∇ *plantag.* ʒi.
menth. ʒß.
succ. cydon. ʒüj.
Troch. de Carabe.
 ʒ *tormentill.* ana ʒi.
Syr. plantag. ʒij. M.
 ℞. *Pulv. rad. tormentill.* ʒi.
 ☞ *sigill.*
magist. Corall. c. succ. citr. ana gr. vj.
Theriaca gr. ij. M. pro 2. dosibus.

Potus erat cerevisia, cui panis cum nucce Moschata affricus erat infusus.

CXLIII. Febris tertiana intermittens scorbutica cum oculorum dolore.

Vir corripiebatur febre tertiana intermittente scorbutica, quam cum binâ vice sustinisset, die intermissionis 2. Junii ordino pulverem purgantem ex ʒ Glat. &c. qui crebrius, sed sine levamine purgavit. Nam insequente Die 3. Junii eadem paroxysmi ferocia: Hoc singulare erat in eo. 1.) quod urinæ fuerint obscure rubræ, quasi sanguine essent tinctæ, sed ad latus adspectæ tenues sine contentis, albidus apparebat liquor, non ergo erat sanguis, qui prodibat. 2.) Dum paroxysmus urgeret, gravissimi dolores crurum cum corripiebant, in regione tibiarum, ut exinde misere ejularer, sed evanescente paroxysmo & dolores hi penitus remittebant; eo die intermissionis nihil sen-

riente; Post aliquot paroxysmos die 7. ordino ~ Θ * c. die intermissionis capiendum, cum vero semper ante paroxysmum per horas 3. vel 4. gravissimas anxietates præcordiorum sentiret, Die 8. Junii ante paroxysmum ordino vomitorium blandum; cuius usu & omnes anxietates remiserunt, & paroxysmus non rediit hac nocte. Sed Die 9. oculus sinister inflammatus cum intenso dolore conspicitur; Die 10. nocte hora II. redit paroxysmus cum frigore & æstu insigni stipatus, dolor crurum medioris, vel nullus; oculus mane etiam dexter admodum inflammatus & acerbè dolens conspicitur; Ob id vocato Chirurgo utrinque vesicas in nucha excitandas jubeo, quibus copiosè plorantibus Die 12. Junii nocte, cum expectaretur denuo paroxysmus, nullus rediit, saltem appetente mane æstus per aliquot horas mediocris, hinc & sudor, sed nullus rigor vel horror, nullus dolor, mediante scilicet vesica his ita evanescentibus.

Die 14. Junii à meridie hora 4ta gravissimi dolores oculorum redeunt, nocte insequente cessantes, supervenit appetente mane paroxysmus levis.

Die 16. hora V. vespertina denuo oculi acerbè dolent, usque ad mediam noctem & appetente mane redit paroxysmus.

Die 18. ut præcaverentur dolores oculorum, jussi acciperet sinapi semen, hocque contundat & cum S. V. irrorando in forma puliculæ carpis applicet utrisque pro Revulsione: cuius usu factum, ut nulli dolores percepti fuerint nocte sequente, & mane paroxysmus exilis denuo rediret. Sed cum medio sinapis oculorum affectus ante paroxysmum cessarent, factum fuit, ut hinc post paroxysmum iidem redirent, ob id semper mane & vesperi sinapis applicandos jussi, quorum usu non amplius redierunt oculorum pathemata, internis vero fixis pedetentim febris evanuit.

Oculis alias ipsis adhibita fuerunt 1.) mistura cum Gl. ʒ & hæc nihil contulit. 2.) Applicatus liquor ex Onis frusto in albumine agitato aliquandiu contulit. Optimum fuit Collyrium ex mucilagine sem. cydon. mistum cum Turia & cum penicillo oculis applicatum, & isti hoc ipso ita elati, ut & liquor infusionis vitri ʒ cum ∇ fœniculi.

In hoc casu notabile est

1.) Doloris tibiarum extinctio superveniente oculorum affectu.

2.) ~ Θ * usus oculis debilioribus noxius.

3.) Vesicatoriorum usus pro intermittentibus compescendis.

4.) Naturæ motus & imperus in oculis tam ante quam post paroxysmos, isque per sinapismum delusus.

5.) Quam

5.) Quam salubre remedium sit vomitorium, si præcordiorum anxietates pluribus horis ante paroxysmum urgeant, ut pro his sedandis præmittatur Vomitorium.

CXLIV. *Lochiorum Suppressio.*

Puerpera secundo à partu die gravi terrore percussa, subito intensissimum corporis æstus cum gravi cephalalgia, lochiorum maximam partem suppressione, mammarum tumescencia & post 4. vel 5. horas incipiente delirio incurrit: Hinc ante omnia venam in pede aperiendam iussi, licet esset hora ix. vespertina, & simul ordinavi:

R. C. C. f. Δ 3ß.

ß diaph. 3j.

myrrh. 3ß.

Θ volut. C. C. gr. vj. M. pro 2. dos. vesperi & appetente diluculo sumendis. Mane sequente cum melius haberet, ordinatum ob alvi symptomata clyisma cum euphoria & interne

R. C. C. f. Δ 3j.

bezoard. Min. gr. xij.

Θ absinth. gr. vj. M. pro 2. dos. Vesperi similia fere, hinc altero mane satis commode habet; pulsus licet admodum febrili adhuc existente.

Quibus & similibus adhibitis tandem convaluit; in declinatione tam Elixire proprietat. quam Ess. myrrhæ cum R. ♀ frequenter usæ fuit.

CXLV. *Nephriticum malum.*

Fœmina nephritica alias conqueritur de appetitu prostrato cum carnis nausea, & potus consueti fastidio; accedunt post mensium absolutum fluxum acerbi dolores in lumbis lancinantes, ad pubem usque excurrentes, cum tremore crurum, tali, qui alias parturientibus sub enixus labore frequentes esse solent, & nil aliud nisi mucosa, viscida, glutinosa cum dolore summo excernit, & quidem semper cum urina, ita ut quoties urinam emitteret, mucosum tale quid excernat; Stimulus pro urina admodum est frequens, dum excernit, dolorem istum percipit, & etiam dum non excernit, subinde crebrius istos excretorios decurrentes experitur conatus: Urina est minus tincta, aliquantisper turbida, cum sedimento copioso, albido, mucaginoso, non purulento, sed huic fere affini.

Judico malum esse nephriticum, ortum primitus occasione calculi renalis, & inde natæ rosionis in pelvi membranacea, unde malum ulterius progressum & læsit & excoriat aliquatenus vel saltem affricu suo vel etiam ob urinæ acrimoniam vesicæ collum, quo factum fuit, ut harum partium degene-

rans nutrimentum has turbas dederit. Ob id

R. ▽ chærefol.

hyssop. ana 3ß.

+ vini 3vj.

ocul. 3 præp. 3j.

Laud. op. ferment. gr. iij.

Syr. heder. terrestr. 3vj. M. capiat

cochlearim, cum euphoria, maximam partem malum dorsi inde levatum fuit; hinc pro reliquis evellendis

R. Pil. de Terebinth. 3ij. pro 2. dos.

Cepit, bene habuit; Sed enixus vesicæ interdum rediit, utut mucosa materia multo imminueretur: Hinc pro progressu morbi, ne forsan exulceratio in collo vesicæ superveneret:

R. Ess. hyperic. 3ij. D. pro 4. dosibus.

Hujus usum nullam percepit alterationem, nam etsi symptomata cessarint, conatus tamen enitendi adhuc vesicam vexabant, licet non adeo intense, urina adhuc turbida, pallida, cum mucos, licet non adeo copiosa prodit, ob id balsamo 4 terebinthinato uti jubeo: sed antequam hoc faceret, calculus oblongus cum urina ejicitur; unde levamen insigne in symptomatibus percepit, tribus abhinc diebus cum continuatus esset usus terebinthinæ, alius adhuc sed minor prodiit, post cujus excretionem adhuc mucos aliquantulum rejectum fuit, sed quod brevi cessavit: Unde omnia cætera symptomata remiserunt, nisi quod sitis continua & appetitus prostratus & speciatim carnis fastidium adhuc urgeret: Pro reliquiis ergo nephriticis delendis dedi omne mane ~Θ* 30. guttas, nam hujus usu alias optime habere consueverat.

CXLVI. *Scorbutus.*

Studiosus alias hypochondriacus conqueritur de aliquali virium imbecillitate, appetitu nonnihil dejecto, &c. omni vespere à hora 3. vel 4. sentit æstum p.n. & incalescentiam febrilem totius corporis satis intensam, cui supervenit vespertina sexta dolor insignis totius occipitis & temporum, lancinans & lacerans insigniter, qui tandem occupat etiam colli posteriorem partem, & hinc utrasque scapulas, & articulationis locum humeri, fere usque ad cubitum; Dolores hi, præsertim in humeris & scapulis sunt crudeles, per noctem durantes, sub media nocte acerbissimi, omnem somnum impediētes, appetente mane sponte citra manifestam causam vel excretionem sensilem remittunt, supervenit somnus, hinc æger mane optime se habet, à meridie & sub vespere prædicta tragoedia recurrit: Omnia hæc ex lymphâ inquinamento scorbutico infecta originem ducunt. Acceperat jam quadam à Studioſo Medicina, inter alia Laud. hysterici gr. vj. in paroxysmo

xyfmo nimis urgente, unde copiosus sudor & symptomatum mitigatio superveniebat; Sed cum nihilominus pertinax malum nimis crudeliter persisteret, paucis absorbentibus ex C. C. & corall. præmissis, mane usurpavit

℞. *Ess. fumar. comp.* ℥iij.

~ *Cochlear.* ℥j. M. Dos. 40. guttæ.

A meridie vero

℞. ~ *Θ * anis.* ℥iij.

Ess. opii ℥j. M. assumantur sub introitu lecti & hora 5ta 40. gutt. Remittebant quidem omnia nonnihil, sed non curabatur; ob id cum his remediis vesicatorium in nuchæ ea parte applicui, in cujus latere dolor capitis maximè urgebat, cujus usus optime ad sanitatem plenam successit.

CXLVII. Diarrhœa.

FŒmina corripitur sine causa manifesta diarrhœa simplici, tum epidemica, cum varia multiplici phlogosi conjuncta: unde virium insignis prostratio, anxietas præcordiorum, inquietudo &c. Vesperi:

℞. *℥ diaph.*

Extr. tormentill. c. V par. ana ℥℥.

~ *figill.* ℥j.

Laud. op. ferment. gr. i℥. M. pro 2. dosibus; capiat vesperi & post mediam noctem, in vehiculo sequenti:

℞. *∇ tormentill.*

scordii ana ℥j.

~ *theriac. camph.* ℥ij.

∇ cinnam. ℥j. M. hinc cessarunt dejectiones, sed nox inquieta, absque somno fuerat. Mane

℞. *C. C. f. Δ*

bezoard. ℥l.

Extr. torment. ana ℥℥.

theriacal. gr. ij. M. Capiatur in isto vehiculo. Cessarunt fere in totum dejectiones, sed utut se cogeret, sudorem tamen nullum elicere potui: Hinc vesperi:

℞. *C. C. f. Δ*

bezoard. ℥l. ana ℥℥.

Extr. torment. gr. v.

theriac. gr. i℥. M. dormivit bene, nonnihil sudavit, mane conquerebatur de insigni circa præcordia molestia, & dolore quasi compressivo, Hinc

℞. *R. nephrit. f. ~ carmin. de Trib.* ℥ij.

Dosis 30. guttæ bis in die: passionēs hystericae supervenerant, quæ sequente mane per 3. dejectiones alvinas fuerunt levatae, unde istam Rm continuare jussi & ita sanata fuit.

CXLIX. Dysenteria.

FŒmina dysenteria epidemica correpta cum jam aliquot dies malum passa fuisset:

℞. *∇ scordii* ℥ij.

menth. ℥vi.

cinam. ℥ij.

+ *vini* ℥iij.

Theriac. ℥i℥.

℥ *diaph.* ℥℥.

Syr. papav. alb. ℥iij. M. pro 3. dosibus, sudorem expectando. Sic sedes multum defecerunt, & melius habuit: Sed cum nihilominus pathemata dolorosa dysenterica perdurarent:

℞. *Rasur. priap. cerv.* ℥j.

Extr. torment cum V. ℥℥.

Laud. hyſt. gr. ix. M. pro 2. dosibus; unde cessarunt ista pathemata, sed genus nervosum à Laudano affectum erat, & fluxus menstruus supervenit: Sequentē die pro confirmanda cura

℞. *Ras. priap. cerv.* ℥i℥.

Extr. torment. ℥℥.

Lap. & præp. ℥j. M. pro 3. dosibus, quarum primam cepit, sed male habuit, in abdomine mire vexata, ob id laudanum hyſtericum ad gr. vi. reliquis admiscui, unde melius habuit, mensium fluxu perdurante.

Cum nihilominus contumaces perdurarent dejectiones, tormina & speciatim tenesmus graviter eam urgeret:

℞. *∇ plantag.* ℥ij.

cinnamom.

~ *theriac. camph.* ana ℥ij.

+ *vini* ℥℥.

diascord. ℥ij.

Lap. & ℥j.

℥ *diaph.* ℥℥.

Syr. myrt. ℥iij. M. Capiat subinde. Item ℞. *∇ tormentill.* ℥ij.

Cinam.

+ *vini* ana ℥ij.

diascord. ℥j.

℥ *diaph.* ℥j.

Lap. & ℥℥.

Syr. cydon. ℥℥. M. Externe jussi capere stercus columbinum, & cum + calido probe subigere, & tam abdomini insternere, quam podici applicare, & sæpius renovare; Cujus usu commode admodum habuit, & potione ista etiam symptomata maximam partem disparuerunt; unde continuata simili potione sed in minori dosi sub prætextu analeptico seu confortativo sanata fuit.

CXLIX. Dysenteria. Scorbutus.

Vlr dysenteria epidemica ex pavore aliquali correptus, cum per 6. vel 7. dies saltem diarrhœa simplici jam laborasset, successively in dysenteriam mutata, magis tamen mucosam, seu *die weiſſe Ruhr* / raro saltem cruentam; Hinc vesperi

℞. *∇ scord.*

menth. ana ℥j.

+ *vini* ℥℥.

diascord.

diascord. Fracast. 3ij.

figill. 3ß.

Syrup. parum M. pro 2. dof. Melius hinc habuit: sudavit. Altero die admodum debilis, siticulosus & anxius, verum quoties cerevisiam biberet frigidiusculam aut potiunculam, toties in continenti urgebat secessus, ad iuscula calida non item: non secus atque dum probe tectus stragulis munitus, pedibus vel abdomini operculis admotis probe cale- ret, & consequenter nonnihil sudaret, & ma- deret, toties angustiae & anxietates præcordio- rum cessabant. Simul vero atque electo sur- geret, vel pedes nudaret, &c. subito anxietati- bus præcordialibus cum sensu molestiae tor- minosæ abdominis & crebriori dejectione af- ficiebatur, unde calide & custodiendum, & calida pro potu propinanda suasi. Hinc

R. Bezoard. ℞l. 3ß.

figill. gr. xv.

C. C. ust. 3j. M. pro 2. dosibus in vehi- culo calidi iusculi gallinacei vel in vino capi- endis: Melius habuit; Utut autem opiata fre- quentius simul propinassent, tamen parcissi- mus & minime talibus vel in media dosi con- veniens seu proportionatus sequebatur somnus. Hinc

R. Ras. priap. cerv. 3j.

Laud. op. gr. ij. M. pro 2. dosibus; un- de satis commode habuit: vesperi præscripta potio ex diascordio cum lapidibus & 3 dia- phoretico. Altero die

R. C. C. f. Δ. 3ß.

Magist. Corall. c. succ. citr. 3j.

bezoard. ℞l. 3ß. M. pro 2. dosibus.

Unam mane, alteram post meridiem in vehi- culo cerevisiæ calidæ sumsit cumino probe conditæ. Vesperi vero *R. bezoard.* gutt. 50. aliquoties cum euphoria; quemadmodum & alii huic malo obnoxii in principio bis vel ter usi hac tinctura, facile evaserunt: sicut aliis Essentia theriacalis anodyna ad 40. guttas opti- me contulit.

Sed cum nihilominus quotidie ter vel quater, & noctu ter deiecere necessum habe- ret, cum paucio somno, nullo appetitu, siti tamen jam moderata, iussi capiat ovi indurati vitellum cum aceto, unde optime habuit, vesperi idem repetiit: Utut autem sic curata esset dysenteria, attamen supervenerunt vagi tumores, parvi, seu tubercula rubra, pru- rientia, præcedente quodam vellicationis sensu in cruribus, & brachiis efflorescentia, sed brevi post denuo detumescencia, nunc manus una alterave intumescibat, nunc fa- cies, nunc labia, &c. denuoque disparebant, singulis octo vel novem horis redeuntia, quæ sequebantur gravissimæ præcordiorum anxie- tates. Gedruckte ihm das Herze gang zu- sammen / und kam in den Hals / und zog

Tom. II. Pars 2.

die Gurgel zusammen / als wenn sie mit ei- nem Stricke zusammen gezogen würde / cum summa virium debilitate, & tantum non periculo mortis: judicavi omnia hæc ex scorbuto originem ducere, ob id dedi 3 dia- phor. ℞l. duas doses, quarum usu evanuerunt, aut ingruentes suppressi fuerunt præfati Paro- xysmi. Hinc

R. C. C. f. Δ. 3ß.

3 *diaph.* 3j.

bezoard. ℞l. 3ß. M. pro 2. dosibus.

Item *R. carmin. de Trib.* 3ij.

cochlear. 3j. M. 40. guttæ ca-

piantur aliquoties in die in vehiculo calido.

R. C. C. f. Δ.

3 *diaphor.* ana 3ß.

3 *absinth.* gr. vj.

3 *dest. succin.* gr. iv. M. capiat vespe- ri; Sed cum media nocte novus superveniret Paroxysmus, mane

R. C. C. f. Δ.

bezoard. ℞l. ana 3ß.

arcana. dupl. gr. xij. M. capiatur, & ho- râ post cucurbitas scarificatas, quibus alias ad- fuerus erat, No. 6. affigere iussi: quo facto li- beraliter fluxit sanguis, & copiosus prodiit su- dor: sed nihilominus pertinaciter omni hora octava revertitur Paroxysmus, utut non adeo atrox.

R. Arcan. dupl. 3j.

Cinnab. 3

3 *absinth.* ana 3ß.

Laud. op. gr. 3. M. pro 2. dosibus; Sed nondum cessantibus Paroxysmis lac bubulum usurpare iussi; cujus crebrius repetito usu ma- ximum levamen percepit, & convaluit.

C.L. *Tertiana intermittens. Scorbutus.*

V Ir tertiana intermittente correptus &c. præmissis quibusdam die 3. a meridie cepit *Elix. febril. Myns.* gutt. 40.

Die 2^a mane Elixir idem, a meridie Vo- mitorium:

R. tart. Glut. gr. xij.

Emet. gr. iij. M. vesperi instante

Paroxysmo præscripti:

R. Arcan. dupl. 3j.

3 *volat.* 3 * gr. viij.

Laud. hyst. gr. j. M. pro 2. dosibus.

Paroxysmi vero semper affligebant absque horrore, comite profuso sudore

Die 3^a *Elix. febril.* bis.

Die 4^a maneparvus extraordinarius Paro- xysmus: a meridie instabat verus, pro quo aver- tendo

R. Arcan. dupl. gr. xv.

3 *absinth.*

card. ben. ana gr. v. M.

Die 5^a ob summam debilitatem

R. card. ben. 3ij.

arcana. dupl. 3j.

[Ccc]

lap.

lap. ʒ. ʒss.

⊖ *volat. viper.* gr. vj.

℞ *cinam.* gutt. iij.

sacchari parum. M.

Ex improvise a meridie supervenit Paroxysmus, adeo ut febris esset erratica, unde suspicio scorbuti: ob id

℞. *R corall. antiscorb.*

Eff. viper. ana ʒi. M. bis vesperi capiat.

Die 2 eadem tinctura; nullus Paroxysmus; 6. dejectiones, sudor copiosus, appetitus nullus. Vesperi

℞. *rad. arinon pr.ep.*

ocul. ʒ. ana ʒss. M.

Die 5

℞. *Ebor. f. Δ ʒss.*

antibet. Poter. gr. ix. M.

A meridie Paroxysmus: Hinc

℞. *Antibet. Poter.* ʒss.

rad. aron. gr. xv. M. Capiat tempore somni.

Die 6. *Elix. febril.*

Die 7. mane litus aromaticus. Item

℞. *rad. aron.* gr. xv.

⊖ *absinth.* ʒss. M. Paroxysmi levia vestigia. Vesperi *Elixir febrile.*

Die 8 ob urinam adhuc crudam

℞. *CrySTALL. prap.*

Magist. corall. c. f. citr. ana ʒss. M.

Vesperi

℞. *Arcan. dupl.* ʒss.

Magist. Corall. c. f. citr. gr. ix. M. D.

in 2 plo, alteram dosin mane capiat. Die 9

℞. *Arcan. dupl.* ʒss.

Magist. Corall. gr. ix.

⊖ *absinth.* gr. ij. M. capiat ante Paroxysmum, qui vix apparuit. Hinc reliquum R 6. & Zwelfferi absolvit.

CLI. *Malum hypochondriacum. Colica Convulsiva.*

Vir per aliquot dies sequentibus laboravit pathematibus: Ante meridiem sanus & vegetus erat, hora vero prima præter propter a meridie dolorem obtusum, gravantem, vellicantem in hypochondrii sinistri profundo percipiebat, ex quo loco insignes dolores lacerantes & contorquentes universum abdomen cum insigni huius quasi tympanitica inflatione distendebant, unde misere affligebatur æger; dolores isti & cruciatus sursum versus ad pectoris regionem etiam protendebantur, hinc subinde vomitus superveniebat, tandem sensu & motu voluntario destitutus brachia cum digitis tendebantur, & ita cum dictis symptomatibus usque ad ingruentem noctem torquebatur; nulla febris aderant vestigia, nocte moderate dormiebat, mane commode habebat. In Paroxysmo a vomitu melius se habebat, injectum etiam fuit clystma, quod per

triplicem evacuationem in Paroxysmo bene conduxit; Vocatus E. ad eum paulo ante meridiem, dedi *Liquor. ʒ Or.* gutt. 30. Externe applicandum iussi regioni splenis empl. de nicotiana, ordinavi simul clystma, tempore, quo redit Paroxysmus injiciendum. His adhibitis nullus Paroxysmus rediit; Altero mane propinavi vomitorium, scil. *tart. emet.* ad gr. iij. & sequentibus diebus omni mane *Liquorem ʒ Orem*, & sic convaluit.

CLII. *Febris acuta.*

Infans 5. annorum occasione nimii terroris in febrem acutam cum delirio continuo, agrypnia, inquietudine, & imminentibus convulsionibus, cum præsentibus pavoribus corripiebatur: his omnibus in principio fere morbi præsentibus, sed successive magis exasperatis. In principio cum morbillos fere suspicaret,

℞. *R tart.*

Eff. myrrh. ana ʒss.

M. capiat bis in die 20. guttas. Sed cum morbus altius radicans videretur, tertia die dedi vomitorium, utut præcedentibus diebus aliquoties vomisset: quod bene per superiora saltem operatum fuit: hinc præfatis symptomatibus, delirio, jectigatione & convulsionibus nimis invalescentibus

℞. ʒ *bezoard. Mich.* gr. viij.

specif. cephal. gr. vj. M. Item

℞. *C. C. f. Δ* gr. xvj.

ʒ *diaph.* gr. viij.

ʒ *epil. ʒl.* gr. ij. M. pro 2. dosibus.

Præ cæteris optime contulit sequens:

℞. *C. C. f. Δ*

Ebor. f. Δ

ʒ *diaph.* ana gr. v.

ʒ *epil. ʒl.* gr. j. M. quod sæpius reiteratum fuit. Interjecta etiam fuerunt, ob deliria & convulsionem, & quia conquerebatur de dolore abdominis atque borborygmi subinde audiebantur, clysmata emollientia & laxantia, cum euphoria; ob vires subinde R *Corall. c. ~ cord. Cervi* ad gutt. 20. item in statu morbi crebro & permutatis cum dicto pulvere vicibus *Liquor C. C. succin.* ad gutt. 20. fuit usurpatus. Externe ob deliria fermentum pistorium cum ʒ subactum crebrius plantis pedum applicabatur, item tempora cum pinguedine crurum vituli crebrius illinebantur, &c. In declinatione universali

℞. *R tart.* ʒij.

~ ⊖ ʒj. M. D. 20. guttæ: optime profuit.

CLIII. *Phthisis. Febris male curata.*

Studiosus Noric⁹ post errores plures in diastata Vitebergæ commissos incidit in Tertianā; consulit Medicum, sed non sufficienter curatur, unde

unde Lipsiam se confert, & febris successive, utur post aliquot septimanas, levibus quibusdam domesticis usurpatis intermittit. Sed iracundia postmodum gravi affectus cœnam capit. Aliquot diebus interjectis debilitas virium summa supervenit, dejectiones liquidas habet, appetitus penitus prostrernitur, cerevisiam horret, noctes insomnes, vagæ quædam phlogosæ subinde cumprehendunt, quandoque lipothymia superveniunt, ita ut levi motu corporis aliave occasione nigredo oculis observari, hinc extremorum frigus & lipothymia supervenire soleant, idque crebrius, pulsus erat celer, frequentia & magnitudine moderatus, debilis, mollis; ipse ager emaciatus ad phthisin inclinare videbatur, cui etiam jam olim obnoxius fuerat. Urina tincta, quæ turbata sedimentum lateritium deponebat:

℞. *Arcan. duplic.* gr. xv.

C. C. f. Δ. ℥i.

℞o *dest. macis* gr. iv. M. pro 2. dosib. sed exinde leve levamen, nisi quod phlogosæ præsertim vespertina remitterent, cœtera omnia eodem modo: ob id respectu ad febrem habito

℞. ∇ *fl. sambuc.* ℥i℥.

menth. ℥i℥.

cinam. ℥ij.

~Θ* ℥i.

Lap. ☉. ℥i.

Syr. card. ben. ℥ij. M. Supervenit tussis sicca, molesta, præsertim noctu affligens, quæ ex omnibus indiciis stomachalis erat, ex acri, ut putabam, acido viscido ibidem vellicante, tussim, lipothymias, &c. inferente. Hinc

℞. *Rad. ari non præp.* ℥ij.

Lap. ☉. ℥i. M. pro 2. dos. vesperi & ante mediam noctem capiendis, sed absque levamine: Hinc cum phthisin metuerem, ad temperata accedendum putavi. Hinc

℞. ∇ *scabios.* ℥ij.

antihæc. *Poter.* ℥i℥.

magist. corall. c. f. citr. gr. xv.

Conf. Alcherm. ℥i. M. Sed eadem omnia. Vesperi

℞. *Antihæc.* *Poter.* gr. xv.

Lap. ☉. ℥i.

Laud. op. gr. β. M. Melius paulo mane habuit. Hinc

℞. *Elix. Propr.* ℥ij. D. gutt. 30. bis in die, mane & a meridie. Vesperi

℞. ∇ *scabios.* ℥vj.

Syr. pap. alb.

diacod. Mont. ana ℥i℥.

fl. Δ

antihæc. *Poter.* ana gr. xv. M. Capiat subinde, hoc ipso tussis mitigabatur, continuavit hæc per aliquot dies cum aliquali levamine. Tandem pro resolvendo fomite in stomacho

Tom. II. Pars 2.

℞. *R tart. acerr.*

~*anif.* ana ℥i℥. M.

Capiat 50. guttas omni mane & a meridie: Noctu vero, si opus esset, Mixturam reiteret. Successus hujus remedii fuit optimus, brevi post appetitus rediit, omnis tussis mox evanuit, lipothymia cessavit, vires redierunt, & optime hujus usu continuato vel intra biduum habuit; Omnia hæc confirmarunt, præfata symptomata, præsertim scotomias & lipothymias proxime ex ventriculo originem habuisse: remote ex intermittente male curata, & diætæ erroribus; unde cum pulsus non esset adeo parvus, sed magnitudine moderatus, urina etiam copiosum sedimentum seponeret, semper bonam spem habui; nec multum adeo de phthisi timui: Elixir Proprietatis tussim semper exasperabat, sed *R tart.* omnem leniebat, etiam si acerrima esset, & utut alcalinæ profapia, appetitum tamen revocavit.

CLIV. Tussis stomachalis.

Similis fere erat ratio cum morbo isto secundario Nobilis cujusdam, qui cum fere convalescisset a febre maligna, incurrit de novo jam plane restitutus in virium insignem prostrationem, cum tussi continua, sicca, circa scrobiculum cordis stimulante: accedebat cephalalgia, & æstus capitis particularis cum obauditione & creberrimis narium, iisque copiosissimis hæmorrhagiis, unde summa virium prostrationes, appetitus nullus, sitis continua, intensâ, imprimis mane, cerevisia lupulata bene sapiebat: Salsedinem sanguinis & lymphæ suspicabar, unde sitis & tussis stomachalis, & hæmorrhagiæ; pro his E. pulveres ex antihectico Poterii cum opio, decoctum chinæ cum passulis, & liquiritia. Præceteris contulerunt vesperi & noctu assumptæ potiones:

℞. ∇ *scabios.* ℥i.

Syr. diacod. Mont. ℥vj.

pap. alb. ℥i℥.

Antihæc. *Poter.* gr. xv.

Lap. ☉. gr. v. M. quod crebrius repetitum fuit.

Interdium in summa virium prostratione

℞. ∇ *rub. idæi.*

scabios. ana ℥i.

gelatin. C. C. ℥vj.

C. C. f. Δ ℥i.

Conf. Alcherm. ℥i℥.

R ☉ ℥i. M. capiat pro lubitu.

Tandem *R tart.* cum ~*anisi*, item ~Θ* *anif.* unâ cum istis potionibus papaverinis compleverunt; agro a continuato *R tart.* usu copiosa viscida sputo crebro rejiciente.

[Ccc 2]

CLV.

CLV. *Alvi obstructio.*

Studiosus contumaci aliquot dierum alvi obstructione laborans assumerat jam laxans aliquod seu purgans, sed frustra, causa erat abusus ~ Θ l. a quo faeces induratas suspicabar, accedebat, quam ipse accusabat, cerevisiae lupulatae alias non consuetus potus; abdomen dolebat, facile vomebat.

℞. Herb. malv.

parietar. ana Mj.

Rad. lil. albor. ʒj.

fl. chamomill. Mj.

Θ *Ciner. clavell. ʒij.*

Coq. in f. q. ∇ f. Colat. ʒix. adde

ʒo lin. ʒvj.

Elect. lenitiv. ʒij.

Θ *gemmae ʒij.* M. pro clysmate; bina vice applicando vesperi & mane. Interea

℞. Passul. min. conquass. ʒj.

Herb. malv. Mss.

rad. alth. ʒvj.

fol. seun. f. f. ʒiij.

Crem. tart. ʒiʒ.

Coqu. leniter in f. q. ∇ f. Colaturæ \mathfrak{H} iʒ.

D. capiat sedulo. Simul pro alimento jusculum quoddam pingue, item mane cerevisiam calidam butyro probe pinguefactam capiat. Sed cum hæc essent irrita, medietatem clysmatis ante meridiem adhuc applicare iussi, unde a meridie secessus secutus est, quare pro stimulo

℞. Herb. menth. Mij.

absinth. Mss.

rad. pyrethri ʒʒ.

pulp. colocynth. in pet. ligat. ʒj.

Θ *Ciner. clavell. ʒiij.*

Coqu. in f. q. ∇ f. Colat. ʒix. adde

Elect. hier. cum agar. ʒʒ.

mell. Mercurial. ʒj. M. applicetur calide.

℞. Pingued. anser. ʒij.

Ungu. de arthanit. ʒj.

ʒo colocynth. Querc. ʒiij. M. Illinat totum abdomen, hinc copiosum secessum habuit, cum euphoria. Hisque continuatis convaluit.

CLVI. *Febris tertiana duplex.*

Vir febre intermittente quasi lenta de typo tertianæ duplicatae affligebatur, ex læsa diæta: Paroxysmi omnes saltem affligebant cum æstu, sine ullo horroris vestigio; lente & pedetentim incipiebant, cum Cephalalgia, hypochondriorum tensione & dolore abdominis gravativo; æstus erat quoad externum tactum moderatus, pulsus non adeo vehemens, sed interiora eo magis urebantur, cerevisiam horrebat, lingua in Paroxysmo arida & squalida; biduo fere jam quædam percellus erat, alias hypochondriacus.

Die ergo Θ

℞. Corall. rubr.

arcan. duplic. ana ʒj. M. pro 2. dosibʹ.

Vesperi appetente nocte Paroxysmus unus ingruerat. Die \mathfrak{z} pulvis laxativus, ex tart. \mathfrak{G} lato &c. vesperi pulvis similis absorbens, & præcipitans; hac die Paroxysmus quasi duplex, ante & a meridie. Die \mathfrak{z}

℞. Arcan. duplic.

\mathfrak{D} \mathfrak{z} t.

Antihel. Poter. ana ʒj. M. pro 2. dosibus: Paroxysmus unus.

Die \mathfrak{z} ~ \mathfrak{D} dulcis dabatur, Paroxysmi bini, mane unus, vesperi alter, iique satis magni, sine sudore omnes terminabantur.

Die \mathfrak{H}

℞. Lap. \mathfrak{z} . præp. ʒʒ.

Θ *absinth. ʒj.*

\mathfrak{z} *diaph. ʒʒ.* M. pro 2. dosibus. Paroxysmus duplex: a meridie & vesperi.

Die \mathfrak{O} Vomitorium, quod bene & mucilaginosum evacuavit; hoc die nullum febris vestigium apparuit, noctuleves quidam insultus, cum vesperi prius assumsisset

*℞. Θ * ʒʒ.*

Antihel. Poter. gr. viij. M.

Die \mathfrak{D} cum metuerem Paroxysmum:

℞. ∇ card. ben. ʒij.

Θ * \mathfrak{z} j.

cent. min. ʒʒ.

antihel. Poter. gr. xv.

Syr. cort. aurant. ʒʒ. M. Capiat subinde cochleatim; quia & lentus & incertus erat morbi motus. Venit Paroxysmus circa meridiem ingens agro admodum anxioso existente & de gravissimo æstu conquerente, ita ut cum post aliquot horas vocarer ad eum, æstum tamen in partibus externis admodum moderatum, nec pulsus etiam febri adeo intensæ respondentem repeterim, agro nunquam adhuc gravius & cum tanto ardore ac tanta cephalalgia se laborasse affirmante: ob id ordinò ~ Θ * mox & appetente nocte ad 30. guttas sumendum; cuius primo usu intra mediam horam internus æstus tepescere, anxietates cessare, quin ad exteriora verso æstu & sudore facili crumpente Paroxysmus cessavit, & nox quietissima fuit. Continuavit integra septimana sequente hunc spiritum, & levia saltem vestigia Paroxysmorum circa meridiem vel hora secunda patiebatur, quæ usu ~ Θ * insequente sudore intra horam evanuerunt. Sed cum hoc quotidie eveniret, & \mathfrak{D} adhuc cum copioso sedimento esset,

Die \mathfrak{O}

℞. Passul. min. laxat. ʒʒ.

tart. \mathfrak{G} lat. ʒʒ.

\mathfrak{z} *Cache. Hartm. gr. vi.* M. Hac die nulla Paroxysmi vestigia, sed alvus non soluta noctem inquietam fecit.

CLVII.

CLVII. *Atrophia.*

Studiosus occasione protractarum, olim licet lucubrationum, incidebat in deficientem nutritionem, aderat simul appetitus fere penitus prostratus, dejectiones respective crebriores, liquidæ, fauces glutinosæ, vires admodum debiles, ita ut diu extra lectum subsistere non posset; corpus facile & intense frigeat, unde aut fornaci pressæ assistere, aut in lecto morari cogeatur, adeo ut calor sic dictus natus extinctus aut admodum imminutus videretur, urina cum copioso & lateritio sedimento, pulsus parvus, debilis, cæteris fere moderatus, sine hecticæ suspicionis, somnus bonus, expuebat mane viscida. Intentio erat, vim digestivam stomachi restituere, viscida incidere, & alcali oleoso bilem inertem acuire, ut provocato appetitu, & imminuto acido, exaltato vero alcali oleoso spiritali fieret melius sanguis;

℞. R \square *acerr.* ʒss. D. 25. gutt. mane jejuno stomacho in vehiculo calido.

℞. \sim Θ * *caryophyllat.* ʒss. D. 30. guttæ mox à prandio, & à cœna sub introitu lecti.

℞. *rad. ari. acris.* ʒss.

Extr. tormentill. c. S. V. ʒss. M. dosis bona cuspis cultri omni mane in calido, loco illius tincturæ, & cum his à meridie iste, modo ille spiritus. His continuatis solis convaluit, simul in pastu interdum, præsertim vespertino vitrum *Spanischen Sect* bibeat, pro stomachi robore, it: loco embammatis cum assatis & similibus succum cydoniorum recentem assumebat.

CLIX. *Tussis humida pectoralis.*

Vir-juvenis tussi humoralis pectorali gravissima laborabat, ex inclementia aëris contracta. Morbus jam aliquandiu duraverat, jam penitus decumbebat, cum tussis crebra, materiæ viscidæ copiosæ reiectione, aderat pulvis febrilis, sudor continuus, respiratio aliquo modo difficilis, dolores spinæ dorsii ingentes, urina paucissima, recurrentes interdum lipothymia, præsertim si reiectio & expectoratio nonnihil cessaret; phlogoses vagæ, *grosse Angst und Bangigkeit des Herzens / da es ans Herze kam / als wenn er icht erwürgen solte es zog in allen Gliedern nach dem Husten.* Pro tussi præscribo pro scopo expectorandi

Die \odot

℞. ∇ *fœnic.*

hyssop. ana ʒij.

asthmat. ʒj.

oxymell. squill. ʒvj. ad ʒj.

Syr. nicot. ʒvj. M.

Pro cæteris symptomatis vagis \sim car-

minat de Tribus datus est, ad 40. guttas, cujus usum summe laudavit, quemadmodum & ista potio multum evacuat.

Die 7. pro expectoratione continuanda succum raphani recentem expressum cum saccharo hauriendum, & spiritum istum continuare iussi.

Die 8. Cum mucus seu productum morbosum maximam partem esset evacuatus, & non nisi difficillima pauci mucii fieret reiectio, tussis verò continuaret, eaque ob inanem conatum dolorosa præcordiis, ad radicem corrigendam & læsionem irritantem tollendam

℞. ∇ *fœnic.* ʒij.

asthmat. ʒvj.

Syr. diacod. Mont. ʒss. M. crebrius accepit, præsertim quando tussis laboriosior instaret, bene dormivit, hanc potionem admodum laudavit.

Die 8. Cum multum tussiret, parum rejiceret, nox mala fuisset:

℞. \sim Θ * *anis.* ʒij.

Ess. opii ʒj. M. D. 40. guttæ bis in die; & sub introitu lecti. Primo quidem acrior spiritus fauces lædere visus fuit; postmodum vero usu continuato admodum profuit, tussim enim instantem mox reprimebat, humidam materiam in expectorando promovebat, & non laboriosam reddebat excretionem, unde eum aliquoties reiteravit.

Huic ipsi ex frigore aëris recidivam patienti periculosam, optime contulit sequens potio:

℞. ∇ *scabios.* ʒij.

asthmat. ʒvj.

Lap. \oplus præp. ʒj.

fl. Δ gr. xv. ad ʒj.

Syr. diacod. Mont. ʒss.

CLIX. *Tussis pectoralis. Ulcus pulmonum.*

℞. *Herb. scord.* Mj.

heder. terrestr.

fol. salv. ana Mss.

Pulveris. subigantur c. f. q. mellis

puri F. Electuarium spissum: adde

Antihet. *Poter* ʒij. M. Capiatur pro lubitu.

℞. *Rad. Chin. in taleol. incis.* ʒss.

Raf. L. saffr. ʒj.

Infund. in ∇ com. lb. v.

Macerentur in MB. per 24. horas, postea adde

Herb. Veron. Mij.

heder. ∇ stris. Mj.

sem. anis.

fœnicul. ana ʒss.

Ebulliant & Coqu. ad $\frac{1}{4}$ remanentiam:

In fine adde

[Ccc] 3

Passul.

Passul. min. conquass. ℥j.

Colat. D. omni mane capiat, expectando aliqualem madorem: omni haustui addat

℞. *Bals. Δ terebintb.* ℥ij.

℥o *dest. succin.* ℥β. M. dos. xii. guttæ.

Item

℞. *Conserv. ros.* ℥iβ.

fl. Δ

antihed. *Poter.* ana ℥β.

Lap. E. præp. ℥j.

Laud. op. gr. xij.

c. f. q. Syrup. ros. simpl. F. Electuarium. Capiat bihorio ante coenam bonam dosin. Hocque Electuarium fere quovis octiduo iteravit.

Vel

℞. *Conserv. ros.*

heder. *Æstr.* ana ℥j.

‡ *Herb. rorismar.* ℥iij.

succin. alb. præp. ℥ij.

antihed. *Poter.* vel *fl. Δ* ℥j.

Laud. op. gr. xvj.

c. f. q. Syr. diacod. Mont. F. Electuarium.

Atque hæc opiata una cum liquidis ultra 3. Menses continuavit, citra ullam vel minime sensibilem noxam. Hinc

℞. *Lign. Guajac.* ℥iij.

Corticis ejusdem.

Rad. chinæ concis. ana ℥j.

bardanæ

helenii ana ℥ij.

Herb. rorismar. ℥iij.

Bacc. juniperi ℥ij.

Incis. macerent. in lb. xij. ∇ s. per 24. horas Coqu. ad mediet. addendo in fine coctionis

sem. anis.

faenic. ana ℥β.

rad. liquirit. ℥j. Colat. D.

Capiat omni mane bonum haustum, semper aliquot guttas de superiori Essentia addendo & sudorem expectando.

Item

℞. *Terebintb. ven.* ℥β.

Mell. violac. ℥ij.

M. c. paucio vitello ovor. Capiat omni mane quantitatem castaneæ in jusculo calido.

Hæc & similia integro fere annuo spatio continuaverat, sed sine emolumento; interim nec mutabatur in pejus, nullæ hæticæ vestigia, vires satis constantes, appetitus bonus, atrophica nulla, pili firmi, saltem habitus faciei minus floridus, pallidior, & quasi nonnihil exsiccatus videbatur: Opinabar ergo, esse ulcus seu abscessum particularem, sua quasi cysti in pulmonum dextra parte inclusum, in quo equidem continuata sordium per transmutationem utilis corruptiva productio, hinc tussis stimulus & excreta præ-

sertim matutino tempore copiosa: sed in quo ipso massa sanguinea ob cystis tegmen non adeo insigniter inficiatur, neque etiam cætera pulmonum substantia ulterius erodatur: Omnibus ergo in eodem tenore perstantibus & ægro subinde aliquid levaminis, utut non diuturni ex haustu tabacini fumi percipiente, Author fui, confirmatus præsertim per Willisium in Pharm. Rat. Part. II. ubi de phthisi: ut continuaret fumi nicotianæ haustum, cui ego privatim auripigmentum permiscebam, & quem fumum omni vespere hauriebat: primo cuivis dosi tabaci, quam tubulus capiebat, & erat ℥β. addidi gr. iij. auripigmenti selecti; cepit hoc 4. vicibus, sine alteratione sensili tam in melius, quam in pejus: hinc adscendi & omni dosi tabaci addidi gr. vj. idque pro 6. vicibus: & simul præscripsi leve decoctum lignorum sudoriferum, cujus haustum calidum jussi capere post potum istius Tabaci arsenicalis, ut scilicet hujus ope sub noctis quiete sequeretur blandus sudor, quo eliminaretur hostile aliàs corpori auripigmentum: sed potus cum minus placeret, raro admodum & saltem in principio hujus curæ eum usurpavit. Assumptis illis dosibus adscendi & dedi ℥β. qualibet vice cum tabaco tanto, quantum una vice caperet, idque pro 6. vicibus: nulla exinde alteratio: dedi porro gr. xij. pro 6. vicibus, dedi etiam gr. xv. adscendi sic gradibus talibus, donec pro 6. dosibus ita ℥iβ. auripigmenti caperet, qualibet nempe vice seu dosi gr. xv. continuavit hanc dosin, quæ dimidium fere erat cum omni reliquo tabaco, quod fistulæ immittebat: nullam sensilem ex usu hoc ultra 3. septimanas ad minimum (in tota vero cura ultra 6. vel 7. septimanas consumsit,) percepit noxam, nisi quod talis fumus stuporem aliqualem dentibus induceret, & fauces nonnihil acridulo sapore sed leviter exasperaret: de cætero sanctè testari possum, me hac ipsa auripigmentali cura nullam mutationem nec in melius nec in pejus observasse, ipso ægro hoc testante, & affirmante.

CLX. *Dysuria scorbutica.*

Vir laborabat urina cruenta, & quasi purulenta, cum gravi penis circa glandem, dum excerneretur urina, dolore, stimulus ad mejendum dum crebrior, dolor in lumbo sinistro: &c. ex sero acri scorbutico eo commoto, & occasione olei dest. juniperi eo magis concitato. Præscripsi potionem cum lapidibus percarum, & cancrorum, & trochiscos de Carabe cum † sed frustra: dedi potionem lactiformem ex semine melonum, violarum, papaveris, cum lap. percarum, sed frustra:

℞. *Troch. de Carab.* ℥j.

Lap.

Lap. 3. *prep.* 3j.

fecchar. ʒ. gr. iij. M. pro 2. dof. bene contulit. Hinc dedi ʒm anaphthificam ad guttas 40. bis vel ter in die.

CLXI. *Ex Ira Symptomata varia.*

Virgo occasione gravis iracundiæ post partum brevi post agrotare cepit, pathemata erant: reperita crebrius anxietas præcordiorum, qua dicebat: *Es wolte ich das Berg abdrücken*; cum sudore circa caput frigido, interdum intenso rubescebat, interdum moribundæ instar palleſcebat, quies pauca vel nulla; crebrius repetebant hæc pathemata, præſertim vesperti & ante mediam noctem, appetitus penitus nullus, sitis mediocris, in progressu intensâ, os glutinosum, labia arida, vomitus biliosi varii subinde repetentes, secessus per alvum admodum copiosi, dolor cardialgiæ ingens, qui etiam superiorem spinæ dorsi regionem occupabat, pulsus celer, frequens, magnus, sudor rarus, urina cruda tenuis, non adeo intense tinctâ; morbus gravis & periculosus, ita ut sæpe moribunda videretur. Existimavi corruptelam alimenterum ex iracundiâ & hinc natam dyscrasiam succorum in primis visceribus, item nervum intercostalem in stomacho esse origines tot malorum: ut ut etiam in principio suspicaret de subluxatione vertebrarum dorsi, hinc eam etiam extendi curavi, & præscripsi misturam ex lap. 3. cum ʒ, sed frustra; ordinavi balsamum stomachale, mediocris usus, clyſma præscriptum, quod prima vice mediocriter, altera die copiosissime evacuavit, sed malum eodem modo contumax.

ʒj. *Corall. rubr. præp.*

arcan. dupl. ana ʒi.

antibell. Poter. ʒʒ. M. pro 2. dof.

Sed parum profuit: ordinatum emplastrum ex tacamahaca, aliquantulum sed non diu profuit.

ʒj. *Ebor. f. ʒʒ.*

Magist. Corall. c. f. citr. ʒi.

ʒi. *epil. ʒl. gr. iij.* M. pro 2. dofibus.

Omne tota die exinde habuit, inſequente die quæſita, & copioso sudore sic erumpente inſequente die eadem ordinata, sed redierunt symptomata. Hinc

R ʒʒi.

Ess. myrrh. ʒi. M. D. 40. guttæ pro dof. bis in die: commodius inde habuit. Unde

ʒj. *Carminat.*

Liqu. C. C. succin. ana ʒʒʒ. M. D. 40. guttæ, bis vel ter in die. Externe ʒʒ

acrol. ad spinæ dorsi inunxerunt. Horum cum perfecte denuo convaluit, superveniente copiosa salivæ excretionē.

CLXII. *Dolores scorbutici.*

Virgo laborabat gravi dolore humbarum in re-

gione sinistra, vicinam insimul abdominis regionem occupante, & simul etiam deorsum ad pubem nonnihil protenso, rodente, urente, noctu, imprimis post mediam noctem crudelius & tantum non intolerabiliter affligens, interdum admodum mediocris erat. Aderat aliqualis urinæ stimulus, urina citrina, sed tenuis, & ad pallorem inclinans, dum dolores noctu urgebant, mane emittebatur, sed dum dolores cessarent, tinctâ intensius, rubicunda, cum copiosis salibus & crystallis undique coagulatis, matule superficiem incrustantibus, sed si dolores noctu gravius urgerent, mane mutata, pallida, & tenuis emittebatur, appetitus bonus, vomitus, nausea nulla, jam sex fere noctes insomnes egerat, ex lecto enim ob dolorum atrociam surgere cogebatur.

Nota.

1. Non erat calculus.

2. Erant salia scorbutica falsa, quæ renes, & his vicinas partes membranosas rodendo affligebant.

3. Dum ita istæ partes vellicarentur, fibræ illarum spasmus crispabantur, & contraherantur, hinc pori angustabantur & urina pallida & tenuis; contra dolore mediocriter existente, fibræ laxabantur.

4. Varia tentata fuerunt: præ cæteris contulerunt balnea aquæ dulcis tepida; ad sedandos vero dolores vel pulveres anodynî cum opio, vel laudani hysterici gr. iij. sub introitu lecti assumi contulerunt.

CLXIII. *Dolor capitis Scorbuticus.*

Vir juvenis laborabat gravissima cephalgia per plures menses, quæ successive increverat; dolor universum sinciput occupabat, ut ut etiam occiput & nucha non libera essent; vespertino tempore circa hor.

4. vel 5. dolor inchoabat, & crudelissime affligebat, usque post mediam noctem, appetente mane remittebat, & æger dormire poterat, oculos simul præfatus dolor occupabat; interdum erat tolerabilis, sed caput admodum perturbatum, appetitus mediocris: suspicabar, cum esset constitutionis melancholicæ, latentem scorbutum, & sanguinem ipsiorem circa vascula extrema cerebri plus minus subsistentem illas dare turbas, confirmabat opinionem, quod sanguis V.S. in brachio emissus mox congruemesceret, & spissus tenaxque existeret, æger alias etiam hæmorrhagiis narium fuerat interdum obnoxius; ob id præmissio digestivo ex arcano duplicato & ʒ diaphor. instituo V.S. brachii, sed absque effectu: hinc purgationem ex ʒ dulci & extr. helleb. nigri, sed etiam cum levi successu: applico capiti raso Empl. de raris cum ʒ malaxatum cum ʒ succin.

cini & ungv. alabastr. sed non adeo multum profuit, omni sexta vespertina redibat dolor gravissimus: Præscribo sudoriferum:

Rx. ∇ fumar. ʒij.

Liqu. C.C. succin. ʒß.

ʒ diaphor. ʒj.

⊖ absinth.

Ess. op. ana ʒß.

Syr. Card. Ben. ʒij. M. Capiat hora 5. vespertina: hujus usu largissimus sudor profluxit, & dolores antiqui redierunt, sed ab hora 1. post mediam noctem nox cum somno quieta secuta fuit: hinc sequentibus diebus dolores vespertina 8. saltem redierunt, & ita bihorio post posuerunt; hinc omni mane usurpavit

Rx. ~ ⊖* ʒijj.

Cochlear. ʒj. M. D. 40. guttæ.

A meridie vero

Rx. Succin. Catarrhal. ʒj.

Zz ʒ ʒß. M.

Item Rx. succin ppt. ʒj.

ʒ Epil. antim. gr. ij.

Zz. ʒ gr. vij. M. Sed pauca levamina, saltem quod hora 8. redirent, & post mediam noctem citius hora 1. vel 2. remitterent, unde quies: Sed simul de dolore quasi Ischiadico coxæ sinistrae, & in articulatione humeri dextri conquerebatur: Unde supra dictum sudoriferum hora 7. vespertina, præmissa hora 6. parca coena, repetere jussi, unde dolor Hor. 10. demum, & is mitior rediit, & citius desiit. Unde jam decreveram hirudines utrinque temporibus applicare, sed antequam hoc facerem, præfatum spiritum quotidie bis vel ter usurpandum ordinavi; appetente vero vesperti sol. seu fl. papav. errat rubr. recentes leniter conquassatos fronti & temporibus utrisque applicare jussi, unde commode satis habuit, hinc aliquoties continuavit, appetitu bono & aucto interea redeunte. Sed non diu durabant hæc halcyonia, quin post octiduum sponte redirent: hinc sanguifugas 4. applicandas jussi, binas temporibus & binas prope nucham: intumuerunt insigniter, & cum totæ essent tumidæ & cum salis aspersione separata, sanguis ex vulnuculis, præsertim nuchæ postea adhuc continuo profluxit. Sed nec sic levamen adeo insigne obtinuit, post biduum acerbo dolore redeunte, inde novum sudoriferum ordinavi, præsertim cum in Ischiade sinistro remittens dolor ex usu emplastri diaphoretici Mynsichti cum ʒo dest. ʒ malaxati dextrum crus graviter affligeret, ita ut & præfatum dolorem capitis vesperti redeuntem simul ex acidior lymphæ caput affligente oriri putarem.

Rx. ∇ papav. rhæad. ʒiß.

theriac. camph. ʒijj.

ʒ diaphor. gr. xv.

⊖ card. ben. gr. xij.

volat. C.C. ʒß.

Syr. card. ben. ʒijj. M. Sudavit

quidem egregie & à sudore postea tota die commodius habuit, sed vesperi redibant dolores capitis, & coxarum circa articulationes, item tumor & dolor in interiori faucium seu colli, ita ut omnia illa vesperi ingravescerent, quæ interdiu mediocriter essent; dolor capitis magis exteriora quam interiora videbatur occupare, oculos simul gravis dolor lancinans cum intenso lachrymarum fluxu occupabat, ita ut exteriora capitis, membranae pericranii ab acrimonia scorbutica affici viderentur: quibus & affectus dolorosi in cruribus consentiebant. Ordinavi capiti empl. ex tacamah. & cerato pro bregmate cum ʒo destill. sassafras. malax. cum aliquali euphoria, pro artubus infessus & suffitus ex formicis per plures dies usurpandos subsequente sudore; item cum affrictione ~ ⊖* c. ʒ & ʒ articul. ad extra: sed paucum vel nullum exinde levamen; intus interea ~ carminat. de Trib. item ante istos infessus decoct. rad. Chinæ & L. sassafras usurpavit: sed nihil proficiebat, noctes graves, doloribus capitis fere in sinistro hemicranio affligentibus, item doloribus artuum gravativis torquentibus, hinc interdiu torpor omnium membrorum. Sed continuato Emplastri istius usu capitis dolores tandem penitus remiserunt, superstitionibus doloribus coxendicum, pro quibus evellendis:

Rx. Herb. & fl. Centaur. min. Mij.

absinth. Mj.

Bacc. Junip. ʒvj. M. Medietas coquantur in Mens. I. lactis caprilli, de quo omni mane bonum haustum capiat. Sed nec his conferentibus tandem decoct. lignorum sudoriferum ad methodum in luc ʒ consuetam malum sustulit. Nam hujus suboriebatur mali suspicio:

1. ex collo subinde affecto quoad glandulas internas.

2. ex dolore artuum quorumvis gravativo, qui omni vespera exacerbabatur.

3. ex tuberculis & pustulis crudis pedentim serpentibus & loco puris crudum ichorem fundentibus in collo, non nisi soluto ʒio in ʒ cedentibus, post balnei formicarum usum erumpentibus.

4. ex levamine, quod ab hoc decocto sudorifero & Pilulis ʒ libus percipiebat æger, sensili.

Tandem in thermas Döplincenses profectus & ibidem in principio & fine Pilulis ʒ libus purgatus, & hinc in balneo decocto lignorum sudorifero vius convaleuit, meliorque rediit.

CLXIV. Morbi Infantiles.

Infanti 16. septimanarum roncho, pavorebus nocturnis laboranti præscripti:

℞. *℥ hyssop.* ʒi.

Syr. acat. ʒß.

Emet. A. Sal. ʒj. M. capiat cochleatim.

℞. *Cran. hum. ppt.* ʒi.

Bezoard. Or. ʒß.

Theriac. gr. ij. M. pro 2. dos.

℞. *Coral. rubr. ppt.* ʒß.

⊙ fulmin. gr. ij. M. pro dosi.

℞. *℥ fl. sambuc.* ʒi.

Gelat. C. C. rec. ʒß.

~ ⊙ * ʒi.

Coral. rubr. ppt. gr. xv.

Syr. papav. alb. ʒß. M. Capiat aliquoties.

℞. *Far. Musc. clavat.* ʒj.

⊙ fulmin. gr. j.

℥ fl. ziliz. ʒß. M.

Puero 7. septimanarum, cum esset inquietus, & nec alvus nec vesica responderet;

℞. *℥ succ. peron.* ʒvi.

farin. musc. clav. ʒß.

⊙ fulmin. gr. ij. M. pro 2. dos. bono cum effectu.

Sic puellæ, fere bienni, cum inquieta esset, & insomnes ageret noctes, cum appetitu dejecto, & gravissimis in somno pavoribus adeoque summo metu Epilepsia:

℞. *Unicorn. ver. ppt.* gr. xij.

⊙ fulmin. gr. ij. M. Hujus usu post aliquot horas insignes vomitus & horridos aliquot habuit secessus, hinc sequente die:

℞. *Unicorn. ver.* ʒß.

⊙ fulmin. gr. j. M. Iterum vomitus unus, & mirus secessus, cum summa euphoria: Reliquum cura peregit *R tart. comp.* ad gr. 20. bis in die, item cum *Ess. myrtar. mista.*

Aliis præscripti:

℞. *Unicorn. ver. ppt.* ʒj.

bezoard. Or. gr. ix.

⊙ fulmin. gr. v. M. pro 2. dosibus, quæ laxam servarunt.

Sic proprio filio 2. septimanarum cum febribus, ardore insigni seu æstu rotius corporis, torminibus, epilepsia, clamore ventris, cum clysinatum usu:

℞. *Unicorn. ver. ppt.* gr. xij.

Ebor. f. Δ

crystall. mont. ppt. ana gr. vi.

⊙ fulmin. gr. ijß. M. pro 2. dos. in *℥*

peron. sumendis, alvus hinc laxa reddetur, cum variis excretis.

℞. *℥ succ. succin.* ʒj.

rut. ʒß.

musc. express. ʒß. M. Inungatur

æstui & rotum abdomeni; it. potio ex musco

peronæ & *⊙ fulminante.* Ipso ipse pulvis

peronæ. Il. Pars 2.

musci clavati postmodum cum pulve propinabatur.

Alii infanti 10. septimanarum:

℞. *Unicorn. ver. ppt.*

Lap. w. ppt. ana gr. xij.

⊙ fulmin. gr. ʒß. M. pro 2. dos.

Item ℞. *Dent. hippopot.*

Ebor. f. Δ ana ʒß.

⊙ fulmin. gr. ij. M. pro 2. dosibus.

℞. *Farin. Lycopod.* ʒj.

℥ odest. anis. gr. ij. M. pro 2. dosibus.

CLXV. Febri Tertiana Intermitte.

FAmulus meus affligitur die 2^a & 2^a inter. Cephalaria, cum oculorum dolore, appetitu prostrato, siri insigni, virium prostratione, æstu continuo, pulsu exacte febrili; Die 3^a ordino vomitorium, quod medicriter, aliquoties tamen supra & infra evacuavit.

A meridie gravis sitis, & hinc intensus æstus, cum ceteris præfatis Symptomatis, pulsus celer, frequens, magnus. Bibebat cerevisiam secundariam, præscripti:

℞. *℥ diaphor.* gr. xv.

arcan. duplic. ʒß. M. D. in 2 plo. Ca-

piat hora 3. unum; Sub introitu lecti *℞ bezoardice* gr. 50. Nox inquieta, bini secessus, insomnis, mane hor. 3. alterum sumit pulverem, mitigabatur affectus. Die 4^a perfecta aderat apyrexia, sitis nulla, nec Cephalgia; Nox insequens bona: suspicabar ergo febrem tertianam intermittentem. Die 5^a mane cepit *Elix. Propr.* 30. gutt. sitis ante meridiem intensissima; hora 1. pomeridiana redit sensim Paroxysmus, iisdem stipatus symptomatibus, præter cephalalgiam, aliquoties alvum deposuit, liquidis existentibus dejectionibus, ob id Hor. 4. sumere jussi pulverem bezoardicum, ad gr. xv. cum arcani dupl. ʒß. unde æstus supprimitur, sed gravior redit. Sub tempore somni *℞m bezoardicam* cepit, hinc largus sudor, & post mediam noctem suavis somnus, æstu ad mediam noctem durante. Die 6^a perfecta erat apyrexia; hinc intermittentem tertianam ardentem esse confirmabar: jussi capere iterum de *Elix. Propr.* Vespere nil: Capit somnum; sed hora prima a noctis medio sitis intenditur, redituri Paroxysmi prodromus, sedes colligativæ 3. quibus interdiu die 7^a adhuc 5. vel 6. succedunt, mane ardor redit, vires prostrant, & admodum imbecilles, præscribo:

℞. ⊙ * ʒß.

Antibez. Poter. ʒj. M. pro 2. dosibus, cepit unam mane, alteram hora quarta pomeridiana. Paroxysmus gravis tota die, hora vespertina sexta redit sudor, hinc remittit Paroxysmus, nox sequitur quieta: sed omni intermissionis die sequebatur Paroxysmus hæmorrhagiarum mediocris.

[D d d]

Die 2^a

Die 4 Melius habebat, sed debilis erat, pulsus febrilis adhuc, minor, hinc transitum intermittens in Continuum, eamque ob diarrhoeam colliquativam, & hæmorrhagias narium periculosam metuebam, præsertim quod ☐ sine coctionis signis prodiret, quæ clara & mediocris consistentiæ, naturali intensius tincta cum levi nubeculæ vestigio. Hac E. die

R. *℞ diaphor.*

arcan. duplic. ana ʒß. M. pro 2. dosibus: Capiat mane & vespere. Nox sequitur inquieta, sine somno, gravi siti, mane appetente æstus intensior redit, cum copiosis integra die secessibus, & hæmorrhagia vespertina; æger est debilis.

R. *∇ rub. Idei ʒiij.*

℞ diaph. ʒij.

Syr. rub. Idei ʒj.

~ *Ⓢ dulc. q. s.* Capiat die 2 pro lubitu: Sed acrior erat, nauseabat eam, circa meridiem vomitus, a meridie *pulveris bezoardici ʒj.* dabatur hora quarta; sudor supervenit, hinc quietiora omnia, sitis & æstus remittunt, nox quieta, sed interlocutionibus variis, ob somnia interrupta, delirii instantis vestigia.

Die 5 sitis & æstus p. n. continuus, non tamen adeo intensi, febrilis etiam pulsus: ob febrim & præcedentis diei diarrhoeam

R. *C. C. f. Δ*

Bezoard. min.

~ *℞ sigill. ana ʒß. M.* Capiat mane: mador aliqualis infecutus: a meridie pulvis bezoardicus dabatur; sudor etiam post mediam noctem successit cum quiete: vespere cum potu cerevisiæ secundariæ miscebam succum cydoniorum; Die 6 bene habebat, mane dedi pulverem bezoard. Hinc mador continuus.

Die 7

R. *C. C. f. Δ ʒß.*

℞ diaph. ʒj. M. pro 2. dos. quarum unam cepit mane, dies bonus, nox quieta; alteram die 8 sequenti, dies bonus, aliquid comedere incipiebat, ☐ eadem, secessus naturales. Utut E. sitis & ardor absque frigoris vestigio adessent, nulla tamen bilis peccantis vestigia deprehendere potui, unde etiam potionem cum ~ *Ⓢ* non bene ferre poterat, quin acidum peccare ostenderet,

1. Quod tertianarum de genere intermittentium primo esset.
2. Quod fæces alvinæ interdum acres, & quasi rodentes essent.
3. Quod absorbentia & præcipitantia, pulveres nempe isti adeo bene conferrent, Melius insipidi isti, quam salibus acuari.
4. Diarrhoea ab acido turbante bilem vel irri-

tante intestina videbatur nata, hinc pulveres isti absorbentes & ~ sigillata adeo conveniebant.

Imo declinante jam morbo sudores nocturni & matutini acidissimum odorem spirantes observabantur: hinc tum temporis præsertim cum tremor artuum, dum surrexisset, supervenisset, *R tart. acris*, item ~ *Ⓢ* &c. profuerunt, & tandem essentia absinthii.

CLXVI. *Febris continua ardens.*

Studiosus corripiebatur febre continua ardente, cum Cephalalgia & aliis consuetis Symptomatis; In principio morbi adit Chirurgum, qui mox vesicatorium nuchæ applicat, pro sistenda Cephalalgia, cum euphoria. Die 6. morbi recipit a pharmacopola vomitorium, unde insigniter debilitatur; vocatus E. non beneferebam vesicatorium, quin metuebam motum naturæ sursum, hinc deliria & convulsiones: istud E. quantocyus consolidare jussi; sed cum nihilominus die 9. morbi leves tendinum spasmos circa carpos perciperem, & in summe debili epilepticas convulsiones metuerem, non obstante illo olim applicato vesicatorio, alia duo vesicatoria unum circa carpum interiorem manus sinistræ, alterum supra genu dextrum interne applicare jussi, cum in eo nullum sudorem possem elicere, ☐ etiamnum cruda existente: interne inter alia maxime profuit:

R. *℞ bezoard. gr. xv. C. C. Or. ʒß. Ⓢ volat. viper. gr. v. M. pro dosi:* repetatur sæpius; plantis vero pedum cataplasma ex fermento cum ruta ~ *Ⓢ* & ~ *Ⓢ* applicare jussi.

CLXVII. *Febris lenta scorbutica.*

Puella gemella 5. annorum pedetentim morbo per plures septimanas confirmato correpta fuit; omni meridie hora præter propter 4. aliquali frigore per horam vexabatur, subsequente æstu intenso, per vespeream usque ad mediam noctem durante, tussis nocturna continua, cum stertore, copiosique muci præsentia: appetitus bonus, urina intensius tincta, ipsa tristis & languida. Inter alia imprimis profuerunt

R. *Syr. emet. sal. ʒj.*

∇ menth. ʒiij. M. pro dosi.

Item nodulus ex *fol. sem. ʒvj. & rad. helleb. nigr. non præp. ʒiij. M. infundatur Cerevisiæ*, de qua vel omni mane vel alternis diebus capiat post assumptum jusculum bonum haustum: Item

R. *Lap. ʒ. ppt. ʒiij.*

Ⓢ absinth. ʒß.

*℞ dest. menth. gtt. vj. M. Capiat de hoc pulvere mane; & vespere hora 4. ~ *Ⓢ* gutt. 20. per integrum curationis cursum.*

CLXIX.

CLXIX. *Epilepsia diaphragmatis.*

Puer 10. annorum Epilepsia particulari diaphragmatis mirabili affectus:

℞. *Liquor. Or.* ʒij. Dof. 10. guttæ bis indie.

Item nodulus ex *absinth. fem. anis. fol. fenn. & rad. belleb. nigr.* de quo cerevisiæ infuso omni mane hauſtum aſſumſit.

℞. *Visci Corylin. pulver.* ʒiſſ.

Corall. rubr. ppt. ʒß.

℞. *dest. succin.* gt ix. M. omni mane 2. cuſpides cultri. Item

℞. *~Θ** ʒiij. Doſis gtt. 20. omni mane.

CLXIX. *Dysenteria.*

Puer ex eſu prunorum dysenteria correptus, cum eâ per biduum laboraſſet a meridie die ʒ

℞. *Rad. priap. cet.* ʒj.

Laud. Op. gt. ij.

Corall. rubr. pr. ep. ʒj. M. pro 2. doſ. veſperi & appetente nocte; nox inſomnis ſecuta, crebri ſceſſus, cum tenefmo, dolor gravativus & convulſivus circa umbilicum: putabam itaque ex ſuppreſſis vi opii ſceſſibus originem hos dolores habere, ob id quia ab externa cauſa natum:

℞. *Rhabarb. ʒj.*

Unicorn. foſſil. ʒß.

Nuc. Moſch. gr. v. M. Capiat mane, aliquot exinde ſceſſus, febricula aderat, ſymptomata parum vel nihil remittebant, mirabar, quod Rhabarbarum non plus evacuaſſet, a meridie & pro nocte:

℞. *~ menth.*

fl. ſambuc. ana ʒj.

** fl. ſambuc.* ʒiij.

theriac. ʒj.

Troch. de Carabe

~ ſigill.

Lap. ʒ. ppt. ana ʒj.

Syr. roſ. ſicc. ʒij. M. Nox inquieta, ultra 10. ſceſſus, gravis tenefmus: dubius fere eram, an iſti ſceſſus a rhabarbaro, an ab iſta præſcripta potione originem traherent.

O id die ʒ

℞. *~ hepat. viper.*

Corall. rubr. ppt. ana ʒj.

Laud. hyſt. gr. v. M. pro 2. doſ. applicet ſimul laterem calefactum abdomini; cujus uſus optime curavit dolorem illum compreſſivum & gravativum abdominis.

Die ʒ

℞. *Troch. de Carab.* ʒß. D. mane.

A meridie

℞. *hepat. viper.*

unicorn. foſſil. ana ʒß.

Extr. tormentill. gr. iv.

Laud. hyſt. gr. iij. M. D. ſub introitu leſti: Nox quieta, omnia melius.

Tom. II. Pars 2.

Die ʒ

℞. *hepat. viper.*

unicorn. foſſil. ana ʒj.

Laud. hyſt. gr. v.

℞. *dest. macis* gtt. ij. M. pro 2. doſ. mane & ſub introitu leſti

Die ʒ

℞. *Eff. hyperic.* ʒij.

Croci ʒj. M. D. 40. guttæ ter indie.

CLXX. *Cephalalgia.*

Studioſus Nobilis Cephalalgia graviffima correptus cum dolore oculorum, nullo licet p. n. in oculis apparente, præſertim veſpertino tempore erat graviffima, malum ægro alias familiare, & quod per ſomnum, ſi recubaſſet, evaneſceret; hinc præmiſſis primas vias abſtergentibus & ~ carminativo de Tribus, ordinavi cataplaſma ex fermento acerrimo cum ſem. ſinapi contuſo, pauco ſpiritu vini addito nuchæ applicando, idque eo magis, quia oculi ſimul dolerent; hujus uſu perquam dolorifico mirabile levamen lenſit & cephalalgia remedium fuit.

CLXXI. *Cephalalgia.*

Fœmina diuturna Cephalalgia ſæpius recurrente per plures annos afflicta, ita quidem ut levi de occasione vel ex capitis ob ~ is inclementiam refrigeratione, vel ab ejuſdem prope focum nimia exaſtuatione, vel ex iſtante menſium fluxu, vel alia levi occasione eundem recurrentem pateretur, & quidem per eſſentiam, cum per conſenſum ejus affecti nullum adeſſet veſtigium. Utur enim in graviffimis illis cruciatibus vomitum pateretur, eumque cum levamine dolorum; atamen ventriculus propter ſui cum capite conſenſum ſubvertebatur. Cauſam remotam noverat nullam, niſi quod ſibi puellæ hæmorrhagia narium familiarior fuiſſet, qua ſuppreſſa Cephalalgia talis ſupervenerat. His ego intellectis cum alia præſumerem fruſtranea, ad venæ frontis ſectionem, vel hirudinum ad tempora applicationem conſilium direxi; frontis venam ſibi incidi non permittebat, conſtrictionis faucium impatiens; ob id hirudines binas fronti ſeu potius utrinque temporibus applicui, felici cum ſucceſſu, ſed copioſius ſanguinem effluere permiſi.

CLXXII. *Cephalalgia.*

Fœmina alia graviffima laborabat Cephalalgia frontis & temporum, es zoge ihr die Schläſſe herunter / und kam in die Kinnbacken / hernach in den Hals und Achſeln / daß ſie nicht zu bleiben wuſſte. Idque præſertim nocturno tempore, a veſpertina 9. ad 3. vel 4. matutinam, cum intolerabili cruciatu nocturno; cauſa occasionalis, ut ipſa referebat,

[Ddd 2]

erat

erat excretio & emunctio materiæ variæ viridi-viscidæ, quasi purulentæ per nares, quæ deficiente & suppressa, ita ut nares penitus exsucci essent, ipsi cephalalgia supervenit. Ordinata sunt Pilulæ gles, ~ carminativus de Tribus, qui egregie contulit, aliquandiu sed sine perfecta sanatione, naribus applicabatur ꝑ nicotianæ cum pauca camphora, sed frustra; aliis irritis jussi sibi applicare curaret vesicatoria bina utrinque circa aures, quorum beneficio ipsa egregie levata & curata fuit.

CLXXIII. *Hydrops Ascites.*

Aurifaber ex diuturna annua quartana ante quadriennium perpeffa, quotannis æstivo tempore tumore pedum hydropico conflictatus, hoc anno 1677. eodem tumore sed intensiori præter pedes & scrotum & abdomen interdum occupante, sed absque siti, optime respondente urinæ profluvio, affligi coepit. Judicavi, cum ex quartanæ reliquiis, visceribus abdominis fortius infixis malum ortum fuerit, haud commodius quam per ꝑ & absinthium idem primario removeri posse. Hinc

℞. R ꝑ cum succ. pomor. ʒß,

Ess. absinth. ʒij. M. D. 40. gutt. bis in die, præsertim in sequenti vino medicato, cum æger jam ante per ʒj. pulv. jalappæ copiosissime se ipsum evacuaslet, & omnem tumorem exhausisset; sed recidivante periculosius malo:

℞. Herb. absinth.

cent. min. ana Mj.

Rad. helen. ʒj.

gentian. ʒß.

fænicul. ʒvj.

helleb. uigr. non ppt.

Sem. sinap.

fænicul. ana ʒij.

Cinam. acut. ʒß.

Θ tart. ʒij.

Incis. Contus. includ. Nodul. S. Püschel in Wein.

Hauriat bis quotidie. Item bis vel ter in potu ordinario utebatur Ess. absinthii pro ʒß. ad ʒj. Item

℞. Θ ꝑ comp. ʒij. pro 6. dosibus bis in die. Hinc

℞. tart. ʒlat.

jalapp. ana gr. xij.

ꝑ dest. junip. gutt. ij. M. nam & omni vespera sub introitu lecti de Rob juniperi largam dosin capiebat, hujus medio & sudor nocturnus & ̄ excretio promovebatur, egregie: Hinc cum illis:

℞. Extr. ꝑ c. succ. pom. ʒß.

absinth. ʒij.

Rhabarb. elect. ʒj.

Rob passul. ʒij. M. F. Electuarium.

Capiat omni diebis, mane & a meridie dosin castaneæ, vel juglandis continuando simul & absinthium & rob juniperi. Item procedente tempore Electuarium hoc saltem matutino uti tempore jussi, a meridie vero R tart. acerrimæ gutt. 40. & ita continuando cum his & Rhabarbarum non inutile fuit.

CLXXIV. *Dolor oculi.*

Dolor singularis erat periodicus oculi Nobilis cujusdam, qui ex interno cerebro oriebatur, & pupillam perquam cruciabat, sine ulla visibili vel oculi alteratione, vel visus læsione, saltem quod lachrymæ interdum promanarent; Mane hor. IX. incipiebat, circa meridiem intensissimus, Hor. III. remittebat, anticipabat gradatim, & quantum anticiparet Paroxysmus, tanto etiam finiebat; vesperi & noctu omnia bona. Laxavi eum per jalappam, vesicatoria utrinque pone aures applicavi; Metuebam enim in altero oculo similem affectum, adhibita ophthalmica liquida; omnium optime conferebat sudor matutinus, repetitus, ingruente Paroxysmo:

℞. ~ Θ * ʒij.

Ess. opii ʒß. M. D. 50. gutt.

Exinde provocabatur sudor, cum jam rediret dolor, cum suspendit ordinario ad aliquot horas. Externe ꝑ ophthalmica ex ̄ putrefactis usurpata. Continuata hæc eum curarunt, erat alias scorbuticus; causa externa forsitan casus ab equo.

CLXXV. *Phthisis imminens.*

Studioso phthisin imminentem habenti ob tussim & æstum dedi:

℞. ꝑ hyssop. ʒij.

Ebor. f. Δ

magist. Corall. c. f. citr. vel fl. Δ

antihæct. Poter. ana gr. xv.

Syr. papav. alb. ʒvj. M. pro 3. dosibus; mane, a meridie & tempore somni.

Item

℞. Ebor. f. Δ ʒj.

Antihæct. Poter.

Θ * ana gr. xij. M. pro 2. dos.

℞. Θ * ʒj.

Ebor. f. Δ gr. xij.

Antihæct. Poter. ʒß. M. pro 2. dos.

Ob dolores in hypochondrio dextro, cum colica quasi, præmissio clystere:

℞. Empl. de cicuta P. ij.

G. * p. j. Malax. c. ꝑ absinth. & apponantur. Hinc balsamus Δ terebinthinatus & anisatus præscriptus fuit.

CLXXVI. *Passio Iliaca. Colica.*

Juvenis corripitur colica, ad quam alias nonni-

nonnihil proclivis erat, occasione pathematum concitata, perfert eam per duas noctes & diem unum, hinc Tauchâ redit domum rhedâ, pessima viæ conditione, acerbè dolens; Die 8 vesp̄i offendo eum de continu- is & copiosâ viscidâ materiâ vomitibus con- querentem, una cum exquisitissimis abdomi- nis infraumbilicum, adeoque iliacis dolori- bus, cum regionis hujus duritie & ad tactum renitentia, sed doloris causâ contactum fer- re non poterat. Alvus utcunque fluida seu aperta erat; Pulsus celer, frequens admo- dum, magnitudine moderatus, sitis intensâ, stupor manuum reciprocus.

Ordino clysmia, cujus applicationi spas- mus manuum & pedum supervenit, reten- tum tamen per dimidiam horam bene eva- cuavit. Interne Ess. theriacal. camphorat. cum dimidio Ess. opii propinavi, bis assu- mendam; aderat simul ariditas faucium & linguæ, sitis clamorosa, calor medioris.

Die 4 eadem adhuc omnia; sed dolor remissior, potum nisi probe calidum revo- mebat, & quoties aliquid biberet, toties do- lores recrudescebant, ordinavi externa illi- nenda & emollientia & anodyna, interne eadem continuanda jussi, potiunculam et- iam analepticam cum essentia opii, sed quam crebro revomebat; interdum tamen quies, unius alteriusve horæ somnolentia: Hinc inter alia ordinavi aliquoties ob colicam:

Rx. Flor. Δ .

maxill. luc. pisc. ana ʒj.

Laud. op. gr. j. M. pro 2. dos. unde

aliquale levamen, flatu & murmura in regio- ne infra umbilicum augebant; Clysmatis usu Die 2 & 5 mane alvus laxata fuit: pulveres continuare jussi. Mador subfrigidus cum pulsu, ut supra, perquam malo affligebat. Tandem nocte inter diem 5 & 6 media ap- petente mane aliquoties liquamina stercorea foetidissima evomit, ita ut de perfecto lico suspicio nulla amplius adesset, ipso ægro si- mul admodum debili. His in angustiis con- sultato ordino mane:

Rx. ∇ menth. ʒiij.

Θ absinth. ʒß.

\sim theriacal. simpl. ʒiß.

Syr. de spina cervina ʒj. M. Cepit

hanc & vomitus cessavit; nec de dolore ab- dominis amplius conquestus fuit. A meri- die potionem repetere jussi (quam ad imita- tionem Sydenhamii de febribus composue- ram, & sane à nullo remedio in toto morbi cursu, quam ab hac vel simili potiuncula me- lius & sentilius levamen percipere potui, id quod omnibus sequentibus diebus usque ad diem 4, quo moriebatur, crebrius hanc plus minus alteratam præscribendo observa- veram) simul ordinando clysmia:

Rx. \circ rapar. ʒiv.

lini ʒiij.

diacolocynth. Querc. ʒvi. M. pro clysmate, quod sæpius etiam repetitum, non sine fructu fuit, & crebriores secessus spon- taneos post se traxit, præsertim cum die 7 bina Poma Borstorfiana rasâ successively de- glutivisset, hinc enim nocte sequente copio- si secessus foetidi cum flatibus depositi fue- runt. Interea die 6, 7, 8 æger de difficil- lima respiratione & anxietate summa miserrime conquerebatur, vix loquendi habens po- tentiam, cum pulsu constanter pessimo & su- doribus crebrioribus seu potius madoribus colliquativis sæpius, & subinde frigidis cum affligentibus, & remittente difficultate respi- randi & cordis angustia singultu subinde su- perveniente: Usurpatus etiam sedulo exter- nus litus, latere calefacto superimposito:

Rx. Ungu. dialth. ʒvi.

\circ chamomill. ʒß.

dest. junip.

terebinth. ana ʒij. M. &

quoties later calefactus non incumberet abdo- mini, toties pejus habebat æger: quin & die- bus ultimis de testiculi sinistri superiora ver- sus retractione convulsiva, item de penis re- tractione, ita ut parum emineret, conquerebatur: Vinum interdum calidum conce- debatur; edebat ultimis diebus, & alvus sat commode fluida erat; sed ex inflammatio- ne & gangrana intestinorum mortem tandem supervenisse credo.

CLXXVII. Febris Quartana.

Mercator Genevensis ad nundinas au- tumnales pervenit, & Francosurti quartana laboraverat, cujus leves insultus sta- tis diebus absque frigore cum æstu, virium prostratione, siti &c. percipiebat. Sed ip- sæ reliquæ per usum $\sim \Theta *$ ad ʒj. repeti- tum, ita: arcan. duplic. ʒj. corall. rubr. ppt. ʒß. M. ante paroxysmum evanuerant, ita ut pro viscerum correctione R Θ l. 7 Zwelf- feri ordinarem. Sed brevi post incurrit re- cidivam hoc modo: Die ante paroxysmum languidus, & morosus erat, ipse paroxysmus Hor. 1 1/2 cum frigore sed moderato durabat, superveniebat vomitus spontaneus, hinc gravis dolor hypochondriorum & epigastrii; anxietas, æstus, &c. quæ symptomata ad 6. vel 7. Hor. ita perseverabant; parco vel nul- lo sudore, altera demum nocte supervenien- te. His ita observatis ordino vomitorium. It: pulverem ex Θ bus fixis & 8 diaphoretico \circ li ante paroxysmum, intermedio tem- pore R 7 &c. item his irritis ante paroxys- mum $\Theta *$, cum jam \sim ejus usurpassem, sed irrita omnia: nisi quod ex litu stomachi & umbilicalis regionis & plantarum pedum

[Ddd] 3

Rx. \circ dest.

℞. *So dest. terebinth.*

junip. ana ʒij.

macer. ʒß. M.

pathemata abdominis plane cessarent, & vomitus intermitteret, ob id die intermissionis bibere iussi

℞. *Herb. absinth. Mij.*

Rad. helen. ʒj.

gentian. ʒß.

armor. rec. ʒijß.

fol. fenn. s. st. ʒj.

Rad. helieb. nigr. ppt. ʒvj.

sem. anis. ʒß.

Limat. ʒ ʒijß. Incis. Contus. includ.

nodulo. De hoc bibit omni mane, mox à iusculo bonum haustum, quem laudabat, & ejus usū bis vel ter laxabatur; hinc imminente altero die paroxysmo, vespere præcedente Hor. 4. capiebat:

℞. *Arcan. duplic. gr. xv.*

Corall. rubr. ppt. aut Antihect.

Poter. ʒß. M.

coena parca: Die sequente jejunus, bihorio ante paroxysmum

℞. *Lap. ʒ ppt. ʒß.*

sacchar. ʒ. gr. xv. M. Capiat in vehiculo calido & jejundet usque ad finem paroxysmi. Hæc methodus per aliquot tempus continuata fugavit morbum, & semper nocte paroxysmum insequente copiosos sudores emisit æger, cum euphoria, talorum regio intumescebat, sed non curabatur; potuserat cerevisia, diæta tenuis, pederentim appetitus plane dejectus rediit.

Sed brevia erant halcyonia, redibat febris eodem tenore & insperato, & speciatim cum doloribus circa umbilicum gravativis & obtundentibus imminente & durante paroxysmo. Pro his E. maxime urgentibus

℞. *Empl. de Nicotiana aust. p. iij.*

G. Tacamah. p. j. Malaxata cum f. q.

ʒo nicotianæ Inducantur super linteam, applicentur abdomini. Hujus usu mox omnes dolores consopiti fuerunt: Coeteris diebus imminente paroxysmo modo dictum emplastrum abdomini applicandum, & sequens oleum illinendum iussi:

℞. *So dest. junip. ʒij.*

menth. ʒj.

Stomach. Craton. ʒijß. M.

Hæc ipsa egregie pro abdominis his pathematis profuere; Insequente biduo vacuo

℞. *Liqu. ʒ fol. ʒ ʒij.*

cochlear. ʒß. M. pro 2. dosibus

quotidie: Hinc die 2. instante paroxysmo:

℞. *Arcan. duplic. gr. xv.*

ʒ fulmin. gr. v. M. D. 3. Hor. ante

paroxysmum; qui levis & tolerabilis fuit. Sequenti biduo nihil medicamentorum as-

sumere voluit, veritus, ne stomachus, qui alias debilis, exinde laderetur, sed omni prandio haustum Vini Rhenani generosi pro stomachi robore assumsit non absque euphoria.

Die 3. ante paroxysmum

℞. *Arcan. duplic. gr. xv.*

Corall. rubr. ppt. ʒß.

ʒ fulmin. gr. v. M.

Hujus usu nulla febris apparuit, & bis ante tempus paroxysmi, ter post id alvus soluta fuit, quin etiam sequente Die 4. quater ad minimum alvum deposuit.

Die 5. Ergo quies.

Die 6. eadem licet propinata fuerint medicamenta, non tamen propterea cessavit febris, sed rediit eadem, solito typo, solitisque symptomatibus, unde ipse, cum hoc ulterius aliquoties factum fuisset, medicamentorum pertæsus ab eorum usu plane abstinere decrevit.

CLXXIIX. *Tussis humida pectoralis.* *Febris Catarrhalis.*

Vir tussi humida pectorali laborabat:

℞. *Ess. theriac. simpl. ʒijß.*

opii ʒß. M. D. 40. guttæ

bis, hor. 5. & sub introitu lecti: sufflaminata tussis, parciore materiæ rejectio, sed febris supervenit catarrhalis vespertina intensâ; Pro qua profliganda dedi R *Corall. c. ʒijß.* pro 2. dosibus, item de ʒ ʒ ʒ anis. 40. gutt. imminente paroxysmo: Appetente nocte Mixturam theriacalem. Tandem pro tussi tollenda

℞. *Rob. passul.*

Syr. papav. alb. ana ʒvj.

jujub. ʒij. M. Capiat subinde.

Sed cum opiati illius usu mane areferent fauces, & quasi æstuatio interna supervenisset, pro his discutiendis:

℞. *Antihect. Poter.*

Fl. ʒ ana ʒß.

Ess. opii gr. ix. M. pro 2. dosibus:

Hor. 5. & sub introitu lecti: Convalescebat quidem sic, sed post 2. vel 3. septimanas recidivam, nempe tumorem tonsillarum catarrhalem patiebatur; debuerat nempe purgari. Hinc instituta purgatione blanda ex jalappa & continuato ʒ ʒ anisato brevi convaleuit.

CLXXIX. *Dolor nephriticus* *scorbuticus.*

Bibliopola passus fuerat dolores quasi nephriticos, sed his evanescentibus insignis virium prostratio cum sudore continuo quasi colliquativo, præsertim circa caput, & imprimis graves & continuæ artuum aderant convulsiones digitorum, manuum, pedum &c. Urina emittebatur pallida, cruda,

cum

cum copioso sedimento albo viscido, quasi purulento, quale in vesicæ vel renum exulcerationibus subinde observari solet. Vomitus etiam subinde affligebant, præsertim si potum non exacte calidum bibisset: pulsus absque febris indicio.

Cum variis remediis contra itum fuisset remittebant successive Convulsiones, & sudor, sed superveniebant hætenus penitus consopiti dolores nephritici, in regione lumbari dextra, fixi, continui, contundentes, secundum Ureteris ductum antrorsum protensi, urina pauca cum intenso dolore ex urethra emittebatur, ita ut & parvissimum potum & parciolem Jam æger biberet & emitteret. Potus nullus sapiebat, vinum abhorrebat, levi ex occasione vomitus.

Varia tentata remedia, tandem æger consilii inops casu ad lac ebutyratum vergit, & serum lactis caprillum: Conceditur utrumque, cum succo citri instillato probe depuratum & leniter acidulatum. Bibit cum egregia euphoria, dolores remittunt, & copiosa admodum cum pauciore tamen mucositate emittuntur. Continuat hunc potum, cum interpositis remediis, & exinde multum levatur: sed simulatque tantillum extremos artus vel dorsum refrigeraret, mox intensiores multo dolores recrudescebant.

Tandem istis sic evanescentibus, supervenit dolor & tumor pedis dextri podagricus, dolore miti sed tumore contumaci affligens, quem brevi post excipit idem pathema in pede sinistro, sed his successive evanescentibus, æger convaluit.

Occasio morbi, causæ externæ nulla, alias vitiosis saporibus hypochondriacis nonnihil inquinatus videbatur, consuetus tum fuerat vino infusionis armoraciæ, quam ~ janthiperino fragis infuso subinde uti, quorum ope arenulas copiosas, seu potius salia rubra crystallisata emiserat continuo. Hæc ipsa ex negligentia per annum intermiserat.

CLXXX. Dolor nephriticus scorbuticus.

Simillimus erat affectus, quem patiebatur Vir quidam Eulenburgi, Dolor lumbaris sinister, urina parum à naturali mutata, saltem turbida, appetitus nullus, potus cerevisiæ horror, vomitus, &c. superveniebat ab usu ~ ☉* dolor levis podagricus, ipse æger vini potator, facie varis tincta, profuit serum lactis, item lac ebutyratum, ~ ☉* item Reuterling optime ferre poterat: balnea & vesicæ lacte calido plenæ, ita clysmata juvabant, quarta demum septimana prodibat calculus, dubium an præextiterit, an sub paroxysmo genitus fuerit?

CLXXXI. Febris lenta.

Vir quidam patiebatur appetitum dejectum, seu potius abolitum, horrorem cerevisiæ: hinc languorem & quasi lassitudinem omnium membrorum. Alvus crebriori secessu liquidorum vesperi & noctu præsertim solvebatur. Urina emittebatur tincta intenso croceo colore seu aureo, crassa, turbabatur brevi post, & copiosum crassum sedimentum nonnihil incarnati coloris seponebat. Omni appetente vespera circa 5. præter propter Horam evadebat languidus, circa præcordia anxius, cum successivo & lento calore, caput & palmas manuum præsertim occupante, cum pulsu celeri, frequenti, adeoque febrili, simul morosus evadebat, aliorum consortia fugiens, & circa septimam obrepebat somnus, quo una cum dimidia hora detinebatur, quo facto remittebant quidem symptomata, sed tamen cum ore glutinoso jejunus lectum petebat, & nunc quieto nunc interrupto somno noctem transigebat. Erat alias ex studiis hypochondriacus, dimidio anno antecedente passus fuerat febrem intermittentem tertianam, quæ post 3. vel 4. paroxysmos evanuerat: ab eo tempore subinde à pastu meridiano tensiones hypochondriorum passus fuerat.

Putabam E. esse febrem lentam ex cruditate acidâ natam, adeoque lymphaticam, dum in hypochondriaco acido viscido inquinata lymphæ circa vesperam tales turbæ excitaret, deficiente vi stomachi digestiva, tam spirituum quam fermenti defectu. Inter varia tentata nil melius profuit, quam

℞. Rad. aron. non præp. ʒi.

Extr. tormentill. ʒß. M. pro 4. dosibus, omni mane in vehiculo calido. A meridie vero

℞. Arcan. dupl. gr. xv.

Maxill. luc. pisc. ʒß. M.

Quæ duo ei restituerunt sanitatem.

CLXXXII. Hemorrhagia habitualis.

Viro hemorrhagia habituali laboranti cum splenis affectu, quæ vini usu exasperabatur, præscripsi:

℞. Lap. hemat. præp.

Corall. rubr. præp. ana ʒi.

sacch. ʒ. ʒß. M.

℞. Ebor. f. Δ ʒi.

Corall. rubr. præp. ʒij.

Lap. hemat. ʒi. M.

℞. Ebor. f. Δ

Dent. hippopot. ana ʒij.

Corall. rubr. præp. ʒi.

Lap. hemat. ʒß. M.

℞. Extr. flor. ʒij.

Ebor. f. Δ

Dent. hippop. ana ʒß.

Corall.

Corall. rubr. præp. ʒi.
Lap. hæmat. ʒij.
c.f.g. syr. ros. rubr. & papav. rhæad.
F. Electuarium.

Extractum parabatur ex floribus rosarum p. ij. & fl. papav. rhæad. & bellid. ana p. j. per multiplicem infusionem in ∇ f. express. & inspiss. ad imitationem Salæ.

R. solut. & cum succo pomor. ʒß.

D. 30. guttæ.

R. Pulp. passul. min. ʒij.

pulv. rhabarb. el. ʒij. M. D. capiatur mutuo. Uno die Ess. & mane semel, altero vero Elect. ad nucis juglandis quantitatem mane & sub introitu lecti. Tandem optime profuit decoctum herb. plantag. heder. terrestr. bellid. minor. flor. ros. rubr. in ∇ f. addendo passulas minores conquassatas, de quo omni mane bonum haustum capiat, interdum Liquor. & \odot interponendo.

CLXXXIII. Mensium suppressio.

Virgo ex mensium defectu ad cachexiam declinabat, cum facie pallida, torminibus alvi matutinis, alvo contumaciori, phlogosi, ab omni pastu per aliquot horas durante, Urina cruda, h. e. tenui, pallida, clara &c. siti præsertim vespertina, appetitu adhuc bono, æstu intenso à quolibet vini haustu: Judicavi omne malum oriri ex acido viscido stomachum & primas vias occupante, cujus cruditatis occasione & mensium fluxus retardetur. Ordinatum ergo vinum medicatum ex aromaticis & blande laxantibus, cum Marte: deinde vomitorium ex ʒß. Syrupi emet. A Salæ, quod copiosissimum mucum & viscidissimum, flavedine tinctum, amarore plus minus imprægnatum evacuavit. Hinc Liquor Martis \odot ad ʒß. 20. guttæ pro dosi omni mane, & ob æstuationes pomeridianas $\sim \Theta *$ ad gutt. 30. à meridie & sub introitu lecti datus est. Continuata hæc sunt ad 3. septimanas: Hinc vomitorium istud reperitum, quod mediocriter evacuavit, sed die sequente menses comparuerunt, qui jam per xij. septimanas defecerant: Hinc biduana quies postmodum pro acuenda bile & refocillando sanguine

R. R. ∇ acris

compos. ana ʒij. M. D. 30. guttæ,

• omni mane. Porro

R. R. ∇ Compos. ʒß. D. 30. gutt. omni mane per octiduum ante mensium fluxum, qui debito tempore cum euphoria redierunt: Hinc modo dictam $\mathcal{R}m$. omni septimana bis usurpandam, & intra xiv. dies semel harum pilularum v. vel vij. vesperti hora vi. ante cœnam capere jussi, idque cum in finem, ut acidum viscidum, quod subinde matutina adhuc faceret tormina evellerem:

R. Aloes succotr. ʒß.

*G. * gr. xv.*

∇ Olat. ʒß.

c.f.g. R. & F. Pilulæ No. LX. Horum usu continuato commode habuit.

CLXXXIV. Colica Convulsiva.

Vir, alias podagricus in summo gradu, conqueritur de dolore anxioso, occupante utrumque hypochondrium cum regione epigastrica, coque compressivo, non torquente, non terebante, sed lancinante quasi, quem vix ferre nec adeo commode explicare posset. Alvus erat clausa, urina sine impedimento reddebatur, vomitus subinde molestus aderat; Credebatur esse nephritis, mihi vero videbatur colica convulsiva: hinc præscripsi:

R. Maxill. luc. pisc. ʒß.

Cinnab. ʒ gr. xij.

Laud. ferment. gr. iß. M. pro 2. dosibus. Ex quarum prima notabiliter remiserunt symptomata, ipso ægro aliquali sudore madente, qui semper ipsi conferebat, sed exinde languidus & omnibus membris quasi tremulus reddebatur: pro alvo solvenda clyisma injectum parum effecit, cum mox fuisset rejectum; propinata passulæ laxativæ nil effecerunt, non secus ac pulvis blandus laxativus, ego vero alia quæcunque usurpare volebam, ne paresin vel epilepsiam inferrem: ad hanc posteriorem enim naturâ erat proclivis; illam vero & podagram etiam occasione aliorum dolorum olim contraxerat. Præscribo potionem laxativam ex passulis & senna, quam bis vel ter pro lubitu una die caperet, sed vomitu eam aliquoties reject, ipso ægro per 3. vel 4. noctes plane insomni existente, utut abdominis pathemata plene evanuerint. Ordino E. $\sim \Theta *$ anisatum ad 30. gutt. ter per diem usurpandum, cujususu melius habuit, sequente die potionem eandem usurpavit, quæ semel absque vomitu alvum laxavit. Hinc spiritum continuando evasit incolumis. Scilicet acidum nervis impactum has turbas dabat.

CLXXXV. Exostosis.

Vir Exostosi tibiæ sinistra laborabat perquam dolorosa, noctu & vesperti præsertim, interdiu satis tolerabili, sine causâ externa, saltem ex spontaneo naturæ motu interno enata; dubius tamen eram, an per degenerationem nutrimenti, an vero per decubitus ex venoso genere natus esset hic tumor.

Interne nodulus alterans & laxans ex amaris, item senna & helleboro nigro acclimatura & præscribebatur. Externe Empl. de ranis cum \mathcal{g} sed hoc sine levamine: dolo-

dolores eodem modo perstabant, hinc post aliquot dies:

℞. *Empl. de Ran. c. 8.*

diachyl. c. gum. ana q. l. imposuit aliquot dies cum aliquali levamine dolorum, tumore eadem magnitudine perdurante. Hinc post quietem aliquot dierum, quibus nudum crus relinquebatur:

℞. *Empl. diachyl. c. gum. q. f.* applicetur aliquot dies: unde levabatur malum. Hinc

℞. *Empl. diachyl. c. gum.*

de Cicuta ana q. l. bene contulit, quoad dolores, reliquis eodem modo permanentibus: Tandem

℞. *Empl. de Cicuta q. f.* sic post aliquot dierum applicationem sponte dolores evanuerunt, sed cum tumor idem persisteret, iussi laminam ex h tenuem desuper imponere, & continuo gestare, quo in calli quasi naturam degeneraret tumor, quod etiam bono cum successu factum. Hæreo an emplastra dolorem mitigaverint, an vero sua sponte successive, illorum tamen ope hic remiserit?

CLXXXVI. *Febris scorbutica. Tussis pectoralis.*

Nobilis Silesius laborabat difficili respiratione cum tussi gravissima & frequentissima, rejiciebat copiosissima, viscidissima, flavescentia, & subito unius vel bidui spatio hæc symptomata contraxerat: accedebat febris intensa, cum summo æstu, omni vespere recurrens circa Hor. 5. vel 6. durabat usque ad decimam septimanam; quo tempore remittebat: sine ullo frigoris vestigio, sponte & successive inchoabat, & quamdiu affligebat, continuis sudoribus diffuebat æger, etiam sapissime his alias recurrentibus: Erat scorbuticus insignis, & copiosa salia crystallisata matulae parietibus affigebantur. Tussis erat revera pectoralis pulmonis vitio enata, quando tantillum non exacte calidum biberet, vel parum pectus denudaret, tussiebat; quo largius sudaret, eo minus sordium expectorabat, &c. Febris ex acido erat scorbutico, quod etiam pectus affligebat.

℞. *Arcan. duplic. 3℔.*

Maxill. luc. pisc.

3 *diaphor. ana gr. vj. M.*

℞. ~ *Θ * anis. 3ij.*

R tart. comp. 3j. M.D. 30. guttæ à meridie & sub introitu lecti: Pro æstu vespertino:

℞. *Maxill. lucii pisc.*

arcan. dupl. ana gr. xv. M.

Sed cum omnia exasperarentur:

℞. *▽ papav. rhæad. 3iij.*

~ *Θ * anis. 3j.*

Maxill. luc. pisc. 3℔.

fl. Δ gr. xij.

Syr. viol. 3vj. M. capiat cochleatim.

Tom. II. Pars 2.

℥ *▽ papav. rhæad.*

hyssop. ana 3ij.

Maxill. luc. pisc. 3ij.

Antihæct. Poter. 3j.

Θ volat. maxill. luc. pisc. gr. ix.

Ess. opii 3℔.

Syr. violar. 3℔. M. Assumit, sed minus copiose, unde cum & debilis esset, & aliquot noctes non dormivisset, in somnolentiam delapsus est, qua vix loqui potuit, adstantibus saltem perquam terribilem. Superior E. mixtura magis proficua repetita & usurpata fuit. Sed ut febris impetum vespertinum infringerem:

℞. *▽ papav. rhæad. 3ij.*

fl. acaciæ 3j.

Maxill. lucii pisc.

Corall. rubr. præp.

Antihæct. Poter. ana gr. xv.

Syr. violar. 3℔. M.

Sed eodem modo ferociit febris, tussi & scretu paulatim remittentibus. Unde

℞. *Amygd. dulc. ambros. 3iij.*

sem. melon. 3j.

c. f. q. ▽ fl. papav. rhæad. F. Emulsio, adde *Mandib. luc. pisc. 3℔.*

Antihæct. Poter. 3j. Edulcoretur pau-

co saccharo; quæ egregie profuit, hinc & eadem vespera repetita & sequenti die etiam, unde temperativa vi hujus remedii omnis æstus febrilis penitus evanuit; Hinc pro consolidandis pulmonibus:

℞. *Ras. santal. rubr. 3j.*

L. sassaf. 3℔. M. macerentur per xij.

Hor. in *▽ com. 1℔vj.* Coqu. ad absorptionem 1℔i℔. adde

Heder. 3℔.

Comar. hyperici flor.

Herb. veron. ana Mij.

Rod. glyzyrrh. 3℔.

sem. fenic. 3vj.

Passul. min. conquass. 3iv.

Coqu. ad remanentiam 1℔iv.

De quo omni mane ingentem haustum calide bibit, ut & sub introitu lecti; dum interea vespere ob febrilia vestigia caperet:

℞. *▽ papav. rhæad. 3iij.*

asthmat. 3i℔.

Mandib. luc. pisc. 3j.

Antihæct. Poter. 3℔.

Syr. papav. alb. 3iij. M.

Item ℞. *Θ **

Mandib. luc. pisc. ana gr. ix. M.

℞. *Lap. 3. præp.*

Matr. perl. præp.

fl. Δ ana gr. vij. M.

℞. *Maxill. lucii pisc. gr. xv.*

Antihæct. Poter. 3℔. M.

Quibus & similibus pulveribus continuatis & per aliquot septimanas continuato simul isto decocto, denuo convaleuit.

[Ecc]

CLXXXVII.

CLXXXVII. *Affectus Splenetici.*

Affectus splenetici se produnt ordinario dolore gravi, obtuso, quasi contundente, (minime omnium punctorio) & subsequentibus spasms, nunc gravioribus, nunc levioribus.

Sic Vir repentino dolore in hypochondrii sinistri profundo corripiebatur, superveniente lipothymia gravi, cum aphonía fere, & spasms ac motibus convulsivis, ac doloribus lancinantibus in omnibus artubus, præsertim manibus. Sicalius Vir conqueritur de continuo dolore in hypochondrio sinistro quasi compressivo, levamen egregium sentit ex applicato Emplastro de Nicotiana cum ana G. Tacamahacæ; sed corripitur sic hemicrania lateris sinistri, urgente præsertim circa regionem temporum istius lateris, turbante simul caput insigniter: remoto vero emplastro in latere sinistro evanescit hemicrania, redeunte hypochondrii molestia.

Fœmina dolore hypochondriaco sinistro profundo quasi lacerante affecta sentit exinde dolores lancinantes & lacerantes in universum abdomen torqueri & totum intestinorum situm recurrentibus creberrimis contorsivis doloribus affligi; revera spasmodici erant, ob plexum lienarem nerveum, ex male habente splene in spasmus actum.

Pariter & Studiosus, qui puer diuturna quartana & hinc hydrope affectus, tandem ab hac mediante copioso fluxu curatus redditus erat summe spleneticus, cum mentis perturbatione, & melancholia summa: nempe quoties tempestatis insignior, in specie verno aut autumnali tempore immineret mutatio, toties sensum palpitationis in imo hypochondrii sinistri prope spinam dorsí fere percipiebat, quam dolor gravativus & obscurus lienis in isto loco comitabatur, hinc caput turbari, anxius ipse reddi &c. incipiebat; adeo ut uno alterove die, antequam contingeret, tempestatis mutationem imminemem dictis in locis & modis perciperet; cum alias, dum ista in regione nil perciperet, hilaris, animosus, optime animo & corpore valens esset. Ut adeo hic quartanæ, lienem afficientis & hujus male affecti pulsatio Hippocratica, quam Helmontius urget, & hanc insequentis melancholiæ pathemata considerata veniât.

Puer porro biennis, qui superiori anno duplicata quartana conflictatus erat, insigniter ab isto morbo tumentem adhuc ventrem gestavit, cum tumore circumscripto sub hypochondrio sinistro, febre continua lenta, appetitu insigni, chylosi imminuta, alvo soluta, & siti antemeridiana insigni. Omnia hæc ex muco acido-salfo primarum viarum dependere ratus præscripsi solutionem *et succo pomorum* ad 20. gtt. pro dosi, Item:

℞. Ungu. alth. ʒij.
℞. chamom. ʒss.
dest. junip.

cumin. ana ʒij. M. Inungatur mane & vespere universum abdomen, & interdum aquæ dulcis balneo insideat. Hinc dedi laxativum ex *℞ fulminante*, tum *Liquor. fol. tart.* Item

℞. Elix. Propr. f. ʒd. ʒss.

*~ Θ * simpl. ʒij.* M. D. 25. guttæ bis in die. Porro accepit nodulum ex rhabarbaro in cerevisia, & ob flatulentias *~ Carmin. de Trib.* ad 30. guttas.

Laxatione repetita cum *℞ fulm.* dedi

℞. Liqu. ʒ. Or. ʒij.

~ fol. tart. ʒij. M. filtra D. omni mane 10. gtt. & a meridie de *~ Θ * anis. 20. gr.*

Epilepsia Infantis.

Infanti 1½ anni gravi epilepsia ex dentitione laboranti.

℞. Liqu. C. C. succin. ʒij. D. xij. guttæ sæpius & crebrius in *℞ fl. acaciæ.*

℞. Unicorn. ver. præp. gr. viij.

℞ fulmin. gr. j. M. D. in 2plo. Cum alvus haud debite responderet:

℞. Lycopod. ʒss.

℞ fulm. gr. j. M. D. in vehiculo jusculi carnis calidi. Hinc

℞. ʒ ceras. nigr.

fl. tilia ana ʒij.

unicorn. præp.

cran. hum. præp. ana gr. xv.

Θ volat. C. C. ʒss.

Syr. fl. tunicæ ʒij.

℞. ʒ dest. rut.

succin. ana ʒss.

nucist. expr. q. s. pro Consistentia balsami, pro illinitione nuchæ & superiorum vertebrarum colli, dorsí & præcordiorum.

℞. fl. chamomill. Mj.

sem. anis. ʒss.

baccar. junip. ʒvj.

Coqu. in f. q. *℞ com.* Colat. ʒvj. adde

Elect. de bacc. lauri ʒvj.

Syr. emet. Sal. ʒij. M. pro clysmate.

CLXXXIIX. *Febris tertiana intermittens. Asthma Convulsivum.*

Mulier 50. fere annorum, cui tamen adhuc fluebant menses, laborabat Tertiana intermittente, & die vacuo asthma convulsivo gravissimo, omni vespere post 7mam ex improvise superveniente, & ad quartam matutinam usque perseverante: Dies vero Paroxysmi febrilis erat vacuus absq; tali asthma: Erat hoc revera convulsivum, nam

1. Nulla tussis aderat, aut saltem, sed inanis præcedebat.
2. Materiæ excretio seu scretus nullus, aliquando quidem ante Paroxysmum, die illo, quo

vesperi

vesperi redibat, viscida, mucosa, exscreabat, sed nec ante, nec post talia videbantur.

3. Finiebatur Paroxysmus successive sine sensibili materiae evacuatione, inchoabat subito, sine notabili causa antecedente primum respiratio difficilis, hinc cordis palpitatio, anxietates praecordiorum gravissimae, motus convulsivi in brachiis & scapulis, extremorum frigus, sudor varius, praesertim frigidus in Paroxysmo affligebat: Finito Paroxysmo lassitudo omnium membrorum, calor corporis, pulsus celer, & frequens supererat.

Finita & curata febre periodum suam tertianariam observabat Paroxysmus asthmaticus, tentata varia, volatilia, ~Θ*, liquor C.C. *sucinatus*, ~carminativus, *Ess. castorei* c. ~Θ*, ~*lumbricorum* & *strium*, sed omnia erant frustranea. Sperma ceri cum croco, empl. ex Tacamahaca & galbano pro praecordiis, sed incassum omnia. Malum non erat hystericum aut ex abdomine, vel hypochondrio, in his locis quieta omnia, caput sine labe, saltem pectus constrigebatur universum, fauces occludebantur, unde non nisi cum sonitu spiritum ducere poterat. Praecesserat gravis Cephalalgia, hanc exceperat febris, haec cum per octiduum durasset, inscutum hoc asthma: Suspicabar acre miasma, Cephalalgiam quod induxerat, utcumque motu febrili resolutum ad nervos intercostales motum, unumque & alterum hujus nervulum occupasse, unde istae lachrymae; □ crassa cum sedimento copioso, quasi farinaceo, & salibus scorbuticis admodum copiosis, unde & scorbutus delitescibat. Aliis ergo irritis ordinata sunt duo vesicatoria, imple, utrinque post carpos applicanda, die vacuo.

Die vero Paroxysmi hora 5. vespertina:

Rx. *Farin. lycopod.* 3℔.

pulv. epilept. 8℔. gr. ij. M. Quorum su evanuit, nec nisi pauca sui vestigia reliquit Paroxysmus; unde per triduum continuum omni vespera continuatus fuit pulvis felicium successu, ut penitus sopiretur malum.

CLXXXIX. *Chlorosis. Mensium Emanatio.*

Virgo Chlorosi cum Mensium emansione laborabat, appetitu dejecto &c. optime profuerunt sequentia:

Rx. *pulv. rad. aron. acr.* 3iij.

Extr. tormentill. 3℔. M. omni mane sumat, quantum ingentis cultri cuspis capit, meridie vero

Rx. *Elix. Propr.* 3iij.

Ess. absinth.

cent. min. ana 3j. M. D. 50. gutt.

Ungt. stomachico insimul inungat praecor-

Tom. II. Pars 2.

dia, facta ex 60 *dest. macis, menth. caryoph.* c. 60 *N. M. express.* Cum hac per aliquot septimanas continuasset, & fere eorum pertaxa esset, alternis diebus, uno mane pulverem, altero a meridie *Essent.* assumsit. Hinc

Rx. *Ess. myrrh. comp.* 3℔. facta ex *myrrh.* p. iv. *croci* p. j. c. *Rtart. acris* D. 40. guttae omni meridie, postmodum bis quotidie, mane & sub introitu lecti, & ita redierunt menses & appetitus. Hinc per septimanam bis solut. 6 c. *succo pomor.* usurpavit, & interea crebro succum seu rob. juniperi, quod eam calefaciebat, erat enim semper frigida.

CXC. *Scorbutus. Tumor pedum.*

Senex fere 70narius subito dolore cruris sinistri corripitur intenso, hinc nocte sequente totum crus ab inguinibus ad popliteum intumescit mirabiliter, ita ut triplo superaret magnitudinem alterius cruris: dolor adhuc per aliquot dies remansit, sed hinc evanuit, praedicto tumore, albo, seu concolori denso & subduro remanente, ipso aegro cetera optime valente. Judicavi in corpore nonnihil cacoehymico & quasi scorbutico, occasione doloris & hinc fibrarum spasmi variam colluviem ex M. S. in pede coacervatam & ita retentam esse; & quia tumor contumaciter eodem modo permanfit, spasmus illum fibrarum adhuc durare, idque ratione irritationis, ut minus sensibilis a colluvie scorbutica acido-salsa facta. Jussi E. ut praemissa levi laxatione qualibet septimana bis vel ter largiter sudaret, mane ex usu Theriacae: Externe vero applicaret toti cruri tumentis a poplite usque nonnihil supra genu cancris fluviales vivos confusos instar cataplasmatum. Fecit hoc omni mane & vesperi semel, reliquendo ita cancris per totum diem & noctem. Continuavit hoc per 14. dies cum euphoria, saltem quod foetor cancrorum admodum molestus esset; Effectus erat, quod copiosum serum resolutum per poros inciperet transsudare, ita ut hinc inde praesertim circa furas pustulae serosae eleventur, ex quibus copiosum admodum serosum liquamen efflueret, quibus apparentibus cancrorum usum intermisit; sed fluere permisit pustulas, quae exinde excavari & in parva foramina abire inceperunt, ex quibus copiosum serum profluebat. Sed cum talia foramina appaterent, accepit emplastrum a quodam apparenter ex resina, terebinthina & cera permixtum, (quod calorem partis naturalem conservaret) quo undique cruri applicato adhuc aliquandiu emanavit serosum liquamen, sed successive cessavit fluxus, & foramina illa omnia fuerunt occlusa. Pes autem fere ad naturalem statum rediit, [Ecc 2] praeser-

praesertim supragenua, ubi alteri similis: infra genu manebat aequale alteri cruri, interdiu vero aliquantulum indurari, & tumescere observatur. Prurit admodum, & ubi scalpit, mox pustulae serum fundentes erumpunt, quas isto emplastro coercet. Jussi ut fonticulum in isto crure supragenu impurendum curaret. Interne ordinavi Pilulas c. & *dulci*, item *Ess. myrrh. comp.* Externe praeterea ~ baccarum juniperi crusa genu ad poplitem usque continuo calide mane & vespere inungebat; linteam etiam cum ~ calido humectatum applicavit, tibialibus calidis mox desuper impositis. Conquererebatur enim de frigore cruris & pedis, id quod ob alcali cancerosum factum putavi, unde acido volatili V succurrere jussi.

CXCI. *Catarrhus suffocativus. Asthma.*

FOemina aliquot septimanas laborabat catarrho suffocativo, ut dicebat. Principium erat frequentior alaudarum assatio; sub qua & butyri irroratione & utriusque pinguedinis in carbones candentes destillatione, & hinc fumorum elevatione factum fuit, ut ipsa primo tussim aliqualem sed siccam & profundam, seu ex imo pectoris experta fuerit, quam aliquando ex improvviso arctior pectoris & faucium angustatio, hinc difficillima respiratio & post aliquot dies perfecta orthopnoea insecuta fuerit, in quo statu continuo ultra octiduum suffocanda videbatur, donec successive expectorare & materiam glutinosam & perquam viscidam expuere, indeque liberius respirare & tandem ad sanitatem redire coeperit. Mansit tamen mali vestigium pulmonibus impressum, ita ut facile a quavis causa externa angustiam pectoris experiat.

Causa remota est acidum viscidum ex butyro & alaudarum pinguedine incensis exhalans, respiratione inspiratum, asperae arteriae & hinc pulmonibus undique inhaerens. Hoc irritavit inimica sui praesentia & acrimonia & adhaesione glutinosa, tanquam fuligo undique camini in pectore ductibus adhaerens, bronchia & pulmones, unde primo tussis, hinc irritatione illa lymphae uberior affluxus, ab utrisque gravior irritatio, unde continuata pulmonum strictura & coarctatio convulsiva. Duravit haec tamdiu, donec tam lymphae quam nutrimenti proprii affluxu, fuligo illa absterfiva, resoluta, & ex utrisque successive concretum novum ob moram & exactam missionem seu subactionem spissum & candidum genitum fuerit. Hujus medio fuligo sublata, irritatio hinc sedata, contractura pulmonum hinc remissa fuit, unde liberiori paulo aeris accessu & recessu materia ista sub Paroxysmo genita

cum fuligine involuta commota, protrusa, & sursum rejecta fuit. Mansit tamen vestigium ex pulmonum nutritione propria seu privata plus minus laesa, adeoque contracta hinc pulmonum debilitate, & fibrarum tali immutatione, qua facillime in spasmos agi possint, unde vel levi occasione externa pulmo irritari, fibrae contrahi, & hinc affectus revocari solet.

CXCII. *Cordis Palpitatio. Atrophia.*

Retulit mihi Pecquetus Parisiis, quod cum aliis Medicis venerit ad mulierem, horribili cordis palpitatione laborantem cum difficili respiratione, & omnimoda corporis macie, venis tamen sanguine satis repletis. Judicavit Dominus Pecquetus, sanguinem illum esse admodum acrem, qui non tantum nutritioni non sit aptus, sed etiam sua acrimonia & asperitate nutrimentum ceterarum partium abstulerit; hujus sanguinis temperandi gratia lacticia convenientissima esse dixit: post 4. vel 5. vicibus Venam sectam, eam lactis usitata restituit, ut intra duos menses bene saginata fuerit, nam Venae sectione sanguinis acrioris partem evacuavit, lac vero reliquum temperavit.

CXCIII. *Febris ardens.*

Polonus quidam, servus mercatoris robustae staturae, &c. ex inopinato circa vespere horrore perfunditur & rigore, usque post mediam noctem, quo tempore admodum incalescebat; vocatus altero die post prandium, cum summe ardentem & calentem cum pulsu magno frequentissimo & vehementi invenio; cutis ad tactum erat arida, & squalida: cum videretur malum admodum esse auctum, jejuno quoniam erat stomacho, propino R *bezoardicae* gutt. xl. unde horae interjecto spatio largus sudor insecutus fuit: vespere cum alvus per triduum esset obstructa, praescribo:

R. *Decoct. emoll.* ℥ix. in quo dissolv.

Elect. lenitiv. ℥j.

Θ *gemmae* ℥j. M. F. clyster.

Pro sedando ardore:

R. *Decoct. hord. c. C. C.* ℥ss.

Syr. nymphae

de papav. ana ℥vj.

~ Θ *dulc.* ℥iij. M.

Hoc potu situm levabat per noctem, mane sponte natura sudorem provocavit, unde omnia symptomata remiserunt: Hinc

R. *C. C. f. Δ*

Ebor. f. Δ ana ℥j.

℥ *diaph.* ℥ss.

Laud. op. gr. iij. M. pro 2. dosibus Sumit

Sumsit mane & vesperi, unde bene dormivit, & cum bene se haberet, adhuc unum pulverem assumsit, sicque curatus fuit.

CXCIV. *Tussis stomachalis.*

Puer conflictabatur tussi stomachali sicca, sed praesertim nocturna, eaque interrupta cum febre lenta, omni vespera bihorio ante coenam exacerbante, cum urina crassa, turbida cum copioso sedimento; acre salsum pertinaciter orificio stomachi adhærens hæc mala inferebat & vomitus interdum spontaneus assumptorum superveniebat. Unde quibusdam præmissis vomitorium propinavi; hinc pro temperando acri & calore lento hecticico demulcendo:

R. *Flor.* Δ

Antihæc. Poter. ana \mathfrak{z} j. M. pro 2. dof. mane & vesperi hora quarta sumendis.

Item

R. *Lapid. \mathfrak{e} . præp.* \mathfrak{z} j.

Flor. Δ

Antihæc. Poter. ana gr. xii. M. pro 2. dosibus capiantur.

Sub introitu vero lecti

R. \mathfrak{R} \mathfrak{z} ij.

Eff. op. \mathfrak{z} ss. M. D. 40. guttæ.

Hiscæ ad tempus & similibus continuatis, factum fuit, ut inciperet omni mane post noctem quietam & continuo somno traductam per horam integram tussire, & copiosa mucosa ex imo corporis & ipso monstrante ægro ex scrobiculo cordis rejicere, (nam licet etiam in principio ad tussim stimulari se diceret, ex irritatione in larynge percepta, post aliquot tandem dies progressu morbo in imo circa scrobiculum cordis saltem se irritari dicebat) quibus excretis toto die vix amplius tussire solebat. Ergo istis & remediis & pathematis aliquandiu continuatis

R. \mathfrak{R} . Δ \mathfrak{z} ij. D. 40. guttæ bis in die, mane & vesperi; & pro stomacho restituendo \sim baccar. juniperi, item Malvaticum juniperinum cum pane sub introitu lecti capere solebat.

CXCV. *Tussis stomachalis.*

Similis erat tussis, quæ prehendebat Nobilem quendam post diurnam quartanam, per portionem cum diacod. & Elæosacchari \mathfrak{z} ti \mathfrak{z} iv. pro 2. dosibus bis in die usurpatam & continuatam, cum inciperet copiosa excernere curatam, addito etiam \sim Θ * anisato: In omnibus his ex stomacho natis tussibus sonus tanquam ex profundo, *wie aus einem hohlen Topf* audiebatur.

CXCVI. *Tussis stomachalis.*

Similis erat tussis, qui vexabat Mercatorem Augustanum, sed curabatur

R. \mathfrak{R} \mathfrak{z} *acris*

compos. ana \mathfrak{z} ij. M. D. 50. gutt. ter in die: Item

R. \mathfrak{R} \mathfrak{z} *Comp.*

\sim Θ * *anis.* ana \mathfrak{z} ij. M. pro 4. dosibus, Hora saltem 5. vespertina assumendis: Symptomata erant appetitus prostratus, sitis, tussis, omni mane hora 5. inchoans, & per aliquot horas durans, cum summo conatu: excernebat æger pauca salivalia viscosa, & fere vomitus in ventriculo contentorum superveniebat: hinc quies; Hora 4. pomeridiana repetebat tussis, eodem modo, & cum per aliquot horas continuasset, iterum quies, tandem sub introitu lecti frigidi aliqualem tussim sed levem, interdum tamen cum vomitu patiebatur.

CXCVII. *Febris Tertianæ & Continua.*

Viro tertiana intermittente & continua aliquoties permutatis laboranti, præscripsi:

R. ∇ *scorzoner.* \mathfrak{z} ij.

\times *vini* \mathfrak{z} ij.

Corall. rubr. præp.

C. C. f. Δ ana \mathfrak{z} ss.

Syr. decoct. citr. \mathfrak{z} ij. M.

R. *Pulv. bezoard.* \mathfrak{z} ij.

Cinnab. \mathfrak{z} gr. xij.

Camph. gr. iv. M. pro 2. dof.

R. *Arcan. duplic.* \mathfrak{z} ss.

\mathfrak{z} *diaph.* \mathfrak{z} j. M. pro 2. dof.

R. ∇ *fl. sambuc.*

papav. rhæad. ana \mathfrak{z} ss.

C. C. ust.

\mathfrak{z} *diaph.* ana gr. xvj.

Spirit. vini camph. \mathfrak{z} ss.

Syr. papav. rhæad. \mathfrak{z} vj. M.

R. ∇ *fumar.* \mathfrak{z} j.

\sim Θ * *f.* \mathfrak{z} ss.

C. C. ust. gr. xv.

Lup. \mathfrak{e} præp. \mathfrak{z} j.

Syr. menth. \mathfrak{z} ij. M.

R. ∇ *fl. papav. rhæad.* \mathfrak{z} j.

\sim Θ * \mathfrak{z} ss.

C. C. ust.

\mathfrak{z} *diaph.* ana gr. xv.

Syr. papav. rhæad. \mathfrak{z} ij. M.

R. ∇ *fl. sambuc.* \mathfrak{z} ij.

∇ *camphor.* \mathfrak{z} ss.

C. C. f. Δ \mathfrak{z} ss.

bezoard. Min. \mathfrak{z} j.

Θ *volat. C. C.* \mathfrak{z} ss.

Syr. fl. tun. \mathfrak{z} ij.

R. ∇ *fl. sambuc.* \mathfrak{z} ij.

∇ *camphor.* \mathfrak{z} ss.

Ebor. f. Δ \mathfrak{z} j.

bezoard. min. \mathfrak{z} j.

Syr. rub. Id. \mathfrak{z} ij. M.

[Ecc] 3

R. \sim

Rx. ~ Θ* f. ℥iij. D. 40. guttæ aliquoties.

Rx. Θ *absinth.*

card. ben. ana gr. xv.

℥ *diaphor.* gr. vi. M. D. in ∇ fl. sambuci.

Rx. *Elix. febril. D. Mich.* ℥ij. D. 40. guttæ.

CXCIIIX. *Febris tertiana duplex.*

FOEminæ tertiana duplici intensâ cum gravissimis præcordiorum anxietatibus in paroxysmo laboranti præscripti:

Rx. Θ ℥t.

Arcan. dupl. ana ℥ß.

scammon. ℥t. gr. iv. M.

Rx. ∇ fl. *sambuc.* ℥iij.

Maxill. luc. pisc. ℥ij.

℥ *diaphor.* ℥j.

Θ *volat. maxill. luc. pisc.* gr. xij.

Syr. borrag. ℥iij. M.

Quæ aliquoties reiterata fuit.

Rx. ∇ *Chelidon. maj.* ℥iij.

Lap. ☉ præp.

Unicorn. fossil.

CrySTALL. præp. ana ℥j.

Syr. nymph. ℥iij. M. quæ itidem

aliquoties fuit reiterata:

Rx. *Unicorn. ver. præp.* gr. xvij.

CrySTALL. præpar. ℥ß.

Θ *absinth.* gr. vj. M.

Rx. ~ Θ* *simpl.* ℥iij. D. qui anxietates optime & miraculi instar discussit, hinc crebro reiteratus fuit.

Rx. *C. C. ust.* gr. xv.

Θ *absinth.* ℥ß.

Specif. ad. Ict. gr. iv. M. aliquoties accepit.

Rx. *Unicorn. ver. præp.* gr. xv.

Cretæ albiss.

Θ *absinth.* ana ℥ß.

⊙ *diaphor.* gr. vj. M. D. ante paroxysmum. In Recidiva, cum facta esset perperâ

Rx. *Pulv. gentian. subtiliss.* ℥j.

Θ* gr. xv. M. D. in haustu vini.

Rx. Θ *absinth.*

corall. rubr. præp. ana gr. vj.

arcan. dupl. ℥ß.

scammon. ℥t. gr. iij. M.

Rx. Θ *absinth.* gr. xv.

Corall. rubr. præp.

Lap. ☉ præp. ana gr. viij.

Extr. troch. Alb. aud. gr. j.

⊙ *dest. caryoph.* gr. j.

scammon. ℥t. gr. ß. M.

Rx. *Pulv. Gentian.* ℥ß.

Θ ℥ gr. xv.

Extr. troch. Alb. gr. j.

⊙ *dest. caryoph.* gr. iij. M.

Hinc pulveris Chinæ Chinæ ℥ß. curam absolvebat, cui subjungebatur nodulus alterativus laxans.

CXCIX. *Scorbutus. Crurum Paralysis.*

FOEmina laborabat scorbuto, qui talum & pedem tumore quasi erysipelaceo cum insigni dolore occupabat, aderant simul copiosæ maculæ scorbuticæ, totum crus pingentes, etiam sanum, hinc superveniebat imbecillitas ambulandi, dolor lancinans cum sensu contractionis in suris, quoties progredi vellet, dolor in genubus, languor virium, somnus nullus, appetitus prostratus, interdum passiones leves hysteriæ, sudor continuus, sitis intensâ. Erat crurum paralysis scorbutica; Hinc præmissis pulveribus quibusdam absorbentibus ex coralliis, ebore f. Δ, & arcano duplicato, &c. cum usu pomeridiano ~ Θ* & cochleariæ, omnium optime contulit decoctum, quo utebatur bis, hora 5. & sub introitu lecti, expectando mane levem sudorem. Scilicet:

Rx. *Comar. abiet. rec.* ℥ij.

Rad. Chin. ℥j. M. Coqu. in ana Cerevis. & ∇ f. ad mediet. absunt. Cujus usu repetito & aliquandiu continuato penitus evanuerunt, & ipsa curata fuit.

CC. *Dentitio difficilis. Diarrhœa. Epilepsia.*

Infanti dentitione difficili cum diarrhœa gravissima & insultibus Epilepticis imminentibus correpto præscripti:

Rx. ∇ *fœnic.*

plantag. ana ℥j.

Liqu. C. C. succin. ℥ß.

C. C. ust. gr. xv.

Unicorn. ver. ℥ß.

☿ *sigill.* gr. ix.

Syr. fœnic. ℥ij. M. subinde reiterabatur, simul balsamus ex oleis destill. nuchæ & abdomini illinebatur, & calido latere pedes continuo fovebantur, hinc declinante malo quotidie bis de Elix. Propriet. sine ☿ do 30. guttas cepit, & sub introitu lecti pulvis bezoardicus vel similis dabatur.

CCI. *Dysenteria.*

Vir juvenis dysenteria gravi conflictabatur, in principio nonnihil cruenta, sed in progressu rota alba: hanc sine evacuantibus rhabarbarinis mox per opiata & specifica aggressus sum curare, aderat simul febris continua. Successit quidem cura, sed magno labore, & continuo calido cerevisiæ potu, lateribus calefactis pedibus & abdomini applicatis. Subinde sudores spontanei præsertim vespertini erumpebant, cum euphoria; cessante diarrhœa aderat adhuc febris

conu-

continua lenta, cum gravamine ventriculi & appetitu de novo dejecto: copioso nempe muco ventriculum obsidente. Ob id ordinavi Θ^* cum paucis lapid. cancr. cujus repetito usu attenuatus quidem nonnihil fuit mucus, sed non rejectus. Coactus ergo vomitorium propinare ex Syrup. emet. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. idque eo magis, quod vespera præcedente æger sponte sua varia mucaginosa excrevisset, spontaneo vomitu. Sed vomitorium nil operatum fuit, utut anxium reddiderit ægrum, muco nempe in ventriculo copioso obtundente remedii vim. Attamen copiosa hinc mucosa creatu & tussi rejicere coepit, febris lenta adhuc durante, quibus rejectis multum levatus fuit. Excrevit autem illa ex ventriculo, nam & stimulum tussis in regione scrobiculi cordis percipiebat; Ob id misturam ex ∇ hyssopi, Syrup. nicotianæ & oxymell. Scilicito ordinavi, cujus usu rejecit quidem copiosius, sed crebriores etiam secessus passus fuit. Hinc

Rx. Rad. aron. acr. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.

Lap. \mathfrak{ss} . $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. M. omni mane largam dosin cepit. Hinc ut penitus ex ventriculo eradicentur mucoginosa

Rx. Tart. acris $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. D. 40. guttæ omni mane, & vesperi; cujus usu continuato pancreaticæ denuo habuit.

CCII. Febris Quartana.

A Neillæ laboranti quartana, præmissis aliquot digestivis ex Crem. Tartari, tart. \mathfrak{G} lat. &c. ante paroxysmum dedi:

Rx. tart. Emet. gr. ij.

\mathfrak{z} dulc. gr. xv. M. Sed cum parum operaretur, die sequente:

Rx. Crem. tart. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Pulv. jalapp. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. M. qui bene operatus fuit; hinc diebus intermittentibus Elixir febril. D. Mich. bis quotidie datum est: Hinc die paroxysmi:

Rx. Θ absinth.

card. bened. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Corall. rubr. præp. gr. xv. M. pro 2. dos. sed male eam multavit, anxietates & similia pathemata inferendo. Hinc continuato Elixir. diebus intermissionis, die paroxysmi

Rx. Θ^ $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. pro 2. dos. mane & circa meridiem in Vino absinth. sumendis; sed non sufficiebat, ipsa ex repetito usu tadio affecta: ob id.*

Rx. Chin. Chin. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. Infund. in Vino absinth. $\mathfrak{M}\mathfrak{ss}$. de hoc infuso cum pulvere capiebat die ante paroxysmum, partes 3. bene tota die exercendo corpus, postmodum die paroxysmi mane & circa meridiem alteras binas partes 3. rediit paroxysmus; sed multum imminutus. Hinc

Rx. Chin. Chin. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. D. pro 2. dos. in Vino absinth. die paroxysmi assumendis; unde non rediit paroxysmus, ipsa semper die post paroxysmum lassitudine omnium membrorum afflicta. Nihilominus ejusdem pulveris $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. die paroxysmi in vehiculo vini absinth. assumendum jubeo; unde denuo cessavit paroxysmus, & omnia naturaliter redierunt. Sed cum ipsa usum remediorum negligeret, die periodico redeunte, denuo paroxysmus rediit, ob id die à paroxysmo præscripsi potiunculam ex \mathfrak{G}^ unde sexies copiosa viscida rejecit; Hinc iterum Chinam Chinam modo præscripto dedi, & altero die usurpatus hinc pulvis paroxysmum fugavit; Sed quid fit? cum continuaret adhuc semel dictum pulverem, nec rediret paroxysmus, die paroxysmum insequente anxietates præcordiorum cum difficili respiratione & æstu corporis & virium prostratione patiebatur, cum sudore insequente nocte: Hæc pathemata iterum altera vice post paroxysmi diem ex continuato pulveris usu redierunt, unde suspicabar, retardatum saltem, non vero oppressum fuisse febris motum; ita ut die insequente semper rediret paroxysmus, minerâ producti morbo si in præcordiis coacervatâ: hinc die illo, quo reverti suspicabar dictum paroxysmum, dedi vomitorium ex tart. emetico ad gr. iv. unde bis copiosissima cum levamine excrevit, unde paroxysmus, qui alias die antecedente debuisset reverti ordinario, reversus est sequente; Hinc die à paroxysmo*

Rx. \mathfrak{z} dulc. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

scammon. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. gr. v. M. Sed nihil evacuavit. Die sequente ergo:

Rx. Θ^ gr. xij.*

pulv. jalapp. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

tart. emet. gr. i \mathfrak{ss} . M. unde quater bene evacuavit, ut itaque promoverem naturæ motum febrilem, antequam ad usum Chinæ reverterer, die paroxysmi:

Rx. R bezoard. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. D. in vehiculo calido 2. horis ante paroxysmum, cujus usu post binas horas ab assumptione sudare incepit, & per 3. horas largissime sudavit, nec illo die quicquam de paroxysmo percepit. Hinc diebus intermissionis Elixir febrile assumsit, (NB. sub sudore menses per 9. septimas suppressi prodierunt, sed die sequente cessarunt) & die paroxysmi redeunte jussi, ut iterum eandem dosin Ræ eodem modo caperet; unde iterum post 2. horas satis largiter sudavit, nec illo die quicquam de paroxysmo percepit, saltem vesperi anxietates præcordiorum, & anhelitus quasi difficultatem; ob id die proximo paroxysmi dedi tart. emet. gr. iv. mane, unde quinquies per superiora purgata fuit, & à meridie R bezoardicæ $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. cum $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. Ess. opii sumsit, unde multum sudavit, & de paroxysmo nil ampli-

amplius sensit. Hinc adhuc semel die paroxysmi Rm. eandem hausit, sed hinc factum, ut die paroxysmi nihil amplius quidem perciperet, verum die post paroxysmi periodum sequente semper febris accessit, & duplicata facta fuit: sic recessit & abiit.

CCIII. *Febris quartana.*

FAmulus meus quartana simplici correptus accepit tribus vicibus ante paroxysmum pulveris rad. asari ℥ij. Erat enim debilis constitutionis: intermediis diebus ʒo ʒ p. d. quotidie bis 40. guttas. Hinc istis præmissis

℞. ∇ *menth.* ʒj.

Extr. gentian. ʒj.

~ Θ * *f.* ʒß.

Syr. card. ben. ʒij. M. capiat 3. Hor. ante paroxysmum, corpus bene tegendo, & ita aliquantulum ante paroxysmum ad sudorem se componendo, aut saltem ut totum hinc corpus æqualiter & probe percalescat: his aliquoties continuatis convaluit.

CCIV. *Febris quartana.*

EAdem contulerunt quoque ancillæ, aliis pluribus, etiam China China irritis, ita ut exinde paroxysmum totum extra lectum facile ferre posset. Terna vice pulverem asarinum & aliquot vicibus misturam ex extracto gentianæ sine ~ Θ * sed cum Extr. theriacali assumsit: quod loco hujus vi sufflaminari paroxysmi tussim siccam, cum difficili & anhela respiratione tempore paroxysmi intulit, eaque omnia ex ventriculo, quæ omisissis theriacalibus & superveniente vomitu cessarunt. Hinc

℞. ʒo *dest. caryoph.* gutt. v.
macer. gutt. ij.

sacchari albi q. s. M. F. Eleosaccharum, Cepit pro dosi in haustu ~ *menthæ*, aliquot horis ante paroxysmum, cujus semper aliquot post horas vomitus, sed cum euphoria fuit inscutus.

CCV. *Febris Quartana.*

VIt quidam patiebatur quartanam simplicem, quæ ex errore diætæ facta fuerat duplex:

℞. Θ * ʒß.

tart. emet. gr. iij. M. assumat ante paroxysmum. Hinc

℞. Θ * gr. xv.

pulv. jalapp. ʒß.

ʒo *dest. caryoph.* gr. ij. M. capiat ante secundum paroxysmum; sequebantur quinque sedes, & in omnibus his paroxysmis saltem æstus, nullum aderat frigus, adeoque erat quartana calida; Die intermissionis Elix. febril. D. Mich. bis propinabatur; Hinc denuo ante paroxysmum:

℞. Θ * gr. xv.

pulv. jalapp. gr. vij.

ʒo *dest. macer.* gr. ij. M. Habuit exinde secessus sex, inde virium debilitas; ob id ante alterum paroxysmum:

℞. Θ * ʒj.

ʒ *diaph.* ʒß. M. sudor secutus est cum euphoria, die intermissionis Elix. Mich. assumebatur.

℞. Θ * gr. xv.

ʒ *diaphor.*

Corall. rubr. præp. ana gr. viij. M. D. in duplo. pro 2. paroxysmis. Hujus adhuc continuato usu febris evanuit.

Sed haud diu quievit, quin redirent paroxysmi modo consueti, absque ullo frigoris vestigio: Hinc

℞. \odot *fulmin.* gr. v.

Corall. rubr. præp. ʒj. M. D. in duplo, ante paroxysmum sumenda: Horum usu post paroxysmum alvum aliquoties fluida, sicut etiam die intermissionis, absoluto digestionis primæ negotio, semper aliquot secessus, adeo ut fluxum lientericum metuerem; Sed nihilominus ante paroxysmum iisdem pulveribus perrexi, unde factum est; ut in duplicatura secundus paroxysmus evanesceret, durante tamen adhuc eodem modo primo: ob id

℞. *Cort. Chin. Chin.* ʒiß. D. pro 3. dos. Unam die intermissionis, reliquas die paroxysmi; qui rediit, sed mediocriter: unde altero paroxysmo instante:

℞. *Chin. Chin.* ʒj.

pulv. asari ʒj. M. pro 2. dos. Die ante, & die paroxysmi, qui non rediit; Hinc

℞. *Pulv. Chin. Chin.*

asari ana ʒj.

caryophyll. aromat. ʒß. M. pro 4. dosibus vino infundendis. Hinc die paroxysmi capiat ~ *ablinth.* ʒiß. in haustu vini absinthitis pro bina dosi, expectando horam inter eas, & hinc se ad sudorem componat: inde largiter sudavit, & de paroxysmo nihil expertus est. Sed cum rediisset, ut leviter, dedi vomitorium die paroxysmi & die intermissionis assumsit grana piperis xij. pulverisata in haustu spiritus vini; ante paroxysmum vero

℞. *Extr. gentian.* ʒj.

ʒ *diaphor.* ʒ gr. ix.

Laud. op. gr. iß. M.

Capiat crebrius cum jejunio. Sic nunquam rediit.

CCVI. *Tertiana duplicata scorbutica.*

VIr laborabat tertiana duplicata scorbutica cum gravibus symptomatibus:

℞. *Gumm. Tacamah.* q. s. Malaxetur

c. s. q. Bals. Peruv. Inducatur super alutam F. scutum stomachale. Irroretur

ʒo *dest.*

- ℞. *Decoſt. menth.*
cumin. ana q. ſ.
Decoſt. hord. c. rad. ſcorzon. lbſſ.
Elect. diſcord. Fracaſt. ʒiſſ.
~ cochlear. ʒſſ.
Syr. Corall. Quercet. ʒvj.
~ ① dulc. q. ſ. pro acore ſubtili. M.
Arcan. duplic. ʒj.
ʒ diaph. ʒſſ. M.
Decoſt. carmin. uſit. ʒix.
Elect. de bacc. lauri ʒj.
℞. decoſt. cumin.
carvi ana gutt. ix.
① tart. ʒij.
vitell. ov. N. j. M. pro Clyſmate
menth. ʒij.
carminat. ʒj.
*~ ① **
cochlear. ana ʒſſ.
① ʒt. gr. xv.
ʒ diaphor. gr. vij.
Syr. cydon. ʒvj. M.
Arcan. dupl. gr. xv.
Magiſt. Corall. c. ſucc. citr. ʒſſ.
℞. decoſt. caryoph.
cinam. ana gt. j. M.
rub. idci.
Scorzon. ana ʒj.
Cordial. Herc. Saxon.
carminat. ana ʒſſ.
Succ. citri rec. ʒvj.
~ theriac. camphor. ʒiſſ.
Confeſt. Alcherm. ʒi.
Syr. acetof. citr. ʒſſ.
~ ① dulc. q. ſ. M.
℞. decoſt. macer. ʒj.
caryoph. ʒſſ.
expr. nuc. ʒſſ. M. pro ſtomacho.
① ʒt.
Arcan. dupl. ana gr. xv.
Corall. rubr. præp.
ʒ diaphor. anagr. vij. M. pro 2. do-
ſibus.
Decoſt. tamarind. cum paſſul. lbj.
Syr. acetof. citr.
corall. Quercet. ana ʒj.
R. fl. bellid.
tunic. ana ʒj. M. pro Julebo.
*~ ① * ſimpl. ʒij. D. 40. guttæ.*
Empl. febril. Strobelb. ʒſſ. Malax.
c. ſ. q. ʒ. ſcorpion. comp.
deſt. rut. ana gt. v. M. applice-
tur pulſibus.

CCVII. *Febris lenta continua.*

FOEmina ex tertiana 16. ſeptimanarum antecedentis anni male curata continuam lentam cum typo tertianæ duplicatæ contraxerat, quæ tandem in tertianam duplicatam intermittentem fatiſcebat; Filia vero ejus con-

Tom. II. Pars 2.

tinuam lentam tertianam ſeu periodicam cum levi horroſis veſtigio ingruente Paroxyſmo habebat, non tamen intermittebat, ſed ſaltem remittebat. Optime contulit in Matre:

- ℞. *① tart. Eſſentif. ʒj.*
ʒ diaphor. ʒſſ. M.
Card. Bened. ʒiij.
Cinamom. ʒiij.
① tart. Eſſentif. ʒſſ.
Maxill. Luc. piſcis ʒj.
Syr. helotyrb. ʒſſ. M.

Pro Filia

- ℞. *MPill. de Trib. gr. xij.*
Tart. Emet. gr. j. M.
c. ſ. q. decoſt. menth. F. Pilulæ ante
exacerbationem ſumendæ.
Elix. propr. ſ. ʒd. ʒiſſ.
*~ ① * ſimpl. ʒiv. M. D. 40. guttæ ter*
in die. Tandem in Matre ſinem impoſuit vi-
num medicatum ex ChinaChina cum ① tart.

CCIIIX. *Dolor brachii poſt febrem.*

FOEmina febre continua ſed quaſi tertiana duplicata periodica laborans, cum convaluiſſet, (poſtquam in toto morbi curſu graviffima cephalalgia laboraverat, qua alias habitualiter conflictabatur) corripitur acerbiffimis doloribus humeri ſiniſtri infra articulum ſuperiorem, fere in medio oſſis humeri cum aliquali tumore: Dolor erat continuus, noctu acerbius affligens, quaſi forcipibus os confringeretur, contundens, oſtocopos, lacerans, & ad extremos uſque digitos lancinans, cum partium muſculoſarum intus thoracem verſus ſpectantium aliquali tumore. Tentata pro doloris lenitione plura, ſed omnia fruſtra v. g. *Emplaſtr. de Ran. c. ʒ. ſuſſitus*, litus cum ~ ① *. Tandem

- ℞. *Empl. de Cicuta ʒj.*
*G. * in ʒ ſol. ʒſſ.*

c. ſ. q. ʒ. *Phil.* F. Emplaſtrum, cujuſ uſu tumor auctus fuit cum rubedine, ita ut ad ſuppurationem vergere inciperet; Hoc viſo cataplaſma ex *ſem. lin. & farina ſecal.* in lacte coctis, addito pauco Sapone Veneto ſub cataplaſmatis forma impoſuit, ſæpiuſque reitervavit. Sed cum lac facile acceſceret, cereviſiam lupulatam ei ſubſtitui; aſt cum ſic tardius emolliri & ſuppurari videretur tumor, imponit *Empl. diachyl. c. gummiſ*; cujuſ uſu continuato tumor ſuppuratus & apertus fuit, ſicque abſceſſus poſt copioſiſſimi puris evacuationem fuit curatus. Hinc collegi:

1. Quod poſt morbos acutos qui ſuperveniunt dolores in parte cum aliquali tumore, non niſi ſuppuratione ſint curandi.
2. Quod hi tumores ſint quaſi Criſes per meſtaſin.
3. Idque eo magis ſi ante vel in morbo dolor [Fff] cujuſdam

cujusdam partis gravior adfuerit, sed qui post morbum curatum evanuerit, quem iste in alio loco exceperit.

CCIX. *Febris Quartana.*

Quartanâ affecto febris propinavi primum Afarum, quod sine vomitu per inferiora tantum purgavit: deinde cum rigore ante Paroxysmum nimis gravi afficeretur, præscripsi linimentum ex ϕ o N. M. & oleis quibusdam destillatis stomacho applicandum, superimposito latere, ne odor adeo facile expirare possit: unde rigor omnino remisit, nec in sequentibus Paroxysmis rediit; unde rigorem hunc ex stomacho ortum fuisse conludebam. Tandem

\mathcal{R} . ocul. \mathcal{E} . præp. \mathfrak{z} ij.

sacch. \mathfrak{h} \mathfrak{z} ss, M.

Sic pulvere oculorum \mathcal{E} ad 14. dies continuo in ∇ decoct. Card. Bened. propinato, contumacem aliquot mensium quartanam curavi.

CCX. *Dysenteria.*

Vir incurrebat dysenteriam ex esu prunorum, cum potu frigido desuper haurito; hac utcunque sed non ex radice curata aliquot abhinc septimanis incurrit in inflammationem & suppurationem tonsillarum; hac curata superveniunt dolores graves lancinantes in genu dextro cum tumore in anteriori loco, hinc & in talo dextro: post aliquot dies etiam genu sinistrum affligitur, hinc & illius cruris talus. Dolores erant fere vagi, nunc plus nunc minus vexantes, nunc atrociores in uno, nunc in altero; tumor nunc intensior, nunc remissior; pluribus tentatis sub Chirurgo sed frustraneis, crure dextro ad atrophiam declinante, ego præmissis Vomitorio præscribo:

\mathcal{R} . Lap. osteocoll. \mathfrak{z} j. D. pro 2. dosibus in vehiculo aceti capiendis. Item

\mathcal{R} . Lap. \mathcal{E} . præp.

osteocoll. ana \mathfrak{z} ij. M. pro 2. dosibus.

Externe

\mathcal{R} . ∇ artic. ad Extr. \mathfrak{z} iss.

$\sim \Theta * c. \Psi$ \mathfrak{z} j. M. præmissis loci affecti & dolentis affricu, illinatur, qui bene profuit, sed inconstans effectus, malo subinde recrudescente; internis his insisitebat, & externa continuabat, sed cum malum perfecte cedere noller, præmissa denuo purgatione supra & infra, corpore cacochymico existente,

\mathcal{R} . ∇ fl. sambuc. \mathfrak{z} j.

\star vini \mathfrak{z} ij.

Theriac. \mathfrak{z} ss.

\mathfrak{z} diaph. gr. xv. M. capiat expectando sudorem; hancque potionem alternis diebus continuavit, intermedio tempore Rob juniperi mane & vesperi usurpato. Externe

\mathcal{R} . ϕ o dest. terebinth.

junip. ana q. v. Illinantur loca dolen-

tia & tumentia, quod omnia inter externa contulit: quibus continuatis convaluit. Scilicet

1. Fermentum dysentericum contenta inquinavit, unde in tonsillis tumor & inflammatio, in articulis ista pathemata.

2. Quæ quasi ad naturam arthritidis vagæ accesserunt, ipso ægro ad scorbutum forsitan inclinante.

3. Nam & in brachio aliquando aliquid percipere incipiebat, & alio tempore maxillarum inferiorum motus inminui & cum dolore quasi spasmodico corripi cœperant.

CCXI. *Bubo Veneretis.*

Laborabat quis bubone venerico, præscripsi \mathcal{R} . Empl. de Ran. c. \mathfrak{z} q. s. Malaxetur cum ϕ o dest. Guajaci, applicetur quotidie bis, una cum purgatione ϕ li. Hinc

\mathcal{R} . Empl. diachyl. cum gummi. \mathfrak{z} j.

magnet. arsenic. A. Salæ \mathfrak{z} ss.

Malax. cum ϕ o dest. guajac. q. s. applicetur.

Hinc Chirurgus applicavit cataplasma, aperuit tumorem: Interne vero decoctum ex L. juniperino, Cort. L. Guajac. & ceteris usitatis, bibit sedulo, & omni mane largiter sudavit, cum interposita purgatione ϕ li.

CCXII. *Febris petechialis.*

Vir juvenis die \mathfrak{z} persentit horrorem; Die \mathfrak{z} lassitudinem omnium membrorum, cum insigni capitis dolore, siti, & oris siccitate; Capit proprio nutu Pilulas cephalicas, circa meridiem accedens ordino:

\mathcal{R} . ∇ menth. \mathfrak{z} ij.

Syr. emet. \mathfrak{z} ss. M. pro sequente die.

Ab usu enim pilularum habuit circa meridiem vomitum unum & bonam purgationem.

Die \mathfrak{z} a vomitorio octies supra & toties infra purgatus fuit. Pro nocte sequente

\mathcal{R} . ∇ scordii \mathfrak{z} ij.

\star sambucin. \mathfrak{z} ss.

Theriacæ \mathfrak{z} j.

\mathfrak{z} diaphor. \mathfrak{z} j. M. pro 2. dosibus.

Die \mathfrak{h} \mathcal{R} . C. C. s. Δ . \mathfrak{z} ss.

Bezoard. min. \mathfrak{z} j.

ϕ o camph. gr. v.

dest. succin.

cort. citr. ana gr. j. M.

pro 2. dosibus.

Fauces erant aridæ & squalidæ, caput turbidum, æstus moderatus. Nox insequens inquieta, cum incipiente delirio.

Die \odot . Symptomata eadem, rubet facies insigniter, pulsus celer, frequens, parvus, inæqualis.

\mathcal{R} . Liquor. C. C. succinat. \mathfrak{z} iss. D. pro 2. dos. a prima dosi æstus intensior, hæmorrhagia larga, quam rubor faciei præmonstraverat; petechiæ in manibus, symptomata cetera eadem; Potus erat cerevisia secundaria cum vino; Pro Fauçibus una cum iis, quæ Chirurgus ordinabat:

\mathcal{R} . Mu-

℞. *Mucilag. cydon. c. spermat. ran. extr.* ʒi.
Rob dianuc. ʒß.
 ☉ ʒi. M.

A meridie alteram spiritus dosin sumsit,
 copiosioribus prorumpentibus petechiis;
 symptomata eadem, vesperi

℞. *∇ fl. papav. rhæad.* ʒij.
sambuc. ʒj.

Ebor. f. Δ

bezoard. min. ana gr. xv.

☉ *volat. C. C.* gr. xij.

Syr. discord. ʒß. M.

Die ʒ

℞. *pulv. bezoard. Mich.* gr. xvj.

☉ *volat. C. C.* gr. viij.

☉ *pestil. Henif.* gr. vj. M. D. in triplo.

Hoc ipso die iterum hæmorrhagia, nox
 inquieta, delira, symptomata cætera eadem.
 Die ʒ.

℞. *Liquor. C. C. succin.* ʒiß. D. pro 2. dos.
 Vesperi

℞. *pulv. bezoard. Mich.* gr. xv.

Cinnab. ʒ ʒß.

☉ *volat. C. C.* gr. jv. M.

Nox pessima, delira, summe inquieta,
 &c. mane incipientes convulsiones,

Die ʒ septimo scilicet morbi

℞. *C. C. f. Δ* ʒj.

bezoard. min. ʒß.

ʒ *epilept.* ʒl. gr. j. M. Symptomata
 eadem: A meridie Hor. III. cepit *Liqu. C. C.*
succin. 40. gutt. Habuit secessus 4. de cætero
 per totum morbi cursum ☐ semper cruda, sa-
 norum simillima. Vesperi

℞. ʒ *bezoard. Mich.* gr. xij.

☉ *volat. C. C.* gr. v.

Cinnab. ʒ ʒß. M.

Post mediam noctem *Liquor. C. C. suc-*
cin. gutt. 40.

Die ʒ Nox prægressa tolerabilior ratio-
 ne delirii, sed convulsiones ingravescentes; ob
 id mane idem pulvis & spiritus idem assumtus:
 vesperi propter nimias faciei & manuum con-
 vulsiones graves vesicatorium utrique bra-
 chio prope carpum in parte extrema applicare
 iussi: Interne

℞. *∇ pæon.* ʒij.

~ *vini camph.* ʒj.

Matr. perl. præp. ʒij.

bezoard. ʒr. ʒj.

Syr. fl. tun. ʒij. M. pro 2. dosibus: una
 ante, altera post mediam noctem capiendis:
 Nox quietior, cum somno, licet interdum
 interrupto: vesicatoriorum Effectus insignis,
 convulsiones mane longe mitiores.

Die ʒ propter vires

℞. *∇ pæon.* ʒij.

~ *vini camph.* ʒiß.

C. C. f. Δ

Matr. perl. ppt.

Tom. II. Pars 2.

ʒ *diaph.* ana ʒj.

Conf. Alcherm. ʒiß. M. reiteretur
 vesperi, unde melius habuit; Convulsiones
 mitiores:

Die ʒ Nox paulo inquietior:

℞. *Liqu. C. C. succin.*

℞ *Corall. c.* ~ *Cord. Cerv.* ana ʒj. M.
 D. bis hac die 50. guttæ; vesperi potio reiterata.

Die ʒ. Nox bona, Convulsiones & cæ-
 tera symptomata cessabant, hinc

℞. *Liqu. C. C. succin.* ʒij. D. 40. guttæ,
 ter in die.

Die ʒ omnia meliora, spiritus idem con-
 tinuabatur.

CCXIII. Tumor testis.

V Ir laborabat tumore testis sinistri, du-
 ro, ingenti, inveterato, cum super-
 veniente insigni dolore & æstu subitaneo.

℞. *∇ ʒ rec.* ʒß.

spirit. vin. camph. ʒß,

sacchari ʒ ʒß.

cerussæ ʒi. M. pro Epithemate.

Alio tempore præscripti:

℞. *∇ ʒ* ʒß.

~ *vini camph.* ʒiß.

sacchar. ʒ ʒß.

opii in ~ vin. sol. ʒj. M.

Hinc sedato quasi Paroxysmo

℞. *Ungu. dialth.* ʒiß.

Bals. Δ terebinth. ʒij.

☉ *Philosoph.* ʒiß. M.

Præmissio semper tota seu suffitu ☉ vini, il-
 linatur mane & vesperi, idque ad imitationem
 Timæi. Deinde

℞. *Empl. de ran. c.* ʒ. ʒiß. applicetur.

Hinc animus erat ad salivationem levem &
 successivam accedere; Interdum propter
 æstum & dolorem renum ac clamorantem sitim
 cum doloribus abdominis præter clysmata
 profuit mistura polychresta ex ☉ & *Lapid.*
 ☉ & *opio.*

CCXIV. Morbilli.

P Uer 4. præter propter annorum, corripi-
 tur Menf. Junio diarrhœa crebra, citra
 causam manifestam, adest simul febris tertia-
 na intermittens duplicata, anno isto quasi en-
 demia, quæ omni vespera hor. iv. prægresso
 levi horrore æstu diuturno plus minus intenso
 pergit, cum siti. Die 8. vel 9. æstus fit conti-
 nuus, utut statò tempore febris intermittens
 etiam horrore solito se manifestaret; Suspi-
 cantur ergo parentes, quod morbilli sint
 prodituri, quia jam soror ejus iisdem mo-
 do convaluerat. Nocte ergo inter diem ʒ
 & ʒ media erumpunt morbilli, & copio-
 sius die sequente; nocte sequente & die ʒ
 perstant, sed durante febre intermittente &
 diarrhœa. Nocte inter diem ʒ & ʒ
 ex negligentia forsitan vigilis infans ob
 [Fff 2] æstum

æstum alia loca frigidiora subinde quærens, ab aëre externo nimium refrigeratur, adeoque omnes morbilli penitus evanescunt, & ne vestigium eorum apparuit, alvi fluxus intenditur, cum gravissimis supervenientibus torminibus, excreta mucosa & cruenta, s. erat dysenteria, cum siti clamosa, infante saltem cerevisiam secundariam frigidam pro potu urgente. Parens propinat *Essent. theriac. simpl.* & abdomini applicat *Emplastr.* ex Theriaca simulque omni modo sudorem & per hunc morbillos provocare studet; sed frustra, ne gutta quidem elici potuit. Consultus suadeo clysmata ex lacte, item

℞. *pulv. hepat. viper.* ℥ij.

C. C. *ust.*

Boli Armen. ana ℥j.

Extr. Croc. gr. viij. M. pro 4. dosibus.

Circa meridiem primum clysmata ex lacte caprino applicabant, quod ad vesperam usque retinet, & saltem lac coagulatum & grumosum reddit: nocte appetente aliud applicant, & retinetur usque ad mediam noctem; ubi de pulveribus dosin unam præbebant, post cujus usum aliquandiu post naturalem sedem seu secessum, sed horribiliter foetentem habet; jussi simul, ut gelatinam C. C. vel potius priapi cervi in potu crebro darent, sicque paucis diebus convaluit, nil de morbillis denuo ne vestigio quidem apparente.

CCXV. Febris maligna ex Tertianâ simplici.

Virex febre tertiana simplici circa quartum Paroxysmum in continuam malignam incidit; post primum Paroxysmum præscripsi:

℞. *Crem. tart.* gr. xvj.

tart. Glut. gr. viij.

Rhab. elect. ℥ß.

Scammon. præp. gr. ij. M. pro dosi.

Item

℞. *R* ℥ ℥ij. D. 40. guttæ.

℞. *fl. papav. rhæad.* ℥ij.

℥ ℥vj.

Lapid. cancr. præp. ℥j.

Syr. rub. idæi ℥vj. M. Capiatur in &

extra Paroxysmum, nam frigus erat leve, æstus vero ultra 12. Hor. urens magis interna & fauces exsiccans, quam extrinsecus se diffundens: repetita fuit hæc potio.

℞. *fl. papav. rhæad.* ℥ij.

succ. rub. idæi ℥ij.

℥ *diaphor.* ℥j.

Syr. papav. rhæad. ℥vj.

~ *Q dulc.* ℥j. M. pro usu in Paroxy-

smo præcipue. Cum E. febris fieret continua, & ego mala suspicarer:

℞. *fl. sambuc.* ℥ij.

~ *rutac.* ℥ij.

Theriac. ℥j.

℥ *diaph.* ℥ß.

Syr. acetos. citr. ℥ijß. M.

℞. *Lap. & præp.*

Antihæc. Poter.

Arcanduplic. ana ℥j. M. pro 2. dosib.

℞. *fl. papav. rhæad.* ℥ij.

R fl. bellid. ℥ij.

C. C. *f. Δ* ℥ß.

bezoard. min. ℥j.

Syr. papav. rhæad. ℥vj. M.

Hactenus ☐ semper cruda, & cum omnia febris malignæ nunc adessent indicia, ob id

℞. *Bezoard. min.*

specif. cephal. ana ℥j.

~ *volat.* C. C. gr. xvj.

~ *pestil. Hænis.* gr. viij. M. pro 2. dosib.

℞. *fl. Ceras. nigr.* ℥ij.

Liquor. C. C. *succin.*

C. C. *ust.* ana ℥ß.

Syr. rub. idæi ℥ij. M. capiatur unâ cum isto pulvere; pulvis & potio aliquoties reiterata fuerunt, singulari cum effectu.

℞. *Ebor. f. Δ.* ℥ß.

specif. cephal. ℥j. M. pro 2. dosibus.

℞. *Ebor. f. Δ.* ℥ß.

Bezoard. min. ℥j.

~ *volat.* C. C. ℥ß. M. pro 2. dosibus.

℞. *Lapid. & præp.*

Ebor. f. Δ ana ℥ß.

~ *volat.* ☐ gr. vj. M.

℞. *R tart. compos.*

~ *Θ * anis.* ana ℥ijß. M. Convaluit.

CCXVI. Colica Convulsiva.

Vir ventriculi frigidi & debilis ac Colicæ Convulsivæ obnoxius habituali, quam facili occasione, & vel cerevisiæ non adeo laudabilis, nec exacte defecatæ contrahebat, post tertianam intermittentem, qua aliquot septimanas laboraverat curatam, ex musti recentis mediocri potu & uvarum recentium paucarum esu gravem Colicam Tenesmodem incurrit: h. e. tormina insignia circa umbilicum, creberrimusegerendi alvum, frustra neustamen conatus, dolor compressivus in ano & antè in regione inguinali, quasi ☐ emitti non possit, alvus contumax, nisi clysteribus & insuper suppositoriis proritaretur, quibus pauca mucosa, sed cum levamine ejiciebantur, sed continuo reiteranda erant. Causam putavi mucum acidum viscidum tartareum, reliquias febriles a musto acefcente & fermentante commotas, adeoque Colicam Convulsivo-pituitosam tenesmodem inferente: appetitus nullus, sitis, subinde singultus: præter clysmata carminativo-emolliens.

℞. R.

℞. *R̄ Comp.* ʒij.

~ *Θ* anis.*

Ess. opiana ʒj. M. D. 40. guttæ.

℞. *Empl. matric. de galbano* p. ij.

Tacamah. p. j. Malaxetur

cum galbaneto Paracelsi. Sed frustra hæc omnia.

℞. *Maxill. lucii pisc.* ʒß.

pulv. conchar. pulveris. ʒj.

⊙ *fulmin.* ʒß. M. pro 2. dosibus: unam cepit vesp̄ri, & alteram mane, pro scopo dissolvendi & abstergendi humorosum & aperiendi alvum, sed frustra. Interea pro ventriculo & viribus & singultu

℞. *Q. E. menth.*

cinam. ana ʒj. M. D. 20. guttæ, bis vel ter de die. Tandem

℞. *G. * in * solut.* ʒß.

Extr. gentian.

⊙ *fulmin.* ana gr. viij.

Troch. Alband. gr. ij.

Scammon. præp. gr. j.

c. f. q. de dest. succin. F. Pilulæ pro 2. dos. Prima optime operata fuit, mucosa, hinc tenuia tarde sed optimo cum levamine evacuans: cum pulveres illi pridie jam materiam disposuissent, pro potu frigido & noxio corrigendo

℞. *Θ volat. aromat.* ʒß.

~ *carminat.* ʒß. M. D. 20. guttæ.

in haustu potus ordinarii aliquoties omni p̄stu repetendo; Hisce convaleuit. Sed cum recidivaret post aliquot septimanas morbus, ob expositionem auræ liberioris & iter præmaturum, ob viscidum dissolvendum:

℞. *R̄ G. ** ʒij.

Ess. Castor. ʒß. M. D. 50. guttæ bis in die.

℞. *Fl. ♀* ʒij.

Extr. castor. ʒß.

⊙ *fulmin.* gr. vi.

℞. *de dest. chamomill.* gutt. iv. M. pro 2. dosibus. Dolores inde remiserant, sed alvus pertinaciter clausa cum conatu & hinc dolore compressivo & stimulante in regione pubis:

℞. *Rad. acorinosr.* ʒvj.

fol. fenn. f. st. ʒß.

⊙ ʒj.

Zingiber. ʒß.

Incis. Contus. D. Infund. in. Mens. ß. & com. fervida, refrigerat paulatim, Bibatur pro lubitu: optime contulit.

CCXVII. Tumor abdominis Infantis.

PUella 1. anni aliquot septimanis jam ablactata, patiebatur tumorem abdominis tympaniticum, universum abdomen cum præcordiis occupantem, appetitus deficiebat, secessus plures vitiosi: Plura tentata sed frustra: superveniunt repetitæ convulsio-

nes Epileptica, unde pulverem cum ⊙ fulmin. præmissi, & clysmata aliquot applicari jussi, interpolatis vicibus Liquorem C. C. succinatumin vehiculo sequenti:

℞. *menth.* ʒß.

Cinam. ʒj. M. simul interponendo.

Quibus Epileptici quidem insultus cessarunt, sed idem abdominis tumor perstitit: pro quo tandem levando ad imitationem Sylvii & Barbette interne quotidie Liquor. ☿ fol. tart. ad 30. gutt. bis usurpavit; Externe vero omni mane & vesp̄ri

℞. *Ungu. de alth.* ʒß.

℞. *chamomill.* ʒij.

Philosop. ʒj.

dest. cumin. ʒj. M.

abdomen illinivit, sicque convaleuit.

Notabile est, quod post usum ⊙ fulmin. semper primo somnum caperet; & hinc cum evigilasset, vomitus, & materiæ horridæ secessus. Erat affectus, qualem Sylvius de abdominis doloribus, & Barbette de Atrophia infantum describit.

CCXIX. Tumor abdominis Infantis.

PUer 5. annorum febre tertiana duplicata afflictus & sine cura relictus, ita ut tempore paroxysmi ederet & biberet: Unde febris illa pertinax & abdomen insigniter intumescere coepit: pro Cura præmissum aliquod vomitorium, quod subinde reiteratum, hinc dabatur Elixir febrile Michaëlis, de quo quotidie bis assumsit 40. guttas, cum regimine diætæ in & extra paroxysmum: & sic intermittentes evanuerunt: Sed post unam alteramve septimanam cum largiter puer comedisset, febris continua lenta cum abdomine tumido & in hypogastrica regione præsertim duro, ac dolente, cum affligere coepit, cum tussi & materiæ viscidæ rejectione, quæ omnis ex ventriculo erat; præmissio vomitu usurpavit saltem Liquor. ☿ fol. tart. 40. gutt. bis quotidie, & quidem repetendo crebrius: Interposui laxationem, per ⊙ fulmin. gr. ij. additis arcano duplicato & lapidibus ☿. idque bina vice, externe litum:

℞. *Unguent. de alth.* ʒij.

℞. *chamomill.* ʒj.

dest. junip. ʒß.

philosoph. ʒj. M.

quo mane & vesp̄ri totum abdomen inunctum fuit, & ita convaleuit.

CCXIX. Diarrhœa torminosa.

FOEmina corripiebatur diarrhœa torminosa gravi, spontanea, cum Mensium fluxu, idque ex ventriculi vitio:

℞. *Conserv. menth.*

Diascord. Fracast. ana ʒij.

Rhabarb. el. ʒj.

[Fff 3]

Corall.

Corall. rubr. præp. ℥ij.
c. f. q. Syr. corall. Querc. F. Electuari-
 um, de quo capiat crebrius.

℞. *Eff. tormentill.* ℥ij.

opii ℥β. M. D. 40. gutt. ter in die.

Item assumsit vitellum ovi ad duritiem
 Cocti cum + rosaceo, quo semel per bidu-
 um quotidie unum capiendo cum ista tinctu-
 ra usâ fuit. Cessârunt sic secessus, sed tor-
 mina in ventriculi & umbilicali regione, item
 aliqualis cardialgia & inflatio ventriculi cum
 anorexia illam cruciabant, imprimis tormi-
 na subinde recurrentia eam affliciebant.

℞. *Q. E. Cinam.* ℥ij. D. 30. gutt. bis in
 die, sicque omnia huius usu evanuerunt sym-
 ptomata, ipsaque convalescit.

CCXX. Febris Quartana. Hætica.

VIr scorbuticus, hypochondriacus ad he-
 tîcam declinans, Quartana laborabat,
 eaque lenta, cum incipiente pedum œdema-
 toso tumore

℞. *Liqu. ☞ fol.* ℥β.

~ *Cochlear.* ℥i. M. D. 50. guttæ
 bis in die.

℞. *Ebor. f. Δ*

Arcan. dupl. ana gr. xv.

☞ *diaphor.* gr. v.

☉ *fulmin.* gr. ij. M. D. ante paroxys-
 mum. Continuavit hæc aliquoties & ali-
 quandiu: Hinc

℞. *Elix. Propr. f. + d.* ℥iβ.

~ ☉ *simpl.* ℥iβ. M. D. 40. guttæ
 omni mane & à meridie. Hinc die paroxys-
 mi mane cepit bonum haustum:

℞. *fol. fenn. f. st.* ℥β.

Rad. acor. ver. ℥vj.

☉ ℥i.

Zingiber. ℥β.

Incis. Contus. includ. nodulo, infund.
 in Mens. j. ∇ fervent.

Vesperis vero ante paroxysmum:

℞. *Arcan. dupl.* ℥β.

Ebor. f. Δ

Corall. rubr. præp. ana gr. vj.

☉ *volat.* C. C. gr. v.

☉ *dest. caryoph.*

macer. ana gr. j. M.

Hæc per plures dies ita continuavit. Hinc
 cum Elixire isto omni pastu propter flatulen-
 tias

℞. ~ ☉ *anis.* ℥ij.

☉ *volat. aromat.* ℥i. M. D. 30. gut-
 tæ in omni pastu. Cum sic remitteret frigus
 & calor lentus saltem in paroxysmo affligeret,
 unâ cum istis ante paroxysmum

℞. ☉ gr. xv.

Corall. rubr. præp.

☞ *diaph.* ana gr. vij.

☉ *dest. macer.* gr. j. M.

Profligato sic maximam partem morbo.

℞. *MP. de Trib. Ruff.* ℥β.

Extr. belleb. N.

☉ *Glat.* ana gr. v.

c. f. q. Tart. acris. F. Pilulæ, quas assum-
 sit ante paroxysmum, & operatæ sunt bene,
 sed paroxysmus fortior, sine tamen frigore;
 Hinc die intermissionis Elixir istud & ~m vo-
 latilem assumsit, sed ante paroxysmum

℞. *Corall. rubr. præp.*

Lap. ☉ præp.

☉ *absinth.* ana ℥β.

☉ *volat.* C. C. gr. vj.

☉ *dest. macer.* gr. j. M.

Cujus usu imminutus fuit ille, & tandem
 repetita tertia vice cessavit. Unde sub hac
 morbi declinatione mane ☉lia, ut R ☉. ☉
 Zwelfferi, item solutio ☉ c. succ. pomor. &
 ~Cochlear. pro robore viscerum; Vesperis

℞. *Elix. febril.* ℥iij.

Eff. myrrh. ℥i. M. Pro acuenda bile, &
 omni pastu ista volatilia usurpavit propter affe-
 ctum hypochondriacum. Cum vero redi-
 ret paroxysmus mediocris absque horrore,
 saltem calore lento molestus: istis intermis-
 sionis die continuatis, die paroxysmi præscri-
 ptæ pilulæ ante meridiem, & vesperi

℞. ☉ *

specif. cephal. ana ℥β.

Corall. rubr. gr. v.

☉ *dest. caryoph.*

macer. ana gr. j. M.

Sic nunquam rediit.

CCXXI. Tussis convulsiva. Singultus.

FOEmina tussi sicca stomachali & singultu
 gravi, utroque convulsivo ex consensu
 splenis laborans (erat enim ratione hæreditatis
 maternæ splenetica & sensum pulsationis in
 sinistro hypochondrio percipiebat) una cum
 vespertinis insultibus epilepticis: præscribe-
 bam in paroxysmo graviori singultus:

℞. ∇ *pæon.*

menth. ana ℥iβ.

Liquor. C. C. *succin* ℥i.

Unicorn. ver. præp. ℥β.

Ebor. ust. ℥j.

Eff. opii ℥β.

Syr. pæon. ℥iij. M. Capiat pro lubi-
 tu. Pro fomite vero viscido eliminando:

℞. *Arcan. dupl.*

Corall. rubr. præp. ana ℥β.

☉ *fulmin.* gr. ij.

Troch. Alband. gr. j. M.

℞. *Solut. ☉ c. succ. pom.* ℥iij.

~ *cochlear.* ℥i. M. D. 30. guttæ

omni mane: vesperi vero sub introitu lecti

℞. ~ ☉ ℥iij.

Cochlear. ℥i. M.

Interjecto tempore aliquando Pilulas
 Sylvæ

Sylvii ex G. * cum Θ l. & ufa fuit cum euphoria.

CCXXII. *Melancholia Hypochondriaca.*

VIr Melancholia hypochondriaca affectus cum gravissimis præcordiorum anxietatibus per intervalla recurrentibus, & tentationibus spiritualibus obstinatissimis

R. *Liqu. & Or.* \mathfrak{z} ij.

R. *Liqu. & fol. tart.* \mathfrak{z} ß. M. filtra D. 20. guttæ omnimane.

R. *Ess. G. & Q. f.* \mathfrak{z} ß. D. 40. guttæ omni vespera. His alternis diebus interponebat nodulum alterativum & aliquoties laxantem. Horum usu per octiduum continuato, cum non melius sed pejus omnino haberet:

R. ∇ *menth.*

fænicul. ana \mathfrak{z} ß.

~ vini camph. \mathfrak{z} ß.

solut. & c. succ. pom. \mathfrak{z} ij.

Syr. fl. tunic. \mathfrak{z} ß. M. pro lubitu capiat, quocunque tempore interdiu atque noctu præcordiorum anxietates urgerent; paucis diebus 24. vicibus eam præparare curavit, at sine notabili fere levamine:

R. *Arcan. dupl.* \mathfrak{z} ß.

Corall. rubr. præp. \mathfrak{z} j.

Camph. gr. v. M. pro 2. dosibus.

R. *Arcan. dupl.* \mathfrak{z} j.

Sacchar. B. \mathfrak{z} ß.

Camph. gr. v. M. Cepit vesperi, optime contulit: Hinc

R. ∇ *fumar.* \mathfrak{z} ß.

Syr. emet. A. salæ \mathfrak{z} j. M. Cepit Hor. secunda nocturna, sed sine ulla sensili alteratione, cum alias facillimæ tamper superiora quam inferiora esset solutionis: unde mane Hor. vii. eodem die eandem dosin repetiit, sed frustra sine vomitu, saltem subinde secessus quosdam movit. Ob id

R. *Fl. chamomill.* Mj.

Rad. levist. \mathfrak{z} j.

sem. anis. \mathfrak{z} ß.

Bacc. junip. \mathfrak{z} vi.

Coqu. in f. q. \square hum. Colat. \mathfrak{f} bj. adde

Elect. hier. c. agar. \mathfrak{z} ß.

Mell. ql. \mathfrak{z} j. M. F. clysmâ pro 2. vicibus eodem mane applicandis: Sed à meridie iterum totum hoc 2. vicibus sibi applicari iussit patiens, copiosa & flatulenta rejecit, cum euphoria: Hinc vesperi Hor. v.

R. *Arcan. dupl.* \mathfrak{z} j.

sacchar. B. \mathfrak{z} ß.

Camph. gr. v. M. D. in 2plb. sequenti mane venam in brachio aperire iussit, ipso multa bibente & vasa manuum semper turgida & tumida habente, cum euphoria. A meridie eundem pulverem cepit. Item

R. *Liqu. & Or.* \mathfrak{z} ß. D. 20. guttæ omni mane; A meridie adhuc unum pulverem,

idque semper cum euphoria. Hinc cum scorbura in urina nunc clarescente, quæ antea semper fuerat turbida, se exhiberent, omni mane illum Liquorem, & à meridie & sub introitu lecti sequentem spiritum assumsit:

R. \sim Θ * f. \mathfrak{z} ij.

Cochlear. \mathfrak{z} j. M. D. 40. guttæ.

Continuavit hæc ipsa aliquandiu, interdum loco Liquoris hunc potum interponendo:

R. *Passul. min. conquass.* \mathfrak{z} ß.

Ebull. in f. q. & com.

Colat. fervent. in fund.

Fol. senn. f. st. \mathfrak{z} ij.

Crem. tart. \mathfrak{z} j. Stent in loco tepido per noctem, mane

R. *Colat. f.* \mathfrak{f} bj. D. Hinc cum hæc optime conducerent:

R. *Arcan. dupl.* \mathfrak{z} ß.

sacchar. B. \mathfrak{z} ß.

Camph. gr. xij. M. de quo capiat omni mane bonam dosin cultello, vesperi & noctu spiritum unâ continuando: sicque convaleuit.

CCXXII. *Febris Quartana.*

VIr laborabat febre quartana diuturna cum phlogosi & æstu, revera scorbutico, hæmorrhagia narium, alvo obstructa, &c. Tandem profligata fuit febris præmissio tart. Glato cum \mathfrak{z} diaphor. Θ l. usurpando omni intermissionis die 20. gutt. Liqu. & Or. mane: Die vero paroxysmi jejunando & aliquot horas ante invasionem Infus. sol. sennæ cum Θ \mathfrak{z} capiendo: bibendo desuper urgente æstu serum lactis depuratū & cum fol. salviæ ebullitum, vel cum succo citri acidulatum; cujus usu ter fere alvus soluta fuit, alias saltem semel, & hac methodo per aliquot septimanas continuata convaleuit: Erat tempus circa solstitium æstivum.

CCXXIV. *Febris Quartana.*

VIr febre quartana leni corripitur, hac utcumque curata sed non perfecte, supervenit tussis ferina, gravis, cum copiosa muci, præsertim matutino tempore rejectione; nullis hæc cedit remediis, tandem superveniente denuo quartanâ, illa sponte sua cessat. Febris ordinario modo motu lento affligit, horror mediocris per horam, æstus hinc blandus & brevi hinc sudor profusus, post hunc calor lentus, priori illo longe intensior per . vel 4. Hor. cum summa virium prostratione, ægrum maxime affligebat: Sitis fere nulla, \square cruda, nempe sanorum similis. Metuebam ex calore lento, sed tamen suo modo intenso &c. ne ex quartana lenta continua aut hætica fieret, ægro nondum

dum decedente, præsertim sub ☐ cruda:
Hinc

℞. *Crem. tart.* ʒi.
tart. Blat. ʒß.

~△ *per camp.* gr. vi. M. pro tri-
bus dosibus matutinis. Item

℞. *Elix. Propr. f. acid.* ʒij.

~⊖ * *simpl.* ʒi. M. D. 40. guttæ à
meridie. Continuata hæc fuerunt aliquan-
diu. In paroxysmo vero, post sudorem in
calore lento & virium ista prostratione

℞. ▽ *card. bened.* ʒiij.

Cinam. ʒiß.

Succ. citr. acid. ʒß.

Corall. rubr. præp. ʒß.

Lap. ʒ. præp. ʒi.

Syr. card. ben. ʒiij. M.

Urinæ non nihil ad meliorem coctionem
successive se disponebant, sed saltem die ante
paroxysmum turbidæ reddebantur, cum se-
dimento: die vero ipsius paroxysmi mane
& die post paroxysmum nunquam mutatio-
nem talem observare potui. Hinc

℞. *Eff. Cent. min.*

G. *. ana ʒij. M. Capiat intermis-
sionis die bis quotidie ad 40. gutt. aliquan-
do ante paroxysmum:

℞. *MP. de Trib. Ruff.*

Extr. helleb. nigr. ana ʒß.

tart. Blat. gr. vi. M. Huius usu
blande purgatus, & sudor non tam cito, sed
lente & absque calore lento subsequente, is-
que moderatus supervenit. Hinc diebus in-
termissionis ista essentia continuata bis vel
ter ante paroxysmum.

℞. ⊖ *tart. essentif.* ʒij.

Corall. rubr. præp. ʒß.

piper. long. gr. ij. vel

50 *dest. caryoph.* gr. j. M.

In ipso vero paroxysmo potiunculam su-
pra præscriptam. Horum usu remittebant
paroxysmi, & calor lentus post sudorem, ut
& nimia virium prostratio remittebant no-
tabiliter, non tamen nisi die ante paroxys-
mum urinam crassam & turbidam cum sedi-
mento habere poteram. Res ergo cum tu-
ta videretur, ad usum Corticis Peruviani
accessi:

℞. *Pulv. Chin. Chin.* ʒvj.

fl. Cent. min. ʒij.

Caryophyll. ʒi.

⊖ *tart.* ʒiij. M. Infunde in Vini
Rhen. Mens. iß.

Capiatur die paroxysmi post ejus finem,
die vero intermissionis bis, mane calide, ve-
speri frigide: Die vero paroxysmi ante cum
nil de hoc vino, sed saltem supra insinuata
essentia; post paroxysmum vero repetatur vini
potus. Et mox primus ab haustu vini paro-
xyismus evanuit, & perfecte curatus fuit.

Sed tribus aut quatuor abhinc septima-
nis ex △e insalubri, cui æger ob negotia
mercatoria se exposuerat, prægrosso simul
terrore recidivat malum; Ergo præmissis an-
te paroxysmum pilulis pestilentialibus cum
tartar. emetico & subjuncto illo ipso pulvere
Chinæ Chinæ, brevi denuo evanuit.

Ex quibus discimus:

- 1.) optimam Chinam propinandi rationem
esse post paroxysmos, & intermissionis
tempore.
- 2.) non desistendum mox ab ejus usu, et-
iamsi non statim videatur juvare, aut
etiamsi recidiva supervenerit, modo
omnia lege artis præmissa & perfecta
coctionis signa observata fuerint; quod
si evanescente utcumque paroxysmo
æger adhuc statuto tempore aliquid p. n.
sentiat, continuandum, etiam per plu-
res septimanas, sic enim curatur & ex-
tirpatur, alias cito recidivans.
- 3.) Tussis solet esse non rarum symptoma
quartanis male curatis, præsertim pa-
roxysmis suspensis superveniens, eaque
sicca, inanis, continua, cum corporis
contabescencia & virium prostratione:
quam tandem phthisis, aut saltem he-
ctica tabifica excipit; Est hæc tussis me-
re convulsiva in principio, utut pro-
gressu suo ex alia causa fiat humida.
Videtur oriri ex plexu quodam nervi
intercostalis cum paris vagi communi,
cujus surculi nervosi partim diaphrag-
ma, partim ventriculum, aliamve
partem afficiunt, unde ex irritatione
illius tussis convulsiva supervenit,
haud tuto curabilis, nisi febris super-
veniat, qua invalescente sponte sua
cessat.

CCXXV. Febris tertiana.

Vir fere septuagenarius tertiana intermit-
tente ex nimio piscium esu corripitur,
gravissimis dorsi lancinationibus & tormini-
bus abdominis, in principio & incremento pa-
roxysmi urgentibus. Ergo die intermis-
sionis

℞. *Cremor. tart.* ʒi.

pulv. jalapp. ʒß. M.

Die paroxysmi ante hunc clystma domesti-
cum applicant, & laterem calefactum abdo-
mini imponunt, cum euphoria. In statu
paroxysmi potiunculam polychrestam capit.
Diebus intermissionis

℞. *Elix. febril.* ʒij.

Eff. cent. min.

absinth. ana ʒi. M.

D. bis in die 50. guttæ, hinc ante paro-
xyismus

℞. ⊖ *tart. essentif.* ʒß.

Corall.

Corall. præp. ℥℥.

℞ *dest. caryoph.* gutt. j. M. capiat in cerevisia. His ad statum morbi continuatis circa quintum præter propter Paroxysmum

℞. *Pulv. Lign. colubrin. subtiliss.* ʒvj. *fl. cent. min.* ʒij.

caryophyll. ʒj.

⊕ *tart.* ʒi℥. M. Infundantur & misceantur cum vino. Capiat primum haustum post Paroxysmum deterso sudore; die sequente intermissionis bis, die Paroxysmi mane semel, vesperi vero bihorio ante Paroxysmum præscriptam essentiam. Hinc primus ab usu hujus pulveris Paroxysmus prioribus gravior, ac intensiori ac longiori æstu comitatus: Methodus vero continuata in remedio eadem; alter Paroxysmus levissimus: tertius penitus defecit, & nullum febris vestigium aderat. Sed hæc continuare aliquandiu jussi, & ita convaluit.

CCXXVI. *Febris Tertiaria duplicata.*

JUvenis febre tertiaria duplicata conflictatus, cum nulla vomitoria sursum movissent, assumsit:

℞. ⊕ *tart. essentif.* ʒj.

piper. long. ℥℥.

℞ *dest. caryoph.* gt. j. M. D. in 2 plo

pro 2. Paroxysmis: Hinc

℞. *Pulv. L. Colubr. subtiliss.* ʒ℥.

Costi Arab. ver.

⊕ *tart. ana* ʒj. M. pro 4. dos. in haustu matutino vini Gallici calido assumendis. Sic evanuit febris.

CCXXVII. *Tumor testiculi.*

JUvenis cui ab alio gonorrhoea maligna intempestive internis suppressa fuit, patitur testiculi dextri insignem tumorem, dolorem, cum urinæ suppressione aut certe difficultate, lumborum ardore, &c.

Præmissa purgatione gli

℞. *Empl. de Ran. c. & 2plic.* ʒj. *cicut.*

* cum * *mollesact.* aa. ʒ℥.

Malax. c. f. q. & philof. D. & applicetur omni mane. Interne

℞. *Bals. ♀ terebinth.* ʒi℥.

Copaivæ ʒj. M. D. 15. gutt. omni mane. Denique

℞. *Corall. rubr. præp.*

off. sep. ana ʒ℥.

succin. ʒj.

⊕ *volat. succin.* ʒ℥.

Laud. op. gr. ix. M. pro aliquot dosib⁹.

Postquam hi pulveres fuerunt iterati, convaluit.

CCXXIIX. *Epilepsia.*

Mulier juvenula, splenetica, convulsionibus Epilepticis obnoxia erat, sed quæ raro affligebant, cum singultu insigni & tussi

Tom. II. Pars 2.

convulsivis; donec convulsionibus Epilepticæ universales superveniunt, quos comitatur ordinario insignis dolor splenis. Jam annum spatium præterfluxerat, ex quo semper sana & vegeta, saltem quoad hunc affectum fuerat; sed Anno 1681. die XI. Februarii, cum vesperi circa decimam usque post mediam noctem totalis illa Eclipsis Iris incideret, cum semper hætenus vegeta fuisset, hoc ipso die a meridie incipit conqueri de vagis horripilationibus sæpius recurrentibus, adeoque metuebat, ne denuo in febrem incideret, vesperi fit languida, citra aliam quandam alterationem, circa nonam vespertinam ex improvviso redeunt isti singultus, & post decimam auditam superveniunt bis terve Paroxysmi illi epileptici, convulsivi, qui tamen sponte denuo cessant, die sequente surgit, est sana, vegeta, & nihil amplius sentit. En effectus insigniores Eclipses Lunaris in morbis generis nervosi habitualibus: Vitium enim istud hereditate materna possidebat.

CCXXIX. *Vulnus Cranii & Cerebri.*

Viro gravissimum vulnus erat in latere capitis dextro, quod os bregmatis cum menyngibus & cerebro affecerat, hinc paucis post diebus supervenit convulsio seu spasmus non levis lateris læsi, & e contra perfecta paralysis lateris totius sani. Sed cum Paroxysmi Epileptici subinde supervenirent in utroq; latere, eorumque partes promiscue convellerentur, extra talem Paroxysmum paralysis pars sana, spasmus pars læsa laborabat.

CCXXX. *Vertigo.*

Vir gravi & inveterata vertigine laborabat:

℞. *Liqu. ♂ Or.* ʒ℥. D. 20. guttæ interdum; De splene insimul nonnihil querulus erat.

℞. *tart. Glut. gr.* xij.

scammon. ʒt.

troch. Alhand. ana gr. j.

M. F. pulvis, quem interdum capiat:

℞. *stercor. pavon.* ʒij.

rad. pavon. mar. ʒj.

Caryophyll. ʒiij. M. ad imitationem

Willisii de vertigine, capiat quotidie bis, mane largam dosin. Vel

℞. *stercor. pavon.* ʒij.

Cinnab. ʒ ʒvj.

Caryophyll. ʒiij. M. usurpetur eodem modo.

℞. ~ ⊕ * *anis.* ʒiij. Capiat 40. guttas omni vesperi sub introitum lecti:

Propter acerbos capitis in occipite & vertice dolores

℞. *Empl. de ranis cum & q. f.*

malax. c. & dest. succin. applicetur.

[Ggg]

CCXXXI.

CCXXXI. *Amor ex philtro.*

JUvenis a levioris notæ fœmina pomum citrinum dimidium acceperat, quod hor. IV. pomeridiana comederat, & quotidie postea sub eadem hora per horæ spatium tanto desiderio & anxio penitus amore in eam fœminam flagravit, ut hinc inde currere, & anxio & inquieto animo, eam amplectendi cupiditate (absens autem erat prostibulum,) coactus fuerit: Cum autem voti sui compos fieri non posset, ob peregre absentem amasiam, amor indies anxio vires, & præcipue illa, qua assumptum erat pomum, hora, donec curatus fuerit.

CCXXXII. *Melancholia.*

STudiosus laborabat melancholia, quam Sennertus vocat per consensum cordis & totius, aderant enim angustiae præcordiorum, inquietudo, repetentes subinde corporis incalescentiae, ut metuerem, ne maniacus evaderet:

℞. ∇ menth.

antiscorb. ana \mathfrak{z} ss.

cinam. \mathfrak{z} ss.

~ cochlear. \mathfrak{z} j.

Θ * \mathfrak{z} ss.

magist. corall. c. succ. citr. \mathfrak{z} ss.

laud. op. ferment. gr. iij.

Syr. scelotyrb. \mathfrak{z} vj. M. pro 3. dosibus.

℞. ∇ scorzon.

antiscorb. ana \mathfrak{z} ss.

R & c. succ. pom. \mathfrak{z} vj.

~ cochlear. \mathfrak{z} j.

Syr. corall. \mathfrak{z} vj. M. pro 3. dosibus.

Hinc injiciebatur clyisma, cum Θ tart. felici cum successu, Tum

℞. Arcan. duplic. gr. xv.

magist. Corall. c. succ. citr. \mathfrak{z} ss.

Camphor. gr. ij. M. optime contulit.

℞. ∇ borrag. \mathfrak{z} j.

arcan. dupl. gr. xv.

facch. \mathfrak{h} gr. vj.

Camphor. gr. ij.

Syr. borrag. \mathfrak{z} ss. M.

℞. ∇ menth. \mathfrak{z} j.

Syr. emet. \mathfrak{z} ss. M.

Sed nihil per vomitum evacuavit, quam quatuor habuerit secessus.

In hisce affectibus loco Martialium optimo cum successu usurpatur R & Qris: alvum enim servat apertam, & subinde nonnihil laxat, unde propinanda postmodum vomitoria, in ordinaria dosi & sufficienter operantur.

Hic Studiosus furente gelu recidivam ejusdem morbi incurrit; Præmissio E. Liqueore & Ori, & applicato hypochondrio sinistro Emplastro de Nicotiana dedi Syrupum emet. ad \mathfrak{z} iv. sed sine effectū, parum per alvum evacuavit; Aliquot diebus interjectis

propinavi tart. emet. gr. vj. sed frustra, ter per alvum tantum absque ulla nausea evacuavit. Hinc

℞. Pulv. Cachect. Hartm. \mathfrak{z} j.

Corall. rubr. pr. ep. \mathfrak{z} ss.

Camphor. gr. xij. M. pro 4. dosibus, quotidie bis capiendo:

℞. ∇ fumar. \mathfrak{z} j.

G. * in Vin. sol. \mathfrak{z} ss.

Syr. emet. \mathfrak{z} ss.

Scammon. Δ t.

Extr. trrech. Alband. ana gr. j.

Syr. ros. simpl. \mathfrak{z} ij. M. cujus usu ter vel quater viscida commode evacuavit, & bis alvum deposuit cum euphoria. Continuavi illos pulveres adhuc aliquandiu, & deinde pulverem ex arcano duplicato cum coralliis, tandem ~ Θ * c. ~ cochleariæ propinavi. Nodulus etiam appendebatur in scrobiculo cordis & aliquandiu gestabatur:

℞. Camphor.

Crociana \mathfrak{z} j. M. F. nodulus.

CCXXXIII. *Mania*

Puerpera, utut omnia in partu recte se habuissent, 14to tamen die melancholica, dein maniaca fiebat, cum mater etiam talis fuerit. Post Clyisma carminans

℞. Ess. & liquid. \mathfrak{z} ij.

crocii \mathfrak{z} ij. M. D. 50. guttæ, quam continuavit per triduum, die quarta, cum perfecta fieret maniaca:

℞. tart. Emet. Myns. gr. vj. M.

mane assumptis. Sed hora v. pomeridiana

℞. Arcan. duplic. gr. xv.

facchar. \mathfrak{h} gr. v.

camphor. gr. iij. M.

℞. facchar. \mathfrak{h} gr. v.

Laud. op. gr. ij.

50 dest. camph. gutt. v. M. F. Pilulæ hora nona nocturna capiendæ. Continuabatur interim R & Qris. Sed cum metus adesset passionum hysteriarum, injectus fuit clyster carminans, & per os:

℞. ∇ meliss.

hirund. c. castor. ana \mathfrak{z} j.

~ Θ * \mathfrak{z} ij.

cochlear. \mathfrak{z} j.

Θ volat. C. C. gr. xv.

Camphor. gr. v.

Syr. de cort. aurant. \mathfrak{z} ss. M.

Facta etiam purgatio pauca per decoctum Sennæ, cum cremore tart. & continuata eadem R & Qris cum camphora tamen mista. Cum de capitis perturbatione conquereretur:

℞. ∇ fl. sambuc.

hyperic. ana \mathfrak{z} ss.

camphor. gr. vj. M. pro Epithemate, mane & vesperi fronti applicando cum euphoria.

CCXXXIV.

CCXXXIV. *Incubus.*

Retulit mihi amicus ceu verissimum, Juvenem quendam laborasse in Polonia Ephialte, qui mirum in modum eum compressit; id quod factum per incantationem a Virgine quadam, qui hoc modo fuit curatus: Suasit aniculae cujusdam urinam suam in lagenam emisit, simul atque invasionem mali percepit, & lagenam probe obturatam cum cera & vesica reliquit: unde per triduum nihil passus est mali, quarta vero virgo cum accessit, obnixerogitans, velit lagenam aperire, quoniam per id temporis nunquam urinam excernere possit, unde etiam tota tumefacta apparuit; juvenis quidem primo renuit, sed postmodum lagenam aperuit, & dictum factum, subito profundit urinam virgo in praesentia juvenis, & nunquam hic ab isto malo amplius fuit infestatus.

CCXXXV. *Incubus.*

Laborabat Puella 18. annorum Incubo: Erat cachectica, & asthmatica, siquidem menses nondum viderat. Hæc ex narratione conservæ primum imaginationem incubi concepit, cum illa sæpius huic dixisset, se incubo corripit, & hoc mali ab alio sibi infligi; Ergo hæc ancilla simplex non leviter hoc malum metuit, sed nihilominus sub illius dimissione eodem malo corripit coepit. Nempe omni nocte Hora II. incipit ejulare, hinc mox sensu & motu privata jacet, donec successive ad se redeat, quo tempore sudore madet, & hinc inde in corpore stigmata rubra magna, præsertim in femoris parte carnosa observat. Ego mox suspicabar, esse symptoma Epilepticum: dedi primitus vomitorium *extart.emet. gr. iij.* quod parum operabatur, & omni mane sequente pulveris cachectici vel croci & aperitivi dosin, vitavit insimul acida. Successus fuit, ut post aliquot dierum usum incubus tardius affligeret, scilicet Hor. III. hinc IV. tandem V. donec per biduum omnino non recurreret: Sed post biduum Hor. V. rediit, utut absque maculis. Propino ergo vomitorium liquidum *3℥e*, quod felicius operabatur, & ab illo tempore, cum copiosa mucosa rejecisset, non rediit. Suasi iteraret idem remedium, & Elixir Proprietatis frequentius usurparet, certus, modo primæ viæ a colluvie pituitosa essent liberæ, & menses comparerent, eam omnino sanatum iri.

CCXXXVI. *Febris Tertianæ Intermittens.*

Vir juvenis laborabat quidem febre tertiana intermittente, sed singulari: nam nox, quæ Paroxysmum antecedebat, erat gravis, & inquieta, vomitus unus alterve, hinc tussis sicca graviter per mediam Hor. affligere.

Tom. II. Pars 2.

bat, tum varia phantasmata capiti obversantia; Hinc Paroxysmus ingruebat, paucis vel nullo frigore, insequente subinde gravi calore, & ardore extrema lancinante, summa cordis angustia, ut æger hinc inde se jactitaret, *und wust nicht / wo er für Angst bleiben sollte.* Accedebat inflatio stomachi & hypochondriorum, (erat enim hypochondriacus) quæ omnia sensim evanesciebant, ut altero intermissionis die sudor sequatur, anticipantibus semper fere per bihorium Paroxysmis. Hinc nocte Paroxysmum antecedente

℞. *menth. 3ij.*

Carminat. 3j.

~ *Θ * volat. 3℔.*

Laud. op. gr. j℔.

Syr. de cort. aurant. 3℔. M. Valde profuit.

In ipso Paroxysmo applicetur clyisma carminans, quod quoties reddebatur, copiosos simul educebat flatum cum præsentem levamine.

℞. *menth.*

fœnic.

fumar.

carminat. ana 3j.

* *3vj.*

~ *cochlear.*

theriacal. simpl. ana 3j.

ocul. 3℔. præp. 3℔.

~ *Θ dulc. gutt. xij.*

Laud. op. gr. j℔.

Syr. cort. aurant. 3vj. M. D. cochlearum in ipso Paroxysmo; valde profuit. Postmodum cum Paroxysmus anticipando in ipsam caderet noctem:

℞. *menth.*

fœnic.

fumar.

carminat. ana 3j.

~ *theriac. simpl. 3j.*

*Θ * vol. 3℔.*

Laud. op. gr. ij.

Syr. cort. aurant. 3℔. M. Optime profuit.

Die intermissionis postea purgatus fuit,

℞. *tart. 3lat.*

arcana. duplic. ana gr. vj.

scammon. 4t. gr. iij.

Trochisc. Alhand. gr. j.

Spec. diacumin. gr. v. M.

Sexies inde fuit evacuatus, cum levamine.

Hinc ante Paroxysmum & die intermissionis

℞. *Arcana. duplic.*

Θ absinth. ana 3j.

ocul. 3℔. præpar. 3℔. M. pro 4. dosibus.

Hinc secuti sunt sudores nocturni.

℞. ~ *Θ * vol. 3ij.* D.

℞. *Arcana. duplic. gr. xv.*

3 diaph. gr. vj.

Laud. op. gr. j. M. Paroxysmus? inde levis.

[Ggg 2]

℞. *Arcana.*

℞. *Arcan. dupl.*

⊖ *absinth.*

℞ *diaphor.* ana ℥ss. M.

Paroxysmus erat gravior antecedente, sed cum sudore finiebatur.

℞. ⊖ *tart.* ℥ss.

Arcan. dupl.

℞ *diaph.* ana gr. vj.

⊖ *volat. succin.* gr. v. M.

Paroxysmus satis gravis, cum horrore & calore 4. horarum; Reiterata die *anagis* purgatio. Hinc

℞. *Specif. febril. Strobelberg.* ℥ss.

Laud. op. gr. jss. M. cum euphoria.

Quo aliquoties reiterato tandem

℞. ∇ *stomach. osæ* ℥i.

Specif. febril. Strobelberg. ℥ss.

⊖ *volat. C. C.* gr. vj.

Laud. op. gr. j. M.

Optime profuit, imminuitur rigor, calor moderatus, sudor copiosus.

℞. *Extr. absinth.*

cent. min.

card. ben.

theriacal. ana gr. v.

℞ *dest. caryoph. q. s.* F. Pilulæ; quæ imminebant frigus, sed augebant calorem.

℞. *Antihæc. Poter.*

⊖ ana ℥ss. M. aliquoties repetebatur.

CCXXXVII. Febris lenta.

JUvenis 18. annorum laboravit febre tertiana intermittente, ordinaria, qua fere sublata concidit appetitus, omnia assumpta, etiam potulenta alieno sapore videntur inquinata, & ipse gravamen quoddam, angustias & pressiones circa præcordia sentit. Assumpto ergo vomitorio, rejectaque copiosissima viscidissima materiæ saburra, omnia hæc symptomata cum ipsa febre evanescent; sed brevi post cum strenue ederet, denuo eadem in præcordiis patitur symptomata, repetito vomitu eadem rejicit excrementa, eaque in magna copia, sed subsequitur calor insignis, vesperti & noctu usque post meridiem alterius diei graviter affligens, cum virium imbecillitate, capitis dolore gravativo, procumbentia in somnum, appetitu dejecto, saliva crassa & viscida, os & fauces subinde conglutinante, & obstruente, adeo ut æger subinde potum postularet, quo fauces eluere, & materiam viscidam rejicere valeret; calor post meridiem remittebat, sed post cœnam recurrebat, per noctem affligebat, mane asper erat, a meridie remittebat, &c. His bene pensitatis febrem, lymphaticam a Sylvio in Praxi appellatam, esse suspicatus sum, eamque non tam ex lymphâ pancreaticâ, cum nulla abdominis essent symptomata, & æger quotidie naturaliter alvum deponeret, quam

ex lymphâ reliquarum glandularum, quæ cum crassa, viscida, & acida p. n. sit, talia symptomata inducat, unde & saliva simili vitio affecta sit, & stomachi symptomata inferat. Hinc

℞. *Antihæc. Poter.* ℥ss.

⊖ ℥t gr. viij. M. D. in 2plo.

Assumat mane & vesperti: Aliquantul. profuit.

℞. ∇ *menth.*

portulac. ana ℥ss.

℞ 3vj.

ocul. s. præp. ℥ss.

Antihæc. Poter. ℥ss.

⊖ *dulc.* gutt. vj.

Syr. de hyssop. ℥ss. M. Aliquant. profuit.

℞. ∇ *menth.*

fœnic. ana ℥ss.

⊖ *theriac. simpl.* ℥ss.

oxymell. squill. 3vj.

⊖ *dulc.* gutt. xij.

Syr. de hyssop. ℥ss. M.

Post aliquot cochlearia æger potiunculam dulcem nauseans, de novo copiosa, crassa, viscida, mucilaginosa rejecit. Hinc ut saliva & lymphâ attenuetur, & stomachus corrigatur:

℞. ⊖ ** depur.* gr. xv. D.

℞. ⊖ ** depur.* ℥ss.

spec. diacumin. gr. viij. M. Profuit.

℞. ⊖ ** depur.* ℥j.

Antih. Pot. gr. xvj. M. pro 2. dos. Profuit.

℞. ⊖ ** depur.* ℥j.

Rad. galang.

zingib. ana gr. viij. M. D. pro 2. dos.

profuit. Et ita omnia symptomata remiserunt, ægro bene & appetente & dormiente. Tandem pro confirmatione:

℞. ⊖ ** depur.* ℥ss.

ocul. s. præp.

antihæc. Pot. ana ℥ss. M. D. pro 3. dos.

Et ita ⊖ ** hic optimum fuit remedium.*

CCXXXIIX. Febris lenta.

Febre lenta cum intensissima cephalalgia & æstu intenso, sed non adeo mordaci omni vespere recurrente, pulsu celeri admodum & frequenti, magnitudine moderato, fere parvo, conflictabatur virgo; Aliis per aliquot dies irritis, præmissa Venæsect: propter mensium suppressionem

℞. ∇ *menth.* ℥ss.

Syr. emet. ℥iij. M.

Nullos vomitus, aliquot secessus torminosos habuit, sed cum tanto levamine, ut cephalalgia & æstus inde cessaret.

℞. ⊖ ** depur.* ℥ij. D. pro 2. dosibus.

℞. ⊖ ** depur.* ℥j.

Arcan. dupl. ℥ss. M.

℞. ⊖ ** dulc.* ℥iij. D. 30. guttæ bis in die.

℞. ⊖ ** ℥ss.* D. 30. guttæ bis in die.

Atque hic curam absolvit; Menstruæ alias parce & diminute fluebant.

CCXXXIX.

CCXXXIX. *Febris lenta.*

JUvenis lue ðea, bubone & exulcerationibus parvis circa glandem erat correptus. Præmissis inunctionibus ðlibus potavit decocta lignorum, cum ð & ð vivo, sed cum aliquot dies hæc continuasset, incidit in febrem cum totius corporis lassitudine, æstu insigni, sed non continuo, vesperi saltem exacerbato gravissime, & post mediam noctem usque grassante, ante meridiem redibat, & à meridie finiebatur, vesperi recurrens. Pulsus continuo erat frequens, & celer, fere parvus, os glutinosum, rejiciebat copiosa viscida, anxius nonnihil erat, & febris lenta ex contagio venereo, lympham inquinante, commoto originem trahere videbatur. Præmissis paucis, propino vomitorium, cum insigni euphoria. Hinc

R. Θ * ðij. D. pro 2. dosibus.

R. Θ * 3ß.

arcan. dupl. ðj. M. D. pro 2. dosib.

R. Θ * 3ß.

Θ ðt ðj. M. D. pro 2. dosibus.

Hic æstus & symptomata remiserunt. Item

R. $\sim \Theta$ * 3ij. D. 40. guttæ bis in die.

Id quod copiosam urinam cum euphoria movit. Sed cum appetitus adhuc admodum esset prostratus:

R. Rad. Chin. 3iß.

Raf. L. saffr. 3j.

Rad. liquir. 3vj.

Santal. rubr. 3ij.

Infund. in ∇ com. lbvj . Stent in MB. per noctem, mane add. Passul. min 3ij.

Coqu. lento Δ ad remanent. lbiv . Colat. D.

De quo mane & à meridie bonum haustum cepit, semper R ð gutt. XL. addendo: & ita convaleuit, redeunte brevi & appetitu & viribus.

CCXL. *Febris lenta.*

STudiosus laborabat scabie, qua male curata incidit in Lassitudinem virium, fauces & os erat siccum, saliva glutinosa, liquidæ alvi dejectiones, urina cum copioso lateritio sedimento, appetitus prostratus, sitis intensa, pulsus celer, frequens, vehemens, parvus, æstus continuus, p. n. sed moderatus; Hæcticæ similis erat affectus. Curabatur variis tentatis per purgationem ex Extr. hellebori nigri c. ð dulci, & crebriorem usum Ess. viperarum, tandem per \sim Carminat. de Tribus.

CCXLI. *Febris lenta.*

Nobilis quidam post curatos morbillos purgationem negligit, unde post aliquot septimanas corripitur insigni lassitudine, & omnium membrorum torpore; Accedit semper mox à meridie calor p. n. ita ut circa

vesperam non mediocriter æstualet, usque ad noctem adultam, mane commode satis habet, dormit nonnihil inquiete, os fere semper siccum & glutinosum est, copiosus mucus à meridie fauces opplet, sponte subinde vesperi ad vomitum inclinatur, labia arida sunt, alvus obstructa, pulsus celer, frequens, parvus, vehemens, anxius est vesperi admodum, sed mane melius, caput dolet & perturbatum est. Urina turbida cum copiosis sedimentis; Aliis frustra tentatis ordino vomitorium, quod cum euphoria operabatur. Postmodum $\sim \Theta$ * & tandem finem curæ præ illa continuata absolvit Elixir Proprietatis.

CCXLII. *Pestis ex Terrore sine contagio.*

CUM anno 1680. pestis grassaretur Lipsiæ, sequentes habui observationes.

1. Des Abends sitzen eines Drathziehers Leute und arbeiten / in der Stube auff der Erden / mit zugemachten Läden der Fenster / als nun die bösen Männer mit einem Toden vorbeifahren / und sehen durch die Klungen noch Licht in der Stuben / klopfte der eine stark mit der Hand an den Boden / der Lehr: Junge hörets und erschrickt / wird in ein paar Tage an der Pest krank und stirbt.

2.) Ein Porten-Würcker sitzt Abends nach der Mahlzeit auff den Stuhl und schlummert / sein Weib höret den Todten-Kern kommen / und ruft zum Manne; da kömt das Kärngen; der Mann fährt im Schlaf auf / und erschrickt hefftig; des andern Tags darauf kömmt er auß der Bettstunde / und wird mit Frost krank; und stirbt in drey Tagen an der Pest. Ist auch niemand mehr nach ihn im Hause gestorben.

3.) Ein Weinwand-Händler kömmt bey Anfang der Pest-Seuche nach Leipzig / seine Waare zu verhandlen; Abends nach der Mahlzeit siehet er im Hofe bey einigen gemeinen Mieth-Leuthen Licht / und höret Sterb: Pieder singen / und meynet nicht anders / als daß jemand an der Pest daselbst krank liege / oder sterben wolle / (darvon doch nichts gewesen) packt noch selbigen Abend sein Geld und Waare zusammen / und reiset mit dem frühesten wieder fort. Als er heim kömmt / gibt er der Magd das Geld / so er in Leipzig erhandelt / daß sie ihm solches im Wasser etliche mal abwaschen solle. Die Magd wundert sich deshalb / frieg aber bald Muthmassung wegen der Pest / scheuet sich / wird bald darauff an der Pest krank und stirbt. Nach ihr sind noch mehr Leute in solchem Hause an der Pest gestorben.

[Ggg 3]

gestorben. Der Mann selbst hat auch an der Pest krank gelegen / soll aber wieder gesund worden seyn.

4.) Ein Magister geht in die Kirche / und kommt ein geringer Kerl bey ihm zu sitzen / welcher heftig nach Toback und auch sonst übel gerochen ; Nach der Kirche spricht hinter ihm eins zum andern / hat nicht der Kerl so heftig nach Toback gestunken / wer weiß auß was vor einem Hause er gekommen ist. Dieses höret der Magister / und erschrickt darüber / alterirt sich / läßt ohngefehr die Hände in den Schooß fallen / da thut es ihm wehe ; geht heim / bekommt nach einem Schauer noch selbigen Tags die Pest cum bubone, an selben Orte / da es ihm weh gethan / und stirbt am sechsten Tage.

5.) Zu Neustadt an der Orle im Henneberg- und Thüringischen ist die Pest ein wenig ; Es gehen etliche vor dem Thore bey einem Garten vorbei / über dessen Zaun reife Pflaumen hangen / dieser etliche reißt der eine ab / und spricht : Die Pest wird ja nicht in den Pflaumen seyn / weil der Herr des Gartens die Pest hat ; wird aber bald darauf krank / hat die Pest / und stirbt.

6.) In einem Dorffe werden von einem Acker etliche Kraut-Häupte gehohlet / und gegessen ; Indem davon gegessen wird / spricht der eine : die Kraut-Häupte sind von dem Acker / dessen Herr die Pest hat / solten dann sie auch schaden ? dieses macht den andern Furcht / werden krank an der Pest / und sterben meistens theils.

CCXLIII. Morbilli.

Corripiebatur infans morbillis cum diarrhoea:

℞. ʒ diaphor.

magist. corall. cum succ. citr. ana
gr. viij.

Cinnab. ʒ gr. vj.

myrrh. gr. iv.

castor. gr. ij. M. pro 2. dosibus.

℞. ∇ menth.

fl. sambuc. ana ʒj.

gelatin. C. C. ʒvj.

succ. cydon. ʒß.

☞ sigill. ʒi.

ʒ diaphor. ʒß.

Syr. acetos. citr. ʒvj. M.

Hæc potio prodest decipiendis infantibus, eleganter sapit, & rubet, ut pro vino habeant.

℞. ʒ diaphor. gr. xv.

myrrh. gr. v. M.

Quod optime prodest, hinc quia myrr.

ha convenit, lymphæ vitium singulare in morbillis subesse puto.

Sed cum morbilli recessissent, & parva symptomata patrascent:

℞. ʒ diaph. ʒi.

Cinnab. ʒ ʒß.

☉ volat C. C. gr. xij.

camphor. gr. ij. M. pro 2. dosibus.

℞. Sem. napi.

aquileg.

card. bened. ana ʒj.

c. f. q. ∇ scabios. F. l. a. Emulsio: adde

ʒ diaph. ʒij.

C. C. f. Δ.

Unicorn. fossil. ana gr. xv.

Edulcor. rotul. manus Christi perlat. q. f. D.

CCXLIV. Morbilli.

Puer 1½ anni cum alii fratres morbillis decumberent, à meridie subito cum gravi stertore incallescere, & admodum debilitari cepit; Malum hoc ex morbillis etiam esse suspicatus sum: cum alii fratres una decumbentes graviter tussirent:

℞. ∇ fl. sambuc. ʒiß.

Liqu. C. C. succin. ʒj.

Syr. papav. alb. ʒij. M.

Hujus usu copiosissimi proruperunt morbilli, & stertor ac difficultas spirandi remiserunt. Nempe ex impetu seri acris, & nimia præsertim vellicatione & irritatione faucium & laryngis malum ortum erat, ob id acrimonia corrigenda per volatilia, irritationis sensus sopiendus per papaverina.

CCXLV. Variolæ.

Puero aliquot annorum ex variolis gravi difficultate respirandi laboranti & simul diarrhoea correpto, in statu morbi sequens potio maxime profuit:

℞. ∇ scabios. ʒij.

☞ sigill. ʒß.

Syr. e succo scabios. ʒß.

violar. ʒij. M.

CCXLVI. Febris petechialis.

Infans 4½ annorum febre petechiali gravissime laborabat, cum anxietatibus insignibus: Die quarta aliis irritis, cum externus ardor alias mediocris esset, sed interiora præcordia urerentur, pro sudore & quiete:

℞. C. C. ☉.

Unicorn. ver. præp. ana gr. xvj.

☉ card. bened. gr. xij.

Theriac. gr. iv. M. pro 2. dosibus.

Id quod optime contulit.

CCXLVII. Purpura.

Credo, quod puerperarum purpura, quia apud nos adeo frequens, non levem conve-

convenientiam habeat cum radice scorbutica, unde aliquoties in puerperarum purpura rubra præscripti:

℞. ▽ *scabios.*
galeg. ana ʒiʒ.
 ♂ *diaph.*
magist. Corall. c. succ. citr. ana ʒʒ.
 ~ *Cochlear.* ʒiʒ.
Syr. card. bened. ʒvj. M.

Ubi suspicio est vel metus diarrhoeæ.

℞. ▽ *fl. sambuc.*
card. bened. ana ʒiʒ.
 ~ *theriacal. simpl.* ʒiij.
C. C. usti.
 ♂ *diaph.* ana ʒj.
bol. armen. gr. xij.
syr. fl. tunc. ʒiij. M.

CCXLIIX. *Purpura cum diarrhoea.*

Fœmina laborabat purpura cum diarrhoea:

℞. *C. C. usti.* gr. xxiv.
bezoard. Or. ʒj.
 ~ *sigill.*
 ♂ *volat. viper.* ana ʒʒ. M. pro 2. dof.
 ℞. *Pulv. bezoard.*
C. C. Or. ana ʒj.
 ♂ *volat. viper.* ʒʒ. M. pro 2. dof.
 ℞. *C. C. Or.* gr. xv.
Antihæst. Poter.
bezoard. Or. ana gr. vij.
 ♂ *volat. viper.* gr. v. M.
 ℞. *Pulv. bezoard.*
C. C. Or. ana ʒʒ.
 ♂ *pestil. Hænis.* gr. iv.
 ♂ *volat. viper.* gr. v.
Pulv. anod. confort. gr. iv. M.

Repetatur aliquoties.

CCXLIX. *Purpura. Hysterica passio.*

IN Puerpera post lochiorum legitimum & decentem fluxum oborta purpura cum excretionibus vagis pustularum scorbuticarum facile evanescentium & gravi uteri passione:

℞. *Ebor. f. Δ.*
 ♂ *diaphor.*
specif. cephal. ana ʒj.
myrrh. el. ʒʒ.
castor. gr. vj.
 ♂ *volat. C. C.*
succin. ana gr. ix. M. pro 3.

dofibus vel singulis bihoriis, quantum cultelli cuspis capere valet.

℞. ▽ *hirund. cum castor.* ʒiv.
Ess. castor. ʒʒ. M. pro vehiculo.

℞. R *Corall. antiscorb.* ʒij. D. singulis bihoriis gutt. xx. vel xxx. Assumfit, unde copiosissima purpura per totum corpus prorupit.

Umbilicoratione hysterica passionis inunxit ♂ deſt. succini. Item

℞. ▽ *menth.*
ulmar.
scorzon. ana ʒj.
Ess. castor. ʒiʒ.
 ♂ *diaph.* ʒj.
Cinnab. ♂ ʒʒ.
myrrh. el. gr. vj.
 ♂ *volat. C. C.* ʒʒ.
succin. gr. v.

Syr. cort. aurant. ʒj. M. pro 3. dof.

CCL. *Febris catarrhalis.*

Vir juvenis laborabat febre lymphatica catarrhali, præmissis præmittendis optime pro corrigenda lymphâ conducebat:

℞. *Liqu. ~ fol. tart.* ʒʒ. D. 40. guttæ.

Hinc:

℞. ~ ♂ *anis.* ʒʒ. D. 30. guttæ mane & à meridie & sub introitu lecti.

℞. *Pilul. de * Querc. q. f.*

Tandem:

℞. *Liqu. C. C. succin.* ʒiij. D. 40. guttæ omni mane; interponendo subinde præsertim in principio pulverem ex Antihectico Poterii & arcano duplicato &c.

CCLI. *Catarrhus.*

Catharrus Epidemicus Anno 1659. cum tussi gravi, coryza, cephalalgia, doloribus dorſi & artuum, hæmorrhagia narium, & diarrhoea curabatur optime

1.) per sudoriferum:

℞. ▽ *sambuci*
card. bened. ana ʒj.
 ~ *C. C.* ʒʒ.
 ♂ *volat. succin.* gr. xv.
Syr. fl. papav. rhæad. ʒʒ. M. pro haustu uno.

2.) pro tussi conducebat potio pectoralis addito ~ ♂ d.

3.) pro coryza & capitis affectibus inunctio verticis cum ♂ deſt. succini, item Emplastrum ex Empl. pro bregmate & de betonica ana q. f. malaxandum cum ♂ deſt. succin.

4.) pro reliquis artuum affectibus & debilitate curandis, imprimis ubi aderant dolores artuum, profuit:

℞. ▽ *cord. Cerv. vel cordial. H. S.*
menth.
antiscorb. Dorncrell. ana ʒij.
Ess. L. Sassafr.
 ~ *lumbric. ~ str.* ana ʒij.
ceras. nigr.
 ▽ *asthmat.*
 ♂ *volat. succin.* ana ʒj.
specif. cephal. ʒʒ.
Syr. fl. tunic. ʒiʒ. M. pro aliquot

dofibus, quater de die, 4. vel 5. cochlearia capiendo.

Vel

Vel

- ℞. *Succin. præp.*
specif. cephal ana ʒß.
bezoard. Or. gr. iv. M.

CCLII. *Febris Tertiana Intermittens.*

FOEmina unà cum filia laborabat Tertiana Intermittente, concitata imprimis per iracundiam, cum calore moderato, sed intensa cephalalgia, & gravi præcordiorum anxietate.

Sub ardore ergo paroxysmi & gravi præcordiorum anxietate

- ℞. ▽ *rub. idæi*
card. bened. ana ʒiß.
 ʒ *diaph.* ʒj.
Syr. rub. idæi vel acetos. citri. ʒj.
 ~ ① *dulc. q. s.* M. Hauriatur cochleatim.

- ℞. *Arcan. duplic.*
 ⑥ *absinth.* ana gr. xv.
 ʒo *dest. caryoph.* gut. iij. M.
 ℞. ⑥ *absinth.* ʒß.
arcan. duplic. ʒj.
Laud. op. gr. ij.
 ʒo *dest. caryoph.* gutt. iv. M. pro 2. dosibus.

- ℞. ▽ *card. bened.* ʒj.
 ~ ⑥ ʒß.
Corall. rubr. præp. gr. xv.
 ʒo *dest. caryoph.* gutt. ij.
Syr. card. bened. ʒß. M.

Pro restante cephalalgia & ardore filia

- ℞. ① ʒt. gr. xv.
Arcan. duplic. ʒß.
 ʒ *diaph.* gr. v. M.

Purgatio harum fuit pulvis ex ⑦ ⑥ *lat.* cum scammonio. & troch. Alhand.

Maritus simili febre cum gravi stomachi, postmodum nephritico notho, & artuum enormi dolore sub paroxysmo:

- ℞. *Arcan. duplic.*
Corall. rubr. præp. ana ʒj. M.
 ℞. *G. tacamah.* ʒiß.
Malax. c. bals. Peruv. ʒiij.
 F. Scutum stomachale.

- ℞. ▽ *tenell. C. C.*
cochlear. ana ʒiß.
 ~ ⑥ ʒß.
Magist. Corall. c. succ. citr. ʒij.
 ʒ *diaph.* ʒj.
 ⑥ *volat. lumbric. ʒstr.* gr. xij.
Laud. hyss. gr. viij.
Syr. cortic. aurant. ʒj. M.

Cujus usu sudor in paroxysmo copiosus.

- ℞. ▽ *papav. rhæad.*
cochlear. ana ʒj.
 ~ *cochlear.* ʒj.
 ⑥ *volat. lumbric.* gr. xij.
Syr. rub. idæi ʒiij. M.

- ℞. ▽ *Card. Bened.*
papav. rhæad. ana ʒj.
 ~ *cochlear.*
 ⑥ ʒß.
Off. human. præp. ʒj.
Laud. hyss. gr. v.
Syr. cort. aurant. ʒvj. M.

In Imbecillitate virium nimia post affectum durante:

- ℞. ▽ *menth.*
cochlear. ana ʒiß.
cinam.
Q. E. Matthiol. ana ʒvj.
 ~ *Cochlear.* ʒj.
Conf. Alchem. ʒij.
Syr. acet. citr. ʒvj. M.
 Ad dolorem stomachi ex acido:
 ℞. *Off. sep. præp.*
ocul. ʒ. præp.
Corall. rubr. præp. ana ʒj.
 ⑥ *absinth.* gr. xv.
Laud. op. ferment. gr. iij.
 ʒo *dest. caryoph.* gt. vj. M. pro 3. dos.
 ℞. *Passul. laxativ.* ʒß.
ocul. ʒ. præp. gr. xv.
Syr. de pomis. q. s. M.

CCLIII. *Vulnus Ventriculi.*

Retulit mihi Dominus Gayant, Chirurgus Parisiensis, quod quidam vulneratus fuerit duos digitos transversos infra cartilaginem ensiformem per gladium, cum ingentibus symptomatibus. Tandem cum videret, alimenta eadem forma, ac assumpta fuerant, per vulnus prodire, conclusit, perforatum esse in superiore parte ventriculum, juxta orificium dextrum: jussit ergo ægrum parum vel nihil edere, & ovo tantum contentum esse; pro sistenda siti, ptisanâ os repleret, non autem deglutiret, sed denuo expueret; plagæ vero balsamum ordinarium ex terebinth. gummi elemi, resina &c. applicat cum turunda, tantum ad peritonæum & non ulterius penetrante, sicque ægrum curavit.

CCLIV. *Cholera.*

Vetula laborabat diarrhœa torminosa cum vomitu, affectu quasi cholericæ ex cerevisiæ non rite defecata potu, ipsâ passionibus alias obnoxia:

- ℞. *Rob. sorbi* ʒß.
diascordii ʒij.
Corall. rubr. præp. ʒj.
 ʒ *figill.* ʒß.
 c *s. q. succ. cydon.* F. Electuarium: Capiat pro lubitu. Optime contulit.

CCLV. *Cardialgia.*

IN Cardialgia cum appetitu insigni, sed apepsia aliis irritis jussi parare decoctum

ex

ex chamomilla & passulis, in ∇ decoctis; de quo omni mane haustum unum ager absorpsit. A meridie vero:

\mathcal{R} . Pulv. rad. acori veri \mathfrak{z} j.
gentian.
ari non præp. ana $\mathfrak{z}\beta$.
cort. aurant. \mathfrak{z} ij.
 Θ absinth. \mathfrak{z} j M. cum euphoria.

CCLVI. Hernia.

Puer xi. annorum quasi herniosus erat, cum dolore, duritie in utroque ileo & tota regione hypogastrica acerbo dolore conflictatus, ita ut erectus nequiret incedere, aliterum testiculorum retractum habebat intro, vomuit aliquoties, & per secessum purgatus fuit; sed repetitis crebrius vicibus, recrudescente dolore, tactum externe ferre non poterat.

\mathcal{R} . ∇ chærefol. \mathfrak{z} ij.
✱ vini $\mathfrak{z}\mathfrak{v}$ j.
ocul. \mathfrak{z} j.
Laud. op. gr. $\mathfrak{z}\beta$.
Syr. card. bened. \mathfrak{z} ijj. M.
 \mathcal{R} . Unguent. de Althea \mathfrak{z} ijj.
o anethi.
hyperici ana $\mathfrak{z}\beta$.
dest. anis. $\mathfrak{z}\beta$.
cumin. \mathfrak{z} j. M.

Inungantur hoc calido moderate partes affectæ, imponendo desuper lintecum medio-criter calidum, creberrime repetendo. Quibus continuatis omnia meliora evaserunt: alvus per jus decoctionis prunorum aperta servata fuit; Hinc pro firmandis partibus:

\mathcal{R} . Empl. contra rupturas.
Gumm. Tacamah. ana q. s.
Malaxentur cum Terebinthina & o hyperici, inducantur super alutam.

CCLVII. Alvi retentio.

Viro alias sano sed alvi mire obstructæ, melancholicæ constitutionis cum peccatoris angustia, præscripti cum successu ad imitationem Vini passulati Timæani:

\mathcal{R} . Passul. min. \mathfrak{z} ij.
Contund. in mortario, ut F. pasta,
Coqu. in $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$ ij. ∇ com. Colat. ferventi infunde

Fol. senn. f. f. $\mathfrak{z}\beta$.
Crem. tart. \mathfrak{z} j.
Fl. violar. p. ij.

Stent in loco calido per noctem. Mane Colatura D. Alias hypochondriacis, quibus obstructa erat alvus, ordinariò præscripti:

\mathcal{R} . Passul. min. $\mathfrak{z}\beta$.
Contus. coqu. in ∇ com. $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$ ij.
Colat. fervent. $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$ ij. infund.
Fol. senn. f. f. \mathfrak{z} ijj.
Tom. II. Pars 2.

Crem. tart. \mathfrak{z} j.
fl. violar. p. ij.

Stent in loco calido per noctem, mane Colatura D. In cuius haustulo uno $\sim \Theta$ * aromatici empyreumatici gr. xxx. optime profuerunt.

Annon in his decoctis ∇ ferrariorum loco ∇ f. capi queat: annon decocto isti in hypochondriacis commode G. * in Vino solut. \mathfrak{z} ij-ijj. addi possent?

CCLVIII. Dysenteria.

Vir dysenteria desperate laborans, ut & ipsemet cum moribundum existimare, \mathcal{R} . Ras. priap. cerv. \mathfrak{z} ij.

Laud. hyst. gr. ix. M. pro 2. dosibus.

Item fiant sacculi ex foliis quercus duo, ano & umbilico applicandi; mire & præter omnem spem profuerunt.

Alias in siti, æstu & virium prostratione \mathcal{R} . Miræ cydon. q. v. diluatur.

c. f. q. ∇ com. adde

∇ cinam.

Syr. de Cinam.

o dest. cinam. M.

Hinc pro rectificando ventriculo, in quo maximum Curæ momentum situm est, præmissis præmittendis extra febrem optime confert:

\mathcal{R} . Q. E. rorismar. $\mathfrak{z}\beta$.
menth. $\mathfrak{z}\beta$. M. D. 20. gutt. mane.

CCLIX. Dysenteria.

In dysenteria excitata ex usu misturæ c. G. * in scorbutico-hypochondriaca, & cui non rite fluebant menses, aliis quibuscunque, etiam priapis irritis:

\mathcal{R} . ∇ plantag. \mathfrak{z} ij.
cinam. $\mathfrak{z}\beta$.

Diascord. Fracast. \mathfrak{z} j.

Troch. de Carabe $\mathfrak{z}\beta$.

Lapid. hæmat. præp. \mathfrak{z} ij.

o diaphor. gr. xij.

Syr. card. bened. $\mathfrak{z}\beta$. M. optime profuit.

CCLX. Dysenteria.

Vir ex esu prunorum dysenteriam contraxerat, quarto die

\mathcal{R} . pulv. rhabarb. $\mathfrak{z}\beta$.
Nuc. Mosch. gr. viij. M.

\mathcal{R} . Pulv. priapi ceti \mathfrak{z} j.

Laud. hyst. gr. ix. M. pro 2. dosibus.

Mediocriter habuit: Cum ergo cruenta febre pura excernerentur:

\mathcal{R} . ∇ plantag. \mathfrak{z} ijj.
Cinam. \mathfrak{z} ijj.

✱ vini $\mathfrak{z}\beta$.

diascord. \mathfrak{z} ij.

Corall. rubr.

o sigill. ana \mathfrak{z} j. M. bene contulit.

CCLXI. Dysenteria.

Juvenis ex mala diata dysenteriam contraxerat, cum acerbissimis doloribus, & [Hhb] gravi.

gravi tenesmo, & vigiliis pertinacibus, nullis tamen aliis pravis signis concurrentibus.

- ℞. *Conserv. rosar. antiq.*
diascord. Fracast. ana ʒß.
 ʒ *diaphor.*
rhobarb. ana gr. xij.
Laud. opiat. gr. j.
c. f. q. Syr. cydon. F. Bolus D. in 2plo.

- ℞. *tormentill.*
plantag. ana ʒij.
Theriace.
diascord. Fracast. ana ʒij.
Extr. tormentill. ʒß.
pulv. priapi cervi ʒij.
off. hum. calcinat. ʒj.
Laud. op. gr. ij.
Syr. de symphyt. Fernel. ʒj. M. D. per noctem.

- ℞. *Fol. quercus*
furfur. ana Mijj.
fl. chamonill.
verbasci ana Mij.

Concis. F. sacculi N. ij. unus rotundus major, alter oblongus minor, ille aceto calido incoctus applicetur umbilico, hic ano; qui admodum profunt, sed sunt continuandi.

- ℞. ʒo *Nucist. express.*
Theriac. ana ʒß.
 ʒo *macis dest.* ʒß. M. pro balsamo stomachico.

- ℞. *Mastich.* ʒj.
G. Arabici ʒj.
Laud. op. gr. j. M. Pulverisata indantur poro excavato, assentur & comedantur.

- ℞. *Croci & adstring.*
crystall. præp.
tart. Plat. ana ʒj. M. pro 2. dosibus.
 ℞. *Gelatin. C. C.* ʒvj. D. in ein Bößel Bier.

Vinum melius conveniebat quam Cerevisia. Omnia adhuc erant contumacia & periculosa. Ergo

- ℞. *pulv. hepat. viper.* gr. xv.
crystall. præp. ʒß. M. D. in 2plo. Capiatur mane & a meridie. Præscriptum etiam est clyisma ex Terebinthina Barbette.

- ℞. *tormentill.* ʒij.
cinam. ʒß.
theriac. camph. ʒiß.
sanguin. dracon.
off. bov. calcin. ana ʒj.
Syr. de symph. ʒß. M. pro vehiculo istorum pulverum, subinde etiam cochlearis forma per se hauriatur.

- ℞. *Decoct. priapi Cervi* lbj.
Syr. corall. ʒij. pro Julebo, loco potus
Gelat. C. C. ʒj. M.

Usurpando.

- ℞. *plantag.* ʒij.
cinam. ʒvj.
 + *ros.* ʒijj.
diascord. Fracast. ʒj.
troch. de Carabe
 ʒ sigill. ana ʒß.

- ocul. & præpar.* ʒj.
 ʒ *diaphor.* ʒj.
Syr. myrtin. ʒj. M. pro potione nocturna.

Hæc præscripta omnia felicissimum habuerunt eventum, unde pro confirmanda medela eadem subinde repetenda fuerunt, mutatis tamen nonnihil formulis, & additis sequentibus:

- ℞. *Heder. & str.* Mj.
Alchymill.
plantagin. ana Mß.
summit. hyper. p. ij.
raf. C. C. ʒij.

- Coqu. in *f. q. & f. Colat.* ʒvij. adde
Syr. corall.

de symph. Fernel. ana ʒj M. pro potu interdiu assumendo.

- ℞. *Bals. & terebinth.* ʒj. D. 4. guttæ semper cum aliquot cochlearibus hujus potionis

- ℞. *Trochisc. de Carabe* ʒß.
ocul. & præp.
hepat. viper. ana ʒj. M. D. pro 2. dos. noctu. His ipsis repetitis æger tandem omnino convaluit; In qua Cura 1.) sacculi, 2.) pulveres viperini, 3.) potio nocturna, 4.) Julebus ex priapo, 5.) decoctum vulnerarium optime conduxerunt.

CCLXII. Dysenteria.

Ancilla laborabat dysenteria: Post clysmata ex lacte cum saccharo propter tenesimum, aliis irritis, profuit:

- ℞. *Decoct. Priapi ceti* lbj.
& Cinam. ʒf. ʒß.
succ. cydon. ʒj. M. D. pro potu vespertino & nocturno.

- ℞. *Conserv. ros.*
Diaseord. Fracast. ana ʒijj.
Pulv. raf. priap. Ceti ʒiß.
Trochisc. de Carabe ʒj.
Corall. rubr. præp.
 ʒ sigill. ana ʒj.
Extr. torment. ʒß.
c. f. q. succ. cydon. F. Electuarium. capiat pro lubitu, sed cardialgiam insert.

CCLXIII. Hemorrhoides cæcæ.

Fœmina ardorem & dolorem insignem patiebatur hemorrhoidum cæcarum, & cum recusasset hirudinum applicationem

- ℞. *Mucilag. sem. cydon. c. sperm.*
ran. extract. ʒj.
 ʒ *camphor.* ʒj.

sacchari

Sacchari ℥ ʒi. M. quo linteum probe illitum & humectatum applicet crebrius.

Intumore & dolore hæmorrhoidum in alia Fœmina a partu:

℞. *Rad. scrophular.* ʒi℥.

Herb. & fl. linar. Mij.

fl. verbas. Mj.

Coq. in lacte simpl. l. chalybeato, & fots adhibeatur cum spongia.

Item alia Fœmina patiebatur dolorem & tumorem hæmorrhoidum cœcarum etiam extra partum, nec poterat ferre pingua & unctuosa, quæ exasperabant malum:

℞. *Ceruss.* ʒi.

Lap. calamin. ʒi.

℥ *camphor.* ʒi℥.

℥ *plantag.* ʒi. M. diluantur pro lubitu cum spermate ranarum veteri per se assertato, & applicetur linteis multiplicatis, egregie profuit.

CCLXIV. *Affectus spleneticus.*

FŒmina laborabat affectu spleneticus, doloroso, spasmodico & melancholico.

℞. *Corall. rubr. præp.*

Unicorn. ver. præp. ana ʒ℥.

⊖ *absinth.* gr. iix.

⊙ *submin.* gr. ij. M. optime profuit in Paroxysmo.

℞. ~ ⊖ * ʒiij.

cochlear. ʒi. M. D. 40. guttæ omni pastu & Hor. V. vespertina.

℞. *Corall. rubr. præp.*

Unicorn. ver. præp. ana ʒ℥.

⊖ *ad albed. calcin.* gr. v.

Extr. castor. gr. iij.

croci gr. j. M. D. in 4 plo.

Omni mane hos pulveres, a meridie & sub introitu lecti spiritum assumat. Hinc potio solutiva ex G. * cum euphoria dabatur.

Pro Præservatione

℞. *Lap. ʒ. præp.* ʒi℥.

Corall. rubr. præp.

⊖ *ad albed. calcin.* ana ʒ℥. M. pro

6. dosibus alternis diebus assumendis.

℞. *MPil. Russ.*

Extr. helleb. N. ana ʒ℥.

tart. Blat. gr. xv.

croci metall. absinth. gr. i℥.

c. f. q. R Bl. & Zwelfferi. F. Pilulæ

pro 3. dosibus vesperi hora una ante cœnam assumendis.

CCLXV. *Epilepsia scorbutica.*

Vir Juvenis laborabat Epilepsia scorbutica, cujus primum signum erat fortis cauda pavina seu crusta pellicea super urinam:

℞. ∇ *antiscorb. Dorncrell.*

epilept. Langii ana ʒiij.

~ *cochlear.* ʒi.

Tom. II. Pars 2.

C. C. ʒ℥.

Arcan. duplic. ʒiij.

Cinnab. ʒ ʒi. M. F. Potio.

℞. ∇ *antiscorb.*

fl. sambuc. ana ʒi℥.

~ *cochlear.* ʒiij.

lumbric. ʒ ʒi.

Arcan. duplic. ʒi.

Syr. scelolyrb. Forest. ʒ℥. M.

Die Intermisionis

℞. ∇ *Epilept.*

antiscorb. ana ʒiij.

~ *cochlear.* ʒi.

C. C. ʒ℥.

arcan. dupl. ʒiij.

Cinnab. ʒ ʒi. M.

℞. *Pulv. rad. jalap.* ʒ℥.

Aloës succotr. gr. v.

Scammon. gr. j.

arcan. dupl. gr. xv. M. Fortiter purgavit.

℞. ~ *Cochlear.* ʒiij.

Elix. Propr. ʒi. M. D. 40. guttæ.

℞. *Cinnab. ʒ* gr. xv.

⊖ *volat. succin.* ʒ℥.

Camph. gr. iij.

Laud. op. gr. j. M.

℞. ∇ *Epilept. Lang.* ʒi.

Ceras. nigr.

lil. convall. cum Vino.

fl. pæon. ana ʒvj.

~ *cochlear.*

lil. convall.

C. C. *essentif.* ana ʒi.

Castor. ʒ℥.

Syr. pæon. ʒ℥. M.

℞. *Herb. matv.*

rut. ana Mj.

fl. chamom. M℥.

tilie

primule veris ana p. ij.

rad. pæon. ʒi.

stercor. pavon. ʒ℥.

Coqu. in *f. q. ∇ f. Colat.* ʒviii. adde

succ. rut. ʒi.

vitell. ov. N. j. M. pro clysmate.

Et ita Cura absoluta fuit, ubi evanescebat cauda pavonis in urina, & arenulæ fundum & parietes matulæ petebant.

CCLXVI. *Malum Hypochondriacum.*

Juvenis studiis deditus malo hypochondriaco alias ab aliquot annis afflictus post insignem corporis, in specie pedum in ludo scenico refrigerationem altero die incipit dolere latere sinistro sub costis; dolor erat acutus, insigniter punctorius, conjunctus cum frequenti vomitu admodum dolorifico, insigni siti, & virium prostratione, pulsus erat mediocris in omnibus, celerior tamen & debilior; Urina pallida, cum

[Hhh 2]

copioso

copioso sedimento lateritio, Respiratio parva, quia difficilis ob dolorem; punctura subinde sursum versus præcordia ascendebat. Ipse æger splenem accusabat, cum ego dicerem esse colon, a pituita crassa viscida forsân & acida obfessum.

Rx. ∇ menth. \mathfrak{z} ij.

carminat. \mathfrak{z} vj.

~cochlear.

⊖ * ana \mathfrak{z} j.

arcan. duplic.

ocul. \mathfrak{ss} ana \mathfrak{z} ß.

Laud. op. gr. iij.

Syr. de canell. \mathfrak{z} ß. M.

Per diem hauriatur: unde dolor & symptomata aliquantisper sed non multum remiserunt. Vesper

Rx. Decoct. emollient.

carminat. ana \mathfrak{z} iv.

Elect. lenitiv.

Mell. rutac. ana \mathfrak{z} ß.

⊖ gemmæ \mathfrak{z} j.

vitell. ov. N. j. M. pro clystere: cum euphoria ingenti.

Rx. Bals. Peruvian.

⊖ nucist. expr. ana \mathfrak{z} j.

dest. mac.

caryoph. ana gt. v. M. pro balsamo applicando scrobiculo cordis & lateri dolenti.

Nox quieta, sed mane omnia symptomata redierunt.

Die 6

Rx. Elix. Propr.

~Cochlear. ana \mathfrak{z} j. M. D. 25. guttæ bis in die.

Leniit symptomata, sed brevi posthæc redierunt. Nox sequebatur gravissima, omnibus symptomatibus insigniter sævientibus.

Die 7

Rx. ∇ menth. \mathfrak{z} ijj.

cinam. \mathfrak{z} vj.

* capparum \mathfrak{z} ß.

G. * \mathfrak{z} ij.

oxymell. scillit. \mathfrak{z} vj.

Syr. de erysimo \mathfrak{z} ijj. M.

Rx. Emplastr. de Cicuta.

G. *. ana q. s.

Malaxent. cum unguento de alth. & \mathfrak{ss} laterit. ana \mathfrak{z} ij.

Inducatur super alutam F. Emplastrum, apponatur loco dolenti.

Vesper cum symptomata parum remisissent, injectus superior clyster, qui multa dura & nigra evacuavit, unde nox quieta cum placido somno. Forsân Empl. de ranis c. 8 & de cicuta non male loco hujus fuisset applicatum.

Die 8 cum omnia essent quieta,

Rx. Arcan. duplic. \mathfrak{z} j. D.

A meridie dolores ingentes redeunt, nam materia viscida, quibus totum Colon erat infarctum, successive progrediebatur ad latus sinistrum, in cujus angustiore loco hærens dolorem formabat: Injectus ergo denuo clyster materiam ibidem hærentem abstergens; omnia pacata fuerunt.

Die 9 omnia quieta; Elixyr continuatum.

Die 8 itidem, a meridie iidem dolores redeunt, sed injecto clystere omnia quiescunt, & nox pacata fuit.

Die 10 emollita jam materia:

Rx. ∇ menth. \mathfrak{z} j.

G. * \mathfrak{z} ß.

tart. Glut. gr. xv.

Scammon. ros. gr. iv.

Extr. troch. Alhand. gr. j.

Syr. Reg. Sabor. \mathfrak{z} ß. M. F. Potio, quæ sine ullo symptomate, sine ullis torminibus, siti &c. cum ingenti alleviatione 15. evacuavit copiosa pituitosa.

Die 9

Rx. Cremor tart. \mathfrak{z} j. pro abstergendis reliquiis, cum adhuc vagi motus in intestinis perciperentur.

Postmodum pro usu quotidiano

\mathfrak{z} ~ Carminat. de Trib. \mathfrak{z} ß. D.

Rx. Pulp. passul. min. \mathfrak{z} j.

Arcan. duplic.

⊖ *

Spec. diatr. piper. ana \mathfrak{z} j.

Syr. de pomis Regis Sabor. \mathfrak{z} ß.

F. Electuarium pro 5. vel 6. dosibus, ad laxandam alvum; quam egregie apertam servavit: sed cum interjecto tempore hoc amplius satisfacere nollet, gr. iij. Extr. troch. Alhand. adjeci.

Postmodum tamen Potio passulata cum tantillo fol. Sennæ singulari cum euphoria subinde intra tres vel quatuor dies semel hauriendo contulit.

CCLXVII. Dolor artuum scorbuticus.

FOemina laborabat dolore artuum lancinante, in specie in nucha, ut collum movere non posset, imbecillitate virium summa, motionibus & tumultibus in abdomine, sudor oriebatur pomeridiano tempore ingens cum virium prostratione, interdum omnium artuum refrigeratione, & imminente Syncope, eaque crebrius recurrente: Inclinationibus ad phthisin, sed mala hæc omnia ex scorbutico erant.

Pro abdominis affectibus, & inde natis lipothymiis optimum semper erat ⊖ & compos. nunc solitarie, nunc cum Scamm. gr. ß. ad gr. j. propinatum: dosis erat \mathfrak{z} j.

Pro artuum vero affectibus, doloribus & lancinationibus lac cum ~ ⊖ *, & cochleariz ana omni mane & vespri assumtum, calidum.

CCLXIX.

CCXIX. *Dolor abdominis scorbuticus.*

FOEmina laborabat dolore abdominis scorbutico, revera convulsivo, cum vagis artuum lincinationibus.

℞. ▽ *lil. convall.*

fl. tilie

menth. ana ʒi.

Magist. corall. cum succ. citr.

~ *Cochlear.* ana ʒi.

Θ * ʒß.

Laud. op. ferment. gr. vj.

Syr. cort. aurant. ʒvi. M. pro 4. dof.

℞. *Spec. decoct. carminant. usit.*

fl. chamomill. ana Mij.

Θ ʒi.

Coqu. in. f. q. ▽ f. Colat. ʒix. adde

Elect. de bacc. Lauri ʒvi.

vitell. ov. N. j. M. pro clysmate.

℞. *Magist. corall. c. succ. citr.* ʒß.

Castor. gr. iv.

c. f. q. Syr. scelotyrb. For. F. Pilulæ

S. *Abend-Pillen.*

℞. *G. * in + solut.* ʒß.

q. dulc. gr. vj.

extr. troch. Alhand.

Laud. ferment. ana gr. j. M. F. Pilulæ.

Alias ad similes dolores ad Epilepsiam terminantes præter Liqu. C. C. succinatum maxime proficuum conducebat:

℞. *Castor.* gr. iv.

Laud. ferment. gr. iß. M. F. Pilulæ.

Tandem R ̄ aperit. curam absolvit.

CCLXIX. *Arthritis vaga cum febre*

Laborabat quidam arthritide vaga cum febre, quæ in principio singulis horis vespertinis per totam noctem affligebat, & exacerbabatur, in principio cum gravi frigore, & ardore subsequente, & gravissimis doloribus vagis in artubus: hinc remittebat frigus, ut solus febrilis ardor in doloribus superesset. Hinc febris evadebat tertiana nocturna, cum febre etiam erant dolores, qui illa remittente etiam remittebant. Hæc febris perdurabat, donec urinæ post paroxysmum apparent turbida, cum copioso sedimento lateritio: His diebus intermissionis semper claris, perspicuis, tenuibus & fulvis apparentibus: Hinc mutabatur facies, ut noctes antea quietæ dierum intermittentium evaderent febiles, & dolorificæ, & ex noctes ac dies, quæ antea erant infestæ paroxysmis, essent quietæ, donec & istarum urinæ cruda fieret præcipitata, & sic sequentibus copiosis sudoribus nocturnis sanitas post 4. fere septimanarum spatium sequeretur.

In Cura febrem aut ejus calorem nihili feci, solum scorbutum observavi; Mirum tamen, quod dolores tantum cum febre comprehendere.

℞. ▽ *antiscorb.*

papav. rhæad. ana ʒij.

~ *Cochlear.*

lunbric. ʒstr. ana ʒiß.

Ess. absinth. ʒi.

Arcan. duplic.

off. microcosm. præp. ana ʒij.

Syr. scelotyrb. ʒß. M.

℞. ▽ *carminat.*

menth. ana ʒß.

~ Θ * ʒß.

Θ *volat. succin.* gr. v.

̄ *dest. anis.* gr. iv.

Laud. op. gr. j. M. Vesperi hauriatur, omisso laudano & ̄ sæpius fuit iterata.

℞. *Ess. contr. arthrit. vag.* ʒß. Sæpius hauriatur cum lacte, quod continuo usurpavit.

Ante paroxysmum etiam cœu digestivum ordinatum aliquando:

℞. ▽ *febrifug.*

antiscorb. ana ʒß.

~ *cochlear.* ʒß.

Arcan. duplic. gr. xv.

off. microcosm. præp. gr. xxv.

Syr. acetosit. citr. ʒß: M.

Tandem aliis non rite succedentibus

℞. *Herb. cochlear.*

fumar. ana Mj.

Rad. helen. ʒi.

armorac. ʒß.

passular. ʒvi.

Conc. Cont. F. Nodulus infundendus vino, de quo quater vel quinquies hauriat, singulis haustibus superassumendo ʒap. ʒß. quod aliquoties reiteratum egregie contulit, & urinas præcipitavit, sudores movit, & sanitatem restituit.

CCLXX. *Febris scorbutica.*

Mulier laborabat febre cum anxietatibus circa præcordia, quotidie 2. Hor. anticipando repetentibus, subita corporis incallescencia simul accedente, cum doloribus vagis artuum, item agrypnia & diarrhœa afflicta, idque ut hæriolabar ex fundamento scorbuti: Curata fuit sequentibus:

℞. ▽ *papav. errat.*

scorbut. ana ʒiß.

Theriac. Androm. ʒiß.

~ *Cochlear.*

Θ * *volat.* ana ʒiß.

Arcan. dupl.

C. C. ust.

ocul. ̄. præp. ana ʒi.

Syr. scelotyrb. ʒi. M. Singulis Horis ʒ. cochlearia assumantur; optime succedit. Post

℞. ~ Θ *

cochlear. ana ʒi. M. D. 25. gutt.

quater in die.

[Hhh 3]

CCLXXI.

CCLXXI. *Asthma Convulsivum.*

Studiofus hypochondriacus laborabat asthmate convulsivo, cum borborygmis abdominis per paroxysmos redeunte, cum insomniis turbulentis & terrore in somno, qui in paroxysmo ad anteriora corpus incurvando aut ligaturam fortem sub costas infligendo levamen sentiebat; Curavi præmissis vomitorio 8to præscribendo Ess. 8 liquidæ & Elix. antiscorb. ana ʒj. M. sed sine successu. Hinc

Rx. ʒ *Blat.* gr. xij.

scammon. ros. gr. v.

Troch. Alband. gr. j. M. Quibus obstructa alvus quinquies leniter cum optimo levamine soluta fuit.

Rx. *Sem. anis.* ʒß.

Arcan. duplic. ʒj.

ocul. 8 præp. ʒß.

Croci gr. v. M. D. pro 2. dosibus

Rx. ~ *Carmin. de Trib.* ʒij. D. 30. guttæ bis in die: cum euphoria. Nodulum ex Croco gestet in scrobiculo cordis, & propter difficilem coctionem, cum pressuræ stomachi & ructus post assumptum cibum adessent, bibat interdum post pastum ~ anisi aut ~ vini: & itares bene successit.

Ostiduo fere elapso redeunt iidem paroxysmi cum alvo dura, rugitibus gravibus & dolorificis abdominis, angustia summa pectoris, operationum animalium perturbatione, in quibus sentiebat originem mali in abdomine, post successive pectus & caput afficere: appetitus solus erat salvus, sed quando sufficienter comedisset, gravamen stomachi, & status copiosos, unde exasperatio mali, cum per biduum continuasset, pulverem & spiritum reiteravit.

Rx. *Specif. cephal.* ʒß.

Castor. gr. v.

Camphor. gr. j.

Laud. op. gr. iß. M. assumat vesperi cubitum iturus, quia paroxysmi media nocte imprimis affligebant.

Rx. 8o *dest. succin.*

spine ana ʒß.

bals. Peruv. gt. xij. M. pro umbilico & scrobiculo cordis. Hac nox salva & cum placido somno secuta, utut circa mediam noctem levissimum insultum percepisset.

Sed aliquot diebus rediit paroxysmus cum solitis ventris turbulentis & copiosis flatibus: Hinc

Rx. *Decoct. carmin.*

emoll. ana ʒiv.

Mell. rutac. depur.

Elect. de baccis lauri ʒß.

8o *dest. cumin.*

carvi ana gt. v.

8 *gemmæ* ʒij.

vitell. ov. N. j. F. Clysma; appli-

candum vesperi ante paroxysmum: Valde profuit.

Tandem

Rx. *Spec. diacumin.* ʒj.

8 *depur.* ʒj.

8o *dest. cumin.* gt. iv. M. pro 3. dos.

CCLXXII. *Scorbutus.*

FOemina laborabat scorbuto cum symptomatibus quasi febris continuæ, summa virium prostratione, & quando ex lecto se movebat, imminentibus lipothymiis, cum facillima à quocunque dulci suffocationis interna excitatione:

Vocatus die 8 vesperi:

Rx. 8 *diaph.* ʒj.

Specif. cephal. gr. xv.

8 *prunell.* ʒj.

Laud. op. gt. ij. M. pro 2. dosibus.

Die 9

Rx. ʒ *borrag.*

galeg.

ulmar.

cordial. Herc. Sax. ana ʒj.

cinam. ʒß.

✱ *bezoard.* ʒvj.

Syr. acetos. citr. ʒß.

~ *ceras. nigr.*

ocul. 8. ana ʒij. M. D. 2. cochlearia

singulis semihoris

Rx. *Milii* Mj.

8 *toft.* Mß.

Merb. verben.

Flor. chamomill. ana Mß.

Pulv. rad. rhod. ʒß. M. F. facculus pro capite; contra ejus dolorem fixum prope futuram coronalem. Applicatum fuit pedibus cataplasma ex rad. raphani, fermento, 8 & ✱ cum euphoria.

Vesperi

Rx. *sem. citr.*

napi ana ʒj.

papav. alb.

c. f. q. ʒ plantag. F. Emulsio adde

C. C. f. 8

8 *diaph.*

Ebor. f. 8 ana ʒj.

8 *prunell.* ʒß. M. Cujus medietas cum euphoria hac nocte fuit consumpta.

Die 10

Rx. *Decoct. carmin.* ʒviij.

Elect. lenit. ʒj.

de bacc. laur. ʒß.

8 *st.* ʒj.

vitell. ov. N. j. M. F. Clysma: cum successu.

Rx. *Antihet. Poter.* ʒß.

Specif. cephal. gr. xv. M. pro dosi.

Vesperi & noctu altera emulsionis medietas est assumpta.

Die 11

Die ♀ Vesperī

℞. ▽ *antiscorb. Doncrell.*

card. bened. ana ʒi.

hypnot.

cinamom. ana ʒß.

ocul. ʒi.

Panac Holsat. ʒi.

~ *cochlear. ʒß. M. cum euphoria.*

Die ♀ eadem potio reiterata fuit,

Die ☉ optime habens post pastum ex lecto surgens lipothymias incurrit, unde pulvis primum repetitus.

Die ☽.

℞. *Decoct. hord. c. C. C. ʒviii.*

▽ *antiscorb. ʒij.*

Syr. acetos. citr. ʒiß.

R fl. aquileg. ʒij.

~ ☉ *q. s. prograto acore. M.*

Hoc Die & noctu assumsit cum euphoria.

Die ☿

℞. *Arcan duplic.*

Rhabarb. el. ana ʒß.

Castor. gr. v. M. Inde purgationes

3. secutæ sunt.

CCLXXIV. *Folliculus fellis petrefactus.*

Retulit mihi Pecquetus Parisiis, se vidisse in foemina post mortem dissecta vesicam felleam penitus cum materia contenta petrefactam, magnitudinis pyri mediocris; in hepate inventam fuisse materiam flavescentem. Sed huic foeminae singulis mensibus ad 8. dies præter propter obvenit fluxus alvi seu diarrhoea biliosa ordinata vice, sicut menstruo rum fluxus periodicus, & denuo cessabat, sequente eadem diarrhoea repetebat, & similiter durabat, idque longo tempore ante ejus mortem.

CCLXXV. *Hydrops.*

Foemina desperato laborabat hydrope:

℞. *Rad. Cichor. ʒiiij.*

gramin. ʒij.

gentian.

helen.

Cortic. rad. cappar. ana ʒi.

L. sassaf. ʒij.

Absinth. Comar.

Pontic.

Fol. card. bened.

summit. centaur. min. ana p. j.

Flaved. cort. citr. ʒij. Incis. F. No-

dulus, cui affundatur Mens. ß. vini malvatici, vel alius Hispanici, stent in loco tepido per 8P. Hinc bibatur mane haustulus unus ante usum jusculi. Egregie per ☐m evacuat. Continuandæ vero sunt hæ potiones aliquandiu; omni septimana simul clyisma emolliens & carminans applicando, & si-

mul sacculum ex aromaticis amaricantibus & carminantibus in ▽ vel Vino coctis abdomini vel seroto imponendo.

CCLXXVI. *Hydrops.*

Foemina alias epileptica, aliquando desperato laborans hydrope ascite, adeoque à Medicis relicta usu succi radicis ireos in vino malvarico hausti & herbæ hederæ ☿stris convaluit. Scilicet extra hederam ☿strem locis tumentibus imposuit, unde notabiliter tumorem remitti observavit: Item assumsit hancherbam in Cerevisia vel ▽ coctam crebro, copiose & calide; & sic convaluit.

CCLXXVII. *Anasarca.*

Vir laborabat affectu anasarcae vel potius leucophlegmatiae simili cum præsentaneo suffocationis periculo: quem antea repetitus vomitus nonnihil juvabat. Unde & cum duobus diebus ante vomitum provocasset, dedi ratione difficillimæ suffocationis ceti ʒi. in cerevisia calida, ter repetita fuit dosi, unde sensibile levamen. Hinc ut per ☐m fere suppressam pellatur causa peccans:

℞. ~ *Carminat.*

R nephrit. ana ʒi. M. D. ter vel quater in die 40. guttæ in haustu vini absinthites. Cum non sufficeret:

℞. *Rad. bryon. rec. ʒi.*

asar. ʒß.

☉ ʒiiij.

Infund. in f. q. ▽ *simpl. Stent in loco tepido per 8 mane adde*

Rad. vincetox. ʒvj.

Comar. absinth. Mj.

Flor. bellid. Mß.

Baccar. junip. ʒvj.

sem anis.

fœnic. ana ʒij. Coqu. omnia simul

in f. q. ▽ simpl. Colat. ʒxv. adde

~ ☉*

R nephrit. ana ʒij.

Syr. de hyssop. ʒß. M. Capiat ter in

die haustulum; Potus erat Cerevisia, cui infundebatur nodulus, ex cochlearia recenti, item interdum Essent. absinthii immiscebat potui huic, quam etiam subinde in ~ ardente fœniculi capiebat; Plantis pedum in summis angustis emplastrum album, instar de cerussa, vel spermate ranarum, dicebat: **es wäre gemein Zug = Pflaster.** Bibebat interdum simul serum lactis, ut promoveatur ☐ fluxus. Decoctum in specie egregie contulit.

CCLXXIIX. *Icterus.*

Puerpera cum purpura simul consuebat Ictero symptomatice, sed vago: Scili-

Scilicet fere intolerabiles cardialgiæ spasmodicæ eam cruciabant, primario in regione dorsi, opposita orificio superiori stomachi, unde & hypochondria tanquam cingulo cingi, & respiratio sufflaminari cœpit, ut vix verbum proferre possit. Alvus in paroxysmo tali aliquoties libera, interdum & vomitus superveniebat, ☐ crassa, intense & obscure tincta, argillaceo-purpureum sedimentum seponebat; pulsus rarus, tardus, debilis, magnus. Die à paroxysmo secundo fere efflorescentia icterica, amarities in ore nulla, saltem intensissima sitis, paroxysmum imminuentem præcedebat sensus & sapor acidus ex stomacho quasi Glicus aut cremor. ♀. Tentata varia:

℞. *Extr. Chelidon. maj.* ʒj.
Lap. bezoard. occid.
 ʒ diaphor. ʒl. ana gr. xv. M.

℞. ∇ *taraxac.* ʒj.
Extr. chelidon. ʒʒ.
 ☉ *volat. C. C.* gr. ix.
Syr. card. bened. ʒj. M.

Pro laxatione interdum repetenda

℞. *Pulv. rhabarb.* ʒʒ.

☐ ☉l. gr. xij. M.
 ℞. *Specif. ad Icterus* ʒj.
Crystall. præp. gr. v.
Croc. gr. ij. M. D. mane.

℞. ☿ ☉* *simpl.* ʒʒ. D. 40. guttæ Hor.
 v. & sub introitu lecti. Melius habuit.

℞. *Unicorn. ver. præp.*
 C. C. f. Δ ana gr. xv.
 ☉ *absinth.* ʒj. M. pro 2. dosibus.

Dabatur etiam decoctum passularum min. in ∇ com. pro potu nocturno, & intermedio inter passum tempore.

CCLXXIX. Icterus.

IN fœmina ictero laborante optime conducebat pulvis ad icterum, & ☿ Carminativus de Tribus. Item

℞. ∇ *Chelidon. maj.* ʒiij.
Specif. ad Icterus ʒij.
 ☉ *volat. lumbric. ☿str.* gr. xv.
 ʒ diaph. gr. xij.
Syr. card. ben. ʒiij. M.

Capiat pro lubitū. Hinc clyisma.

CCLXXX. Tumor Uteri hydropicus.

Mulieri tumore uteri hydropico ex suppressis ad aliquot annos lochiis laboranti præscripti:

℞. *Arcan. duplic.* ʒij. D. pro 2. dosibus.
 ℞. *Extr. Elater.*
 ʒ *dulcis* ana gr. xij.
Extr. troch. Alband. gr. iij.

c. ☿ *lumbric. ☿str.* F. Pilulæ assumentæ sequenti die: quæ sine molestia ulla egregie & copiose evacuarunt, 6. l. 7. vicibus materiam nigram instar atramenti.

CCXXXI. Nimius Mensium fluxus.

Mulier plethorica sed sanguine terosiore turgens post abortum subinde in enormem uteri hæmorrhagiam incidit, aliis fere frustraneis cum successū præscripti:

℞. *Conserv. ros. antiqu.* ʒvj.
diacydon. f. spec. ʒiij.
Corall. rubr. præp.
sanguin. dracon.
off. hum. calcin. ana ʒj.
Troch. de Carabe.
O crud.
sem. plantag. ana ʒij.
Laud. op. gr. vj.
Syr. corall.

canell.

de ros. siccis ana q. s. M. F. Electuarium, quod in principio aliquali turgescencia fermentat.

Hoc ter in die magnitudine juglandis capiendum & haustulus vini superbibendus.

CCLXXXII. Nimius Mensium Fluxus.

Cum alia essent irrita, cum successū præscripti:

℞. C. C. *ust.* ʒj.
Lap. hæmat. præp. ʒj. M. pro 2. dos.
 ℞. C. C. *ust.*
Trochisc. de Carabe ana ʒij.
Lap. hæmatit. præp. gr. xvj. M. pro 2. dosibus.

Vitando vinum. Nam hujus usu exasperabatur insigniter fluxus, vitando etiam frigidum potum. Externe admovebat decoctum gallarum cum ☿ pubis regioni, idque frigide.

Conferebat prius etiam aliquantis permixtura ex diascord. Fracast. ʒj. corall. & hæmatit. cum ☿ vini.

Cum pateretur recidivam alia vice:

℞. *Conserv. ros. ☉lat.* ʒvj.
 C. C. *ust.*
Corall. rubr. præp.
Troch. de Carabe ana ʒj.
O crud. ʒʒ.

c. f. q. *syr. cydon.* F. Electuarium spissius, de quo sæpius pro lubitu capiat.

CCLXXXIII. Fluxus Mensium Nimius.

IN fluxu mensium nimio singulis 14. diebus recurrente post fœtum mortuum:

℞. *Corall. rubr. præp.* ʒij.
Dent. hippopot. ʒʒ.
Lap. hæmatit. ʒj. M. sumatur omni

vespera. Sed mane Liqu. ☿ Orem.

CCLXXXIV. Hæmorrhagia uteri.

Fœmina patiebatur gravem hæmorrhagiam uteri, sæpius recurrentem, ex scorbuto:

Repetita interdum fuit alvi solutio per Rhabarb. ʒʒ. Hinc

℞. Co-

℞. *Corall. rubr. præp.*
Lap. hæmatit. præp.
boli armen.
unicorn. ver. præp. ana ʒi.
sem. plantag. ʒiijß.
alum. crud. ʒß.

Laud. op. gr. v. M. Capiat bis in die bi-
 horio ante coenam, & sub introitu lecti: ma-
 ne vero *Liquor. ʒ c. succ. pom. gutt. 30.* jeju-
 no stomacho.

Interdum pulvis hic cum *Conserv.*
menth. ʒ ros. rubr. ana ʒvj. & cum *Syrup.*
ros. rubr. in Consist. Electuarii, sed ingrati re-
 digebatur.

CCLXXXV. *Fluor albus.*

IN fluore albo aliis irritis sequentia pro-
 fuerunt:

℞. *Pulv. Cort. avellan. ʒij.*
Sem. anis. ʒi. M. pro 4. dosibus.

℞. *Ebor. f. Δ.*
Corall. rubr. præp. ana ʒß.
Lap. osteocoll. præp. ʒi.
ʒo dest. terebinth. gutt. vj. M.

℞. *Ebor. f. Δ.*
Corall. rubr. præp. ana ʒß.
Lap. hæmatit. ʒi.
ʒo dest. anthos. gt. iv. M.

Hinc Essentia Lignorum D. Mich. & præli-
 minariter *Liquor ʒ Or. ad 15. gutt. omni*
 mane.

CCLXXXVI. *Hysterica Passio.*

MUlier male tractata in partu lactans pue-
 rum & ordinarie habens menstrua,
 cum ablactasset puerum, incidit in hæmor-
 rhagiam uteri nimiam, ordinario mensium
 tempore, ut quidem non adeo confertim nec
 etiam adeo continuo, subinde tamen plus mi-
 nus per integras 6. hebdomadas fluere san-
 guis, superveniunt tormina vehementissima
 & crudelia lateris seu hypochondrii sinistri &
 totius abdominis, in specie dorsi & regionis
 lumborum, cum difficili respiratione & an-
 xietatibus ac compressionibus cordis, super-
 veniente spasmu quasi manus ac pedis sinistrae,
 uti & faciei partis ac nasi sinistrae cum harum
 partium refrigeratione, pulsus erat parvus,
 celer, & fere nullus: hæcque per Paroxysmos
 subinde sic recurrebant; Vocatus in Paroxy-
 smo, cum alvus per 5. dies esset obstructa,
 præscripti:

℞. *Rad. angelic.*
levistic. ana ʒvj.
Herb. malv.
chamomill. ana Mj.
Flor. chamomill.
sambuc. ana Mß.

Sem. 4. calid. min. ana ʒij.
Coqu. in f. q. ʒ simpl. Colat. ʒ. ʒix. adde
Elect. de bacc. Laur. ʒvj.
Tom. II. Pars 2.

ʒo dest. succin.
cumin. ana gt. vj.
castor. ʒß.
⊕ ʒt. ʒß. M. pro clysmate.

℞. *ʒo chamom. ʒij.*
dest. succin. ʒij.
carvi.

fenic. ana gt. x. M. pro inun-
 ctione hypochondriorum & umbilici.

℞. *ʒ hirund. cum castor. ʒij.*
meliss. cum vino ʒi.

~ ⊕ * ʒi.
cochlear. ʒß.
⊕ volat. succin. ʒß.

Laud. op. gr. iij.
Syr. cort. aurant. ʒvj. M.

CCLXXXVII. *Hysterica Passio.*

FOEmina hysterica passione laborabat una
 cum ictero, cum illa remittente nonni-
 hil graves dolores & cruciatus stomachi & ab-
 dominis superessent, ex pituita vitrea acida:

℞. *ʒ menth.*
fl. sambuc.
matricar. ana ʒi.
Ess. Castor. ʒiß.
⊕ volat. C. C.
succin. ana gr. xij.

Laud. hyst. gr. ix.
Syr. cort. aurant. ʒiij. M.

℞. *ʒo dest. succin.*
spice ana ʒi.
nucist. expr. q. f. pro balsamo.

Inungantur regio stomachalis, umbili-
 calis & hypochondria. Idque mire laudavit.
 Conducebat etiam sequens clyisma, quod
 cum linimento pituitam mucilaginosam pro-
 be detergebat, & liquefaciebat, ut sponte
 plures dejectiones mucilaginosæ sequerentur.

℞. *Decoct. carminant. ʒix.*
⊕ tart. ʒi.
Electuar. lenitiv.
de bacc. laur. ana ʒß.

castor. ʒß.
ʒo dest. cumin.
carv.
succin. ana gt. ix.

vitell. ov. N. j. M. pro clysmate.
 Pilulis usualibus utebatur:

℞. *G. * in ʒ sol. gr. xv.*
Castor. gr. v.
Extr. troch. Alband. gr. j.
c. f. q. Ess. salv. F. Pilulæ.

CCLXXXIIIX. *Passio hysterica.*
Mensium Suppressio.

ANcillæ menses supprimebantur, dolor
 accedebat gravis, in sinu & lumbis, respi-
 ratio difficilis, amissa loquela, fauces occlusæ, ut
 iusculum calidū deglutire nequiret, anxietates,

[Iii] suffo-

suffocatio imminens, lipothymia recurrentes, rugitus abdominis, dolor capitis, scotomia, tinnitus aurium. Adstantes credebant esse catarrhum suffocativum, ego passionem hystericam esse dicebam cum mensium fluxus suppressione:

- ℞. ▽ *puleg.*
meliss. ana ʒiʒ.
 ~⊖* ʒi.
 ⊖ *volat.* C. C.
succini ana gr. vii.
Syr. cort. aurant. ʒvi. M. optime contulit.
 ℞. ~⊖* ʒi.
Ess. castor.
myrrh. ana ʒʒ. M. D. ʒo. guttæ crebrius.

Mane secta vena in pede cum euphoria, quemadmodum & clyster bene contulit; cum præcordia essent plena mucilagine viscida, & dolores acerbi punctorii in hypochondrio sinistro, præscripsi potionem ex G. * cum successu, tandem *Elix. Proprietatis*.

CCLXXXIX. Stranguria & affectus nephriticus in gravida.

G Ravida patiebatur dolorem in dorso e regione lumborum, ☐ creberrimum stimulum, ejusque crassæ turbidæ excretionem, cum summo conatu, ita ut etiam alvus crebrius deponeretur, diutius illam non poterat continere, & quando ☐m excernebat, tanta cum molestia id fiebat, ut totum corpus inde contremisceret. Nephritidem esse notham judicabam; Erat medio gestationis tempore.

- ℞. *Corall. rubr.*
Lap. percar. præp. ana ʒj.
 o° *dest. cort. aurant.* gutt. ij.
Ess. opii gutt. x. M. pro 2. dosibus.
 Optime contulit.
 ℞. *Bals. Copayv.* ʒj.
R tart. acris ʒiij. M. D. ʒo. guttæ.

CCXC. Dolores post partum. Passio hystERICA.

D Oloribus post partum gravibus laborabat puerpera:

- ℞. ~⊖* *anis.* ʒij. D. 40. guttæ sæpius.
 Hinc clystma carminans injectum est.
 ℞. o° *cheiri* ʒʒ.
dest. chamomill. ʒj.
anis. ʒʒ. M.
 Sed cum jungeretur passio hystERICA:
 ℞. *Matr. perlar. præp.* ʒʒ.
Antihæct. Poter. gr. xvj.
 ⊖ *volat.* C. C. gr. vi. M. pro 2. dos. bene contulit.
 ℞. *R tart.* ʒij.
myrrh. ʒj. M. D. 40. guttæ.

CCXCI. Febris Puerperæ.

D Le 4to ab abortu incidebat foemina in febre:

- ℞. ▽ *hirund. cum castor.* ʒij.
meliss. ʒj.
ocul. b. præp. ʒʒ.
 ʒ *diaph.* ʒʒ.
bezoard. ʒl. gr. v.
spermat. cet. ʒj.
myrrh. ʒʒ.
crocigr. v.
Syr. cort. Ont. ʒʒ. M.

Cum hystERICA fieret, cum sensuum imminutione, calore interno, pulsu crebro & frequenti, nonnihil debili cum crebris oscitationibus:

- ℞. C. C. f. Δ
Cinnab. ʒ ana gr. ix.
myrrhæ el.
 ⊖ *volat. succin.* ana gr. v.
castor. gr. iij. M.

Curata hæc Muller cum exiret in templum, recidivam febris patitur gravem, quæ typum tertianæ representabat cum gravi dolore uteri, tantum in exacerbatione Paroxysmi affligente; præmissio ultimo pulvere cum euphoria præscripsi ~⊖* *volat.* cujus usu cum bis accessisset febris, supervenit diarrhoea spontanea, una cum lochiorum fluxu sanguineo, unde & febris & uteri dolor sopitus, ipsaque curata fuit.

CCXCII. Tinea Infantis.

I N Tinea pueri 7. annorum sicca, crustosa, cum pustulis & pediculis:

- ℞. ʒ *dulc.* gr. viij.
pulv. jalapp. gr. v. M.
 Secuti fuerunt bini vomitus & secessus.
 ℞. *Bals. Δ anis.*
terebinth. ana ʒj. M. D. 7. gutt.
 omni mane. Externe
 ℞. *Ungu. de Tut.* ʒʒ.
 ⊖ *tart.* ʒij.
 o° *spicæ* ʒʒ.
c. f. q. o° nicot. F. linimentum molle.
 Loco hujus sequens etiam conducit:
 ℞. *Pingu. gallin. non salit. f. porcin.* ʒʒ.
Empl. de Tutial. de b ʒij.
Fl. Δ ʒij.
 ⊖ *tart.* ʒj. M. Illinantur loca crustosa & sæpe repetatur; ac subinde balneo ex cerevisia secundaria abluantur.
 His non sufficientibus
 ℞. *Ungu. de Litharg.* ʒiij.
Fl. Δ ʒvi.
 ʒ *virv. saliv. extincti* ʒʒ.
c. f. q. o° hyper. F. In mortario hæc liniment.
 Sin repulsa plus minus tinea affectus faucium, quem catarrhum suffocativum vulgo vocant, superveniat, in potu nodulus ex Rhabbarbaro & helenio infundatur, præterea
 ℞. *R tart.*

℞. *Rtart. Comp.* ʒij.
 ~ *Θ* anis.* ʒj.
Ess. opii ʒß. M.

CCXCIII. *Herpes.*

IN herpetibus foedissimis Studiosi præmissa purgatione gli optime conducebat Ess. viperarum. Externe vero fieri decoctum jussi ex Herb. nicotianæ ex ∇, quo abluebat loca herpete obsessa mane & vesperti calide: illinendo desuper sequens:

℞. *Ungu. alb. camphor.* ʒß.
diapomph. ʒij.
g. dulc. ad Extr. ʒiß.
c. f. q. o. nicot. F. linimentum.

CCXCIV. *Dysuria ex vino.*

NOvi foeminam, quæ quoties vinum bibit, dysuriæ est obnoxia, quam tamen o amygdalarum dulcium cum lapillis percarum statim sedat.

CCXCV. *Tussis ex ∇ odore.*

CHymicus quidam hic locorum ex odore ∇ gravem tussim contrahens, coquendo hederam ∇-strem cum ana cerevisiæ & aquæ, & per tempus usurpando restitutus est.

CCXCVI. *Febris piperis curata.*

JUvenis 17. annorum 70. grana piperis leviter contusa, cum febre intermittente laboraret, pro una dosi assumsit, & febris emanavit, ut post dies aliquot ex haustu cerevisiæ secundariæ frigida redierit, piperis tamen usu continuato iterum fuit profligata.

CCXCVII. *Ischuria.*

MUlier per 7. dies urinæ suppressione laborabat; tandem aliis irritis Emulsionem Cratonianam ex violarum semine præscripsi, unde ischuria sublata, sed epilepsia insecuta est.

CCXCIX. *Cholera.*

Affligebatur quidam per 4. dies desperata cholera, postquam vero V rectificatissimum ab herbis cordialibus abstractum, cujus ʒj. camphoræ ʒj. fuerat additus, cum linteis multiplicatis regioni epigastriæ applicueram, cum admiratione summa adstantium ne semel quidem evomuit.

CCXCIX. *Hellebori albi noxæ.*

MUlieri, Materialistæ uxori, inter alia rad. hellebori nigri vino infundendam suaseram; famulus autem ejus, helleborum album efficaciorē ratus, illi substituit, unde non solum vehementissimi vomitus, verum & jam cruenti fuerunt insecuti.

Tom. II. Pars 2.

CCC. *Hæmorrhoides cæcæ.*

FOEmina secunda vice gravidæ, tumetibus hæmorrhoidibus afflicta, ita ut alvum intra annum sine summo dolore dejicere non potuisset, suasi radicem scrophulariæ coxæ alligare, folia vero omni mane cum butyro & pane comedere, aliamque radicem ejusdem modulo inclusam potui infundere, & felix inde effectus insecutus est.

CCCI. *Vomitus Cruentus.*

FOEmina phthifica, quæ inter alia imprimis de dolore in latere dextro sub hypochondrio querebatur, ubi pancreas inseritur in intestinum duodenum, vomitum infirmul cruentum patiebatur, cui sequens portio optime profuit:

℞. ∇ *plantag.*
tormentill. ana ʒj.
cinam.
 ✕ ana ʒvj.
Corall. rubr. præp. ʒß.
Troch. de Carabe ʒj.
 ∇ *sigill.* ʒß.
Mionia gr. vj.
Laud. op. gr. ij.
Syr. de symph. Fernel. ʒj. M.

CCCII. *Diarrhæa.*

VIr consistentis ætatis, habitusque cætera sani, in itinere infestatur diarrhœa, cum appetitu prostrato, siti, & imbecillitate vitium, qui curatus quidem fuit quoad diarrhœam per debita remedia, deficiebat nihilominus appetitus, & pauca licet comedens qualibet tamen nocte quinquies vel sexies per alvum reddidit liquida. Malum oriri videbatur ex cruditatibus stomachi nidorosis, siquidem omnibus mane patiebatur ructus nidorosos; Hinc exhibui ei Vomitorium, unde ad tempus melius habebat, sed non diu post recidivabant pathemata, non tamen adeo atrociter.

CCCIII. *Hæmorrhoides.*

PUer 12. annorum dolore & fluore hæmorrhoidum internarum laborabat, licet igitur alvus quotidie esset aperta, idque forsan occasione doloris stimulanis, dedi tamen sequentem pulverem cum euphoria; præmissis *olibis*, sed irritis:

℞. *Pulv. Rhabarb.* ʒj.
Corall. rubr. ʒß.
Lap. hæmat. gr. v. M.

Inde enim omnia evanuerunt symptomata, & cum post aliquot septimanas idem malum recurreret, eodem pulvere denovo curabatur.

[Iii 2]

CCCIV.

CCCIV. *Tussis.*

A Liquando eram sanissimus, & parabam clystum ex δ , \oplus , & \triangle , per retortam, sed ex intensiore igne rumpebatur retorta, unde ingredientia \triangle ea copiosum fumum acidum eructabant, ex cuius inspiratione incidi æstivo tempore in coryzam & tussim per 4. septimanas pertinaciter durantem, in qua copiosa, admodum mucilaginoso per nares emungebam, & tussi per os rejiciebam; quæ non destillabant ex capite, cum nulla pateat via, nec erant in massa sanguinea, nec in corpore, sed fiebant in summitate narium & in aspera arteria, ex acido inspirato has partes lædente; unde primo copiosior lymphæ alluebat, postmodum superveniente dispositione phlegmonode & aliquali excoaratione dictarum partium, earum alimentum proximum in talem mucum copiosum degenerabat, donec irritatione cessante, indeque lymphæ copiosiore affluxu desinente & per vulneraria restitutis partibus læsis, alimento non amplius degenerante omnia illa Symptomata cessarent.

CCCV. *Tussis.*

Puer 10. annorum constitutione fere asthmatica, facie tumida, dormiebat aperto ore & cum stertore, obnoxius subinde erat aliquali tonsillarum tumori. Hic vel ex simplici aeris frigidi nudo capite susceptione, vel ex refrigeratione extremorum post corporis motum, & exercitium proxime insequente, aut certe altera nocte in catarrhum suffocativum incidebat, ita ut suffocandus omnino videretur, facies intumescerebat, ex rubro cœrulescebat, tussis crebra, sed inanis, & sub qua nil, præterquam tenuis & pauca lymphæ evacuaretur. In Paroxysmo semper dicebat: *Est kügele ihm in der unechten Kehle* / nempe erat affectus laryngis, ex lymphæ acri vellicante ortus, in motu debito impedita. Cum evanisset Paroxysmus, febris aliquot dierum lenta supererat, tussis frequens & pedetentim copiosi muci, crassi & visceri, per aliquot dies excretio, & sic morbi solutio. Redibat tamen sæpius Paroxysmus, idque speciatim hyberno vel verno tempore, rarius æstate. In Paroxysmo inungebant adstantes verticem balsamo succini, vel bronchia fortioribus ligaturis constringebant. Præscribebam sequentem potionem, ut irritationis sensum & hinc laryngis contracturam lenirem:

Rx. ∇ *scabios.* \mathfrak{z} ij.
asthmat. \mathfrak{z} ss.
Syr. diacod. Mont. \mathfrak{z} j. M. Item
Rx. ∇ *scabios.* \mathfrak{z} ij.
 $\sim \Theta$ * *anis.* \mathfrak{z} iss.
Syr. papav. alb. \mathfrak{z} vj. M.

Externe in regione laryngis cum linteis calidis applicari & sæpius reiterari iussi:

Rx. ∇ *articul. ad Extr.* \mathfrak{z} ij.

\sim *Ceras. nigr.*

lil. convall. ana \mathfrak{z} j.

Ess. opii \mathfrak{z} ij. M.

Hincce brevior reddebatur Paroxysmus: quo finito præscripti:

Rx. ∇ *scabios*

serpill. ana \mathfrak{z} iss.

asthmat. \mathfrak{z} vj.

Flor. \triangle \mathfrak{z} ss.

Syr. asthmat. \mathfrak{z} j. M.

Quæ potio crebriorem tussim & materiæ copiosioris rejectionem prævenit; Tandem ob crebriorem nimis recidivam in subjecto phlegmatico, seroso chylo abundante inurebatur brachio sinistro foniculus, unde nec crebri adeo nec adeo graves postmodum redierant Paroxysmi. Circa annum 14. denuo claudere cœpit foniculum, cum spes esset ex alteratione corporis, & notabili habitus ejus immutatione, etiam hunc affectum immutatum iri.

• CCCVI. *Febris tertiana absque calore.*

Erat hic Artifex, qui laborabat perfecta tertiana, anticipante semper Paroxysmo duabus horis cum nullo subsequente calore. Existebat alias summe scorbuticus; Paroxysmus ingruebat maximo cum rigore, & gravissimo horrore, ultra horam integram durabat, postmodum loco doloris atrocissimi dolores totum corpus, omnesque artus cruciabant, in specie regionem dorsilumbarem, in & circa centrum mesenterii & femora. Cum his doloribus sensim solvebatur Paroxysmus: circa cujus finem subinde materia viridissima, teterrimi tamen & amaricantis saporis vomitu ejiciebatur. Urina erat insigniter turbida, pallida & crassa, cum copioso sedimento, simulque arenulis, seu potius salibus scorbuticis matulæ affixis. Vocatus ego, cum jam purgatus esset, curavi eundem attemperando acidum:

Rx. *tart. Glut.* gr. xv.

Lap. S. gr. xij. M. capiat ante Paroxysmum, qui tum erat quartus; Post hoc remedium & frigus & dolores insigniter remiserunt, & quidem blando sudore subsequente, absque tamen insigni incalescentia corporis, potius erat sudor subfrigidus; Post Paroxysmum & sudorem vomitus ordinarius sequebatur; Die intermissionis propter radicem scorbuticam præscriptum est:

Rx. $\sim \Theta$ * \mathfrak{z} ij.

cochlear. \mathfrak{z} j. M. D. 40. guttæ bis in die intermissionis bihorium semper ante pastum, & die Paroxysmi bihorium ante eundem.

CCCVII.

CCCVII. *Hæmoptoe in gravida.*

Mulier quædam juvenis, hilaris, vegeta & gracilis, cujus vasa sanguine turgebant, cum esset prima vice gravida ultimumque gestationis tempus adesset, & ante menses quatuor tempore æstivo ex cursu & motu in horto in sputum cruentum incidisset, moxque fuisset sanata, antecedente septimana ex improvise vespere cum tussi sicca copiosum sanguinem floridum spumofum ex ore emisit, cessante tussi lectum petiens placide dormivit. Mane vocatur Medicus ordinarius, qui præter pulveres confortantes ratione foetus ordinat cucurbitulas scarificatas scapulis & brachiis pro aversione sanguinis imponendas. Sed ego vocatus non probavi consilium, parum enim evacuant, & tamen sanguinem versus pectus alliciunt, & metus est, ne circa vesperam hæmoptylis major recurrat, quod etiam factum est. Quapropter altero die jussi venam secare in brachio ad ζ iv. simul ordinando sequentem misturam:

Rx. ∇ *plantag.*
portulac. ana ζ j.
 \star *vini* ζ ii.
Corall. rubr. præp. \mathfrak{z} j.
 \equiv *sigill.* \mathfrak{z} ß.
Syr. fl. papav. err. ζ vi. *M. pro* 2. *dof.*

Interim nullum sanguinem rejecit, sed saltem subinde sreat, & tum sputum cruentum rejicit, quod saltem ex capite laryngis deductum fuit. Vespere sanguinis sputum recurrebat eodem impetu, inde ægra delassabatur, foetu fortius se movente; Unde ordinabam quietem, prohibebam Vinum Rhenanum, sed imperabam dulce, & sequens Electuarium:

Rx. *Conserv. heder.* \equiv *str.*
ros. rubr.
costæ ana ζ vi.
Hematit. præp. ζ ij.
Corall. rubr. præp. ζ j.
 \equiv *sigill.* \mathfrak{z} ij.
c. syr. papav. alb. *F. Electuarium.*

Libenter ordinassem trochiscos de Carabe: sed quoniam eos ingreditur opium crudum, propter foetum timui. Electuarium sæpe sumsit, & multos dies sine sputo fuit cruento.

CCCLIX. *Tinea capitis. Epiphora. Lethargus.*

Curavi puellam 4. annorum, quæ laborabat tinea capitis, qua evanescente superveniebat Epiphora oculi dextri, cum sensili oculi atrophia. Hac cessante accedebat febricula lenta, quæ omni vespere exa-

cerbatur, cum continua in somnum proensione. Quæ omnia superveniebant omnino ex tinea capitis, & ejusdem fermento acri, mediante lymphæ ad interiora raptæ. Puella erat intractabilis, omniaque remedia respuebat, hinc applicabam vesicatorium nucha, ex emplastro citrino liquefacto cum cantharidibus, quod ingentem vesicam excitabat, cum copiosissimo feri profluvio; unde altero die omnis febris & somnolentia evanescebat, epiphora cessabat, & tertia die restituebatur.

CCCIX. *Scabies. Vertigo.*

Vir laborabat scabie, quem præmissis præmittendis jussi se inungere cum unguento quodam, sed calide: dum autem cubitum petit, unguento illinit artus, sed quia cubiculum erat frigidum, accipit vas carbonum, calefacit artus & sic cubitum petit. Mane evigilans totus erat vertiginosus, & non audebat tres gressus facere, ne corrueret, dicebat: *es sey ihm so angst und weichlich / als wenn er sich übergeben sollte*: Suspicio erat: an scabies fuerit retropulsa, quia æger etiam inunxit præcordia: brevi tamen post superveniebat vomitus cum euphoria ægri. Ordinavi quædam stomachica; Vespere jussit afferri vas carbonum, inunctionem repetiturus; & subito atque olfecit carbones, vertiginosus factus est: Hinc manifestum est, vertiginem ortam fuisse ex fumo carbonum. Hæc ergo vertigo fuit per consensum stomachi, quia ejusdem pathema vomitus, factus cum euphoria ægri satis ostendit, in stomacho fuisse radicem morbi.

CCCX. *Vertigo.*

Viro cuidam vertiginoso à festo paschatis ad principium usque hyemis præmissis præmittendis ad imitationem Willisii de de Anima brutorum Part. II. cap. 2. præscripsi:

Rx. *Stercor. pavonis* ζ iiij.
rad. pæon. mar. ζ j.
Pulv. caryoph. ζ iiij. *M.*

De quo capiebat quotidie bis largam dosin, mane jejuno stomacho in vehiculo calido, & bihorio ante cœnam in frigido. Continuavit per aliquot septimanas cum successu. Omni vespere sub lecti introitum accepit simul $\sim \Theta \times$ anis. gutt. XL.

CCCXI. *Gonorrhæa vera.*

Curavi aliquando Studiosum Suecum, ex manuſtupratione sub primo pubertatis tempore per plures annos repetita, diuturna

gonorrhœa affectum, idque ob vesicularum seminalium laxitatem. Mille fere remedia fuerant adhibita, sed frustra: Tandem

℞. R⁴ \bigcirc ℥. 3℔. D. 40. guttæ omni mane in vehiculo calido; à meridie vero Hor.v. Trochisc. de Carabe 3℔. assumat; quibus aliquandiu continuatis, & observata simul diætâ tenui & stricta, & decumbendo magis in lateribus, quam in dorso convaluit.

CCCXII. Abortus metus.

JUvenculæ quarto mense gravidæ, quæ per scalas deciderat in cellam, & exinde insigniter terrefactæ, ita ut fere per dimidiam noctem non sentiret motum foetus alias alacris, præscripsi:

℞. ∇ lil. convall.

Ceras. nigr.

Epil. Lang. ana 3j.

Ebor. s. Δ 3℔.

‡ Epil. March. 3j.

Specif. Cephal. gr. xv.

Thuris.

Mastich. ana gr. v.

Syr. Corall. Quercet. 3℔. M.

De qua mistura, non ingrata, bene agitata capiebat subinde aliquot cochlearia: unde factum est, ut postmodum cessaret alteratio à pavore inducta, & foetus inde roboratus denuo se alacriter moveret; applicata simul externe crusta panis cum Vino Malvatico. Hæc mistura in quovis abortu, à gravioribus animi pathematibus metuendo usurpari potest.

CCCXIII. Febris Lactea.

MUlier juvenula secunda vice puellam enixa à partu optime se habebat, & cum prima vice infantem ipsa lactasset, jam laboris peritæsa nutrici negotium committe-

bat, sed die nono à partu media nocte intenso corripitur æstu, cum siti, cephalalgia, & anxietate, mammae antea lacte mediocriter repletæ in immensum tuebant, turgabant, dolebant & indurabantur; appetente aurora symptomata evanescent, superstitie saltem insigni virium prostratione, appetituque dejecto. Die altero vocatus præter externa mammis imponenda præscribo:

℞. C. C. s. Δ 3℔.

‡ absinth. 3℔.

Myrrh. el. gr. iij. M. Assumsit pro

2. Dosibus, sed symptomata redibant cum simili ferocia & ad mediam noctem perdurabant; Altero die melius habebat, mammae minus dolebant, lac per papillas effluebat; nox insequens quieta erat: sequenti die

℞. Lapid. ∞ præp. 3j.

‡ absinth. gr. xij. M. Hunc pulverem hora 1. capiebat, sed circa vesperam ex improvise gravi horrore per Horam integram durante corripiebatur, æstus gravis per aliquot horas superveniebat, mamma sinistra de novo intumescibat, indurabatur & insigniter dolebat; post mediam noctem symptomata febrilia cessabant; Hinc mane

℞. \sim Θ *c. Ψ 3℔.

Ess. Croci 3iij. M.


℞. Empl. de Galbano croc. Myns. q. s.

Malax. c. s. q. 80 \square fæt. Inducebatur super linteam, in medio perforatum. Spiritus tepidus spongiola illinebatur mammae, & applicabatur desuper Emplastrum. Hinc imponebantur sacculi oryza, avena, vel milio ad pollinis crassitiem referti, calidissime. Die altero cum symptomatibus febrilibus dextra mamma eadem patiebatur, & speciatim tumor durus magnitudine ovi gallinacei paulo profundius tactu percipiebatur. Applicatis dictis remediis convaluit.

FINIS

CASUUM ET OBSERVATIONUM.

MICHA.




MICHAELIS ET MULLERI
Philosophiæ & Medicinæ Doctoris, Professoris Publici
Lipsiensis, ac Facultatis Medicæ Adfessoris,
DISSERTATIONES ACADEMICÆ.

DISSERTATIO I.
THEORICO-ASTROLOGICA,
DE
CONJUNCTIONIBUS MAGNIS

à
M. MICHAELE ET MULLERO,
Publicæ Ventilationi subjecta,
die 24. Maji, Anno 1662.
RESPONDENTE
GEORGIO JENICHEN, Pirnensi,
Philosoph. Baccalaureo, & Alumno
Electoralis.

I. N. J.

Th. I.



Icet Primum Mobile motu suo communi ab ortu versus occasum omnia secunda mobilia singulis diebus naturalibus astronomicis circumrapiat, nihilominus tamen & ipsa hæc secunda mobilia motu quodam gaudent proprio, quo non tantum motui illi communi ab occasu versus ortum, alia quidem celerius, alia vero tardius progrediendo reluctantur, sed & inter se vario modo configurantur. Hæ ipsæ verò configurationes, aspectus vulgò dictæ, pro variis Astronomorum placitis variant, dum veterum quidam ut Pontanus, de rebus cœlestibus, Guido Bonatus de Forlivio, in *Tract. 1: Astron. lib. 2. cap. 13.* Zahel Ismaelita, in libro de Judiciorum principiis, Jacobus Faber, Stapulensis, in libro Theoric. corporum cœlest. & Comment. ejus Jodocus Chlichtoveus Stœflerus in Ephemeridibus, Joannes Baptista Carellus Placentinus, in Ephem. quatuor tantum, scil. Quadraturam, Trigonum, Sextilem, & Oppositionem numerant. Quidam vero ut

Ptolomæus, in Centiloquiis, & libro de Astrorum judiciis, & Commentator ejus Cardanus *lib. 1. Text. 45.* item Cyprianus Leovitius in *Ephemerid. cap. 12.* & Petrus Pitatus Seronensis, in Almanach novo, Origanus in introduct. Ephem. Casparus Schottus in Cursu Mathematico: *Lib. VII. Astr. part. 3. cap. 12.* quinque numerant, addunt enim Conjunctionem supra enumeratis, quamvis minus propriè, ut demonstrat Carellus. Recentiores verò, ut Cel. Kepplerus, in *lib. Harmon. Mundi*, Eustadius, in *Ephem.* Joannes Baptista Ricciolus, in *Almagesto novo l. 7. Sect. 5. cap. 7.* & novissimè Jacobus Bartschius octo supra dictis 5. annumerant, & ita numerum earum insigniter augment. Sed ad Conjunctionem quod attinet, definitur, quod sit affectio motus secundi, quo stellæ in uno cœli loco combinantur. Quod non ita accipiendum, ac si stellæ conjunctæ sphaeras relinquant, & ad se invicem accedant, sed dicitur ita respectu Zodiaci, qui mensura est motus secundi, ut Aequator motus primi, quod illæ conjunctæ dicantur, quæ unum locum in Zodiaco obtinent; Cœperunt verò Magnæ in-

primis

primis Conjunctiones esse celebres, de quibus cum jam agere sit animus, faxit Deus T. O. M. ut feliciter.

Th. 2. Ad Nominis igitur rationem quod attinet, dicuntur Magnæ tres inprimis ob causas: 1. Propter dignitatem subjectorum seu stellarum, quæ conjunguntur, quæ sunt ♄ & ♀, ad quos & ☿ nonnunquam accedit. Sunt enim Planetæ supremi, adeoque ponderosissimi & motu tardissimi, ita ut propter tarditatem motus longè diutius durent in conjunctione partili vel platicâ, quàm cæteri Planetæ, & ad multos annos talium conjunctionum effectus vel significationes extendantur; quod vult Messhala *Arabs*, dum in *Epist. de Conjunct. Mag.* dicit, Scito, quod res maximæ ac mirandæ accidant, ex Conjunctione planetarum superiorum, & hoc fit propter motus tarditatem. 2. Propter Gravitatem effectuum & eventuum, quos efficiunt & portendunt, qui omnium reliquarum conjunctionum, Eclipsium etiam effectus superant. Testatur hoc *Arabs Almanfor*, in Propositionibus ad Regem Saracenorum, p. 133. Ex ☿ ♄ & ♀ in signis mobilibus, cognoscetur commutatio status & mundi, & ex eorum conjunctionibus in signis fixis etiam. 3. Propter influxus efficaciam. Licet enim adhuc sub judice lis sit, cui inprimis Planetarum maxima influendi efficacia sit tribuenda, nihilominus tamen non est negandum, hos duos Planetas supremos conjunctos, omnes cæteros influxu suo antecedere, quod testatur effectuum varietas & apparebit in §. 9. Ex his jam manifestum est, quod Conjunctio Magna sit, quando ♀ & ♄, interdum & ☿, unum Zodiaci locum occupant. Consentit nobiscum *Hermes ille Trismegistus*, dum in Centiloquiorum suorum apli: 91. dicit: Tunc dicitur Conjunctio Magna, quando tres superiores Planetæ in uno è signis regis conjunguntur. Ex quibus vetustas hujus doctrinæ colligi potest, ita ut ab antiquissimis Astronomis Conjunctionum Magn. doctrina magni æstimata sit, dum *Ptolomæus* earum in Centiloquiis suis, verbo 64. mentionem facit, & commentator ejus *Arabs Haly* eas obscurè licet exponit: *Almanfor* quoque in Propositionibus suis de eis tractat.

Th. 3. Verum tres harum Conjunctionum ab Astronomis constituuntur species: Magna scilicet specialiter sic dicta, Major, & Maxima; In quarum specierum essentiâ magna admodum Autorum est discrepantia. Quorundam saltem apponamus sententiam. *Messhala Arabs*, Maximam vocat illam, cum ♄ ♀ ☿ conjunguntur, Majorem cum ♄ & ♀, Magnam cum ♀ & ☿; & inter has duas posteriores aliam interponit mediam

vel mediocrem appellatam, quæ fit, cum ♄ & ☿ coeunt. Alii ut *Albumasar*, & cum eo tota ferè Astronomorum & Astrologorum Schola, Maximam vocant, quando ♄ & ♀ conjunguntur in o. v, quod est principium triplicitatis igneæ, vel in transitu è triplicitate aqueâ in igneam. Eadem etiam mens est *Guidonis Bonati in tract. Astron. 4. c. 4.* Magnæ illis sunt, quæ fiunt post annos viginti, Majores, quæ post 200. annos. *Cardanus* verò vocat conjunctiones illas magnas, quas *Albumasar* maximas; quas verò hic magnas, eas ille minores appellat; quæ 200. annorum spatio redeunt, eas ille vocat medias. Quæ opiniones legi possunt apud *Ricciolum in Almag. Nov. l. 7. f. 5. c. 9.* Hic verò novam incipit ordinationem, easque in tres distribuit classes: quarum prima sit ♄ & ♀, & vocat eas Saturnijoviales; altera ☿ ♄, quæ Saturnimartiales dicuntur, tertia, ☿ ♀ ☿, quas nuncupat Martijoviales. Uniuscujusque postea classis, maximas constituit illas, quæ sunt conjunctiones periodicæ, evolutio scilicet Zodiaci ab uno puncto cardinali ad idem, Majores, quarum loca, ab uno puncto cardinali ad aliud immediate subsequens vel præcedens, vel saltem ad oppositum transitum faciunt, Minimæ, quæ proximè & immediate sibi succedunt. Sed quicquid sit de his sententiis, nobis inprimis *Albumasar* & Astrologorum arridet sententia, quare dicimus: Conjunctio magna est, quando duo supremi planetæ, ♄ & ♀ quibus & ☿ nonnunquam se associare solet, conjunguntur in signo, ejusdem triplicitatis cum signo, in quo præcedens conjunctio est facta: Major est, quando planetæ supremi conjunguntur, in signo diversæ quidem triplicitatis, à quo proximè præcedens facta est, non tamen igneæ: Maxima denique, si supremi planetæ antea in signis alterius triplicitatis juncti, primum in ignea copulantur triplicitate. Dicitur verò Maxima, non quod major sit aut tardior cæteris, sed quod eam propter singularem dignitatem, & efficaciam majoris æstiment, non sanè nullâ de causâ, aut futilibus conjecturis, ut criminantur securi & obliti numinis Epicurei. Nam ut rebus ferè in omnibus prima coitio est acerrima omnium, sic conjunctiones Magnæ priores, sine dubio fortius afficiunt, & urgent prioribus stimulis naturam Elementarem, unde majores turbæ succedunt, inquit *Lic. Philippus Müllerus B. M. in Orat. de Conj. Magn.*

Th. 4. Ut verò eò exactiùs Conjunctionum nostrarum doctrinam perspiciamus, causæ mutationis triplicitatum & intervalla earundem sunt explicanda. Si jam conjungantur ♄ & ♀ in o. v. ♀ verò utpotè celestior

rior $\text{H}\phi$, cursum suum Periodicum instituat, absolvet eundem 12. annorum spatio ferè, quo tempore H usque ad finem Ω erit progressus, ad quem dum properat Ψ , hic verò longius indies moveatur, fit, ut in Ψ demum secundum calculum convenient, post 20. annos ferè s. 19. an. 318. d. cuius spatii hæc est ratio, quia Ψ ab γ , in quo proximè præcedens conjunctio est facta, per duas tertias Zodiaci distat partes; has verò ut absolvat motu suo medio H 20. indiget annis, quoniam motus periodicus 30. est annorum, Ψ quoque, ut eas percurrat, 8. postulat annos, qui cum prioribus periodici cursus annis 12. conficiunt 20. ut ita spatium inter has duas conjunctiones medias sit 20. annorum. Fit autem hæc conjunctio in Ψ 2. & 3. non in principio signi, ut in præcedente conjunctione, propterea etiam loca harum conjunctionum non distant præcisè triente Circuli, sed tantum 117. in præcedentia signorum. Hic verò defectus cum non refarciatur in sequentibus, sed semper augeatur, dum locus posterioris conjunctionis superat priorem tribus gradibus, sequitur inde, quod 9. ϕ , quarum una quæque 20. ferè constat annis, totum absolvant signum, adeoque 10. completis ferè 200. annis, s. 198. an. 260. d. fiat in secunda triplicitate, usque dum elapsis 400. annis fiat in tertia triplicitate; & ita toto absoluto Zodiaco post annos 800. ferè, s. 794. d. 310. ad triplicitatem igneam redeat ordo, atque conjunctio fiat maxima. Ex quibus apparet: differentiam harum conjunctionum consistere in intervallo à se invicem, tum in diversitate loci in quo fiunt. Major enim in eo differt à magna, quod in hac tantummodò ex uno triplicitatis unius signo, in alterum ejusdem triplicitatis, in illa vero ex una triplicitate in aliam, ita tamen ut non sit ignea, alias fit maxima, fiat transitus. Superata autem numerus Magnarum decies numerum Majorum, & harum numerus quater Maximarum.

Th. 5. Cœterum ut doctrinæ nostræ clarior lux affulgeat, triplicitatum, quarum jam sæpè facta est mentio, natura explicanda venit, idque ex mente tum Astrologorum, qui hanc sententiam maximi faciunt, tum Arabum, utporè quibus cum tota doctrina Astrologica hæc signorum divisio originem debet. Distribuerunt scil. veteres Zodiaci signa in quatuor classes, triplicitates dictas, idque partim ideò, quia unaquæque classis tribus constat signis, partim, quia signa illa tria, si connectantur per rectas, efficiunt Δ circulo inscriptum. Prima classis dicitur ignea, quia constat signis igneis, h. e. calidis, masculinis & diurnis, nempe γ Ω Ψ , huic \odot & Ψ dominari dicuntur: Classis secunda dicitur, terrea, complectitur signa, sicca, fœmini-

Tom. II. Pars 2.

na, nocturna, ut ϕ η ζ . dominium hujus classis ϕ & ζ concessum est. Tertia vocatur aërea, continet signa humida, diurna & masculina, nempe Π \triangle \equiv ascripta hæc est H & ϕ imperio: Quarta denique aquea appellata, signis frigidis, fœmininis & nocturnis constat, ut M χ , imperant huic σ & ρ vel ζ , de quibus videatur Cardanus, in *Comment. ad Ptol.* Ponranus de rebus cœlest. Orig. in *Ephem.* Causæ, cur veteres has triplicitates ita denominarint, apud Astronomos nullæ planè inveniuntur. Ricciolus refert illam in conjunctiones magnas, cujus hæc sunt verba: *Cur autem easdem [triplicitates] appellarunt Δ la, & trigonos igneum, terreum, aqueum, aëreum, sic accipe: si H & Ψ congregiantur in principio γ s. triplicitatis igneæ, post annos 20. ferè fiet altera illarum conjunctio, & longè ab initio per antecedentia, s. retrò per trientem ferè circuli s. 120, atque adeò cadet in principium Ψ , quod est idem signum igneum, & tertia conjunctio post alios 20. annos ferè retrocedet, per alia signa quatuor, in principium Ω signum pariter igneum, itaque cum per trientem ferè circuli distent loca harum conjunctionum, inter se, fit ut annis 60. trium ϕ loca forment Δ ferè æquilaterum Zodiaco inscriptum, & respiciant sese aspectu quasi trino.* Sed Ricciolus mutat statum controversiæ, & dum debet declarare, ut ipse etiam proponebat, rationem appellationis, explicat quid sint triplicitates, quamvis & in hac explicatione minus congruè procedat. Ut enim taceam obscurum esse, utra doctrina, an triplicitatum, an vero Conjunctionum sit antiquior, in eo certè peccat, quod triplicitatum doctrinam ex conjunctionibus magnis haurire velit, cum hæc illarum præsupponant notitiam, ut eò melius Magnarum, Majorum & Maximarum innotescant differentiæ. Joannes verò Baptista Carellus, in *Ephemer.* Guido Bonatus de Forlivio, in *tract. 2. Astr. part. 3. c. 11.* causam denominationis quærunt in ipsis signorum qualitatibus, Bonati verba sunt: *Dixerunt Philosophi, Triplicitates sunt quatuor, & distinguuntur sic: omnia signa, quæ concordant in unâ naturâ, & complexionem, faciunt unam triplicitatem, Vigetur, Ω & Ψ faciunt unam triplicitatem; γ enim est signum igneum, calidum & siccum, Ω similiter est signum calidum & siccum, & sic sunt duo signa calida & sicca, Ψ est signum igneum, calidum & siccum, & sic sunt tria signa calida & sicca, convenientia in unâ complexionem.* Sed neque hic nodum solvit. Potest verò hæc sententia intelligi vel de signis octavi orbis vel noni, de utrisque quod ita dicantur vel formaliter vel virtualiter, de singulis breviter. 1. Non possunt

[Kkk]

possunt in hoc negotio intelligi signa octavi vel noni orbis, quod talia denominentur formaliter & subjective; essent enim sic stellæ & cælum elementaris naturæ, adeoque naturaliter corruptibiles: quod licet multi affirmant, nobis tamen nondum persuadere aut receptam jam sententiam argumentis suis labefactare potuerunt. 2. Nec possunt intelligi signa octavi orbis, quod sint talia virtualiter vel effectivè, quatenus vim obtinent influendi in hæc sublunaria, eaque variè immutandi. Nam ut ut placeat nobis sententia, quæ astris hoc sensu tribuit qualitates elementares, ita ut ☉ dicatur calidus, ☿ humida, &c. non tamen ratio ex eâ peti potest, cur signa in tales triplicitates divisa sint, cum contrarium experientia quodammodò clamare videatur: Scorpius enim est signum Martialis maximè naturæ, cum omnes ejus stellæ ☿tem influxu suo imitari, & illa primæ magnitudinis in pectore, *Antares* Arabicè dicta, Marti par censi soleat; ☿ ipse quoque domicilium suum in signo hoc habeat, triplicitati aqueæ, h. e. frigidæ & humidæ, accensetur, qui nihil tamen minus est, quàm frigidus & humidus. Quare Ricciolus inquit: *Sed cur non potius Aquarius aqueus, & Taurus vel Scorpius dicitur igneus, cum maxime in iis stellæ Antares & Palilicium rubore suo Martis ignes æmulentur.* Ob quam etiam causam non possunt intelligi signa octavi orbis, quatenus jam sedes mutarint, s. quatenus v. g. signum 6. octavi orbis respondet 7. in nono orbe. 3. Non possunt intelligi signa noni orbis, quod sint talia virtualiter. Licet enim concedamus, cælum non esse otiosum, sed influxu suo etiam mutare sublunaria; nemo tamen hætenus tam accuratè influxum signorum observare potuit, quin alius potius stellis semper ascribendus fuisset: quod si itaque influxus nondum planè est notus, neque etiam ab eo distributionis signorum ratio peti potest. Et licet quis cum Pontano dicere velit, quod fiat respectus ad influxum, quem habent signa, dum ☉ in iis versatur; nihil tamen proficiet, stellæ enim hic non respectivè in ordine ad ☉em, sed potius consideratæ in se & suâ naturâ accipiuntur. Adhæc ☿ anmeratur triplicitati frigidæ, qui tamen mense Junio, dum ☉ in eo ambulat, plus satis calidus & siccus est. Nos in re dubia & controversa quid dicamus, cum non habeamus, judicium sapientibus relinquimus, cum melius sit, nescire quædam æquo animo velle, quam absurda defendere. Ex his jam dictis haud erit difficile augurari, quid velint triplicitatum voces suprâ in explicatione conjunctionum adductæ.

Th. 6. Dispiciendum jam est, utrum

veræ an verò mediæ conjunctiones sint attendendæ? quod ut eo melius fiat, de motu medio & vero stellarum errantium sunt quædam differenda. Astronomi duplicem stellis attribuunt motum, unum medium, alterum verum: medius est arcus Zodiaci inter principium ♈ & lineam motus medii interceptus; Est autem linea motus medii recta, ex centro mundi per centrum Epicycli usque ad Zodiacum protracta; motus verus est arcus Zodiaci inter principium ♈ & lineam motus veri interceptus; est verò linea motus veri recta, ex centro terræ per centrum stellæ usque ad Zodiacum protracta. Ubi notandum, non esse confundendum motum Physicum cum motu Mathematico. Physicè unus tantum est motus, qui competit stellis, ab ortu versus occasum, & hic vocari potest aliquo modo motus medius Mathematicus, ut ita unus tantummodò sit motus, qui pro diversitate modi considerandi duplicatur. Mathematici verò duplicem assumunt motum, alter est absolutus, qui competit stellis prout in sphaera cœlesti moventur, & hic est medius; alter est respectivus, qui tribuitur stellis in ordine & respectu ad nos homines, qui eum ex superficie terræ aspiciunt, & est verus, qui ideò, quia nobis apparet, apparens dicitur: ille semper sibi est conformis, & propterea æqualis dicitur; hic verò difformis, cum planeta nonnunquam hoc motu directus, nonnunquam retrogradus, appareat, & ideò inæqualis dicitur. Assumserunt verò Astronomi præter motum verum etiam medium, propter calculum; cum enim viderent gravissimas calculi difficultates, si motum inæqualem adhiberent, ideò de æqualitate quadam motus cogitarunt: quare acceperunt motum stellæ periodicum verum, & per regulam proportionis collegerunt medium annuum, per hunc diurnum, & denique horarium: vid. Jacobus Faber *Stapulensis, in libris Theoric. & Comment. ejus* Jodocus Chlichtoveus, *lib. 1. cap. 6. p. 9.* Dn. Nott nagelius, *in Synops. Math. lib. 4. f. 2. p. 240.* & Dn. Weigelius *in Sphaera Euclid. lib. 1. f. 2. c. 2. d. 240.* Quod si stellæ conjungantur per motum medium, ita ut lineæ mediorum motuum earundem in eodem Zodiaci loco conveniant, est conjunctio media; si verò per motum verum conveniunt lineæ motus veri, est conjunctio vera. De his duabus conjunctionum speciebus quaeritur: quænam in magnis sit attendenda? Ubi tres proveniunt sententiæ; quidam concludunt pro conjunctione media; alii pro verâ, quarum sententiarum & autores & defensores vide apud sæpius laudatum Ricciolum, qui tertiam arripit sententiam, & vult, ut veræ imprimis attendantur conjunctiones, non secus ac veræ synodi in Luminarium Eclipsibus.

Existi-

Existimat tamen adhibendas quoque simul esse conjunctiones medias, non tantum ut faciliiori supputatione eminus verarum conjunctionum odoremur tempora, sed etiam, quia, si præcedunt veras, inchoant per quandam applicationem earum influxum, si verò succedunt veris, per defluxum quandam obtineant aliquid de impressione jam facta. Quam sententiam ut facillimam & tutissimam nos etiam amplectimur, imprimis cum, cognitis motibus & conjunctionibus mediis, motus & conjunctiones veræ per prostaphæreses faciliè inveniri queant.

Th. 7. Sed jam ad ipsum Conjunctionum numerum & tempus, quando factæ sunt, descendendum, simulque effectus earum considerandi, ut postea de influxu eò melius agere possimus. Sequamur verò Conjunctionum calculum & ordinem Riccioli; licet enim quis novum instituere & accuratorem ducere velit, vix tamen certi quid colligere poterit. Ut enim taceam, controversum adhuc esse, quonam anni tempore mundus sit conditus? ita, ut medium Planetarum motum per calculum retrò institutum ad tempus conditi mundi invenire non possit; in eo tamen certè hærebit, quonam anni menses vel dies conjunctioni huic mediæ annumerare debeat? sine his verò apodicticum calculum in posterioribus nunquam instituet. Sed removendus in primis est error Riccioli, quem fovit, dum nimium intervallum inter annos Christi & mundi posuit, nempe 3980. annorum, cum in rei veritate non plures sint quam 3949. secundum epocham vulgarem, quam Dionysius Exiguus, *Abbas Romanus* veteribus pro verâ obtrudit, secundum accuratam verò 3947. & ita Ricciolus mundum 31. annos vetuliorem faciat quam est. Vid. Dn. Calvisius in *Isagoge Chronol.* Dn. Ægidius Strauchius in *Brev. Chronol.* Sunt verò ab anno mundi usque ad nostra tempora factæ conjunctiones 282. in quibus 7. Conjunctiones Maximæ, non verò 8. ut statuit Ricciolus, deceptus falsâ suâ hypothese de anno mundi, 21. majores & 254. magnæ. Quas omnes melioris doctrinæ gratia in tres ordines distribuamus: primus continebit Conjunctiones ab ortu mundi ad diluvium; secundus à diluvio ad natum Christum; tertius à nato Christo ad nostra usque tempora. Hos ordines connectamus 1. cum Periodo Juliana, quæ est systema 7980. annorum; 2. cum Epochâ mundi conditi; 3. cum epochâ nativitatis Christi, præsupponentes eam factam anno mundi secundum epocham vulgarem 3949. Priorem ordinem quod attinet: inchoatur anno Per. Jul. 763. mundi 1. ante Christum 3949. desinit verò ann. Per. Jul. 2421. mundi 1658.

Tom. II. Pars 2.

ante Christum 2291. Complectitur hic ordo 84. Conjunctiones, 76. magnas, 6. majores, 2. maximas. Prima omnium conjunctionum fuit magna, facta anno 9. post initium mundi, maxima verò illa, quæ 99. annos diluvium antecessit, dubio procul iræ divinæ fuit annunciatrix, ita ut confirmasse illius decretum videatur; Magna in serie ultima, quæ in ipso diluvio facta est. In secundo ordine, qui incipit in anno Per. Jul. 2421. mundi 1658. ante Christum 2291. desinit vero anno Per. Jul. 4713. mundi 3950. Christi vero v. i. 115. Conjunctiones sunt contentæ, quarum 103. sunt magnæ, 9. majores, & 3. maximæ. Quarundam insigniores effectus ex Calvisio adducamus. Sub 3. in hoc ordine Regni Babylonici fuit initium. Sub 5. quæ fuit major prima mutatio Reipubl. est facta, dum gentes in omnes terras ob confusionem linguarum dissipatæ sunt. Sub 15. Regnum Babylonicum à Nino in Semiramidem translatum est. Sub Conjunctione 35. edictum Pharaonis de necandis liberis in vulgus editum est, *Mose* & *Aaron* nati sunt. Sub conjunctione 39. ingens admodum *diluvium Deucalionis* dictum terram circa Parnassum montem inundavit. Conjunctionem 40.eductio Israëlitarum ex Ægypto secuta est. Sub Conjunctione 46. Rex Dardanorum tertius Tros Urbem Trojam ædificavit; unde initium Regni Trojani, quod sub conjunctione 55. majore ob raptum Helenæ eversum est. Post Conjunctionem 78. Romulus & Remus urbem Romam condiderunt, & ille ob raptas vigines primum bellum gessit. Sub Conjunctione 85. majore, Nebucadnezar regnum Babylonicum arripuit, & brevi post Jojakimum cum populo Israëlítico captum abduxit. Sub conjunctione 98. Alexander bello Darium aggreditur, & Monarchiam Græcorum inchoat. Post Conjunctionem 104. Bellum secundum Punicum Romani inceperunt. Sub conjunctione 150. Bellum Romani cum Philippo gesserunt, sub eadem etiam vehemens admodum pestilentia Romam vastavit. Sub Conjunctione 113. Cæsar perpetuus Dictator creatur, annum fastosque corrigit. Ultima denique in hoc ordine Conjunctio est maxima, quæ annos 6. Nativitatem Salvatoris antecessit, quo tempore ad summum fastigium Romanum Imperium elatum erat. In tertio denique conjunctionum ordine, qui à nativitate Salvatoris ad tempora usque protrahitur, 83. Conjunctiones continentur, 2. maximæ, 6. majores, & 75. magnæ, qui ordo inchoatur anno Per. Jul. 4713. mundi 3950. CHRISTI, 1. Exempla quadam effectuum sunt subjungenda: Conjunctionem primam subsecutus est ingens motus terræ,

[Kkk 2]

terræ,

terræ, cujus vi pars muri urbis Romæ everſa eſt; idemque factum in Aſia; hoc etiam tempore Germani cum Romanis de libertate dimicarunt: Sub 3. Nero ſæviit, urbsque Hieroſolyma everſa eſt: Sub 6. horribilis terræ motus eſt factus Antiochiæ, quem longè ventitoniaque antecceſſerant: In 13. peſtilentia & varia morborum genera ubique graſſata ſunt: Sub 20. Majore bellum crudele inter Theodoſium & Eugenium ortum eſt: Sub maxima 40. Carolus Magnus floruit: Conjunctio 80. eſt maxima, quæ anno ſuperioris ſæculi 1583. accidit, quam res variæ ubique conſecutæ ſunt, ita ut de anno 5to poſt eam hi vulgò proferantur verſiculi, quos habet Leovirius: *

Wenn man zehlt 1580. acht/
Das iſt das Jahr das ich betracht/
Gehet in dem die Welt nicht unter/
So geſchehen doch ſonſt mercklich Wunder.

Rationem verſiculorum vide apud Georgium Urſinum, in *tractatu Beſchreibung aller Finſterniſſen/ auch Conjunctionum und Oppoſitionum der obern Planeten*. Ex quibus apparet: Conjunctionem, quæ proximo fiet Anno 1663. haud vulgares quoque rerum mutationes allaturam. Licet enim ipſa H & J conjunctio partilis, quæ fiet 12. 22. Octobris, 14. J felix ſatis fauſtaque, astrologico more conſiderata, appareat, dum J & Δ eos conjunctos ſalutet, & J quoque ad eos accedat, (quæ tamen, quaſi male credat H o, retrocedit) ut nihil fermè mali metuendum ſit; hiſtoriæ tamen contrarium alta exclamant voce. Apparebunt verò J & platica per totum fermè annum, à menſe Januario ad uſque Novembrem, quo tempore ſub radiis ſolaribus occultantur. Die 12. Febr. Eclipſin Lunarem inſeſto \square aſpiciunt, ita, ut mutationes regnorum ob mortem Magnatum, quem ſignificare videtur Eclipſis, moliri velint. Haud vulgarem quoque mutationem minatur \square & J , quo conjunctionem hanc menſe Martio interturbat. Humaniorẽ interim induit faciem, dum menſe Aprili conjunctionem Δ amice aſpiciat. Mutabilis tamen eſt, & menſe Julio armatus Palilicio J primò J poſt H ferit, hanc interim deponit inimicitiam, dum ſub J & partili Δ radio omnia mala componere videatur. Notatu verò dignum eſt in hac noſtra conjunctione, quod 1. & media & vera in uno proveniant ſigno, quodque 2. ſine combuſtione directo curſu ad ſe invicem accedant, & 3. quod aquila, cujus caput anno ſuperiori 1661. cometa illuſtrarat, una cum his conjunctis in Germaniâ oriatur, & 4. J ex eo ſigno eos irradiet Δ in quo anno 1623. conjuncti fuerant. Cæterum cum radiosum fuiſſet, omnium Conjunctionum apponere

effectus, ſufficiat, potiores ſaltem adduxiſſe, ex Hiſtoricis cæteri & Chronologis repeti poſſunt. Hoc certum eſt, Conjunctiones has ſemper novi quid inſecutum eſſe, quod aſſeruat etiam Almanſor in *Centiloq.* pp. 127.

Th. 8. Cæterum cum tanta effectuum ſit varietas, diſpiciendum, an à Conjunctionibus dependeat? Ubi duæ ſunt ſententiæ: una attribuit vim illam efficiendi Conjunctionibus, quæ communiter eſt Arabum & Astrologorum; altera omnem Conjunctionibus denegat vim & influendi & ſignificandi. Nos medium tenebimus, nec omnia nec nulla tribuentes conjunctionibus. Quare ut eò melius procedamus, prius quædam præſupponamus, poſt aliquot Concluſionibus mentem noſtram manifeſtemus. Not. 1. ſtellas pro varietate circumſtantiarum, imprimis pro ratione aſpectuum cum aliis ſtellis, novas ſubindè vires ſuſcipere, eiſque nunc augeri nunc minui: Hinc Philippus Mullerus b. m. *Si adea, quæ in terrâ efficiuntur à ſtellis, aſpectus aut conſfigurationes nihil pertinent vel efficiunt, quiſit? quod v. g. J & J aut corporibus ipſis hærentes, aut \square o, J i, aliove radio conſigurati, conturbant æris ſtatum ventis, imbris, tonitruis, aut alio modo, non aſpicientes non conturbant? quiſit quod in iis ad quæ adhibentur, excellent, qui ſub validis, aut multis aut diuturnis aſpectibus concepti ſunt, eaque, ad quæ apti nati J exercitati ſunt, alacrius perſciant, & quaſi ſeipſos ſuperent, incidente aſpectu ſimili, vel Planetâ tranſeunte per thematis natalitii aliquem locum præcipuum?* Not. 2. Cùm aſtra non ſint otioſa, ſed influant in ſublunaria, iuſſus illius modum eſſe duplicem, directum & indirectum: ille eſt, quo influunt immediatè, nulla alia intercedente cauſa: hic, quo mediatè aliis intervenientibus cauſis; in illo ſidera ſunt cauſæ proximæ, in hoc remotæ: in illo cauſæ per ſe, in hoc per accidens: ibi cauſæ Phyſicæ, hic morales: per illum agunt ita, ut neceſſitent, h. e. ut poſitis omnibus agendi requiſitis tam ex parte ſiderum, quæ influunt, quam corporum, in quæ influunt, non poſſit non ſequi effectus, per hunc verò tantum inclinent, h. e. ut poſitis omnibus agendi requiſitis effectus à cauſa proxima tolli poſſit. In his omnibus cauſam ſupremam non excludimus, ſed præſupponimus. Not. 3. Res in quas influunt aſtra, eſſe vel naturales vel liberas; in illas ita influunt aſtra, ut neceſſario ſequatur effectus, in has ita, ut ſequatur ſaltem contingenter, quia actio adhuc tolli poſeſt à libertate cauſæ ſecundæ; de quibus vid. *Phyſ. & Metaph.* Ex his jam facile quis reſpondere poſeſt ad ea, quæ in contrarium diſſerit Joannes Baptiſta von

vonHelmont, *in Principiis Phys. inauditis*. Adducere ea angustia vetant pagina.

Th. 9. Hisce præsuppositis sit Conclus.

1. Superiores Planetæ, ♃ & ♄, efficacissimè influunt. Proprium stellarum munus est influere; quò magis itaque quædam influit, eo magis officio fungitur; si vero alius planeta efficaciter influit, is est certe ♄ vel ♃. Testatur hoc, ut cætera taceam, tempestatum varietas, quæ maxima ex parte ab his Planetis, prout alio atque alio cum Luna configurantur aspectu, dependet; ob tardum enim motum diutius in uno persistunt loco, & ita fortius movent naturam sublunarem, quam veloces Planetæ. Hæc verò efficacia augetur, si conjungantur, vis omnis enim unita fortior, & conjunctæ vires magis penetrant quàm dispersæ. Patet hoc in luminarium conjunctionibus, quorum ☿ num influentia omnibus nota. Idem quin eveniat in Planetis superioribus, nullum est dubium.

Concl. 2. Effectus in rebus naturalibus, qui sequuntur conjunctiones Magnas, oriuntur à planetis conjunctis per influxum directum. Per effectus in rebus naturalibus intelliguntur terræ motus ingentes, tempestates, tonitrua inusitata, incendia montium, pestilentia, & morbi varii, fames, inundationes regionum, & similes. Quod verò rerum harum sint causæ, id patet ex doctrina meteororum; multa enim ab astris effluviis exsuscitantur genera, quæ si sint terræ inclusa, & foras exire nitantur, fit concussio illa terræ horribilis. Si attolluntur in aërem, & vario modo inter se pugnant, fiunt tempestates, tonitrua, fulmina. Quod si calida & sicca in terra exsuscitentur effluvia, eo loco quo sulphuris haud parva latet copia, fiunt incendia illa Heclæ, Vesuvii & Aetnæ. Tunc vero imprimis, si ☿ vel conjungatur, vel conjunctos illos ☿ aut ☿ radio aspiciat; ☿ enim est igneæ naturæ, & pro diverso posito non parum facessit negotii. His ipsis effluviis corrumpitur nonnunquam aër, quem inspiramus & expiramus, hinc pestilentia, morbi que varii. Planetæ illi conjuncti exurunt nonnunquam terram, vel exiccant nimis, aut humectant, hinc extincto calido innato mors herbarum, quàm sequitur fames. Quod si eveniat ut conjunctis hisce associet sese ☿a, humorum domina, vel opponat, ingentes nimbi augent flumina, quæ operiunt terras, hinc diluvia.

Concl. 3. Effectus in rebus liberis, qui consequuntur conjunctiones magnas, nullo modo ab astris dependent, nisi interdum valde indirectè. Homo est liber ita, ut si libertate sua velit uti, nihil valeant astra in eum, qua homo est, licet non nihil agant in corpus, illius temperamentum vario modo im-

mutando, quod quia habitaculum est animæ, incitare, inclinare, infligare animam solet; quæ tamen utitur libertate suâ, ita, ut si non placeant ipsi decreta, ad quæ inclinant astra per temperamentum, opponere sese iisdem, & ea repellere possit. Quod si verò eveniat, ut homo inclinationibus illis astrorum obediat, iisque dominium suarum actionum committat, ita ut astra regant hominem, fit illud saltem indirectè per temperamentum. Ex quibus apparet; Astrologorum prædictiones minimè esse contemnendas, nisi justos exeant limites; de temperamento enim corporis & consequentibus illud, firmiter illi aliquid concludere possunt. Quoniam itaque mutationes Rerum publicarum, bella, & dissidia à solis causis liberis dependent, nihil valent astra in iis directè, neque etiam Conjunctiones, sive Magnæ sive Maximæ: vid. Bodinus *in Lib. de Republ. lib. 4. c. 2. p. 617*. Non negamus interim, quin possint interdum homines incitare, præsertim qui sunt Temperamenti cholericæ aut sanguinei, ut novent res, & creent bella, quod haud parum quoque aliarum stellarum configuratio & regionum diversitas aliæque circumstantiæ adjuvare solent.

Concl. 4. Conjunctiones Magnæ, mutationum Rerum publicarum, bellorum & aliorum eventuum signa esse solent. Duobus modis profunt astra, afficiendo & significando. Non propter solum influxum data sunt sidera, præmonent scæpe mortales de rebus instantibus, ut eos è somno socordiae excitent. Non solum cometarum aut novarum stellarum munus est significare, ordinaria etiam, & quæ justas habent causas, significant, & annunciant futura. Pulcherrimè differit hæc de re B. M. Müllerus, *in Orat. de Conj. Magn. De imperiorum orbis terrarum motibus, & id genus rebus magnis, timidius profero sententiam, ne ad siderum necessitatem illas referre, & mentes à DEo, cujus est dare & transferre imperia, ad creaturas & causas secundas parum providus abducere videar, cum potius adducenda fuissent. Et dicendum est tamen, quod rationi consentaneum & experientia comperitum fuit, nimirum, ingruentibus mutationibus rerum humanarum, & imperiis ad insignem motum & conversionem spectantibus, nequaquam, certè non semper, tacere cæleste automaton, sed veluti de excelsa specula pulsus dare, h. e. monstrare nobis & subicere talia, quorum arcana signa & occultas notas optimi creatoris beneplacito & nutu liberrimo, vel ab initio susceptas, vel sequentibus temporibus adjunctas habet. Fateor, DEI Consilia voluntatemque in verbo revelato primò,*
[Kkk 3] præci-

precipue, & ante omnia scrutandum esse. Nectamen apud me causa est, cur non interdum etiam in natura quæram illam, in natura præsertim & rebus uaturalibus, & ad hujus vitæ sustentationem pertinentibus. Hæc ille: Vid. etiam M. Stephanum Fuhrmannum in Epist. ad Andream Concium de influxu siderum.

Cæterum, quæ contra Conclusiones objici possunt, videantur apud Ricciolum, quæ facili tamen negotio solvi possunt. Nos hic subsistimus.

COROLARIA.

Log. *Non est terminus intermedius inter æquivocum & univocum, qui vocatur analogus.*

Phys. *Zoophyta non sunt animalia, neque perfecta neque imperfecta.*

Metaph. *Ens in potentia non est ens reale.*

Geom. *Corpora Geometrica sunt accidentia.*

Astrom. *☉ nunquam oritur, aut occidit.*

Geogr. *Si terra Polaris esset habitabilis, incolæ vix viverent ultra centum dies.*

Ethic. *Subiectum virtutum moralium est & appetitus & voluntas.*

Polit. *Non differunt vir bonus & civis bonus.*

SOLI DEO GLORIA.

DISPUTATIO II.

EXAMEN

CORALIORUM TINCTURÆ,

ventilatum

SUB PRÆSIDIO

Viri Nobilissimi & Experientissimi,

DN. MARTINI FRIDERICI Sriesii

Philosoph. & Med. Doct. Facult. Med. Assess.
& Prof. Public.

M. MICHAELE ETTMULLERO,

Lipsiensi, Med. Baccalaureo, Autore &
Respondente,

die 15. Septembris 1665.

I. N. 7.



Non Thales solum Milesius, σοφῶν ἰστέ σοφιστῶν, firmiter sibi persuasit, ex aqua omnia primam sumsisse originem; sed modernorum quoque quamplurimi, experientia adjunctis rationum subtilitates, idem adstruunt; quibus ingens rerum varietas, qua aquæ Oceani præprimis se jactitant, non leviter patrocinatur: quæ ipsa fertilitas palmam terræ, ingenti rerum multitudine, quas tanquam alma parens sinu suo quotidie excludit, fovetque, superbienti ambiguum omnino reddit. Commoti exinde antiqui gentiles, Mari quoque Deum suum Neptunum tribuerunt,

regiō Tridentis insigni cum instructes; in-nuentes hoc ipso, latè ejusdem per omnia tria regna, minerale, vegetabile & animale, diffusam potentiam. Ad hæc spuma Maris est ista materia, ex qua amica Venus, omni-genæ fertilitatis parens, enata fingitur. *Nihil enim aqua potentius*, inquit Faber *Pan-chym. l. 4. cap. 9. in rerum natura reperire potest, vita & mors ab ipsa dependent, infinitaque secreta & arcana sunt in inti-mis aquæ, quæ regna omnia pretio su-perant & antecellunt.* Nos impræsentia-rum, sepositis cæteris ramum coraliorum rubrorum è maris fundo decerpamus, cum-que, ut chymicorum hætenus in exuenda
cuius-

eiusdem purpura industriam fatigavit, paulò exactius, assistente Divini Numinis gratia, consideremus. Necessè est autem, ut primò

Statum Controversiæ

legitimum formemus, considerando non tantum, quid Tincturæ nomine in specie intelligendum veniat? sed vel maximè ipsam coraliorum essentiam exactius pensitando, quæ cognita fili Ariadnes loco ad superandum præsentis controversiæ Labyrinthum nobis inserviet.

Gansius hist. Coralior. c. 2. p. 23. Ovidius l. 4. Metam. Item l. 4. de Pon. Synonyma v. ap. Gansium c. 2. p. 24. J. Nard. noct. genial. p. 564. Bauh. Tom. 3. hist. plantar. l. 39. p. 793. 798. sic Paracels. Metacuriosum Nitrofixatus dicitur arcan. corallinum, muscus quidam Marius ob similitudinem corallina appell. De hac controvers. v. Plinium l. 23. Hist. natural. c. 2. Matthiol. in Dioscor. l. 4. cap. 97. Boet. l. 2. de gemm. cap. 33. A. Bacc. l. de gemm. c. 73. Bauhin. Tom. 1. c. 33. l. 39. Hofman. de med. officinal. qui ad muscum refert. Eichst. de conser. alk. c. 17. Cal-

§. 1. Ipsum ergò quod attinet nomen: ex Græcia natales ducit vox Corallii, apud Latinos equidem usù recepta, utut Etymi ratio vera adhuc dum lateat. Quibusdam enim à Græco κόρη, quod puellam significat, nomen accepisse placet ob Poëtarum fabulas, qui Corallium è virgis, cruore Gorgonis Medusæ perfusis (unde & Gorgonia dicitur) & in lapideam duritiem concretis, enatum narrant: Alii à Corallis, Ponti accolis, nomen inditum putant; de quibus Ovidius:

Hic mea cui recitem, nisi flavis scripta Corallis.

Alii dictum existimant Corallium, quasi *coralens*, non enim postremum est remediorum cordi robur addentium, de quo postea: vocatur quibusdam *Λιθόδενδρον*, Latinis frutex marinus saxeus, (Plinio *Dendritis*, alia enim synonyma brevitati operam daturi consultò omittimus) quasi saxeam vel lapideam arborem dicere velint, innuentes hoc ipso, ambiguum ejus naturam, quam inter vegetabilia, mineraliaque obtinere videtur.

§. 2. Nondum enim inter Eruditos ista decisa, cui regno, minerali an vegetabili, inferenda sint Corallia? & si vegetabili, an plantam sui generis viridem invadendo succus lapidescens in duritiem istam coagulet? an verò jam emortuum lignum in lapidem transformet? Quod prius attinet membrum: (hoc enim deciso posterius per se patebit) ex utraque parte non contemnenda se sistunt argumenta. Esse enim vegetabile persuadere videtur 1. arbusculæ elegantissima forma, quam sese surrigendo exactissimè repræsentat, hoc uno excepto, quod foliorum ornatu destituta sit; qualem figuram nulum aliud minerale obtinet, sed plantarum generi, tanquam naturalis quædam dos, propria videtur: sic re-

fert Matthiolus in Dioscorid. se habere ejusmodi corallinam plantam, quæ prope radices brachii ferè habeat crassitiem, & è medio trunco in ramos elegantes se diffundat. 2. Quod baccas ferat similes cornis, & specie & magnitudine. 3. Ad hæc reperitur circuli lignosi, qui ex parte tantum Coraliorum induerunt faciem; ex parte verò ligneam vegetabilem ostendunt formam, sicque ex ligno & lapide compositi & quasi conglutinati videntur. 4. Notum quoque est sagacioribus naturæ scrutatoribus sæpius in fontibus quibusdam, aliisque aquis, ligna à spiritu lapidifico, quo aquæ istæ egregiè imprægnatæ sunt, in lapidem converti: quidni idem fiat in mari, tanta salis copia referto, cum spiritus lapidificus salinæ esse profapiæ statuatur? sic in vicino Jenensis civitatis territorio ejusmodi reperitur fons intrusum lignum in lapidem convertens; sic in Hibernia supra Armacanum urbem in stagno haud amplo hasta lignea defixa, pars, quæ aquis tegitur, vertitur in cotem: (utut hoc quidam in dubium vocare audent.) In Boreali Ultoniæ provinciæ parte fons est, qui ligna per septennium immersa indurat in lapidem: In Bohemiâ quoque prope Thermas Carolinas fons est, in quo lignum diu durans in lapidem convertitur.

§. 3. Esse verò Minerale Corallium, ipsa natura ejusque essentia vel lippientibus monstrat, cum consistentia lapidea ejusque solida durities firmiter hoc ipsum persuadeat, qualem à succo lapidescente, lignum vel plantam imprægnante, frustrà expectas. Ligna enim concreta in lapidem, in certis aquis à succo lapidescente, diversam planè repræsentant formam à Coralliis; sunt enim plerumque instar cotis, vel lapidis alterius ex granulis multis compactim concreti, & ex arenulis quasi concatenatim conflati; cum econtrà Corallia continuum planè ostendant nexum, sine vestigio concretionis ejusmodi l. granulatæ compactionis, sed quasi cera Hispanica, in varias figuras per liquefactionem extensa, appareant, & non nisi vehementiori tritura in pulverem vel arenulas redigantur. 2. Minus rectè accenseri vegetabilibus, sed mineralibus accensendum esse, ex eo confirmatur, quod careat omninò radicibus, sicque non

ceolar. in Mus. f. 4. Encel. de re metall. l. 3. c. 3. Tenzel. exeg. Chym. Kircherus Mund. subterr. l. 9. f. 3. c. 6. Gans de Coral. c. 2. Februre Traicté de la Chym. p. 686.

Mund.
subterr.
l. 9. c. 3.
t. 6.

non per alimenti veram intro susceptionem & digestionem, vegetationi plantarum necessariam, sed saltim partium superadditionem crescat. Patet hoc ipsum ex experientia sagacissimi Naturæ Scrutatoris Kircheri, qui rupis integram partem ex profundo maris extractam, totam Coralliis obsitam, inter rariora Musæi sui asseruat, cui varia conchyliorum genera annata sunt; in hac rupe, partim ex concavâ conchyliorum parte, & aliorum convexâ, partim vero ex ipsâ soliditate saxea erumpunt Coralia, nullis planè suffulta radicibus, utut diligentissimè circa eorum inventionem laudatus autor laboraverit, sed ipsi trunco velut agglutinata sine ullo perforationis vestigio spectata sunt. Posito ergò indurari per lapidescentem succum plantam, saltim quoque vestigia radicum relinquerentur, sicut truncus illibatus persistit; ut taceamus, nullum quoque vel fructuum vel foliorum in iis reperiri signum. 3. Adhæc non determinatè rupes in maris fundò protuberantes incolit, sicut plantæ in Terra saltim crescunt & adolescunt, in eaque radicum agunt fundamenta: sed, ut dictum, non petris tantum & saxis nudè adhærescit, conchyliisque adnascitur, sed, ut citatus autor refert, à Piscatoribus unâ cum stripibus extracta fuerunt ossa, lateres, saxa, tabulæ ligneæ, feramenta, omnia Coralliis, quæ in eis excreverant, conferta, quin è duro delphini corio Coralia propullularunt: sic Magns Dux Hetruriæ, Pisis in suo gazophylacio, habet cranium Humanum, ex quo Corallina planta excrevisse spectatur: sic ex lapide coctili aliquando nascuntur; ob solidam vero firmamque ejus coalescentiam nulla ex eo nasci planta potest. 4. Præterea consimiles saxæ concrectiones in fundo maris reperiuntur, quas vegetabilium tractabili genti inferere saxea earum barbaries renuit: Cujusmodi sunt Pori, tam magnus, quàm ramosus, item Madreporæ variæ species, planta saxea, Abrotonoides, tubuli marini, aliaque corpora saxea, ut Coralliis affinitate juncta, sic plantarum formam referentia, cum tamen saxeis petrosisque planè assimilentur substantiis. Asserere quidem quispiam possit, esse easdem similiter plantas à lapidifico spiritu coagulatas, non se-

Bauhin.
in hist.
Plant. T.
3. l. 39.
c. 34. 35.
36.

cus ac Corallium: verum cur quæso hic succus determinatas adeò invadit plantas, & quare non alias, quibus maris fundus abundantissimè confitus est, similiter vegetabilium species saxæ istâ duritie indurat? Fortè cum Boëtio hoc propter singularem harum dispositionem contingere ais, vel quod succus lapidescens natura ipsorum substantiæ insit? sed quoad prius: explicanda venit peculiaris ista dispositio, è progenie occultarum qualitarum dubio procul oriunda; quoad posterius, hoc ipso vegetabilium adscribuntur ordini, quo succum Lapidescentem ipsis connatum tribuis, h. e. ex eo oriari asseris. 5. Firmiter admodum astruit naturam mineralem generatio Coralliorum; inest enim Corallinis stirpibus liquor quidam spermaticus, quem per canaliculos, quibus insigniores præsertim ramuli instructi sunt, de se emittunt, qui in quamcunque rem deciderit, ibi statim densatus, novam fundit Coralli propaginem: Hinc, ut suprâ relatum, in conchyliis, delphino, &c. Coralli furculus enatus fuit: hinc integræ planè in maris rubri fundo Coralliorum Sylvæ reperiuntur, tantâ earum copiâ condensatæ, ut ne piscibus quidem aditum concedant: sed hæc non conveniunt in plantas, quæ vel per furculos, vel semina, vel radices, easque tam fibrosas, quàm bulbosas aut tuberosas, sese multiplicant: ut taceamus, aliena hæc planè esse à plantâ emortua. Qua enim ratione planta in lapidem concreta generabit succum prolificum & sperma, quod similem plantam producat?

Kircher.
c. l. Agri-
cola in
Pop. p.
850.

§. 4. Hæc sunt, quæ ex utraque parte prostant argumenta: ex quibus non immeritò cum Eruditiss. Kirchero dicere quispiam possit: *Corallium quo nomine appellem vix dispicio, nec enim plantis vegetabilibus nec lapideis excrecentiis id rectè annumerari potest, satius itaque ὁβόφυτον, h. e. planto-lapidem appellandam censemus, dico medium quid inter lapidem & plantam.* Sed cum rerum in Classes distributio non ab accidentali forma, externaque earum configuratione, sed speciali potius essentia, desumenda sit, Corallium ad mineralium, & in specie saxearum, propaginum seriem relegamus, utut quoad externam faciem arbusculæ speciem repræsentet, dicimusque

que Corallium esse lapideam in fruticis speciem concretionem.

§. 5. Necesse est jam est, ut oppositæ partis argumenta diluamus. Quod itaque externam fruticis configurationem attinet: non sufficit eadem, ut vegetabilibus annumeretur Corallium; ab externa enim formationis similitudine ad ipsius essentia identitatem non valet consequentia; non enim statim Frutex est, quod fruticis gerit speciem. Non secus atque *Fungus Medicæ* scutellatæ, orbiculatæ, vel turbinatæ, cochlearum minorum referunt testas exactissimè, non tamen pro cochlearum habentur domiciliis, & *scorpioidis Fructus* (non tantum qui spinis horret, sed præprimis, qui crassior est, colore viridi & sine spinis, longè exactius priori crucem referens) adeò crucis formam, ejusque in se convolutæ spiras repræsentat, ut ob id Germanis *Raupen-Kraut* vocitetur, non tamen pro veris habetur crucis: sic *fungus phalloides*, utut pudendis humanis utriusque sexus simillimus, & *boletus Cervinus*, licet Cervi genitale sæpius exactissimè referat, propterea tamen animalium non annumerantur partibus, cum tamen eadem horum sit proportio ad res repræsentatas, quæ Corallii ad Fruticem quandam vegetabilem. Ut taceamus Coraliorum Fruticem ramorum saltim divaricatione, sine vel foliorum vel florum ornatu atque radice fundamento, plantæ referre imaginem: imò ipsa eorum in ramulos expansio non adeò ordinata & artificiosa est, qualem in vegetabilium conspiciamus gente, sed inordinatæ planè & quasi fortitæ sunt totum excresecitiæ, protuberantiis verrucosis quandoque similes, quos hinc inde absque consilio rationeque jactant & exporrigunt, ut non tantum ad vivum depictæ eorum ostendunt imagines, sed vel maximè vera exemplaria ex maritimis alportata locis hoc ipsum confirmant. Cum interim notissimum sit, quam varias for-

piscium ac diversas picturas, integra hominum aliorumque corporum simulacra lapidibus imprimi, hasque in tales statuas elaborari, Naturæ Curiosorum testantur monumenta: quidni idem Coralliis contingat? cum in illis saltim per accidens, & joco quasi naturæ, tam elegantes exprimantur formæ; in his vero ex primaria sua intentione & data opera, ob certam materiæ dispositionem, aliasque concurrentes circumstantias, in arboris speciem contingat elaboratio. Quod baccas attinet: sunt ex liquor Coraliorum spermaticus, post extractionem sub forma coriandri aut baccæ corni crassæ instar pinguedinis residens; quæ vero in Coraliorum monilibus, cornis & cerasis similes visuntur, ex ipsorum truncis tornò & lima prius parantur, mox snyderidis lapidis pulvere, & terra quadam Tripolitana expoliuntur, & lucidum quendam levorem contrahunt, cum iis diutius fricantur: quod verò 3. reperiantur ligna, quæ ex parte suam obtineant naturam, ex parte sint Coralia, hoc ipsum ostendit, si cum spermaticum per Coraliorum canaliculos extrusum, si quando inci dat in plantulam veram lignosam, investire ejus corticem, & extraneo quasi amictu induere, sicut sæpius à piscatoribus ramosa herba unà cum Coralliis extracta fuit, quam plerique myricam aut algam, è maris fundo extractam, dicunt: dum corpora nitro-sulphurea, mira quadam amicitia lege, hanc plantam appetentes, eam lapideâ istâ lorica obducunt, sicut in Gazophylacio *Cardinal*. Barbarini simile Corallium, tandem in myricæ affinem plantam desinens, invenitur: ubi v. hujusmodi algæ aut myricæ defunt, ibi nihilominus in ramos extenditur eo modo, quo efflorescentiæ minerales in varios ramusculos, continuata partium superadditione, panduntur. 4to jam supra satisfactum.

§. 6. Vindicata hæcenus Natura minerali Coraliorum necesse est, ut genesis ejus, quantum fieri potest, explicemus. Generari ergò dicimus Coralia ex succo quodam minerali salino nitroso, pinguedine & viscositate quadam sulph. imprægnato, qui per subterraneum ignem per poros fundi maris erumpit, sed ubi attigerit marinas aquas, protinus tum frigore, tum congelante earum salsedine, subsidet, primaque fundamenta agit futura

con.

Gansius
c. 2. p. 25.
Bauh.
Tom. 2.
l. 17. c. 64.
Bauh.
Tom. 2.
l. 21. c. 23.
Tabern.
næm. p. 2.
l. 8. c. 153.

Kircherus
Mund. sub-
terr. Tom.
2. l. 8. c. 1.
c. 8. Boot.
l. 2. c. 72.
Agricol.
denat. fol.
c. 14. 15.
Eacel. de
lap. &
gem. l. 3.
c. 77. va-

riæ salium
formæ l. 3.
c. 30. va-
ria achatis
schema-
ta, &c.
Marth. in
Diosc. l. 5.
c. 7. cum
quo Lam.
& Corna-
rius mi-
rantur
Plin. talia
proferen-
tem. Mac-
thiel. c. 1.
Wormius
in Mus. c.
35. p. 231.
Kircher.
cap. supra
p. 160.

Kircherus
Mund.
subterr.
l. 3. tom. 2.
c. 6. Para-
cellus de
glutin.
Aque.
Gansius
c. 2. Pla-
tearius
apud
eund.
Tenzelius
exegesi.
pag. 693.

Tom. II. Pars 2.

[LII]

concretionis; ex allabente v. & expirante continuo novo succo, coagulata ista materies sensim distenditur, sensimque in altum elevatur, quæ novo novoque corpusculorum sulphureo-salinorum affluxu non tantum condensatur, sed ulterius quoque ascendendo, ob copiam succi turgens, hinc inde in ramos erumpit, qui ex novo appulso succo primò quidem verruculas quasi promunt, quas recens salinus liquor ulterius extendendo, in furculorum ex ramulis enatorum speciem expellit; quod si abundantia nimia distendendo arbusculam disrumpat, vel ex ramuli extremitate exsudet, exstillans liquor spermatis naturam assilipit, sicque novam Coralii propaginem fundat, & quaecunque remattigerit, tanquam fertile solum osculando, novo superingesto spermate, in arbusculæ speciem similiter extollitur: Eodem E. modo celebratur hæc Coraliorum genesis, quo cæteræ salium efflorescentiæ contingunt, vel quomodo enati sunt silices, alique lapides, qui ramulis insignes & fruticum speciem gerentes reperiuntur, quales se vidisse ad Albim propè ostium Tangræ memorat Encycelius *de re metall. l. 3. c. 3.* Estque hoc idipsum, quod loquitur Paracelsus *tr. de glutine aquæ: Coraliorum oriuntur ex tenaci resina s. glutine, quod ipsorum proprium est, & prima ipsorum materia est quasi forma & liquor alicujus resinæ, quæ lapideam in se proprietatem habet, &c.* Rectè verò materiam salino-sulphuream statui, patet ex lapideâ duritie Coraliorum, quæ ex salino principio non tantum dependet, sed in specie quoque spiritum Lapidificum dictum in se continet, qui nil aliud est, quàm sal universi centrale, vel sal naturæ, vel spiritus salinus subtilissimus, qui ut aliis aliisque sibi proportionatis aquis, salibus & sulphuribus junctus, omnem lapidum atque gemmarum varietatem peperit, ita & Coraliorum materiæ sese insinuando, eandem postmodum in lapideam istam duritiem induravit. Sal verò Coraliorum nitrosum esse vel nitro sulphureum, affirmat Quercetanus, qui ex hoc quoque spiritum eorum ardentem in destillatione emergentem oriasserit; huic sali adjunxit sese viscositas sulphurea, quæ non coloris tantum elegantia decorat Coraliorum, sed

hæc ipsa quoque salina conglutinans corpuscula, & visciditate sua conjungens, soliditatem istam non parum promovet, & excrecentiam formosam valdopere adjuvat. Causa itaque materialis Coraliorum est succus iste salinus-sulphureus; efficiens proxima est spiritus lapidificus ipsi inexistens; remota & sine qua non est vulcanus subterraneus seu ignis sub terræ crusta reconditus, activitate sua succum attenuans, resolvens, & ad poros fundi maris elevans; causa adjuvans est marinæ aquæ appulsus & urgens frigus, quod succi ulteriorem exhalationem repellens, & spiritum insitum ne exspiret coercens, ad congelationem egregie & coagulationem cooperatur.

§. 7. Ex modò deductis mox patet, quid de Coraliorum duritie sub aquis habendum sit: non enim adeo esse dura, in tenebris maris dum adhuc jacent sepulta, atque cum liberiori fruuntur solis aspectu, facile ex modo generationis patere potest; non enim tantum sic omni nutritio & spermatico destituta essent succo, sed ob duritiem nullum illius excursui concederent transitum, omnique proinde artificiosa carerent structurâ, & instar massæ informis infiderent rupibus; idem experientia eorum loquitur, qui interfuere Coraliorum piscationibus, à quibus dura equidem, non tamen lapidea, deprehensa fuere. Interim tamen mollia quoque sub aquis existere, omninò falsum est: qua enim ratione in altum exsurgerent? vel rapido maris motui resisterent? vel piscium transeuntium impetum sustinerent? Experientia quoque duram eorum soliditatem patefacit, dum extrahuntur, simulque piscatorum retia ab eorum furculis dilacerantur: Et si in aquis omninò essent mollia, unde post eorum extractionem durities? à solo aëre ambiente? atqui sic rursus solverentur in aquis, quod tamen minimè ita se habet. Mollitiei verò, quam tribuerunt antiqui ipsis, figmento, occasionem fortè dederit muscus iste villosus, quo non rarò obsita sunt, ex aquis dum extrahuntur. Duritiem enim satis firmam habent sub aquis, non tamen lapideam, sed mediam inter fruticeam mollitudinem & soliditatem saxeam sortita sunt: cedunt impellenti succo nutritio ex parte, & quidem ita, ut in fistulosum canaliculum

Deussing. Virid. ferus 6. 8. p. 296. et Peireskio. Beguinus tyro. l. 1. c. X. Boet. c. 153. l. 2. Tencelius exeg. p. 695. Kircherus cl. Deussing. c. 1.

culum se excavari patiantur, sensimque cedendo ex inferiori parte trunci densitatem respectu gracilitatis ramorum ostendant. Cur verò ex aquis extracta demum lapideam ossëamque assumant duritiem? causâ primario in ambientis diversitate consistere videtur, quod succi illius lapidifico spiritu turgidi congelationem nunc promovet, nunc impedit; evulsa Coralia, & in liberum aërem tracta, ab ambientis, humidum solventis aeris, caliditate & siccitate, & deterfiva humiditatis qualitate, intra exiguum tempus in perfectum saxum convertuntur, quod ipsum humiditas maris antea impediverat: Confirmat hoc non tantum firmissima lignorum durities, post humidi resolutionem sese patefaciens, sed vel maximè Peireskii experientia, Coraliorum furculos post extractionem in leni fornacis vel solis igne indurantis. Quin tamen in aquis tandem quoque plane lapidescant, non adeò dubitandum est, invalescente spiritu lapidifico, & tandem indurante eadem, ut perfectissimam suam acquirant formam & consistentiam: quod asserit Paracelsus *ubi ad justam*, inquit, *magnitudinem pervenit, insito spiritu salis & ætate induratur*, id quod accidit vi ipsius propria.

Deusling.
l. c.

tr. de glut.
elem.

Tenz.
Exeg.
Chym.
p. 696.
modus
elaboran-
di Gan-
sius
cap. X.
Boor, c.
156.

vid. Kirch.
Mund.
subterr.
l. 9. f. 3.
c. 6. Gan-
sius c. 3.
Tenzelius
Exeg.

§. 8. Hactenus de natura Coraliorum: nunc ex differentiis paucis, quæ præsentis scopo conveniunt, perlustrabimus. Removemus autem hîc omnia factitia eorum & adulterata monstra, eaque solum recipimus pro elicienda tinctura, quæ ex benignissimæ naturæ gremio pronata sunt. Hæc ipsa verò, cum sint rursus vel alba, vel rubra, vel nigra, (alias enim differentias, data opera, sicco præterimus pede, utpote quæ pro extrahenda tinctura non sunt usuales) ea tantum nostro inserviunt operi, quæ rutilante minii nativi colore se jactitant, quæque masculorum nomen habent, cum pallescentes fœminæ dicantur. Hujusmodi verò coloris incunabula meritò cum nobilioribus Spagyricis ex sulphure deducimus, tanquam fonte, ex quo omnis colorum realium varietas in corporibus spectanda emanat. Prout enim sulphur à Vulcano magis minusque depuratur, & sal diversimodè exaltatur, non neglecto aliarum partium, ad constitutionem corporis proximè concurrentium habitu, varia quoque colorum appa-

rentia in corporibus oritur. Coralia quod attinet: eorum colores similiter ex sulphure cum salino principio certo modo misto, hisque ab igne subterraneo variè concretis & digestis oriri asserimus: in quibus enim succus ille mineralis Coraliorum materies perfectè est coctus & elaboratus, sulphur ejus optimè depuratum probeque à subterraneo calore digestum, sal quoque ab eodem suavi tepore probè exaltatum & resolutum, nobilissima Coralii species, quæ purpurco se ostendit nitore, exinde generatur. Quod si nimia ejus sit cruditas ob defectum debitæ digestionis, album emergit Corallium; sin verò luxurians in succo Sulphur ab Ignis nimia vel vehementia vel propinquitate comburatur & corrumpatur, nigricans exinde, caliginosum Paracello dictum, corallium nascitur; sicuti similes colorum mutationes beneficio digestionis & in Igne coctionis exhibet continuo sedula Naturæ scrutatrix Chymia. Et licet coralia ex pelago extracta non statim manifestent elegantem suam purpuram, hoc tamen exinde provenit, quod muscus villosus, quo oblita sunt, (quem corticem quidem falso æstimant, dum non in omnibus reperitur coraliis) colorem abscondit, qui tandem eo detracto emergit. Licet quoque à Viris gestata diutius splendore suo radient, à fœminis verò citius pallore inficiantur, & appensa mulieri hystericae pallescant, sed si ad carnes mulieris sanæ affricentur, fulgorem recuperent, sicut etiam observatum est, ab instante morte morbove eadem maculis liventibus & nigricantibus conspurcari; hoc tamen saltem ab atomorum & effluviis ex corpore gestantis emanantium adhesionem, & in porulos eorum penetrationem, contingit; quo ipso ostendunt peculiarem quandam cum Tinct. microcosmi s. sanguine humano sympathiam, qua id, quod ex massa sanguinea, tanquam heterogeneum, præternaturale & excrementitium excernitur, ipsis quoque infestum & hostile est, effluviis ex sanguine naturaliter constituto minimè ipsis offensis: patescit hoc præprimis in febribus malignis, in quibus ut sanguinea massa toto genere insensò obsidetur hoste (dum minutissimis tunc scatet vermiculis) ita & tunc coralia magis quam alias splendorem depo-

chym.
p. 693.
Fabe Pan-
chym. l. 4.
c. 25.

nunt suum. Et in hujusmodi casibus imprimis statuenda videtur simul actio quædam irradiativa Helmontio dicta, quæ etiam fit, ut rubra appensa coralia hilaritatem & lætitiā, nigra tristitiā & mœrorem inducant, imò quā illa affectibus melancholicis in specie sic dictis & Epilepsiæ egregiè opitulantur; hæc verò phrenitides & furiosas Manias sedant, pro vario scil. modo, quo Archeus ab ipsis afficitur.

Tenzelius
Exeg. pag.
696. Li-
bavius.
Gansius
c. 8. Para-
cellus de
1. Q. E.

§. 9. Ex hoc rubro Coralio Tincturam elicere gestiunt Spagyrici, quo colorem simul, cum nobiliori Coraliorum essentia pro usu medico, rejectis terrestribus aliisque inutilibus fecibus adipiscantur. Est n. vera & propriè sic dicta Tinctura portio aliqua substantiæ propriæ corporis, ex quo extrahitur, cum concentratione coloris & virtutis, idoneo menstruo extracta & exaltata; sicquæ Coraliorum Tinctura habebit ipsum in se esse formale Corallorum. Quod verò extra ipsam datur, pro rejectamento habendum, non secus ac in Moscho, demto odore, nihil aliud reliquum est, quàm Cadaver; ita Coraliorum Tinctura est totum ipsorum esse formale, quo habito cœtera susque deque habenda. Ex quibus non difficile erit, Tincturæ veræ naturam ab apparente discernere, quæ solum scilicet colorem sine essentiæ extractione obtinet. Licet enim Tinctura in specie quidem colorem, vel ejus saltim inductionem notet, dum à tingendo derivata sit; usus tamen obtinuit, ut colori juncta nobilior Essentia Tincturam constituat, sicquæ nec color sine essentiā, nec hæc sine illo, Tincturæ laudem mereatur. Veræ E. legitimæquæ Tincturæ hæc requiruntur conditiones: I. ut per extractionem, non v. Coralli corporis meram solutionem, parata sit. Ut enim illā operatione essentia rei intima exhauritur, sic hæc saltim res in calcem redigitur: ut in illā purum ab impuro, essentia ab excrementis segregatur, ita hæc eadem junctā, statim discontinuatur. Ex hoc sequitur 2. Veram Tincturam eam non esse, quæ non remaneat, abstracto suo menstruo, sub colore suo proprio, sed vel salis vel Calcis specie resideat; illud enim genuinus extractionis effectus, hoc v. corrosione est, & illa Tinctura ex partibus sulphureis & co-

Zvelfe-
rus app.
animadv.
P. 59.

Sennertus
de conf.
& diff.
c. 10. pag.
391.
Zvelfe-
rus ani-
mad. in
pharm.

loratis à toto oritur separatis, hæc verò ex menstrui cum atomis corrosis conjunctione. 3. Neceffe est etiam, ne Tinctura, si debet esse vera, præcipitari possit; sive contingat per infusionem spirituum vel salium acidorum, in magisteria sic dicta; sive per menstruorum abstractionem & evaporationem in pulveres salinos albos; sic enim nil aliud quàm subtilissimos pulveres, menstruo corroderenti inexistentes, Tincturam dedisse manifestatur. 4. Vera Tinctura rubra non nisi ex rubris Coraliis parari potest & debet. Quod si enim similis operationis beneficio ex nigri vel albis quoque eliciatur Tinctura rubra, vellipientibus perspicuum fit, non à Coraliis, sed menstruis, per eorum vel longam digestionem, vel certam à corpore subjecto dispositionem, eandem oriri. 5. Ut corpus Coraliorum album, & purpureo suo ornatu spoliatum, post extractionem remaneat; hoc ipsum enim, ut realem Tincturæ ex corpore extrahendō in menstruum transitum notat, ita ejusdem coloris post extractionem remanentia quid aliud, nisi fucatam & apparentem ostendit Tincturam? 6. Ut tinctura non sit adeo copiosa: non enim adeo copiosè in Coraliis luxuriat sulphur & abundat, sed ejus potius parcissima inest copia, ita ut ex Librà vix Uncia una veræ Tincturæ parari possit; imò adeo parvam statuit Laurenbergius c. 4. adeoque parcissimè & leviter corpori permittam, ut per centenas Coraliorum Libras vix pauca ejus Unciæ disseminentur. Hæc requisita nobis inservient postea tanquam Regula, ad quam processum pro elicienda Tinctura veritas judicabitur.

Gansius
c. 7. Lau-
remb. in
aph. Sala
aph. 13.
sec. 1.
Agricol.
in Popp.
de Sole
P. 7.

Et hæc de Coraliis eorumque Tinctura in genere dicta sufficiant: Sequitur jam.

Decisio Controversiæ.

§. 1. An verò genuina & legitima detur Coraliorum Tinctura, ex solo principio ejus sulphureo oriunda valde discrepantes Chymicorum sunt opiniones. In genere tamen quidam omninò negant, veram dari, sed omnem esse vel nudam Coraliorum corrosione, vel menstrui saltim talem colorationem: alii econtrà hosce audacter mendacii accusant, & nimis promptè in affirmativam propensi, multas Tincturas, quæ non omne examen sustinent, pro veris venditant:

Vid. Ang.
Sala aph.
Chym. 1.
aph. 42.
Tenzelius
in Exeg. 2.
pag. 689.
Sennertus
de conf. &
diff. c. 19.
& proom.
in Inst. 2.

alii

Crollius alii mediam terunt viam, non negantes possibilem esse Tincturam veram, & secundum omnia requisita paratam, sed valdè eam paratu esse difficilem, valdèquè parcam, ita ut nondum vera & strictè sic dicta à Spagyricis literis hætenus prodita sit. Ossea enim & lapidea eorum compages, utut faciliè per corrosiva dissolvi possit, principia tamen Sulphur cum Sale, & hoc cum Terrestritatibus, adeò esse firmiter connexa, ut vix ac ne vix quidem postea unum ab altero separari possit, nisi forte per Ignem, qui tamen, volatilitando & destruendo Tincturam, omnem spem eludat.

§. 2. Posteriores, eamquè anteriorem, sententiam nostram facimus. Compositum enim quoddam sunt Coralia, & simul suo Sulphure, à quo Tinctura dependet, debite imprægnata, hinc extrahi posse per conveniens menstruum quis dubitet? & si nullum hætenus inventum sit, quod huic satisfacere queat scopo, saltem menstruum illud universale, Mercurius benedictus Philosophorum, acetum eorum acerrimum, & Avicula Hermetis, efficaciam suam ostendet, modo uberior paulo ejusdem apud Spagyricos sit proventus. Sicut Rhumelius in *Compend. Hermet.* per Aquam suam acerrimam seu menstruum suum Universale eadem resolvit, posteaque cum Spiritu Vini extrahit. Et posito, paucissimum inesse sulphur & inde oriundæ Tincturæ in Coraliis, hoc tamen unà cum defectu menstrui convenientis saltem summam difficultatem, non verò omnimodam impossibilitatem declarat: & pauca licet extrahatur Tinctura, non tamen eadem est nulla: licetque sit ardua ejusdem acquisitio, ob arctam principiorum unionem, non tamen supra Chymicæ artis vires ejusdem possessio. Vulgares verò Pharmacopœorum Tincturæ, vel aliæ etiam, quas elegantiores Spagyrici literis posteritati prodiderunt, non sunt veræ proprièque dictæ Tincturæ, neque rigorosum requisitorum examen sustinent, sed vel colorata tantum sunt menstrua, vel tinctæ eleganter Solutiones.

§. 3. Quod itaque attinet primo Tincturas à menstruo oriundas: hæ sunt omnes eæ, quæ ex Coraliis Igne actuali ante calcinatis oriuntur, & licet hæc menstrua aliquid solvant de

Coraliis, exinde tamen Tincturæ non est origo. Calcinatio autem ista fit vel cum Igne solo, vel adjuncta unà, aut pumice, aut sulphure, aut nitro. Quæ cum Igne fit solo, in eâ Coralia observatis reverberationis gradibus, per biduum vel triduum calcinata, deponunt in Spiritum V. vel roris Majalis suam Tincturam, falsam scilicet, non veram: diuturna enim & violentissima ista Coraliorum tortura quid aliud, nisi sal quoddam fixum alkali (de quo quidam dubitant) cum Terrâ mortuâ conjunctum acquirimus, vel calcem quandam vivam acerrimam, destructa omni Coraliorum essentia, omni eorum exhausta virtute, & expulsa Tinctura? Quod verò per vim Ignis expellatur omnino Tinctura, patet ex eo, quod non tantum ab albis Aquilæ Cœlestis alis seu sale Armoniaci unà elevetur, sed cum sulphuris quoque floribus unà ascendat, & utrosque flores colore sanguineo ut imbuat, ita viribus nobilioribus longe imprægnat, Coraliorum corpore, tanquam cadavere emortuo, ut in aliis contingit calcinationibus, resistente. Nobilior E. & spirituosior eorum essentia, in qua vera Tinctura sepulta jacet, calcinationibus istis omnino perit & evaporat; non secus ac Magnes valde calcinatus vim attractoriam omnino perdit, succinumque ustum vim trahendi paleas. Non ignotum hoc fuit Aromatario illi Neapolitano, qui, cum electuario cordiali, Regi Arragoniæ præscripto, Coralia alba immiscere deberet, in defectu eorum, calcinando rubra, continuo alba nactus est Coralia, ob quam fraudem à Rege 9000. Ducatorum pœna affectus, Aromatarii dignitate privatus fuit. Calcibus E. istis superfusa menstrua tinguntur ab iisdem, mediante inprimis digestionem, non secus ac super aliis salibus alkalibus idem fieri solet: qua ratione ex calce viva, cum modico Tartari vel etiam Nitri certo modo conjuncta, cum Spir. Vini Tinctura, quoad colorem elegantissima, extrahitur; vel (ut maneamus in materia proposita) ex calce Coraliorum affusa Aquâ calidâ extrahitur Sal, huic per repetitas solutiones & coagulationes purificato affusus S. V. Tincturam sanguinei coloris similiter extrahit, cum tamen veræ Tincturæ nihil sit in sale isto, quæ calcinando jam longe evanuerit. Nec quem

quem quam ambiguum reddat transitus coloris in calcinatione ista, ex albedine in flavedinem, ex hac in rubedinem; apparens enim tantum est, & ignis violentia fucis tali pinguntur Coralia. Cur enim primo gradu sese absconderet nativus eorum rubor, & postea per gradus rursus emergeret? si quidem & similes fucos in aliis quoque videmus calcinationibus: nam Vitriolum viride primo leni Igne in albedinem; mediocri in bruncum colorem; fortiori in intensam rubedinem; fortissimo in nigerrimam abit calcem: & Tartarus similiter, dum calcinatur, in varias, ad instar Prothei, se transformat facies. Ex hisce simili modo judicandum de Tinctura illa putatitia per spiritum Coraliorum proprium acidulum, ex iis immediate per Retort. prolectum parata: posito enim, elici ejusmodi spirituum acidum ex iis, (obstinatè enim hoc affirmare nolumus, cum nulla hujus à nobis facta sit experientia) vera tamen Tinctura extrahi cum eo nulla poterit; in Coraliis enim per Ignis istam violentiam jam omnis evanuit rubedo, & ipsa sanguine omni exhausta ex Retort. eximuntur: qualem E. ex hoc Coraliorum cadavere iste spiritus eorum proprius extrahet Tincturam? seipsum potius tinget, qualis mos acidorum alias esse solet, quemadmodum Acet. destill. super Coralia ad albedinem calcinata fufum, rubro quoque tingitur colore; non secus ac super pumice calcinato, unde fictitia ista Tinctura. Sed quid sentiendum de hac cum pumice calcinatione, & inde parata Tinctura à quam plurimis celebrata? Falsissima hæc est, ne micam quidem in se continens vel substantiæ vel tincturæ coraliorum: nam 1. per vim Ignis omnis perit tinctura, ut jam demonstratum. 2. pumex de eadem calcinatione ista nihil assumit; licet enim albescentibus in principio Coraliis pumex quodammodo rubescat, postea tamen iisdem propemodum nigrescentibus, & tandem planè albo colore suffusis, nihilo magis tingitur pumex, cum tamen, quando magis Coralia exuerentur rubedine, tanto magis eam indueret pumex, quod tamen contrariatur experientiæ. 3. Coraliis, quibus sic tinctura à pumice extracta est, affunde spiritum mellis vel Urinæ, & acquies etiam tincturam. Quæ E. est vera? nulla sanè. In hac

enim ex Coraliis, sulphure suo exhaustis, paratur, & in illà ex pumice, qui nihil ejusdem Sulphuris Coralini in se continet. 4. Tinctura ex solo est pumice, qui per diuturnam calcinationem vi empyreumatis, & cujusdam alkalisationis ab Igne contracta, Aceto destill. vel Spir. Vini superfuso, mediante longiore digestionem tingit, non secus ac idem lapis; autore Libavio crematus, Aquâ affusa simplici simili modo tingitur, vel ut idem pumex nimis calcinatus tinctura smaragdina imprægnat Acet. destill. affusum, autore Agricola. Ad hæc cum Sulphure quoque calcinantur Coralia, horum p. j. illius p. iij. per horas 2. vel 4, & sic calida injiciuntur Aceto destill. quod per digestionem cum calce illa Coraliorum, cam solvit, sicquæ se ipsum tingit; vel cum S. V. tandem Tinctura extrahitur, idque faciliè mediante digestionem. Par ratio est cum Nitro, cum quo fusa Coralia, & probè calcinata, de se in auras transmittunt tincturam. Sal vero nitri fixum, cum calce Coraliorum alkalisationem relictum faciliè beneficio digestionis S. V. tinget: quod patet vel maxime ex eo, quod restans Coraliorum pulvis similiter rursus cum Nitro calcinatus, eodem modo iterum S. V. tinget. Alii hoc ipsum exactius perspicientes, nitro jam satis fuso injiciunt pulverem Coraliorum, agitando continuo spatulâ; sic enim nitrum Coral. sulphur assumere creditur, ne evanescat: materiæ postmodum calidæ Sp. V. affusus faciliè hinc se tingere poterit. Sunt alii, qui cum Nitro pulver. Coraliorum ana in Retort. tubulatam injiciunt, propellendo sic Sp. Nitri, & simul calcinando Coralia; ex qua calce salina Spir. V. luteo colore tingitur: abstracto eo, pulverem in Aqua solvunt, in qua rubedinem sese prodere ajunt, pulverem rursus coagulatum in Oleum rubrum per deliquium solvunt, super quo fusus S. V. statim rubescit, &c. Sed quis putet, aliquid remansisse tincturæ in Coraliis? cum post omnem materiæ injectionem ad 12. horas Coralia Vulcani vim sentiant; & cur in specie V. primo luteo tantum colore, tandem vero rubeo tingitur, pulvere spontè in Oleum rubrum fatisciente? Profectò cum Chymicorum manus oculatæ sint, non prius huic Tincturæ adhibebimus fidem, antequam

Hartmag.
in Croll.
p. 292.
Grulin.
Floril.
part. 19.
c. 2. Sennert. l. 5.
Inst. p. 3.
f. 3. c. 9.
Gansius
par. 12.
24. Gansius
par.
30. p. 91.
par. 13.
pag. 76.
Zvvelferus
Mantiss. p. 437.
Kesslerus
Cent. r.
Process.
85.

Gansius &
Hartmag.
in Croll.

Laurentberg.
in Sal. aph.
part. 14.
pag. 9.

Schreud.
pharm. l.
3. p. 339.
Gansius
parag.
298. p. 91.
Agric. in
Pop. p.
852. part. 1.
Boot. cap.
154. Schr.
p. 335.
Gansius
part. 26.
Poppius
Agr. in
eum p.
858. Laur.
in aph. sal.
pat. 13. p. 9.
Tenzel. p.
697. Tenzelins
pag. 699.

quam eam secundum præscriptionem elaboratam intueamur. Sunt qui cum nitro Coralia calcinant, adjecto Sulphuris momento, mox terunt, & cum S. V. Tincturam eliciunt, præcipitato Nitro cum Oleo Tartari. Sed Tinctura hæc saltem à sulphure oritur; nam post S. V. evaporationem pulvis remanens planè est sulphureus, & croceam Tincturam tradit, spiritui terebinthinæ, qui ex fl. sulphur. similem Tincturam extrahere assolet.

tum, quod super istiusmodi alkalia V seipsum facile tingat: forte alio modo per eandem materiam, si cum eadem fundantur Coralia in crucibulo, per præcipationem sulphur Coraliorum per acidum quoddam separare, & exinde tincturam parare quis speraret? sed sicut ista præcipatione non solum acquiritur sulphur, à cætero corpore solutum omnino, sed simul minutissimus Coraliorum pulvis; ita eundem quoque insimul V imbibere poterit, sicque habebit non extractionem Coraliorum, sed elegantem eorum solutionem. Similem menstrui tincturam præbet spiritus roris majalis, qui Coraliorum calci per Ignitionem paratæ affusus, ex iis tincturam extrahere videtur; vel si secundum Quercetanus Coralia Igne reverberata cum menstruo coelesti destillato, cum proprio suo saccharo, (h. e. cum spiritu roris majalis cum manna parato) extrahantur. Non equidem rori majali suam in extrahendis tincturis negamus efficaciam, utpote qui sale naturæ & aeris, omnia vegetante & vivificante, egregie imprægnatus est; sed quid extrahet ex Coraliis calcinatis? Verum quid dicamus de spiritu ardente Saturni (quem multi vel omnino pro non Ente, vel saltem pro V regenerato habent) cum quo ex Coraliis Tincturam parare docent Chymiatræ? ut & de spiritu ardente Coraliorum, quem similiter pro V ex aceto resuscitato habere possis, (utut Lauremberg, hos spiritus compositos asserat ex spiritu aceti & parte ardente Saturni vel Coraliorum, quæ pars ardens, separato aceti spiritu, remaneat) nisi quidam etiam sine aceto, & non ex sale tantum Coraliorum, sed ex ipsis immediate Coraliis certo modo destructis, parare velint? Res sane ut adhuc incerta, ita & difficultatis plenissima. Quicquid sit, quæ cum spiritu Coraliorum paratur, eam ipse rejicit Hartmannus, ejus autor, eamque à menstruo oriri vult, & Sennerthus, qui simili modo ex albis Coraliis tincturam rubram elici affirmat. Quod si verum est, verum etiam erit de spiritu Saturni, cum de similibus idem sit judicium.

§. 5. Promovendus jam gradus ad tinctas Coraliorum corrosiones, eaque imprimis per acida paratas menstrua, quæ subtilissimum Coraliorum pulverem imbibebunt, & accedente

Gansius.
c. l. par. 28.
Schrod. l.
3. p. 338.

Agr. in
Pop. de
sal p. 207.
Schr. p. 339
in Sal. Par.
XI. Hartmann.
in Crol. l. c.
Heist. in
dispen. p.
2. l. 4. p.
96. Gansius
parag.
23. Schr.
p. 3. p. 338.
Schneiderus
de Catarrh. l.
4. c. 6.
p. 499.

§. 4. Similia tincta menstrua, cum pulvere subtili Coraliorum interdum imprægnata, sunt etiam sequentes Tincturæ: Primò quidem ea, quæ cum succino destillando paratur, dum putant succinum esse magnetem Tincturæ; sed rubedo inde emanans, obscura nimis, succini est, non Coraliorum. Eiusdem valoris est, quæ cum Sp. Vini solo paratur, vel per digestionem, vel per crebrius repetitam destillationem, qua tandem Tinctura per alembicum prodeat, (ut ajunt, de quo dubitamus, utut Gansius hoc oriri asserat, à Sp. Vini per crebriorem destillationem exaltato) nam notum est, quod S. V. in loco calido super subiecto idoneo, colore purpurâ nitidiore seipsum tingat; non secus ac spiritus terebinthinæ per levem digestionem seipsum rubrâ induit veste. Sic idem Sp. V. ex Coraliis calcinatis, h. e. ex quibus jam omnis exhausta est Tinctura, tamen colorem rubrum extrahit, & quidem facilius ex his, quàm crudis, quod forte ex illis in porositate ab Igne redactis particulæ quædam à S. V. imbibuntur, qui

S. V. seipsum ting. V. affundatur Coraliis, per Oleum Citri jam suâ Tincturâ privatis, nihilominus colore rubicundo tingitur: ut taceam Sp. V. plane imbecillum esse pro extrahenda Tinctura ex Coraliis, nisi antea debite sint reclusa. Hinc loco Sp. V. simplicis, Sp. V. Tartarificatum quidam assumunt; sed quidni hic sal tartari in digestionem acceleret tincturam? cum non dubium, quin simul partes quædam Coraliorum solvantur. Cæterum tinctura, quæ hac methodo paratur, copiosior est, quàm ut ex Coraliis sic extrahi possit. Alii per liquorem Alcahesticum lapidum, ex silicibus & tartaro paratum, Coraliis affusum, eorum tincturam extrahere, eamque postea S. V. affuso communicare volunt: sed nulli igno-

S. V. seipsum ting.
Agr. in P.
de Sale
pag. 55. de
Tart. p.
709.
Haupt.
scr. Col.
lil. p. 26.
Grül. Flo.
rileg. part.
19. p. 367.
Rolf. Ch.
p. 303.

Exc. Rolf.
Chym.
pag. 227.
l. 4. f. 1.
ait. 5. c. 3.
Glauberus
p. 2.
dige. furnor.

Philos. c. 105. p. 151. Tenzel. p. 696. Rolf. c. l. Beguinus l. 2. c. X. p. 255. Glückrad. in Beg. cum lim. ex sect. est Cardinal. Farnesii & Tinct. P. Cavalli. Ganfius par. 21. Schrod. p. 340.

digestione, aliisve principii conjunctione, Tincturam prodiderunt. Vulgaris inter has est notitia destillatio Coraliorum cum saccharo, sic per Retort. prodit liquor rubicundus; non secus ac saccharum cum antimonio destillatum simili prorepat colore, particulas tamen quasdam Coraliorum spiritus acidus simul elevat corrodendo, per oleum Tartari beneficio precipitationis facile separandas. Alii solutionem Coraliorum cum succo limonum, vel berberum, vel citri, pro eorum tinctura venditant, acquirantes sic loco tincturae magisterium non inelegans. Alii succum citri ad consistentiam mellis abstrahunt, posteaque cum spiritu Vini Tincturam extrahunt, non minus pulchram solutionem ostendentes: vid. Rolfincius c. l. Bootius l. 2. c. 154. p. 310. Cum oleo corticum citri alii rubedinem Coralii exuunt, hisce integris, sed albis, in fundo relictis: (& hoc oleum citri corallatum calci solis affusum egregiam tincturam extrahere, sunt qui asserunt) sed subtilis huius olei acrimonia subtilissimas Coraliorum partes, tinctura tamen sua non destituta, corrodet & recipiet, cumque ipsum sit colore aureo, facile accedente ad solutionem istam debita digestionem, nitidiore purpurâ renitebit. Fuit aliquando Pharmacopœus quidam, qui Coralia cum Aqua Cæsareâ, ipsum Martem dissolvante corrodit, sicque Tincturam paravit, eamque Podagrigo, ob assumptum arcanum Corallinum graviter decumbenti, pro viribus reficiendis propinavit. Sunt, qui cum Spir. Vitrioli Coralia subtilissimè pulveris. dissolvunt, & digerendo in tincturam elegantis coloris redigunt, quæ non à solis cortosis est Coralii, sed maxima ex parte à solo spiritu Vitrioli, qui vel ex levi pulvisculo, vel alio quodam incidente, rubro se colore tingit: Vel spiritum Vini & Vitrioli per frequentes cohobationes firmiter jungunt, eosque loco menstrui adhibent: sed Sp. Vitrioli dum corrodit eadem, pulvisculum recipit, & S. V. implantat, hinc facile rubescunt. Alii recip. Corall. Libr. j. Vitrioli, & Sal. gem. ana Uncias ij. & affusa aqua levistici per Mensem digerunt, sicque corrosione Coraliorum Tinctura rubra exurgit. Solvit quoque Coralia Spiritus Mellis acidus, & color rubicundus ex solutione

ista oriundus ex Spiritu est, ingenue hoc fatente Crollio, p. 288. qui nunquam etiam genuinam se vidisse Tincturam aperte affirmat; facile enim Spiritus mellis per se Tincturam assumit purpuream: sic si cum S. V. adjectis arenis, mel digeratur, dat Tincturam omnino sanguineam, & si jungatur cum sale tartari, instar sanguinis mel rubescit. Facile E. super Coralii calcinatis, aliquas eorum particulas imbibendo, Tincturam rubicundam in leni calore induet, minime verò à Coralii oriundam, nam spiritu hoc abstracto, ex pulvere rursus per S. V. Tinctura evocanda, repetitâ digestionem: prætereaque tam copiosa sic paratur Tinctura, respectu Sulphur. Coraliorum, ut nullo modo ex his solis eadem oriri possit: Et idem copiosus Tincturae proventus, respectum reddit Locatelli processum, qui ex sale Coraliorum, cum spiritu acido aceti ad abundantiam usque inebriato, per affusionem Spiritus mellis Tincturam extrahit: & nulli dubitamus, quin hoc modo, & fortè etiam priori, ex albis Coralii rubra Tinctura elici possit. Quod attinet Tincturam Mynsichti, cum spiritu Mellis etiam paratam, ea non facile limam subire potest, cum occultè & philosophicè admodum descripta sit, satis tamen accurata videtur, & si istis paratur circumstantiis, quales Autor consignavit, non adeò longè à verâ Tincturâ abesse videtur. Sunt porro alii, qui ad modum superiorem istum primum Hartmanni, loco Spiritus Mellis, Spiritum Urinæ adhibent, extrahendo sic rubedinem: sed fraudulentum quid subesse videtur, ex eo, quod Sal Armoniacum, cuius potissima pars est Sal Urinæ volatile, (ratione verò huius salis Spiritus Urinæ agit, quicquid agit) solutum in aqua comm. & affusum Coralii rubris, cœruleum impense colorem extrahat. Sed unde hæc Tinctura? ut E. hæc est apparens, sane & illa cum spiritu Urinæ ejusdem erit valoris, ibi enim per Sal Armoniac. ex Coralii illibatis educitur Tinctura cœrulea, hinc v. cum spiritu Urinæ ex Coralii calcinatis, & cum Sale fixo Nitri conjunctis, facile similis spuria Tinctura exsurgere potest. Cum similiter spiritus Urinæ Coralii cum pumice calcinatis (hoc est è quibus à pumice omnis Tinctura extracta est, ut putant, vel potius

P. 2. p. 255. Ganf. par. 10. Schrod. c. l. Grüling. floril. c. 2. part. 19. p. 365. Horstius l. 4. P. 2. p. 96.

Theatro, d'arcani. arc. 45. p. 218.

f. 2. p. 24.

Agricol. de cor. in Popp. p. 555.

Tenzel. egreg. p. 698.

Agricol. in Popp. p. 858.

Alii cum oleo anisi eliciunt TRam. ita tamen ut postea affusa Aqua fontana oleum per destillationem abstrahatur & deinde S. V. extrah. TRA. Hofm. de us. & ab. us. med. Chym. p. 20. Contr. Med. dest. P. 1. p. 136 Ganfius par. 18. Contradus Med. de still. p. 1. p. 137. Boot. c. 154. Hartmannus in Croll p. 291. Agricol. in Popp.

tius è quibus omnis per ignis volatilitatem simul exhausta est Tinctura) & plane dealbatis affusus, Tincturam rubram extrahat: quod ipsum de spiritu Mellis non minus verum: Sal enim Urinæ mirificam colorum potestatem potentia in se continet, secundum quam ad variam subjectæ materiæ diathesin, modo hunc, modo alium colorem exhibet. Solutiones elegantes sunt etiam, quæ fiunt per

quando pulvis Coraliorum solutus in Spiritu Sal. & optime edulcoratus, extrahitur cum Spiritu Vini: quæ extractiones per repetitas digestiones, & aliquoties iteratas cohobationes, quinta destillatione promunt Spiritum rubeum, (ut volunt) sexta vero cohobatione in Retorta pulvis huiusce coloris in fundo manet. Sed ut optimum est Gansii iudicium, rubedo illa Coralii accedere videtur, vel à reliquiis spiritus salini, vel à menstruo sæpius affuso, & multum digesto. Hisce annumeranda etiam tinctura *Frat. Basilii Valentini*, in qua Coralia cum spiritu Sal. soluta, postmodum cum Sulphure, camphora, & calcinata, Spiritum Vini rubro colore tingunt. Ex huiusmodi solutionum censu est etiam ea Tinctura, quæ per menstruum compositum ex Tartaro & Vitriolo paratur, (quantum pro varia præparatione modo plus modo minus participet de Vitriolo) sive hoc sic simpliciter paratum assumatur, sive ab ossibus calcinati prius quater cohobetur, menstruo hoc super Coraliiis rubefacto, ab iis decantato & abstracto, materia restitans affusum S. V. vel aquam temperatam, vel spiritum rosarum tinctura rubicunda imprægnat. Nulli vero dubitamus, quin simili modo ex albis quoque Coraliiis eadem parari possit: & ipse Dominus D. Langelot, qui primus eam communicavit D. Schrædero, aliisque non pro sincera eandem habet, sed eam potius, quæ cum spiritu vel sale aëris paratur, eadem præfert.

§. 6. Examinatis hætenus Tincturis, quarum nobiliorum Chymicorum ingenuitas & candor nos participes reddidit, iisque sub apparentium classem redactis, restat ut selectiores quasdam præparationes ejusdem apponamus: quæ utur verarum Tincturarum non merentur titulum, elegantioris tamen & efficacioris Coraliorum solutionis nomine meritò gaudent: 1. Recip. *pulverem Coral. rubr.* solve in f. q. *succi citri* in digestionem, filtrenturque, filtratus liquor includatur *Retortæ*, vel *cucurbitæ*, omnisque humiditas abstrahatur & coaguletur lento Igne: affunde super materiam in fundo relictam S. V. vel, quod melius *spiritum* quendam *apropriatum*, ad 2. digit. eminent. & tridui spacio, beneficio digestionis,

[M m m]

habe-

Kircherus 1.9. Mund. subterr. f. j. c. 4. p. 161. Tenzelius p. 697. Conrad medul. dest. p. 1. n. 10. p. 137. Boot. 1. 2. c. 154. Schr. ex comm. Cloff. p. 340. Deodatus in panth. hyg. Conrad. P. 1. Medull. destillat. p. 135. & P. 2. p. 263. Gansius par. 17. Boot. c. 154. Sennert. Instit. 1. 5. p. 3. f. 3. c. 9. Gansius par. 1. & 1. ac 3. Corall. p. 289.

Gansius patagr. 25. Sch. p. 337. Schrod. sub nomi. ne Tinct. Holfat p. 339. Horst D. p. 1. 4. p. 69. Davidf. in prodrom. comment. in Pet. Severin. Datum. Februre Traict. de la Ch. p. 688. qui post corrosio. nem cum hoc men-

Tom. II. Pars 2.

habebis spiritum rubicundissimum, qui tincturam citri & Coraliorum in se continet. Elegantiores longè sunt tincturar. Coral. præparationes, quas D. Michaëlis, parare solet, easque vel cum *spiritu ligni sassafras*, vel cum *spiritu antiscorbutico composito*, unde tinctura Coraliorum Antiscorbutica; vel cum spiritu Cord. Cervi, quarum felicem energiam quotidiana experientia comprobat. Elegantis quoque tincturæ nomine venire potest extractio Coraliorum secundum ductum Q. E. Coraliorum Fabri parata, in *Myrothec. Spagy. l. 3. c. 22. Recip. pulv. Corall.* eleganter rutilant. *Sal. Armoniaci* ana, sublima, & sic Sal Armoniacum corrodet subtilissimas earum partes, floresque rubicundissimi ascendent, attracta secum Coraliorum Tinctura, quam à Sale Armoniaco cum *Spir. Vini* aliòvè appropriato optime rectificato separare & per lenem abstractionem ejusdem ad tincturæ debitam consistentiam redigere poteris. Vel curiosiori modo hisce floribus Coralatis solutis in Aqua calida spiritum quandam acidum infunde, sicque præcipitando separabis sulphur quoddam Coraliorum ardens, ex quo per S. V. quin tincturam elicere queas, nulli dubitamus: sicut hoc ipsum ab Amico quodam singulari bona fide nobis communicatum fuit. Sic ex floribus Sulphuris coralatis, seu cum Coraliis sublimatis colore citrino, & intenso præditis vel per S. V. optime alkoholisatum, vel spiritu terebinthinæ, tincturam parare poteris; Sulphur enim per se vires possidet egregias medicas, quas conjugium subtilissimæ Coraliorum partis, non parum exaltabit. Non inelegans quoque & hic est processus, ab Italiæ quodam Principe in Secretis habitus, tincturæ pretiosæ nomine appellatus: E Coraliis super porphyrite pulverifatis cum terra sigill. vel alia, & aqua, fiant globuli, exciccantur, & destillentur per Retor. per gradus, postremo fortissimus prodibit liquor brunci coloris vel nigro-rubicundi, qui rectificatus super frusta aliquot Coraliorum, stet in leni calore, & eliciatur Tinctura: repetatur injectio, donec acquiratur sufficiens rubedo, depleatur & filtretur, cum S. V. circuletur per menses, postea lento Igne abstrahatur ad debitam consistentiam; parvus autem est tin-

cturæ proventus. Sed novissime egregius quidam Chymiater, Parisiis novo & antea inaudito modo, tincturæ præparationem aggressus est: Certò scil. tempore colligit *Aquam aeris*, utpote sale universali naturæ intigniter acuatam, ex eaque, præmissa debita digestionem, destillat primò phlegma, hinc spiritum, &c. phlegma illud primò prodiens, ut diaphanum est & planè perspicuum, ita omnis omnino saporis expers; & non secus ac vulgaris aqua omnino insipida, ita ut vix ab eadem discerni queat, & tamen hoc ipso menstruo insipido extrahit ex Coraliis tincturam rubicundam, ipsumque eorum Sal; evaporata enim in Solis radiis tinctura, sal in cubica forma residet, reliqua materia instar succi berberum supernatante, &c. &c. Hæc de præparatione tincturæ Coraliorum dicta sufficiant: considerandus jam ultimo paucissimis ipse

Usus Tincturæ.


Communis Autorum ferè omnium & Chymiatorum est sententia, vi cordiali egregia instructa esse Coralia rubra, atque imprimis legitimam ex iis paratam tincturam. Præterea quoque peculiarem cum sanguine humano sympathiam & intimam amicitiam fovere, eamque ab omnium heterogeneorum excrementorum sordibus repurgare: unde in morbis venenatis, febribus malignis, ipsaque adeò atrocissimâ peste, non vulgariter commendatur. Adstipulari hisce videtur signatura rubedinis Coraliorum, qua nectaris microcosmici tincturam exactè repræsentat; imò Gansio iudice, Coralium viribus propè divinis omnes gemmas superat, nec gemmis tantum, sed cunctis etiam herbis præferendum videtur. Sed ne quid nimis? Egregias largimur Coraliis vires, Panaceæ tamen titulo ea indigna censemus; habentque essentielles suas dotes à divino Thaumaturgo in prima rerum origine seminali suo principio implantatas, determinatas tamen, & ad certos effectus restrictas: participem earum imprimis dicimus tincturam veram, modo lucem liberiores aliquando ea aspiciat, eamque insigniter in supra nominatis affectibus commendatam volumus. Origo harum virium ex sulphure cum spiritibus salinis, fixatis conjuncto, optime digesto, concocto & exaltato, originem habere putamus; pro varia

Conrad. Medul. destillat. p. 132. Boer. c. 154. Bernard. G. Penatus à Port. S. Mariz de Præp. & ul. mod. Chym. II. Unzer de Epil. Gærling. in Florileg. p. 19. c. 2. p. 368. Febure Trait. de la Chym. p. 694.

Cap. 154.
Pag. 312.

varia enim horum miscela, ut lapides gemmaeque reliquae virtutum suarum nobilitatem nanciscuntur, ita & Coralia. Sulphur enim tanquam totius Universi calidum nativum & insitum, miris splendidisque virtutibus praeditum, ut pro varia rerum, praesertim salium, secum combinatione varias & diversas induit virtutes; ita imprimis in Coraliis, ob peculiarem suam nobilitatem, in quam ob summam coctionem & digestionem exaltatum est, arctumque cum spiritibus salino-nitrosis connubium, non potest non longè efficacissimum & saluberrimum toti Microcosmo reddi, cumque in vera tinctura à reliquis principiis, tanquam recrementis, secretum existat, statim hujus divina energia patescit. Interim tamen, cum nondum licuerit adire Corinthum, in locum ejusdem tinctas artificiosè solutiones recipere cogimur, quæ ipsæ, utut supra enarratas virtutes in inferiore possideant gradu, non tamen omnino rejiciendæ veniunt, firmante earum stationem non Boëthii tantum, sed quotidianâ quoque experientia: & cum præterea minutissimas Coraliorum substantiæ contineant partes, easque ex parte terrestres, blanda quadam adstrictoria facultate simul pollebunt, qua non tantum egregie partium internarum conservando tonum, & robur earum firmando, eas recreabunt, sed omnibus quoque fluxionibus quarumcunque partium, & in specie hæmorrhagiis mascule resistent, simulque præcipitatoria quadam facultate, nimias sanguinis effervescentias, & inde ortos anxiosos ardores, suaviter

compescent. Quæ ipsæ virtutes à menstruo magis adhuc determinabuntur, magisque appropriabuntur p. n. affectibus. Hinc quæ cum S. V. paratur, ultimo insigne erit spirituum confortativum, & totius Microcosmi à venenis præservativum, cum hic ipse spiritus sit elegantissimum Aurum potabile, efficacissimumque simul alexipharmacum: quas dotes eminentius inveniemus in ista solutione, quæ cum succo citri primitus instituta fuit: sic quæ cum spiritu ligni sudoriferi est extracta, divinum contra Veneream foeditatem est auxilium, non secus ac Tincturam antiscorbuticam miracula in hoc morbo præstare certissimum est. Familiarissimo quoque in usu Excell. D. Langelott est Tinctura Holsatica, adhibetque in omni impuritate sanguinis. Quæ verò ab Armoniaci subtilitate elevata fuit, si cum eodem conjuncta maneat, excellentissimum merito nominabitur Diaphoreticum, omnes peregrinos hostes sub fuliginum specie ex Microcosmi expellens territorio: qualem usum forte sola habebit Tinctura, quæ ex præcipitatione cum appropriato quodam spiritu fuerit: sed quæ cum sulphuris floribus concinnatur, in peste imprimis, morbisque aliis venenatis & pestiferis, strenuam se ostendet: sicut & ea, quæ cum alexipharmaco Solaris terræ spiritu paratur. Cum aqua aëris, quæ extracta est, cum tanquam recens editus foetus nondum indolis suæ ediderit specimina, de eadem adhuc experientiæ testimonia inquirenda veniunt. Quibus aberramus & facimus
F I N E M.



DISPUTATIO III.
DE MORSU VIPERÆ,
LOCO DISPUTATIONIS INAUGURALIS,
SUB PRÆSIDIO
SIGISMUNDI RUPERTI *Sulzberger*/
Philosoph. & Med. Doctoris, Anatomices & Chirurgiæ
Professoris Publici, Facultatis Medicæ Adfessoris,
à
M. MICHAELE ETTMULLERO,
Lipsiensi, Artis Medicæ Baccalaureo Publico
Examini submissa,
die 17. Augusti Anno 1666.

P R O O E M I U M.


*T*Errestres Deos si vocarim primos nostros Parentes, vix aberraturum me æstimo: absoluta namque eorum potestas totum terrarum complectebatur orbem, & quicquid universo hic ipse fovebat ambitu, ceu Dominis humillimè eis serviebat. Sed neglecto ab ipsis mandato divino, omnes quoque subditi rebelles similiter sunt facti, ut levissimum animalculum insurgere contra eosdem animosè audeat. Non sufficiebat scilicet, tot morborum tempestatibus expositum esse corporis navigium, aut nebulae instar evanescere fugaces vitæ dies, sed ad principis antea conspirare debebant internecionem, tum ipse homo, tum reliqua animantia. Relinquo Machinationes, quas homini homo struit malitiosè, ne proprii generis aspergere infamiæ labem videar: Brutorum saltem notanda vis, eorumque insigniorum atrocitas, & viliorum nocendi perniciositas, quæ leviter saltem provocata lethalibus se ulciscuntur plagis. Quem non prosternit Leo, Tygris, Ursus, Lupus vè? quis cornuum Tauri ferat insultum? aut ungulae equinae percussione? que ut apertè nos aggrediuntur Marte, ita manifestam eorum lesionem nemo non fugit. Ast vix hic cedunt vel vilissima animalcula, quæ occultis veneni armata sunt spiculis. Araneus non bufoni tantum mortiferas struit insidias, sed & homini, si provocetur, est venenatus hostis. Quid scorpium valeat aculeis, neminem latet; quidque apum, vesparum vè ictus habeat in recessu, loquuntur Prædici. Taceo phthiriasin, morbum, in quo, horrendum dictu! sordidi pediculi miserè interimunt aegros. Viperæ impræsentiarum considerabo vim, & quantum malignitatis in morfu sub alexiteria earum lateat virtute pensitabo. Hinc ut faveat Divinum Numen, supplex rogo.

CAPUT I. THEORETICUM.

P U N C T U M I.

Morsum viperæ esse venenosum asserit.

§. I.



Paradoxa admodum prima fronte videtur Cornelii Celsi sententia, dum libro V. Medicinæ c. 27. expressè asserit, omnem feræ morsum habere quoddam virus: quod effectum, licet de propriè dictis feris indomitis,

iisque homini singulariter infestis, intelligi possit, sicut hoc sensu illud interpretatur Sennertus lib. V. Prax. Part. IV. c. 19. antecedentes tamen lineæ, & subsequens generalis medendi methodus, ad omnia animalia hoc assertum accommodandum suadent, cum imprimis in aliorum Autorum lectione occurrens experientia idem satis confirmet. Notanter interim, quoddam virus habere, ait, innuens hoc ipso varietatem graduum, dum intensius modò sit idem, modò remissius, modò insignioribus comitatum sit symptomatibus, modò levioribus, ita ut in genere quilibet morsus cujuscunque animalis, furore

urore tamen vel irâ concitari, præter læsionem externam, veneni unâ inducat metum.

§. 2. At interferas, morsu venenato inquinantes, præ aliis serpentum & reptilium eminent genus, inter quæ verè primum meretur locum vipera, animal in totum perniciosissimum & venenosum, ut loquitur Amatus Lusitanus *Cent. 1. Cura 1. Scholio 10.* Quod quò notius est omnibus ferè Europæis, eò vehementius lædit mordendo, testantibus hoc Symptomatis, quibus catervatim stipatur hic morsus. Sed in quo venositas hujus consistat, omninò controversum est; necesse ergò, ut de natura veneni morsusque venenati prius constet, quò eò certius de veneno viperino possit ferri judicium.

§. 3. Venenorum essentia, si quæ alia, in toto Naturæ theatro ut maximè est obscura, ita ob id perdifficilis in Medicina eorum curatio est. *Vide elegantissimum discurs. Johannis Fabri Lyncei Expositionibus in nomina, & imagines animalium novæ Hispaniæ pag. 783.* In primis monendum, insignem vulgò hic animadverti abusum, dum quodlibet corpus naturale, ejusve quædam pars, lædens quocunque modo corpus humanum, cujus læsionis ratio adeò manifesta dari non possit, aut licet reddatur, ab altero ob præconceptarum opinionum vim, non accipitur, mox venenosum, læsioque à veneno oriunda, dicitur: Sic Opium sæpius vocatur venenosum ob vim suam narcoticam, cum tamen magni ipsius theriacis Antidoti constituat basin; unde & Hyosciamus, Solanum, Mandragora, ipsumque salutiferum Papaver, sub venenorum vulgo rediguntur classẽ, cum tamen horum legitima præparatio & usus divinas medentibus porrigat manus, & nunquam satis deprædicandam ægris ferat opem: Sic similem sortem subit ob similem vim datura dicta planta, ex cujus tamen semine quam elegantissimum Pharmacum phantasticum doctissimus elaborat Fabricius Bartholetus, ad quæcunque deliriorum melancholicorum inprimis genera efficacissimum, videri potest in *lib. V. Method. in dyspnœam Part. 1. cap. 1. pag. 392.* Quod ipsum medicamentum manu ferè nos ducit ad penetrandam intimius medicamentorum vim, eorundemque spiritus & archæum corporis nostri afficiendi modum. Miror interea, cur non & pares ob causas vinum inter venena relatum fuerit, postulante hoc delirio ebrioso, post nimium ejus usum, nunc melancholico, nunc maniaco, &c. pro varietate individuorum inducto? sicut ob vires hujusmodi stupefactivas vapor ex musto fervescente exhalans venenatus dicitur, cum tamen mustum, in larga quoque copia haustum, nullas veneni imprimat notas. So-

lent similiter sanguis menstruus; lac in ventriculo coagulatum, ob quædam symptomata ex stomachi gravedine oriunda; unguium segmenta ob vim emeticam vel purgantem excedentem; cantharides ob vim suam inprimis vesicam exulcerantem &c. venenorum appellari nomine. Ut & calx viva, item gypsum, vitriolum assumptum, aqua fortis, venenata dicuntur, ob repentinam suam læsionem &c. Ceterum si simili modo pergere debeam, vereor sane, ne omnia medicamenta, & alimenta ex perverso usu fiant venena, & horum usus legitimus easdem in medicamenta permutaret: Aliud namque est noxium, aliud verò venenatum.

§. 4. Venenorum interim propriè sic dictorum quod attinet naturam, ante omnia præcindendus est conceptus usurpationis & præparationis ab eorum interna essentia; quia sub illo respectu venena fiunt non venena, hoc est, legitimo usu & commoda præparatione abeunt in saluberrimas medicinas: propriam verò consideratam essentiam, conceptu quodam generali omnibus univocè competente exprimere, res videtur ferè impossibilis, tum ob insignem eorum varietatem, tum etiam ob unius ejusdemque veneni variam operandi rationem. In genere tamen in hoc omnia convenire videntur, quod agant, vel ratione fermenti cujusdam peregrini Massæ sanguineæ, tanquam Nectari vitali, omnino exotici, vel ratione speciei, seu Ideæ cujusdam Archæo hostilis, eum in varias agitantes perturbationum procellas, unde enormis actionum læsio, & perversio contingit; Ita ut læsio à veneno partim ad corpus, partim ad actiones ejusdem pertineat: Quas læsiones communiter à qualitate quadam maligna, & toto genere deleteria, oriri ajunt, contra quos tamen disputat Johannes Marcus Marci à Kronland. in *Philosoph. Vet. Restit. Part. IV. Sect. 3. pag. 431.*

§. 5. Hujusmodi veneni operationes & operandi modos deprehendimus inprimis in morsibus venenatorum animalium, quando præter rationem partis affectæ, & læsionis continui modum, supervenit symptomatum miserandorum & horrendorum cohors, hinc certum imminens vitæ periculum, cum morbi acumine seu brevitate, ut sunt; totius corporis tremor, item exhorrescentiæ, syncope levissimo vulnere, remota licet in parte, superveniens; sudor frigidus syncopticus, corporis intumescencia, maculæ & livores hinc inde erumpentes, quæ pro varietate mordentis etiam variant: in genere tamen vulnere tali ut tali nullo modo per se coherere possunt, sed omnino *τὸ θανάτου* Hippocratis hujusmodi læsionibus inesse videtur. Non sufficit autem, ut à venenato habito vul-

[Mmm 3]

gò ani-

gò animali contingat læsio; nam & venenatum citrà veneni sui vim lædere, & contrà non venenatum plagam venenosam infligere potest, pro alio atque alio, in quo consistunt, statu. Hujusmodi porro crudelia symptomata (de quibus postea, ubi de signis) cum præsentaneo vitæ periculo, cujus linea ultima imminet, nisi celeri manu feratur auxilium, conjuncta, quæ morsum viperæ insequuntur, aperte ostendunt, à posteriori licet, venenum & hujus lethiferam vim conjunctam esse cum isto morsu. Unde tutissima quoque curatio per alexipharmaca, seu communia, seu appropriata, experientiâ duce inventa, instituitur, seu intus assumpta, sudoris beneficio, naturæ conatum juvent, expellendo, seu foris admota eandem levent attrahendo.

§. 6. Sunt equidem nonnulli, qui morsum viperæ licet vel atrocissimum venenatum negant, sed omnem supervenientem symptomatum syndromentum ex acutie, & summo dentis lædentis acumine, ejusque relictis spiculis, & tenuis biliosi liquoris sociatione, tum ex partis læsæ nervosa compositione, oriri volunt. Non secus ac ex aciculæ punctura in partibus nervosis nonnunquam superveniat mors: vid. Bartholinus de angina Puerorum *p. 111. & 112.* & D. Pauli Digressio de Febr. malignis *p. 45.* Hildanus *Cent. V. obs. 11.* Sed utut hæc sese recte habeant, non tamen omnem absolvunt paginam: multum facit acumen dentis, unde sine eo invalidæ sunt viperæ, demonstrante hoc Zwelff. & Severino: multum quoque pars læsa, ut majora sequantur symptomata: liquor etiam effusus maximè est ponderandus, & in hoc ipso id, quod venenatum reddit vulnus, cæteris paribus residere existimo, cum in minima quantitate maxima ejus sit vis. Cur enim hujusmodi morsus maculæ & livores, & intumescencia corporis, cur horrendæ lipothymix & cordis anxietates sequerentur, alias in similibus non obviæ læsionibus? cur in partibus carnosissimis eadem adessent Symptomata; Cur applicata externè alexipharmaca, & proprio ex subjecto, & etiam ex alieno, item volucres, attrahendo relevarent agrum? Cur interna alexipharmaca curarent maximè, si ab omni venenatæ læsionis suspitione esset liber viperæ morsus? cur denique tam brevis relictæ sit vitæ usura demorsis? taceo hic suctionem partis læsæ cum ore accelerare mortem, promovendo venenum ad interiora ex Amato, licet rejiciatur hæc hypothesis à M. Severino de Viperæ Pythia. *Part. II. cap. 8. p. 36.* Cujus exsuctionis veritatem vide apud Lynceum loco *sup. citat. p. 778.* Cur denique aliorum animalium vulnera levia, ob veneni tamen quandam labem sunt lethalia? ut infra pate-

bit. Perplacent ergo mihi Serinerti verba *lib. V. Prax. Part. II. cap. 21. Vulnera à venenatorum morfibz vel ictibus illata plus nocent vi venenata, quam vulnere, quæ per se plerumque non sunt magni momenti.* Concluserunt ergò veteres, viperam esse venenatam, sed quæsitum ulterius, cur sint venenatæ? dixere, quia earum licet exiguus morsus sit lethalis, idquè propter venositatem animalis, & ita vitiosum commiserunt circulum; quem ut effugerent tandem, responderunt, vim inesse ipsis peculiarem, toto genere præter naturam, & uno verbo occultam. Sed hoc ipso dixere, se ignorare istam vim venenosam, quæ ipsis occulta; quod namque occultum est, hoc ignoro. Pergendum ergò jam ulterius & ad naturam veneni viperini, ejusque per morsum communicationem est progrediendum.

PUNCTUM II.

Autorum de veneni viperini sententiam perpendit.

§. 1.

Viperam ejusque inprimis morsum, maximè esse formidandum, ob veneni noxam, experientia edocti statuere veteres. Cæterum & eandem viperam insigniter prodesse ad profligandas multorum morborum phalanges, eadem ipsos informavit experientia: Sic vinum, in quo suffocata viperæ, præsentissimum ad horrendam Elephantiam Græcorum, seu lepram Arabum, esse Alexipharmacum, demonstrat Galenus *lib. VI. Coment. Aphorism. 47.* Quas tamen historias in dubium vocare videtur Poterius, contraria experientia fretus *Cent. 3. obs. 81.* Et musto, in quo similiter extincta vipera, spontaneo nisu, talis æger non tantum perfectè curatus sed præterea quoque omnino in juventutem quasi restitutus fuit, exutis crinibus unguibus & pelle, hisquè omnino renovatis, referente Aretæo *lib. II. de Sign. & Caus. diuturn. morb. cap. ult.* quarum historiarum explicationem vide in Zacuto Lusitan. *lib. VI. Medic. Princ. Histor. II.* Unde etiam à Galeni antecessore, Andromacho, theriacz tanquam basis fuere immisti ex viperis parati trochisci. Cæterum cum deficeret ratio, propter quam tam perniciosum venenum, & rursus adeo salutare pharmacum, consisterent in eodem subjecto, res tandem eò pervenit, ut dixerint, non totam viperam esse venenatam, sed tantum quasdam ejusdem partes. Has recenset Bald. Angel. Abbatius de Viperæ. *Cap. IV. V. & VI.* & ait, esse dentes, gingivas & vesicam felleam: in dentibus quidem venenum esse à natura, inde manifestum, ait, quoniam ab iisdem dentibus viperæ jam dudum mortuæ, si quis tangatur, lethale est.

Quare

quare hac in parte, & mortua & viva, semper apta nata est ad lædendum; in gingivis porro, & vesiculis earum esse collectum venenum exusu & cibo venenatorum animalium, attractum à vesica fellea, vagum & spirituosum, translatum ad gutturis partes, tanquam in sentinam deponi à natura, & facultate viperea perfici. Hanc autem fellis virulentiam toto capite V. probat ex eo, quod impositum fel ictui viperino, venenum à viperæ ictu projectum, similitudinis ratione attrahat.

§. 2. Hæc veterum fuere asserta, ab Abbatio explicata, quæ ex parte vera esse certâ ratione, dummodo legitime explicentur, inferius patebit. Merentur interim examen: Videntur enim omnino ex nudâ, eaque falsa, hypothesi oriri: observarunt scilicet Veteres, morsu tantum lædere viperas venenosæ, hinc dentes esse venenatos conclusere, cumque præterea vesiculas observarint in gingivis, easque liquore quodam plenas, confirmati ulterius in sua opinione, & hunc venenatum statuerunt, cum ex fellis deriveretur vesicâ, affirmantes, felleum liquorem, pessimum corporis in quocunque animali virus. Sed superiores restant difficultates; si tam pretiosius pro vita humana & conservanda & prolongandâ est recondit⁹ balsamus in viperis, unde hæc earum venenositas in dentib⁹? in liquore felleo? & in vesiculis gingivarum? in quo consistit hoc ipsum venenum? Hinc qua ratione dentes sint venenati, omnino probandum, & explicandum fuisset, non ex nudo effectu, morsu venenato, de dentium malignitate judicandum: ad hæc etiam post mortem lædere posse ex se & venenosa sua vi, quam dicti modo Autores illis attribuunt, vana est mentis persuasio, cum nulla vera huius rei unquam observata sit experientia; & licet exemplum, quod mortuæ viperæ dentis tactus sit lethalis, habeat J. C. Claudinus de Ingressu ad infirmos, huic tamen & etiam Abbatio abunde satisfacit doctissimus Severinus, & ratione & experimento confirmatus, de viperâ Pythia cap. 8. Part. II. p. 359. & 360. inter alia inquit: *Viperæ aut dens integer, comminutus & uti libuerit voratus, ne dum non lethiferus, sed neque detrimentosus experimento comprobabitur tibi, seu nuper mortuæ denticulus, seu vivæ, seu dum digitis tribus continetur coercitus anguis capite, in animantis cuiuspiam carnem, tum ipsius operam per vinum adactus, seu per arbitrium vipere fuerit defixus, quod duplex nos experimentum in pullo Gallinaceo fecimus.* Quod vesiculas attinet sub dentibus; ex Ambrosii Anatomica observatione constat, quod viperæ præter 34. dentes maxillarum (48. numerant Hodiernus & Spontonus) habeant

quatuor caninos, imprimis formellæ; semper tamen duos tantum se observasse ait Locatelli *Theatr. Arcanor. p. 263.* Qui conspiciuntur perforati, & vesicula liquore plena muniti, quod tamen de duobus tantum asseritur à quibusdam (& in specie inter hos quodam medio) quæ novo quotidie repletur humore, dum primus in ictu consumtus fuerit. Ad has dentium vesiculas ex corde & hepate venæ seu arteriæ ascendentes deferunt hunc liquorem: Videatur Jonstonus lib. 1. *Histor. Nat. de Serpentinibus Tit. II. cap. I.* Sed hanc ipsam Ambrosii, & antecedentem Abbatii sententiam, licet nec autopliam confirmare, neque rationem ullam comprobare ostendat Veslingius, describens Anatomicen viperæ, Marco A. Severino Part. I. cap. 12. p. 234. Horum tamen effatum sub Plinii defensione confirmatur à J. B. Hodierno in descriptione dentis viperini ad Severinum missâ pag. hujus 258. qui observavit vesicam felleam hepati colligatam in mediam propè caudam propagari, atque istius filamenta quadam mirâ subtilitate per spinam ad os perducere, & virus per ejusmodi filamenta, quasi per venulas, ad dentis cavitatem perducere; ubi dentium harum accurata structura eleganter describitur: cuius brevem quasi summam dat Veslingius in sua *Anatomicæ Viperæ*, dicens, *quod recondantur intra laxas veluti vaginas, liquore felleo plenas, ex quibus ad libitum ferè celerimè efferuntur. Ilos lethale discrimen & perniciem asferre demorsis, tenuique fistula, veluti scorpionum aculei, perforatos infundere venenum tam experientie censurâ, quam Autorum scriptis, seriò confirmatum est.* Sed salivalem hunc in & propè dentes humorem per se consideratum, experientia edoctus similiter ab omni veneni suspitione liberat Severinus p. 360. vidit nempe Johannem Branchinum, Theriacopæum Senensem virosum hunc liquorem de viperæ viventis dente collectum, nihil exinde noxæ perpeßum, qui retulit, & de gingiva viperæ mortuæ viventis ore ventriculo captatum, alii præter se nulli ex aqua vel vino potatum nocuisse: nec succum hunc gallo gallinaceo immissum in os quicquam nocuisse: nec famulo super manu perpuncta virus hoc infricatum aliquid noxarum intulisse: & licet ex fellis vesicula oriatur, cum vesicæ felleæ non sit venenatus liquor, nec hic exinde ortus erit malignus, probat hoc meum assertum Zwelferus *Animadvers. in Pharmacop. August. Class. XII. p. 211.* Qui in his partibus nullam unquam deprehendit malignitatem, & abscissa capita, vesiculas felleas, & caudas, earundem alia carne obvolutas felibus & canibus devoranda objecerit,

cerit, qui hæc ipsa sine ullo vitæ discrimine consumsere, videatur Boyle *Experiment. Philosoph. Experiment. II. p. 58.* item Bartholnus *de Angina puerorum p. 111.* refert: capita resecta canes devorant nulla mortis mulcta, & si humorem suspectum ex capite demortuo promas, innoxium senties, & *p. 113.* aliis vesicula fellea est suspecta, quæ tamen canibus in alimentum cedit; quam ipsam potius ceu ad quælibet venena antidotum deprædicat Borellus *Cent. IV. Obs. 19.* & certa observationis fide comperit Severinus *parte II. cap. I. p. 288.* quod pulli gallinacci stomacho immissum fel nil offecerit. Præterea si vipera integra in vino extincta leprosos restituit, & foeminæ Anglicæ tali vino pro cosmetico utantur, teste Zwelfero, *eodem loco*; si totæ vipera in retortam immisæ cum capite & cauda, dent saluberrimum sal volatile, ubieorum erit fellea malignitas? obijciunt quidem venenatis vesci alimentis viperas, hinc venena hæc secerni in fellis vesicam, salutes verò partes in succum & sanguinem converti. Sed ut taceam, merum esse effugium, nulla ratione stipatum, hujusmodi animalia venenosa, cur non eodem veneno in digestionum officinis afficiunt partes? cur non inquinant sanguinis vim alexipharmacam, antequam in vesicam colligantur biliaria? item unde petenda origo virtutum alexipharmacarum, si venenatis vescuntur bestiis? Præterea & anates bufonibus & ranis delectantur venenatis; sicut ciconiæ similibus ranis, serpentibus, bufonibus, aliisque toxicatis animalculis (unde hæc aves per putrefactionem in similia denuò reviviscunt animalia, non secus atque ex indusiis humanis fiunt pediculi, ex spermate & sanguine humano fiunt muscæ & pediculi, ex pane & melle fiunt formicæ, ex Basilicone & fracedine lapidis scorpiones &c. videatur Helmontius *de Potestate medicaminum §. 37.* quale Scorpionis ex ocymo exemplum observavit Magnus D. D. Michaëlis,) tantum tamen abest, ut venena colligant, ut potius efficacissima exhibeant alexipharmaca; hinc Theophrasti Paracelsi arcanum ad quævis veneni genera ex sanguine Ciconiæ notissimum est, videatur de hoc Crollius *in sua Basilica Chymica p. 450.* cujus felicissimum effectum in Principe refert Hartmannus *Comment. in citat. loc. p. 252.*

§. 3. Nec quicquam obtinet Abbatius ex eo, quod venenum attrahat denuò fel impositum; nam aliæ viperarum partes similiter impositæ idem præstant: ad hæc columbæ vel gallinæ vivæ dissectæ, calentes adhuc morsui impositæ, virus extrahunt, quæ tamen ab omni veneni exemptæ sunt suspicione: non secus ac pulli gallinacci vel columbini, circa

anum deplumati, buboni pestilenti applicantur; extrahunt namque tam fortiter venenum, ut ipsi etiam cum salute ægri moriantur: Quod ipsum quoque præstat stercus humanum bufonibus pestilentialibus applicatum, sicut Saaer *in seinen Ost-Indianischen Kriegs-Diensten* refert, esse in Indiæ Orientalis Insula quadam, ex Insulis Celebes, arborem quandam vel levissima læsione summè venenatam, cujus venenata plaga alio non possit curari modo, nisi proprio subito excreto stercore, eoque calido affecto loco applicato: qualem vim alexipharmacam assumptum idem stercus habet contra animal lacertiforme, Guarid dictum in India Occidentali, teste Zacuto Lusitano *lib. 3. Prax. admirand. Observ. 93. p. 117.* tandem & passerès vivi circa ventrem deplumati, & parotidibus malignis impositi, attrahendo venenum, moriuntur. Sed hæc omnia licet venenum attrahant, non tamen sunt venenata. Quod ergò humorem in vesiculis dentium contentum attinet, æstimo eundem per se minime esse venenatum, ut supra ostendi, non magis quam alias viperarum partes, sed arbitror potius, eundem respondere salivæ in faucibus aliorum animalium obviæ; de cuius usu non est, ut sim sollicitus, primario inservit præparationi ciborum in ore, ut subacti melius, & volatili hoc liquore imprægnati, facilius in stomacho deponant suum succum nutritium, & si quid insit iisdem venenati, à sale volatili alexipharmaco subjugetur & corrigatur; quod autem copioso constet sale insigniter volatilifato, tum aliis quoque partibus spirituosis aquæ copiosæ nexu copulatis, sicque in consistentiam quandam redactis, nemo dubitet, qui ingentem harum partium copiam, in destillatione viperarum prodeuntem perpendit, simulque analogiam, cum saliva proprie sic dicta, & usum in alimentis præparandis; ut taceam facilem huius liquoris in iracundis viperis effervescentiam, de qua inferius erit dicendi locus. Ast licet vipera nihil mandat, sed omnia transvoret integra, nudas nidorum præpetes, aves plumosas, lacertas, mures, ranas, bufones, quæ exsiccata diu, nil comminuta reddidit, per membrum sui secessus, ut Autor est Severinus *part. I. cap. 7. §. 5. p. 104.* Attamen cum dentium copiosum habeat numerum, osque saliva madens, cum eodem Severino dico, dentes minutulos, & sub maxilla latentes ei usui destinatos, ut perpungant tantummodo solidiores escas, atque has fermento suo peracri tabefaciant probe, præsertim quod exserti quidem natura, verum gingivis obducti dentes, cum alimenta conterunt, sic virus è vesiculis exprimunt. Abutitur tamen hoc liquore vipera, dum per fistulosum den-

tem,

tem, simul ejiciendo, maximum toxici fit subiectum.

§. 4. Pervenio nunc ad doctissimum Marcum Aurelium Severinum, qui tantâ viperam Pythiam pertractavit sedulitate, ut nil deesse videatur; unde etiam sententiam ejus intime fovet Kircherus in Mundo Subterraneo, ubiquasi compendium continetur eorum, quæ fufius suo tractatu toto pertractat Severinus: Hic ergo in eo est totus, ut viperæ naturam totam esse alexiteriam defendat; venenum verò quod attinet ejus, hoc non agnoscit proprium aut intrinsec⁹ concretum, verum adscititium, & aliunde irrepere confectum, quod pluribus in locis viperæ veneno, & venenandi vi careant, sed immutentur tantum occasionibus locorum, cœli, victuum, &c. ut etiamsi viperæ sit plurimum veneni, tamen adscititia sit affectio, & materiam quidem veneni esse peracrem & biliosum sanguinem, qui à virulentis escis proficiscatur, bestiolis nempe sulphureis, quæ sunt scorpiones, bubrestes, aranei, bufones, &c. ex quibus paratum chylum lava cordis fornax mitis modis reddat retorridum & fumidum. Ex quo loco sursum arteriæ sanguinem spiritualem devehant, ad retiformen plexum in ventriculis cerebri, à quo plenius hic spiritus vitalis elaboratus reddatur animalis, & à cerebri fumosi arteriis extenuatus adducatur ad summam Pyrosin, qui succus spirituosus, quem ore ac dentibus recipiat viperæ, venenum à vulgo æstimatum, venenum reverà non sit, sed tributum ob id viperis, ut tot sensuum viriumquæ bonis gauderet agrestis fera: hunc porro succum cum morsu dentis conjunctum reddere vulnus malignum & inficere hominem, ita ut definiat infecturam, actum feræ, defigentis in aliud animal dentem, & inde virus emittentis, pro sui ipsi tuitione: ut nec dens per se, nec liquor hic plagam inferat venenatam, sed utrumque simul. Non adeo absorta est hæc Severini sententia, quam ob id quoque amplexus est Kircherus: & modo attendatur fermentatio- nis, vel effervescentiæ ratio in viperæ lacerata, quam inculcat Kircherus, Severinus verò hinc inde parvam facit mentionem, nil culpabile videtur in hoc ejus dogmate, hoc saltem videtur incongruum, quod veneni materiam liquoremque virosum statuerit talem, qui ad vigorem & alacritatem viperæ, adeoque ad ejus actiones & usus, vel maximè sit necessarius: cum probabilius videatur, esse saltem salivam in particulares collectam assertamque usus: qua abutatur postea viperæ irata in perniciem humanam; & cum ob istum nobilem usum communis sit omnibus viperis, cur non omnes viperæ ubique erunt venenatæ? quæ Severini est assertio; nam victus

Tom. II. Pars 2.

ratio, locique mutatio non omne absolvit punctum, cum ciconiæ nullo modo sint venenatæ, sed potius alexiteriæ; cum denique originem hujus liquoris derivet ex cerebro, in cujus elaboretur plexu, adductus eò per assertum Johannis Trollii pag. 289. Non video, quid respondere possit Hodierno, qui avtopsia similiter fultus, ex fellis vesica derivat ductus veneniferos. Tandem & cauda quibuscumque est suspecta, unde in medicamentis ex viperis parandis abjicitur: Sed nulla similiter ratione, Marco Aurelio Severino innocentiam caudæ satis demonstrante *Part. II. cap. 1. q. 284.* Sed his relictis ad alia pergo.

PUNCTUM III.

Viperam mortuam nullo modo esse venenatam affirmat.

§. 1.

Aliorum perlustratis opinionibus, propius ad scopum accedam, necesse est: considerandæ autem sunt viperæ, sicut & reliqua omnia animalia dicta venenata, in duplici statu, & quando vivunt, & quando sunt mortuæ. Mortuas viperas ab omni veneni labe absolvo, & potius esse divinas in iisdem medicas opes, quas vix in alia reperias creatura, statuo. Docet hoc ipsum experientia, veritatis magistra, quæ nullum suggerit fide dignum exemplum, ex viperæ reverà mortua quocunque modo usurpata, veneni noxam cuidam esse inflictam; notandum hinc venit Heliontii Adagium, *Tractat. de Ideis morb. §. 34. Morta la bestia, morto il veneno*; cui fortasse Germanicum illud respondet, *ein todtter Hund beißt nicht*; unde nec pulli gallinacci à viperæ commorfi mactati, & esitati postea, lethales sunt, sed quartanam potius, Medicorum alterum scandalum, feliciter profligant, teste Severino p. 366. & Bartholino 110. Mitto jam superius enarrata exempla, aliquot saltem adhuc adnotasse sufficiat. Quas vires habeat per retortam artificiosè propulsus spiritus cum Θ c volatili ad febres malignas & pestilentes, insultus epilepticos, scabies leprosas, aliosque malignos affectus, quotidiana loquitur experientia; & quia spiritus fere, omne quod agit, agit ratione Θ lis volatilis, de hoc sciendum, quod omnia encomia, stupendæque dotes, quas veteres adscripserunt suo Θ i theriacali, nostro omnino convenient salvi volatili, non verò earum fixo, per tam fortem calcinationem parato, cujus aut nullam aut minimam in se continent quantitatem viperæ, non secus ac alia animalia. Fixari equidem etiam solet per artem, sed si hoc contingat per acida, est potius enecatio Θ lium volatiliū, quam vera

[Nnn]

eorum

eorum correctio: Acida namque omnia, effervescendo & precipitando immutant Θ ia volatilia, unde non possunt non diversas postmodum edere operationes; manent enim invicem adeo postmodum juncta, ut vix nisi beneficio cuiusdam Θ is alcali fixi, cum quo libentius inire solet conjugium acidum, quam cum volatili, denuo separari queant. Noviter inventus est modus in Italia, sine huiusmodi per acida destructione figenda Θ ia volatilia viperina, modumque callent non tantum D. D. Tackenius, cuius recentissime editus vid. Hippocrates Chymicus, qui novissimi viperini Θ is antiqua fundamenta ostendit, sed præterea quoque Antonius de Sgobbis Pharmacopœus Venetus sub signo Struthii, cuius hæc sunt verba: *Dipoi per mezzo del loro proprio menstruo, cordiale & aleffisfarmaco acqueo (accio vedano, che non sia questo menstruo imbevuto, d'altra facultà Θ ina,) hoc cavato il vero Θ e fissò viperino, ch'è una gioia pretiosa, per salute humana: & novissime alius nomine Harras Venetiis ita fixare novit hæc salia volatilia viperina, idque sine acido, ut etiam per chartam tuto hinc inde transportari possint. Est ergo verus reconditus balsamus in viperis, eorumque Θ e volatili, qui totius corporis renovat œconomiam, fermenta viscerum effœta jam renovat, & sanguinis vitalem fermentationem fortiter conservat, & mascule restaurat: hinc est, quod ex viperino vino secuta fere sit elegans rejuvenescentia, quod ex brodio decoctionis viperarum mulier leprosa quadragenaria, sterilis antea, post curatam lepram facta fuerit fœcunda, teste Helidæo Paduano in Curationibus pag. 294. à Magistro Joh. Wittich. editis; non secus ac galli gallinæque viperis nutritæ, docente Zwelfero, *Animad. Class.* 12. admodum fiant fœcundæ, quæ animalcula postmodum viperinas vires possidentia, esu, ad eadem conferunt mala, ad quæ ipsæ viperæ, in specie ad elephantiasin, & ipsi cognata mala, scabiem fœdam, luem Veneream, &c. tum ad fœcunditatem, vitæ prolongationem, corporis nitorem, & oculorum claritatem conciliandam: de quibus vide Joh. Fab. Lyncei expositionem in Rehum pag. 780. Ad hæc itidem valent partes atque essentia viperinæ, secundum artem paratæ; siquidem Magnif. D. D. Michaëlis Essentia sua viperina luem Gallicam aliquando curavit tam prospero effectu, ut ægro hinc sanato, cuticula ex universa decideret cute, strigmentorum facie, instar serpentum exuvias suas exuentium. Sed pagina deficeret, si omnia proponere vellem.*

§. 2. Quod partes in specie viperarum attinet; eas in mortuis omni veneni carcere

suspensione, multa illustria ostendunt exempla. De regio cordis viscere ut incipiam, quinque corda exsiccata una vice assumpta tantum valuerim Juvene quodam, ut nullum amplius ipsi nocere potuerit venenum, serpentes nullos timuerit, quin potius eos amaverit, & semper tractare voluerit. Hos verò cum admodum timuisse Autor est Joh. Fabr. Linceus *loc. citat. pag. 786.* Ex corde & hepate viperino egregium & pulverem & aquam bezoardicam animalemparare docet Zwelferus *pag. 213.* Intestina exsiccata, & in pulverem trita, admodum commendat Hartmannus *Comment. in Crollium p. 456.* ad omnis generis affectus epidemicos majorum & minorum animalium, inprimis ovium & equorum. Sed cur non & hominibus inprimis in intestinorum affectibus prosint? cum hepata viperina pulverisata sint sane præsentissimum remedium in dysenteriiis, præprimis epidemicè grassantibus. Fellis viperini exsiccati gr. j. ab omnibus venenis liberare, ait Borellus *Cent. IV, obs. 19.* Spina exindeque paratus pulvis, aut secundum quosdam magisterium, ad eosdem profunt usus Medicos, ad quos caro: non est ergo, ut caudam ob constitutionem ossicam, sicut facit Abbatius, formidemus, cum præterea eadem cauda vel nudo contactu tollere odontalgiam dicatur, caput verò appensum ad febrium arcendos paroxysmos laudetur: quale ergo in his reconditum erit venenum? firma potius manet mea assertio, post mortem viperas non esse venenosas: ex quo notanter elicio, venenum viperarum, si quod habent, non consistere in quodam principio materiali, post mortem residuo, sed in quodam intentionali, vel certe tali, quod pereunte vita, & ipsum esse desinat.

§. 3. Confirmat me in hoc ulterius consideratio reliquorum animalium venenatorum, quæ cum in vivis esse desinunt, & innoxie tractantur & intra corpus assumuntur. Apparet hoc vel maxime in bufone, animali pleno veneno, ut non immerito terrestris toxici & contagiosæ virulentia bursa magnetica dici possit, loquente sic eleganter Kircherus in *Scrutinio Pestis pag. 341.* Tanto in hominem odio est, ut suspensus & verberatus ab eo præ nimia in illum rabie moriatur: unde ipsi, inprimis in terrorem actus, quacunque potest ratione, insidiatur; nunc labiis scabris eundem fortiter mordendo, nunc habitu virulento, saliva venenata, lotio vè toxicato in dissitum à se hominem evibrando; vel herbas saltim inquinando, aliave corpora inficiendo, quibus mediantibus noceat homini: videatur Kircherus *cit. loc. pag. 342. & 207.* Scennertus *lib. VI. Prax. Part. VIII. c. 22 p. 345. 346.* Jonstonus *Historia de quadrupedibus*

edibus lib. IV. tom. I. cap. 1. pag. 188. Sed neca bestiam, & liber eris ab ejus veneno. Conusum externum ad anginam pestiferam ne luum commendo, sive sub propria forma cum vel sine aceto applicentur bubonibus, tumoribus pestilentialibus, sive sub troscorum facie, ex vermiculis vomitu ejus & ipsa substantia bufonum tragacanthi beneficio paratis, de quibus Helmontius in amulo pestis, aliique passim Autores, in primis Crollius in sua Basilica, & Hildanus suis Centuriis, sed quoad usum internum, ex eorum cineribus calcinatis extractum interne ʒss. ad ʒj. pondere in ☿ Carduibenedicti usurpatum, ad omnem pestem è massa sananea eliminandam, eamque ab omnibus venenis vindicandam, mirifice commendat J. Faber *Panchym. lib. V. cap. 8. p. 631, libro primo Myrothec. cap. 24,* & tantam egregia sudorifera animalia extollit. *Θ* um bufonum & aranearum Glauberus *ruor. Philosoph. P. 3. c. 22. pag. 177,* vel repetur saltem bufonis exsiccati pulvis ad & habebis experimentum ad hydropisiquas educendas certissimum, teste Wic-
in Obs. Petrar. Nosol. Part. I. Dissertat. hydrop. Hartmanno in Croll. p. 420. in usum similiter vel externa solum ad re-applicatione præstat. Borellus quoque ones innoxie voratos refert *Cent. IV. Obs. & Cent. II. obs. 37.* Pergo ad scorpi-
ctijus aculeum in caudæ extremitate mentem lethale vulnus ob veneni pernium vim inferre constat: sed mortuus pio, magnus licet, non tantum cum u gelidæ in os citra noxam illapsus fuit F. Lynceo *pag. 781,* sed præterea hic audâ, ex scorpione viva abscissa, sponvulneravit, sine ulla noxa: sic devoracorpionum offam à circulatoribus plus lvidit Baccius sine vitæ detrimento; & chinus referente Severino *pag. 366.* Nec um est, quod egregiè valeat ad cienurinam, & provocandum lotium supm, non externa solum sub olei specie atio, sed interna quoque pulveris, vel ati, vel solum exsiccati, assumptio. Arasle venenatas, sed non omnes, com-erasserunt: ego interim telarias vene-esse arbitror, tum quia eorum oleum is resistit externo illitu ad modum alio-
enenatorum animalium, tum etiam, morsu vel potius ictu lædant, non condis insequentibus symptomatis: si-
ranææ morsu epilepsiam suscitaram re-muth *Cent. III. Obs. 35.* Et ex ara-
n morsu duos mortuos Panarolus *I. Obs. 45. p. 27.* Nec minus calidos is, in quos incidunt, venenoso con-quinant, teste eodem Salmuth. *Cent. om. II. Pars 2.*

II. Obs. 22. Sennerto *lib. 6. Prax. p. 348,* & prava ex deglutita aranea Symptomata vid. Salmuth. *Cent. II. Obs. 48,* Borellus *Cent. III. Obs. 19.* Sed telæ non solum interne ad sedandos intermittentium febrium æstus usurpantur, sed ipsæ quoque aranea mortuæ exsiccatæ, & pulverisatæ, ad similem usum non sine successu propinasse rusticum quendam, certò constat. Multos præterea esse serpentes venenatos, qui mortui pretiosissimadant pharmaca, cum vita exurâ omni veneni labe, notissimum est, & serpentes innoxie vorari, & in cibis usurpari cum sanitatis commodo, videatur Borellus *Cent. IV. Obs. 1. 65. & II. Obs. 37.* Quidam quoque serpentem pro anguilla comedit, nil mali inde perpeffus: sed cum cognovisset postmodum fuisse viperam, ex phantasia in morbum illapsus obiit, Libavius *Alchimia Pharm. 12.* Zwelferus *p. 273.* Similem imaginationis vim vide apud Salmuth. *Cent. II. Obs. 93.* Ex quibus simile etiam de viperis esse ferendum judicium, omnino existimo.

§. 4. Exclusa tamen hic volo animalia ea quæ peculiaris rabies sub venenatorum redigit classem; cujusmodi sunt canes, feles, lupi, aliaque animalia; hæc enim in statu præternaturali sunt, adeoque venenatis reliquis in statu naturali constitutis nil derogant; nam rabiosa ut in vivis dum sunt, & morsu & saliva etiam nuda inficiunt, ita mortua & esitata similem rabiem inducunt: exempla vide apud Bauhinum *Tractatu de rabie.* Kitcherum, *de Peste, de felle rabiosa comesta pag. 206.* De sue rabie tacta, esitata Borellus *Cent. I. Obs. 75.* Videntur enim mihi hujusmodi animalia laborare quasi febre quadam maligna, cum intània maniaca conjuncta, ex effervescencia massæ sanguineæ à fermento peregrino peculiaribus ideis insignito, oborta. Quod verò hydrophobiam attinet; hæc quidem tanquam inseparabile serè adesse solet symptoma rabiei, utut contrarium referat Salmuth. *Cent. III. Obs. 90.* Non tamen proprium est rabiosis, cum etiam sine rabie, & in specie in febribus malignis citra ullam contagii rabiosi suspicionem, observata sit, testibus Schenckio *lib. VII. Obs. de venenis anim. Sanchez in Obs. p. 378.* Ubi tantus citra ullam animalis rabidi mortum adfuit aquæ timor, ut ne ferre quidem præsentiam ejus, aut manus ablucere potuerit æger, simile exemplum habetur *p. 379,* Salmuth. *Cent. II. Obs. 52.* Animalia ergò rabiosa per morsum, vel etiam per salivam, communicant furibunda quasi fermentum suum febrile, Ideis morbificis Archeum corporis læsi, seu spiritum ejus insitum admodum perturbantibus, insignitum, quod totum corpus in mores quasi brutales transformat: Suntque hu-

jusmodi ideæ in fermento quidem radicaliter, in homine verò affecto non nisi radiative, de quibus vide elegantem Marcum Marci *Phil. Vet. Restit. Part. IV. Sect. III. sub Sectio. I. p. 435.* Cum ergò hujusmodi affectus sit peregrinus ipsis brutis rabiosis, sitque præternaturalis, & à peculiari dependeat fermento, in quod Archeus Ideas suas seminales imprimat, etiam post mortem superstes manere potest, licet sopitum ferè, donec in alio corpore vivente exfufcitatum denovo, similes concitet tragœdias. Sed cum venena aliorum sanorum animalium sint eis naturales quasi dotes, non tamen nisi imaginationis vi traducantur in actum, ut postea demonstrabo, canis rabidi exemplum, hujus puncti veritati nil detrudere valebit.

PUNCTUM IV.

Viperam totam esse Alexiteriam, nec, nisi laceffitam, esse venenatam, aut venenosè quenquam ledere, ostendit.

§. 1.

Viperam mortuam insontem pronunciamus, ex cujus egregiis medendi viribus totam eam alexipharmacam & bezoarticam concludo: nec venenum ejus, quod in morfu percipitur, in quodam materiali consistere assero; quoniam aliàs, & hoc post mortem, semper esset superstes; sed potius in quodam intentionali vel spiritali, à furore concitato: nec tamen vivens per se est venenata, nullibique, teste Severino, duce experientia, obvia ejus est malignitas; quam non nisi laceffita, vel provocata morfu exerit. Unde duplex viperæ perpendendus venit status: unus, quo nullis gravioribus acta affectibus tractabilem se offert, vel saltim nullo lædendi conatu se armat, aut metu, terrorevè acta, fugam quærit; alter quando iræ concitata furore ab externo provocata læsione vindictæ inhiat, & spicula dentata exerit. Priori in statu est innocens, & nulla culpabilis malignitate, nec lædit: posteriori verò truculenta est fera, feros infert morsus. Vino quo maximè delectatur, suffocata licet, loco veneni salutiferas infundit dotes, ut supra dictum: Nec vivens Vipera, stomacho recepta, detrimenti quicquam attulit, sed sine noxa vivens per alvum fuit expulsa, teste Gatinaria de suffocatione matricis: hinc nudos & dormientes non laceffit sponte, quod sibi etiamnum puero sapissimè contigisse perhibet Olaus Magnus: Ad hæc mulieres non paucas viperis insidiis struentes, videre contigit, quæ serpentem hunc manibus libere contrectarent & amicè, dicit Bartholinus de Anginâ puerorum *pag. 111.* In metu posita

omnis quoque malignitatis deprehenditur expers, hinc eos, qui eò audaciæ processerint, ut eas alacriter adeant, non lædunt, sed terrore percussæ fugiunt: indidit namque provida Natura serpentibus metum quendam & timorem, ut homines, qui eos intrepide persequuntur, fugiant, teste experientia Zwelferi *pag. 273.* Unde, eodem Autore, qui serpentes in capite & collo prius arripere ausit, itaque tractare novit, ut in prima invasione mordere non audeant, is sanè postea ad lubitum cum ipsis ludere potest, modo caveat, ne eos ad iram provocet. Sed objicere possis Lector: sub illo statu esse venenatas viperas ac serpentes, licet non lædant suo veneno, aliud nempe esse actum primum, aliud esse actum secundum. Bene: Sed unde quæso probabis hoc tuum assertum? ex absentia enim effectus, quomodo demonstrabis præsentiam causæ? hoc est, ex defectu læsionis venenatæ, unde ostendes venenum, nisi ex præconcepta opinione de Veneno ejusque principio materiali dicere velis, habere in se quoddam venenum, quia sint animalia venenata, hoc est, nisi petere velis principium, & probationis loco substituere id, quod est in quæstione: supra enim probavi, venenum hoc non consistere in quodam materiali, quia non sit superstes in mortuis, aut si forte velis comparare cum veneno animalium rabiosorum, quæro, cur post mortem per carniem esum non similiter fiat activum? potius cum Bartholino dicam: *Ingenue fatebor, minus in vipera recondi veneni, quam vulgo persuasum; de Angina pueror. p. 110.*

§. 2. Idem observare licet in aliis bestiis, venenatis vulgo licet habitis, quæ non laceffitæ, aut ubi metu fuerint percussæ, non lædunt, seu ictu, seu morfu; è contrà non venenata animalia ubi irritata, ex irâ vehementer efferbuerint, ut feles, equi, homines, &c. venenatis non absimiles inferunt plagas: Romæ Scorpiones quidam sine damno deglutivit, prius commode complicatis chelis, caudæque spiculo; in Italia sæpè iidem dormienti accubuerunt, sed non læsi innoxii fuerunt; Bartholin. *Cent. IV. Obs. 95. p. 418.* Rusticum aliquot centena scorpionum vivorum manibus apprehendendo digitisque revolvendo, non aliter quam nummos aureos numerare, vidit Linceus *l. supra citat. p. 781.* Fatuus quidam Patavii araneas omnes obvias devorabat citra noxam; Barthol. *citato loco.* Quod itidem mulieres quasdam fecisse refert Borel. ubi insimul observandum, quod aranea à viro deglutita, sine noxa per duos menses retenta, & mirum in modum aucta fuerit, tandem malignitatis suæ, irritata forsân, prodidit vim, *Cent. III. obs. 19. & IV.*

§ IV. obs. 56. Taceo hic puellam Coloniensem vulgò notam, summo cum appetitu ranas capientem, & devorantem: & quam hic faciliè araneorum diversitatem quis attendere possit, quia etiam lethales hujusmodi araneorum observatæ sint deglutitiones, imen communis aranea, quæ parietes telis æstuit, non sine malignitate est, saltem irritetur, docet D. Pauli Parecbasi de febribus. Vulgaris porrò notitiæ est Historia fulieris, quæ serpentem vivum, mammillis fugentem, per decem menses innoxie genuit: quæ tamen vocatur in dubium à D. Hortio *Epist. Med. Sect. VI.* & Sebizio Jun. cìpionf. in dictum locum. Notandum tamen, quod loco citato refert Horstius de serpente, mulieri dormienti per os in ventriculum descendente ibidemque per aliquot menses morante, & per vomitum tandem expulsa, nulla graviora inferendo symptomata, tam aliæ sordes ventriculo adhærescentes terre solent. Similes prostant Historiæ de fonibus, quorum semina quacunque rane assumpta vivificata sunt in ventriculo, quæ in bufones perfectos adoleverè, sine ulla insigni per vomitum rejectis. Historiæ insigniores vide apud Gruling. *Cent. II. r. 9. p. 9.* Bartholinum *Cent. IV. histor. 19.* A. Severinum *d. viperæ part. I. cap. 11. p.* & similem rationem de omnibus venenatis mantibus valere æstimo: ut placido instans nulla vi venenata sint formidabilia, at si percita fuerint cæstro, vel quovis modo sint perniciosiora. Irritationis tamen enda diversitas, dum nunc ab externa tum læsione & molestia concitantur, nunc interno agitantur stimulo, iis nempe in bruquæ naturalem quandam cum homine habent inimicitiam, ut bufones, serpentes scorpiones, & si quis est, basiliscus, &c. quæ modo aspectu inflata odio iræ effervescentia mescunt, & venenato fermento furoris se insignito inficiunt, quod nunc per contum saltem fit corporalem, nunc verò in insensibilem: Illud morsu, ictuque; hoc per salivam, vel urinam, vel halitum.

PUNCTUM V.

Viperam irritatam & ad iram provocatam concepto furore morsum inferre venenatum declarat.

§. I.

Viperæ animal summe bezoarticum, sit thesaurus alexipharmacus, sit libera ab omni veneno mortua, sit insensibilis non irritata, at tamen insigniter, morsus infert venenosus, brevi lethales. Historias vide plurimas in Schenckio *lib. VII. Obs. de*

Ven. animal. Viperæ iracundiæ cæstro percita, canem ubi morsu sauciaverit, intra decursum aliquot horarum, vel citius, mortem inducet, Zwelferus *p. 212.* & Severinus *p. 365.* inquit: *qui remordebitur canis aut felis, vix hora, pullus verò demorsus, vix tam diuturnum recitabitur angelica salutatio, detinebitur in vita:* hinc Aldrovandus, viperæ collotenus jam pridem exsectæ caput, quod integrum sit, posse demorsum à se animal perdere veneno: cujus rei capto experimento vidit horæ semisse mortuum gallinaceum Severinus *cit. loc.* Simile refert Lynceus *p. 782.* de famulo Pharmacopœi à capite viperæ, jam post tertium diem abscisso, cum manibus apprehendisset, lethaliter morso, ut vix vel efficacissimis thetacialibus curatus fuerit. Nec ignota est Matthioli historia, referentis de rustico à vipera forte secundum caput discissa, pro mortua habita, apprehensa, lethaliter morso, &c. Symptomata denique demorsis ab iracundis viperis supervenientia eandem venenositatem palam testantur, de quibus infra. Mordet ergo per dentes acutissimos, fistulosos, ex quibus ejicitur liquor salivæ; venenatur verò per summam, qua tunc ardet, iracundiam. Dentes isti sunt acutissimi, Authoribus quibusdam quatuor, quibusdam duo, quibusdam medius, quidam inter hos insignior, aduncus & acutus, omnibus tamen sunt fistulosi, ut per eorum canales derivatus liquor salivæ, cum impetu dentium in animali irato inferat lethalem veneni vim. Liquorem hunc simul ejectum vocat virus D. Severinus, innuens eo ipso, ab hoc imprimis dependere virulentiam vulneris: sed in quo virulentia hæc consistat quæritur? dicit in vi liquoris pyrotica, sulphurea & arsenicali, quæ vincatur, tanquam valentiore, calor noster vitalis, Rectè: Sed cur in specie adjumentum dentis requiritur? cur non in vipera mortua est talis? cur etiam ex vivæ ore extractus est insons? hujus ratio ex iracundia animalis petenda, quæ furens Archeus & effervescens saliva similes motus, similesque ideas, per morsum inferunt morso. Ut ita formaliter vipera sit venenata, quatenus est irata, & infert morsus venenatos, quatenus ab irato infligitur animali.

§. 2. Iræ ergo quam maxima hic pensanda natura, quæ vix validior, nisi amoris excipere velis vim, reperitur affectus. Considerandus hic & impetus animi, & sanguinis reliquorumque humorum motus. Impetus animi vehementissimus furibundusque ex præsentia mali maxime infesti concitatur, ad quod amovendum tota insurgit natura, eademque omni conatu amovere à se repetat; objectum enim odiosum per suam speciem

ciem movet animæ vim cognoscentem, per sensuum organa operantem, quæ ex ejus inconvenientia & odiosa præsentia permota abhorret eandem, & amoliri à se conatur, urgente hoc, se conservandi, omnibus innata concupiscentia, & hic actus iræ nomine vocari solet. Ex hoc ipso horroris actu nascitur species, ut sic dicam irascibilis, & Idea amovendi, & propulsandi molestum, quæ non tantum recipitur in memoria & asservatur, sed etiam totius corporis partibus fluidis, imprimis sanguini, spiritibus mediantibus confusè, in specie verò membro cuidam, cui molestiam propulsandi munus committitur, distinctè imprimitur, & insculpitur: adeoque in viperis hoc animi impetu permotis, species hæc idealis, ut totius corporis ergastulo, ita in specie ori ejusque partibus, & maximè dentibus imprimitur percussoribus, simulque liquor salivæ in eorum confiniis asservatus, pingitur hac ipsa furoris impressa idea. Rem ita circa affectus se habere, præter auctoritatem Helmontii, Marci Marci, Zwelferi & aliorum modernorum, testantur permulta quotidie in medico foro obvia: Cruor Tauri potantem strangulat, non cruor bovis aut vaccæ, idque propter tauri furorem, cum cupidine vindictæ morientis: Canis rabidus vel vivens, per salivam & morsum, vel mortuus per esum, læsos transformat in mores caninos, felis rabida in mores felinos; non secus ac nuperrime in oppido vicino Torgavia mulier maniaca, & quidem, ut putabatur, ex Philtro, lictorem, in custodiam se abducentem, mordendo propè axillas in similem conjecit calamitatem, ut postero die similiter ac ipsa fureret, muliere meliusculè sese habente: Sic felis sanguis haustus à puella, eam in mores felinis similes transformavit: Osiculus certum bufonis cum tremore scilicet & terrore, ut ut conjuncto aliquantisper furore, morientis, mederi vel nudo contactu odontalgia, certo experimento novi: (hinc catholicum anodynum ex bufonibus parari posse, experientia quorundam celebriorum constat Medicorum) prodest idem ad epilepsiam infantum, ex nutricum imprimis immoderatis affectibus oriundam, ut & ad Paroxysmos febriles: bufo exsiccatus & applicatus quæcunque hæmorrhagiam, ex interna sanguinis ebullitione & effervescencia ortam, certissimè sistit: sanguis leporis, pavidissimi animalis, curat erysipelas & dysenteriam: pellis caudæ, lepori vivo detracta, ceu amuletum, idem curat erysipelas; admotæ verò omnes sanat ambustiones: sanguis asini, torpidi illius bruti, post aures collectus, maniacas coercere & placare nemo dubitet: rasura cornu tauri, in coitus ardore abrasa, mire armat in Venerem;

quod alias non facit: Cerebrum passeris, in veneris actu transfossi, potentius longe stimulat eandem, quam si nudè interficiatur alio tempore: filum, quo strangulata vipera, medetur angina: mores nutricum bibuntur cum lacte earum à tenellis infantibus; sicut infans à caprâ nutritus, caprinos miris saltibus, & variis petulantis, imitatus est gestus: terror, anxietas, & tremor, paventibus Podagricis suam curant podagram: terror, tremor, ira, lapsus cerasi in Corpus, visio capitis à lano per medium fissi, &c. simili modo signant foetum: & alia hujus farinae exempla plurima vagantur obvia. Hinc optimè acutissimus Marcus Marci *non parum referre, in qua dispositione animalia moriantur, quorum partes ad usum medicum queruntur, dicit.*

§. 3. Sed has & similes operationes, per species quasdam intentionales, recentioribus Ideæ dictas, ex quarum directione tanquam in speculo, quid agendum, cognoscat natura, peragi, paucis ostendam, dum harum in omnibus viventibus præsentia & directrix vis, ex veterum imprimis Philosophia, observare detur. Agentia sunt diversorum generum in rerum natura, præ cæteris observanda viventia, quæ varias edunt operationes, tam vegetabilia, quam bruta & homines. Horum omnium ortus, processus & interitus, variis mutationibus, iisque naturalibus, ut est subjectus, ita ab interno agente perfici assolet: Sed cum huic variæ incumbant operationes, necesse est, ut certò modò determinetur, ut operetur hoc, ut operetur istud, ne fiat confusio, quam abhorret natura. Hoc verò quod determinat in agendo, sunt species intentionales dictæ Veterib⁹, recentioribus Ideæ: Hæ dum determinant hominem in ratiocinando, dicuntur intelligibiles; dum bruta in sentiendo, sensuales; in actionibus per appetitum motis, appetibiles; dum omnia viventia in actionibus vitalibus, naturales. Sic cicuta per Ideas proprias crescit, adolescit, & assumpta nos in anseres, anates & mergos quasi transmutat: Canis operatur in actionibus propriis, per proprias Ideas, quæ à rabioso nobis communicatæ, nos ferè in canes transformant, aut certe ad caninas actiones, moresve determinant: Homo intelligit per intellectuales, quæ, quod probè notandum, dominantur sensualibus, & hæc imperant, aut certè sæpè perturbant naturales. Natura ergo per spiritum seu archeum corporis nostri extructrix & conservatrix, cujus diligens minister est Medicus, agit, & quidem ordinatè, semperquè, quæ sua est prudentia, eodem modo, id quod eò magis est mirabile, quo stupenda magis totius microcosmi est conformatio, & actionum tot, tamque mirandarum

andarum varietas ordinata, minimeque confusa, nisi à quodam superveniente perturbentur; quæ omnia directæ sunt in conservationem totius in genere, & uniuscujusque artis in specie. Necesse est ergò, sciat, quid agat? & cur agat? sed quo mediante determinatur, & specificatur? hoc fit per species naturales, seu Ideas: Hæ in genere dirigunt agendi vim, ut hominem homini formet similem & etiam in specie filius Patri, filia patri, &c. respondeat in lineamenti, ut albus valgum, blæsus blæsum generet, & hæc hujusmodi alia à conformationis vitio oriunda, errata: Horum namque rationem impossibile sanè est reddas, nisi directrices eas seu species afferas. Dumque præterea tractum domicilium, & omnium partium actiones factas rectasque conservat, & perturbatas restituit, ex eodem hoc promanat fons.

Verum impedita in sua ordinaria agendi, per sex res non naturales dictas, in prius per affectus animi, mirè transformantur, & obfuscantur naturales species, unde atque, & variæ archei perturbationes, variæ actionum læsiones. Depravatè ergò non agit natura, non cæco fertur impetu, ex speciebus pravis oriundæ corriguntur, removendo occasiones, Ideas & actionum perturbationes aut contrarias ipsi submirando species, quæ vel deleant priores ruptas vel eadem corrigant, &c. ut natura restituta suæ integritati per naturales suas sèdenuò agat. Hic est modus agendi suorum medicamentorum, alius ne mente sem conceptibilis est. Sed longius de re hæc prohibeor.

§. 4. Considerato sic animi impetu in ira irritata & mordicante, pergendum ad motum humorum in tam furibunda perturbatione. Hic autem consistit in impetu sanguinis ebullitione, & effervescencia, cunctis omnibus obvia, Veteribus exintum fervorem circa cor definientibus, in eum iratus fervere, & totus in fermento communiter quidem, sed appositè, diriguntur; unde & iram fortitudinis cotem dixere ci, si non ut duce, sed ut milite, eam utatur. Ira hæc similiter acuit viperæ fugientem alias hominem & pertimentem, ut supra dictum, eundem ut fortissimè conatu. Fermentatio hæc sanguinis, ex spirituum impetu, variis motibus cordis pulsatile corpus moventibus & oventibus, oritur, indeque nimia sanguinis rarefactio, incensio, effervescencia & visio, ex rarefcente imprimis bilis pinguis a parte, & salina volatili ejus substantiarum & volatilem impetum concitatio officiscitur. Agitatum sic sanguinem salivalis sequitur agitatio liquoris; sive

enim ex felle cum Hodierno, sive ex sanguine & cerebro cum Severino, derives, perinde est, dum partes ejus spirituosæ & salinæ volatiles in motum effervescencie similiter rapiuntur; non secus ac homines irati spumare sapius ore assolent, ex simili salivæ motu: Et quidem eo magis hoc locum habet in viperæ, quo volatilibus & facile fermentescibilibus eadem ditata est partibus: videatur Severinus, *qui Part. 1. cap. VII.* in eo est totus, ut calidam viperæ defendat temperaturam, eamque sulphureis calidis & spirituosissimis, & veluti alimentis, & constare partibus: Unde & rectè ex sulphureis spirituosissimis, & volatilibus hujusmodi partibus virulentiam ejus oriiri defendit, Parte tota secunda.

§. 5. Hisce consideratis, patet; quid de venenositate morsus viperini habendum? consistit ea partim in Idea furoris Archei, impressa dentibus & salivæ, sicque per morsum unà parti læsæ, & consequenter reliquis partibus communicata, spiritum seu Archeum corporis similiter perturbante, & in furorem concitante; partim verò in parte salivæ fermentescente, per fistulam dentis in vulnus evibrata, & beneficio circulationis sanguinis toti massæ communicata, in similem fervorem & impetuosum motum eandem concitante: in hisce consistit venenum morsus viperini. Confirmant hoc multa, tum in viperis obvia, tum in aliis animalibus observanda: ratione Ideæ dens humanus aliàs innoxius, venenatum infligit vulnus, nam redditus talis per imaginationem, & inde concitatum vehementem iræ passionem Marco Marci *Phil. Rest. p. 430.* Meticulosos & expavescentes fortius lædit, & periculosius viperæ, ob Ideam furoris Archei trementi contrariam altius impressam. Quo calidiores terræ regiones incolunt viperæ, eo venenosiores, fortius scilicet vel levi ex ira effervescentes: Quò item magis inhiat Veneri, eo virulentior ejus est morsus, agitata jam sponte sanguinea massa per spiritum genitalem, hincque fortius eadem effervescente. Ast quo fortior effervescencia, eò altius furoris imprimitur Idea, nam & effervescencie vim furoris intendit impetus & Ideam; contra major effervescencia fortificat, commota tota sanguinis massa, unde & salivæ altius furoris imprimitur species: quo acutiores sunt dentes, eò malignior est morsus, ob facilitatem salivæ penetrationem, & altiore ejaculationem, quæ solo contactu externo nil nocet; hinc circulatorum diffractis jam dentibus viperinis & mutilatis, ut mordeant eandem, patienter ferunt, quia sine noxa, minus penetrante, hebetæ earum acumine, minusque sic noxii infundente. Extra hanc effervescenciam innoxius est salivalis liquor: referente namque

Bartho-

Bartholino *de angina* pag. 110. ipse Neapoli virus, quod in chartam irritatæ viperæ bilioso coloris simile ejaculaverant, innoxie manibus trivi & ab aliis devorari Florentinus ibidem Pharmacopola retulit. Nam evanescentibus partibus spirituosus & volatilibus, sicque sedata effervescencia, innoxium est virus. Idea furoris Archei partis læsæ impressa similiter eum perturbat, hinc intolerabilis verè dolor: ast affluente sanguine inopinatus tumor, salivæ fermentis bilibus particulis eandem in æqualem effervescenciam cogentibus, Circulationis beneficio, brevi tota ejus afficitur massa, quæ eodem ebulliens modo admodum tumefacit corpus, febremque accendit acutam: humores circa præcordia imprimis bilis volatilis, & fixus pancreatis succus unà quoque commoti effervescendo, qua data porta ruunt, & regurgitando sursum atroces dant vomitus: Speciebus furoris interea in cerebrum allatis, vertigines primo ex perturbato spirituum motu, hinc deliria ex speciei impressione infestant ægrum.

§. 6. Quod in vipera contingit iræ percita cæstro, idem & in aliis observamus animalibus; Ab homine omnium principe duco exordium: Qui ut alteri solet esse lupus, imò diabolus, ita etiam vipera, idquæ per morsum. Dentes equidem ex se innoxii, ut & saliva, his tamen sæpè immedicabile, aut certè periculosum infligi vulnus constat, ubi ira vehemens eosdem armavit in perniciem: Exempla vide apud Hildanum *Cent. I. Obs.* 84. 85. item *Cent. IV. Observ.* 87. ex morsu levi hominis in digito gangræna brachii ad cubitum usque idem *Cent. Epist.* 73. Glandorpius *Specul. Chir. Observ.* 49. pag. 239. Panarolus *Pentecost. II. Observ.* 42. Zacutus Lusitan. *lib. 3. Prax. admirandæ. Observ.* 88. Imò sanguinem hominis ruffi venenatum perhibent, si ira exacerbato detractus fuerit, Autore Marco Marci pag. 433. sicut Zacutus Lusitan. *lib. III. Prax. Adm. Observat.* 82. refert, ex potu sanguinis hominis ruffi, per venæsectionem sine affectibus gravioribus emissi, perpetuam secutam fatuitatem. Si ira fuisset percitus, vel alia vehementiori passione, alia certè secuta fuissent symptomata. Cauda Scorpioni viventi ex improvise amputata, innoxium facit vulnus, teste Marco Marci pag. 430. & Lynceo pag. 782. Ast irritata pessimum ejaculat virus, cujus vim in effervescencia à sale volatili oriunda consistere, demonstrat Pauli *Digress. de Febr. malign.* pag. 50. 51. 52. Similiter cornua tauri, ac dentes apri, quando irritantur & efferantur, plagam inferunt magis venenatam quam si casu eadem fiat, in-

quit Marcus Marci pag. 430. cujus ratio in sola iracundiæ consistit Idea. Sic mentionem facit vulneris virulenti ab apro in suram infligti Salmuth. *Cent. III. observ. IV.* ut & trium vulnusculeorum à cercopitheco infligtorum, per biennium durantium, ut & vulneris difficulter curabilis à mure minore infligti. Hinc rectè concludit; non dubito, quin ejusmodi animalium, irritatorum imprimis morsus, malignitatis quiddam obtineat: cujus sententiæ est quoque Lynceus p. 782. dum inquit: cum sciam venenosa animalia, quæ pungendo aut mordendo vulnerant, vix nobis virus suum inferre, nisi irritata, adeoque vel à nobis, vel aliis, vel à se ipsis ad iram eadem provocata fuerint, id sæpe in felibus, canibus, & gallis gallinaceis, iracundia flagrantibus contigisse animadverti, ut vulnera tunc infligerent cacoëtica prorsus & ægre sanabilia, cum tamen quando placide nobiscum agunt, & fortè nos sauciant, vix quicquam detrimenti inde percipiamus. &c. Qui ipse discursus perplacet quoque D. D. Paulli in *Digress. prope finem*: similiter discurret Febure *Traict. de la Chimie Tom. I. Part. 2. lib. 1. cap. 8. pag. 421.* item Boyle of *Experimentall Philosophie Part. 2. Experiment. 2. pag. 52.* Porro ex equi morsu in tibia epilepsiam observavit Salmuth *Cent. III. Observ. 35.* & gangrænam ex equi morsu Hildanus *Cent. II. Observ. 86.* qui licet venenata simpliciter non habeat hæc vulnera, malignitatis tamen expertia non æstimat. Morsum lupi non rabidi, sed saltim irati, malignitatem habere conjunctam, in eodem vide Hildano *Cent. IV. Observ. 90.* Confirmatur à Schenckio in *Obs. lib. VII. de Venen. animal.* qui similiter luporum, licet non rabientium, morsum venenatum probat: Sed non satisfacit ratio, quam affert, quia scilicet in renibus eorum plerumque nascantur serpentes: Mellifluæ apes tantum abest, ut scateant ubique melle, ut iracundiæ quoque prodant fel; hinc ab apum ictu ortam gangrænam observavit Zacutus *lib. III. Prax. admir. Obs.* 83. ex punctura vespæ circa carpum dolorem ingentem totius & lipothymiam Hildanus *Cent. IV. Obs. 77.* sicut ex simili punctura circa juncturam mandibulæ ulcus insanabile secutum, idem *Obs. 78.* & dolorem horrendum aliaque symptomata ex ictu vespæ secuta, theriacalibus internis & externis curata, Riverius *Cent. III. Observ. 88.* & *obs. 6. Commun. à Pachequo*; sicut alias eadem læsio curari solet per vespam superimpositam, & per oleum ex vespis per infusionem applicatum, sicut Scorpius ejusque oleum proprio medentur ictui. Nec alteri solum speciei infligunt labem, & noxam venenatam hæc animalia, sed

sed se mutuis quoque interimunt ictibus: vipera namque à vipera atrociter demorsa vitam cum morte commutavit, Autore Zwelfero: scorpiones irritatos permistos invicem, se mutuistransfigere ictibus, testatur Lynceus: Araneas insigniores in vitro conjunctas se mutuis petere aculeis, & enecare, oculatus sum testis, alia ut taceam. Persuadent hæc ipsa & multa alia apud Autores passim obvia, venenatos esse hujusmodi animalium iratorum morsus; unus tamen plus alter minus: differentiae ratio & in agente & in patiente quærenda: agens nunc magis est irritabile, & irritati instrumenta nunc minus, nunc magis sunt acuta, & majori in patiens flagrat odio, vel minori. Patiens si est metriculosum & pavidum, venenum morsu receptum exaggerare, & diffusioni in totum corpus portas patentes aperire potest; contrarium fit si animosum & intrepidum nunc dispositum est magis ratione massæ sanguineæ, ad recipiendum venenosum fermentum, nunc minus, unde etiam nunc atrociora sequuntur symptomata, nunc leviora. Pars læsa nunc est nervosa, nunc est carnosæ, nunc nobilior aut ignobilior, nunc nobili parti propior aut remotior, &c. Variant hæc omnia magis & minus venenatorum morsum & ictuum vim & energiam.

§. 7. Ex modo allatis confirmata videtur sufficienter primitus allata Celsi sententia, omnem animalis morsum quoddam habere virus, ex quibus conclusionis loco elicio: si ob id animal dicendum est venenatum, quia ictus infert venenosos, vel morsus, sequitur omne animal, etiam hominem, esse venenatum, quia fervente iræ stimulis animali inflatum tunc est venenatum vulnus, ut demonstratum; idque eo magis, quo magis, vehementia affectuum rapitur brutum, quod rationis regimine eosdem refrænare nescit. Sed vix sine absurditate hoc dogma concedi potest, inprimis cum incongruum sit, id vocare venenatum, quod non semper habet venenum, nec quod aut vivum aut mortuum est tale, nisi in certo casu; Potius ergo arbitror, statuendum nullum animal reverà & per se esse venenatum, fieri autem tale per accidens, dum abreptum impetuosæ animæ passionibus, frendens ita & ferociens, vindictæque anhelans, per effervescentem salivam, vel simile quid, Ideam iræ conceptam per morsum communicat, & ita venenat, id quod innuit Lynceus p. 782. dicens: *In hanc devenerim sententiam, venenum absolutum nullum dari, sed relatione solummodo habita ad objectum, & ejus quidem naturam modumque inficiendi, imperscrutabilem verè nobis esse.*

Tom. II. Pars 2.

CAPUT II. PRACTICUM.

PUNCTUM I.

*Signa Morsus viperini &
Diagnostica & prognostica
pertractat.*

§. I.

Viperam per dentes duos caninos læsisse, ex ægri relatione peroptimè addiscitur. Notanda interim sunt & adjuncta ipsius morsus & supervenientia symptomata, ut & de qualitate ejus & instituenda cura certior reddatur Medicus. Morsum ergo ipsum quod attinet, apparent in loco demorsio duo foramina parva, invicem spatio discreta, vel etiam plura pro quantitate dentium, fluitque ex his sanguis primo purus, hinc humor saniosus, deinde oleosus spumofus, hinc æruginosus: prout magis magisque sanguis partis læsæ à fermento venenoso immutatur. Symptomata, quæ superveniunt, sunt vel ex genere actionum læsarum, vel qualitatum corporis mutatarum, vel excretorum depravatorum; omniaque habent originem vel ex furibunda Idea, vel per morsum impressam, vel ex praternaturali effervescencia, per fermentum venenosum inducta. Quæ sicut se invicem sequi solent, enarrare placet: Pars demorsa miserandum dolet, adjuvantibus hic non parum spiculis acutissimis, ex dentibus viperinis in parte relictis; non secus ac spinulæ ex urtica planta, vel opuntia seu ficu Indica, præprimis majore, relictæ, dolorem admodum acerbant. Dolor hic adeo sensim accrescit, ut totum quoque corpus dolere tandem dicatur; unde subitaneo tumore pars insurgit horrendam in magnitudinem, & sensim sensimque totum similiter corpus inflatur; quod si ore admoto haurire patiens conetur & exugere venenum, mox labra linguamque mirum in modum intumescere videas, ut os ipsam vix amplius capere queat, hinc putrilagine correpta, brevi ulceribus scatet, teste oculato Lynceo pag. 778. Color partis læsæ primo quidem rubicundus, sensim alterato per fermentum veneni sanguine, subruber, donec livescat, & obrepente gangræna, sphaceloque nigrescat, corporis similiter natus nitor perit, & pro fermenti efficacia, & sanguinis certa missione, ac inde orta alteratione, nunc rubescit, nunc viridescit, nunc purpurascit, nunc nigrescit, sanguineæ massæ Tinctura rubinacea sic corrupta: quales alterationes observare est in sanguine eorum, qui post iræ nimiam incandescencia eundem arte evacuant, quibusdam mire flavescit, aliis viridescit, vel etiam omnino livescit; Confusa ex inordina-

[Ooo]

ta ef-

ta effervescencia debita sanguinis multione, indeque obfusato & obtenebrato splendido ejus rubore. Calor præterea totum exurit corpus intensus, incensa febre periculosa à peregrino & hostili fermento; Unde arescunt fauces, ardetque larynx, accedunt vomitus biliosi admodum molesti, anxietates cordis, lipothymia, & syncopes terribiles invadunt ægrum; hinc & Palladis arcis fit afflictio supervenientibus scotomiis, deliriis, tandemque amentis: labascente jam spirituum regimine, tremores agitant artus, & diffuente ac quasi omnino liquefcente sanguinea massa, ex sufflata propemodum flammula vitali, cum horroribus quibusdam ultimi Naturæ afflictæ sed relictæ conatus indicibus, per poros penetrat frigidus pessimi ominis sudor, ac stagnante tandem, & subsistente sanguine in partibus vitali aulæ vicinis, & impedita sic ejus circulatione adfunt refrigeratio extremorum, respirationis difficultates, tandemque totius animæ exspiratio supervenit.

§. 2. Ex quibus vel sponte patet, qualis eventus tandem expectandus veniat, quomodo enim tanto symptomatum insultui par esse perterritus æger queat? non tamen præcipitet se Medicus in prognosi; quia ut variant vipera, pro varietate locorum, victuum, irritationis, &c. ita etiam variat eorum venenosa vis, quod ipsum parili ratione de parte læsa tenendum; quibusdam in regnis aliquot horarum spatio, in quibusdam tribus diebus, in aliis longiori tempore conficiuntur ægri; hoc generaliter interim notandum, morsum hunc tanquam ut plurimum lethalem, subitanæ medicaminis postulare opem. Actius hoc proponit *ναυήπιος*: *Centaurium cum vino tritum bibendum præbeto: siquidem enim Pharmacum evomet homo, morietur, si non, vivet.* Quod sexuum diversitatem attinet: litigant adhuc dum inter se autores, Maris an Fœminæ periculosior sit morsus: Sententias & auctoritates vide apud Severinum pag. 414. Et sane ab utraque parte stat ratio, maribus major effervescencia competere videtur, fœmellis efficaciot Ideæ vis, ob iracundiam, ad quam in omni ferme animalium genere fœminæ sunt promptiores, utut vana non raro sit sine viribus Ira. Sed quicquid sit hujus controversiæ, parum aut nihil interest Medico, ut sciat animalis lædentis sexum. Hæc tandem ultima prognoscere signa Eustachius Rudius *libro tertio de morb. acut. cap. XVIII.* collegit, & sunt: *Si Vipera percussus in syncopen incidit, si illi sanguis è naribus profluit, si labia virorem adscivere, si digiti extremi gelidi redditi fuere, si corpus omne concussum est tremore, & ut Nicander ait, veluti grandine percussus sibi*

videtur, certum est mortem esse propinquam.

PUNCTUM II.

Methodum medendi morsui viperae præscribit.

§. 1.

Dispiciendum tandem, quid valeat ars operosa medendi, quid ferre reculet; Maturam ferat opem Medicus, ne elapsa occasione, quæ secundum Dictatorem nostrum summum solet esse præceps, simul sperata ægri convalescentia evanescat. Indicatio, quam præfixam habet Medicus, est, remove venenum, quod præstat vel ex vulnere extrahendo, vel ex corpore expellendo? Consistit namque istud in parte salivæ effervescente, Idea furoris insignita: sublato ergò miasmate hoc, & inquinamento, securitatis spes affulget. Quæ extrahunt venenum ex parte læsa, sunt topica, & exterius admoventur, idque mox agendum in primo principio, antequam perniciofa veneni celeritas, beneficio suæ volatilitatis, inprimis cum sanguinis circulari motu, ad intimiora penetret, totamque sanguinis massam conspurcet, ejusque Idea ubique spiritus sigillet. Abscisso hinc continuo membro læso, abest noxa, teste experientia Galeni in rustico, qui remorsus à vipera secundum digitum, hunc sibi per falcem fructuosè & salutariter amputavit, videatur Zacutus Lusitanus *lib. V. Med. Princ. Histor. I.* Sed truculentum nimis est hoc remedii genus, ad mitiora ergò accedamus. Hoc interim semper observandum, ut injiciantur vincula, & ligaturæ partibus superioribus, firmæ & valentes, ne vi doloris concitatus sanguis, nimio impetu per arterias affluat, nec cito nimis unà cum veneni inquinamento per venas refluat. *Testificati sunt Psylli Marsique nostri*, inquit Severinus pag. 249. vid. Panciroll. p. 178. *cum forte per viperas incaute mordentur, si continuo morsam particulam exasperent scalpris, adeo ut tingatur caro multo cruore quem diligenter expresserint fieri sic, ut nulla sequatur noxa.* Bona equidem hæc est medendi methodus. Sed dum consideramus vulnusculi angustias, & spontaneam partis extumescenciam, vereor, ne plus attrahatur sanguinis, sine eo, ut convenienter evacuari possit, ita ut præter veneni celeriore propagationem, ex sanguinis in tumore extravasatione, coagulatione, & à fermento maligno mortificatione, subitanæ gangrænæ ingruat metus. Melius ergò faciunt illi, qui partem commorsam scarificant, idque pro circumstantiarum varietate nunc levioribus nunc profundioribus incisuris, applican-

plicando postea tam sanguifugas naturales, hirudines dictas, quam artificiales, seu cucurbitulas, quæ saniosum illum & tabe manantem ibique conculcatum sanguinem exhauriant. Commendat hic Severinus *pag. 451.* Exsuctorem, quicumque sit, & quicumque ratione fiat, eumque ab omni labe securum promittit: Cujus tamen non fuero imitator, deterrente me observatione Lyncei *pag. 778.* Sed duo omnium efficacissima & absolutissima, commendat Severin. media, Ignem nempe & Sulphur. Ignem quidem expeditissimum esse auxilium, cum cæterorum præstet viribus; sicuti etiam Hildanus in *Observationibus* suis ignem ad canis rabidi morsum vel maxime commendare solet. Adhibendum autem pro Ustione suadet, rhombum unum alterumve fimi caprilli incensi, quos imponendos suadet, donec cinerescant, fimum namque hunc in se & ignem servare & flammam reddere, idque ratione copiosi, quo impragnatus sit, sulphuris. Cæterum quis non formidet hinc dolorem intentum, qui per moram longe fieret crudelior, vereor ut patiens tunc tantam exhibiturus sit patientiam, quantam dolorificum hoc requirit remedium. Et hoc ipsum similiter obtinet de ferro ignito, loco affecto impresso: Horrent ægri mentionem ferri, nedum ignis, quid facient in hujus applicatione? commendo potius hic perelegantem modum Domini Boyle in *Exper. Philos. pag. 59*, qui etiam fit per ignem, sed sine ustione, per quem extrahitur venenum, sed sine corporali ad partem læsam applicatione. Modus est hic: Ferrum ignitum admovetur parti affectæ eo usque, quo ferre potest æger sine dolorifica læsione, idque tam diu, donec per hunc ignis contactum virtualement extrahatur, quicquid est in parte veneni; sic namque interdum in marte observari maculam quandam flavam. Experimentum factum in homine quodam vulgari, qui statuto pretio ab irritata insigniter vipera sustinuit morsum in manu, unde in continenti mirum in modum eadem tota intumuit, ita ut vix ob temporis angustiam sufficienter incalescere potuerit ferrum, sed hoc per 10. vel 12. minuta admoto, incrementum tumoris omnino remisit, & licet adhuc aliquandiu continuassæt, iponte tamen evanuit, qui postea sæpius hoc medio pecunias lucratus fuit. Quoad efficaciam hujus medii non dubito de quadam veneni extractione, qua ignis sulphureas volatiles & actuosas ejus partes alliciat: sed forsan adhuc aliud quid in recessu habet; dictum enim est supra, fermentum venenosum insignitum præterea quoque esse Ideam furoris, quæ ipsa perturbando Archeum admodum exasperet malum. Sed huic nil magis contrariatur quàm terror,

Tom. II. Pars 2.

quo per ferri igniti præsentiam incusso, extinctâ priori Ideâ Archeus contrariam fabricet, sicque veneni vim non parum enervet. Observare datur simile quid in procidentia uteri, quæ utut per solam ligamentorum aut laxationem contingat, aut ruptionem, optime tamen incusso certo modo terrore, idem restituitur in suum locum: teste enim Roderico à Castro *lib. II. de Morb. Mul. cap. 16.* cauterium actuale ignitum si teneat Medicus manu, simuletque ac si vellet uterum tangere, eundem subito retrahi: quod ipsum in intestinis prolapsis obtinere quoque affirmabat. Simile stratagemata expertus est quoque feliciter Zacutus Lusitanus *lib. II. Prax. adm. obs. 95.* idque ex manu ductione Avenzoaris, per mures cruribus alligatos, quorum transcursu perterrita foemina, uterus in propriam reductus fuit sedem. Alterum generosum, quod commendat Severinus, remedium est Sulphur, cujus varia est applicandi ratio; vel enim guttulas accensi sulphuris instillare, vel olei sulphuris per campanam complures guttulas in plagam demittere, eamque specillo tenuissimo refricare protinus, vel ol. vitrioli similiter immittere, vel acetum adhibere jubet. Præter autoritates, quas apud eum vide, experimentum reddit hoc: quod ol. sulphuris effusam in abaco viperæ insecturam, confestim coagulet, & fixet. Perplacent hæc, cum amice hic conspiret theoria & Praxis, illa effervescendo agere dicit venenum viperæ, hæc ergò medicamentum postulat, quod præcipitando coercere queat istam immorigeram vim. Cum itaque venenum viperæ consistat in sale volatili, spiritibus sulphureis juncto, hoc est, ut loquitur Severinus, sanies viperæ sit pyrotica, spirituosa, sulphurea & arsenicalis, optime conveniet acidum, vel sulphuris, vel vitrioli, vel aceti, quod præcipitat omnem salem volatilem & figit, & coagulando blande sulphur, fermentum venenosum omnino mortificabit. Hinc internè hujusmodi acida vel etiam aceta Bezoartica, juncta Theriacalibus medicamentis, tam laudabilem præstant opem, dum illa præcipitando vim veneni fermentativam hebetant; hæc verò, si quid inest heterogenei in massa sanguinea, per cribrum cutis porosum excludant: de quibus postea. Sed cum acidum hoc in oleum concentratum, vulneratæ applicatum parti corrodingo atroces excitare valeat dolores, forsan per manu ductionem D. Boyle fumus ex incensis tædis sulphureis propè applicatis erit utilis, ut tum ratione admoti ignis, tum ratione vaporum acidorum sulphuris, junctis quasi viribus, subjugetur venenum. Usitata sunt & alia extrinsecus applicanda pro veneni extractione, ut aves, imprimis gallus & palumbus deplumati

[Ooo 2]

circa

circa podicem & admoti, vel dissecti per medium, & calentes adhuc applicati: Alii theriacam vel solam, vel aceto subactam, commendant, vel ex theriaca, cum cepis, alliis & caricis paratum cataplasma admovent: Lynceus unguentum ex majore parte olei scorpionum, mediocritheriacæ, & minore aceti compositum cum fructu adhibuit. Tormentilla exterius applicata, salutem demorsis attulit, teste Fracastorio *lib. III. de Morb. Contag. cap. 2.* Actius admodum commendat stercus caprinum, cum aceto applicatum, vide Zacutus *lib. V. Med. Princ. Historia 2.* Hincalii ex stercore capræ cum aceto, pice, cera & sulphure, utuntur mistura; nec inutile erit, emplastrum magneticum *Sala*, ratione magnetis ex sulphure, arsenico & antimonio conflati, cui si addas vel pulverem viperinum, vel earum bilem, aut subigas cum earum pinguedine, eò efficacius reddes. Viperarum namque partes externe applicatæ quæcunque exoptatissimam ferunt opem, imprimis fel illitum, & caput mortuæ impositum quod utut furore prius ardeat, imminente tamen morte in terrorem & tremorem sensim facessente furore, obit. Extracto sic veneno, danda opera, ut si quid inest sanguinis adhuc corrupti, & congrumati, per debitam suppurationem evacuetur, postmodumque consolidetur.

§. 2. Quod interna attinet remedia, ea sint talia, quæ conceptum jam fermentum venenosum foras excludant, intestinas sanguinis commotiones sistant, & discussis fuliginum per poros cutis nebulis, serenitatem pristinam microcosmo inducant. Specialius Antidotorum vim determinat Marcus Marci *p. 434.* inquit: *Antidota & in principio & in progressu morbi medelam præstant, quia nimirum vel à veneno Ideas noxias exigunt, vel penitiùs mistum istud destruant, vel demùm Archeum vulneris per amicabiles Ideas alloquuntur, & solando furorem sensim exuere procurant.* Sint ergo alexipharmaca vel præcipientia, hæc tam positiva quàm privativa, illa tam communia quàm contra vipers appropriata. Communia alexipharmaca ubivis nota, tam simplicia quàm composita. Inter simplicia scordium, scorzonera, ruta, centaurium minus, &c. Ex mineralibus antimonialia profunt fixata, ut diaphoreticam acquirant vim, imprimis sulphur ejus aureum, seu quod Mercurii sublimati beneficio ex antimonio eruitur, seu quod per sal ammoniacum sublimatur & figitur, ut sine vomitu secessuque per nudam agat blandissimamque diaphoresin: Ex animalibus omnia profunt ex cervo parata. Theriaces quoque insignis vis apud omnes commendatur Autores, indeque Ef-

sentia theriacales, spir. Theriacal. Camphoratus, ex quo cum spir. vitrioli & Tartari (his imprimis volatilibus) parata mixtura simplex, de cujus usu jam præcedenti paragrapho, atque etiam celebris Tinctura Bezoardica D. Michaëlis, admodum erunt proficua. Opiata quoque, cum theriacalibus maritata, admodum commendo, cum theriaca communis maximam verè vim fortiat ex opio, co tamen minùs correcto, quod si correctum legitimè cum Bezoardicis misceatur, sedando sanguinis impetuofum motum, & delendo furoris in Archeo Ideam, maximè foret proficuum. Appropriata ad morsum viperæ medicamenta ex ipsis copiosè hauriuntur viperis. Pertinent huc pulveres viperini, de quibus videatur Spontonus Tractatu de Pulvere viperino. Item essentia earum & Tinctura, quarum quamplurimas & in Zwelfero & Severino invenies: & quod instar omnium est, sal ejus volatile, quod si ritè absque acido figere nescias, in id saltem incumbas, ut legitimâ edulcoratione urinosum & nauseabundum tollas saporem, è contrà verò suavem ipsi, dulcem & aromaticam, omninò concilies & fragrantiam & dulcedinem, quod faciliè secundum ductum D. Boyle Tract. suprà citat. fieri potest. Ratio operationis horum medicamentorum consistit in similitudine, qua simile attrahit suum simile. Assumpta ergo vel admota viperina, fermentum venenosum & salinum suæ naturæ omninò simile, attrahunt, illud alterant, vim fermentativam sopiunt & placant. Parili ratione atque pili canis rabidi impositi ejusdem morsui, relevant ægrum: & jecur ejusdem comestum eundem curat. Aut sicut Scorpius vel apes impositi, suis ictibus iisdem medentur, eliciendo id, quo nocent. Inter appropriata commendari vulgò solet fraxinus, utpotè cujus vel nudam umbram vipers & serpentes fugere autumant; hinc succum foliorum admodum commendat Zacutus Lusitanus *libr. III. Prax. adm. Obs.* sed rejicit hoc ex Plinio haustum dogma Severinus *pag. 264.* Et licet Amatus Lusitan. *Cent. I. Cur. I.* Puellæ à vipera demorsæ propinaverit succi fraxini \mathfrak{z} iv. cum juvamine, hoc factum est ratione tremoris adjuncti, cujus specificum est in fraxino, & aqua ejus destillata egregia hic est medicina. An ex corylo parata medicamenta assumpta aliquid afferant commodi? nondum certò expertum: attactu quidem virgæ coluræ torpescere & stupefieri serpentem & vipers fama est, & circulum virgæ columnæ circa viperam factum hanc non transgredi, quidam, qui se hoc experimentum vidisse dicebat, retulit. Non E. ejus internus usus omninò videtur improbabilis, cum præterea in corylo, quamplurima abstrusissima lateant ar-

cana,

cana, & oleum heraclinum ex eo paratum stupendas possideat vires: ut taceam corylinum viscum ad morbos ab incantatione & veneficiis oriundos potestates obtinere omnino singulares: Renealmus *Observ.* CLV. CLVII. morsam à vipera jam fermè conclamata, restituit per Decoctum ex Verbasco, & cortice sambuci interno, cum parte sexta baccharum acathalidis assumptum, & partibus laxis scarificatis extra applicatum. Galegæ seu rutæ capraræ vis & hic specifica est egregia; aquam ejus destillatam non inferiorem æstimatorum scorzonæ Lynceus *pag.* 786. & cum hoc galegæ succo curatum juvenem ex viperæ veneno infectum, vide in Schenck *lib. VI. de Ven. Anim.* Et Historiam Lacertæ cum vipera pugnantis, & cum galega contra vim veneni viperini se munientis, vide in Foresto *lib. II. de Incert. Urin. Jud. pag.* 209. v. 156. Inprimis felicissimum expertus est usum urinæ humanæ, ejusque potus in morsu viperæ Zacutus Lusitanus *lib. VII. Præxios adm. Obs.* 94. Sicut eadem prodest ad præservationem ipsius quoque pestiferæ luis,

jejuno si hauriatur ventriculo: spir. ergo urinæ volatilis cum essentiis theriacalibus, vel potius viperinis mixtus, foret hic saluberrimus. Saliva hominis jejuni serpentes & vipers enecare communiter asserunt; sicut etiam sanatores dicti per sputum suum aquis injectum & imbibitum quamplurimas ægri-tudines, & à viperis inductas noxas, sanare solent, cujus exemplum habet Joh. Marcus Marci *pag.* 554. §. 16. qui licet hanc vim naturalem esse, & ex sola imaginatione sputum certo modo sigillante, in quibusdam subiectis provenire asserat; tamen amicus quidam fide dignus retulit, esse donum quoddam divinitus concessum, & proprium quibusdam in Italia, qui in Festo Divi Pauli nati, signum serpentis vel viperæ sub lingua aliove in loco gerant, cujus se oculatum testem sanctè affirmavit. De diætâ non est, ut multa moneam, cum eam præsens Medicus dirigere faciliè sciat. Temperantiæ medium ubique est optimum, quare ne & ego mediocritatis nimia prolixitate excedam limites, facio FINEM.



DISPUTATIO IV. DE CHIRURGIA INFUSORIA,

PRO LOCO

IN FACULTATE MEDICA LIPSIENSI OBTINENDO,

MICHAELE ETTMULLERO,
Phil. & Med. Doctore, Examini Publico submissa,

die 30. Octobr. Anno 1668.

R E S P O N D E N T E

GEORGIO FRIDERICO STIRIO,
Uratravienfi Silesio.

P R O O E M I U M.

Utile, quale est, conservetur corpus nostrum, assumendorum alimentorum imposuit necessitatem provida mater Natura, iisque Oesophagi iter, & stomachi constituit diversorium. Sed de ægitudine illa minus sollicita, medicamentis applicandis nullam determinatam destinavit partem, sed ubicunque juvare possunt, commodus applicandi est locus. Eadem nempe ratione, qua morborum Autores, non semper per patulam oris in nos subintrant viam, sed mille modis nobis insultant, ita quicquid juvare potest, sive deglutiat, sive appendatur, sive imponatur, sive infundatur, sive illinatur, perinde est: Mille namque nocendi modis, mille salvandi media respondere par est. Quamplurimæ quidem extraordinarii curandi sunt modi, de quibus ceu particularibus non est faciendæ universalis regula, ut, dum per imaginationem fit purgatio, ut videre est in Obs. Henrici ab Heer, aut ex imaginaria persuasione, ex ridiculis verbis schedulæ inscriptis & appensis, febris curatio apud Salmuth c. 2. Obs. 81. aut dum per contactum fit ægri sanatio; sicut ante paucos annos in Anglia fuit Rusticus, qui quosvis etiam gravissimos affectus curavit solo manus suæ contactu; item, dum tumores

[Ooo 3]


& ex-

& excreſcentiæ contactu manus mortuæ evaneſcunt; aut quando trans-
plantationis vim morbi in beſtias transferuntur, ut Podagra, Colica, Odon-
talgia, &c. incanes, vel in plantas, quarum exemplum collecta vide apud
Bartholinum Cent. 3. Obſ. 66. & C. 6. Obſ. 53. Borellum Cent. 3. Obſ. 28.
Boyle Uſefulneſ. of. Experim. Philoſ. p. 2. Ut jam curationes ſic dictas Magne-
ticas præteream; nam de huiusmodi modis minus uſitatis, in præſentia-
rum non agam; ſed urgebo ſaltem, non eſſe deſtinationem Naturæ, ut ſo-
lummodo per os ingerantur medicamenta pro internorum correptione malo-
rum, cum applicatorum extrinſecus viſ ſit mirabilis, ſecus accum alimen-
tis contingit. Lotiones pedum in pertinacibus Vigiliis, Cephalalgis,
Catarrhis, Menſibus retentis, quid valeant? Prædictorum loquuntur li-
bri. Aloëtica cum amaris, ut felle tauri, oleo abſinthii, &c. umbilico ap-
plicata, lumbricos enecant & propellunt. Purgantia extrinſecus umbi-
lico vel pulſibus applicata purgant; ſicut theriacalia & opiata e contra ſimi-
li uſu hypercatharſes ſiſtunt. Hellebori albi radices ventriculi regioni im-
poſitæ, vomitum cient, quod & unguentum de arthanita facit; folia ve-
ro cuſdem hellebori inſtar plantaginis, ſed longiora & duriora, ſub cin-
guli forma lumbis applicata, nimios menſium & lochiorum fluores ſiſtere
expertum eſt: Quis virgus pinguedine ſuilla vel oleo tauri ſubactus, ſpine
dorsi vel articulis artuum, vel quod optimum, plantis pedum, inunctus,
ex Gallorum Chirurgorum methodo, per ſalivationem ſæpius, rarius per
diarrhæas torminoſas, luem & eam curat, qualem effectum & plumbum
ſimili uſu in infantibus exhibet: ceditque contumaciſſimum hoc malum
huius Mercuriali inunctioni, quod antea omnes decoctionum ſudoriferorum
& dietarum ſtriſtiſſimas neglexerat leges. Succus urum fluviatilium, vel
ſedi majoris, vel spermatidis ranarum, capiti vel plantis pedum appli-
cati, valde perè ad compeſcendos ſanguinis ætus, & phreniticorum deli-
ria commendantur. Quid pulſibus applicata valeant in abigendis febribus
intermittentibus, ſæpius cum rubore ex aniculis diſcunt medentes. Pul-
pa paſſularum cum flor. lupuli, & pauco camphoræ, pulſui applicata,
quamplurimos febricitantes reſtituit Anglos. Quid Strobelbergeri em-
plaſtrum valeat ad frangendam quartanæ contumaciam, ejus fide digna
monſtrant ſcripta. Ex fuligine ſplendente, terebinthina, telisque ara-
nearum, cum camphora & oleo aranciarum concinnatum emplaſtrum ſeni
nobili ferè ſexagenario, ſine cuiusdam alterius medicamenti uſu, quarta-
nam proſtigaffe Autor eſt Deſideratiſſ. meus Præcept. D. Michaelis. Em-
plaſtrum ex Nicotiana paratum, cum oleo capparum ſpleni applicatum,
quartanam tollit, illudque Helmontii fuiſſe, ſunt, qui exiſtimant. Pau-
ci anni claſſi ſunt, quod novus medicamenta applicandi corpori noſtro mo-
dus à curioſis inventus fuit, dum immediate medicamenta venis inſun-
duntur, unde Chirurgia Inſuſoria appellatur, cujus genuina Filia eſt
Transuſoria, dum ſanguis ex uno animali in aliud transfertur. De qui-
bus juſſu gratioſiſſ. Facult. Medicæ hac vice libentiſſimè conjunctim egiſſem,
niſi defectus quorundam ſcriptorum Pariſiis præterita hyeme, cum ibidem
degerem, editorum, quæ & ardentè adhuc expecto, me impediſſent,
Transuſionem igitur ad proximam occaſionem reſervabo, & in præſen-
tiarum Inſuſionem tantum pertractabo; cui incepto, ut divinum Nu-
men favere velit, ſupplex rogo.

CAPUT I.

*Historiam Chirurgiæ**inſuſoriæ enarrat.*

§. I.

Definitio
Chirurgiæ
Inſuſoriæ.

Um acerbiori ſævitia
quotidiè in nos irru-
unt conjurati vitæ
noſtræ hoſtes, morbi,
in eo totam ſe occu-
patam monſtrat ars operoſa meden-

tum, ut novis quoque machinis illorum
impetum non ſuſtineat tantum, ſed ge-
nerosè quoque propellat; Unde tot egre-
gia hætenus in lucem protracta ſunt
inventæ, de quibus veneranda antiqui-
tas ne ſomniavit quidem, cum accu-
rator Diætæ obſervatio à gravioribus
morborum inſultibus eam ſufficienter
muniret. Inter hæc inventa non ul-
timum locum meretur Chirurgia In-
ſuſoria dicta, qua beneficio instru-
menti

menti appropriati medicamentum in apertam antea venam artificiosè injicitur, ut infractis agendi potestatibus, celeriorque agendi promptitudine, agere queat id, ad quod antea à Medico destinatum fuit. Ad Chirurgicas operationes refertur hæc medicandi ratio, cum manuum artificiosa peragatur opera, similisque hac ratione sit reliquis injectionibus, quib⁹ nunc intestina, mulierum genitalia, irrigantur, nunc abcessus, ulcera, fistulæ, &c. eluuntur; unde non incongruo appellationis genere Clysmatica, vel Enematica Nova, dicitur, ad differentiam artis istius clysmaticæ veteris, majoribus satis cognitæ, de qua modo locuti sumus.

Inventum
est novum.

§. 2. Novum omnino est hoc inventum, quodque inter Medicos vix lustri attingit ætatem. Meretur ob id meritò, ut pensiretur accurate, plusnè commodi an incommodi exinde ad mortalium gens redundare queat? Nec novitatis quemquam deterreat titulus, cum non omnia, quæ seculorum aliquot numerant annos, veritatis niteant splendore, nec novis omnibus falsitatis inurenda sit nota. Quæ jam antiquata sunt usu, suos olim habuere natales, & quod modo exsurgit inventum, post seculi spatium forte elegantius florebit. Multum egerunt ante nos majores, multa agenda restant posteris, nec nobis E. prohibita sit ingenium exercendi libertas. Nonnullæ licet circumstant difficultates hoc negotium, commune tamen id habet cum omnibus, quæ primo in lucem prodeunt; Foetus tennellustalo incedere nequit firmo, qui in virili ætate insigni robore pollet, & planta dum primitus germinat, quibus non exposita est tempestatum injuriis? quas, ubi in arborem adolevit, omnes contemnit. Eodem modo longior experientia roborabit forte nostram Chirurgiam, & ratione confirmata uberiores adolescentibus annis proferet fructus, quam nunc in prima ætate ab eadem haurire aut sperare queamus. Nam

*Eventus varios res nova
semper habet.*

Autores.

§. 3. Primi, qui Chirurgiam hanc exercuere, fuerunt Angli, & inter eos primus Autor dicitur D. Wren, Math. in Acad. Oxoniensi P.P. insignis, & Regiæ Societatis socius; jamque magno eruditorum desiderio expe-

ctatur absolutus de hac Materia tractatus, quem D. Clarck, Anglus Medicus Regius, præpediem in lucem est editurus, in quo, præter alia curiosa, etiam abortuum ferè omnium mensium contentæ erunt historię. Hæc dum Angli peragerent, J. D. Major, Med. Doct. Anat. & Botanic, P.P. in Acad. Chiloniensi, meditando, qua ratione intercepti sudores ob sanguinis visciditatem in agris ex febre maligna jam agonizantibus (dum usitata remedia incastrum sæpius adhibentur) revocari, sicque sanguineæ massæ nova fluiditas & fermentatio induci possit, ad hujusmodi infusionem liquoris medicamentosi tandem devenit, & anno 1664. prodromum de hac Chirurgia infusoria publico exposuit, quem anno currente judiciis doctorum virorum, eorumque objectionibus simulque modestis ad eas responsionibus locupletatum denuò edidit. Eadem res evenit Carolo Fracassato, *Med. Doct. & in Acad. Pisana Anat. Prof. Publico*, viro ut ex privato collegi discursu, multum curioso; qui, dum quærit, quo modo fermentatio sanguinis in genere revocanda, si forte abierit, vel interitura renovanda? ansam accipit de Medicina Infusoria cogitandi, eamque exercendi, ut videri potest in *Tetrad. Epist.* Malpighii & Fracassati anno 1665. Bononiæ edita. Nec omittendus hic est Joh. Sigism. Elsholtz, D. & *Elect. Brand. Med. Ordinarius*, qui occasione experimenti anatomici, quo anno 1662. circularem sanguinis motum in muliere undis suffocata demonstraverat, Clysmaticam etiam hanc novam invenit, de qua vid. ejus Tractatus, hoc nomine insignitus. Nec sua laude hic defraudandus Mauritius Hoffmannus *Med. D. & P.P. Anat. ac Botanic. Aldorffii*, qui in literis, ante biennium Patavium ad me missis, inter alia refert; se jam ante aliquot annos & publicè & privatim docuisse, quomodo in melancholicis, Epilepticis, &c. sanguis ex juvene florido in ægrum immittendus? &c. quod idem discipuli ejusdem testantur. Hi sunt, quibus inventi hujus novi gloria debetur, quique diversas licet vias ingressi, ad eundem tamen collimarunt terminum. Quilibet sanè rationis suæ obtinet robur, illudque applicando, quid mirum, si res nova

væ

væ inveniantur? Quæ seu sint diversæ seu eadem, unumquemque tamen laus inventi proprii merito manet; *Si enim alius alia plura invenire potest, nemo omnia*, ut inquit *Ausonius*, *etiam alius alterius inventis similia reperire valebit*. Retulit interea Vir quidam Nobilis curiosus, & fide dignus, se anno 1642. in Lusatia superiore apud Magistrum quendam Equitum, virum rei venatoriæ multum addictum, & ob id quam plurimos canes alentem, vidisse, quod ejus venator delectationis gratia interdum canibus in venam apertam per osficulum gallinaceum ex ore vinum hispanicum, vel aquam vitæ infuderit, unde canes post ligaturam parum ejulantes, ebrii facti fuissent, donec ebrietatem per somnum discussissent: eumque solitum fuisse, canes ægrotantes hoc modo medicamentis, nescio quibus, curare.

Tentamina in canibus.

Aqua simplex.

Vinum.

Purgans.

Vomitivum Gal.

§. 4. Experimenta varia Chirurgiæ hujus Infusoriæ, quæ tum in supra allegatis Autoribus reperiuntur, tum etiam ab aliis privatim tentata fuerunt, sunt sequentia: Cani majori in venam cruralem ∇ æ comm. \mathfrak{z} j. injecta fuit facili labore, qui, cum per mediam horam lambuisset vulnus, fugam postmodum quasi nihil passus arripuit. Ex vini hispanici \mathfrak{z} j. injecta nulla in cane alteratio ab Elsholtio animadverti potuit, ob dosin forte nimis exilem; in debita vero dosi quid contingat, præter alios docet imprimis Schottus *Techn. Cur. lib. II. cap. 21. p. 891. Vino hispanico, infuso cani, primum in saltus & tripudia effundebatur, tum ebriorum more titubabat, demum procumbens in somnum solvebatur, donec crapulam edormivisset*. Ex infuso purgante, *Spiritu vitæ* Oeo ad \mathfrak{z} j. quantum homini abundè sufficit, canis per aliquot horas male habere visus est, & hinc inde vagari, septem verò elapsis horis bis copiosè satis deiecit, teste Elsholtio. Ab aliis felici semper successu idem expertum fuit, & in quibusdam horæ tantum elapso spatio operatio medicamenti per inferiora se prodidit, cum aliàs canes, vel non, vel difficillimè, ab assumptis purgantibus solvantur. Infusum granorum sedecim croci metallorum non filtratum, ad \mathfrak{z} j. cani pomeridie injectum, inter singultus & salivationes oris, gra-

viter decumbentium instar, cum sonoris suspiriis, secunda ab infusione hora, vomitus produxit, eodem valde interea inquieto, & ex uno angulo in alterum prorepente? nocte verò transacta mane extinctus fuit inventus. In alius molossi arteriam Infusum croci metallorum pauca quantitate nil invexisse damni, observatum fuit; cum verò dosis ad \mathfrak{z} ij. aucta fuisset, & animam & omnia simul evomuit, Autore Dn. Boyle. Opii tantum, quantum ^{Opium.} hominem enecare, selem verò in rabiem lethalem conjicere potest, nullam noxam cani propinatum infert; cum verò extracti liquidi opii ad \mathfrak{z} j. injectum fuisset, canelicer existente feroce, is statim mansuetus factus post mediam horam adeò dormire cœpit, ut licet acicula per linguam exsectam transadigeretur, vix tamen parumper evigilaret, imo cum eadem acicula in pede per cutem adigeretur, se nihil moveret; sin verò ad nodulum usque in carnem intruderetur, quædam lenius signa daret, & ita biduum unamque noctem dormiendo consumeret, eodem postea reconvalescente. Ab aliis observatum post opii Tincturam in arteriam canis infusam cum mox in vertiginem, & paulo post similiter quoque in soporem incidisse, paulatim verò ex eo tempore mirum in modum pinguescere cœpisse. Iniectione ^{Aqua chrysulca.} aquarum Chrysulcarum in jugularem & cruralem venam animal cito interit, sanguine omni ferè coagulato, venisque & meatibus sanguineis majoribus scissis seu ruptis, quemadmodum in apoplecticis vasa pulmonum plerumque disrumpuntur. Amicus quidam in venam canis subclaviam injectit \sim m \mathfrak{M} i, & paulo post extincto cane sanguis in ista vena & corde coagulatus, & in dispersos grumos concretus, repertus fuit. Ex infusione \sim vitrioli ^{Spiritus vitrioli.} *sanguis pariter, sed non illico* (verba sunt Fracassati) *concresebat, verum aliquo interjecto tempore; nam animal diu conquerebatur, & munera respirationis ingeminabat, & succussato toto pectore ingentis doloris signa edebat, spumaque circa os prodibat, ut in Epilepticiis. Secto animali sanguinis non ea erat concretio, ut aliam sanguinis partem continuatam haberet, & velut stria inane vasorum impleret, sed divulsus, & inequaliter fuso hoc sale revinctus,* ^{Oleum sulphuris.} *reperiebatur*. Infuso oleo sulphur. in venam

venam jugularem, non potuit canis, iterata licet infusione, adigi, ut moreretur; sed obligato vulnere dimissus confestim coepit ossa quærere, cuncta vorare famelicus, ut videretur famēs hæc cum ol. sulph. indita. Mira videri potest hæc relatio, consideranti magnam ol. sulph. & ~ Vitrioli afinitatem, qui dum ex uno sale acido seu esurino sulph. embryonati, ut Helmontio audit, in terræ visceribus sint generati, affectionibusque & proprietatibus sint admodum similes, adeo diversos tamen in sanguine producant effectus. Boni ergo & curiosi cujusdam amici animatus instinctu, ejusque adjutus ope, experimentum institui, & 3j. ~ sulph. per campanam in 7x 3j. & quod excedit, dissolutam in venam cruralem injeci, factaque convenienti vulneris deligatione canem à vinculis solutum in arcam deposui, qui vivax omnino, apertis lucidisque oculis, plena, paulo tamen frequentiori respiratione, in area decumbebat, hinc sensim altiore, crebriorem & minorem agendo respirationem, levibus quibusdam imprimis oris convulsionibus agitari, hinc crebrius respirare, tandem fortiter diuque ex imo pectore non sine violentia stertere, copiosam spumam effundere, hancque scenam, repetitis subinde levibus convulsionibus, tam diu agere coepit, donec quasi strangulatus ferè circa mediam horam ab infusione exspiraret, effluente ex ore mox post mortem copiosa admodum aqua serosa tenui, instarque loturæ carniū rubicunda, cum copiosa & viscida supernatante spuma. Cum verò ex area in mensam elevaretur pro viscerum scrutinio, eadem spuma copiose admodum ex ore effluebat, apertoque rictu totæ fauces repletæ erant, ipsaque integra quoque aspera arteria, compresso namque exterius larynge, copiose in fauces erumpebat hæc spuma, simulque per nares effluebat. Aperto thorace pulmones in quibusdam extremitatibus ex albedine rubescebant naturali colore, sed maxima ex parte, inprimis ubi costas respiciebant, ex atro admodum rubescebant, non secus ac si ex contusione sanguis concretus in iis retentus esset: abscissis vero uno vel altero lobo, sanguinis moderata, imo exigua, quantitas effluebat, copiosissime vero se-

Tom. II. Pars 2.

rum istiusmodi sanguineum per omnes vel minimos quoque, meatus cum copiosa spuma emanabat; erantque pulmones spongiarum instar, sero hujusmodi sanguineo spumoso, h. e. bullis copiosissimis minutis & viscidis, repleti, omnesque arteriæ asperæ, majores pariter ac minores, rami hujusmodi spuma tantum non obstruati. Aperto cordis thalamo dextro sanguis, qui erumpebat copiosus, admodum ater apparebat, tenuis & fluidus quidem, crassioris tamen, quam naturaliter esse debet, consistentiæ, apparebantque similiter non pauca & grandiores bullæ hujus ventriculi parietibus affixæ: sanguis similis ater & crassiusculus, facileque coagulabilis ex sinistro pariter ventriculo, vena subclavia ut & cava, effluebat. Dum reliqua scrutaremur viscera, abscissis grandioribus hepatis lobis, nihil sanguinis ex iis effluebat, nisi forte compressione ex porulis eliceretur, imo hepar totum ex sanguine apparebat, grandioribus ramis vasorum inanitis, lien duriusculus ex sanguine similiter erat, ut & renes: olfacientes ergò id, quod res erat, arteriam magnam paulo infra cor aperuimus, ut & ramum cruralem, item ramum ascendentem axillarem sinistram, & similiter paucas quasdam sanguinis reliquias, quibusdam tantum in locis, reperimus, arteria ipsa ex toto fere in majoribus his ramis inanita. Multæ reflexiones hic quidem fieri possent, sed cum non faciant ad rem præsentem, hoc saltem addo: Verisimile videri, sanguinem ex acido ☿is injecto, ob crassitiem circulationi redditum ineptum, in pulmonibus stagnasse, ibique repetito aëris motu, in spumam istam serumque rubicundum abiisse, dum interea, eodem in arteriis promotum semper ulterius in minores ramos, exindeque in venam cavam, nihil potuit circulari per pulmones, unde viscera majoresque arteriæ rami omnino inaniti fuerunt. Oleum ☿i immissum

Oleum
tartari,

cani, necem ipsi attulit, prævia tamen magna vexatione: querulus namque ingentem testabatur dolorem, totusque inflabatur & à postrema inflatione exspirabat. Sectus postea, sanguinem valde fluidum & rubicundiorē solido exhibuit: nimiam ergo sanguinis coagulationem, pariter ac ejus nimiam dissolutionem, mortem inferre, abunde patet; quarum illam

[P p p]

ab

Deco-
ctum ar-
senici.Solutum
Merc.
Subl.

In Catello

Experi-
menta in
homine.

ab exuperante acido; hanc verò ab urinoso prædominante contingere, præter modo allegata Experimenta, quilibet experiri potest, si sanguinem venæsectione emissum diversis vasculis hujusmodi liquores continentibus excipiat, mutationesque exinde sanguini obvenientes observet. Decoctum Arsenici in aqua simplici, ad ℥j. infusum cani, mortem miserandam cum gravibus symptomatis, ronchis, copiosis alvi & vesicæ dejectionibus, volutationibus violentis, oculorum contorsionibus, intulit; Videatur Elsholz. Ego aliquando experimenti gratia ℥ss. ℥ij. æti in ∇ simplici solvi, & licet non omnis Mercurius sublimatus solutus esset, illius tamen solutionis paulo plus ℥j. in venam cruralem canis majoris injeci: simul verò atque fieret injectio, canis, qui antea semper, dum cutis scinderetur, venaque separaretur, quietus jacuerat, violenter se commovere inchoabat, & paulo post, repetita aliquoties respiratione, cum misero & horrido ejulatu, violentaque corporis commotione, ex improvviso, nobis nil tale cogitantibus, exspirabat. Aperto corpore, sanguis omnis non sine nostra admiratione & in corde & in cavæ trunco, etiam prope injectionis locum omnino fluidus & tenuis instar sanguinis, qui ex canis strangulati vasis effluit, sine ulla coagulationis nota apparebat. Catello modo in lucem edito, Garmannus (videatur Majoris *Chir. Infus. p. 103.*) infudit aliquam potiunculam Sp. Vini Rhenani, & præter solitum incalecebat, paulo post superinjecit aliquot guttas liquoris narcotici, & en! horrore percussus stupidus evasit. Elapsa femihorula de purgante paululum insperlit, & alvo soluta ad se redire visus fuit. Hæc sunt ea tentamina, quæ experiundi gratia ordinarii Anatomicorum Martyres, canes, sustinuerunt. In genere autem in Belgio observatum fuit, infusionem Diæticam, h. e. nutritionis & sustentationis gratia institutam, infeliciter successisse; alterativam verò & catharticam nunquam fefellisse.

§. 5. Progressum fuit ulterius, & quid humano valeat in corpore novum Inventum, similiter tentatum. Milites tres gregarii primi experimentum in se ipsis, ab Elsholtio persuasi, fieri passi sunt. Ulcere antiquo laborabat primus in crure sinistro, unde

aperto venæ cruralis ramo interno, & ulceri vicino, beneficio syphonis parvi aqua plantaginis injecta fuit. Alteri febris afflicto, post sanguinem per apertam medianam emissum aquæ cardui benedicti stillatitiæ cochlear unum immissum. Scorbutica cacochymia torquebat tertium, cui similiter post sufficientem sanguinis ex vena mediana extractionem aquæ cochleariæ portio infundebatur. Dantisci in Nosocomio publico militi lucæ ea inveterata cum ulceribus in tibiis, tumore brachii dextri, doloribus capitis horrendis, cum gummatis seu nodis in ossibus laborante, resinæ scammon. gr. vij. dissolutæ in Essentia guajaci ad ℥ij. infusa fuere, unde insequente vomitu subitanea omnium symptomatum 24. horarum spatio remissio, & post triduum ulcerum coalitio secuta fuit. Ancillæ vero, ab incunte ætate epilepsia gravi correptæ, resinæ gialappæ gr. vj. in ~Lil. convall. dissolutæ infusa fuerunt, unde post vomitum talis secutus successus, ut aliquot menses ab invasione libera prorsus fuerit. Radicaliter an curata sit? nescio.

§. 6. Modus exercendi hanc Chirurgiam adeo magno non indiget apparatu, nec dexteritate. Eligatur ante omnia vas, in quod injiciendus venit liquor, quod sit vel arteria vel vena, aliud haud reperies. Arteria non videtur conveniens, (licet ad partem, cui liquore infuso est oppitulandum, si illa à corde sit remotior, per arteriam ad eam extensam celerior medicamento fiat appulsio) quia in exiles arterias non sine magna difficultate potest fieri instrumenti intrusio, in majoribus verò ramis ob difficilem coalitionem, subsequenterque aneurismatis metum, periculosa est sectio. Situs quoque arteriarum profundior carnibus immersus, & sub venis occultatus, non parvum objiciet laborem; ut taceam hujus usum infusionis non ad partem quandam singularem, sed imprimis ad totam massam sanguineam esse directum; Unde primo omnium ad cor liquoris fieri debet directio, ut ex eo, ceu communi scaturigine, in omnes cæteros rivos potestatum ejus fiat distributio. Commodior ergo est vena: sed an partium superiorum, an vero inferiorum, & si illarum, an jugularis, an vero mediana, sit aptior pro infusione?

Modus
operatio-
nis.

ne? quæritur. Sane si tunc demum salutaris est expectandus infusionis eventus, quando in cordis thalamis cum sanguine permiscetur, indeque in totum corpus distribuitur, non potest non ea vena esse commodior, per quam propior ad cor patet aditus, Superiores ergò præferendæ sunt inferioribus: & licet ex hoc fundamento jugularis sit anteponenda medianæ, hujus tamen & usitatior præ illa faciliorque sectio & obligatio, palmam medianæ alterivè brachiali pro infusione relinquit. Invento sic vase pars, ubi instituenda est operatio, linteis calidis confricetur, vel vino calido, aut aqua sambuci calida, cum Spiritu Vini camphorato foveatur, hinc factâ duplici ligaturâ, primâ citra locum infusionis in superiori parte, quo venis ex impedito sanguinis motu turgescantibus facilius sit sectio; secundâ vero ultra infusionis locum in inferiori parte, ne sanguis factâ apertura copiosius effluens negotium inturbet, nisi necesse sit aliquid sanguinis emittere; tunc enim post sufficientem evacuationem ista fiat ligatura, aperiatur vena, foramine tamen digito appposito statim clauso, quod sic clausum constet, donec (quod agiler fiat) instrumentum infusorium immissum sit. Tunc soluta fascia citra injecta liquoris fiat legitima infusio, ejusque successiva partis superiora versus compressionem, promotio. Absoluta injectione foraminis fiat occlusio, sicut in ordinariis venæsectionibus usu venit, ligatura ultra soluta, ut sanguinis restituto motu liquoris infusi adjuvetur cursus. Instrumentorum alio opus non est apparatu, (præter usitatum in omni venæ sectione,) quam solo instrumento, quo liquoris fit injectio, quod vel est canalis seu tubulus argenteus in fine angustior, parumque incurvatus, cui annexa in extremitate ampliore velicula, medicamento infundendo plena, qua compressa, liquoris per canalem venæ immissum fit infusio, ut in communi clysmatum applicatione fieri solet; vel sypho quidam argenteus moderatæ magnitudinis, cujus ope per cuspidem foramine venæ immissum liquoris fit impulsio, promptior longè & expeditior, quam cum priori veliculæ compressionem, unde & hic modus illi præferendus. Tertiæ modi, vaporosi nempe, mentionem in-

Tom. II. Pars 2.

jicit D. Major *Chirurg. Infus. pag. 281.* per vasculi Clavarii aut alterius instrumenti commodam applicationem. Cum transfusione, qua sanguis non tam injicitur, quam impellitur, vel potius spontaneo motu incurrit, nobis hac vice nihil est negotii.

§. 7. Patet ex jam relatis, non ^{Facilitas operatio-} possibilem tantum, sed facilem quoque admodum esse hanc operationem, idque imprimis in homine, non adeo immorigero ac sunt bestia. Cogita, quæso, quales operationes sunt cæteræ, quæ Chirurgorum perficiendæ industria, ut sunt trepanationes, laryngotomiæ, thoracis paracenteses, herniarum sectiones, &c. Utracumque calculi extractionem, & partium corruptarum abscissionem, quam sive cultro falcato more Gallorum, sive cultro ignito more Italorum instituas, ob dolorem tamen horrendum, exilientemque sanguinis rivos, &c. rem periculosa alex plenissimam invenies. In harum consideratione ludum jocumque dicerem Chirurgiam Infusoriam, in qua nullum periculum, dolor nullus infestat ægrum; miles namque iste, cui infusa erat plantaginis aqua, interrogatus post operationem peractam, num intrusio canalis insignem dolorem intulisset? fere nullum, respondit.

§. 8. Finis, in cujus gratiam instituitur Chirurgia Infusoria, & propter quem medicamenta in venas ita infunduntur, est Medicamenti viribus infracti accelerata cum sanguine permixtione ad cor translatio, indeque per totam corporis machinam distributio, unde celerior & potentior ejus operatio. Sine ulla namque sui alteratione, quam alias in prima stomachi culina, & prolongatis intestinorum tractibus sustinet, sineque alterius humoris permixtione immediate sanguini confusum, potenter operandi exerit potentias, & sine tot meatuum canaliumque ambagibus & angustis, è quibus alias eluctari necesse habet, recto tramite sanguini, indeque cordi, infertur. Cæterum cordato & conscientioso Medico hîc imprimis observandum venit, quod Medicamentorum vis, dum celeriter in actum prorumpit, id non sine commotione singulari corporis ægri contingat, & dum infracta virtute operatur, non sine quadam vehementia

[Ppp 2]

hoc

Finis Chirurgiæ Infusoriæ.

hoc fiat. Unde non ludat imprudenter de corio humano audacter infundendo, & generosum hoc inventum stulte prostituendo. Citò sane curare debet Medicus, sed simul tutò, & quantum fieri potest, jucundè: fulcire corpus ægrum medicando, non impetu remedii nimis commovere aut prosternere, minister sit naturæ attentus & obtemperans, non (nisi raro) ejus Magister superbus & imperans; unde tentanda prius ea suadeo, quæ leges artis ratione & experientia Magistris sancitæ, secundum legitimam medendi methodum jubent, & non inconsideratè, primo quoque morbi impetu (nisi necessitatis urgeat immutabile præceptum) neglectis cæteris medicandi rationibus, usu hætenus receptis & comprobatis, ad infusionem accedendum. Consuetis vero alias & approbatis remediis incassum tentatis, quamdiu aliquantula spes vel salvandi vel liberandi citius ægrum adhuc superest, ne negligentia Medici eum perdat, quem debita ejus industria conservare potuisset, Chirurgiam hanc Infusoriam generose in usum revocet, & quo major hostis est impetus, eo generosiori remedio resistendum ipsi animosè cogitet. Suppetias scilicet cæteris remediis ferat infusio, non prima fronte hostem aggrediatur, occasionisque pariter ac necessitatis, ut in aliis medendi rationibus, ita & hic summa habeatur consideratio.

§. 9. Ratione ergò sui scopi habeat Chirurgia hæc suas Divisiones, dum primò est vel curiosa, vel salubris. Illa, quæ experimentandi fit gratia in brutis; hæc verò, quæ medicandi gratia in corpore fit humano. Secundo, salubris porro est ratione intentionis vel restitutiva seu curativa, vel conservativa seu Diætetica, vel ex his duabus mixta. Curativa est, quæ corpus ægrum per medicamentum infusum sanare intendit, idque vel proprie, vel improprie seu palliative tantum. Diætetica est, quæ alimento liquido infuso corpus nutrire & conservare nititur. Mixta, quæ utrique jam dicto scopo inservire debet per injectionem medicamenti alimentosi. Tertio ratione liquoris injiciendi demum est vel infusoria in specie sic dicta, vel transfusoria: hæc dum sanguis ex uno animali injicitur in aliud; illa dum aliquid aliud quam sanguis

immittitur, de qua in præsentiarum nobis tantum est sermo. Apparet jam, non possibilem tantum, sed etiam facilem, hanc esse Chirurgiam. Quæritur verò tantummodo de usu, quem obtineat in succurrendo corporis humani defectibus, partim quibus in affectibus sit congrua ejus usurpatio? partim quale medicamentum sit infundendum, pro obtinendo salutari scopo? Quod ut eo melius decidatur in cap. 3. propterea

CAPUT II.

*Præsupponendorum**Considerationem continet.*

§. 1.

Innumerabilem si dixerim causarum morbificarum esse exercitum, qui vitæ nostræ quotidie insidias struit, minimè me erraturum existimo; Ita ut miraculo simile videatur, vel unicum momentum hominem supervivere posse. Missos jam facio fortuitos casus, qui nos exagitent, omnem externorum insultum, aeris, cibi & potus, reliquarumque non naturalium dictarum rerum omitto vires. Saltem quot & quam atroces exsurgant, primarum viarum, h. e. primæ assumptorum alimentorum elaborationi, scoriarumque ab utili chymo separationi dicatarum partium vitio, calamitates, exactius considerarem, nisi fermentatio sanguinis, ejusque in horas mutabilis status me ad se traheret. Vix namque amplius dubitat aliquis, statum nostrum uti salubrem & floridum, ita & morbosum & languescens, ex sanguinis fermentatione, partim immediate, partim mediate, dependere: Est namque corpus nostrum instar machinæ hydraulicæ, à contento intrinsecus liquido (sanguine) diversimodè motæ, pro cujus liquoris ratione diversâ, (ex fermentationis varietate oriunda) diversimodè quoque se habet machinæ integritas & motus. Dependet autem hic particularum purpureum hoc nectar componentium motus intestinus & agitatio, qui fermentationis venit nomine, ex duplici isto Θ e, acido & urinoso seu alcali volatilibus, quorum solutorum concursu, & in se invicem actione, reliquæ quoque particulæ nimis commoventur & agitantur. Actio hæc Θ ium istorum in se mutua oculis conspiciendam se præbet, estque satis manifesta,

Præsup-
positum
I. Fermentatio-
nem
sanguinis
esse fun-
damentum
status
salu-
bris &
ægru-

Fermen-
tatio ra-
men cum
efferve-
scentia
non con-
funden-
da.

nifesta, quando, dum pura seu impermissa aliis principiis existunt, effervescentiæ excitant impetuositates: sed in fermentatione magis occulta eorum est pugna, ob intertextum aliarum particularum simul agitarum, &c. Non rejicio hoc loco probabilem valde eorum sententiam, qui in cavitare cordis sinistra fermentum quoddam ponunt vitale, spiritibus vitalibus imprægnatum, & vitaliter illuminatum, *quod transmutati cruoris (venosi) in sanguinem (arteriosum) est causa sufficiens, prout sanguinis in spiritum vitalem transmutationi præest, ut loquitur* Helmont. *Blas Human.* §. 22. Quod fermentum jam in ovi puncto saliente radicum, ob spirituum abundantiam, Θ ium volatile esse, omnino mihi persuadeo, ut sicut in chylicationis culinâ summus coquus est de Naturâ acidâ volatili, ita in sanguificationis, & renovatæ in sanguine fermentationis, officinâ Θ ium volatile & luminosum, ceu præses summus, prævaleat. Est tamen, ut omnium aliorum, ita & hujus fermenti potestas, licet mirabilis, tamen limitata, ut sanguinem certo modo requirat prædispositum pro receptione debitæ suæ activitatis, (cum non quidlibet agat in quodlibet) quæ præcedanea sanguinis dispositio à Θ ium istorum duorum, acidî & alkali volatilium, conditione dependet, quos (fermentum cordis) instar fermenti pistorii in farinaceâ massa excitat ad fermentationem, certumque fermentationis characterem vi sua Θ inâ volatili simul iis inprimit, unde his duobus Θ ibus legitimè se habentibus, debita sanguinis fit fermentatio, spirituum vitalium fit elaboratio & illuminatio, totiusquæ microcosmicæ Reipublicæ aureum nunc viget seculum.

§. 2. Sed turbatâ istâ Θ ium horum harmoniâ & læsâ hujus sanguinis fermentatione, heu, quantæ procellæ in continenti corpus nostrum obruunt! Aut imminuitur enim & deficit ista sanguinis fermentatio, unde chronici quam plurimi exurgunt morbi, Cachexiæ, maculorum pariter & foemellarum, leucophlegmatix, anasaræ, &c. & spiritibus non ritè exaltatis nec elaboratis actiones omnes languent, torporquè profundus obsidet membra, & succus alibilis recens apportatus in viscidum facef-

fit liquamen, pituitæ excrementitiæ nomine, à Veteribus appellatum, sanguisque tandem periculosè concrefcit: aut aboletur, quod seu pedetentim seu confestim fiat, quid, nisi syncope, virium extremas prostrationes & mortem ipsam denique affert: aut augetur impetuose, unde ardores corporis, intumescentiæ, rapidus sanguinis motus, inquietudines, febres ardentes, pleuritides, angina, morbilli & variolæ, &c. alique hujus generis affectus: aut depravatur vitiosè, quod ut mille modis fieri potest, ita & mille inducit calamitates; hinc namque uterinorum affectuum, passionis sic dictæ hysteriæ, scorbuti, lèteri, luis &c., &c. fœcunda seges. Omnia hæc vitia, unde, nisi ex Θ ium in sanguinea massa ametria & vitiata harmonia derivanda erunt? Nunc enim ambo non ritè ab aliis particulis commistis temperata sunt, unde nimis acria impetuosam effervescentiam concitabunt; nunc ab aliis nimis obruta deficientem reddent fermentationem; nunc unum alterum multum præponderabit, unde ab acido quod subito toti erit hostile & venenosum, periculosa sanguinis concretiones, indequæ fermentationis notabiles defectus, testibus canibus, ex acidorum infusione ob coagulum sanguinis expirantibus, de quibus suprâ c. 1. §. 4. sicut quilibet sanguis recens emissus acidi affusione concrefcit: ab alkali verò insignes sanguinis dissolutiones, omnimodæque fermentationis abolitiones: ab utriusque tum inter se, tum cum aliis commistione, mirandæ sanguinis alterationes, ob fermentationis depravationem. Indicibilis namque hinc emergit Θ ium varietas; siquidem quot sapor, tot adæquatè Θ ia, totque simul diversa fermenta: acidum nunc est vitriolicum, nunc Π osum, nunc Υ osum, nunc Θ ium simpliciter, nunc Ψ osum, nunc austerum, nunc acerbum, nunc alias saporum monstrat differentias: alkali nunc est subtilius & acrius, nunc ol. temperatius, nunc amarum, nunc penetrans adstringens, nunc moderatè dulcescens, nunc alias innominatas & anomalas monstrat differentias: hæc nunc inter se, nunc cum aliis diversis mista, contemperata, exaltata, immutata, quas non alias prodent differentias, sub Θ si nomine venientes? Quas non

[Ppp 3]

diver-

diversas excitabunt fermentationes? Quot, quæso mutationes, & in sapore & in cæteris qualitatibus exhibet multum, dum fit vinum, & dum per reiteratas fermentationes degenerat in acetum? hinc l. denuo aut rancescit, aut vaporescit, aut in vermes abit, &c. unde Θ ium differentias ex alia atque alia contemperatione & compositione cum aliis particulis, & inde fermentationum vicissitudines varias, vel manu palpare poteris. Idem in sanguine fieri cogites, in quo varix istæ Θ combinationes, & sym-vel ametriæ, quotidie fere ejus statum mutant, & conditionem alterant. Quanta namque assumptorum diversitas, tanta saporum in succis nostris alteritas, & fermentationis varietas. Non equidem me latet suprema fermenti stomachici potestas, omnia assumpta sub acoris dominio in Θ ium volatile, tandem bilis adjumento concurrente transmutantis; sed & hoc scio, fermentum hocce singulis ferè prandiis & cœnis sub saporum cæterarumque qualitatum suarum latitudine insigniter variare: imò multas qualitates quorundam ciborum illæfas pertransire stomachi angustias, imò sæpius hoc contingere, ut vel acidum nimis, vel non ritè volatilifatum, vel viscidum, vel ratione alia deficiens, ex stomacho per pylorum effluat alimentum, in intestinorum verò gyris tum ab acido pancreatis stagmate, tum ab amaro & urinoso bilis liquore, varias alterationes & saporum ac proprietatum differentias suscipiat. Silentio prætereo hic exotica fermenta, quæ sub contagii forma in nos irruunt & fermentationis in sanguine motum naturalem, mirum quantum turbant: sunt namque & ipsa de Θ ium prosapia, nunc alkalium volatile, unde febrium malignarum, petechialium & pestilentialium; (de quibus vid. Paulli *digress. de febr. malign.*) nunc acidorum, unde scorbuti, luis &cæ, dysenterix epidemicæ, multiplicativa propullulant germina. Ingens hæc Θ ium varietas, sub duplici, Urinosi & acidi in Θ so conjuncti, vexillo militat, eam tamen sub unitatis numerum Θ is cujusdam primi, alii revocant. Omnis autem (in genere) quæcunque salium varietas ex principiis mechanicis, magnitudine scil. figura, textura & motu, tum sui ipsius, tum aliarum, cum quibus

coaluere, particularum definienda venit.

§. 3. Præter fermentationis hæc ^{Præsuppositum II. Eurorem archeturi bare actiones.} læsiones, & spiritus vitalis sanguinis primarius incola, & Oeconomus nostræ vitæ, interdum suas graves quoque patitur exorbitantias: *sæpiusque*, (cum sit impetum illud faciens Hippocr.) *impetuosè nimis agitur, rapideque nimis commovetur, unde ingens actionum animalium imprimis* (ab hoc spiritu ceu primo rectore dependentium) *perturbatio succedit*. Quocunque enim modo à causa aliqua occasionali lædatur (irritari dicunt multi cum Galeno, in furorem agi loqui amat Helmontius) mox extravagantiis suis insolitis totam nostram perturbat Oeconomiam, hinc scil. phreniticorum emergunt deliria, hinc vigiliarum inquietudines, hinc convulsivæ membrorum contorsiones, & epilepsiæ Herculei insultus, hinc tenebrosæ vertiginum obscurationes: ut non dicam de enormi ejus in omnes operationes dictaturâ, dum Idearum sequitur ductum, sive ab extrinsecus advenientibus peregrinis pingatur, sive graviorum ex affectuum eas interno concipiat motu; harum enim consideratio ad hunc locum non pertinet.

§. 4. Fermentationum ista vitia, & Archei perturbationes, ut corrigantur, promptum sæpè & tantum non præsentaneum postulant remedium, quodque, quantum fieri potest, intemeratis agendi potestatibus agat, quod agere debet. Et fermentationum quidem labes, qua ratione melius quam Θ ino emendabitur remedio, modo sine sui immutatione sanguini permisceatur, quod dum per os recipitur, vix sperare licet. Magnas ^{Præsuppositum III. Medicamenta in primis viis multum alterari.} enim alterationes, sæpè & virium jacturas, subeunt fere omnia assumpta in primis stomachi & intestinorum viis, tardoque gradu in mensesenterii & thoracis lacteis ad cor prorepunt. De hoc quis dubitare velit, qui stomachici fermenti varietatem quidem, (licet ut plurimum acidum volatile vel sit vel naturaliter esse debeat) simul tamen & menstruaalem solutivam ac fermentalem transmutativam perpendit potentiam? unde in pultaceum transmutata alimenta cremorem, quidquid antea obtinebant, facultatum deponunt. Tantam talemque alterationem non quidem in medicamentis

mentis fieri putandum, insignem tamen eam esse (habita tamen preparationis ratione, qua ea nunc magis nunc minus patentia, reluctantur illi menstruo) eorum cum alimentis medicamentosis analogia, dum plurima ex vegetabilium petita classe, nonnulla ex animalium genere hausta, facile persuadet: imprimis cum superatis fermenti stomachici molestiis, duos adhuc in intestinis obvios habeant Dracones (ut eleganter dicuntur à Tackio *Orat. de Chrysog. animal. & mineral. p. 16. 17.*) Orientalem unum, lixiviali oleoso Θ e imprægnatum, Occidentalem alterum, acido Θ ino menstruo armatum, cum quibus ipsis denuo pugnandum est. Ut silentio præteream lymphæ miscelam in receptaculo communi, unde nova ipsis accedit impressio, adeo ut quædam assumpta per se indifferentia, in primis viis ex istorum succorum concursu, forte & connexu, demum in medicamentum abire videantur. Mineralibus generosior quidem est animus, & non adeo facile diætorum succorum potentiis auscultant; illibatis tamen ea procedere agendi viribus vix sibi persuadebit, qui ea non secus ac omnia cætera medicamenta pro varietate subjectorum varias exserere vires (de ordinariis loquor remediis, quæ tyrociniorum & Chymiarum proponunt compilatores; nam de majoribus arcanis, & iis, quæ diffusionem radiorum operantur, aliter pronuncian- dum, de quibus inferius) dum ea nunc citius, nunc tardius, nunc fortius, nunc debilius, aliove modo varie operari, Θ emque eundem nunc adstringere, nunc laxare, observat. Ex succorum namque horum Θ inorum virtute contingit, quod non tantum in diversis subjectis, sed in eodem unum idemque medicamentum varias exerat virtutes, dum v. g. eadem pilularum dosis nunc multum, nunc parum, nunc nihil operatur, quod ex fermenti stomachalis majore vel minore acore purgantium vegetabilium vim, in Θ e volatili acri consistentem, figente oriri facile patet ex eo, quod canes, ut supra §. 4. cap. 1. demonstratum, difficillimæ sint purgationis, per medicamenta ore assumpta, cum teste J. D. Majore in *Chirurg. Infus. prodrom.* grana xxiv. vitri δ ii pulv. nullam dejectionem in ca-

ne produxerunt, cujus tamen vel 3. grana supra & infra, non sine periculorum symptomatum concursu, nostrum corpus exagitant. Quale autem acidum in stomacho canum resideat, vel ossium deglutitio & in ventriculo dissolutio abunde demonstrant, unde & purgatio per venam injecta, qui à stomachi acore non fuit infracta, cito & potenter in cane operatur. Simili modo ii ægri, qui melancholici, ut dicunt, sunt temperamenti, vel melancholicis laborant affectibus, &c. h. e. in quibus acidum abundat (nam melancholia Hippocrati est acidus humor) difficilis sunt purgationis; unde & spiritus Vitrioli omnium purgantium vim aut immittit, aut planè tollit. Eadem ratio est cum opio, cujus oleosum volatile sal ab acido fixatum omnem narcoticam & somniferam deponit virtutem, unde & canum vigilantia vix ejus ingenti dosi potest debellari ut *supra c. l. dictum*. Hinc etiam melancholicis phantasmatis obnoxii ob acidum in iis abundans, præter alias causas, ab opio vel non, vel difficulter, ad somnum deducuntur. Venena animalium innoxie assumi notum est, eaque ex perturbationibus oriri, Helmontio acutè docente, hætenus à multis creditum fuit, unde & morsu tantum lethalem inducant noxam. Sed modernorum Italarum, imprimis D. Redi, *Archiatri Florentini*, experientia manifestat, in viperis liquorem salivalem in dentium vesiculis contentum, expressum, in quocunque liquore assumtum, innoxium esse; sin verò vulnere vel levi tantum cutis incisuræ illinatur, seu ex viperâ vivâ, seu quocunque in statu, mortua fuerit desumptus, lethum indubitato inferre, frustra etiam applicatò decantatò isto serpentino lapide, ex pileatis serpentibus confectò, quod prætertract. de hac materia impressum ipse Autor frequenti experientia confirmatus, mihi sanctè affirmavit, cum aliis quibusdam de hac materia, quæ timor abusus hic scribere prohibet. Unde & Celsus, *Venena animalium non potu sed vulnere nocere*, scitè docet. Hinc & Pfylli secure venenum quodcunque ex vulnere, à venenato animali influcto, exfugere valent, sed si levem quandam oris habeant læsionem, vel parvam exulcerationem, suctu isto intoxicantur. Unde quæso illius

illius rei ratio petenda esset, nisi succorum in primis viis stabulantium activitas venenorum quoque eludat alias insignem energiam? & quid de salivæ adversus animalium venena efficacia dicatur, ceu omnibus notum hic relinquo. Quare & ob horum succorum diversam rationem fastidit, & non sine singulari læsione assumit istud medicamentum unus, quod alius ceu Ambrosiam exoptat, licet per consuetudinem vel longam annorum seriem, alteratis succis istis, idem postmodum sine alteratione assumamus. Balsamum illud omnium florum, Mel, à Democrito ad vitam longam internè maximè commendatum fuit, unde & senibus illud præscribit Aetius, propterque singulares dotes jam Pharmacopœorum magis quam coquorum ornat officinas, unde & sunt, qui Mulsam ob salubritatem vino præferunt. Sed in quibusdam propinatum mel, vel quædam mellita, ingentes stomachi inflationes, tormina, cordis angustias, aliaque huiusmodi symptomata concitare videbis, quibus scil. à succis istis, melli adversantibus, tantæ excitantur effervescentiæ: id quod de saccharo, quod tamen cum \odot & ψ tam elegantem consanguinitatem fovet, in hypochondriacis similiter ad oculum patet; quæ si de sequiori sint sexu, suffocationis uterinæ dictæ patiuntur turbulentias: quot econtrà & quantis in summis deliciis positum est saccharum? Quibus nempe succi isti blandè & Naturæ consueto modo operantur. Ordinariæ sanè Medicorum sunt querelæ, medicamentum propinatum uni salubriter, sine fructu esse applicatum alteri, imò interdum noxas intulisse huic, quod illi panacæ vice fuerat, iisdemque licet conflictati fuerint ægritudinibus. Tanta succorum horum in primis viis est vis, in alterandis partim, partim & imminuendis medicamentorum facultatibus; unde eò meritò incumbendum sedulo, ut (in gravioribus in primis vel contumacioribus affectibus) sine istius alterationis susceptione immediatè eò portentur, ubi eorum requiritur adjuvmentum. Quod si medicamentum immediatè sanguini permisceatur, idem sine ulla sui alteratione operaturum vix credo; unde & infusa quædam medicamenta non immediatè, sed certo interjecto temporis spatio,

vires exeruere suas: sed gravem illam & adeo notabilem in primis viis nunquam experietur, unde & medicamenta, quæ canem per os non purgant, nec narcosin inducunt, injecta tamen feliciter operantur. Cum econtrà medicamentum in primis viis jam non leviter immutatum, eandem tamen in sanguine sustinebit alterationem, quàm idem immediate infusum.

§. 5. Adhæc dum in sanguinea massa spiritibusque ipsis altius radicatum est malum, sævisque sæpius & periculosis Paroxysmis se prodit, longa nimis assumtorum est mora, antequam cum sanguine commisceantur, ut novas Naturæ succumbenti ferant suppetias. Viæ namque, quæ cognitæ hætenus sunt post Oesophagum & stomachi cavum, longæ & implexæ intestinorum circumgyrationes, per quorum porulos in lactearum ramulos transfudat remedium, & exinde per glandulas ad receptaculum commune abit, unde cum lymphæ ex partibus inferioribus ascendente (falsitatis enim jam satis convicta est Bilsii de motu rotis sententia, tum per lymphaticorum ligaturas & valvulas, à Ruyisch. detectas, tum per J. H. Pauli Anatomen) per communem lymphaticorum truncum ramo axillari cavæ infusum, ad cor demum descendit; deferri namque aliquam contentorum in intestinis partem, ad hepar, experimentis nondum comprobatum est. Quæ medicamenti mora eò erit periculosior, motusque tardior, si medicamentum per se non sit mobile seu volatile, & penetrans, sed potius fixum, terreum aut concretum; unde eo tardius movebitur, faciliusque hinc inde adhærescendo, longiores multo moras necdet. Præterea, quasdam ejus partes ad loca Urinaria ex mesenterio ad uterum in gravidis, ad mammas in lactantibus, abire valde probabile à modernis est redditum. Urgente E. necessitate debile tardumque auxilium afferunt per os assumpta medicamenta, quæ tamen per se alias satis sunt vigorosa.

§. 6. Sunt namque stupenda medicamentorum, etiam simplicium, potestates, quæ in sua simplicitate sunt sufficientes ad sanationem omnium morborum, modo legitimè ab artifice cognitæ, ab ergastulis concreti, quibus sæpè devinctæ latent, liberentur, ut ad majorem operandi

Præsup-
pos. IV.
Variare
admo-
dum me-
dicamen-
ta secun-
dum ope-
randi ra-
tionem.

liber.

libertatem deductæ feliciter operandi virtutes mirabiles & multifarias pandere queant. Hoc namque certum est, magnam in medicamentis, quoad operandi modum, esse varietatem. Non considerabo subiecti, in quod agere debent, in horas mutabilem statum, de quo supra, nec præparationis necessitatem, secundum quam propriæ virtutes nunc in lucem protrahuntur & exaltantur, adjunctorum concrementorum sæpius sepultæ sub cortice, nunc verò valdopere alterantur & immutantur, qua ratione chymica quamplurima artis potius quam Naturæ vi nativa agunt. Sed modum, secundum quem simplicia (de compositorum enim inutili & pomposo apparatu nil dicam) operari videntur, quantum præsens requirit negotium, considerabo. In genere verò nunc corporali agunt contactu, hoc est, materiali suarum partium cum succis nostri corporis, inprimis sanguine, connexu & miscela, nunc verò virtuali tantum operantur virium diffusionem, & radio veluti vel aspectu sui, quod occultarum vulgo qualitarum imaginariæ adscribitur potentia.

Quædam
operantur
virtuali
facultate
diffusione.

Hoc posteriori quæ agunt modo, eis imprimis succurrunt affectibus, qui vel ab Archæi emanant fonte, vel ab ejus potenti curantur dominio; in quem virtutes suas exerunt, vel idearum suarum Tincturam imprimendo, vel novam ideam exuscitando, vel radiativa sua vi illuminando, vel odore suo eum delectando & exuscitando, vel sub amuletorum forma insensibiliter influendo. Legantur ea, quæ solito acumine Helmont. *Tr. de Verbis, Herbis & lapidibus*, de 9io in ▽ macerato ejusque diffusa vi discribit; item de vi radiativa sulphurum metallicorum benedictorum, utpote quibus correctis ac perfectis tota morborum cohors auscultat (de quibus videatur Polemann. *de sulphure Philosoph.* ut & observatu dignissima cura à Sebastiano Bartholo, *Pro-Regis Neapolitani Medico*, anodyno ex sulphure 9is peracta, cujus relatio annexa prostat ejus *Traſſatui Exam. dogm. Art. Medicæ*) ut & de singulari virtute, quam nudus contactus lapilli Butleri olei olivarum integræ lagenæ communicavit, *Tr. Butler.* Multa namque sunt, quæ sub minima mole & pondere ingentes producant effectus, vixque deglutita

Tom. II. Pars 2.

stupendas subito exerunt energias. Merito hic consideranda venit bufo- num hoc in genere magna virtus, quam externo usu tantum præstant, dum omnem quæcunque Hæmorrhagiam fortiter compescunt (quod similiter umbilicus marinus ex lapidum genere cum saliva ex averſa parte applicatus præstat) & urinæ incontinentiam quæcunque, etiam ex vesicæ dilaceratione ortam, corrigunt, teste Heer *Observ.* 14. & repetita Anglorum experientia, perfectumque pestis Xenexton constituunt. Osficulum ejus non dentium immanes odontalgias tantum sedat, sed & pulsibus infantum applicatum insultus eorum epilepticos sistit, ex affectibus nutricis enormibus contractos. Uf- nea manu detenta sanguinis ex secta vena impedit eruptiones. Manus longa tabe, vel etiam alio morbo interempti cadaveris suo contactu ex- crescentias tollit, quod Helmontius primus docuit, & Angli aliquoties feliciter experti sunt; uti manus mortui infantis maculas nævosque mater- nos delet. Odores quid valeant? no- tum est; quis enim non observavit aromatum odores duntaxat gustato- rum contestim lipothymicos reficere, & debilitatos roborare? unde sapiens Democritus odore panis vino asperſi labentem jam vitam ad aliquot dies sustinuit: moschata suffocationes ex- citant muliebres, quas castorei odor tollit, & graveolentia sæpius sopitas revocant epilepsias. Sunt nempe odores, qui dolores capitis, nausæ- am, vomitus, tussis, singultum, ver- tiginem, epilepsiam, apoplexiam, dysenteriam, movent, atque sui con- tagio inurunt. Suntque idcirco & alii qui consimili modo eadem sanant, aut saltem mitigant, si radicem fixio- rem habeant, ut experte loquitur Helmont. *Tr. Imago fermenti im- prægnat massam semine* y. 20. Non destituuntur quidem corporeis efflu- viis odores, sed eorum corporeitas nil facit ad hos effectus; nam quic- quid agunt, odoriferâ inducunt im- pressionem, sæpiusque, sine ulla in na- ribus alteratione Archæum tamen af- ficiunt: Sic enim pestilens odor nati- bus non perceptus archæum horrore quatit. Multa dicenda restarent de Amuletis, eorumque influentiis, (ut- ut quædam sint ex his, quæ & iuas emittunt Aporrhæas) & insigni jaspidis, æthi.

[Qq]

æthitis, bufonitis, corallii, saphyri, hæmatitis, persicariæ, pæoniæ, scrophulariæ, Vincæ Pervinæ, sambuci è salice, ungulæ alcis, dentis equi marini, corii serpentum & humani, &c. efficacia; nisi ad alia properarem, cum omnia ea medicamenta, quæ virtuali potestatum agunt radio, ad Infusoriam Chirurgiam nihil faciant, sed potius, quam diu optatos præstant effectus, ejus praxin omnino excludant. Plura qui cupit, elegantissimum citatum supra legat Helmontii *Tractat. Ut & supra citat. Tractat.* Bartoli *Exerc.* 10.

§. 7. Ad ea ergò, quæ corporali agunt contactu, actuque sanguini materialiter sese immiscant, me converto, eaque sub saporum forma se nobis præcipue manifestare, reperio, licet & alias habeant proprietates, secundum quas multipliciter operari soleant. Saporum Iverò imprimis differentias notat Helmont. unum nempe, per quem res sunt acres, amaræ, falsæ, quem sentit salium esse dignitates & officia; alter verò est specificus, semini nempe appropriatus, vel seminalis. Medicamenta ergò, quæ saporum sub forma, h. e. salium suorum virtute, in nos agunt, ea contactu corporali succurrunt nobis, quatenus nunc noxia, causas nempe occasionales, tollunt resolvendo, abstergendo, exhalando & expellendo, quæ proprietates salibus sunt congruæ; nunc quatenus læsam in sanguine fermentationem corrigunt & emendant, quam à salibus ortam, salia quoque conservant & restaurant. Hinc generali vel acris vel acidi sapore se contrariam vim salinam infringere testantur remedia, quatenus verò specificus concurret sapor, ejus singulari corruptioni vel alterationi in corpore succurrere manifestant: v. g. sub communitate acrimoniæ volatilis specificè cochlearia & nasturtium scorbutico, fumaria iëtero, centaureum minus febribus, cappares & fraxini cortex splenibus; conducunt, &c. de quo vid. Tachenii Hipp. Chym. Metiri quidem caloris & frigoris gradus per sapes nituntur scholæ, ceu proprietatum cunctarum opifices; sed notanter Helmontius disserit *Tr. Dispensat. Modernum* §. 16. *Tandem & singulis rebus specificus sapor, qui proprietatem deberet docere, si quid aliud externorum signorum.*

Est nempe præter acuitatem Cinnamonum peculiaris gratia in sapore, quam in ullo vix reperies simplici. Sic gentiana, enula campana, &c. præter communes amarores specificum saporem habent, qui subter regulas ob singularitatem propriam quorumcunque simplicium redigi nequit, solusque proprietatum singularium est accusator & distinctor. Oraculum sanè Hippocratis *lib. de veteri medic. apte inculcat, non calidum, frigidum, humidum, aut siccum esse, quod magnam agendi vim habeat, verum amarum & salum & dulce & acidum & insipidum & acerbum, quæ contemperata nulla molestia nos afficiant; dum vero secreta per se extiterint, nobis nocent.* Quæ omnes saporum saliumve sunt proprietates. Quid mirum ergo erit, si contrariorum specificorumque saporum potentiis curentur à salibus & saporibus inducta mala? Rem in animalium & vegetabilium familia se ita habere apertum est, in mineralibus quam plurimis, imprimis quæ de salium aut sunt profapia, aut ipsis cognata probatione quoque non eget. In metallicis paulo difficilius videtur negotium, sed multa ex his, imprimis fixa & quasi terrestria, ad salium classem revocari possunt, dum lixivialium fere imitantur naturam, acidum quodvis p. n. absorbendo, & sudores pariter ac urinas sic provocando. Sed majora ex iis parata arcana separatione preciosi nuclei à duro concreti cortice sunt vera specula lucentia, quæ ita vim habent penetrandi, illuminandi que Archæum à suis erroribus, furoribus, atque defectibus, quod illum restituant in nitorem Tincturæ totalis perfectionis, ut loquitur Helmontius *cit. loco*, de quibus nihil in præsentiarum est, quod dicam, cum iis instructus non opus habeat Chirurgia Infusoria, cum illorum vis & operandi promptitudo sufficienter Medicum nobilitet, speique ægri abunde satisfaciat.

§. 8. Cæterum in medicandi virtute ex salibus volatilia cæteris palmam præripiunt, sive in nativis existentia ingerantur cum cæteris concreti partibus mista, sive, quod melius, ab iis separata per Chymica artificia, forsan & alterata, scorsim applicentur. Sulphura sanè & ipsa, & quæ eis cognatæ sunt naturæ, multa præstant; sed ipsa ut plu-

Salia volatilia cæteris medicamentis sunt potentiora.

ut plurimum etiam salibus maritata reperiuntur, vel iis saltem amicè admodum se jungunt. Jungunt sese sane libentissime alkalibus, tam fixis artificialibus, quam volatilibus naturalibus, subtili mediante acido, quod in se gerunt, sicque volatilium potentias partim temperant moderatè; partim quodammodo exaltant, ipsaque sub nativa sua pinguedine digestionem nostræ reluctantia, connubio istorum nobis fiunt magis appropriata. Præprimis alkalia fixa, quæ sulphuris, h. e. acidi obscuri, cum volatili fiunt colliquatione, si volatilifentur, magnorum Pharmacorum adæquant potestates. *Quippe vi incisionis, resolutionis, & abstersionis, delata ad linimentum usque quartæ digestionis tenacitatem coagulatorum in vasis fundamentaliter tollunt*, attestante id Helmontio, inter quæ alkali Tartari volatilifatum præminet, dum ad succedaneas liquoris Alkahest dignitates accedat. Quod si alkalibus istis adiungantur olea destillata propria, debitaque circulatione abeant in Elixiria parva mirabilia, (ut ea vocat Tachenius pag. 37. & 155.) efficient in magnis morbis, quod de illis speratur, dum sese in prima nostra constitutiva ingerunt, de quibus videatur Helmont. *Tria Chymicorum principia &c.* §. 84. quorum cum non unusquisque possit esse possessor, imprimis cum præter occultam digestionem etiam singularis vasorum apparatus à quibusdam requiratur, quæ duo sanè tam ad fixandum quam volatilifandum plurimum præstant, à modernis ceu succedaneum substituitur sal volatile, ut vocant, oleosum seu aromaticum, in quibus partes aromatum volatiles oleosæ, vel eorum plantarumque aromaticarum olea destillata, beneficio S. V. salii volatili & ci juncta non contemnenda in quamplurimis affectibus exhibent remedia. Sed ut ad scopum jam redeam, & de utilitate Chirurgiæ Infusoriæ quædam disseram, succedit in

CAPUT III. Conclusionum de Chirurgiæ Infusoriæ usu applicatio.

§. 1.

Totum negotium, quod de Chirurgia Infusoria adhuc viget, est de ejus usu, quem medicando præ-

Tom. II. Pars 2.

stare valeat, quibus scilicet in morbis conveniat, & quisnam liquor sit infundendus. Prioris decisio est facilius longe posterioris determinatione, cum nondum experientia satis demonstratum sit, quid quodlibet medicamentum immediato sui contactu in sanguine agat; ut taceam ipsius sanguinei liquoris obscuram adhuc valde crasin. Nihilominus tamen paucis conclusionibus animi sensa, idque generaliori saltem discursu prodam, salvo interim aliter & rectius forte sentientium judicio.

CONCLUSIO I.

Chirurgia Infusoria legitime administrata per se semper est utilis, interdum etiam necessaria, sed debito tempore applicanda est.

§. 1. Applicatur eo scilicet fine, ut cito & potenter operetur, hoc est, de-
fectibus nostris succurrat medicamentum, ut supra cap. I. §. 8. dictum: qui scopus per se salutaris & exoptatissimus est. Quod si observentur necessariae conditiones, & debita circumstantiæ, tam ratione ægri, quam ratione medicamenti, quibus nempe in morbis, & quo medicamenti genere, quave dosi, &c. conveniat: non potest non emergere exinde sperata utilitas, & per se nihil evenire mali. Quod ut de omnibus in genere medicamenti verum est, ita quoque de infusione valet.

§. 2. Continget vero interdum, ut & necessaria videatur infusionis celebratio. Cogitemus enim ægrum, cui vel ex paralyti, vel etiam convulsione musculorum & fibrarum nervearum œsophagi, omnis ablata est deglutiendi quicquam potentia, tam in quam extra apoplecticos aut epilepticos vel uterinos insultus: vel cui ex vaporibus Vitriolaceis & stypticis in hypochondriaco & scorbutico affectu loquela (id quod in JCto quodam observavit D. Michaëlis) & simul deglutiendi facultas aufertur: id quod etiam ex infuso radicis lymphiti majoris epoto fieri, observavit Hochstetterus *Decad. 3. cap. 5.* Vel observemus, quando fauces præclusæ sunt, aut tonsillarum tumore, aut partium vicinarum, imprimis laryngis & œsophagi musculorum inflammatione in angina in qua vel pro aeris transitu interdum arteria aspera in Laryngotomia perforatur. Et posito esse apertas fauces,

fauces, tantus tamen horror sæpius invadit ægrum, ex aspectu solo remedium, ut quodcunque potius patiatum malum, antequam vel tantillum, suaveolentis licet & insipidi, degustet medicamenti, ob id tantum, quod pharmacopœam oleat, in quibus etiam isto horrore adco ligatum est sæpius ventriculi orificium, ut nihil omnino admittat, aut si admittat dicto citius denuò superiora versus rejiciat. Familiare quamplurimis in morbis est symptoma obstinatus vomitus, ut quicquid ingeritur, in momento denuò emittatur. Quid dicam de Lienteria, in qua omnia assumpta, & sic etiam medicamenta, sicut deglutita sunt, brevi post per alvum excluduntur? aut coeliaco affectu, in quo assumpta in ventriculo alterata quidem, sine ulla tamen heterogenei ab eo, quod Homogeneum nobis est, separatione, & pervasa in corpus distributione egeruntur, vitio vel ductus, per quem biliosus pancreaticusque succi destillant in intestina obstructi, vel ob infarctus vasorum lacteorum, à mucopituitavè viscida illa copiosiore & crassiore, qua ordinariò intestinorum parietes oblinuntur. Forsan & D. Majoris suspicio locum habet, dum ex adstrictione osculorum vasorum, in intestina hiantium, vi medicamenti acidi & Vitriolici distributionem medicamenti omnem impedire asserit. His similibusve in casibus si malum urgeat, externa verò remedia sint nimis imbecillia, ut & interna, (quod frequentissimè obvenit, idque ob alterationes, quas suspiciunt in primis viis, vide supra *cap. 2. §. 4.*) quid tentare aliud poteris, nisi Infusoriæ Chirurgiam? vel si omnibus aliis frustra tentatis ad extrema perventum sit, ita tamen, ut nondum mors fore pulset, nihil tamen appareat, quod fieri debite possit; uno verbo: si pro deplorato habeatur æger, ne cum relinquo, extrema potius tentes in extremis, unde Chirurgia hæc tunc maximè necessaria erit. Rectè enim Fracassatus, *citat. supra loco pag. 425. deploratos eam respicere morbos*, asserit.

Applicandi tempus
sit status
morbi.

§. 3. Sed dum adhiberi debet, observandus est imprimis temporis articulus. Occasio nempe est præceptus, Autore Hippocrate *sect. 1. Aph. 1.* quâ semel clapsâ, à posteriori eam ob ejus calvitium nunquam deprehende-

re poteris. Hac ut omnis medicationis constituit animam, ita in specie in generosiorum medicamentorum usu, ad quæ & Chirurgicæ infusiones pertinent, strictissimè observanda venit. Si ante conveniens tempus eam administras, quid aliud agis, quam quod naturam turbas & perturbas, fermentationemque acriorem & vehementiorem efficis, naturamque adeò non leviter prosternis? Sin, elapso convenienti momento, tardius advenias, naturæ jam succumbenti frustra manum porrigis, quam apprehendere nequit, Archæumque frustra exsuscitari studes jam sopitum. Non ergò in agonizantibus conveniens ejus est usus quocunque in statu sit negotium, nisi sub agonis vocatus sis extremitate, & tunc non nisi prognostico bene munitus, negotium aggrediaris. Necessitatis tempore ergò in agonizante eam celebres, non verò tempore commoditatis seu electionis, quando scil. adhuc deliberare potes, quid factu opus sit. Quid enim facies in agone, ubi natura jam prostrata & non cooperante frustra sunt omnia, fermentatione sanguinis jam verè abolita, aut ob nimiam ejus dissolutionem ex abundantia alkali seu volatilis, vel nimiam coagulationem ab acido peregrino, vel nimiam crassitiem ex defectu diluentis feri, qua ratione novam suscitabis fermentationem, scilicet vitalem, ubi liquor est ineptus ad ejus susceptionem: aut si fiat motus in sanguine revocatus, hostilis potius erit effervescentia, quam debita, & sub Archæi Dominio gubernata fermentatio. Et dum jam in labiis extremis residet diffugiens vita, qua ratione certus es, eam operationis expectaturam successum. Ut raceam diffamari sic injuste generosi remedii potentiam, non secus ac abdominis hydropici paracenthesis ob tardem nimis, quod fere semper usu venit, administrationem apud multos infamiam, apud quamplurimos in defuetudinem abiit, testantibus hoc gravissimis Autoribus. In tempore ergo infunde; Nisi agonizantis vocem latius extendere velimus, eosque pro talibus habere, in quibus multa egregia remedia frustra jam adhibita, dubiam ad minimum faciunt spem, modo non exitium futurum prænuncient, quo sensu aliquo modo tolerari potest in agonizante infusio.

infusio. Temporis autem ut observetur convenienti momentum, distinctionis morborum in acutos & Chronicos habeatur ratio. De Chronicis, utpote inducias dantibus, & longâ morâ sævientibus, res est facilis, eos non deposcere infusionem, nec in principio, nec incremento; sed tantum maturo in statu, dum usitatis & canonicis incassum adhibitis remediis malum ob id non tam remittat, quam indies magis sæviat, tunc sine periculo fieri potest, sine mora fieri debet, infusio. Quod si paroxysmorum habeant vicissitudines huiusmodi affectus, iisque sint truculentiores, nec facile aliis succumbant armis, non obstat sane, ubi symptomata urgent, in principio vel incremento paroxysmi particulari, instituere infusionem pro tollendo symptomatum impetu, licet forsân incrementum morbi vel principium sit universale. Sunt namque huiusmodi paroxysmorum vicissitudines veluti morborum acutorum particularium, in Chronico universali intervenientium intervalla, quæ violento impetu & ingentibus symptomatis urgent celer simulque potens remedium. Quod si morbi sint acuti, in his certè vel quodlibet temporis momentum est admodum pretiosum. Fermentationis tamen in sanguine in his habeas rationem, observando, an ea sit talis, quæ quando heterogeneas faeces instar Tart. in vino (quod coquere vocarunt majores nostri) aliquando earum totalem spondeat exclusionem per Crisin, seu fiat excernendo, seu transponendo in Abscessum? Negligere equidem bonus Medicus Crisin debet, quia anticipare: sed si hoc non factum sit, vel fieri non potuerit, naturam ne turbes infundendo, sed spectatorem agas sedulum ejusdem actionis, simulque ministrum providum ejusdem indigentiae. Quod si nil horum appareat, & dubio Marte adhuc ferveat pugna, naturam inter & morbum, cum ordinaria aliasque salubria non profuerint remedia, sicque vix aliquid boni ominari queat Medicus, res licet videatur hic periculosa alex plena, cum per se incerta hoc in casu sint predictiones vitæ & mortis; tamen in statu morbi infundere potes, vel ut adjuves naturæ potentiam, vel ut infringas morbi sævitiam; Imo interdum & debes, si scil. signa jam se manifestare in-

cipiant vacillantis & nutantis naturæ. Intermissio convenienti hoc tempore, si natura succumbat, vereor, ne frustra post festum accedas, & dilates potius ad unum diem mortis fatales terminos infundendo, quam eos ad annos aliquot feliciter & exoptato extendas.

CONCLUSIO II.

Liquor infundendus pro vario scopo est variandus, præ cæteris tamen salinus volatilis temperatus seu oleosus videtur utilis, & hinc opiatus.

§. 1. Respondeat ex Diametro affectui medicamentum: ut ille ergò est multiplex & varius, ita & hoc. In genere tantum universalia consideremus, purgantia nempe, diuretica & sudorifera, confortantia, ad quæ pertinent & opiata; & quæ ex his commodè infundi possunt, ponderemus.

§. 2. Purgantia quod attinet, ad quæ & vomitoria pertinent, cum majoris & minoris activitatis ratione tantum differre videantur, ea commodè infundi posse, & cum ægri euphoria, non videtur verisimile: Sunt namque ferè omnia propriè sic dicta purgantia, ob malignitatis notam suspecta, obque id parva vel mitiora quibusdam audiunt venena. Fermentando nempe resolvunt, & resoluta seu colliquefacta putrefaciunt, idque promiscuè tam vitales succos, quam nociva excrementa; Unde & aequaliter tam in ægrum quam sanum ferociunt: hincque virium lapsus, genuum tremor, faciei macies, & oculorum decidentia, purgationum vim sequuntur, licet per os ingerantur, indeque succorum in primis viis stabulantium experiantur prius alterativam vim, de quo videatur Helmont. *Tr. Potestas Medicam. §. 33. & de Febris cap. 5.* & Andreas Cnœffelius *Method. Medendi Febr. Epidem. & pestilentialibus*. Quod si ergò immediate infundantur venis, quas non turbas dabunt toti corpori? unde & canes per medicamenta purgantia infusa, quæ per os eos nil movent, non sine gravi & periculoso sanguinis motu, indeque gravibus symptomatibus, purgantur; imo per antimonialia vitam & excrementa simul evomunt: quid non fiet ergò in imbecilliori corporis nostri machina? Hinc namque purgantia non adeò violenta, minuta

Purgantia non sunt infundenda.

dosi infusa, homini vomitus induxerunt, ut ex experimentis Dantiscanis supra *cap. 1. §. 5.* apparet. Corrigi possunt purgantia, non quidem per pallium aromaticum, ut communiter, sed ridiculè, contingit; neque per acida, quæ eadem castrant, sed per artificiosam fermentationem. Verum cum natura inferiores abdominis lateras excrementorum separationi destituerit, quidni ejusdem sequamur ductum, & per os ad inferiora mittamus, quæ per inferiora purgare, aut immediatè ex stomacho vel intestinis evacuare debent? cum tutius longè & jucundius fieri possit.

Nec Diuretica.

§. 3. Diuretica quod attinet: in eorum usu imprimis distinguenda urina potus ab urina sanguinis. Illa enim, cum ex primis viis, ante chymi cum sanguine permissionem, secernatur, ut multa id admodum probabiliter persuadent, ad ejus excretionem infusio in venam facta omnino erit frustranea. Quod attinet sanguinis urinam; per infusionem sanguinem ita disponi posse, ut facilius serosi laticis in renibus fiat secretio, idque beneficio injectionis liquoris nitrosi volatilis, nullus equidem dubito, cum & communia sudorifera, quæ sanguinem fundunt & attenuant, nisi per poros cutis excerni queat serum, per urinam copiosam ejus exitum promoveant. Sed in morbis, ubi necessaria est urinæ provocatio, diuretica communia per os assumpta omnino satisfaciunt scopo, & cum in istis affectibus nulla sit urgentia, commodeque repeti queat diureticorum propinatio, non opus videtur, frustra ad generosum hoc confugere remedium, cum ex diuretico infuso tam citò sudor, quam urinæ fluxus excitari possit.

Benè autem sudorifera.

§. 4. Sudorifera autem sunt, quæ commodè infundi possunt, quando vel assumi nequeunt, vel sine sperato successu assumpta fuerint: Cumque ea, quæ per se sudoriferam vim obtinent, subtilium & tenuium sint partium, h. e. omnia sint volatilia, & in specie Θ ina, sanè commodè sine sanguinis similiter Θ ini volatilis noxâ infundi possunt. Ut namque acidum sudoris inhibet exclusionem, coagulando sanguineam massam, unde & nimios sudores quæcunque acida fixa feliciter refranant (nisi acida perfectè sint volatilia, quo in casu potius subtilisant,

quam condensant ipsa;) ita econtrà omnia ea, quæ acidum absorbent & præcipitant, tam fixa, quam volatilia, dum fluidam & tenuem reddunt eandem, denuo sudorem inducunt. Cum grano Θ is tamen hæc accipienda sunt; nam licet reverà res ita se habeat, nimia tamen sanguinis dissolutio, h. e. debitæ consistentiæ defectus ex alkali abundantia, (ut ex ol. Tart. infuso patet in cane,) non leve etiam sudori infert impedimentum, non minus, quam sanguinis p. n. effervescencia & ebullitio, quarum illa in statu lethali, hæc in principio ardentium forsan & malignarum reperitur, & isto in casu incassum propinantur diaphoretica. In his E. casibus diaphoreticis vol. optimo jure adduntur acida, quæ debitam sanguinis restituant & consistentiam, & simul quoque effervescentiæ impetum præcipitando refranant; unde spiritui camphorato theriacali volatili nervosè adjungitur in diaphoretico in peracutis, Tincturæque bezoardicæ D. Mich. sp. Vitrioli acidus. Quod ipsum medicamentum an commodè infundi possit? dubito, metu coagulationis sanguinis à Spir. Vit. Sed hæc obiter. Per se sunt tantum volatilia Θ ina, quæ inducunt sudores, commendatque ob id D. D. Major spiritum Θ *ci ad 3ß. purissimum illud alkali volatile, cui nihil omnino ol. adhæret, ut in spiritu C. C. sanguinis humani, &c. contingit, ipsique addendum suadet spiritus Vini camphorati 3j. cujus usum equidem non dissuadeo, ubi extinctus prope modum cum sanguinis fermentatione calor denuò exsuscitandus, ut eò facilius sudor sequatur. Sed si se mutuo coagulent hi duo spiritus, quod vereor, artificiosâ antè instituta digestionem unita, ejus mandato cum 3iß. ∇ x cujusdem fortioris infundi possunt: Vel conjungatur beneficio S. V. cum oleo pestilentiali Henisii ex camphora, succino, citro, Spiritu Θ *ci, in spir. Θ inum oleosum, & ejus 3j, vel plus minus pro ratione ægri & morbi, vel cum vel sine vehiculo infuso, non contemnendum administrabit sudoriferum. C. C. quid valeat, lippis & tonsoribus notum, imprimis in malignis, cum totus Cervus sit alexipharma: hujus E. spiritus, Θ e suo probe essentificatus, ut dicunt, camphoræque certâ quantitate per reiteratas Ω ationes maritatus, excel-

excellens contra malignas præbet sudoriferum, non sine fructu ad \mathfrak{D} ij. vel \mathfrak{Z} j. infundendum. Est enim in Camphora singularis vis contra malitiosarum febrium sævitiam, unde & omnibus medicamentis admiscendam esse, jubent practici. Alia enim salia volatilia pro sudore ciendo commode injici possunt, ex sanguine scil. humano & cervino, in specie ex Viperis & serpentibus, quorum balsamica vis, Naturæ nostræ amicissima, quorum Θ ium vis non tantum pro sudore ciendo, sed & pro aliis scopis satisfaciendis, creberrimo in usu est, ut inferius patebit. De dosi hoc in genere moneo, circa eandem experientiam esse consulendam, quæ ut omnium aliorum medicamentorum primadocuit dosin & confirmavit, ita etiam, quoad infundendorum quantitatem, ea sola magistra erit, & per crebrius repetitas injectiones, quantum injiciendum monstrabit. Quo autem tuto fieri possit experientia, à parva dosi incipiendo, sensim progrediendum, donec quid valeant ægrorum humeri, quid ferre recusent? innotescat. Quâ cognitâ, postmodum eadem pro ratione virium ægri impetus morbi, necessitatis, ipsiusque liquoris virtutis, varianda venit.

\S . 5. Ad Confortantia me confesso, quæ licet rarò adhibenda videantur, cum vel per os assumpta spirituosâ, vel etiam odorifera, sæpe sufficiant, nihilominus considerationem merentur. Sunt autem talia injicienda, quæ spiritus suscitare & vegetos reddere, vel saltem ipsis, ceu aliquo modo consanguinea, facile se jungere possunt, simulque sanguinis æquabilem fermentationem conservare valent. Cinamomum hic omnibus palmam præripere videtur, ut & ambra; hæc duo enim singulare quid præ se ferunt, licet posterioris natales sint obscuri, modernorum tamen, imprimis Anglorum, observationes, eam cum spermate ceti balænarum esse fructum, illamque in intestinis, hoc verò in cerebro reperiri, verè confirmant. Sulphurea spirituosâ salinis volatilibus juncta hic convenient, unde sal volatile oleosum Dn. Sylvii, (quod per os assumptum etiam mirabiles monstrat vires) hic futurum esset egregium, aliaque huic similia, de quibus supra *cap*. 2. \S . 9. imprimis cum & ex cinamomo parata. Hæc

namque & fermentationi sanguinis & spirituum robori egregiè conducunt. Ad pura sulphurea magis inclinât Marchius, unde Sp. V. subtilissimum merè sulphureum, ab omni Θ ina acedine liberatum, cum olei vel rosarum vel cinamomi, & tantillo camphoræ junctum, præfert; ipsi tamen, si commode fieri possit, aliquid $\sim \Theta$ *ci adjiciendum putat: *vid.* Major *Chir. Infus.* p. 77. Restaurativus D. Sachsi liquor salino-volatilis sane non contemnendus, ex $\sim u$ scil. cinamomi cum oleo \mathfrak{N} ato succini, juniperi, sale volat. C. C. &c. artificiosè junctis. Est etiam egregia ambra Ess. cum \sim rosar. parata, sanguinis rubineam tincturam exactè reterens; vel \sim rosar. ambratus, ex ambabus fermentationis adjumento paratus, nisi nimia quædam exactuatio in sanguine metuenda. Unde mistione cum sale quodam volatili aliquo modo temperentur; tunc enim sub moderata dosi de felici successu non desperarem.

\S . 6. Ad confortantia, quæ spiri- ^{Item} tus exsuscitant, prostratos & languen- ^{Opiata} tes, ea etiam pertinent, quæ spiritus impetuoso motu ferocientes, & tantum non furentes, sopiunt, eorumque periculosum impetum compescunt, opium nempe, & quæ ex eo procedunt medicamenta. Magnum namque sæpius ægro imminet periculum ex ferocia ista spiritus, quæ gubernacula vitæ deferens, omnia conturbat, de quo supra \S . 3. *cap*. 2. locuti sumus, qui exinde dubiæ spei eventus, partim prænuncius, partim causa existit. Hos fluctus quod sedat, has furias quod placat, magni remedii meritò obtinet nomen, & hoc est opium, quod, quicquid agit, unice motum spiritus sedando agere videtur. Hinc namque dolorum remissio, hinc suavis quies, omnisque ferocis motus optata sedatio, unde & turgescencia materiæ peccantis, orgasmusque humorum, facile desinunt. Quas vires quo modo exequantur opiata, hoc in loco non attinet dicere: sunt, qui dicunt probabiliter, figere eadem spiritus, hoc est, condensare eosdem, & certo modo coagulare, unde mobilitas, indeque facillima cujuscunque objecti impressionis receptio supprimuntur. Multi sunt, apud quos maximi medendi Arcani locum tenet somni vel quietis in

Ut &
Confor-
tantia.

in acutis productio, hinc namque dolores vigiliaeque urgentia alias, & ob spirituum gravem jacturam multum debilitantia symptomata sopiuntur, omnesque corporis nostri succi, qui vigiliis exasperantur, sopore inducto blande temperantur, unde omnium vel graviorum saltem symptomatum remissio; effervescentiaeque imminutio, unde mox coctionis clariora signa se produnt, facta quâdam praecipitando utilis ab inutili separatione, quae ante ob omnimodam sanguinis perturbationem erant vel nulla vel saltem levia. Hinc facilius praecedente tempore vel fit Crisis, vel artificialis aut per sudores aut per urinas materiae coctae seu praecipitatae secretio: Spiritibus quoque quietatis in ordinem quodammodo reddit microcosmi turbati antea respublica, dum rector supremus furore placato, id quod suarum est partium, denuò observat, quae omnia legitimum opii usum facile sequuntur. In febribus ardentibus, ut & malignis, sanè quam plurima praestant, teste experientia, & Johanne Daniele Horstio in *Judicio de Chir. Infus. p. 83*. Inter alia hæc ejus notatu digna sunt verba: *opiatorum sulphur, à quo spirituum motus efferos & concitioris sanguinis turbas frænandi, domandi & sopiendi vim obtinet, feliciter desideratum sudorem concitat, &c.* & paulo post; *opium est sumum sudoriferum, & semper insuper excitat, spiritus congregat, & ita roborat, ut insurgant in quemcunque morbum.* Purgantibus certè additum vel praemissum, eorum virulentiam corrigit; cum ambra mistum à multis pro secreto habetur & reo; Unde & Indi communiter pro virium restaurativo singulari habent, sicut revera est in calidioribus regionibus (*vid. Bontius Animadvers. in Garciam ab Orto in cap. 4. p. 3.*) & ut eo melius placeant suis famellis in concubitu, quibus non tam repetitus quam una vice continuatus placet actus, antea opio, seu peculiari armaturâ, se muniunt.

§. 7. Sed non sine ratione quam plurimi metuunt in opio sulphur quoddam pravum, sylvestre, & narcoticum, quod ita reverà esse, nemo est, qui dubitat; sed ut huic occurratur necessitati, observandum, meconium potius esse, quam verum

opium, quod sulphure isto deleterio sit imprægnatum, ob cruditatem suam. Sed cum rara avis in nostris terris sit opium verum, meconium ejus loco debito modo est corrigendum: sed non per rorem majalem; hæc enim correctio parū plus præstat, quam quod opium superficialiter tantum depuret; nec per Sp. V. hæc enim deleteriae qualitatis est potius exaltatio. Nec per acida; hæc enim est opii castratio, cum ejus vis in sale volatili oleoso consistens acidis istis multum infringatur: potius *Θεαλkali* fixo, imprimis Tartari cum terebinthina debita ejus fiat per digestionem correctio; sic namque opium tutum & mirabile in magnis quoque morbis fit remedium. Hinc notanter loquitur Helmont. *Tr. jus Duumviratus §. 31. Sopores tam morbofi quam artificiales sive opiatorum optime debellantur per lixiviam, &c.* sicut alias etiam sal tartari legitimus purgantium est corrector. Optima omnium est correctio, quae per artificialem fit fermentationem cum succo quodam stomachico, quo opium sic correctum abit in remedium anodynum, sine Narcosi, & cujus x. grana non plus vel minus profunt aut nocent, quam xxx. Hoc modo præparatum celebratum apud doctiores quosdam exteros est remedium, suntque qui pro Helmontii Laudano habent opiato, de quo nempe *Tr. citato §. 65.* dicit, *felix aeger, cujus auxiliator Medicus novit lethalia è papavere separare, retento auxilio excitatore potestatis in duumviratu.* Hujus ultimo modo correcti opii, tam liquida quam solida sub forma, conveniens dosis ad viij. vel x. grana cum s. q. *∇ cinam. infusa*, nobilitabit Medicum, qui legitimum ejus novum usum; sic namque & citius, quoniam sæpissimè periculum in mora, & potentius, quoniam nulla in primis vii ejus sit alteratio, operabitur, de quo superius *cap. 2. §. 4.* Sunt equidem adepti, qui sulph. & is anodynum jactitant, (cujus oleum elementum ignis & is vocat Helmontius) & quo egregiam istam curam peregit Bartolus, de qua supra *cap. 2. §. 6.* locutus sum, de cujus veritate nullus dubito, cum sciam, Aquilam albam ex & c. primum ens elicere, eoque in Croci coloris habitum se vestire; unde egregiam stomachicam anodynam & an-

& antiquariam vim acquirit, cæteras ut taceam operandi virtutes. Cæterum cum non omnibus liceat adire Corinthum, indeque sulphur illud quis accersere, opio interea nos contentare poterimus.

Opiata in
principio
infunden-
da.

§. 8. Sed, quod superiore conclusione inculcaverim, temporis vel maximè habendam esse rationem, pro instituenda infusione, imprimis & in opii injectione observandum. In genere namque adhibendi tempus opiatum, in acutis est morbi incrementum, demonstrante id Ballonio *lib. 1. consil. 65. p. 79.* & Lindenio in *Colleg. Privato supra Hartman. Prax. Chymiatricam cap. de anodynis*; non principium, ubi nullus eorum est usus; non status, ubi vel impediens Crisin, si morbi eventus est salutaris, vel frustra adhibes opium, ubi inclinante ad mortem ægro spiritus oppressi & prostrati ulterius non sunt sopiendi, sed potius excitandi, ne languori eorum superinducta artificialis quies, ad perpetuam quietem ægrum deducat. Fiat ergo opii infusio non, quod supra innui, in statu, sed vel sine principii, vel incremento morbi, si per os opium vel assumi non valeat, vel assumtum nil proficiat, ut furore Archæi aliquantisper sopito, hic expeditius id, quod agendum sit, agat, pro conservatione œconomiae vitalis, & perficiat.

CONCLUSIO III.

In affectibus subitaneis, hincque peracutis, nil promptius auxiliari posse videtur infusione, v. g. in syncope & cordis palpitatione, apoplexia, vertigine tenebrosa, & epileptico insultu graviore.

§. 1. Turbam in medium produco omnibus terrificam, ægro sapissimè fatalem, quæ ut inopinata cum sæpius aggreditur violentia, ita citissima jugulet strage. Advolet ergo Medicus, & quidem generosissimis instructus armis. Multa hic præstant odores, ex volatilibus elevati oleis, de quibus *supr. §. 6. cap. 2.* Spiritus volatiles arduentes in os injecti, salini volatiles immixti, juncti in salia volatilia oleosa, tantum non miracula interdum præstant, dum spiritus nostros, ordinaria non expectata in primis viis alteratione, dicto citius interdum exuscitant sopitos, vel revocant abeuntes, de quo videatur Horstius *Judic. de*

Tom. II. Pars 2.

Chirur. Infus. p. 76. & 77. & supra citato loco. Unde hæc omnia tentanda prius, antequam ad generosiora abeamus remedia. Sed quid? si ægro hæc per os infundi non possint, vel tarde nimis operentur, vel æger horum ope non restituatur, si singulis momentis expectetur fatum, si metus, ne nunc syncope extinguatur, nunc apoplexia, vel epilepsia suffocetur? Hic nec timidum se præstet Medicus, licet graviora sint mala! sicut nec tumidum se exhibeat in levioribus. Occasione potius agendi arreptâ, intrepide infundat, ut generosè curet.

§. 2. Syncope sane, quæ Micro-^{Syncope.}cosmi est eclipsis, ob spirituum luminositatem, indeque eorum irradiativam vim, tunc ferè extinctam, quam plurimas agnoscit causas, in specie tamen, quando imprimis infusionem postulare videtur, ejus origo est vel ex nimia sanguinis dissolutione, unde Spiritus, dum non generantur copiosè, interea exhalant; vel ex nimia ejus coagulatione, unde iidem violenter opprimuntur. Illud ardentibus in febribus malignisque sæpe usu venit: hoc in illa syncope specie, quam cardiacam nonnulli vocant, & sæpius cum apoplexia confunditur, si sit gravior (vid. Hofmann. *in Instit. Med.* & idem eleganter explicat Lindenius *Colleg. in Hartman. cap. 11.*) Lævior verò si sit, catarrhi suffocativi nomine venit ab ignaro vulgo, itemque in hypochondriacis suffocationibus, &c. evenit: hujus causa est sanguinis in præcordiis periculosa stagnatio, ex acido excessivo ab inferioribus partibus allato, imprimis à pancreatis acido nimis vel austero succo, sanguini infuso, oborta. Ea, quæ infundenda veniunt hoc in puncto, cum eis conveniunt, quæ supra *Conclus. 2. §. 5.* retuli, ex cinamomo imprimis & ambra parata; hac tamen cautela adhibita, ut in priori casu, sanguinis scil. nimia dissolutione, sulphureis & spirituosius moderatè acida, sed volatilia (fixa enim nimis periculosè coagulant) addantur, quo sanguini debita restituta consistentia, deficiens ejus redeat fermentatio, spiritusque vitales de novo suscitentur & retineantur; unde acetum ex vino generoso cum S. V. volatilifatum, v. æ cinamomi vel spiritui rosar. ambrato additum, forte ex usu foret; vel acidus,

[Rrr]

duſ, volatilis tamen, viridis æris ſpiritus, ſine ꝑi additione præparatus, & ſi opus ſit, S. V. ulterius mediante digeſtione temperatus, tum modo dicto ex uſu erit.

§. 3. In poſteriori verò caſu, ſanguinis nempe coagulo, medicamenta magis ſint ſalina volatilia, ut acidum corrigant & ſanguinem celeriter diſſolvant, quorum hinc inde ſufficiens facta enarratio, in ſpecie *Concluſione* 2. §. 4. Sperma ceti hoc in caſu interius aſſumptum, præmiſſa venæſectione, ceu ſummum prædicatur præſidium, & reverà miranda ejus eſt vis in diſſolvendo ſanguine, quacunque ex cauſa congrumato, ut & in abſorbendo omni hoſtili acido, unde Pariſiis podagricorum articulis dolentibus mirabili cum ſucceſſu applicatum vidi: ſed in primas detrufum vias, nimis tarde, idque non ſine alteratione, operatur, ut ſupra *cap.* 2. §. 4. & 5. dictum, unde convenienti menſtruo diſſolutum, & venæ inſuſum, ſalutarem valdè promittit effectum. Hæc, quæ de ſyncope dicta ſunt, facile etiam ad nimias virium imbecillitates, ut & enormes ſæpius cordis palpitationes, applicari poſſunt, in qua poſteriori legitimam aliquam coralliorum Tincturam, (qualem cum ſale Tart. volatili paratam, quæque per retortam facili negotio deſtillabatur, in Anglia vidi,) debito vehiculo ſi opus videatur permixtam, inſundendam cenſeo.

§. 4. Apoplexiæ ſubitaneus iſtus ſenes ſæpius, interdum mediæ quoque ætatis homines derepente proſternit. Symptomatum atrocitas unicuique eſt nota, cum non rarus ingruat hic affectus, & ob brevem ac triſtem exitum quamplurimos perterreat. Origo ejus imprimis ex impedito ſpirituum animalium motu petenda, ob interceptum ſanguinis motum in cerebro; ſive ex coagulante hoc contingat acido (de quo videatur Tackii *Oratio de Chryſog. animali & miner. p.* 42. & 43.) unde & non pauci apoplexia mortui, ſanguinem omnino in vaſis coagulatum exhibuerunt, imò in iſtis præcordiis polypos, h. e. ſanguinis concrectiones, in apoplecticis repertos, & vaſa pulmonum ex impedito ſanguinis motu diſrupta, refert Fracaſſatus *Tetrad. Epistol. p.* 424. & 414. ſive à nimia ejus craſſitie, quacunque ex cauſa

oborta, imprimis viſcido & crudiore chylo non rite ſanguini aſſimilato, ſive à narcotico ſpiritu vel gas quodam ſylveſtri, ut Chymicis audit, extrinſecus per ærem hauſto, ſpiritus figente, & ſanguinis motum ac fermentationem inhibente. Omni in caſu res eſt periculi plena. Vomitoria hic ſæpe divinas afferunt opes, experientia teſte, v. æ apoplecticæ, ſpirituofæ, & odoriferæ non contemnendæ, aliaque medicamenta quoquo modo adhibita. Sed ſi pertinacia mali eludat omnem horum medicamentorum vim, & ſtertor fatalis ingraveſcat in extremo hoc articulo, quidni non tam extremum quam generoſum inſuſionis adminiſtrems remedium, ut eo citius concretus & ſtagnans ſanguis reſolvatur, & ejus colliquatio promoveatur, quod ceu maximum praxeos feliciter exercendæ ſecretum non ſine ratione commendat Claudius De la Courvée *de Nutrit. factus in utero Part. 2. cap.* 3.

§. 5. Salia volatilia, tam vegetabilium ex Cephalicis, eorumque ſpiritus volatiles, quam animalium ex C. C. Cranio, & oſſibus humanis, ſanguine Cervino & humano, ſunt hic proficua, ut & Q. E. Matthioli, ſpecifico ad apoplexias, ſinapi & crucæ, ac naſturtii ſeminum volatili ſale imprægnata: Θ volat. ſuccini palmarium quoddam remedium, Liquorque C. C. ſuccinatus D. Michaelis, S. V. vel theriacalis vel camphoratus à quibusdam commendatur; ſalinos tamen volatiles hic potius præferrem. Spiritus liliorum covall. vel ceraſ. nigror. Θ e volat. C. C. & camphoræ tantillo per iteratas cohobationes imprægnatus, ſalutiferum hic erit medicamentum. Nec omittenda hic Θ ia volatilia, oleoſa ex aromatum oleis parata, de quibus ſupra *cap.* 2. §. 9. Quibus applicari poteſt id aliquo modo, quod Helmont. *cap.* 5. *de Febr.* §. 7. de ſuis ex ol. Ratis paratis Θ ibus volatil. diſſerit. Sunt, qui ~us ceraſor. virtutes, ſuper vitriolum cohobando, tam ad apoplexias quam epilepſias, exaltare volunt; quod ſi febricula horum medicamentorum uſui ſuperveniat, cum apoplectici tamen inſultus, diminutione, ne timeas, quæſo, cum ſalutem promoveat. Quod ſi eorum uſu ſudor calidus & moderatus proliciatur, gratulari ægro dereconvaleſcentia poteris. Quod ſi Narcoticorum

rum miasmatum haustu producta sit apoplexia, Castorei salutaris erit medicamentis admistio, magisque ad spirituosâ sulphurea quam salina inclinare poteris, cum spirituosâ impressa jam à narcoticis spiritibus noxas curent, eos denuo exuscitando & agitando; sicut acida ab eorum impressione præservant.

Epilepsia
& Vertigo.

§. 6. Hercules adhuc superest morbus, cum ejus prodromo vertigine caliginosa & caduca in juvenibus (in senioribus enim apoplexiæ potius est certus prænuncius) qui & ipse Herculeâ infundenda monet remedia. Qualis hic sit affectus? lippis & tonso-ribus notum est, ut &, quomodo per Paroxysmorum infestet circuitus. Unde extra insultum legitima medendi methode tractandus venit. Quod si verò insultus sit gravior, quam ut consuetis cedat remediis, ne periculum vitæ incurrat æger, nil prohibet, quin infusionem administres. Aquæ Epilepticæ in os intrusæ, salia volatilia naribus admota, & ori infusa imò hæc ipsa cum clysteribus injecta, tam in infantibus, quam in adultis, egregius quidam Practicus non sine experto sæpius successu commendat. Sed si his reluctetur Paroxysmus, quis dubitat de felici hujusmodi salium in venas infusorum auxilio, si remotos intestinorum perreptando gyros sint salutare? Idque eo magis, si non privatae cujusdam partis vitio, quod sæpe evenit, sed ex maligno massæ sanguineæ spiritibusque animalibus impresso Charactere invadat. Hinc sanè, si accedentem insultum præcavere velis, salinum hujusmodi volatilem liquorem, camphora acuaturn, vel opii Ess. bene præparata temperatum, infundere licet. Id quod & in ipso principio insultus, si vel gravior vel diuturnior esse soleat, faciendum: Opii enim cum camphora connubio singularis hac in parte est vis, & impediendi futurum, & imminuendi præsentem jam Paroxysmum, licet ad præcautionem tutius usurpetur, dum ferocientes spiritus compescit, & sedato Paroxysmo, blandum somnum cum salutari sudoris eruptione inducit. Salina volatilia hic quoque injicienda ex antecedente petenda Paragrapho, inter quæ succinum eminet. Utilis quoque erit ~ secundinæ humanæ, quo medicamento Regem Poloniae Epilepticum curasse dicitur

Tom. II. Pars 2.

Cnoësselius. In stercoreibus, pavonis imprimis, Ciconiæ & leonis, ut & hominis, singularis quoque vis est antepileptica, experientia multiplici teste: vid. Borell. *Cent. III obs. 15*. Henricus à Bra *de Medicament. Epilepticiis*. Crato *in Consiliis*. Quam ex humano qui debita fermentatione & volatilisatione novit elicere, ut moschum & ambram fere oleat, sicque in Zibetham Paracelsi occidentalem abeat, forte non contemnendam ad multos morbos habebit medicinam; alias ut præteream stercoreum præparationes. Omnibus interim præferendus ~ vitrioli volat. ab omnibus instar Phœnicis decantata, rarissima licet, avis, cujusque, ad epilepsiam imprimis applicati, tot sunt descriptiones, quot capita. Phlegma subtile striatum ex vitriolo, violarum Martiarum odorem referens, ab amico quodam tempore hyberno præparatum novi, quod tamen pro vero volatili non habuerim spiritum. Cujus Tackius mentionem facit spiritus egregii vitrioli aurei *Judicio de Chirurg. Infus. p. 103*. ejus elaboratio est admodum rædiosa, in notissimo tamen quodam Philosopho Chymico aperta ejus prostant vestigia, infusioni videtur ineptus, ob vim, quam cum penetratione metuo, coagulantem. Qui veri volatilis sulphurei spiritus est possessor, facile, experientiam consulendo, quid valeat ad epilepsiam dum infunditur, felici, ut spero, eventu reperiet.

CONCLUSIO IV.

Ad sanguinis debitam fermentationem, restituendam apprime conducit infusio.

§. 1. Duo sunt mala, quibus expeditâ infusionis ope succurrendum: spiritus scil. seu archæi furibundus motus, sanguinis inordinata fermentatio, ut supra *cap. 2. §. 1. & 3.* dictum. Hanc qualiscunque sit, salinum esse effectum, supra *cap. 1. §. 1. & 2.* ostensum, ut & ejus defectus salinis quoque curandos esse remediis *cap. 2. §. 7.* quæ tamen ex salium in primis viis varietate & inevitabili concursu, non parvam ibidem subeant alterationem, antequam debitam in sanguine peragant correctionem *citat. loc. §. 4.* similiter declaratum. Ex acido nempe imminuta vel depravata fermentatio contrariis alkalibus corrigenda: quod qua ratione fieri possit? vid. Ta-

[Rrr 2]

ckius

ckius *Orat. supr. citat. p. 43.* Ab Alkali contrà vitioso eadem turbata, per acidum est emendanda. Quæ salia nunc pura & acria, nunc aliorum, imprimis sulphurcorum, adjunctione temperata, sunt applicanda. Quod si verò in primis viis oberrent salia sylvestria, vitiosique succi, quæ medicamentorum vires infringant, & quod salibus facillimè evenit, eadem alterent, nullus effectus exinde sperandus venit, potius propiori via sanguini immediatè sunt commiscenda, ut promptius & potentius succurrant; quod quibus in malis sit faciendum, inferius patebit.

§. 2. Jam verò quantæ succorum istorum salinorum esse possint corruptiones, suprà *cap. 2. §. 2.* declaravi: quas corruptiones vitio massæ sanguineæ oboriri, nemo facillè dubitare potest, qui cogitat, ex sanguine istos succos continuo regenerari, sanguinem verò ipsum ex rerum nonnaturalium varia activitate magnas continuo alterationes subire: sæpiusque per contagium massæ sanguineæ depravatam notam immediatè inuri, sine succorum illorum præcedente vitio. Assumtorum alimentorum magna hic est efficacia, sed modò sanguineum nectar in debita persistat puritate, & non similiter ab alimentis istis corrumpatur, facillè noxa illa inducta eluetur. Quod si non fiat, & massa sanguinea succique simul sint corrupti, miseram effervescentiarum inordinatarum variorumque symptomatum ludent tragœdiam. Viscera & ipsa quoque, imprimis lien, suas sanguini imprimunt noxas: sed quas sæpè antea ex sanguine hauscerunt, cujus ineptitudine aliunde contracta, viscerum fermentativa correctio eluditur, ejusque crassitie illorum obstructio scirrhusa, aliaque vitia, producuntur. Unde sanguinis restauratio est nulla, dum à succis istis infimi ventris, aliisque visceribus continuo depravatur, & succorum istorum viscerumque emendatio est frustranea, dum sanguinis corrupti partes eorum malitiam continuo renovant. Sed cum alteratio sanguinis sit major longè ob res nonnaturales, quæ omnes in sanguinem agunt, simulque succi isti dependeant à sanguine, ex cujus massa in convenientibus cribris secernuntur, utique sanguis alterandus venit primario: quod cum per medicamenta

assumta fieri non possit, ob rationes suprà & hic allegatas, meritò infusio administranda, ut correctâ sanguinis labe, inordinatâque fermentatione, isti succi partim spontè, partim verò medicamentorum assumendorum ope, redintegrentur. Contrarium equidem fit in ordinaria medendi methodo, ubi primarum viarum humorumque ibidem stabulantium noxæ in morbis, præsertim Chronicis, prius corriguntur per assumta, idque rectè, cum alias in sanguine nil alterari possit, ut suprà dictum: hancque methodum tamdiu continuandam suadeo, quamdiu aut successui optato respondeat, aut spei aliquid desiderati successus adhuc superest. Sed res ipsa loquitur, quàm tædiosè sæpius hujusmodi sint curæ, quantum tempus requiratur ad eas absolvendas; imò quod malum si sit inveteratum, non tam cura quàm palliatio fiat, vel ægri à Medicis ceu deplorati relinquuntur. Ast expedita magis est infusio, ut mitigatio (non dicam curatio) symptomatum in ancilla epileptica inveterata, & milite lue Venerea antiquata correptis ostendit: videatur *supr. c. 1. §. 5.*

§. 2. Eleganter disserit de hoc negotio Tackius in *Judicio p. 99.* Comparandum sanguinem cum vino, dum inquit: *fateor, haud mihi displicuisse ad sanguinis sopitam fermentationem excitandam ingeniosas cogitationes, imprimis quod sciam vina quiescentia ad novam fermentationem excitari posse. Imo & degenerantia & tenacia & viscosa velut sulphure restitui. Non enim nescis, sanguinem esse vinum vitæ nostræ, vinumque non raro in sacris sanguinem uvæ appellari. Si itaque ad novam fermentationem vina resuscitari possunt, cur non & sanguis, ille vitæ nostræ thesaurus, cujus Spiritus homogeneam fortè naturam habet cum Sp. V.* In qua convenientia vini & sanguinis declaranda, totus quoque est Willis de *febris c. 1.* Jam verò id, quod de nova fermentatione suscitanda dicit Tackius, facile quoque ad alteram potest applicari corrigendam. Totus etiam Fracassati scopus is est tantum in sua *Medic. Infusor.* ut sanguinis fermentatio renovetur concretusque ab acido resolvatur, cui negotio Sp. V. Tartarisatum pro infusione destinatur: sed verus Quâtus S. V. non est res adeo facilis,

cilis, utut multum utilis, ad cuius singularem quandam præparationem in Tackii Chrysogonia inveniendam p. 44. te remitto. Quale interim fermentationis est peccatum, tale quoque correctionis remedium, nunc salinum lixiviale, nunc acido volatile, nunc spirituosum sulphureo-salinum, nunc alia qualitate præditum, prout in sequentibus pluribus dicitur.

CONCLUSIO II.

Atrociori affectionis hypochondriacæ & hystericae ut & Asthmatis convulsivi, paroxysmo Infusoriâ Chirurgiâ est succurrendum.

Affectio
hypo-
chondria-
ca & hy-
sterica.

§. 1. Congeries ista symptomatum truculenta, quæ mali hypochondriaci in viris, suffocationis verò uterinæ (si nempe est acerbior) in mulieribus nomine venit, adeo interdum paroxysmus sævit, ut à Dæmone obsessi ab ignara plebe habeantur ægri. Testimonia hinc inde prostant plurima. Præcipua symptomata sunt; murmur & rugitus in hypochondriis, dolores in abdomine acerbis, respiratio impedita, & suffocationis metus, palpitationes cordis gravissimæ, lipothymia & syncopes sæpius recurrentes, vertigines tenebrosæ & caducæ, deliria varii generis, artuum miræ convulsiones, corporisque totius epilepticæ subinde concussiones. Mali hypochondriaci nomine venit in viris; in mulieribus, si gravis huiusmodi insurgat paroxysmus, sine convulsionibus quidem, suffocatio uterina; cum convulsionibus vero Epilepsia uterina dicitur. Sed reverà in utrisque unus idemque est effectus: differentia primariæ namq; quas statuunt Autores, est motus iste globi, (quem ridicule muliercularum instar uterum esse multi autumant) ascendens in abdomine & faucium suffocatoria constrictio, quas in foeminis tantum esse asserunt, in viris quoque obviæ sunt. Affectum enim hystericae passioni adeo similem, ut ovum ovo similis esse nequeat, observavit in viro Willis in Pathol. Cerebri specimine, una cum globo isto in abdomine violenter moto, & suffocationis sensu in graviore affectu hypochondriaco torquere viros, nihil novi est; idque duplici modo, nunc quidem sentiunt fauces, & laryngem à vaporibus vel

humoribus acidis, ponticis, austeris & stypticis, quasi constringi, quale exemplum D. Michaelis vidit in JCro, ut supra dictum, quem cum acidum præcipitantibus & concentrantibus alkalibus fixis, nempe creta, oculis ☉, & diaph. & similibus restituit: cuiusmodi casus etiam mentionem facit Sennertus, L. 3. *Prax. Part. 1. Sect. 1. cap. 1. p. 7.* nunc verò sine tali in faucibus molestia saltem impotentia movendi thoracem adest, & cingulo vel Zona quasi circa diaphragmatis cum costis connexionem se constringi & coarctari queruntur ægri, ita ut reverà affectu suffocationis uterinæ viros quoque laborare dici possit, nisi falsa appellatio putatitii mulieribus uteri ascensus, cuius tamen innocentiam pluribus sufficienter demonstrant autores, hoc impediret: *vid. Willis lococitat. cap. de affect. hypochondr. & hysterico.* Quam sententiam similiter fovet Celeberrimus D. Sylvius, alique accuratiores hujus seculi Medici. Quod autem clitoridis contrectatio, vel odorum ad uterum applicatio, paroxysmum sedat, ratio est, quod titillatio istius sensibilissimæ partis voluptuosa, spiritus fortiter afficiendo, ad determinatum compellat motum, unde inordinatus motus, convulsiones, cæteraque symptomata remittunt. Odores verò afficere spiritus, imprimis circa genitales partes, eosque allicere, & ad motum certum, ut modo dictum, determinare, patet præter suprà dicta ex eo, quod inuncto penis glande vel Zibetho vel balsamo apoplectico, &c. voluptuosiores longe solito faciat utrique sexui congressum: multa paucis declarare cogor, ob pagellarum angustiam.

§. 2. Varietas symptomatum complicatum omnino monstrat affectum, partim nempe ex vitiosa in abdomine ab acido pancreatis cum bilioso succo effervescencia, hinc postea sanguinis ab acido coagulatione, partim verò ex depravato & perturbato spirituum motu, unde vertigines, deliria, spasmique contractivi, partim mesenterii & partium annexarum; (quod nostratibus mulierculis apuissime *die schwere Noth im Leibe* dicitur) partim partium respirationi interservientium; partim verò, & circa finem paroxysmi imprimis, artuum externorum, de quibus optime vide differen-

[Rrr 3]

tem

tem Willis. *loco citat.* Id, quod primario peccat, est acor pancreatici depravatus, sæpè acerbus, austerus & ponticus, effervescentiæ in intestinis, hinc flatuum & borborygmorem Autor, qui postea sanguini infusus, cum periculosè coagulat, quod sanguis venæsectione in paroxysmo emissus testatur. Unde syncope pulsuum longæ intermissiones, simulque ex sanguinis stagnatione in præcordiis suffocationis inchoatus sensus: unde mulieribus scorbuto laborantibus, sin vel levioribus purgantibus moveatur istis Camarina, sanissima licet sint quoad uterum, hypochondriacas hujusmodi suffocationes incurrere observavi, moto scil. in viis vitioso acido. Hinc omnia ea, quæ acidum infringunt, tam fixa quam volatilia, tam in quam extra paroxysmum, hos affectus curant, ~ Θ *ci, ~ carminativus urinosus volatil. ex Tart. Θ o & vino, it.: Θ volat. & ol. \mathcal{R} atum succini, experta ad revocandos hypochondriacos & hystericos sunt remedia. Huic accedit singularis spirituum facile irritabilis, nimisque impetuosè mobilis dispositio, qua concitati partim ex effervescencia in intestinis, partim ex sanguinis stagnatione in præcordiis impetuosè moventur, unde mesenterii convulsiones, cujus centricus nervorum plexus globum istum simulat, diaphragmatis, & musculorum ceterorum respirantium contractiones, deliria, vertigines, &c. subsequuntur: unde opiata, quæ spirituum motum compescunt, spirituosus cephalicis mista, quæ eos corroborant, futurum paroxysmum impediunt, inchoantem verò jam tollunt.

§. 3. Urgente jam tot symptomatum crudelium sævitia, propinari alia nequeunt, quam volatilia, acidum subito absorbentia, præmisso interdum vomitorio. Quod si tamen iis legitimè adhibitis Paroxysmorum imprimis, quoad actiones animales, persistat atrocitas, ne sub eorum succumbat impetu æger, ad infusionem procedendum; præmisso tamen semper medicamento per os cum Castoreo, quod acidum primarum viarum absorbere valeat. Infundendi liquores facile ex hætenus dictis patent; si enim præcavere volumus vel futurum Paroxysmum, vel ejus nimium incrementum saltem suspendere, spiritui Θ *ci mediante Sp. V. temperato Ess.

opii q. s. addendum, hæcque conjunctim infundenda: vel in Q. E. Matth. aliquid de opio solvatur, cui in sequiori sexu semper Ess. Castorei, vel asæ foetidæ, vel myrrhæ, sufficiens addatur quantitas; vel in ∇ hirundinum cum castoreo dissolutus Θ *ci ~tuserit proficiuus; vel ejus loco Θ volat. succini conjunctum cum Θ volat. Cranii humani, ad convulsiones specifico. Spr. porro secundinæ humanæ cum Θ e volat. sangu. humani infusus, non sine prospero erit successu; vel ~ bacca. sambuci, aut Ess. ex rob. sambuci cum ~ proprio parata, ol. destillato succini lenta digestionem imprægnatus, erit injiciendus. Prout autem constitutio varia ægri nativa, nunc Θ ina volatilia acriora, nunc verò per oleorum additionem temperatiora, sunt injicienda.

§. 4. Suffocationem vel difficilem ^{Asthma} saltem respirationem multum affligere ^{convulsivum.} re his morbis laborantes ex dictis patet. Jam verò in Scorbuticis, vel in quibus hypochondriorum affectus non sunt adeò inveterati, aut non adeo atroces, sæpè evenit, ut levissima procatactica causa præcedente, gravissima ipsis oriantur Asthmata, & adeò etiam orthopnoæ. Nullo modo cum iis Asthmatis, quæ ex infarctu pulmonum à crassa vel viscida materia interdum, licet valde rarò contingunt (cum ventriculi sæpius sint sordes, quæ tunc tussi rejiciuntur) conveniunt, cum sine tussi, sine antecedente excrementorum coacervatione, aut sensibili eorum, finito Paroxysmo excretionem ægros invadant, & nunc periodice, secundum lunæ motum, nunc non periodicè repetant, quale exemplum Parisiis in meo Comensali observavi. Causam horum asthmatum convulsivum esse motum diaphragmatis & reliquorum musculorum respirationi dicatorem, qua sanguinis in præcordiis impedito motu ejus & stagnatio, & suffocationis ita inducatur sensus, vid. Willis *cit.* \mathcal{L} . Helmontio Caducus seu Epilepsia pulmonum dicitur hujusmodi Asthma, quod etiam siccum ab eodem vocatur, *Tr. Tussis & Asthma*, quæ tamen latior appellatio tum syncopes cardiacas, alias catarrhi suffocativi dictas, de quibus *Concl.* 3. §. 2. dictum, & quas exactè exprimebat canis iste, cui oleum sulphuris infudimus, de quo supra *cap.* 1. *p.* 4. comprehendat. Multa horum Asthmatum spasmodicorum

corum notata reperiuntur præter Helmontii citato loco exempla apud Practicos, qui tamen ea ad ordinaria asthmata humida reducere, obnixè insudant, vid. Platerus *lib. 1. Obs. p. 161. & 172. It. obs. Schenckii pag. 234. & 237.* Marcellus Donatus *obs. lib. 4. cap. 21. p. 280. Colle Med. Cosm. p. 159.* Riverius *cent. 111. obs. 85.* Cura horum asthmatum extra Paroxysmum ad originalem morbum, scorbutum scilicet vel malum hypochondriacum, dirigenda, quibus curatis & ipsa cessant. Cæterum in Paroxysmo, ubi misèranda horum ægrorum est constitutio, ceu convulsioneseptipræ sunt tractandæ. Excellit specificè in hac cura ternarius medicamentorū sequentium numer⁹, nempe sperma ceti, aselli, & lumbrici. Unde si atrocitas Paroxysmi alia omnia respuat remedia, & æger in horas suffocari videatur, ne nihil intentatum relinquat Medicus, infusionem tentet. Mediante ergò digestionem & putrefactionem resoluti lumbrici in liquorem, dant spiritum ad infusionem, ut videtur, aptissimum, in quo vel solo, vel Sp. V. prius commode maritato, solum sperma ceti, quod fieri posse suspicor, non contemnendam gravi hoc in morbo præstabit medicinam, imprimis si tantillum Croci Essentia cum eo commisceatur. Quin tamen & usitata Epileptica volatilia commodè infundi possint, nullus dubito, cum, teste Helmontio, quicquid Epilepticum adultum sanat, sanet etiam Asthmaticum. Dubitare hic possumus cum Riolo *Enchirid. Anatom. l. 4. c. 14. de Laryngotom. pag. m. 316.* (ubi videtur, cum jam tunc temporis olfecisse hanc Chirurgiam) an non per apertam asperam arteriam liquor dulcis, attenuans & incidens, introduci queat, ad incidendum sputum & promovendam anacarthasin. Sed meritò dubitamus, imò vix possibile credimus: nam vel levis potus aliavè materia insperatò huic arteriæ illapsa, quas non turbaret? & liquor injectus dum per minores trachæ ramos se dispergeret, respirationem omnino tolleretur, jam per se latis exilem.

CONCLUSIO VI.

Chronici morbi, qui Cachexiarum veniunt nomine, profundè radicati, & aliis vel non vel dif-

ficulter cedentes medicamentis, salutarem expectant medelam. Quibus & Phthipsis annectenda videtur.

§. 1. Torturæ ægrorum sunt & scandala Medicorum, quos præsens Conclusio in scenam producit affectus. In quibus imminuta partim, partim verò insigniter depravatâ, massæ sanguineæ vitali fermentatione, ipsa nutritioni fit inepta, unde ex depravata nutritione mali exsurgunt habitus, qui per alteratos faciei oculorumque, imò totius corporis colores, in conspectum prodeunt, unde & generali Cachexia nomine veniunt, cujusmodi sunt Cachexia in specie sic dicta, tam masculorum quam fœmellarum *χλωρωσις*, &c. (cui supervenit ordinariæ menstruæ purgationis cessatio) & excellentior hujus gradus Leucophlegmatia, & quæ hanc ferè semper insequitur Anasarca, item scorbutus, lues Venerea, & tandem lèterus. In omnibus namque his primaria sanguinis ex fermentationis latione est labe. Cachexiam quidem in specie sic dictam quod concernit; ex chylo non ritè cum sanguine assimilato originem ducit, dum is viscidus & acidus, nec ritè volatilifatus, sanguini infunditur, unde in humorem crudum dilabatur & aquosum, sanguisque exinde crassus, viscidus, æquabili fermentationi ob principia salina, imprimis volatilia urinosa ob abundans contrarium acidum depressa & obruta, ineptus existit, indeque minus spirituaescit; sed torpidus & semicoagulatus in vasis lentè circulatur, unde & menstruæ fermentationis, quam ordinaria sequitur purgatio, fit cessatio, indeque cruor præter modum congestus, vasa onerans, stagnationi fit aptus, unde gravissimorum in virginum febre symptomatum origo. Malo ulterius procedente, & partibus crudis istis succis infarctis potius quam nutritis, Leucophlegmatia sequitur, quam ex lymphæ, & ipsius quoque tenacis, impedito motu anasarca pressò comitatur pede.

§. 2. Ad primas equidem vias dirigenda imprimis cura, propinando ea, quæ omne absorbent acidum abundans (inter quæ excellunt & alia quocunque modo præparata, modo ab acidis nimis mensuris non antea fuerint corrosa,) restaurant & volatilifera spirituosum deficiens, & quæ subtili pene-

penetratione crudos succos fundendo, habitum floridum restituunt, præmissio sæpius vomitorio; sed contumacia mali sæpius est tanta, ut omnem remediorum eludat vim ob profundè nimis in sanguine actas radices: propiori ergo adjumento succurrat infusio, injiciendo spirituosæ & salina volatilia, v.g. Sp. V. camphoratum, vel Q. E. Matthioli, vel $\sim \Theta * ci$ c. \sim cochleariæ, vel oleis etiam Oatis aromaticarum plantarum, in specie corticum aurantium temperatum; item spiritum ex Tart. Θo , & Sp. V. compositum, aquæ cinnamomi q. s. dilutum. Quibus omnibus non incommode præferendus verus volatilis Tart. vinosus Sp. Adde his Elixir propr. Helmontii *p. m.* 458. & *Tr. Arbr. vitæ* pag. 635. quod etiam intrinsecus propinatum singularia hic præstat; it. Essentias vegetabilium absinthii, Centaurii min. card. bened. Roris marini, ligni sassafr. & eorum spiritus, imprimis ex antiscorbuticis prolectos, ut Cochleariæ, &c. quibus in scemellis Essentia Castorei, vel Croci subinde addendas suadeo; in Anasarca verò \sim lumbricor. terrestrium, cujus suprà *Conclus. 5. §. 4.* mentio facta cæteris addendus, & alia ut injiciantur sub liquida forma inepta censeo, quomodo verò assumpta operentur in primis viis cum ultra diaphragma non ascendant? vid. Tachenii *Hipp. Chym. p.* 217. *cap.* 28.

Scorbutus.

§. 3. Cachexiam scorbuticam & ipsam esse ex acido, nemo, qui scorbuti considerat symptomata, facile negabit. Sed acidum istud non est simpliciter tale, sed certo modo corruptum, unde massæ sanguineæ status depravatus tunc non incommode vino rancescenti aut pendulo (quæ qualitates in vino quoque acidi, sed certo modo depravati, sunt fructus) comparatur Willis *Tr. de Scorbuto*. Jam certum est, vix esse morbum, tam difficilis eradicationis, quam scorbutum, ubi vel leves saltem egit radices, quique simul diversissimo symptomatum apparatu magis vexet ægros. Medicamenta communiter, sic dicta antiscorbutica, quæ sale volatili acri abunde instructa multum laudo, usum lactis, in specie caprini animali herbis appropriatis præsertim nutrito, maximi facio. Dietas quoque sudoriferas ex sassafras & Chinæ radice, quas multi commendant, non

reicio. Sed quam obstinatè omnibus his reluctetur hoc malum, ii norunt, qui experientia propria id didicerunt. Ut ergo aut celerior aut felicius saltem fiat eventus, & ut curetur potius malum, quam pallietur iis, quæ interno ulu proficere experientia docuit, infusionem in venas simul addamus, quo & sanguinis corrigatur vitium, & si quæ subest lienis labes, efficacius emendetur. Spiritus ex cochlearia, persicaria, piperitide, nasturtio, & à Belgis experta flammula, vel cum Vino destillatione, vel præcedanea fermentatione, (quam sine causa multi in antiscorbuticis condemnant,) præparati, huic usui videntur idonei, præ cæteris $\sim \Theta * ci$ cum his spiritibus junctus & unitus. Quod si verò (quod sæpè ab interno contingit usu) oriantur corporis phlogoses & nimix incallescenciæ ab eorum infusione, quæritur non immeritò, an diluti \sim rus cum lacte, vel saltem cum ejus sero, commode possint infundi? item an lac ipsum, cum sit nobile antiscorbuticum, Suecorumque tantum non panacæa, imprimis si scorbuto superveniat marasmus, commode possit infundi? Lac sanè est Chylus, ^{Pro nutritione infuso est inutilis} destinatus à natura ad hoc ut nutriat, unde & pars ad mammas deportata Lac dicitur, cetera parte sanguini infusa, chyli & nutrimenti corporis retinente nomine. Probabile ergo videri possit, nutritionem hoc modo fieri posse non tantum in scorbuticis, sed etiam iis, qui anginâ laborant periculosâ, aut qui ad omnem alimentorum mentionem tantum non exhorrescunt: (quo etiam inclinât Rolfinck. *in Ord. & Med. special. lib.* 11. *sect.* 1. *cap.* 31. *p.* 934. ubi simul jusculorum carniū, emulsoꝝ amygdalatoꝝ, mentionem facit) cum idem videatur negotium, sive Chylus immediatè ad sanguinem portetur in corpore, sive prius per mammarum colatus tubulos, sanguini in brachio infundatur: quod si Chyli quandam depurationem fieri dicas in lactificatione, lac eò aptius erit ad nutritionem, quo purius. Imò cum Clysteribus fieri nutritionem, multi statuunt, quidni ipse nutrimentosus Chylus, sanguini injectus? Sed reaccuratè pensatâ, vereor, ne spes omnis sit inanis. Si namque corruptio optimi est pessima, vereor, ne lac sanguini, scorbuticorum acore rancescente im.

imprægnato, infusum tetram corruptionis, vel, quod pejus, coagulationis, induat labem, ipso admodum fermentescibili, facileque alterabili existente, unde rarum lac reperitur, quod non paucis, postquam emulctum est, interjecto tempore, copiosos exhibeat vermiculos. Ut taceam ipsum lac pro alimentorum ratione & animalium varia constitutione indies variare, aliudque alio melius, aliud nocentius deprehendi, de quo vid. Helmontius *Tr. Sextupl. Digest. aliment.* §. 71. 72. &c. unde facile tantum incommodi, quantum commodi, exinde emergere possit. Et merito Avicenna lacte vitioso nihil nocentius esse, statuit. Et quid fiet cum caseosa ejus parte, scæce nempe lactis, cujus malitiam vel nequitiam cum peculiari decantaverit tractatu Joh. Petr. Lotichius, non est, quod multa de hoc addam. Cautus ergo hic sit Medicus, & licet naturam imitari videatur, duo tamen cum faciunt idem, non esse idem, abunde notum est. Dum namque continuato cursu, lactis materia seu Chylus sanguini infunditur, Character ejus vitalis, qui in stomacho à fermento ipsi impressus fuit, non mutatur; quod tamen contingit simul atque extravasatur, eoque magis, si ad tempus steterit. Simul namque atque ex uberibus lac elabatur, partes ejus spirituosæ & subtiles multum evanescent, subitoque pars ejus caseosa coagulationis induit Characterem; (unde occulta accedente fermentatione, ratione prioris sensim acescit; ratione verò posterioris caseus ad fundum secedit.) Ad hæc quæcumque aeris labem, nobisque occultum vitium, facile lac in se recipit & quasi attrahit, unde & peste grassante usus ejus multis reprobatur, ob attractum veneni miasma. Hinc providò Consiliò papillas uberibus agglutinavit natura, ut immediatè oris suctu extrahatur à foetu lactis nutrimentum, ne aeris contactu alteretur. Quod autem de nutritione per Clysteres dicitur, falsum est, nulla namque alimenti ad nutritionem potest fieri adaptatio, nisi prius in stomacho ab ejus fermento vitali insignitum sit Characterem, cum præter dicta etiam nulla Heterogenei ab Homogeneo in intestinis fiat secretio, nullaque à bile Tincturæ sanguineæ ab ejus rubicundo oleo impressio, nisi namque hæc

Tom. II. Pars 2.

fiant, omnia alimenta putrescunt & cadaverisuntur, ut in ardentibus contingit febribus, unde & reliquos quoscunque nutritios liquores omnino ineptos censeo, ut venis injiciantur, cum experientia quoque doceat Infusiones diæteticas seu pro scopo nutritionis frustra esse tentatas, vid. *suprà cap. 1. §. 4. in fine.*

§. 4. Sed ut in viam redeam, dubitari potest; annon serum lactis, istis medicamentis permistum, sit salutare; hujus namque volat. ☉ ☉ & temperat ardores, & corrigit simul scorbuticum sal acidum corruptum: sanè tutius tentari hoc potest, quàm lac, modò benè præparatum, & ab omni caseosa parte separatum sit, ☉ ☉ ejus subtile magnarum est virium in multis morbis ab acido ortis, & quamplurimas sanguinis effervescentias efficaciter, simul tamen blandè, compescit. Quod si rationes adhuc supersint, quæ seri infusionem prohibeant, aquam ejus destillatam commendo, cum qua modò cautè & legitimè destilletur, magnam ☉ ☉ is volatilis partem simul elevari certum est, unde diluta hac aqua spirituosæ ista medicamenta & acria optatum dabunt successum. Quibus addo etiam spir. lumbricorum terrestrium, egregium antiscorbuticum, & imprimis molestissimum ejus symptoma, arthritidem vagam, medicamentum. Quibus *Ess. Myrrhe* ceteris permiscendam subjicio, cum hæc in confirmato scorbutico sanguinis singulares corruptiones & quasi putredinis macularum & stigmatum apparentia, (quas plenas esse vermiculis, putredinis nempe indivisibilibus comitibus, sunt qui affirmant) se prodentes, balsamicæ sua virtute inhibeat. Tandem benedicta arboris antiscorbuticæ seu pini laudo medicamenta, quæ tantum non miracula præstant in Scorbutico; ejus Spiritus ex novellis & tantum erumpentibus strobulis, item ☐ ejus oleosa & spirituosæ, secundum ductum Grugneri in *Tannenbaum*/ ut & ess. pini ☐ proprio parata, nec Medicum nec ægrum, ut propinata ita infusa, spe sua excidere permittent: de quo vid. Mollenbroeck *de Arthrit. Vaga c. 3. p. 116. & seq.*

§. 5. Lues Venerea ut in multis Lues Venerea cum scorbutico convenit [nam præter aeræa. aliam convenientiam uterque sua contagiosa hinc inde affigit miasmata] ita

[Sff]

ita malitia, contumacia, & symptomatum crudelium & dolorificorum tortura ipsi non cedit, sed longè potius post se relinquit. Hanc ab acido corrupto, in humore crasso & viscido ac pituitoso stabulante, oriri, ante aliquot annos splendidum Lugdunensium sidus, Franciscus de le Boe Sylvius publicè & accuratè docuit, ita habità dissertatione egregiè confirmavit. Methodus ordinaria, quæ nunc per decocta lignorum fit sudorifera, nunc per Mercuriales inunctiones, & inde foetidas salivationes, nunc, quod rarius, per Cinnabarinas suffumigationes, neminem, nisi qui in Practicorum scriptis hospes est, latere potest, quæ etiam speratum sæpius obtinet effectum, nisi malum sit nimis inveteratum; post curam namque Mercurialem peractam, quâ multum extenuantur ægri, ipsos mirabiliter & subito denuo pinguescere vidi. Quod si verò malum sit inveteratum, ægri verò ob immanes nocturnas ossium nodorumque torturas & dolores id non tam ferre nolint, quam ferre nequeant, imitandus venit Medicorum Dantiscanorum conatus, qui post infusionem peractam, ut supra *cap. 1. §. 5. &c.* subitaneum ægro attulerunt levamen, nam totam peractam esse curam, mihi persuadere non possum; eam tamen hoc modo esse possibilem, non dubito, præmissis universalibus, & tentatis iis, simulque continuatis, infundi possunt ex lignis paratæ Essentiæ omnibus notæ, v. g. sassafr. guajaci, rad. sarsaparill. cum ~ fumar. paratæ, &c. Non tamen necesse est, ut exoticis istis tantum, sæpè cariosis, aut nimio senio corruptis, adhæreamus, & nostra tellus hac in parte est provida mater, quæ larga manu nobis suggerit juniperum ejusque lignum (cui succedaneas cedro ad vitam longam implantavit vires, de quo videatur Tackius *in Orat. p. 67.*) ut & Buxum (cujus anodyna & antepileptica vis est miranda) loco guajaci & sassafras; radices bardanæ & Caryophyllatæ loco sarsaparillæ; præter hæc etiam sarmenta lupulorum & periclymeni, cum Corallinis ejus baccis, de quibus vid. Colle *Cosmit. p. 207.* Ut nihil dicam de aliis simplicibus, nempe persicaria, saponaria, scordio, absinthio, vincetoxico, & valeriana. Ex quibus pro lubitu Medici parata medicamenta,

sale volatili C. C. acuata, vel ~ the-riacali camphorato imprægnata, injici poterunt. Omnibus autem hoc in casu palmam præripiunt serpentes & viperæ, quarum ingenioso decocto non semel, ut curavit Tachenius lue Gallicæ infectos, vid. *ejus Hipp. Chym. cap. 11. p. 60.* Ita ex earum Essentia vel sale volatili, liquore convenienti soluto, injectis felicem spero successum.

§. 6. Ad Ictericam me conféro, ^{icteru.} quam & ipsam esse cachexiam, in qua sanguis vitiosè fermentatur, bilis vitio procreatam, clarum est: quæ sive sit flava, sive sit nigra, perinde est, cum ex uno scaturiant fonte. Bilis nempe sulphur seu oleosa pars in vitio est, quod corruptum & nimis copiosum existit, simulque sale ejus acre lixiviosum imminutum & debilitatum, unde Chylus à scoriis alvinis non ritè secernitur, nec debito modo ad futuram sanguificationem (invisibiliter licet tingitur, vid. Tackius *cit. loco. p. 16. 17.* unde corrupto & vitiatto chylo, vitiatæ sanguinis fermentatio & coloratio, aliaque symptomata succedunt: quod si succi pancreatici accedat vitium, quod sit vel vitriolicus, vel Osus seu ponticus, icterum nigrum corpus deturpare, admodum probabile est. Medicamenta primaria quæ conducere his affectibus per experientiam hætenus innotuere, sunt omnia Θe volatili, eoque acri inprimis, prædita (excipio hic ~ alia, aliaque, quæ, ut ab impedimentis primas vias liberent, & acidum absorbent, adhibentur, de lapide fulminari & exuviis serpentum, singularibus specificis, quomodo operentur, negotium adhuc est intricatum) quo obtundatur corrupta & nimia bilis oleositas; econtra verò augeatur & acuatur ejus Θ obrusum, acidumque & ponticum pancreatis succi corrigatur. Quod si E. obstinata contumacia affectus, inprimis icteri nigri, cum ob insignem succorum corruptionem in primis viis, tum ob gravem assumptorum medicamentorum alterationem ab iis, de quibus supra *c. 2. §. 4.* infusoriam postulat Chirurgiam, salina quoque volatilia, sed ob immediatum sanguinis contactum aliquantisper spirituosius oleosis temperata, injicienda: imprimis ~ urin. it. ~ lumbricor. terrestr. cum Ess. chelid. maj. abrotani, cent. min. Curcumæ, taraxaci, Hirun-

Hirundinar. Rhabarb. junctus, de qua re jam suprà aliquoties egimus. Est in pane, tam triticeo quam secalino, ejusque sale volatili, perfecta rubifica sanguinis tinctura, unde ejus Ess. rubicunda debito modo parata, vel etiam

Phthiſis.

§. 7. Hisce ceu corollarium adjungo phthisin, morbum, si quis alius, chronicum, & qui lenta tabe tandem ad mortem deducit ægrum. Hanc ab ulcere pulmonum esse nemo est qui dubitat, (cum flagello Angliæ verò seu tæbe Anglica aliter res se habet) & præter contagiosum miasma, hæreditariumque characterem, quo se multiplicat, sæpè scorbuti est filius, vel variolarum nepos, aut eorum, qui salibus vel mineralibus, imprimis aquæfortis, vitrioli, &c. vacant præparationibus, est præmium. Quæ ut tollatur, ad acidum fermentum ulceris, corruptivum proximi pulmonum alimenti corrigendum, omnis directæ est cura. Suffumigia & medicati aëres attracti multum adferunt opis, vid. Benedictus *Theat. Tabidorum*, vulnerariarum herbarum insignis est vis, ad tollendum istum acorem, occulto suo, quo imprægnatæ sunt alcali, vid. Helmontius *Tr. a sede animæ ad morbos*, §. 20. & ex eo Tachenius *Hipp. Chym. pag. 128.* quicæ ob id lacti præfert pro hæcticæ curæ p. 129. Nihilominus frequentissimè cum insigni medentum dedecore incassum adhibentur hæc remedia in phthisi, unde ad balsamica, Elixyr nempe proprietat. Balsamum Peruvianum, ipsùmque sulphur, & ex eo sulphuris paratum balsamum, progressi sunt, sed & hoc non raro frustratentatum; imò Expertissimo Dn. Michaelis testante, multi ex nimio balsami sulphuris usu in phthisin vel etiam hæcticam inciderunt. Progressi hinc sunt ad metallica, & diaph. Antihect. Poter. Sacch. Saturni (non contemnenda multis in affectibus remedia) vitriol. & in usum revocatum; unde quam plurimæ antiphthificæ tincturæ ex Saccharo Sat. & vitriol. & paratæ fuerunt. Sed & hæ ipsæ sæpius spem ægri fallunt, utut per se egregia sint medicamenta. Nam licet vitriol. per se phthificis sit virulentum, unde

Tom. II. Pars 2,

& acidulæ iis nocivæ cum eorum usu aliquot phthificos hydropicos factos observarim; est tamen dulcedo vitrioli, postquam ab omni separatum est acido, quæ ab ejus sulphure pendet, & omnem vulnere & ulcerum corruptorem enecat. Quod si verò nil horum juvare valeat, Essentiæ ex vulnerariis & ligno sassafras cum roris majalis paratæ, vel vseri lactis destillata extractæ, per Chirurgiam Infusoriam sunt injiciendæ, ut teneretur, quid propiori contactu hæc valeant. Quod si non metuenda sit insignis incallescencia sanguinis, cum Sp. V. paratæ, it. Solutio balsami Peruviani, injiciendæ. Vix equidem fieri potest, quin aliqualis Essentiarum harum fiat in sanguine præcipitatio, sed ob id earum usus non est negligendus, cum debito modo operentur, ut exemplo similium c. 1. §. 4. & 5. allegata testantur: id quod & de Essent. Benzoës, vero pulmonum balsamo, it. myrrhæ, omnis in ulcere corruptionis destructoris, intellectum volo. Terebinthina sola est balsamus verus occidentalis internorum ulcerum & vulnere, hinc Medicus, qui convenienter eam diluere & solvere in liquorem limpidum noverit, eam injiciendo, intentum assequi valebit.

CONCLUSIO VII.

In febribus acutis cum inflammationibus, itemque malignis, melius est infusionem experiri, quam ægrum ceu deploratum relinquere.

§. 1. Expeditum remedium postulant febres, cum inflammationibus erysipelaceis partium imprimis internarum conjunctæ, cum sint admodum acutæ, quales sunt angina, pleuritides, & peripneumonia, inflammatio jecoris, diaphragmatis, quæ & paraphrenitis audit veteribus, ventriculi, cerebri, cujus inflammationem sphacelum appellabant veteres, Autore Lindenio, quod si hæc inflammatio exteriora capitis occupet, Erysipelas capitis appellatur. Omnes hi affectus periculosi & acuti, unus tamen plus, alter minus. Causa est acallescencia inepta sanguinis, cum Sc ejus volatili effervescens, & ad coagulationem disponens, unde reliqua omnia symptomata, & stagnante in hac vel illa parte sanguine, dum ob crassitiem per vasa capillaria difficul-

Febres acutæ cum Inflammationibus,

[Sff 2]

ter

ter pertransire potest, inflammatio inducitur: quod sufficienter probat Helmont. *Tr. Pleura furens*, it. Willis *de febr. c. 11*. Et confirmat experientia, tum anatomicorum, qui sanguinem p. n. crassum & grumescentem in taliter mortuis reperierunt, tum Gabelchoveri *Cent. 4. Cura. 70. & 79*. Hinc & ii, qui post nimiam incalescentiam corporis, imprimis ex exercitio vehementi, subito frigidum ingurgitant potum, facillimè in hos morbos incidunt, ob subitaneam sanguinis coagulationem; hinc eadem medicamenta, quæ in hoc casu, ut & in lapsu ab alto profunt, pleuritidem similesque morbos sanant. Totum negotium consistit in resolutione sanguinis grumescantis, quam sequitur immediatè sudor. Præstant hoc medicamenta ea specificè, quæ acidum illud conceptum tollunt, & sanguinem incrassatum resolvunt, omnia quæ alkali constant tam fixo, quam imprimis volatili. Sæpius, imo maxima ex parte, satisfaciunt assumpta interna, quod si non contingat, sed mala interim exasperantur, ultimum fere refugium est in Chirurgia Infusoria. Injici possunt liquores volatiles salini, v. g. C. C. sanguinis humani: $\Theta \times ci$, aliorumque, dissoluti in ∇ chærefolii vel spermat. ranarum, aliave appropriata: quod quia per se patet ex sæpius jam dictis, hic prolixus esse nolo. De febribus ardentibus simplicibus & periodicis ob certas causas hic aliquid dicere supersedeo.

Febres
Malignæ.

§. 2. De malignis quid dicendum sit, ferè hæreo, ob obscuram earum naturam; sicut alias nuspiam magis cœcutiunt Medici, quam in venenorum natura & cura, imprimis in iis, quæ non ex animalibus originem ducunt. Sunt namque, qui in malignis febribus nimiam ponunt dissolutionem, ob sal alkali volatile subtile & acre excedens; sunt, qui in eis p. n. ponunt coagulationem; sunt, qui talem in iis statuunt putredinem, ut sanguis in copiosissimos abeat vermiculos; alias aliorum ut silentio præteream sententias. Ubique prostant rationes pariter & experientiæ; unde ut theoria est diversa, ita & cura. Sunt, qui acidis sanguini debitam restituere volunt consistentiam, sunt, qui sudoriferis cum diluendum suadent, ex quibus optima medendi methodo, medium eligit Joh. Stephanus *Operib.*

Med. Decad. 8. Conf. 3. & Decad. 9. consil. 6. Et in principio & incremento effervescentiam præcipitantibus corrigendam suadet, qualia sunt acida moderata; in statu verò, vel tunc temporis, quo natura expulsionem aggreditur, sudoriferis ipsi esse opem ferendam: qualis Methodus ab accuratioribus Practicis in variolarum imprimis cura observatur, unde & alii *electuar. diascordii Fracastorii* in principio malignarum adeò commendant. Faciunt huc ex parte, quæ supra *Conclus. 2. §. 4.* de sudoriferis dixi. Experientia hic optimus Judex: ut namque variant malignæ febres in sua natura, ita & varianda earum cura; omnes ejusdem enim esse naturæ, nullo modo mihi persuadeo; alia namque pestilentialium est causa & affectio, alia morbi Hungarici, sicut in morbillis vel variolis & in dysenteria maligna non minorem concipio diversitatem, &c. In hoc quidem omnes conveniunt, quod sudoriferis ventilanda & expurganda veniat massa sanguinea, quod cum omni febre continua putrida dicta commune habent. Quæ quidem in principio sint pauca, in incremento moderata, in statu generosa, & hoc tempore sola, illis verò temporibus, præcipitantibus seu effervescentiam compescentibus mista, semper camphora est utilis. Omnia ergò si ritè fiant, ad pejus tamen ruat continuò æger, ne aliquid prætermisum sit, quod fieri commode potuisset, ad infusionem quoque accedat Medicus, & quidem in statu imprimis, ubi volatilia sudorifera ex C. C. sanguine humano, viperis cum camphora & theriacalibus mista, infundat. Sulphur, quod Hippocrati arcanum ad pestem curandam fuisse dicitur, in peste ultima crudeli Londinensi multum fecisse, certum est, etiamsi solum stigma ejus acidum potui ad gratiam saporis permistum fuerit; quod etiam in sanguinis putredine ceu expertum laudat Tackius *Judicio p. 104*. Magis verò optatui Medici satisfecit, si potus per Gas Sulphur. imprægnatus fuit, quem ad asthma Helmontius commendat *Tr. asthma & tussis §. 77*. Methodum verò hæc duo miscendi docet Cnoëfeli *Tract. de febr. Epidemica p. 96*. quem is similiter ad omnes febres malignas universaliter commendat; quo potu mirabilia in peste ista Londinensi se præstasse,

tisse, Medicus quidam ibidem locorum mihi affirmavit. Annon injectio hujus liquoris imprægnati fieri potest in venas? Dubito, ob coagulum, quod metuo, cui lubet, experiatur.

CONCLUSIO VIII.

In morbis hæreditariis frustraneam esse Chirurgiam Infusoriam, arbitror, ut & in Arthritide & Nephritide.

Morbi
hæredita-
rii.

§. 1. Hactenus in quibus casibus probabiliter conducat infusio? explicatum, restat ut & quorundam faciam mentionem, in quibus inutilis apparet. Pro scopo diætetico eam esse nullam, ex iis patet, quæ supra *Conclus.* 6. §. 3. dixi. Idem de hæreditariis affectibus similiter judicandum, modo radices eorum cum vitæ, imò in vitæ ipsis principiis insertas, consideremus. Ob has namque causas in ordinario quorumcunque remediorum usu inextinguibilis eorum est furor, si semelexarierit? siue namque ex Ideis morboris in Archæo in generatione sigillatis, siue ex fermento quodam cum contagio seminis spirituoso translato, siue ex alia adhuc incognita ratione sint nobis congeniti, perinde est, ubique enim medicina est imbellis, adeorum insultus. Quid ergo hic faciet Chirurgia Infusoria? aut qua ratione corriget causas, adeo firmiter radicata? Qualisnam liquor est infundendus, qui extinguat occulta eorum semina? Hæret hic aqua, & exultat infusio.

Nephritis
& Arthri-
tis.

§. 2. Hoc similiter dicendum de nephritide, ut & de arthritide, quorum coagulans pariter ac tormentans acidum non tam infestat sanguineam massam, quam quod stomachi imprimis suscitetur vitio. Et cum in nephritide propior via ad renes ex intestinis sit, quam ex brachio per venas & arterias, quod supra *Conclus.* 2. §. 3. innui, potius propiore via deducenda sunt medicamenta, cuicunque etiam usui inservire debeant, quam remotiore. Cum arthritide eodem modo se habet negotium: acidum nempe in primis viis corrigat, qui præservari vult à Paroxysmo, aut ejus præsentis acerbationem gravem inhibere, cui cum satisfacere queant per os ingesta remedia, quid opus est eadem infundere? Aut licet infundatur, plus adjumenti tamen, modo non minus, asferre nequit: imò cum

ad præsertionem arthritidis præter vomitum nil conducibilius, quam per urinam repurgare sanguinem, quod idem in curatione est singulare arcanum, cuiusui injecta Oso volatili & plena, nempe lumbrici, aselli, & in specie scarabæorum totus exercitus, præcipuè inserviunt; hæc autem per os assumpta apprime necessitati satisfaciant, abstergendo & expurgando & sylvestria primarum viarum, frustranea omnino & superflua hac in parte est omnis infusio.

CONCLUSIO IX.

In mulieribus gravidis periculosa admodum est infusio, in infantibus verò recens natis difficilis, imò inutilis.

§. 1. Totum negotium, quod in gravidis ut talibus incumbit Medico, est, ut præmaturam foetus præcaveat exclusionem, hoc est, abortum. Huic nihil confert infusio, cum liquor infundendus, per os assumptus, eundem præstare valeat effectum, imò fortè meliorem, quia celeriore, si vera est probabilis modernorum Anatomicorum suspicio; vias esse quasi lacteas, ex mesenterio ad uterum, nutrimentum pro foetu eo deferentes. Et qualis liquor pro præcavendo abortu infundi potest? Sin infundis liquorem confortantem spirituosum & volatilem, vel hujus generis alium, qui commoverat spiritus & massam sanguineam, metus est, ne vehementiore eorum agitatione uterus moveatur, & à spiritibus inordinate motis, ejus fibræ nervæ impleantur & contrahantur, unde foetus expulsio. Hinc namque vinum adeo strictè interdicitur gravidis à Practicis, ne spiritibus vel sanguine commotis, sequatur abortus. Hinc omnia medicamenta, quæ levem menses proritandi habent potentiam, ut venena gravidis prohibentur. Quod si verò infundere velis liquorem opiatum, pro compescendis spiritibus nimium ferocientibus, vel ex morbo, vel delirio, vel dolore, vel omni affectu graviori, imprimis ira, terrore, pavore, &c. (quos frequentissimè insequuntur abortus, turbatis spiritibus,) in summum periculum gravidam injicis: nam torpentibus spiritibus eorum motus æquabilis, & blanda fibrarum nervosarum inflatio cessat, unde & fibris uteri laxatis, hic sponte foetus elabi permittet, tono ejus sic resolutio. Præterea

nil nocentius est gravidis, medicamentis opiatīs, teste accuratum quorundam Practicorum experientia; quibus opiata lege artis adhibita, tam mediis quàm etiam ultimis mensibus, imò sub finem gestationis, abortum provocare, foemellarum damno innuit. Imò opium singulariter utero esse infestum, eadem docuit experientia: eo ergò gravis infuso, quæ non mala exinde oriuntur? Blande ergò tractandæ gravidæ; imò nulla uti medicina apud eas sæpe est optima medicina, cum abortum, ob nimium eum præcavendi studium, interdum inductum esse observatum sit.

§. 2. Tenellos quod attinet infantes, si adhuc nutricis sustententur lacte, si solidioribus uti cibis assuescant, in iis admodum difficile erit, Chirurgiam Infusoriam exercere; ipsi enim adhuc immorigeri & intractabiles, quomodo aut venæ apertionem, aut instrumenti intrusionem ferent? Eorum corpus succi plenum sub cute ab humiditatibus imbibitis turgida, altè abscondit vasa, quomodo ergò ea inveniendæ? Ipsorumque vasorum exilitas inepta admodum per se est huic opera-

tionem. Et ob quem usum turbabis semilacteam tenellorum sanguineam massam, aut quem in finem, cui non abunde satisfaciant per os ingesta? Morbi ordinarii, quorum subjacent imperio tenelli, ex lactis vitioso propullulant coagulo, ab acido p. n. oriundo, propter quam causam etiam lac rejicitur ceu ineptum pro nutritione foetus ad vitam longam ab Helmontio. Qui ergo acidum præcavere aut debito modo corrigere valet, sufficienter instructus est pro medendis infantum vitiis: cui scopo vel solus anisi feminis grossè contusus sufficiens est. Benedictum sanè pro infantulis hoc est medicamentum, quod & acidum corrigit, stomachum roborat, flatu intestinorum dissipat, & lactis coagulati æruginosi excrementa per alvum exoptate exturbat. Sed his abrumpo, rogando Lectorem, ut si quædam minus vel concinnè dicta vel præmeditate scripta videantur, ea festinanti, imò currenti & volanti calamo, imputare velit. Dum ego interea dico

SOLI DEO GLORIAM.



DISPUTATIO V. MEDICINA HIPPOCRATIS CHYMICA,

MICHAELE ET TMULLERO,
Phil. & Med. Doctore, Publico Examini exposita,

die 28. Octobr. Anno 1670.

RESPONDENTE

HENRICO WARNATIO, Schovva Polono,
Philosophiæ & Med. Studio.

Q. D. B. V.

Hermeticorum Chorus pleno gutture decantat suam Tabulam Smaragdinam, in qua omnis sapientia veraque Philosophia mirà brevitate deprehendatur, ita ut instar Lydii lapidis omnium Philosophantium & sit & esse debeat. Idque eò magis, quod totum Mystrium Sôphorum, & gloriosissimum Lapidis Benedicti artificium in eadem depictum pariter ac descriptum reperiatur. Linquamus iisdem hac vice Smaragdinam Tabulam, suspendendo hujus loco Cedrinam, in quâ Divina Hippocratis Oracula, cedro sane immortalis quæ inscribantur dignissima, exarata conspiciantur: qualia sunt, quæ lib. de priscâ seu veteri medicina nobis reliquit, dicendo: Nihil igitur utilius, neque magis necessarium, quàm hæc cognovisse: quod & probe & convenienti ratiocinatione investigantes, juxta hominis Naturam hæc primi inventores invenerunt, judicaveruntque artem dignam, quæ DEO adscriberetur, quemadmodum etiam est receptum. Non enim siccum neque humidum, neque calidum neque frigidum, neque aliud quicquam, ex his putaverunt hominem ledere, neque aliquo horum homini opus esse, opi-

opinati sunt; sed quod in unoquoque forte & humanâ Naturâ potentius est, quodque non possit superari, hoc ipsum ledere dixerunt, & hoc auferre quaesiverunt. Fortissimum autem est inter dulcia dulcissimum, inter amara amarissimum, inter acida acidissimum, & in omnibus adeo rebus vigor ipse ac summum: Hæc enim & in homine esse viderunt, & hominem ledere. Inest enim in homine & amarum, & salsum, & dulce, & acidum, & acerbum & fluidum & alia infinita, omnigenas facultates habentia, copiamque & robur. Atque hæc quidem mixta, ac inter se temperata, neque conspicua sunt, neque hominem ledunt: Ubi verò quid horum secretum fuerit, atque ipsum in se ipso fuerit, tunc & conspicuum est, & hominem ledit. De hac Hippocratica sententia, cum exercitii gratiâ quedam exarare sit animus, faxit summus Archiater, ut fiat Felicitèr.

CAPUT I.

*Qualitatum Elementalium**Hippocratica Correctio.*

§. 1.

UT cautos reddat suos filios Hippocrates in prudenti instituenda prognosi, si quid in morbis divini insit, acutè perpendendum, accurateque perno-scendum hortatur. Quod divinum quid sit, ut intelligatur, Divino opus habet Oraculo, cùm tot de eo sint sententiarum, quod interpretes id explicare aggressi sunt, & ipse Hippocrates vix alio in loco apertam præterea mentionem ejus faciat. Sunt qui occultarum qualitatum seu totius substantiarum, ut vocant, morbos hic intelligunt: alii omne virus abditum & insolens occultumque in morbis huc vocant: alii Ideam morbificam, & ab eadem productos morbos ideales seu archeales, substituunt. In genere Divini nomenclatura ab Hippocrate quibusdam indita videtur morbis, vel quod singulari Superum potentia inducti videantur, vel quod eorum Natura obscura non nisi à Superis sit dignoscenda & curanda. Ob id ergò, quod sint divini & obscuri, adeoque sublimioris conditionis, & non superficialiam requirant considerationem, raram eorum facit mentionem, quin potius reliquos ex manifestioribus deducendos rationibus hinc inde, præprimis in aureo de Veteri Medicinâ libello, accuratè & perspicuè pertractat.

§. 2. De his nota sunt dogmata, longâ annorum serie in scholâ Galenicâ mutuâ interpretum subscriptione confirmata, quod nempe corpus humanum ex quatuor Elementorum mixture compositum, ex primis horum qualitibus certam obtineat temperiem, quatuor humoribus nutritiis Elementis analogis sustentatam: quibus vitiatis, non tantum varii excrementitii oriantur humores, non nisi elementaribus qualitibus definienti, sed præterea læsâ istâ naturali temperatūrâ diversi intemperiei resultent morbi, qua-

ternioni Elementorum similiter superstructi: unde & remediorum vires non nisi per qualitatum elementarium varias graduationes determinantur, universaque ferè medendi methodus his circumscribitur limitibus: si quid superest, his primis qualitibus non declarabile, qualitatum occultarum vasto inscribitur catalogo.

§. 3. De his quid judicandum, ingenuè nos informat Hippocrates, non tantum in proœmii loco suspensa Tabula, sed præterea dum *libr. de Veteri Medicinâ* ita inchoat: *Quicumque de Medicinâ dicere aut scribere aggressi, dicendi scopum ac fundamentum sibi ipsis supposuerunt, calidum aut frigidum, aut humidum aut siccum, aut aliud quodcunque voluerint, rem in compendium contrahentes, principium causæ tum morborum, tum mortis hominibus idem, unum aut duo proponentes: hi in multis quidem quæ dicunt, manifestè errasseprehenduntur: & s. 27. num. 30. ejusdem libri pergit dicere: frigiditatem & caliditatem ego omnium facultatum minimè potentes esse in corpore existimo.* Adjungo his accuratissimum scientiarum restauratorem & augmentatorem Franciscum Baconem, Baronem de Verulamio, (cujus vestigiis tam feliciter sui conterranei Angli insistant, per accurata minimèque fallacia experimenta, Naturam ad promovendam Medicinam artesque mechanicas, scrutantes) qui quodam in loco apertè asserit: *Elementorum commentum, quod a vidè à Medicis acceptum, quatuor Complexionum, quatuor humorum, quatuor primarum qualitatum conjugationes post se traxit, tanquam malignum aliquod & infustum fidus infinitam & Medicinæ, nec non compluribus mechanicis rebus sterilitatem, attulisse.*

§. 4. Perverustum sanè esse hoc dogma, quod augustum Naturæ palatium quatuor qualitibus primis, ceu angularibus lapidibus superstruit, minimeque gentium à Peripateticâ tantummodò schola primò fundatum, quin potius Hippocratis tempore magno applausu receptum fuisse, totus citatus tractatus

tractatus Vet. Med. unicè contra hoc dogma conscriptus, testatur. Nam Hippocrat. tempore Artaxerxis Longimani centum & aliquot annos ante Alexandrum Magnum, & ita etiam ante Aristotelem vivens, Democrito familiaris & amicus, sine dubio hujus accurata Naturam interpretandi crebris firmisque experimentis, in quibus totus fuit Abderita, confirmata dogmata hausit, iisque in-nixus, vulgatam tunc temporis elementarium qualitarum doctrinam, ceu Medicinæ aut non sufficientem, aut inutilem rejecit, & atomorum variè conformatarum corpora componentium, indeque ortarum sensualium qualitarum & aliarum proprietatum beneficio, tam macro quam in specie microscopi mirabilia exposuit, cum ex hoc Abderitano lumine, præter scholam Epicuream, tam Cartesii materialis, quam modernorum quorundam Corpuscularis Philosophia, primos suos radios hausisse, quodammodo videantur. Aristoteles verò Elementorum istam & qualitativam hypothesein, à majoribus traditam, in specie ex Ocello Lucano excerptam, posteris ceu suam proposuit, & quantum possibile, antiquos Philosophos oppres-sit, utpotè qui secundum Illustr. Verulamium de *Augment. scient. l. 3. p. 228. more Ottomanorum regnare se tutò haud posse putaret, nisi fratres suos contrucidasset.* Hujus postmodum tam à Galeno, quam hunc insequentibus Arabibus, arrepta Philosophia in Medicorum scholas, neglectis limpidis Hippocraticis fontibus, derivata, & copiosa Commentariorum foeturâ multiplicata fuit.

§. 5. Cæterùm tota Physica Peripatetica specialis, & huic à Galeno superstructa Medicina, ex eo nutare videtur, quod quaternio iste Elementorum nunquam & à nemine adhuc vel ullâ apertâ ratione demonstratus, vel certâ quadam experienciâ confirmatus fuerit; quin potius Natura rerum ubique ipsi repugnare videatur, ut hoc sufficienter declarant Dominus Boyle in Chymista Sceptico, & Helmontius hinc inde in suis scriptis, in specie *Tr. Mist. Compl. Elem. Figm.* Et hoc ipsum curiosioribus ingeniis primum subministravit calcar, reformandi vulgatam de Natura rerum doctrinam, & vel antiquam Democriteam & Epicuream, vel Hermeticam dictam resuscitare Philosophiam, vel novam quandam per experimenta ab ipsa Natura, ejusque æmula Arte, subministrata, illam interpretandi investigare rationem. Nam quatuor istas primas quod attinet qualitates; hæ ipsæ, non secus ac cæteræ, secundæ aut tertiæ appellatæ, modi saltem sunt materiæ, ex ejus particulis corpora componentibus variè conformatis & contextis, & diver-

simodè motis resultantes. De quo vid. Boyle *lib. de Origine formar. & qualit.*

§. 6. Non rejicit verò ex toto Hippocrates has ipsas qualitates, aut tanquam inermes contemnit, utpote cum ubique in suis scriptis easdem adducat, sed tantum ceu minus efficaces eas considerat, & non sufficientes, ut ab iisdem insigniter corporis machina alteretur, adeoque Medico convenientem medendi rationem subministrant; quin potius iisdem semper potentiorē facultatem annexam asserit, à qua in primis activitas & energia promanet, cui alia ex primis instar pedile-quæ adhæreat: *Non enim propter calidum simpliciter homines febricitant, sed est amarum & calidum idem, & calidum, ac acidum & falsum ac calidum, & alia infinita, & rursus frigidum cum aliis facultatibus conjunctum. Hæc itaque sunt quæ lædunt: si simul adest autem calidum robore participans, nimirum ducens, & exacerbans, & augens simul cum illis, verum nullam potentiam majorem quam convenit videlicet habens cit. loc. p. 30.* Terunt pressò pede hac in parte Divini Senis vestigia Paracelsistæ & Helmontistæ qualitates istas primas relollæas vocantes, i. e. non procedentes immediatè ex fermentis & seminibus rerum. Unde etiam fermentis & fermentationibus transmutationum autoribus tribuuntur ea munia, quæ calori aliàs fuere adscripta, cum hic non effectivè, sed tantum dispositivè, operetur,

§. 7. Rationes autem, quas profert Hippocrates, ut insufficientiæ arguat istam qualitatum Elementalium hypothesein, *cit. libr. conscriptæ*, & ex observationibus quotidiano usu obviis haustæ, (paucis ut repetam eas) sunt ferè sequentes: 1. à Dieta *f. 22. f. 23.* quod alimenta, v.g. triticum, caro, aqua, vel inordinatè ingesta, vel non ritè præparata, nos lædant, & contra hæc præparata aut aliàs mutata nos denuò sanent, sine ullâ per qualitates elementares inductâ aut sublatâ alteratione. De quo plura infrâ. 2. Ab auctoritate majorum *f. 24. & 22.* novum modum artem medicam quærendi esse, ex elementaribus qualitatibus; primos enim artis inventores has ipsas rejecisse vires, & potius sapores, tanquam morborum autores, observasse. 3. Ab alimentis medicamentosis *f. 25. 26.* Nam alimenta temperata esse, quæ nos nutriant, & corpus sanum conservent; sin verò nos alterent alimenta nonnulla, hoc ab ipsis fieri, non quatenus calida aut humida, &c. licet tales proprietates attribuantur iisdem à quibusdam; sed quatenus sint, amara, salia, acida, &c. 4. A methodo medendi *f. 27.* Curam nullam fieri per calidum aut frigidum simpliciter, cum multa sint calida, licet diver-

diversissimarum virtutum: quædam scilicet calida acerbæ, calida tenuia, aliasque subcontrarias vires sibi ipsis habentia: cum autem his indiscriminatim adhibitis contrarii sequantur effectus, necesse esse, ut potius ad vires adjunctas calido, quam ad ipsum calidum respiciatur. 5. A subitâ permutatione unius extremi in alterum, istarum qualitatum. f. 28. & 29. sive à frigore in calorem, sive à calore in frigus, tam vitâ communi, per mutationem loci & vestimentorum, quam in febribus, in quibus extremis rigoribus acutissima febris subitò succedat; & post sudores adeo subitò ægrum denuò frigare, ac si nunquam febricitasset. *Cui igitur*, inquit, *brevis adeo contrarium accedit, cuique vis adimitur suâ sponte, quidnam ab hoc magnū aut grave fiat? aut quid opus est multo auxilio?* 6. A duratione morborum. f. 30. cum qualitates istæ sint adeo facile mutabiles, in quibusdam verò morbis, febribus ardentibus, peripnevmoniis, &c. calor sæpè sit diurnus, eo ipso non solum esse calidum, sed amarum & calidum idem, & calidum & acidum, & salum & calidum & alia infinita. 7. A defluxionibus. f. 31. 32. 33. in quibus æger malè se habeat, quamdiu materia sit acris, quàm calores & ardores, febresque insequantur; temperatâ verò materiâ acri, & inspissatâ nimis tenui, idque ex sola permissione, & ægrum sanari, & calorem spontè cessare. 8. A nocentibus. f. 34. humores peccantes esse tales ratione saporum, qualis v. g. bilis flava sit ratione amaritudinis; bilis verò æruginosâ sit adeo anxiosâ ratione acrimoniæ. 9. A coctione & cruditate. f. 35. humores scil. concoqui & alterari per omnigenas species, à quo ratio crasium dependeat; hoc aut calidum aut frigidum perpeti, i. e. coqui, nunquam contingere.

§. 8. Sed ut pergamus in examine dogmatis vulgati, viscerum quod spectat temperiem vitalem, hæc tota dependet à sanguine, spirituque vitali, qui æqualiter per sua vasa iustitiâ distributivâ in partes effusus & circulatus, ipsis debitam largitur temperiem; unde eodem æstuante in causo, & totum corpus ardet, eodem vero in senibus deservescente, totum corpus similiter tepet: unde & vipera tum corpus ad tactum friget, cum sanguis eorum & cor actu in iis vigentibus frigeant, non minùs quàm in ranis aut piscibus. Quid verò per temperamentum reverà intelligendum veniat, malo verbis J. M. Marci declarare, qui in *Philos. Vet. Restituta* P. 2. f. 4. p. 133. ita inquit: *Per temperamentum intellige non qualitates primas, aut harum symmetriam, verum constitutionem cujusque radicalem, ex qua veluti effectus procedunt dictæ qualitates: cujus potissima vis*

Tom. II. Pars 2.

in sanguine, qui est proximum subiectum animæ, & primum vivens, cujus gratiâ corpus universum videtur factum, vitamque ex eo participare, humidum vero radicale aut sanguis est, ut vult Harvæus, aut certè in eo radicatur; & corpus sanguine destitutum confestim friget, nihilque manet in eo de temperamento, &c. Inest scil. omnibus mistis sua determinata crasis in semine radicata, & in corpus inde genitum necessitate seminali, qua semina omnes suas energias in productis explicant, & hæc rursus ea in nova semina concentrant, propagata: hujus enim medio corporum tam in specie quàm in individuo mirandæ idiosyncrasie per generationem multiplicantur, ex Elementis eorumque qualitatibus nullatenus explicandæ, utut primariam craseos temperamenti partem constituent. Prout E. radicalis ista sanguinis & spiritus variat crasis, (cujus ratio ex certa particularum materialium, imprimis salinarum, corpora ex seminum directione componentium habitudine & textura, indeque mutua activitate dependet,) etiam variet animalium Natura, ipsaque temperies.

§. 9. Sanguis E. proportionaliter distributus in partes, proportionatum quoque calorem, aliasque nobis apparentes qualitates, iis impertit; unde facile patet, quid habendum de decantata ista intemperie viscerum inæquali, nempe ventriculi frigida & hepatis calida, ex qua, tanquam Pandoræ infausa pyxide, tot contumaces affectus, v. g. cruditates, ructus acidi, flatus & tormina, cachexiæ, catarrhi, & tantum non omnes morbi chronici, surgere dicuntur. De hac apertè pronunciat Joh. Ant. von der Linden in *Colleg. M. Sto in Hartmanni Prax. Chymiat.* c. 124. *Hoc mera est fabula; partes non habent calorem ex se, sed ex sanguine hunc accipiunt, qualis enim sanguis est, talis quoque est calor in parte, quomodo E. idem calor, qui hepar calefacit, potest ventriculum frigefacere? dein si hepar sit calidum, quomodo ventriculo incumbens non calefacit eum, sed refrigerat?*

§. 10. Ut, quod probabilius videtur, proponamus, reverà in tali casu intemperiei putaræ inæqualis tota mali radix plantata est in stomachi cavo, cujus succus fermentativus nimis acidus & fixus, nimiusque volatilis cum copioso muco viscido ex βραδυσυψία coacervato junctus, & stomachi inflationem, & ructus acidus, & vomitus similes, & tormina intestinorum, & phlogoses aliasque symptomatum myriades producit, quatenus primam alimentorum digestionem perniciosè depravat, eaque in liquamen acidum &

[Ttt]

visci-

viscidum corrumpit loco ejus, quod in subdulcem seu salsum volatilem, aut saltem moderate acido volatilem, transmutare debeat cremorem. Unde & in tali casu, indeque consecutivè ortis affectibus, præter vomitoria profunt ea, quæ vel acidum absorbent, ut Saturnina & Martialia, item fixa Antimonia- lia, ut ex animalibus cornua & ossa, eorum- que coagulata lapidea: vel quæ idem tem- perant, & sensim denuo volatilifant, qualia sunt vegetabilia gustu acria, ut allia & porrum, ab Hippocrate acida eructantibus commen- data; & antiscorbutica, quæ sale volatili acri turgida æstimantur, item aromatica, aut re- verà talia, aut his affinia, v. g. mentha, aco- rus, absinthium sale volat. oleoso temperato dotata. Hippocratem quod attinet: nullibi talis inæqualis intemperiei meminit, sed ista symptomata, ceu ex cruditate stomachi ori- unda, exponit *l. de affection. f. 44. n. 14. & 15. & specialiter l. 3. de dietâ f. 20. 21. & 22.* apertè deducit, quomodo à cruditate hac stomachi acida quamplurimi affectus in spe- cie cachexiæ & anasarçæ dependant?

CAPUT II.

*Facultatum Salinarum Hip-
pocratica Assertio.*

§. 1.

Non siccum, neque humidum, neque calidum, neque frigidum, neque aliud quid ex his, hominem magnoperè lædere, hætenus nos docuit divinus noster Cous. *f. 24. sed è contra inest in homine & lædit, & amarum & salsum, & dulce, & acidum & acerbum, & fluidum, & alia infinita, omnigenas facultates habentia, copiam- que & robur.* Mirum sanè, quam apertè hic loquatur Hippocrates, & quàm formidu- losum exercitum in campum educat, ita, ut *μυρία* (quod vulgò infinita vertunt, Foësius ve- rò numerum pro indeterminato sumens sex- centa, Junius decem millia interpretatur) talia contra nos armet, & hæc ipsa *f. 27. c. l. tum in homine, tum extra hominem, sive edantur sive bibantur, sive forinsecus il- linantur; & quomodocunque formata adhibeantur.* En totam Hippocratis Patho- logiam Medicam, quam non recentem aut novam, indeque quibusdam futuram nau- seosam, sed ut ipse *cit. loc.* fatetur, à *primis artis inventoribus acceptam*, graphicè tan- quam in synopsi nobis delineat.

§. 2. Inesse verò in nobis tales sapes & facultates, experientia tam quoad as- sumpta, quàm quoad retenta & excreta, uber- tim confirmat. Panis secalinus, quo nullum frequentius est alimentum, his facultatibus Hippocratis turget; moderato igne enim fun-

dit spiritum acidum volatilem (cum quo et- iam aliquantulum salis volatilis in rectificatio- ne unà ascendisse, apud amicum me vidisse, meminì) brevi temporis spatio, absque Vul- cani adjumento, aut Veneris aut Martis tin- cturas, aut coralliorum aut hæmatitis solvens & extrahens, & in nonnulla corpora minera- lia potentiùs ferè agens, ipsa ∇ forti. Præter panem assumimus acida, amara, acria, aroma- tica, dulcia, insipida, acerba, falsa, &c. ea- que variis salibus imprægnata, quæ utut sub stomachi digestionem in homogeneam, quoad sensum, falsam aut acidulam abeant massam, retinent tamen adhuc nonnullæ suæ craseos vestigia, quod effectus medicamentosi tali- um alimentorum non rarò confirmant. Dis- solvuntur hæc assumpta in stomacho à succo salino sapiùs acido; teste namque experien- tiâ omnia assumpta, etiam saccharum & mel, primùm in stomacho acescunt, quòd tam ru- ctus, quam legitimo tempore provocatus vo- mitus, antequam scilicet alimenta per fermenta- tionem in chylum transmutata fuerint, ma- nifestant. Quam fermentationem non mo- dernorum saltim inventum, sed jam Hippo- crati cognitam fuisse, palam est ex *f. 20. libr. de Vet. Med.* ubi ita disserit; *Et sanè puto his, qui cibum sumere consueverunt, quod non expectaverunt tempus justum, donec ipsorum venter pridie ingestos cibos perfe- ctè consumpsisset, & exsuperasset, evacua- tusque esset, & quievisset, sed in ferven- tem adhuc & fermentatum novos ingres- serunt, &c.* Hinc simili menstruo acido volatili chylum artificialem ex alimentis in vitro producere novit Tachenius in suo *Hip- pocr. Chym. cap. 31. pag. 78.* & Boyle men- struo ex vitriolo artificiosè parato idem per- ficit, *Usefulness of Experim. Philos. P. 2. p. 20.* Acri vero nimis reddito hoc succo ap- petentia canina exurgit, in qua copiosa acida vomitu rejecta affectum aut leniunt, aut tol- lunt; sicut pingua in tali casu acorem vitio- sum obtundunt, aut fixa terrea eundem ab- sorbent. Balsamicus bilis sapor amarus inti- gniter omnibus notus. Pancreatica lymphæ, nunc subacida, nunc falsa deprehenditur, ita tamen acris, ut anno, & quod excurrit, cla- pso in Anatome publicâ mulieris decollatæ fa- næ, intrusus stylus argenteus in ejus canalem, & ibidem aliam ob causam ad aliquot horas relictus, colore intensè cœruleo ex corrosio- ne inchoatâ tinctus extractus fuerit, tincturâ ipsi pertinaciter adhærente. Reliqua lymphæ, lymphaticis comprehensa vasis, ut plurimum subacida, instar diluti citri succi gustatur. Chylus, ejusque frater germanus lac, dulce- scunt; sicut & ipse sanguis, qui tamen sa- le volatili copiosissimè turget. Urina falsa est, i. e. acido & alcali volatilibus in falsum vola-

volatile junctis, foeta: cujus spiritus non adeò violento paratus igne, crudum cupri corpus in tincturam intensè cœruleam solvere valet. Insensilis transpiratio, & sensilis pedum sudatio, salsa est adeò, ut orichalci limaturam calceis impositam, in viridem crocum dissolvere valeat.

§. 3. Ast quàm excessivos saponem morbofo in statu non rarò contrahunt hi succi? Vomitus sæpè insigniter amaricantes, non rarò austeri, dentibus stuporem inferentes, molestant ægros. Scorbutici & hypochondriaci tam corrosivos rejiciunt per gulam liquores, ut, præter hujus & faucium dolorosam exco-
nationem, pelvim æneam, item argenteam, ærugine obducant: ipsum horum sanguinem hæmorrhagiâ narium rejectum, adeo acrem, ut lintea, quibus exceptus fuerit eraserit, observavit Dœringius *de Med. & Med. p. 109.* (similem vim corrosivam linteorum Lunari mulierum tributo etiam assignat Helmont. *cit. Tract.*) unde & horum urina observata fuit interdum adeò acris, ut paulò diutius in matula vitrea detenta, eam corroserit, & non nihil absumserit, utut fortissimis menstruis vitri compages resistat. Quam facultatem dissolvendi non obtinet interdum stomachi menstruum, dum præter gallinas Helmontii, in quibusdam gulonibus & vitra obterat & consumat, item coria, testas, ligna, carbones, &c. exempla vid. in Amato Lusitano *Cent. 2. Cur. 69. Schol.* item in Sennerti *Paralipom.* Non minùs rarum est, quod refert Boyle supra *cit. tract. p. 86.* de milite, lapides & frustula horum devorante, & ita consumente, ut alvi excreta arenosa exinde fuerint rejecta, lapidibus in stomacho in arenulas resolutis. Notum aliàs est omnibus, duram ferri limati compagem in hypochondriacis, aut etiam virginibus cachecticis, non sine sanitatis optatæ emolumento dissolvi; quin & numismata ænea deglutita, attrita priùs & non nihil consumpta, per inferius guttur reddita tandem fuerunt, teste Amato Lusitano *c. l. & Kerckringio in specileg. Observat. Anatom. I.* Urinæ salsedo in acidum p. n. mutata in stranguriis & dysuriis sufficienter se monstrat. Sudores sæpissimè (quod in declinatione Tertianæ, cum arthritide vaga conjunctæ, aliquando observavi) insigni acore sunt tincti; unde præter molestum & manifestum acidum odorem, & cutis intensum pruritum, & cuticulæ erosionem inferunt. Ulcerum corrosiva & acida sanies, quas non torturas ægris multiplicat? quæ ossium robur in cariem, eadem erodendo, infirmat; imò argentea etiam & ferrea Chirurgorum instrumenta levi contactu non rarò dissolvere inchoat, hincque indelebili maculâ eadem inquinat. Quid cancerum memo-

Tom. II. Pars 2.

rem, teneram mammillarum corrosivo suo sale, arsenico autem quibusdam comparato, exedentem substantiam? pustulæ cutaneæ & ipsæ non carent vitioso tali sapore. Patavii familiarissimus mihi erat juvenis, & ipse Germanus, scabie inferiorum inprimis partium circagenua vehementer afflictus, cujus pruriginosa ulcuscula scalpendo aperta, liquorem ferolum odoris apertissimè acidi, instar subtilis cujusdam & penetrantis aceri, fundebant. Saliva naturaliter ferè est insipida, quæ tamen in scorbuticis, corrosivo acuata sale, gingivas manifestò depopulatur, & dentium ossa erodit: vidi adolescentem scorbuticum, qui matutinis horis jejunus adhuc adeò acrem sanguinem nolentam in chartam duplicem firmam expuebat salivam, ut hæc exinde brevi eroderetur: Hanc ipsam icterici, & multi febricitantes, amarore molesto inquinatam percipiunt, quæ in hydropicis nimis salsa gustatur. Catarhales denique affectus, ex lymphâ nimis acri, sive per nares sive per oculos moveatur, oriri, unde interdum istarum partium ulcerationes sequantur, fatetur Hippocrates *nostr. c. l. f. 31. & 32.*

§. 4. Meritò ergò Hippocrates, manifestaturus & status pacati & turbati Reipublicæ Microcosmicæ autores, (in tali casu, ubi nihil Divini immisceat,) sub saporum notionibus eos nobis declarat, idque propterea, ut (cùm in præfatis qualitatibus gustabilibus profundior & potentior plerumque lateat dynamis) iis quasi manu nos ducat ad investigandas occultas salium proprietates & energias, cum salia sub saporum formâ præprimis se nobis manifestent. Licet enim affirmare nequeam, ex solis salinis particulis saponem dependere; hoc tamen certum est, vix corpus esse magis lapidum, quàm salinæ quod est profapiæ, ipsaque salia nullum organum sensitivum potentius afficere, quàm gustui quod inservit, & pro salinarum inprimis particularum mutatione, & diversâ cum aliis texturâ, saponem specialius variare. Ignis ergò Spagyricus est consulendus, qui in manu artificis & alterat variè, & etiam resolvit concreta naturalia. Sed cautò hic opus est, ne Chymicorum ingredientes laboratoria ab inconditâ salium, sulphurum & Mercuriorum turbâ, instar vespertilionum in tenebris, circumvolitante obruiamur, utpote ex confuso Paracelsi chao mentali exclusâ. In genere duo se offerunt salia quasi fundamentalia (quæ ab uno summo sale primitus oriri, sunt qui existimant) acidi & alcali seu urinosi quæ veniunt nominibus, ex quorum mutuâ conjunctione tertium salum emergit, neutrum ex istis, de utroque tamen participans. Sub hoc genere infinita specialium salium se offert varietas: nam acidum aliud est ferri, aliud auri, aliud

[Ttt 2]

vitrio-

vitrioli, aliud nitri, aliud aceti, aliud ligni quercini, &c. alcali contra aliud fixum, aliud volatile, aliud animalium, v. g. lumbricorum, cancrorum, cervi, hirci, urinæ, osium, fellis; aliud vegetabilium saporis aromatici, ut fœniculi, menthæ; acris, cochleariæ, sinapi; amari, absinthii, gentianæ, chelidonii; adstringentis, gallæ, malicorii; insipidi, sempervivi, solani, &c. sed quis finem inveniret, qui omnia hæc distinctè enarrare vellet? nam & Hippocratis sexcenta nimis angusta videntur. Plura qui vult, adeat Tachenium in *Hipp. Chym.* & ejus Clave, Zwelferum in *Append. ad Animadv. p. 71. & seq.* & videat ea, quæ Swalbe de acido & alcali conscripsit.

§. 5. Considerandum modò ulterius venit quod omnis salium potentia ex eo radicaliter dependeat, quod alcalia & acida ubicunque sibi (medio imprimis aqueo vel fluido) occurrerint, tanquam contraria in se invicem agere, sese contemperare, destruere, & tandem arctâ concordia unionem sese in sal tertium conjungere satagant. Prout verò diversus est salium status, dum ea rarò pura aut solitaria, quin potius semper aliis concretorum particulis intermixta existunt, etiam effectus reciproca istius actionis & mutui concursus est varius: Nunc enim effervescentiam impetuosa cum bullis & strepitu, & insigni non rarò incallescencia, ubi eadem sunt aciora; nunc verò fermentationem, ubi eadem adhæsione aliarum particularum materialium sunt temperata; nunc coagulationem & novorum concretorum productionem, ubi mutuò amplexu alia simul adhærentia sibi uniunt; nunc separationem seu præcipitationem rerum non benè cum iis unibilium, producant. In genere ex salibus istis cum aliis particulis materialibus diversimodè concurrentibus junctis, separatis, variè situatis & contextis, &c. non tantum ipsa eorum varietas, & Protei instar mutabilis facies, sed omnes ferè insigniores in natura alterationes, forsitan etiam generationes & corruptiones proficiuntur, quas specialiter excutere, non est hujus loci.

§. 6. Quod si ulterius rationem istius mutua salium in se actionis, indeque adeò diversorum Naturæ inde surgentium phenomenon investigare velis, in promptu erunt conditiones minutorum corpusculorum seu particularum salinarum mechanicæ, in specie determinatæ eorum figuræ, & texturæ, magnitudines & inde exsurgentes diversæ motiones; istæ enim sunt tales, ut acidum & alcali ex figuræ & texturæ proportionem certo modo sibi adhærere, & mutuo amplexu se continere queant: antequam verò ad debitum unionis situm perveniunt, medio fluido, cujus particulae sunt in continuo motu, permi-

sta, unum impingit in alterum, hoc trudit, istud repellit, acidum rodit alcali, hoc absorbet acidum, idque tamdiu, donec diuturnâ affrictione, & hinc inde contorsione, in legitimo situ unita firmiter sibi adhæreant, & ita figuræ & texturæ mutatione in salsum abeant, aliasque concretorum alterationes (ratione aliarum particularum unâ concurrentium, & vel simul connexarum, vel separataram, vel translocatorum) inferant: quæ texturæ ipsorum salium mutatione & ipsa variè exasperantur, mitigantur, alterantur, & ita infinita ista Hippocr. constituunt: Sic enim oleum acidum vitrioli cum oleo tartari urinoso mutua texturæ mutatione vel salsum leviter, vel insipidum tertium, producant: Sic ex alcali fixo cum silicibus calcinatis in ignis vehementi tortura per violentum & continuum particularum motum, ob mutatam earum texturam, novum & planè mirabile ens, nempe vitrum, producit, cui simile Natura nullibi, nisi in lapidibus pretiosis constituit: Sic mutatione figuræ & texturæ particularum materialium sal commune nudis in igne fusionibus, in aqua solutionibus & coagulationibus repetitis, in terram insipidam abit, teste Borrichio, *de Ortu & Progressu Chem. p. 82.* Sic oleum sulphuris vel spir. Vitrioli, sali communi vel nitro affusus, mutatione certâ utriusque texturæ dat sal istud mirabile seu enixum Glauberi, quod figit & solvit, & ex sale communi paratum reserabit claustra auri, aliorumque subjectorum sulphureorum, ex nitro verò Lunæ: sic alcali vegetabilium volatilia sub ignis torturâ, concurrente cum sulphure concreti, in quo latet acidum, & mutando texturam, abeunt in sal fixum salsum, quod fortiori concrematione, & in igne fusionem, abit tandem in perfectum alcali: Sic aqua fortis nudâ texturæ ejus, per sal commune vel sal armoniacum additum, mutatione aurum solvit, & Lunam antea amicam spernit. Nam in hoc menstruorum consistit diversitas & simul etiam potestas, ut cor respondeant particularum suarum figuris, poris & meatibus corporis solvendi, & particulis solutis. Unde alcahesticum menstruum ob summam penetrantiam & subtilitatem quaquaversus penetrat, & omnia dissolvit, teste, præter Helmontium, experto Starckey *Pyrotechn. c. 9. 10. & 11. & seq.* it. Bechero in *Phys. subterr. l. 1. f. 3. c. 4.* Hinc nihil repugnat, dari etiam menstrea insipida, modò ita sint constituta, ut, v. g. auri poris exactè respondeant, iisque se subtiliter & promptè insinuent. Nam nihil impedit, corrosivissima mutata textura insipida fieri; sicut e contra, teste Bechero *Phys. subterr. l. 1. f. 5. c. 2. §. 23.* ipsa communis aqua multoties destillata & rarefa-

ita ita corrosiva redditur, ut metalla solvat; quæ aqua alia sub præparatione in acetum transit, teste Helmontio *Tr. 6 pl. digest. alim.* §. 59. Låurenbergius sanè asserit, se talem vidisse aquam seu liquorem, in quâ aurum sine ulla corrosivitate liquecat, instar glaciei in aqua calida: *aph. 6. contra Salam.*

§. 7. Per tales salinas facultates adeò potentes in administrandis Naturæ negotiis definiendas esse causarum morbificarum energias, sub saporum ceu per se notissimorum formâ, inculcat Hippocrates. Obid & bilem flavam nomine amari designat; acutam verò & acrem bilem æruginosam definit *lib. cit. f. 34.* generationem verò illius descripturus *l. 4. de morb. f. 8. num. 3.* ita differit: *postquam comedit & bibit homo aliquid amari, quodque alias biliosum & leve est, copiosior bilis fit in hepate:* & ita per amarum & leve seu volatile, ut hodierna loquendi fert consuetudo, bilis naturam determinat. Non enim calidum aut siccum est, quod præpollet in bile, ignea obid vulgò appellata; sed acre & amarum, i. e. alcali insigniter volatile, temperatum tamen sulphure seu oleo, in seipso rubro: ut prioris beneficio chylum balsamico imbuat vigore, simulque acorem ejus volatilem à stomachi digestionem nonnunquam superstitem in perfectum salsum volatile transmutet; posterioris vero ratione tincturâ sulphuris invisibili eum tingat, pro futura sanguificatione. Flava bilis sic dicta excrementitia cruditatem stomachi nidorosam, & ita neque calorem, neque frigus, sed alimentorum corruptionem ex nimio pinguium & similium succum stomachi hebetantium & depravantium, ejusque salinam vim enervantium usu nascentem. Æruginosa bilis acris & acuta, aut ex alimentis in stomacho vitioso acore depravatis, aut ex vitiosè acido pancreatis succo, perversam effervescentiam cum bilis sale volatili oleoso in intestinis excitantibus, originem ducit; nam & spiritus vitrioli, bili ex vesiculaeductæ admixtus, colorem ex atro-virescentem producit, teste Graffio *Diff. de succo pancreat.* §. 147. unde & talia æruginosa infantibus sunt familiaria, ex lacte corrupto & acescente enata, quæ post molesta ab acido nimio tormina rejecta, & acidum manifesto spirant, & acidum absorbentibus, v. g. ocul. cancror. ebore aut C. C. usto, it. creta, sem. anisi, & similibus curantur. Talia æruginosa ab hypochondriacis superius rejecta, & manifesto linguæ a core dentes stupefaciunt, & adjunctâ austeritate fauces & gulam fortiter adstringunt. His adjunctæ ventris murmuraciones, flatulenti borborygmi, & intestinorum convulsivi dolores, effervescentiæ illius p. n. in intestinis inseparabiles sunt comites.

§. 8. Abile ad succum melancholicum deflecto, qui vulgò frigidus, siccus, & ob id terrestris statuitur. Sed ut taceam, nullitatem talis succi (prout vulgò quidem explicari solet) sufficienter esse demonstratam à Conringio *Tr. de sanguin. generat. & mot. cap. 12. 13. 14.* cerrè ea, quæ de hoc humore obscurè dicuntur, perspicuè per acidum, item acerbum, in corpore nostro secundum Hippocr. reperibile, explicantur: sive sit succus fermentativus stomachi nimis acidus, sive succus pancreaticus nimis austerus, sive lymphæ nimis acida, sive in particularibus membris, ex corruptione alimenti proximi, talis acor peregrinus, v. g. in ulceribus & abscessibus, generetur. Obid convenienter admodum aceto comparat melancholiam Sennertus *lib. 1. de febr. cap. 20.* manu ductore tamen nostro Hippocrate, qui verè chymicè *lib. de vict. acutor. f. 28.* differit: *aciditates ex aceto, amarâ bile abundantibus magis conferunt, quam atrabilariis; amara enim dissolvuntur, & in pituitam transeunt, dum ab ipso attolluntur,* (i. e. ut terminis usitatis explicetur, acida præcipitant alcali volatile in bile, & simul transmutantur effervescendo, quod forsân attolli vocat Hippocrates in tertium salsum vel omnino insipidum, instar pituitæ aquosæ seu insipidæ) *Nigra verò fermentantur & attolluntur, ac multiplicantur; acetum enim nigra sursum ducit, vel interprete Sennerto l. 2. de Febr. c. 20. p. 296. nigra exaltat* (i. e. nigra seu melancholica, aut atrabilaria, quæ bili amaræ opponit Hippocr. ab aceto augmentantur, & in sua qualitate nociva per fermentationem, acriora & volatilia facta, exaltantur.) Exaltatione ista acidi generatur bilis, quam vulgò vocant atram, acris admodum & corrosiva, ex acidi in gradu & volatilitate augmento nata, furia corporis pessima; nam & lenia spernit remedia, & validioribus in deterius ruit. Consideremus pro exemplo cancrum exulceratum, ab omnibus ab atra bile derivatum, hujus acidum & volatile fermentum instar aquæ chrysulæ corrosivum se monstrat, corrodendo & depascendo vicinas partes: hic acor uti medicamenti Sarumini, quæ acidum absorbent & dulcescere faciunt, aliquantisper mitescit, ita contraria mitiora alcalia spernit, à validioribus verò & acrioribus propter subitam effervescentiam, & hinc vicinæ partis colliquationem, plurimum exacerbatur, supervenientibus febre & totius ardore, partis ulceratæ horrendo dolore, similibusque ægrorum tormentis. Imò verò vulgaria ulcera, acrioribus paulò tractata, in cancrasas malignitates similiter degenerant, exasperato & volatilifato eorum fermento.

§. 9. Paracelsitarum idolum, Tartarus

[T t t 3]

micro-

microcosmicus, propter aliqualem similitudinem cum propriè sic dicto Tartaro, Bacchi filio, ab acore vini, propria fece saturato, & cum eadem in sal compositum, ipso patre Vino nobilius, coagulato, ita dictus, non nisi ex Hippocraticis potentiis suam obtinet auctoritatem: siue enim resolutus in forma liquida fluctuet, hinc inde dolores, lancinationes & torsiones inducens; siue jam sub coagulo peregrino seipsum coërceat, ubique principium omnis ejus operationis est acor, partibus hostilis. Est scilicet Tartarus propriè loquendo nil aliud, quam succus acidus, facile in subiecto idoneo coagulabilis, aut jam in eodem coagulatus, vitio primæ digestionis, ob hujus cruditatem acidam & secum vitiosæ segregationis genitus. Acor ergò talis vitiosus in stomacho hospitans & graviorum ejus symptomatum, & successivè mali hypochondriaci, est autor: in intestinis torminum colicorum fecunda est genitrix, imprimis si subiectetur, in copioso intestinorum muco, pituita acida tunc appellato: lotium imprægnans stranguriam infert, sicut in articulis arthriticas torturas: massæ sanguineæ inquinans dulcedinem, & cordis palpitationes & scorbuticos infert affectus. Sin aptum inveniat subiectum, imprimis de alcali participans, cum eo coagulatur in Gorgonium monstrum, quale est omne Duelech seu calculus, tam in renibus quàm fellis folliculo, ex ejus coalitu; ibi quidem cum urinæ volatili sale per fermentum putredinis resolutum; hîc verò cum alcali volatili bilis genitum, sub qua concretionem, quicquid coagulabile simul deprehenderit, in novi concreti consortium trahitur: Sic synoviam, articulationes ossium instar cujusdam axungie oblinentem, coagulat in tophos, arthriticis cognitos, & ossium corrumpens alimentum, cum eodem in gummata Gallica, ossa cum intolerabili nocturno tormento perforantia, concrefcit. Sin viscidæ conjunctus mucilagini angustias vasorum permeare nequeat, sed circa easdem coagulatus subsistat, oppilationum & obstructionum, omniumque scirrhorum & scrophularum est artifex. Contra hunc acidum p. n. Tartarum usurpantur medicamenta & ipsa tartarea, seu fit spiritus tartari perfectè volatilis seu urinosus, siue sit Sal ejus volatilifatum; hæc enim & acorem ejus destruunt, & producta jam coagula dissolvunt & referant.

§. 10. Præter enarratos hætenus sapes, dulce denique & insipidum non rarò memorat Hippocrates, innuens hoc ipso statum temperatum & blandam dulcedinem nutriti corporis nostri succi, chylosi quidem pro partibus spermaticis seu nervinis, sanguinei verò pro parenchymatibus sanguineis. *Dulcia enim & pingua ac oleosa replent,*

quia ex modicâ mole multum diffunduntur: at vero acida & acria & austera & acerba, & ex toto collata & sicca non replent seu nutriunt, docet Hippocrates l. 2. de *Dieta*. f. 33. num. 19. 23. &c. Hinc si blanda & temperata dulcedo, nutritii succi pervertatur, ut acrimoniam vitiosam, in specie salfam, acquirat, unde asper minusque mitis reddatur, & exinde nutritioni ineptus fiat, subinde tabe & atrophîa emaciatur corpus vivum sceleton repræsentat. Succus talis nutritius minus in stomacho ex alimentis resolutus, & volatilifatus, sed visciditate p. n. tenax & glutinosus, pituitæ p. n. nomine vulgò venire solet; siue ullo excessivo sapore careat, siue acrimonia salfa, siue etiam aciditate peregrina, deprehendatur inquinatus.

CAPUT III.

Facultatum Hippocraticarum ad Hygienam & Therapsiam Applicatio.

§. 1.

Quæcunque mala homo patitur, omnia a facultatibus potentiis proficiscuntur, inquit Hippocrates cit. lib. f. 34. quæ facultates, ipso interprete f. 39. *humorum nostri corporis sumas vires & robur* designant, istis saporibus ab eo definitas. Sed cum eadem & naturalem nostram administrent œconomiam, & tanquam negligentes aut inobedientes ministri simul eandem non rarò pessundent, propterea distinctum earum & statum & effectum declarat Divinus noster *Senex* f. 24. & 25. & lib. de *natur. hum.* f. 6. *Hæc quidem mixta inter se & temperata, neque conspicua sunt, neque hominem ledunt: ubi vero quid horum secretum fuerit, atque ipsum in seipso fuerit, tunc & conspicua sunt, & hominem ledunt.* Superius scilicet monitum fuit, salinas potentias continuo reciproce actionis motu seipsas fatigare, & in æquilibrio positas, aliis permistas, blandâ & æquabili fermentatione agitari, sub qua seipsum tanquam mutuò activa & passiva ita temperent, quo minus aliquod nocuum in corpus redundare possit. Ipsum hoc est, quod corporis machinam sartam tectamque conservat, si scil. sanguineum vitale nectar debitâ fermentatione circulatur, quâ & chylus ipsi assimilatur, & spiritus volatilis volatilifatur, simulque reliqui succi debitam crasin & proportionem, tam ad se invicem, v. g. bilis ad succum pancreaticum, quàm ad subiecta externa, v. g. succus stomachi fermentativus ad alimenta, obtineant. At vitiata hæc facultatum proportione, & lasa earum temperaturâ, sin vel in gradu una excedat alteram, vel à naturali crasi degenerent,

rent, cuius infiniti sunt modi secundum Hippocratem, non potest non rebellio atrox turbare microcosmum.

§. 2. Origo læsæ temperaturæ, indeque ortorum morborum, *partim ex dietis, partim ex spiritu, quem attrahentes vivimus*, est, autore Hippocrate *de Nat. human. f. 18. num. 11.* Diætæ partem primam constituunt assumpta, de quibus nos ita informat *Oraculum Coum, lib. cit. sect. 25. Quin & ex cibis, quicunque nobis incommodi sunt, & ingesti hominem ledunt, horum unusquisque aut amarius est meracus, ac intemperatus, aut falsus, aut acidus, aut alius quis intemperatus & fortis: & propterea turbamur ab ipsis, quemadmodum etiam ab his, quæ ex corpore excernuntur. Omnia autem quæ edit aut bibit homo, talia edulia palam est, minime hoc intemperato & dissidente ac excedente succo participare, velut sunt panis & maza, & his similia, quibus adsueta est homo plurimis & semper uti.* Jam verò edulia ista hominis sunt vegetabilia, aut animalia illis ipsis antea saturata: in quibus terra nascentibus suas facultates maturè considerat Causa nostra, dum *lib. de Natura Human. f. 11.* ita scribit: *quemadmodum ex terra nascentia, & in ipsam plantata ac seminata, ubi in terram pervenerint, unumquodque trahit id, quod naturæ suæ familiare in terra existit: inest autem in terrâ & acidum, & amarum, & dulce, & falsum, & omnigenum, &c.*

§. 3. Scilicet ut idem nos informat Hippocrates *f. 26. Robur & augmentum ac alimentum præsertim per nihil aliud contingit, quam quod probe temperatum est, & nihil habet intemperatum, neque forte, sed totum unum factum est, & simplex, & non forte*: hæc enim in naturali statu absque ulla alteratione corpus conservant, ob quam temperaturam & lac, & carnes, & oryza, similiaque Cerealia; tam commodum suggerunt alimentum. Ast ubi excessivus sapor imprægnat edulium, salinam potentiam excedentem manifestans, non potest non, iisdem corporis nostri potentiis occurrendo, easdem alterare, aut augmentando, aut imminuendo, aut diversimodè alterando; plus minus tamen, prout aut major vel minor fermenti stomachici in illo alterando & transmutando fuerit potestas, aut prout consuetudine ejus corporis potentiæ salinæ magis vel minus jam antea ab eo immutata fuerint. Sic enim & venenorum consuetudine, alteratis jam corporis nostri potentiis, eorum robur imbelles factum fuit, & continuata diutius eadem medicamenta, tandem incassum adhibentur: unde non tantum loco modò

citato §. 2. consuetudinis rationem habet Divinus Senex, sed ejus observantiam quoque diligenter inculcat *f. 2. aph. 50.* dum *consuetudo longo tempore, etiamsi deteriora sint, insuetis minus molesta esse*, pronunciat.

§. 4. His suis potentiis determinandas esse alimentorum facultates, non calore & frigore, sufficienter docet Hippocrates in libris *de Diætâ, it. l. de Affect. f. 49.* ubi acrium, salisforum & acidorum, dulcium alimentorum frequentissimam mentionem injicit: & hoc illustrat pariter *lib. de prisc. med. f. 22. & 23.* exemplo cujusdam, crudo tritico & carne læsi, pane verò propinato curandi, quem præfert tritico crudo, non ob qualitates elementares, sed ob id, quia sit præparatus, sub qua præparatione diversas subeat alterationes. Præparationis cardo in legitima consistit fermentatione, quâ adjectione fermenti acidi volatilis farinæ aufertur visciditas, quæ multum stomacho aliàs faceffit negotii, & resolutæ partes salinæ & quædam sulphureæ aliarum particularum implexu aliquantisper se extricant, fermentando volatilifantur, & in spiritum volatilem ardentem transmutantur: antequam vero tota hoc modo fuerint volatilifata, clibano imposita massa torretur, unde pars volatilifatorum salium in spiritum avolat, suavi odore omnia replens, quibusvis perlarum aquis virtute confortativâ à Bechero *l. 1. Phys. subterr. f. 5. c. 2. §. 144.* præposita, cujus colligendi modum docet Kergerus *de ferm. f. 3. c. 1. p. 181.* pars verò salium alterata, nondum perfectè volatilifata, impedito fermentationis per exsiccationem motu à reliquis particulis implicata detinetur, facili tamen Vulcano in spiritum subacidum volatilem per retortam separanda, à quo subtilis panis aciditas etiam dependet. Panis ergò stomacho ingestus propter hunc spiritum acidum volatilem, de quo supra *c. 2. §. 2.* ex suscepto fermento productum, liquefcens in stomacho in cremorem, herbas & cibos, quibuscum est masticatus, unâ colliquefcere cogit, ut rectè loquitur Helmontius *Tr. victus §. 15.* adeoque fermento stomachi potentes fert suppetias, & locum cujusdam fermenti aliis cibis additi quodammodo supplet, & propter ejus convenientiam cum stomachi succo fermentativo nunquam nos panis, continuò licet comesti, capit fastidium, quin potius naribus admotus nauseam & vomitum ab assumptorum horrore imminentem compescit; & sicut ægrotantes ultimo ejus appetitum amittunt, ita convalescentes eandem primariò denuò recuperant, ut rarissimum sit, quosdam à pane omninò abhorreere, qualis fuit puer iste apud Schortum *Phys. Curios. l. 3. c. 27. p. 530. & seqq.*
ab ima-

ab imaginatione maternâ gravidatis tempore ita dispositus.

§. 5. Loco aquæ vinum suprâ dicto ægro propinat Hippocrates stomacho similiter blando acore acceptatissimum, de cuius uvarum benedicti nectaris naturâ & statu, cum ab aliis, in specie à Celeb. D. Sachsio in Ampelogr. qui instar omnium est, sufficienter actum sit, cui jungatur Becherus *Phys. subterr. l. 1. f. 5. cap. 2.* non est, quod actum agam. Hoc saltem, quoad *Hippocraticas Facultates* noto, observandos in eo esse & *Spiritus salinos volatiles sulphureos, sulphur* Bezoarticum vegetabile, item aurum potabile vegetabile quibusdam dictos, & etiam acidum, primo iusto plus minus sensibile: ratione cuius & vinum cum unicornu fossili notho effervesceat, & ab oleo silicum in instanti coagulatur. Spiritus vini volatilis, tanquam symbolizans quodammodo spiritui vitali, brevi morâ ex stomacho in vasâ raptus, advocatur in hujus supplementum, levi contactu fermenti in corde perficiendus: Sin vero plus iusto hic insit stomacho, ebrietas sequitur, quatenus celeri distributione totus in spiritum vitalem commutari nequit, quin spiritus animales prius in motus confusos & inordinatos actos quodammodo sulphure suo figat, instar opii & aliorum narcoticorum, indeque eos torpidos, & ad debitas motiones & expansiones ineptos reddat. Quoad acidum vini benignum: hoc partim in stomacho, partim in intestinis, concurrente fermento felleo in salum volatile abit; sin verò inordinato, & in specie vini nimio abusu, crudus & acidulus liquor ex stomacho elapsus fuerit, hostili sua toti corpori aciditate, cum sibi adjunctâ aquâ vitæ in intestinis tormina colica, & exinde in artubus pareses, aut contracturas, præter mala arthritica & nephritica, progenerat, Tartaro tam resolutio quàm coagulato superius adscripta; adeò ut sæpissimè vinum prohibendum sit ægris, non ratione spiritus sui ardentis, seu, ut vulgò dicunt, ob nimium ejus calorem, quàm ratione aciditatis sui, partibus insensibilissimis, v.g. in vulneribus, articulorum affectibus, &c. Sic memini mulieris, dysuriæ subinde obnoxia, cujus Paroxysmus tam ab aceti, quam vini usu subito recrudescit, oleo amygdal. dulc. c. lapil. cancerorum & percarum denuò sopiendus.

§. 6. Vini Vicarius est cerevisia in locis Septentrionalibus, decoctum scil. hordei vel tritici cum lupulo ut plurimum, fermentatione exaltatum, quæ temperatior quidem est vino, indeque minùs alterativa, sed plus nutritiva, iisdem tamen potentiis Hippocraticis similiter instructa; ut ut ejus acor non adeo purus, quin potius lupuli sale amaricante de alcalium natura, nonnihil modificatus. In

præparatione observanda venit hordei germinatio, cum in finem instituta, ut visciditas ejus mucilaginosa corrigatur, quæ & fermentationem decocti impediret, & digestionem stomachi turbaret; hordeum enim parum coctum ventositates efficit, oppilationes vero, si meliusculè bullierit. Ast sub ista germinatione irrorata grana aquarum imbibitione turgescunt, unde resoluta salia in iis, aliarum particularum complexu aliàs irretita, mutuò agere & reagere, & angustia loci conclusa, quâ datâ portâ, prorumpere, & ita per gemmam secum adhærentes particulas simul protrudere incipiunt. Verùm ne in liberiore aura continuatâ ista actione fermentativâ omninò avolent, semenque ita emoriatur, & particulis activis salinis spoliatum pro fermentatione cerevisiæ fiat ineptum, tostione ulterior salium in germinatione prohibetur progressus, & postquam contritum fuerit, & cum lupulo conditum per cocturam, in cerevisiam per restauratam fermentationem abit. Inest enim omnibus vegetabilibus, imprimis seminibus, & ex his præ cæteris Cerealiis, substantia quædam viscida & mucilaginosa, quam ceu primarium activitatis suæ objectum digestio stomachi resolvit in cremorem nutritium. Hæc substantia dum per fermentationem recluditur, & volatilifatur, transmutatur in spiritum volatilem ardentem, novum ens, formaliter ab eo, quod erat antea, distinctum, adeò ut non amplius subjaceat fermenti stomachalis imperio, nec amplius sit ita nutritiva ut antea, quin potius subito transeat, ut suprâ dictum de spiritu vini, ad augmentandos spiritus corporis, & ita facta est primariò egregiè confortativa; ob id namque liquidus potus longè facilius & felicius nos recreat, quam solidus cibus. Natura equidem neque cerevisiam neque vinum, ut talia, postulat, sed tantum simpliciter ut humida, quibus latex corporis absumptus restauratur pro subministrando alimenti vehiculo; id quod bruta simplici aquæ haustu contenta sufficienter demonstrant: Verùm curiositas humana, per artem subinde præsumens corrigere naturam, conjungit aquam spiritui per fermentationem, quo una vice & latex subministretur, & alimentum suppeditetur, & spiritus reficiantur.

§. 7. Tartarorum potus, ut notum, est lac equinum, idque tantummodò in solennioribus festivitatibus, quod tamen ita preparare norunt, ut ebrietatem conciliet, non secus ac vinum. Modus præparandi cum sit curiosus, eundem ex Lingua Gallicâ in Latinam translatus, ex Relatione de Tartarie, per Jean Luca, Religieux Dominique, de Tartares Precopites p. 15. & p. 19. huc annotare libuit. *Eorum potus, quem nominant*

nant Chimus & Boza, cum farina milii (forſan interdum loco hordei) inebriat inſtar vini noſtratis, præparatur ſequenti modo: Poſtquam equa peperit, permittunt pullum lactere per menſem, poſtmodum applicant naſo pulli fruſtula ligni acuminata, eum in finem, ut quando pullus velit ſugere, equa iisdem puncta cum admittere nequeat. Interea ipſi colligunt lac, eoque vas replent, in quo vinum aliàs fuerit (ſi tale habere poſſunt) quod dum in vas reconditur, per linteum trajicitur, & vas poſtmodum exactiſſimè obturatur. Huic injiciuntur 20. vel 30. gr. hordei, cum cochleari oxygalæ vaccinae, ſeu lactis acidi vel ebutyrati, aut ſaltem parum fermenti. Interea neceſſe eſt, collocare vas iſtud vel prope ignem, vel exponere idem radiis ſolaribus, ut lac bulliat & bene clareſcat, id quod ſpacio 2. vel 3. ſeptimanarum evenit: quod ſi addatur tantillum vini, potio erit eò gratior. Lac ita bene depuratum trajicitur per linteum purum antequam hauriatur pro potu, qui præparatus tempore vernali melior eſt omni eo, qui reliquis anni temporibus conſcitur. Hæc potio longè durabit, tantum enim lactis novi ſemper denuò infundi poteſt, quantum exhauritur. Obſervandum & hoc, quod ſi lac per ſeipſum ſatis acidum fuerit, non opus erit oxygalam vel fermentum addere, ſed ſufficiunt grana hordei: utque magis tutò procedatur, in diſtinctis vaſculis inſtituenda eſt præparatio. Poteſt enim quibuſdam infundi nodulus ex radicibus violarum aut foliorum coriandri. Decies quotidie equæ lac emulgetur, dum ea interea optimis herbis nutrienda eſt. Potio hæc eſt admodum ſalubris, & magno emolumento iis, qui ſunt impotentes. Semina coriandri meliorem habent ſaporem ipſis foliis. Hactenus Auctor Gallus, in quibuſdam nonnihil obſcurus.

§. 8. Poſt aſſumta eſſe inſpirata, quæ potentiarum Hippocraticarum proportionem & temperaturam in ſuccis machinæ noſtri corporis hydraulicæ turbent, ſupra §. 2. dictum fuit. Tota namque atmophæra, quam nos reciproçâ reſpiratione attrahimus, copioſiſſimis particulis, inſignibus facultatibus Hippocraticis ſalinis pollentibus, & quaſi tot diverſis fermentis imprægnata eſt. Notum eſt, non vitrioli tantum caput mortuum aëri expoſitum, de novo ſingulari ſpiritu acido imprægnari, ſed etiam terram tam nitri quàm aluminis exhaustam, ſemel aëri expoſitam, poſt aliquot annos novum nitrum vel alumen ſuppeditare. Hinc aërem non ſine ratione, oculari eoque firmo experimento confirmatus, plenum ſale Hermetico

Tom. II. Pars 2.

uni-verſali, in diſtinctis matricibus determinationes varias ſuſcipiente, ſtatuit Rochas *Tr. Obſervat. nouvell. des eaux. mineral. c. 1.* Nam & duris metallis in aëre quis ſtatuerit incunabula, & tamen minera plumbi Anglica ante multos annos exhausta, ab aëre novo plumbo imprægnatur, teſte Borrichio ad Bartholinum in hujus *Epist. 92. Cent. 4.* Idem fit cum ſcoriis ſtanni ab igne depauperatis, per aërem denuò ſecundatis, vid *Hiſtor de Singularit. Natur. d. Anglet. p. 16.* uti etiam, biſmuthi vena Miſſenſis inanita aëri expoſita argento denuò nonnihil locupletatur: antimonium fixatum ad volatilem tamen revertitur naturam, aëri ubi fuerit expoſitum. Vegetabilia ſimiliter nonnulla, quæ inter principaliora ſunt bulbus ſcyllæ marinae, uti & aloë Hiſpanica in conclavi ſuſpenſa, ex aëre ſolo vegetantur, creſcunt & ad tempus adoleſcunt; non minus quam viperillæ, araneæ & ſcorpiones ex aëris ſuctu, vitris arête incluſæ, vitam trahunt. Quæ non fermenta imprægnant aërem tempore veris, dum putris gleba reſoluta exhalat copioſiſſima ſalina miaſinata, admodum fermentativa, quæ maſſam noſtram ſanguineam de novo quaſi inſpirato fermento animant, ut hac occaſione annoſi & clandeſtini morborum fomites potenter ſubinde exardeſcant. Hyberno tempore ſale ſubtili acido, de armoniacali forſan natura aërem plenum eſſe, perſuadent faciei, labiorum & manuum contractæ aſperitates & ſuperficiales fiſſuræ, lotionem urinæ aut ſaponis acris, tanquam contrario alcali curandæ. Fermenta locorum endemica, aut interdum epidemica, ſalinæ omnia nunc acidæ nunc urinoſæ naturæ, quo & omnia pertinent contagia in diſtans operantia, aeris amplo ſinu ſoventur. Hic ergò inſpiratus, quas non ataxias & dyſcrasias in maſſa ſanguinea, ejusque potentiis Hippocraticis, item in aliis humoribus particulis ſuis ſalinis fermentativis inducet?

§. 9. Intemperatas ergò, & ita altero extremo excedentes iſtas potentias nos lædere aſſerit Hippocrates. Hinc enim tot frequentes febrium efferveſcentiæ, tot tormenta ab acido vitioſo inducæ, tam variformia affectus hypochondriaci & Protei ſcorbutici ſymptomata, nunc caloribus nunc horribus comitata. Curam ob id talibus, quæ intemperatas, & à legitima craſi degenerantes potentias in juſtam temperaturam reſtituere valent, inſtituendam monet; tunc enim humores acres crudos dictos, ex permixtione & temperatura mutua, non calidi aut frigidi ſimpliciter additione & ſubtractione, blandiores redditos, coctos & denuò naturales fieri. Idque monſtrante viam naturæ in deſuſionibus, tam ad nares, quam ad oculos,

[Uuu]

aut

aut ad fauces, unde anginae, erysipelata, peripneumoniae, &c. oriantur, apertum demonstrat *cit. lib. f. 31. 32. & 33.* quae quatenus tenues & acres nos laedunt, & huius acrimoniae sensu ardorem & interdum inflammationem inducunt; restituantur autem & curantur, ubi temperatae fuerint & concoctae, & ab omni acrimonia liberatae, tunc jam & febres, & alia hominem laedentia solvuntur. Temperaturam hanc ex permissione fieri asserit Hippocrat. *c. l. f. 31. n. 25. f. 32. n. 13. & f. 35. n. 16.* dum scilicet particulae salinae intemperatae & conspicuae factae, atque exinde aciores redditae, additione & interpositione aliarum particularum materialium, in specie contrariarum salinarum, mutata figura & textura acrimoniam & corrosivitatem emittunt: qua ratione acidum acetum solutione lapid. cancerorum mitescit, corrosione Saturni dulcescit, impraegnatione salis tartari falscescit.

§. 10. Rem ita se habere, constat ex eo, quod Mercurius sublimatus sapore suo excessivo seu acore corrosivo, non minus quam arsenicum, sint lethalia venena; quae tamen coercent aut copiosum lac epotum, aut butyrum largius assumptum, aut oleum amygdal. dulc. deglutitum; quatenus talia pingua acoris corrosivi obtundunt, & quasi inviscant aculeos. Convenit etiam oleum tartari per deliquium haustum, quatenus hoc alcali fixum excedens istorum acidum destruit, & sui complexu & permixtione in falsum temperatum transmutat, Mercurio deposita crystallina larva, aut pulveris terrei facie sese vestiente, aut viva forma profiliente: non minus utilis est crystallus montana preparata, aut calcinata, quia haec acidum absorbet, istudque, dum in se ruit, pro corrosione concentrat, quo minus corpori nocere queat: qua ratione similiter æruginosae bilis, quam acidam valde supra diximus, eadem crystallus est alexipharmacum, & choleram aut dysenteriam exinde ortas perniciosas curat: eadem ratione creta, lac Lunæ, imò laterum coctilium pulvis, item ebur ustum, corallia, & similia, ardorem stomachi ex effervescencia acidum vitiosi cum regurgitante bile aliove alcali ortum extinguunt, non frigore, sed vi absorbendi acidum, seu, ut vocant, precipitandi: qua ratione eadem & caninae appetentiae sunt remedia, quatenus acidum corrosivum temperant; acida contra, ut spiritus nitri, vitrioli, salis, succi berberum, ribium, limonum, febrium ardentium & diarrhaearum, quas vocant, biliolarum, Item ægrorum nimis ardoribus debilitatorum sunt solamina, quatenus salis volatilis biliosi in sanguine compescunt vim, quod ceu contraria temperant in falsum, & ita ab eodem in-

ductam aut p. n. sanguinis effervescenciam, aut nimiam ejus dissolutionem refranant, & blando coagulo compescunt. Et sanè alterantium (nam de evacuantibus non est dicendi occasio) omnium vis & efficacia in virtute temperandi aut exaltandi acidum aut alcali in genere, aut corrigendi específicos alios ex istis vitiatis saporibus obortos, primario consistere videtur, non verò in calore aut frigore, nisi consequenter, in iis scilicet morbis, ubi nihil divini subest. Quae tamen non ita intellecta volo, quasi omnem simplicium operandi modum comprehendant; in multis enim multa non parum differunt, cum v. g. opiatorum aliorumque narcoticorum longè dispar ab his sit ratio, sed quantum ad effectus ab Hippocraticis potentiis excitatos tantum pertinent.

§. 11. Hæc ut pateant ulterius, consideremus à medicatrice Naturâ ipsa propinatos julebos acidos, ex terra acidularum nomine scaturientes, quas non calore aut frigore aut humiditate proficuas esse, ad averruncandos chronicos affectus, ex hoste Tartaro, præter naturam intus recepto & coagulato pronates, in propatulo est consideranti, spiritum acidum esurinum istas aquas impraegnantem dissolvere & abstergere mucilaginosas sordes in primis viis, iisque annexis visceribus stabulantes, dum interea soluta in mineris ab hoc acido Martis vena absorbet in se saporibus vitiosos acidos, acerbos aliosque, salia sylvestria, aut excrementitia, item Tartarus resolutus ab Helmontio appellatos, eosque secum fecum nigrarum forma evacuat. Nam & simili ratione aut cruda ferri limatura, per se semper adstrictiva, sicut omnia Martialia, aut quicumque ex eo, sine acido tamen excessivo parati croci aut tincturae, profunt, quatenus excrementa & peregrina salia, ad ferrum, ceu ad æquatum suae activitatis objectum, accurrentia absorbet, & ita ab iis illatas noxas in chronicis affectibus, obstructionibus communiter attributis, emendat. Eadem vi saccharum Saturni, aceti acido non omnino saturatum, spleneticorum & hypochondriacorum & scorbuticorum acia salia aceto sapè potentiora, dulcificando, non refrigerando, innocua reddit: Id quod longè clarius, dum Chirurgum agit Saturnus, cujus artis quartum præbet fulcrum, dum non tantum cum Marte sociatus in tincturam rubicundam internis ulceribus quarumcunque partium potenter medetur, sed etiam solus externe variis cerussæ, minii, lithargyriorum, &c. lavatus formis, omnia ulcerum, etiam chronicorum & cacoëthicorum, fermenta acida, alimenti partis in saniem corruptiva, ratione sui Mercurii copiosi, paucissimo sale associati, promptè absorbet & dulcificat, & ita

& ita non refrigerando, nec abstergendo aut exsiccando, eadem consolidat. Id quod similiter de Veneris cadmia factitia & tutia asserendum venit, non minus quam de terra vitrioli dulci, ob egregium tam in vulneribus quam ulceribus usum balsamica quibusdam dicta. Sed charta nimis citò deficeret, si de salibus vel volatilibus viperarum, cervi, hominis, cochleariæ, persicariæ, vel fixis vegetabilium, vel spiritibus acidis mineralium, vel salibus ex duobus posterioribus compositis, tartaro vitriolato, nitro tartarificato, arcano duplicato, item sale ammoniaco, in specie sulphure metallico per sublimationem, inprimis à colchothare imprægnato, dicere vellem: quæ omnia non qualitarum primarum virtute, sed ratione potentiarum Hippocraticarum & agere, & easdem corruptas in corpore corrigere, ferè per se patet. Modò observetur, quod tam stagnata mineralium acida, quàm alcalia vegetabilium fixa, sint quidem abstersiva sordium, & correctiva suorum contrariorum, sed simul stomacho insigniter nociva, dum alcalia lixiviali sapore fermento stomachi contrariantur, acidi verò spiritus corrosivitate suâ ipsi insigniter adversentur: ob id rarius sola, potius vel mutuâ conjunctione in tertium salum abstersivum & diureticum alterata, sunt usurpanda, vel additione alterius dulcificata (v.g. alcalia per sulphur vel minerale vel vegetabile, quo elixiria parva, item balsamus Samech pertinent, acidi verò spiritus per spiritus volatiles ardentes) in usum vocanda, ut talibus temperatis & temperentur excessivi nostri saporis, & si qui horum sunt fomites, sine læsione removeantur.

§. 12. Sed cum omnes concretorum, in specie vegetabilium, saporis, singulares obtineant varietates, iisdem nobis insinuant, non ad solum acidum, aut urinosum, aut salum, semper & simpliciter respiciendum esse; sed præter communes acris, amari, aut acidi rationes uniuscujusque specificum saporem semini appropriatum, & ex seminali concreti crasi, eo, quo supra c. 1. §. 8. dictum, modo, oriundum, maturè considerandum esse, ceu appropriatum specificis morbosis corporis nostri saporibus, ex Hippocrate infinitis, remedium. Non latuit hoc nostrum Hippocratem, qui occasione alimentorum medicamentosorum hoc inculcat, l. 2. de dieta s. 7. ita differendo: *At verò ciborum ac potuum singulorum vim, tum eam, quæ secundum naturam est, tum eam quæ per artem accessit, hoc modo cognoscere oportet: Quicunque igitur in summa dicere aggressi sunt, aut de dulcium aut pinguium, aut saliorum, aut alterius cujusdam consimilis facultate, non rectè judicant.* Non enim eandem vim habent, ne-

Tom. I. Pars 2.

que dulcia inter se, neque amara, neque ulla aliqua ejusmodi; Multa enim ex talibus, quæ & album emolliunt & sistunt, siccantque & humectant. Similiter autem in reliquis omnibus. Sunt & quæ adstringunt, itemque album movent, & urinam cient. Sunt qui neutrum horum faciunt. Similiter & ex calefacientibus ac reliquis omnibus, alia aliam facultatem habent. Ex hoc enim fonte, specifico nempe sapore, omnis ferè specificorum remedium in morbis promanat efficacia, quod nempe chelidonium majus, ceu expertum, curat icterum flavum, cochlearia scorbutum, quod myrrha aut sabina Lunare mulierum tributum exigat, quod priapus cervi & ceti dysenteriam, papaver rhœas pleuritidem, succus stercoris equini colicam, tam virorum quàm mulierum, aliàs passionem hysteri- cam, spiritus sanguinis humani epilepsiam, castoreum variolas, lumbrici arthritidem vagam sanent. Hinc namque cum Helmontio omninò asserendum videtur, *in simplicibus perfectam esse curam & sanationem omnium morborum*, ut non opus sit, semper ad sublimiora provocare arcana.

§. 13. Communis equidem scholarum mos est, per saporis expiscari vegetabilium virtutes; sed duplex in eo deprehenditur error: 1. quòd, relictis Hippocraticis potentiis, per saporis calores & frigora dimetiri in iisdem aggressi fuerint, tanquam proprietatum cunctarum opifices; cum tamen qualitarum elementalium cum saporibus nulla sit cognatio. 2. Quod específicos singulorum saporis neglexerint, & ita gustato communis saporis cortice, nucleum appropriati & singularem energiam rejecerint; cum tamen hic ex propria eorum crasi oriundus, singulari sub eodem latentis facultatis sit index; ex specifica enim concretionis crasi, à semine oriunda, specifica simplicium dotes, eorumque indices, specifici saporis, prodeunt. Unde & hanc crasin, ceu optimam rei partem simpliciumque nucleum, in eorundem præparatione tam studiosè conservandum monet Helmont, & ablatis aut transmutatis eum tegentibus nunc malignis nunc inutilibus scoriis, tanquam corticibus, in apertum protrahendum, ut sexcentis istis saporibus corpus nostrum infestantibus, ex dyscrasia potentiarum Hippocraticarum, & varia depravatione abortis, citò tutò & jucundè mederi queamus: in quo excellentia liquoris Alkahest miræ est commendationis, non tantum ab Helmont. *Tr. Dispens. Modern.* §. 22. primitus prædicata; sed præterea quoque à Starkey *Tr. Pirotechnie asserted.* c. XII. p. 28. propria experientia confirmat;

[Uuu 2]

qui

qui scil. resolvit vegetabilia in primam eorum materiam liquidam, discriminans in iis omnes heterogeneous, donec parvus liquor, crassus totius herbæ vel seminis integram in se continens, ab aliis separatus, sese seorsim conspiciendum præbeat. Nam in quamplurimis aliis præparationibus, sive per ignem fiant, sive sine eo mediantibus solutionibus, aliisve operandi modis, in specie fermentationibus, simplicium crasis & hinc operandi ratio pro diversitate laborum, additorum aut separatorum, non parum immutatur, & alia quasi nova per artem ipsis imprimatur, ita ut talia chymica sæpissimè potius artis acquisita, quàm naturæ finitiva agant, idque imprimis in minerali regno: Sic enim rhabarbarum cum sale tartari digestum omnem purgandi virtutem amittit: asarum in aqua bullitum, diureticum evadit egregium tardarum febrium re-

medium: opium per acida virtute narcotica & anodynâ omninò spoliatur: Sal tartari volatile vegetabilium venena, in specie napellum, levi digestionem omninò corrigit, teste Boyle *Experim. Philos.* p. 136. Mercurius vitæ vomituriens per sal Tartari fit catharticum per inferiora; per nitrum verò evadit bezoardicum: Luna per nitrum dat pulv. amarissimum, parvâ 2. vel 4. gr. dosi copiosè, absque ullo tamen nocumento, hydropicorum aquas educentem, facile denuò in antiquum iners Lunæ corpus reducendum: Auri dura compages præcipitatur in pulverem tonitrualem, qui tamen per sulphuris acidum omninò obmutescit, pro basi auri diaphoretici Poteriani singularum virtutum remedium. Et quanta hæc non possent adduci, nisi respiciendus esset finis?



DISPUTATIO VI. VALETUDINARIUM INFANTILE.

a
MICHAELE ETTMULLERO,
Phil. & Med. Doctore,
pro Publica Perlustratione apertum,
Mense Majo, Anno 1675.
R E S P O N D E N T E
GEORGIO HEINTKE, Olsnâ-Silesio.

I. N. 7. P R O O E M I U M.

SI quis alius, certè ingeniosus per Ignem Philosophus & Medicus Helmont, de tenera Infantum Valetudine est sollicitus, dum nutritionem eorum non solum ad Vitam sanam, quin potius ad Vitam longam, novâ paradoxâque ratione instituendam, docet. Merito sanè: Siquidem mutabilis ista, & instabilis Vitæ nostræ conditio, utut communis sit omnibus hominibus, imprimis tamen infantibus propria magis esse videtur, quatenus sub tenerâ eorum constitutione, minusque validâ viscerum structurâ, & fermentorum (speciatim istius, quod primæ ceu fundamentali inservit digestionem) nondum sufficienter exaltato vigore, quoscunque sub nutritione commissos errores graviter luunt, indeque fœcunda morborum suscipiunt semina, quæ per totum subinde Vitæ cursum perniciosos fructus progerminare solent. Utut enim sub pubertatis tempore genitalis vigor, fermenti ad instar singularis, sanguineæ massæ inspiratus, spirituosiore in sanguine excitans fermentationem, & fermenta viscerum reliqua exaltans, contractas sub nutritione infantili labes subinde auspiciatò corrigit, & quasi abstergat, ob id namque secundum Hippocratem l. 5. aph. 7. Epilepsia quibus ante pubertatem contingit mutationem recipit: confer. Celsus l. 3. c. 24. Nihilominus hæc ipsa superveniens alteratio ad Vitam sanam suo modo conferens, ad longam tamen reddendam hanc ipsam, inefficax & languida planè deprehenditur. Determinatur namque universaliter
Vita

Vita longa aut brevis, sanaque aut agra, primario pro indole seminis parentum, & hinc secundum alimentorum & climatum bonitates; Ita ut ipse inevitabilis Vitæ terminus, divinitus pariter ac naturaliter præfixus videatur, qui ex radicali vitæ seminalique primordio secundum causarum naturalium inviolabilem legem quibusdam brevius imminet, ab aliis longius abest, quousque scilicet primordiales in semine radicate potestates vitales se extendunt, quem amplificare mediis hæcenus quidem cognitis & usitatis impossibile, attingere, legitimo causarum effectuumque regimine proclive, prævenire ex perverso earundem usu, facile possumus. Huc namque alimentorum & climatum imprimis facit bonitas malitiaque atterens per morbosos affectus, robur potestatum Vitalium, easque plus minus enervans, adeoque & brevius & ærumnosius reddens Vitæ curriculum. Horum insultus refrænare quidem nonnihil valent regule dieteticæ, & rerum non naturalium rigorosum regimen: sed ad istum vitæ terminum vix exactè sanam conservabunt vitam, nedum ut fines ejus ulterius queant extendere, adeo ut frustra sic Claudius Deodatus, dum in suo Pantheo Hygeæ ad 120. annos per dietetica media salubriter Vitam producendirationem docere nititur. Longè alia enim pro Vita longâ indaganda sunt remedia, talia scilicet, quæ vitæ radicem ex seminali primordio oriundam, in sanguine ceu parte primigenia explicatam, & in specie in parte ejus sulphuræa ceu principio activo, h. e. ut aliæ explicant, in calido nativo & humido radicali fundatam, attingant, eam quantum possibile sartam tectamque partim conservent, partim balsamicâ quadam virtute ab omni alteratione destructiva præservent, adeoque primis nostris constitutivis, ut loquitur Helmont. Tr. Arbor Vitæ, assimilari vel adjungi queant. Quæ imprimis ex Vegetabili regno, ceu medio inter animalia, & ipsa in radice breviter caduca, & mineralia ceu nobis incompatibilia, propriè investigandi docet præfatus Naturæ Consultus, & ex cedri incorruptibili ligno haurienda monet, cui alii balsamicam juniperi fruticem, Terebinthum alii, substituunt. Sed quàm pauci hic desideratam obtinere possunt Phyllidem, cum & ipse Arcanorum Monarcha Paracelsus cespitasse in hoc puncto graviter non paucis videatur. Si ergo ad vitam longam pertingere non aequè liceat quibusvis, saltem sanam hanc ipsam pro viribus conservare annitamur. Cum verò causas inter, propter quas tam brevi termino circumscribitur nostra vivendi ætas, simulque tot morborum ærumnis continuo comitata decurrit, vix graviores inveniantur, ut ex suprâ dictis vel spontè patet, quàm Parentum plus minus morbosorum character hereditarius, & hinc perversa puerorum nutritio, ita ut hæc posterior unicus ferè sit fons, ex quo tantum non omnes infantiles morbose ærumnæ largiter scaturiunt, ac subinde toto vitæ cursu pertinaciter egros affligunt: ob id affectuum infantilium, ex erronea nutritione enascentium, & causas, & curandi pariter ac præcavendi rationes, breviter hac vice delineare est animus, cui cæpto, Divinus Archiater, clementer assistere velit.

V. eleg. Epist. de secretis operibus artis & Naturæ, in Naturæ miraculis expressissimè Adaptorum Reg. Bacons, c. 7.

CAPUT I.

Historiam Nutritionis infantum, morborumque eorum tunc temporis frequentium, recenset.

§. I.

Nutritio
foetus
cum lacte.



Simul arque in lucem editus est foetus humanus, ligatoque funiculo umbilicali probè ablatus, lecto reconditur, ut collectis in utero materno recrementis ex-

cretis aptior fiat pro nutrimento Lactis, ex mammis vel maternis, vel ad id conductæ nutriticis, emulgendo. Quo ipse loco potus ut plurimum sustentatur, eoque ob id frequentius propinato, adeo ut teneriores primis post partum mensibus subinde omnibus bihoriis, post 3. vel 4. menses sexies aut septies, postmodum bis tervè sub unoquoque solis circuitu lactentur. Hoc lactis Potu sustentatur ut plurimum annuo spatio, à quibusdam etiam biennio, rariùs triennio, ut ut ultimis mensibus etiam potui locis patriis usitato sensim assuefieri soleat,

[Uuu 3]

leat,

leat, donec perfectè à lactis usu removeatur, adeoque, ut dicunt, ab-lactetur.

Et cum
pulte.

§. 2. Cum hoc lactis liquido & quasi Potulento nutrimento sociare solent esculentas pultes, bis quotidie ad minimum, etiam sæpius si adolescant magis magisque, easdem propinando, ex farinâ ut plurimum triticâ aut secalinâ puriore, & lacte vel aquâ paratas, quas nutrices quædam prius in os proprium ingerunt, cum saliva propriâ colliquescent, postmodum in infantum buccas intrudunt, sub finem mammam præbendo, ut superventu lactis diluatur probè, & ita facilius, ut sperant, concoquatur.

Morbi
infantum
præcipui.

§. 3. Sub hoc nutritionis cursu frequentissimis tenelli obnoxii sunt ægitudinibus, quæ & ipsæ postablactationem non statim desinunt, quin interdum factâ ablactatione demum se prodant, ob errores circa nutritionem commissos. Primitus intestinorum tormina frequentissimè cruciant illos, cum quibus excreta alvi à consuetâ flavedine subinde defleunt & obscuriori colore, subinde viridi omninò, porraceam vocant. Præfici bilem, tinctæ apparent, quin hoc peregrino colore (rariùs sine eo) eadem ipsâ non in debita fluida æqualiter permixta consistentiâ cernuntur, sed in parvos quasi grumulos discepta (mulieres dicunt, *es gehet von ihnen wie gehacktes / oder wie gehackte Eyer /*) procedunt: præter quas vitiosas excretiones & copiosas excretiones & copiosior alvi fluxus seu diarrhoea non rarò eos delassat. Juxta has passiones & vigilie pertinares maximè necessariam junioribus somnolentam quietem tollunt, aut interrupti pavores eandem turbant, prodromi scilicet gravioris mali epileptici, cui vel maximè ista ætas est obnoxia, sive interiores abdominis tantum convellantur partes & thoracis, (quod nostrates vocant *die schwere Noth im Leibe*) sive externa simul concutiantur membra: Hypochondriorum præterea flatulenta intumescencia tumorque præcordiorum angustat eosdem, non minùs quàm difficilis respiratio, tussisque perquam vel ex eo molesta, quod aut nesciant aut nequeant rejicere ea, quæ ad tussim proritant, nisi repetitus vomitus spontè natura vitiosa auspiciatò elimi-

net. Ut autem viscerum & membrorum mollis extensilitas aptissima sit pro uberiori augmentante nutritione; crebrò tamen exarescunt potiùs, aut deficiente nutrimento atrophiam laborant, aut nutriantur licet, vitio tamen hujus nutritii succi prava non rarò efflorescunt tubercula, in ulcera saniosa, & cutaneas partes instar favorum in mellificio exedentia, aut tineæ instar cranii tegmina erodentia: quibus malis nec linguæ artificiosus musculus, nec palati concamerata structura, carent, quin ulcusculis, aphthis appellatis, infestentur. Ut nihil dicam de febribus variis, in specie lentis, item de variolarum & morbillorum contagioso insultu, mustum tenellorum sanguinem, non minùs quàm paulò adultorum magis, febrili turgescentiâ & tantum non effervescentia turbante. Supervenit tandem & dentitio, dolorosa eadem, & pessimorum symptomatum concitatrix; non secus ac intertrigo, seu cuticulæ tenerrimæ hinc inde facta exoriatio. Ac ne malorum aliquid desit, Lumbricorum incondita turba, quibus non malis mulctat infantes? in intestinis qui hospitantur, dum Crinones seu capillares vermiculi intercutanea loca catervatim inhabitant.

§. 4. Talis tantaque malorum strages imminet pueris, ut rectè cum ^{Humana} Plinio ^{Virz miseria.} in *Proëm. Lib. 7. Hist. Natural.* dicendum sit: *à supplicis vitam auspiciatur homo, unam tantum ob culpam, quia natus est*; aut asserendum cum sapiente Solone; *homo est putredo in exortu, bulla in omni vitâ, esca vermium in morte.*

CAPUT II.

Originem morborum infantilium declarat.

§. 1.

Non absque præmeditatâ ratione ^{Prima respiratione multum habet in recessu.} Harveus *de Generat. animal. Exerc. de Partu p. m. 501.* qui fiat, quod fœtus non tantum ultimis gestationis mensibus in utero, sed etiam tandem extra uterum, dum membranis adhuc integris est oper-tus, & etiamnum in aquâ sua manans, per aliquas horas circa suffocationis periculum superstes sit; idem tamen secundinis exutus, si semel

semel aërem intra pulmones attraxerit, postea ne momentum quidem temporis absque eo durare possit, sed confestim moriatur? Ast æquè, si non magis, mirabile videri possit, quod foetus ex tam subitanè, adeoque apparenter periculosa mutatione, quam subit, simul atque ex claustris vapidis uteri materni in liberum apertumque irrumpit aërem, non statim graviter & ferè lethaliter ægrotet? quidni enim loci calidi cum frigido, humidi anxiosique æstuarii cum autà siccâ patulâque permutatio, & ab aëre in pulmones primò irrumpente, & inde succedente reciproco respirationis negotio, maxima in sanguine facta mutatio, totius corporis sensibiliissimam inducat alterationem? Tantam sanè, quantam post primam hanc inspirationem usque ad ultimam expirationem per totum vitæ cursum vix perferre videtur animal. Hæc ipsa tamen, quam tunc suscipiunt corporis mutatio infantes, non ad ejus destructionem, sed perfectionem potius tendit. Plus sanè in recessu habet operosum respirationis negotium, quàm ut vel fuliginum explosioni, vel sanguinis simpliciter refrigerationi, vel hujus saltem circulationi, vel soni formationi inserviat, modò attendamus mirabilem aeris naturam & effectus, simulque nexum respirationis cum Vitâ, ita ut quamdiu extra uterum vivimus, tamdiu etiam necessariò respiremus, & contrâ. Scilicet ad sanguinis perfectionem & spiritualcentiam vitalem primariò tendit hic aeris suctus, ita ut hujus medio attenuetur & resolvatur sanguis in pulmonibus, & inprimis ejusdem sulphur hoc modo quodammodo resolvatur & volatilifetur, quo sub aucta fermentatione in Corde cum salibus sanguinis volatilibus coëat in Gas spirituosum volatile, seu spiritus vitales, calidos, & probabiliter lucidos, ac ita sanguis quasi accendatur. Quod cum ritè fiat primitus in foetu, dum utero materno egreditur, non potest non ex debitâ perfectione sanguini tunc primitus induta, adeoque ejus majori spiritualcentia & intensiori incalescentiâ ex aucta ejusdem fermentatione, cum rapidiori per omnes meatus circulo & uberiori spirituum animalium proventu, indeque organorum corporis quorumcunque ad motum singulari

nisu, foetus quasi noviter aut propriè animatus reddi, & vitâ perfectâ animali dotari, qui antea in uteri materni claustris saltem plantæ cujusdam, aut zoophyti, vitam egissè videtur. Occultum nempè vitæ cibum in aëre contineri, sublimiorum naturæ scrutatorum communis fert sententia: idque ratione salis sui, ut sic dicam, mirabilis, quæcunque penetrantis, resolventis & volatilifantis, atque universalis quasi solventis. Unde tanta respirationis ad Vitam emergit necessitas, ut quæcunque animalia, simul atque ex ovis semel eruperint, aëris pernecessariò victu nunquam carere possint, ipsis etiam insectis eodem indigentibus, non secus ac pilces; aquarum licet incolæ.

§. 2. Cum E. ad perfectivas potius quàm destructivas alterationes pertineat dicta foetus singularissima passio, quam primò in mundum ingressu suscipit, saltem hæc ipsa rationem videtur subministrare probabilem, qui fiat non rarò, quod matres quædam cacochymicæ, & in specie nostrates scorbuticæ, quos in utero feliciter gestarunt, & optimè lacteo nutrimento aluerunt foetus, postmodum factâ exclusionem citra periculum lactare ipsæ nequeant, quin potius, si eosdem sanos conservare velint, conductæ ad id nutrici committere necessè habeant, qui aliàs sub proprio matris lacte, eo nempè, ex quo ipsæ partes corporis primo coaluerunt, adeoque iisdem appropriatissimum sit, continuo ploratu, torminibus, non rarò quoque supervenientibus epilepticis insultibus, aliisque variis pathematis, non leves ægritudines testentur, subindè ad mortem terminantes: quæ omnia alieno lactis superveniente suctu successivè evanescant, & non rarò cum optimo infantis habitu permutentur. Solutionem hujus dubii subministrat præfata sanguinis & totius corporis per inspiratum aërem alteratio, sub qua ipsa sanguis citiori fermentatione turgescit, & ab inspirato aëre resolvitur, unde simul morbosa semina, sub nutrimento lacteo in utero matris communicata excitantur, & ceu fermenta exotica partim sanguinis Crasin vitiant, partim alios à sanguine dependentes succos, in specie lympham & bilem, alterant, aut ipsum stomachi fermentum protopepticum inquinant,

Quare infantes omnes non aquè lac matris perferre possint.

nant, unde successivè largæ morborum affectuum segetes progerminant: Idque cò magis, quo amplius simili, inquinato nempe à morbosa matre lacte, nutritur infans, & ita feminibus morbofis, nempe igni oleum aprissimum se multiplicandi subiectum subministratur. Simile ferè hîc evenit atque id, quod tempore verno sub renovati quasi aëris inspiratione adultis etiã crebrius accidit, ut scil. eodem tempore latentia & antea sopita morborum semina quasi evigilent, & varios affectus & corporis passiones, ceu tot flores, protrudant. Maturè ergo à mammis propriis abigant necesse est matres tales suos foetus, & alienis in tali casu tradant, pauperculis licet mulieribus, modò sub moderata diata, & laborum continuato exercitio, sanæ magis & vividæ existant, ut temperato & salubri tali lacte opprimantur morbosa fermenta, imprimis salino-scorbutica, & corrigantur sanguinis dyscrasie, quo constans & firma magis exinde conservetur sanitas. Ex hoc ipso etiã ratio indaganda, quare infantes, speciatim nostrates, recens nati, subinde 3. aut 4. à partu die efflorescentiã cutis miliari, purpurâ, Germanis *der Friesel* / dictâ, affligantur, quatenus scil. ex respiratione factâ Massa sanguinea intensiori fermentationis gradu agitata, salia heterogenea præcipitando separat, & ceu feculentias non ritè miscibiles ex suo misto extrudit, quæ ipsa seroso lactice, ceu communi nutrimenti & excrementi vehiculo, imbibita, occasione balnei in recens nato instituti, & promotæ hac ratione liberioris perspirationis, ad corporis peripheriam, in specie glandulas intercutaneas miliares, deponuntur, ubi cum rubedine, pruritu, & aliquali subsequente excoiatione seu cuticulæ desquamatione, pedetentim exhalant. Reverà purpuræ nostratis origo ex scorbuticâ affectione matrum originem ducere videtur, cujus productum inter alia pathemata & purpurata hæc existit efflorescentia.

Excreta
infantium
naturalia.

§. 3. Monitum fuit suprâ §. 1. ex spirituaſcentiã majori sanguinis ab inspirato aëre promotâ, indèque spirituum vitalium & animalium concitatori impetu, in organis quibusvis insignem ad motus nisum excitari. Exinde namque originem ducit, quod

foetus recens editus non tantùm artus validè moveat & vibret, adeòque digitos variè inflectat, sed quod in specie urinam brevi pòst per urethram emittat, crebriori vomitu cruditates stomachi ejiciat, & alvi recrementa varia protrudat. Quæ ipsa in utero nunquam naturaliter excernuntur, adeò, ut certum signum foetus in partu, ex labore & nimio conatu mortui, referatur Vellchio *de Ægagrop. Diff.* 2. p. 61. cur. 6. si meconium seu alvi excrementum, antequam foetus prodierit, emittatur utut contrarium huic asserto exemplum reperiatur apud Rulandum *Thef. Curat. Empir.* p. 300. f. cent. 3. c. 66. Sternutare etiã interdum foetus recens exclusus observatur, dum ex membranâ narium irritata, nervis intercostalibus per consensum connexionis effectis, etiã convulsiva partium, cui inferuntur, sequatur commotio & concussio. Hæc ipsa tamen omnia, cum opera potius sint naturæ, quam morbosa symptomata, ob id propius ad affectus p. n. accedamus.

§. 4. Causas E. generales dum Capita generalia causarum morborum infantum evolvim⁹ affectuum infantilium supra enarratorum p. n. duæ principales se offerunt, unde omnes supra memorati affectus primam nanciscuntur (excluso tamen semper vel vitio parentum hæreditario, vel aliunde hausto fermento contagioso) originem, nempe obstinata retentio excernendorum, & perversa ingestio nutriendorum; ibi quidem eminet fecum primarum viarum, & in specie Meconii suppressio, & hinc insensibilis transpirationis oclusio; hic vero primariò se offerunt Vitia Lactis & Errata Pultis.

§. 5. Feces primarum viarum Cap. 1. retentio meconii. quod attinet: præter ventriculum, al-bicante plus minùs lentaque materia refertum, pituitosa, & flava, interdum variegata, recrementa intestina tenuia occupant; sicuti in crassioribus excrementa duriora, crassiora, & quasi picea ex viridi nigrescentia, papaverculum seu meconium quibusdam appellata (utut meconii vox generaliter Hippocrati *de Vict. acutor.* f. 69. no. 9. quod primum natis exit excrementum, denotet) hospitantur, & omnia ex nutrimento, per os sub formatione & nutritione foetus in utero hausto, genita sunt. Hæc ipsa maturè ex corpore infantis expurganda

da sunt, ne retenta diutius aut pertinacem alvi obstructionem inferant, aut lactis nutritivi distributionem impediant, aut sub distributione per intestinorum gyros idem corrumpant, & æruginoso virore tinctum ad corruptionem disponant, aut intestinis pertinaciter adhærendo, & acrimoniâ acidâ rodendo, tormina crudelia inducant. Constans sanè Practicorum est sententia, frequentissimum atrocium torminum, ut & epilepsiæ, esse fomitem feculentiarum harum diutinam nimis retentionem, & hinc in deterius corruptionem; sicut & Icterus 3. aut 4^{to} die à partu infantibus supervientem, imò ipsis interdum connatum, ex harum quisquiliarum fonte non ineptè alii derivant. Ipsa Natura provida ordinariâ lege brevi à partu vomitu pariter & secessu hæc ipsa feculenta quantocyus ex œconomia animali proscribit, etiam antequam aliud quid moliatur, præmonstrans his ipsis viam ministro medico, quid sub tardiori ejus conatu ipsi agendum sit? Præ cæteris meconium malè audit, idque suò meritò, acidum nempe p. n. est, quod in ejus recessu peccat. Cum enim oriatur ex nutrimento fœtus in utero quasi lacteo, nil aliud esse videtur, quàm crudior caseus, à reliquâ nutritiva substantiâ sequestratus & quasi præcipitatus, qui ipsi acorem à stomacho semel conceptum plus minus retinere solet, indeque occurrendo bili in intestinis cum eadem in obscurum ex nigro-viridescentem colorem coit, & pedetentim sub morâ in intestinorum cellulis diuturniori coagulatur firmitus: quæ ipsa mutatis mutandis & reliquis recrementis accommodari possunt.

Cap. 7.
Transpirationis
occlusio.

§. 6. Pergo ad insensilis transpirationis morbosam in infantibus occlusionem, cujus quanta in omni vitæ genere & statu sit necessitas pariter & quantitas, eleganter docuit Sanctorius in Medicinâ Staticâ, adeò ut corpus nostrum in continuo fluxu constitutum atmospheram certam ubique in ambitu circumfundat. Præ cæteris infantes, cum copioso sustententur nutrimento, ob id necesse est, copiosè quoque transpirent, partim ut nutrimenti tam universalis seu remoti Massæ sanguineæ, quàm particularis seu proximi hinc inde distributi puritas ab omni vel heterogeneâ vel effœta feculentia partibus non assimilabili

Tom. II. Pars 2.

farta tectaque conservetur, partim si quid feculenti sub nutritione enatum ipsis commissum fuerit, ex partibus solidis eliminetur. Jam verò infantum corpora ordinariò quasi crustâ aut lanugine viscidâ & glutinosâ obducta esse solent, ex liquore nutritivo, in quo innatant, successivè cutis extimæ regioni adhærente, à qua ipsa insensilis halitus effluxus insigniter impediri solet. Retenta E. talia transpirabilia in massâ sanguinea si coacerventur, hujus æquabilem turbant fermentationem, & ad febres ordinario disponunt; sin verò sub poris cutis deposita hæreant, corruptionem subeunt variam, & cum salinæ simul esse soleant profapia, & salso sapore, adeoque composito, sint insignita, plus minus licet, (vid. Tachenius *Hippoc. Chym. p. 78.*) facile acrimoniam intentam vel salis simpliciter, vel, idque ut plurimum Θ so acidam contrahent, unde digestionem particulari seu privatâ partium subcutaneorum turbatâ, cutanei affectus efflorescunt, alterato & corrupto ab illis retentis nutrimento earum proximo, & pessundato plus minus fermento istarum partium digestivo. Quæ ipsa eò promptius eveniunt, si & ipsum transpirabile ex nutrimento minus temperato oriatur, sive propriâ culpâ tali, dum in se ipso acrius Θ sius, aut facile acescibile, aut aliàs plus minus vitiosum extiterit, sive digestionis primæ errato, vel non corrigentis nutrimentum minus adæquatum assumptum, vel ipsum acore, p. n. inquinantis, tale redditum fuerit. Quod si verò temperata magis pinguique extiterint transpirabilia retenta, adeò ut minus ad acrimoniam Θ so acidam degenerare queant; cohibita tamen partim propriâ naturâ, partim tepore loci humido, in infantibus semilacteis ad putredinem ruunt, ex emergente tunc alcali destruyente acidum, quâ occasione larga animalculorum variorum seges successivè emergere solet.

§. 7. Erat hæc excernendorum retentio; ad nutriendorum vitiosam pergo ingestionem, ubi primariò se offerunt Lactis vitia: quorum primum est, si fuerit alienum, h. e. dum non à propriâ matre tenellis porrigitur mamma, sed nutricibus hoc negotium committitur. Quod ut pateat clarius, præsuppono 1. fœtum in utero materno nutrirî non solum per um-

Cap. 3.
vicia Lactis
1. alieni.

[Xxx]

bili-

bilicum, sed simul etiam per os: vid. *Differt. Segeri de Hipp. Orthod. & Democr. Heterod. in Nutrit. fœtus* it. Cl. de la Courvee *Tr. de nutrit. fœtus in Utero*, it. Harveus *de Generat. Animal. Exerc. § 8. it. 56. & Exerc. de humor. 2.* Nutrimentum utrobique non esse sanguinem, sed lac seu chylum lacteum, cum sanguine per arterias (cùm aliæ nondum repertæ sint viæ, in vaccis licet lactantibus instituta fuerit inquisitio anatomica) ad uterum delatum: vid præter loc. cit. Needham *Tr. de format. fœt. c. 1. 3.* Lac mammarum & ipsum reverà esse chylum, in mammarum glandulis secretum, & ductibus particularibus exinde ad papillam delatum: vid. Deusingius *de Lacte*, & Charleton *Exercitat. de Galaxia*. Jam verò unicuique mulieri suum proprium est lac, seu specialis lactis proprietas acidiosyncrasia (ut taceam lac diversum in una mamma observatum fuisse, ab eo, quod erat in alterâ, à Lysero *Observ. XI. annex. Cultro suo anatomico*) oriunda ex speciali fermenti digestivi stomachalis differentia (nam hoc in unaquaque specie magnam subit latitudinem) secundum quod, ut in unoquoque individuo, tam naturaliter quàm p. n. constituto, distinctus est appetitus, ità etiam distincta digestionis est ratio, eorundem licet assumtorum. Diversum ergò lac mammarum nutritis, à lacte uterino matris in stomacho infantuli, ipsi aliàs non assueti, (cùm consueta, longo tempore, licet deteriora, insuetis minùs molesta esse soleant, Hippocrates *f. 2. aph. 50.* indeque ob intimam symbolizationem assumendorum cum fermento) non potest non subire corruptionem, & lādere insigniter digestionis primæ arduum negotium, quin & distributum ulteriùs ad Massam sanguineam, heterogeneitate suâ turbare hujus crasin, & fermentationem vitalem, anrequam successivè stomachi fermento alterato, & sanguinis crasi immutata, conveniens magisque homogeneous fiat nutrimentum, cùm generalis stomachi digestio præsit quibusque singularum digestionum coquinis. Instituantur licet varia lactis examina bonitatisque ejus scrutinia, fallax tamen est, quòd ex consistentiâ, colore, sapore, pinguedine, &c. judicare volunt Practici, cùm insensilia ut-

plurimùm sint vitia, quæ lactis corrumpunt miscelam [ut non tantum in seminibus morbofis, cum lacte transplantatis, sed in specie vitiis morali-
bus per lac insensibiliter communicatis, est manifestum] adeò ut revera lactis conditiones & vires metiendæ sint ex sanitate bestię, vitæ ejus & Cibis: vid. Helmontius *Tr. sextupl. digest. §. 74.* Cum verò nutrites adscititiæ sint ut plurimùm pauperculæ, & quibuscunque eduliis subinde latranti respondeant stomacho, vix fieri potest, quin & Cacoehyliâ, & inde oriunda cacoehymia, laborent. Morbofæ hæ proprietates naturales uti per lac communicantur à nutritibus, ita non minùs etiam morales, de quo meritò conqueritur Helmontius *Tr. Infant. Nutrit. p. m. 623.* cùm legitimo sensu verissimum sit illud Galeni, quod mores sequuntur temperamentum corporis: sic puella v. g. observata fuit admodum siticulosa, ex nutrice bibacula à Deodato *Valitud. p. 26.* Cum & brutales proprietates & mores cum lacte in infantem penetrent, ac quæst. 47. in vitam perseverent, ut in pueris à Cervæ, item à capræ lacte nutritis observatum fuit. Sed hæc cùm minùs faciant ad scopum nostrum, ob id vel summis labris ea delibasse sufficiat. Quæ ipsa de lacte ex chylo elaborato explicata hætenus, fortius adhuc eos stringunt, qui ex sanguine lactis fontes derivant. Consultissimum ergò fuerit, ut matres sanæ, vel non admodum morbofæ [tali enim in casu observanda venit thes. 2. suprâ explicata] proprios nutrant fœtus, de quo vid. Sennertus *Tr. de Morb. Infant. P. 1. c. 1.*

§. 8. Hæc ipsa simul ostendunt, quàm aliena sit à vero eorundem opinio, qui consideratione facilis corruptionis lactis in infantulis, indeque natorum variorum malorum, alio potius nutrimento quàm lacte tenellos cibare & educare malunt, adeoque vel hordeata juscula, vel ex Crepatura hordei, additis vitellis ovorum, emulsioni similem misturam, vel juscula avenacea, vel amygdalarum emulctum lacteum succum, aliudve simile substituunt; quo etiam nutrimentum Helmontii pro pueris *Tr. Infant. Nutrit.* pertinet, ex pane, cum melle. Siquidem nec frustra, nec sine prægnanti ratione, aut ornatus saltim gratia, mammae mulieribus,

Vid. Reiss
campum
Elyf.
quæst. 47.
P. 586.

An loco
lactis ali-
ud nutri-
mentum
conve-
niat.

ribus, & in iis mox post partum Lac, non secus ac reliquis brutis terrestribus, uti & quibusdam aquatilibus, concessum fuit à Natura, quin hæc ipsa potius digito quasi intento hanc fatuum nutritionem monstraverit: Hinc aves mammis carentes earum defectu grana deglutita, & in ingluvie aliquali morâ macerata, ac ita ad fundendum citius lacteum suum nutrimentum prædisposita, evomunt denuò pro meliori pullorum sustentatione. Tenerior siquidem infantum est stomachus, minusque exaltatum fermentum eorum digestivum, unde quæcunque fere ingesta laboriosam saltem, si non & defectuosam, penitus redderent digestionem, quæ facillima & summè nutritiva erit, dum lac ceu chylus, jam ante in nutrice elaboratus, ipsis suggeritur; talis scilicet succus, ex quo & primitus machina eorum corporea constructa fuit, & ipse foetus jam in utero sustentatus, & quem ceu jam consuetum facillimè digerere & concoquere potest. Quod si quædam ex lactis alteratione in infantibus metuenda erunt pericula, ea sanè in se sunt facile corrigibilia, modò maturè & legitimè iisdem occurratur; Unde & rarissima eorum observata fuerunt exempla, qui defectu nutricum feliciter adoleverint.

Vitia Lactis 2. Morbosi.

§. 9. Nam sive nutrix sive mater sitienti satisfecerint puerulo, nisi sana vegetaque gaudeant corporis œconomia, indubitatum est, morborum semina radicesque firmissimas in eum, tanquam per medium fomitem, transplantari. Lithiasin per nutricem in puerum derivatam, notavit Helmont. *Tr. Nutrit. Infant. ad V.L.* Lue quæ per matres infectas puellas inquinatas binas observavi in Nosocomio Patavino: nutrices habitus seriosioris ad affectus catarrhales proclives reddere, quos nutriunt infantes, compertum est: Scorbuti labes multiformis per mammas propagari in sugentem, nemini mirum, quum contagiosa ejus indoles sit notissima. Sed res ipsa cum loquatur, quid opus ulteriori diductione? Quin etiam sana licet in proprio corpore deprehendatur nutrix, si tamen propriæ constitutionis causâ, idque ex ratione peculiaris in stomacho digestionis, vel certæ in glandulis mammarum texturæ, serosius, acrius, aut falsius, alio-

Tom. II. Pars 2.

vè modo minus conducens infanti lac colligat, etiam citra sugentum noxam id propinari nequit, quin nutrimentum tale, ipsi minus appropriatum, hostile & inimicum evadat.

§. 10. Sed utut sanissima etiam sit mater vel nutrix, tamen tenello infantulo ipsum lac probè excoctum, crassius, spissius, adeoque uberioris nutrimenti, non aque primo statim haustu convenire vel ex eo fit manifestum, quod in utero materno adhuc conclusus foetus nutrimentum lacteum per os hauriat admodum subtile, perque duplicem chorii & amnii membranam probè filtratum & depuratum, quo teneriora facilius perluat abdominis viscera. Ob id provida editi foetus non statim lac perfectum pinguius & spissius subministrat, sed præmittit Colostrum, h. e. serosiores tenuioremque Chylum, ut hic ipse minus stomacho faceat negotii, quin potius serositate salinâ abstergat blandè stomachi mucum, intestinorumque sub gestatione collecta recrementa expurger, ac virtute diureticâ organa urinaria probè eluat, ut ita supervenienti successivè alimentoso magis lacti facilitetur digestio, & impediatur facillima ejus corruptio, cum reverà tale Colostrum sit alimentum medicamentosum. Hinc istud, quod die primo scaturit ad mammas, potentiùs purgat; quod secundo & tertio minis, donec succedat purgatrici vis nutrix. Quam pessimè E. suis consulunt natis, qui robustis, aut obesis, aut qui jam aliquandiu lactarunt, nutricibus mox tradunt eosdem, à quorum lacte butyroso & caseoso nimis gravatur tenellus stomachus, & digestionis opus inde insigniter retardatur, ac cruditati acidæ lactisque coagulo promptissima occasio subministratur. Illustrat hæc epilepsiæ exemplum, aliquot filiabus lethale, ex nimia lactis, materni licet, butyrositate & pinguedine, quod recenset Hoffmannus *Tr. de usu & abus. medic. Chymic. p. 49.* Quod si verò matres nutrire intendant suos foetus, quo quæso consilio corrigunt naturæ prudentissimos conatus, & tam studiosè emulgent salutare hoc colostrum, quasi nocere possit infanti, quod ceu divina medicina ipsi propinandum foret? Id quod etiam contra quendam Medicum ur-

Vitia Lactis 3. nimis nutritivi.

sit sufficienter Veslingius. *obs. & Epist.*

[Xxx 2]

Epist. 28. p. 123. & ante cum Spigelius in erudito scripto de formato foetui c. 13. p. 16.

Vitia Lactis 4. superflue ingesti.

§. 11. Sed tolerabile adhuc, quia facile corrigibile esset hoc erratum, nisi gravius longè, familiarissimum licet, se offerret, nempe superflua & inordinata, & tantum non coacta, lactis infusio, qua matres pueros suos nimis alendo sæpè necant, & dum lactant, mactant, ut rectè observat Kerckringius *specileg. Anat. Obs.* 40. Dum ad quemlibet ex quacunque causa excitatum infantis ejulatum, ipsi renuenti licet, subinde papillas in os intrudunt, ac lac sugere cogunt, priori, licet crudo adhuc, subacido & nondum concocto in stomacho hærente, unde novi superingesti necessaria congruescentia, caleatio, ac utriusque in pastam acidam, viscidam, corruptio succedit: unde Pylorus indignatus vel se pertinaciter stringit, qui aliàs de seipso in pueris arcto munitur sigillo, observante hoc etiam laudato Kerckringio c. 1. & planè non, aut difficulter saltem talia caseata transmittit, ut ulteriori morâ in loco isto tepido in deterius, ac ex cruditate acidâ in corruptelam putredinosam labantur, ac in liquamina putrida, flavescentia, nidorosa, &c. tandem degenerent: vel graviore furore percitus idem Pylorus, salutari licet effectu, per gulam omnia ista vitata remittit: vid. Helmont. *Tr. Infant. Nutr.* qui Tragœdiam hanc graphicè & eleganter delineavit. Præstat sanè hic peccare in defectu, quàm in excessu, cum repletiones ad extremum productæ graves esse soleant, teste Hippocrate. *f. 1. aph. 4.* & sicut repletio omnis, in specie panis in adultis, irâ sanè lactis in tenellis, est pessima; hinc enim consequenter *impura corpora, quò magis nutriveris, eò magis læseris*, Hippocr. *f. 2. aph. 10.*

Vitia Lactis 5. per malam dietam depravati.

§. 12. Periculosius jam urget Fatum misellos lactentes, ex perversâ & sæpius inordinatâ lactantium dietâ, circa quam saltem alimentorum promiscuam ingluviem, affectuum neglectam refractionem, & excernendorum pariter ac retinendorum peccata considerabimus.

1. quoad assumta.

§. 13. Sanis quidem omnia sana, modò per internam appetitus dictaturam imperentur; quòd enim sapit, nutrit, adeò ut in sanis scrupulosus alimentorum delectus reverà sit fru-

straneus, quin potius, si appetitus circa aliquod objectum feratur intensius, inprimis consuetum, [nam in insuetis appetitus subinde medicamentum quærit] vix denegandum sit, quia fermentum digestivum potenter quælibet in sui ditionem trahit & coërcet, utut talia cum modamine mediocritatis propinanda sint, cum sobrietas rectè cardo totius dicatur diætæ: id quod nutricibus conductiis in specie observandum, ut plurimum egenis, adeoque famelicis, & frequenter nimio nutrimentorum excessui primitis indulgentibus. Lactantes tamen præ cæteris tenellos respicere debent, cum leve illarum erratum, utut ipsis innocuum, his graves subinde inducat passiones, & assumptorum plures proprietates in chylo persistentes, utut plus minus infractæ aut alteratæ, sui tamen præsentiam in lacte manifestò exerant, & anisum pro augmentando aut corrigendo lacteo chylo assumptum, sui in eo præsentiam odore testetur; non secus ac florum sambuci in lacte decoctorum insons esse solet potus, imò admodum proficiuus pro lactis augmento, quos tamen observavi à nutrice fortius dicto modo decoctos, & liberalius potatos, & ipsi lactenti copiosum excitasse alvi profluvium: confer. Bartholinus *Centur. 2. Histor. 93. p. 338.* Nil dicam hîc de purgantibus, quæ nutricibus propinata infantes purgant, & omnia inprimis propriè dicta infantibus sunt inimicissima. Tacebo peculiare idiosyncrasias infantum, quoad certa assumpta à parentibus transplantatas, qua à nutricibus neglecta graviter tenellos lædunt, quarum exempla recenset Digby *de Natura Corpor. Tr. 1. c. 38. p. m. 424. 436.* Verùm in specie urgeo acida, quæ sive sint condimenta, sive potulenta, etiam Vinum, [in non assuetis] sui vestigia in dulci Lacte relinquunt, utut sensibus abscondita, postmodum tamen torminum infantilium ex acido rodente autores. Unde & cautiores matres, dum foetum in utero inclusum gestant, acidamini fugiunt, ne præmaturè inton-tes torqueant, aut fomitem epilepticum ingenerent: id quod sæpius observavit Celeber. Sylvius, quòd nempe infantes nati à matribus, acido non adeo indulgentibus, epilepsiæ minus sint obnoxii, idque etiam adeò pluribus

ribus matribus prædixit; Cùm præterea acidorum abusus ad abortum gravidas disponere recte asseratur à Beckio, *in Medic. & Experim. p. 214.* quod etiam de Vino, quòd nempe foetum pellat, asserit Hartmannus *Prax. Chym. c. 229. §. 3.* Unde etiam Joh. Ant. von der Linden / *in Comment. super hunc locum*, primis gestationis mensibus Vinum gravidis, in specie, ut vocat, calidioribus, prohibet metu abortus, quibus ultimis 2. vel tribus mensibus Creticum aut malvaticum, in parvâ tamen dosi, concedit. In quo tamen acido frequentissimè peccatur; amicum enim ac gratissimum cùm sit stomacho, tantum non quotidianum ejus percipimus appetitum. Caseus itidem non immeritò interdicatur nutricibus, ne hoc tanquam præmaturo coagulo ad grumescentiam p. n. jam in mammis lac disponatur. Cerevisia non ritè fermentata, aut fecibus turbata, utut robustiores in nutricibus intestinorum tunicas minus afficiat, à fermento stomachi ferè subacta, pueris verò quod diarrhæam torminosam excitet, compertum est. Id quod similiter de fructibus horæis succulentis, facile fermentescentibus, manifestum est; sicut aridiores è contrario alvum pertinaciùs sistunt, quod contigit in infante, cujus nutrix avidiùs castaneas assumerat, teste Timæo *l. 5. Cas. 15. p. 252.* Cautas ergò nutrices esse jubeo in assumendorum ratione, plus minus tamen, prout nempe aut consuetudinis aut digestionis primæ, vel absolutioris vel deficientis, adeoque subactorum plus minus & alteratorum à fermento digestivo ingestorum in iis fert ratio.

Quoad 1.
animi pa-
themata.

§. 14. Affectuum exorbitantiæ jam attingendæ sunt, quorum inordinatus insultus, ut generaliter spiritus animales totumque genus nervosum, & his mediantibus massam sanguineam & reliqua corporis contenta liquida commovendo insigniter alterat; ità specialiter nutrientium depravat lac. Præ cæteris iracundia & terror nutricum nimius nocentissimus est infantibus, & ab utroque, in specie priori, epilepticas excitari convulsiones, notissimum est. Turbant sane affectus omnes concoctionis primæ negotium, adeò ut ex tristi nuntio esurienti inopinatò allato, adeoque incusso sic terrore, statim pereat

omnis appetitus, unde digestionis consequenter impedimenta, & cruditatum acidarum occasiones: qui effectus itidem ex iræ furore expectandi sunt, sub cujus fervore vel maximè sanguinis ebullitio & quasi febrilis effervescencia cum bilis orgasmo, considerandi veniunt. Ex alterato ergò ac depravato chylo simile generabitur Lac, aut hoc genitum licet in statu pacato, sub intestinâ tamen affectuum rebellionem, & inde natâ omnium corporis contentorum à spirituum vario ac p. n. impetu, non potest non insigniter alterari, & variè commotum ac quasi secundum minima concussum in partes secedere, & butyri ac casei ex seroso vehiculo quasi separationem p. n. pati. Vix sanè quicquàm frequentius est, ac terrorem, non minus quam iram, lactis inducere coagulum, ac in mammis grumescentiam; unde tandem inflammationes, dolorosissimique abscessus, & in specie erysipelata superveniunt; sicut à tali lactis semicaseati tactu mille malis infans mulctatur infans & speciatim ad epilepsiam ordinariò disponitur. Observavi juvenulam primiparam, quæ suum alitura infantem, pro uberiori lactis proventu, & meliori papillarum protuberantia, simul catellum subinde mammis admovebat. Evenit casu, ut graviter perterrescisset puerpera, unde repente, ad se cum redisset animus, catellum mammas exfugere permittit, ne alterato isto lacte foetui noceret: quo factò brevi post gravi epilepsiâ corripiebatur Catellus, quæ propinatâ Theriacâ, & insequente gravi sopore, demum evanuit. Sed præter has sensiles coagulationis & grumescentiæ qualitates nocivas, & alias multifarias difformitates induit lac, ex tam variis affectuum fluctibus: quibus sanè non tam matres, quàm specialiter nutrices, obnoxia succumbunt, quarum singulae infantis nutrimentum lacteum morbosè disponunt, & ità foetus sanitatem graviter labefactant.

§. 15. Excretorum supersunt con-
sideranda in nutricibus errata, quæ in-
ter menstruorum consideratio prima-
tum obtinet. Supprimi hæc ipsa, ut
in gravidis, ita & in lactantibus (pro-
babiliter in salutem foetus) naturæ re-
spondet legibus; in habitioribus ta-
men, sanguine turgescentiore prædi-
tis viraginitibus dictis, tam primis ge-
statio-

Quoad 3.
excreta.

[Xxx 3]

stationis mensibus, quàm ipso lactationis tempore, eadem ordinariâ erumpere periodo observatur crebrius, collectore Exemplor. Schenkio *Observat. pag. 574. & 630.* Quoties verò sanguinis ista contingit excretio, toties sensilis in tenellis observanda venit alteratio, quâ languidi, lachrymosi, ac imbecilles fiunt, donec obturato denuò sanguineo fonte, dicti languores etiam denuò remittant. Id quod itidem observatum à Paulo Zacchia *Quæst. Med. Legal. lib. 7. Tom. 3. quæst. 3. pag. 599.* singulari scilicet fermentativo motu sanguis sub menstruationis tempore agitur & turgescit, unde & menstruam febrim, seu omni mense, quum sanguis per genitalia evacuaretur recurrentem, ex aciori scil. effervescencia observavit Lindanus *in Coll. MS. super Hartmann. Prax. Chym.* Quidni ergò lac tunc temporis & similem fermentativum concipiat motum, qui & turbet infantis primam digestionem, & vitalem sanguinis fermentationem vitiet, forsân simili quodammodò ratione, atque quando adulti cerevisiæ potui vel vini adfueti, ex potu talis liquoris adhuc nonnihil fermentantis ceu extraordinariè affecti subindè non leviter læduntur. Verum enimverò insignior longè lacti imprimitur alteratio, si per fœcundum coitum nutricis impediatur menstruatio, ad corruptionem exinde lac disponitur, & horridam quodammodò acquirit impressionem, fœtui ferè abominabilem; id quod & in brutis observabile est, ut curioso exemplo observatum à Graffio *de Org. Viror. Genit. pag. 126.* Lac ita depravatum, ne dicam corruptum, ab infante haustum degenerat in ejus stomacho in vitiosum casei coagulum, tenello infantis stomacho mirè infectum, adeo ut eidem exindè stigma per totam vitam durabile inprimatur; unde casei aversionem tam multis familiarem, non absque summâ probabilitate deducunt *Schockius lib. de Aversat. cas. & Ill. Digby de Nat. Corporum cap. 38. pag. 437.* Ob id & Medicorum est præceptum, ut toto lactationis tempore nutrices à coitu abstineant, unde etiam lactantes matres, à redditione debiti excusat, propter insignia fœtus nocumenta, Paulus Zacchias *loc. supr. cit.*

§. 16. Hæc vitia lactis fuere: re-

stant adhuc errata Pulvis ceu secundum genus errorum in assumtis. Detestor autem in pulve inprimis farinæ crudæ usum, quæ cum lacte vel aqua subacta & cocta, ac in pulmentum instar viscosi glutinis redacta, quid aliud dabit, quam pastam tenacem, crudam & viscidam, utiliore bibliopægis pro glutinandis chartis, quàm infantibus pro nutritione: siquidem ob fermentationis farinæ in panificio pro adultis etiam summè necessariæ defectum difficillimæ eadem existit digestionis, quia laboriosæ in ventriculo fermentationis. Panis ex quacunque farinâ confectus, non ritè fermentatus, ac ità pro digestionem stomachali facilius suscipiendâ, & in aliis unâ assumptis promptius adjuvandâ ineptus, ex defectu acidi spirituosissimi volatilis, crudam farinæ mucaginem resolventis & volatilifantis, quantum noceat sanitati, etiam adultorum, & quàm fœcundus sit genitor morborum chronicorum, præter quotidianam experientiam vel muliebris loquitur sexus, ex talis panis usu menstruorum patiens defectus & cachexias, ut pluribus videri potest Kergerus *de Ferment. §. 3. c. 2. p. 216.* & Schockius *de Ferment. c. 2. & 3.* Ast robustus est adultorum ex spirituosiori ac aciori fermento stomachus, debilis è contra infantilis:ingere tale pulmentum glutinosum & viscidum, & superaffunde lac butyro & caseo pingui turgidum, quid putas futurum exindè in stomacho infantili? tenax nempe & glutinosus, vitiosoque acore intensè tinctus emerget mucus, mille malorum in junioribus talibus fœcundus parens. Compertum sanè est, sponte suâ & facile quamlibet farinam liquore sufficienti subactam, & in loco tepido asservatam, acescere insigniter, & hinc fermentare & spumose turgescere, etiam citra fermenti additionem: id quod si fiat in stomacho infantis, ex p. n. & stomacho peregrino pulvis acore corrumpitur superingestum lac, & in grumos caseosos densatur, adeoque tota digestio prima exinde depravatur insigniter. Potius ergò farinæ talis, pro meliori digestionem, fermentativa præparatio extra corpus præmittatur, quam quod cum tanto sanitatis periculo eadem in stomacho demum instituenda supponatur. Perspexerunt hoc & rejecerunt ob id tales pulves jam olim plures insigniores Medi-

Cap. 4.
Vitia pul-
vis 1. in
præpara-
tione.

Medici, uti de hoc videri potest Vel-
schius *de Vena Medinens.* §. *Dracunculis Veter. Exercit. de Verm. Capill. infant. p.* 261. conferatur simul
Hildanus *Cent. 6. Obs.* 34. qui periculosissimam pylori obstructionem à tali spissa pulte natam, observat.

1. In usur-
patione.

§. 17. Post pultis præparationem culpo etiam ejus usurpationem, dum nutrices eandem prius in ore volutant, & salivæ permistione debitam fluiditatem conciliant, indeque infantis ori intrudunt. Jam vero salivæ singularis est vis fermentativa, à modernis sufficienter declarata, ratione cujus proficua sanè esset ejus cum pulte miscela, si exactè sana nutrix eam institueret: sed cum ratione huius virtutis fermentativæ etiam morbofa contagia sub ejus vehiculo promptissimè communicentur, seque multiplicent, ob id minus istam nutricis delibationem permittere possum, cum exinde facillimè ad morbosam corruptelam puls disponatur, inprimis si tantillum scorbutici fermenti gingivas & salivam inquinaverit.

Causa
proxima-
affectu-
um infan-
tilium.

§. 18. Detectis ità remotioribus causarum morbificarum fontibus, dum exactius nocendi rationem proximam seu rationem cauſandi inquiremus, perspicuum evadit, succum vitiosè acidum, nunc viscidum, nunc aqueo-serosum, defectu primæ digestionis in ventriculo, ejusque intestino duodeno perfectionis, adeoque ex cruditate acidâ coacervatum, esse causam proximam & radicem, ex quâ tot morbi infantiles frequentissimè propullulare soleant. Hunc s. Galenicorum pituitam acidam, seu Paracelsitarum \ominus acidum seu Tartarum fecalem appellare velis, mihi perinde est; simus namque in verbis faciles, modò in rebus conveniamus. Facillimè scil. lac, seu sanum seu alteratum, in stomacho tepido p. n. acescit, idque eò magis, quo copiosius aut inordinatius ingeritur, hinc spissescit, & factâ per coagulum feri à contentis separatione casei cum butyro perniciosus grumus nunc in stomacho, nunc in intestinis subsidet, & plus minus pertinaciter agglutinatus hæret, conferente symbolum pulte farinaceâ crudâ & viscidâ facillè acescibili, una cum retento & plus minus corrupto meconio, unde ex conditione loci, h. e. stomachi calidi, & ratione contentorum recrementorum, uti & ingestio-

rum lacteorum & pultaceorum intensus acor necessariò & de facili oritur, qui nunc materiâ viscidâ irretitus, in primis viis suas ludit Tragœdias, nunc vehiculo aqueo seroso, & lymphatico ulterius distributus, etiam aliis & remotis in locis mille malorum existit artifex. Clara hæc evadunt iponiè, modò superioribus thesibus explicata probè consideremus, in specie *in thes.* 5. 7. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. &c. simulque observemus, pleraque infantum mala per remedia acidum destruentia, de alcalium tam volatilium quam fixorum proficiâ, uti & per aromatica \ominus ina volatilia Oleosa, optimè percurari.

§. 19. Quæ tamen ità intelligenda sunt, non quasi alia nulla in corpore tenello sint errata, quàm quæ ex dicto acido oriuntur; ubique enim excipiendi sunt hæreditarii morbi, uti & à lactantibus transplantata morborum feminaria, aut aliorum hausta contagia. Præterea mille larvas induit lac sub sui corruptela, mille inde nocendi artes, non tantum dum adhuc in mammis turget, sed in specie, dum infantis in stomacho corrumpitur, hinc in intestinis tam à bile quàm succo pancreatico alteratur, subinde à restitante meconio similibusque excernendis inquinatur, quin & propriâ sponte de facili corrumpitur, unde diversimodè dulcescit, amarescit, colliquescit, viridescit, livescit, putrescit, verminescit, aliasque quam plures peregrinas acciscit sibi qualitates: nam & jam in tenellis sexcenta seu potius infinita Hippocratea, de quibus Autor Libri *de Prisc. Medic.* locum inveniunt. Unde tam in abdominis visceribus, quam massa sanguinea, & inde derivatis reliquis contentis liquoribus activis, quamplurima p. n. nocumenta præstò adſunt. Ut ut ea, quæ ex cruditate acidâ veniunt, sint frequentissima, quia talis corruptela est familiarissima.

§. 20. Paradoxon equidem videri possit, quî in semilacteis infantibus, adeoque dulci rore ubique perfusus, ex lacte dulci primitus concretis, & eodem cum pulte insipido dulci enutritis, acor adeò nocivus & subinde intensus oriri possit, à quo tam tetra superveniant symptomata. Sed clarius redditur facillè totum negotium, modò aspiciantur assumpta tam matris utero gestantis quam nutricis lactantis.

Variat
subinde
causâ pro-
xima.

Unde aci-
dum adeò
vitiosum
in infan-
tibus.

tis.

ris. Hæ ipsæ enim præter manifesta acida, quæ, ut supra §. 13. monitum fuit, ex dictamine appetitus hauriunt, vescuntur saltem pane, & bibunt cerevias. Panis omnis, in specie secalinus, continet in se spiritum intensè acidum, volatilem tamen, adeoque in se saluberrimum, duriora tamen etiam corpora, v. g. Coralia, ferrum, Vitrum §ii, aliaque rodentem, qui cum aliis assumtis lacti simul materiam præbet. Utut autem acor hic ipse, partim sub stomachi digestionem, partim bilis alcalinæ in jeuno permissione, alteretur plus minus in falsum volatile, sicque occultetur, nihilominus facilè datâ occasione denuò se exserit & operatur; hinc enim tam facilis lactis aciescentia, & assumpta acida matri ac nutrici innocua, tamen infantibus per lac revera ad gustum dulce sunt torminosa, & vel maximè hostilia. Cerevisia verò quæcunque facillimæ est aciescentiæ, cum modica lupuli pinguis aromatica conditura non sufficiat, quin tandem aciescat; ut taceam vel cerevisiam novellam, à fecibus nondum sufficienter depuram, fermentando in stomacho facillimè aciescentem, aut cerevisiam inveteratam jam nonnihil acidulam, à nutricibus subinde haustam. De cætero his ipsis vix ulla est cura, quantum sua assumpta foetum aut infantem afficiant, utut earum delicta diu post demum luant infantes, idque datâ qualibet occasione, ut plurimum per epilepsiam, ut supra §. 13. monitum. Quid fructus horæos memorem, effervescentes facillimè, acetaria & similia, gravidis pariter ac lactantibus citra reflexionem in foetum familiarissima. Adeo ut acidum sit, quod morborum infantilium frequentissimus est autor; sicut subjectum ejus viscidum eos contumaces subinde reddit, aut crebrius recidivantes; vehiculum verò aquosum etiam in remotioribus locis, & extremâ corporis peripheria, eosdem propullulare facit.

Unde tor-
mina &
varia alvi
excreta
Infan-
sum.

§. 21. Jactis hisce fundamentis facilis est via, ulterius indagandi supra enarratorum morborum generationes. Tormina infantibus ferè inevitabilia ab acido oriuntur, quod ex stomacho, sæpissimè ex lactis coagulo & esu acidorum à nutricibus delapsum, intestinorum membranas pungit, rodit & lancinat; unde isti cruciatus, cum convulsivis spasmis

juncti, prodromi exinde non rari epilepsiæ, iique eò crudeliores, quo viscidiori glutine se agglutinaverit eorum parietibus. Horum indicia, præter ejulatum, sunt ut plurimum excreta viridia plus minus, seu, ut vocant, porracea & æruginosa, oriunda ab acido excessivo & vitioso (nam acidum acrem odorem spirant talia) cum bile Θ inâ Oleosa volat. permista, ex quorum miscela viriditas ista exsurgit. Equidem viridis color revera sub concursu plurimum ex miscela flavi & cærulei emergit: flavedo in bile clara est & conspicua: cæruleus color in nullo succorum corporis unquam nec naturaliter nec p. n. observatus fuit, unde rarissimum, & fere unicum est exemplum, quod recenset Meara, de lacte nutricis saphirinum colorem exacte referente in *Exam. Diatribe de Febr. Willisi* p. 65. Cum tamen cæruleus color ad nigrum accedat propius, adeoque in certâ luminis maximam partem intrò susceptione in poros, & cum umbrulis mixture consistat; loco hujus in corpore absentis acidum perspicuum licet, constringendo tamen & angustando aliquali subjecti coagulatione, poros flavi corporis sufficiet, inprimis si dictum acidum & ipsum in subjecto nonnihil densiore & crassiore hæreat, ut exinde viridis ceu medius inter cæruleum & flavum color emergat. Comprobat dicta experimentum Grassii, de *succo pancreatico thes.* 145. 147. ubi bilis flava ex miscelâ cum spiritu Vitrioli atro-virescentem induit colorem. Nec est, quod quoad experimenti fidem objicias, id quod alio mihi obtigit tempore, in spiritu Vitrioli adhuc contentas esse, & sub rigoroso ignis examine cum acido simul elevatas metallicas & eas & oles particulas, quæ attractu alcali bilis præcipitata virorem repræsentent, sicut eadem attractu gallarum in Vitriolo atrum colorem induant: nam idem experimentum tentavi & cum spiritu Θ lis purissimo, non secus ac cum spiritu Θ i, & ubique idem fuit successus & eventus, quod nempe istâ misturâ intensus viror effloruerit: id quod simili ratione de lactis vitioso acore, virorem cum bile producente, verum erit. Unde subinde etiam grumosa apparent talia, sub infantum torminibus excreta; quia lac à præternaturali acido in grumos

mos caseosos coagulatum, istam laryam induit. Non tamen semper talia grumosa simul sunt viridia; quin subinde sint flava. Scilicet discoloratio horum excrementorum oritur à bile per acidum mutatâ & corruptâ; sæpè tamen evenit, ut feces excernantur flavæ, quæ paucò tempore postmodum colore viridi tinguntur. Causa hujus phænomeni est: 1. quod acidum in bilem, quamdiu in corpore fuit, sufficienter non egerit, propter impedimentum lactis, continuo vel brevibus intervallis tantum assumptum, quippe quod ejus vim temperando infringat: 2. Quia non nisi finitis effervescentiis, & præcipitationibus, mutationem rerum accuratam observamus; unde post excretionem, dum aëris accedit adjumentum, finitâ mutuatâ actione & reactione permistorum, color tandem tertius emergit: 3. Quia & ipsa commista excreta facilius forsitan in aëre libero novum coloris schema arripiunt, quam dum in intestinis adhuc sunt coercita. Observandum quoque hoc loco atrocissima non raro adesse tormina, excretis alvi aquæ instar leviter flavescents fluidis, quæ nimis fluida, subinde adeò acria observantur, ut & podex excoriari exinde soleat.

Unde Anorexia, Vomitus, Præcordiorum & hypochondriorum inflatio.

§. 22. Quod si copiosus tenaciorque grumus stomacho incumbat, cui per pylorum transitus negetur, non potest non exinde appetitus deijci, & activitate fermenti digestivi, à lacte vel copiosiore vel coagulato obrutâ, horror mammae oriri, cum absolutâ aperiâ, cum quotidie observemus, istud quod semel stomachum læserit, ceu hostile postmodum, diu eundem averfari: quod si gravius exinde oneretur stomachus, vel obstruatur omnino pylorus, de quo vid. Hæserus *Herc. Med. p. 149.* item Hildanus *Centur. 6. observat. 34.* & irritetur quoque hujus convulsiva contractio, quam vomitus violentus sequitur, supervenit, tenella corpuscula insigniter quidem lædens, salubris tamen, quatenus excrementa ista removet, & graviorum malorum jamjam imminentium est medicus. Finge enim hæere talia diutius in Ventriculi bursa, facile ex acore fermentativo pastæ instar farinaceæ intumescunt, & impetuoso flatuum proventu, intumescantium præcordiorum, hinc diaphragmatis impedito

Tom. II. Pars 2.

motu, difficilem respirationem, & ex horum flatuum in orificium sinistrum impetu, hujusque pertinaci strictura, præcordiorum anxietates, inde inquietudines, somni impedimenta, vigilias inferent. Eadem est origo hypochondriorum inflationis, & totius abdominis tympanicæ distensionis; nam loco saltem differunt à priori; pasta nempe acida viscida, vitioso acore fermentata, concurrente simul alcalino bilis stimulo, Gastale flatuosum eructat. Scilicet farinacea puls cruda acescentiam necessariò subit in stomacho, unde cum lacte semicoagulato turgescencia fermentativa, de quo supra, flatuumque & modo dictorum symptomatum in & circa hypochondria & epigastria fertilis proventus. Cogitemus adultorum hypochondriacum affectum, & in eodem flatuum & borborygmore impetus, ex acido viscido digestionis primæ relicto p. n. oriundos, & simile ferè in infantibus usu venire perspicimus; cum sufficienter Helmontius *Tr. de Flat.* horum originem ex acido stomachali, non tamen fermentali, ordinariò demonstraverit.

§. 23. Quod si tenacior talis, acidi- Unde singultus, tussis, asthma infantum. orificio firmitus adhæserit, per consensum firmissimæ connexionis diaphragmatis siquid irritabitur musculus, unde hujus sub inspiratione factâ convulsiva contractio singultum, subinde contumacissimum, infert; sicut in ventriculi cavo si magis fluctuent pituitosa talia acida, aut Θ so acida, eaque successivè irritent orificium superius, vel insensâ & molestâ suâ præsentia, vel saltem halitibus acrioribus, excitantur sub expiratione occasione vellicati diaphragmatis, ipsique compatiuntur musculorum expirationi inservientium, horum convulsivi motus, unde repetentes tussis concutient tenella pectora. Reverà enim ex stomacho, hujusque in se ipso coacervatis cruditatibus infantum exoritur tussis, subinde tantâ violentiâ repetens, ut non nisi superveniente Vomitu, copiosique mucis rejectione, ad tempus cesset. Rara autem infantibus sicca tussis, aut quæ ex laryngis asperæque arteriæ oriatur irritatione, obvenit, nisi interdum inclementioris aëris afflatus & liberior haustus suo modo ad hunc disponat. Idem asse-

[Yyy]

rendum

rendum de tussi istâ, quæ sub dentitione laboriosiore frequenter turbat infantes, quam copiosior salivæ subinde Θ so acrioris defluxus in stomachum, & imprimis uberior ejus ex membranâ pituitariâ posteriori seu inferiori transfusio, & inde defectuosa reddita prima digestio, & crudatum accumulatio infert. Idem asserendum de infantum asthma, quod ut plurimum ex ventriculo onerato oritur, dum mucilagines acidæ coacervatæ, & flatulentâ turgescentiâ tumefactæ, molestum tale asthma producant; hinc etiam provocato Vomitu statim liberantur, Autore Primerosio *de Pueror. Morb.* p. 73.

Unde
Lumbri-
ci in In-
fantibus.

§. 24. Quod si mucus similis, blandior tamen & dulcior, ex alimentorum quocunque modo digestorum reliquiis in intestinorum canalibus diutius hæserit, occasione loci, caloris, & inchoatæ successivè putredinis, occultata lumbricorum semina excitantur, foetusque vivi excluduntur. Semina scil. vegetabilium Cerealia, in specie secalina & triticea, vel immediatè in pulve farinaceâ, vel mediatè cum lacte ex pane comesto genito ingesta, seminali insectorum contagio, (quod sub minimâ etiam mole latere potest, utpote constituere dicitur saltem 2800. partem sui seminalis corporis) quasi imprægnata, data occasione hæc excludunt. Accedit, ut monui, tepor loci blandus, vis digestiva ventriculi debilior, quâ digerendo non subiguntur omninò dicta animalculorum seminalia primordia, & temperata bilis acrimonia infantum, defendens aliàs succos, quos attingit à tam promptâ putredine & verminatione: unde & ibi, quò fermentum fellis non pertingit, lumbricorum est Patria, Autore Helmontio *tr. 6tupl. Digest.* §. 82. hinc & tinearum in adultis causam potissimum in obstructionem cystis felleæ refert Hartmannus *in Praxi Chym.* c. 156. §. 11. Talibus E. occasionibus faciliè viva ista putredo excitari poterit.

Unde
atrophiæ,
febres len-
tæ, Tineæ,
furuncu-
li infan-
tum.

§. 25. Cum ergo ex suprâ dictis subinde mucus crudus acidus & viscidus loco nutritii succi distribuendus sit, non possunt non eodem intestina aut admodum incrustari, aut oscula ductusque lactei eodem obstrui, aut glandulæ melsaraicæ consequenter intarciri, unde tumores

abdominis protuberant, & denegato nutrimenti transitu, insigni totius corporis atrophîâ contabescunt infantiuli, accedente simul ut plurimum alvo laxiore: vid. Sylvius *Prax.* l. 1. c. 14. §. 56. p. 168. *item Prax.* Barbette. l. 3. c. 2. *obs.* 3. & *Anat. Pract.* l. 1. c. 14. Hæferus *Herc. Med.* l. 7. p. 349. Sydenham *de Febr.* p. 89. Ut taceam hoc loco dyscrasiam lactis alieni, nempe nutricis, vel inepti pro nutrimento infantis, vel vitiati, unde ibi atrophia, hic cachexia supervenit. Quod si minus viscidus, crudus tamen & vitioso acore, vel saltem acrisalfo sapore inquinatus distribuitur tandem, pro sanguine augmentando & corpore nutriendo, necessario depravatur exinde Mæ. S. Crasis, vitiatumque insigniter sanguificatio, & oritur p. n. ejus effervescencia, unde febres variæ, in specie lentæ, sub vesperam præcipuè exacerbantes, superveniunt. Inquinatur hinc necessario etiam lymphæ latex nimio acore nimiaque acrimoniâ, simulque subinde nimis viscida redditur, unde & circa glandulas tumores, & catarrhales affectus infantibus superveniunt, in specie tusses siccæ nocturnæ, ex lymphæ talis acido acris ad laryngem effusione; item per membranam pituitariam inferiorem transfusione oriunda. Obrunditur econtrâ bilis Θ vol. oleos. seu balsamicum, unde perfectio digestionis primæ in intestinis deficit ultima, & ita magis magisque propullulantes jam confirmantur ægritudines. Quod si cum tali plus minus intensâ sanguinis & lymphæ labæ nutrimentum exinde pro augmentandis & sustentandis partibus confectum, has ipsas subintret, & per earum porulos distribuatur, nullo modo perfecte ipsis assimilari potest, quin potius acore, antea quidem apparenter occultato, & aliquali simul visciditate ipsis inimicâ, hinc inde in pustulas congeratur, in quibus acor denuò manifestatus cum vicino rore partium acius effervescit; hinc altior tumor, intensior rubor & ardor supervenit, donec mutuâ temperaturâ nunc in pus, nunc in saniem, nunc aliud simile liquamen abeant, & per cuticulam prius in squamulas & furfures erosam exeant, relicto adhuc post se fermento subtili, acido viscido, corrumpente ulterius novum, inculpatæ etiam notæ, alimentum, istud-

istudque in similes sordes transmutante, serpente ita successivè ipso malo ulterius, & inquinante & excedente acore suo proximam adjacentem partis substantiam, ut in favis, tinea, crustaque lactea, item furunculis infantum, obvium. Quæ omnia eò facilius eveniunt, eòque pertinaciores radices figunt, quo minus transpirabiles sunt partes ita affectæ, & quo magis poris earum clausis, dicta excernenda successivè congeruntur.

Crustæ
lactææ
origo.

§. 26. Facta modò lymphæ p. n. acidæ, item crustæ lactææ, mentio, uberiolem sui explicationem urgent. Siquidem dictas corporis, & imprimis faciei & capitis, defædationes pustulosas crustosas, ulcerosas, quæ crustæ lactææ, achorum & tineæ nomine venire solent, quarum descriptiones & differentias saltem accidentales vide sis apud Practicos, reverà ex lymphæ nimis, seu p. n. acidæ plus minus simul viscidæ, vitio originem ducere arbitror, lacte vel matris sub gestatione fœtus, vel nutricis sub ejus Lactatione vitioso, causæ remotæ vices obtinente. Semper enim ferè cum hisce defectibus glandularum in collo & circa caput densè consitarum, item porotidum, &c. tumores conjuncti esse solent, ita quidem, ut vel præcedant, vel simul affligant, vel dictos affectus declinantes subsequantur. Rarissimè hoc posterius observatur, & vel metum recidivæ, vel mutationem defædationis dictæ in alium affectum p. n. secum trahit: Istud prius frequentissimè accidit, ita ut mulierculæ etiam per experientiam edoctæ, ex conditione dictorum tumorum, quasi scrofulosorum, & quos ordinariè **Haupt-Drüsen** appellare solent, affectuum talium diuturnitatem, vel magnitudinem, aliasvè circumstantias probabiliter prælagire soleant. Certè observavi, tumores tales glandularum ad parvi ovi gallinacii magnitudinem in collo, mox infra aurem protuberassè, cum crusta lactea caput obducens evanuisset, quo tumore successivè subsidente, & tandem dicta lactumina denuo efflorescebant. Non amplius enim dubitatur, glandularum functiones versari circa lymphæ præparationem & distributionem, unde sponte patescit lymphæ vitium primum subessè, ita quidem, ut ejus consistentiâ materiali obstru-

antur glandulæ, & inde consequenter intumescant; ejus vero aciditate, ob largiorem in partes intercutaneas capitis extimas effusionem, ex denegata plus minus debita distributione & motu per glandulas, pruritus intensissimus in dictis locis, cum pustulis rubris successivè in pus abeuntibus, & squamis insequentibus ac furfuribus, ex cutis & cuticulæ erosionibus superveniant: quæ omnia, pruritus, purulenta sanies, crustæ & squamæ, de aciditate agente causæ peccantis manifesta sunt indicia, ut alio loco & ab aliis probatum est. Ut taceam, asperiora facta hæc mala ad cranium usque penetrare, istudque erodere pro more acidorum, osseas substantias facile erodentium, de quo vid. Sennertus *lib. de Morb. Infant. P. 2. c. 3. p. 28.* Unde & capitis partes extimæ præ reliquis locis dictis infestantur malis, ob copiosiores glandulas, quibus hinc inde speciatim collum stipatum est. Differentia autem has inter capitis defædationes observatur, quatenus nunc acrior & acidior eadem fuerit, unde ulcuscula manantia, & copiosam acrem saniem fundentia, emergunt, vel quatenus eadem minus acris, sed ferè magis temperata & viscida extiterit; sic enim crustæ densiores, & densè subinde compactæ, & sibi invicem superstratæ, generantur, successivè decidentes: imò etiam pro lymphæ ita peccantis ratione varia glandularum quoque observatur constitutio, de quo uberior experientia adhuc consulenda venit. Et sanè non levis est cognatio talium lactuminum cum adultorum scabie, cum & subinde contagiosa deprehendantur, & iisdem remediis, in specie nicotiana, sulphure, &c. curari soleant, & retropulsâ, ut vocant, paria planè inferant symptomata; ita ut quasi particularis capitis sit scabies. Equidem vulgi fert persuasio salubres esse infantibus tales defædationes, quatenus præservent eos à gravioribus; quod negari suo modo nequit, quatenus sunt bonum quidem signum, sed malæ causæ, quæ si abesset, magis conducere. Quæ hætenus sunt exposita, videtur confirmare, quem observavi, puerulus, 9. mensium præter propter vitio nutricis cacochymico-scorbuticæ insigniter, dictâ crustâ lacteâ super cranii hemisphærium, & faciem ferè inte-

[Yyy 2]

gram

Tom. II. Pars 2.

gram mirè deformatus: quæ cum spontè evanisset, successit gravissima tussis, tenellum pectus insigniter & continuò quatiens, cum copiosi muci in stomacho & Oesophago præsentia, unà cum diarrhœa serosa, adeò acri, ut etiam extrema podicis & vicina loca excoriarentur: totum corpusculum insigni æstu fervebat, & insultus quidam epileptici, subinde istud convellebant. Factam fuisse hic arbitror lymphæ peccantis metastasin, præter alia loca in specie ad glandulas salivales, & quæ laryngem irrorant, ut & ad pancreaticas, per quas lymphæ ista acida acris, non adeo viscida, uberius effusa, speciatim dictam tussim & diarrhœam, alia ut transcant symptomata, induxerunt. Dicta modò etiam rationem aurium humiditatis fluentis, excoriationis & exulcerationis, item labiorum, manifestam reddunt.

Quæ Variolarum radicata origo.

§. 27. Hæc ipsa vel manu nos ducunt ad evolvendam morbillorum, & in specie Variolarum, abstrusam aliàs naturam, cum harum, qua talium, fiendi modus & effectus cum modò dictis affectibus in quamplurimis conspirent, & etiam Tinea Capitis non rarò post variolas superesse, aut etiam easdem insequi soleat. Torquet imprimis Philiatros inevitabilis ferè harum insultus omnibus Europæis, ne dicam de aliis quibusdam nationibus. Ex menstrui sanguinis reliquiis multi cum Arabibus earum radicem derivant, alii ex repetita post semel factam conceptionem & a libidine: neutrum mihi satisfacere videtur. Quin potius sic certò statuendum est, quod aliquod nobis quasi implantatum habeant principium, ratione cuius nemo ferè easdem effugere queat, earum radicem ex corruptelâ lactis nutritivi, tam in, quàm extra uterum, & vitioso viscido acore tenellos inde inquinante derivarem; exinde enim & frequentissimè saltem infantes & pueros, rarissimè demum adultos, affligere solent. Qui vitiosus acor aliquandiu occultatus, tandem occasione datâ, in specie excitata M. S. per fermentum simile extrinsecus inspiratum vel haustum, perniciosas febriles effervescantias excitat, concurrente acido fermentativo viscido cum Θ e vol. massæ sanguinæ, donec præcipitato & subjugato acido isto vitioso, & sero involuto, critica sanguinis purgatio-

ne hinc inde per vasa capillaria, in specie beneficio glandularum intercutanearum miliarium, excernatur, & sub cuticulâ harendo successivè in pustulas coacervetur, quarum contentus falso-acidus succus effervescendo ulteriùs mitescat, donec in pus perfectum abeat, quod cum cuticula crofa tandem in crustam duram & crassam condenseretur, erodente interea sub hac ipsa acido cutim subjectam in foveas plus minus, prout magis vel minus effervescencia febrili temperatum fuerit. Unde & ulcera subinde perniciosâ & cacoethica ex variolarum pustulis, tam in partibus externis quam internis, in specie in tenera vesiculosa pulmonum substantia oboriuntur, pro conditione acidi plus minus virulenti varia, quod ipsum in dictis Variolis ossa non rarò arrodere & corrumpere assolet, id quod expertus testatur Paræus de Variol. cap. 1. Hinc etiam Liberi à parentibus, morbo Gallico laborantibus, prognati, omnium gravissimè à Variolis affici solent, observante hoc Hørstio l. 6. Obs. append. p. m. 308. quod non ineptè illustrat & dulcis, ceu singulare alexipharmacum curans pariter & præservans Variolas: confer Miscell. Acad. N. C. anni 3. Obs. 9. & 56. Ob id & convulsivi motus & epilepsiæ insultus præcedunt earum eruptionem, morsicante acido vitioso nervos, & ad crispaturas eorum fibras, & hinc inordinatos ac impetuosos motus spiritus animales irritante. Unde & myrrha, acidum istud vitiosum mirè temperans, non minus quam castoreum, & Θ ia Volatilia istud per sudorem eliminans, & δ fix. ebur. f. Δ Unicornu fossile istud absorbens, pro harum medelâ utramque faciunt paginam. Non rejicio hoc ipso vermiculorum exercitum, in singulis pustulis acervatim grassantem, vid. Borellus Centur. 2. Observ. 72. & Observ. microscop. 31. p. 21. item Lipsius de Variol. Bartolin. Centur. 5. Hist. 20. Rhodius Cent. 3. Observ. 46. cum nullum pus absque horum pullulante segete reperiatur, sed hos tanquam effectus, spontè ex ordine causarum morborum in pure supervenientes, transmittito.

§. 28. Nec scrupulum injiciat, Quare Variolæ interdum tam tarde se ostendunt. aut tardior in quibusdam earum insultus, aut repetitus etiam accessus. Nam diutiùs morbosa fermenta in corpore.

corpore delitescere possunt, donec sub suâ dierum maturitate tandem evigilent, id quod ex hæreditariis non tantum affectibus, sed etiam ex Canis rabidi salivali fermento, ex febrium petechialium ad aliquot hebdomadas interdum latente contagio, ex Luis ææ connivente diutius seminio, patet, &c. Unde & infantes, qui sub nutritione sani erant & vegeti, post ablactationem subinde cutanea contrahunt vitia, achores & similia, dum vitia lactis per consuetudinem sub lactatione quasi appropriata naturæ citra nocumentum adsunt, quæ mutata diætâ per effervescentiæ motum in musteo sanguine separata, & instar fecum præcipitatâ, hinc inde per sanguinis circulum sub cute defiguntur, & ibidem coacervata suas morbosas ludunt Tragœdias, redeunt subinde pertinaciter, quamdiu tantillum miasmatis morbosî aut semini fermentativi, nunc sub sanguinis velamento, nunc sub epidermidis Tegumento, latuerit, quod ex materiâ conveniente datâ occasione se multiplicat, & malum renovat: quæ ipsa de variolis & morbillis pariter asserenda videntur.

Unde
Aplithæ.

§. 29. Ita quidem se habent exulcerationes partium externarum: sed præter has etiam interiores quædam, speciatim partes oris, fauces, palatum, lingua, ipseque non rarò Oesophagus, ulcusculis parvis scatet, aphthæ appellatis. Harum origo est acre acidum, excorians & exulcerans plus minus dictarum partium superficiem. Fons peccantis acidi potissimum est in stomacho corruptela lactis & pultis, nimiaque ejus acescentia. Ut enim aut lactis nutricis aut salivæ ipsius infantis à quibusdam nimia acusetur acrimonia, vix tamen in infantibus aliam originem agnoscunt, quàm acorem vitiosum ex stomacho exhalantem. Nam & in adultis frequenter contingere solet, ut correpti febribus, cruditatibus recrementosis in specie porraceis in stomacho existentibus, aphthis molestè laborent, nisi maturè fomes removeatur à Medico ex Ventriculo.

Pavores
infantum
& epilepsia unde.

§. 30. Superest funestum adhuc tenellis symptoma, nempe pavor in somno, oriundus ex explosivo ferè impetu spirituum animalium in nervos; qui cum sub somni requie blando tardoque gressu influere debeant, impetuosius irruentes inopinam to-

tius corpusculi ex fibrillarum nervearum momentaneo contractivo nisu inferunt concussionem, adeò ut non ineptè mulierculis prodromi habeantur convulsionum epilepticarum, infantibus admodum familiarium, ex simili inordinato & perverso spirituum animalium motu in cerebro, & violentâ explosione in nervos oriundarum. Frequentissimâ v. paris vagi & intercostalis ramificationibus annexæ partes abdominis & thoracis convulsionibus hujusmodi epilepticis præ cæteris partibus tentantur admodum torminosis, quas mulierculæ convenienter admodum, **die schwere Noth im Leibe** / appellare solent. Scilicet continuus & nunquam interruptus spirituum animalium in hos nervos est motus & influxus, pro continuando motu Cordis, diaphragmatis & respirationi interservientium musculorum primariorum, ut & Ventriculi & intestinorum motu peristaltico perficiendo, unde consueto quasi tramite longè promptius irruunt in dictarum partium nervos spiritus animales, quàm in membra externa in infantibus magis quieta, adeòque dictos spasmos internos frequentius concitant. Quod si verò crebrius repetant, tandem totum spirituum animalium exercitum integrumque nervorum systema, per consensum & continuitatem motus similiter afficiunt, unde universalis tandem supervenit Epilepsia, de quâ dicunt **die schwere Noth bricht aus**. Has & similes passionones, post nervosarum sensilium fibrarum quocunque in loco irritationem consequentes, unde melius deducemus, quam ex supra sæpius insinuato acido, per se nervis inimicissimo, multo magis in tenellis, quorum fibrarum nervearum mollior textura facillimè mobilis, & ita in convulsivos motus erupabilis, ut sic dicam, existit. Hinc quæ propiores sunt partes fonti vitiosi acidi, stomacho nempe & intestinis, aut mediantibus nervis connectuntur iisdem, etiam frequentius patiuntur convulsivos spasmos, qui continuati ulterius in tantum, donec totum nervorum systema in cerebri cerebellique continnis concutiant, universalem tandem epilepsiam superveniente spirituum impetu interant; uti in adultis subinde in membro quodam externo, focus latet epilepticus, qui per continuatos


nuatos spasmos, sub apparente auræ frigida sensu sursum delatus ad cerebrum, tandem universum microcosmum concutit, ita pari ratione ex acido, imprimis viscido in abdomine hærente, tam spasmi leviores interni, quam epileptici totius corpusculi insultus oriuntur, optimè ob id per alcalia, experientia teste, curabiles. Adeo, ut rarissimam infantum existimem epilepsiam, cujus focus acidus non in abdomine lateat, aut ex abdomine non derivetur, excepto dentitionis negotio, ita tamen, ut citra halituum aut fumorum impossibilem ascensum malum dicto modo explicari queat. Pro quorum confirmatione, quod nempe infantum nocturni pavores & epileptici insultus ab acido peccante excitentur, annotasse sufficiat: 1. quod graviora tormina cum excretis æruginosis frequenter comitem asciscant epilepsiam, teste, præter Quercetanum in *Tetr. graviss. c. affect. c. XI. p. m. 116*. Lindano super *Hartm. Prax. chym.* qui vix virorem æruginis instar intentum in infantum excretis observari asserit, citra epilepsiam: quod si dicta materia ita sit acris, ut febris etiam accedat, plerumque interimit pueros, tormina verò & talia excreta, ex acido lactis corrupto superius derivavimus. 2. Hippocrates *lib. de Morb. sacro* asserit: infantes, si ipsis ulcera in capitibus, vel circa aures, vel in reliquo corpore excitentur, liberari ab epilepsia: vid. Sennertus *de Morb. Inf. P. 2. cap. 3. pag. 28*. quas exulcerationes etiam ex acido lymphæ supradeduximus; quibus 3. accedit cura Epilepsiæ infantilis per alcalia volatilia, item per Terrea, acidum absorbentia.

Dentitio
difficilis.

§. 31. Modo insinuaturn fuit, Epilepsiam & Dentitionem subinde comitari: hujus ergò dentitionis negotium, & symptomata ejus occasione excitata, hic evolvenda erunt. Equidem nil aliud, præterquam gingivarum à dente accrescente perforandarum dolor primariò urget, similis quodammodò illi, dum acido morbofo gingivæ in dentium radicibus punguntur, & quasi perforantur. Sed cum sensilis gingivarum, ex interspersis variis nervulis substantia, cum partibus vicinis insignem consensum habere soleat, quod ex odontalgia adultorum, subinde dimidiam

Capitis sphæram per consensum afficiente, interdum muscoli temporalis aliquem spasmum inferente, notissimū est, de facili evenit, ut atrocioribus sub doloribus tandem universum ferè nervorum systema simul vellicetur, & inde convulsiones epilepticæ superveniant: idque eò promptius, quò vel per se & in seipso nervorum systema infantum tenerius & mobilius extiterit, vel ipsum ex perversâ diætâ matris vel nutricis, acidis abutentibus, de quò suprâ, in primis suis staminibus debilius & facilius irritabilius redditum vel ex lymphâ vitiosâ commota hinc inde irritatum fuerit. Cum verò ex dolore gingivarum, vicina glandularum, præprimis salivarium, vasa & illas integentes membranæ vellicari soleant simul, hoc ipso uberior salivæ in os effusio, indeque effluxus, quod vocant *das Geiffen*/ ordinariò comitari, interdum aliquandiu præcedere, dentitionem molestiorem solet. Quæ lymphæ si & ipsa minus temperata, sed falso-acida plus minus fuerit, præter rosionem faucium & laryngis, indeque excitatam tussim subinde siccam seu inanem, ad stomachum copiosior delata, anorexias, nunc apêpsias, interdum vomitus cum tussi ferina, aut certè in intestinis diarrhœam plus minus serosam excitabit, vel nervosum genus hinc inde vellendo ad epilepsiam disponet: qualia scil. symptomata ordinariò præter vigiliis, inquietudines, ejulatum, febrilem æstum, dentium eruptionem comitari solent.

§. 32. Restant adhuc febres, utur ^{Febres.} lentarum *jam supra* §. 25. rationem deduxerimus, non minus quam variolarum & morbillorum §. 27. similiumque cum exanthematis se exhibentium. Cæterum præter has & aliæ febres variæ, aut continuas ardentibus similes, aut periodicæ continuæ, aut catarrhales, similesve frequentes sunt infantibus, quarum rationem omnem ex corruptione lactis internâ, aut ex pororum cutis occlusionem externa, optimè explicabim⁹. Præter acidam enim cruditatem, quam puls & lac in stomacho infantuli subeunt, & unde ejus febres frequentissimè, nunc lentæ nunc acutæ scaturiunt, etiam variæ aliæ omninò lactis sunt depravationes, *jam supra* §. 19. insinuatæ, sive in ventriculo sub digestionem, sive in intestinis sub hujus digestionis perfectio-



fectione & facum separatione, obveniant. In specie cruditas nidorosa appellatur, dum flava copiosa ejiciuntur à tenellis; id quod neutiquam tali in casu bilis tingentis est opificium. Unde enim tanta in foetu juniore bilis abundantia? nisi infantulos ferè omnes primo sui initio biliosiores Viris ipsis dicere velis? neque amarescunt semper hæc ipsa, sed dulcescunt potius subinde, & avidè à canibus, amari omnisosoribus, comeduntur. Lac potius vitiatà quacunque ratione digestionem ventriculi spontè de facili citrinescere, sufficienter declarat Helmontius *Tr. schol. Pass. Decept. c. 3.* adeò ut hujusmodi digestionis primæ multiplicia errata ex alimentis, & hinc affectibus nutricis, primariò oriunda, cum non corrigi possint in secunda digestionem, necessariò sanguineam crasin in tantum alterabunt, ut hujus p. n. effervescentiæ febriles variæ inevitabiliter superveniant: id quod pariter in quibuslibet infantum, etiam ablactatorum, febribus, tam lentis quàm acutis, observandum venit, quæ omnes ferè pro causâ interna errata digestionis primæ in Ventriculo & intestinis, propter ordinariam eorum addiphagiam, agnoscunt. Et quidem eò citius ex enarratis occasionibus febris accenduntur, quo minùs per cutis cribrum insensibiliter putrificatur sanguis: id quod vel defectus caloris ambientis, vel crebra linteaminum non sufficienter calefactorum mutatio, vel denique balneorum neglectus usus inducit. Calidi sanè balnei lotio, ut sordes cutaneas infantis copiosas abstergit & removet, ita & fibras retis Cutanei laxando, pororum apertioni, & copiosiori transpirationi amplam occasionem suggerit, cujus intermissio & poros constipat, & ex heterogeneorum coacervatorum impetu, hujus febrili fermentationi uberrimam occasionem suggerit.

Comedonum origo.

§. 33. Facta superius mentio vermiculorum in purulentis Variolarum pustulis, atrophia quoque superius considerata, deducunt nos ad considerationem Vermiculorum Capillarium infantum, quatenus hi ipsi atrophiam simul junctam semper habere solent. Proprio nomine Comedones, ab adjuncta infantis Tabe, quasi nutrimentum comedendo largiùs absumant; item Crinones, à figura, quod

Crinium seu Pilorum curtorum nigrorum formâ foràs interdum prominere per poros Cutis soleant, appellantur; Germanis, *die Mit-Esser/ die Zehr Würme*. Differunt à Sironibus, vermiculis minutis quasi pedicularibus in pustulis prurientibus, sub cuticulâ manuum inprimis & pedum enatis: de quibus vid. Sennertus *l. 5. Prax. P. 1. c. 24. p. 118.* Langius *l. 2. Epist. 42.* Gœdartius *Metamorphos. P. 1. p. 126.* sicuti & Sironum & Crinonum formæ per Microscopium consideratæ, differentes planè deprehenduntur. Sunt ergò dicti Crinones vermiculi Capillorum spissorum seu setarum formâ curtarum, nudo oculo aspicienti se exhibentes, quando nempe mellis affricti dulcedine allecti in loco calido foras prorumpere nonnihil, frigoris verò ipsis inimici sensu denuò intrò repere observantur. Accuratè magis per microscopii adjumentum iidem observari possunt; sic enim Coloris cinerei, cornubus seu potius antennis binis longè prominentibus instructi, oculis rotundis grandiusculis, caudâ oblongâ in fine villosa, uno nomine aspectu horridi, observari solent, prout ab amico curioso & artificioso, nempe Domino Christiano Schæffero, Sereniss. Duc. Saxon. Mauritii Apelle Aulico dexterrimè, non secus ac alia minutissima insectula, in specie sirones, item Termites seu potius lendescaeorum &c. hacce sub formâ accuratè, per microscopium observati & delineati fuerunt: ubi a. quantitatem & figuram eorum exhibet, prout nudo oculo occurrere solent: b. ostendit Crinonem integrum per Microscopium accuratè observatum, & ab ipso observatore dextre delineatum: c. est similis Crino, sed cui sub separatione à Cuticulâ corporis, cauda truncata fuit: d. item Crino est alius, sed majorem sub sui à cuticulâ separatione noxam passus, &c. Nam non tantum propter morositatem puerorum, difficulter separari possunt, sed ob exilitatem etiam ac tenebrositatem vix integri obtineri, quin facillimo attritu vitientur. Occupare magis loca musculosa, inprimis dorfi, hinc scapularum, humeri, it. surarum & crurum sub cuticula assolent. Infantes inprimis teneriores, minus robustiores affligere solent. Originem iis subministrat suppressa insensibilis

bilis transpiratio, ut rectè id suspicatur Horstius *l. 4. Observ. 53. pag. 254.* quæ temperata si fuerit, minusque aeris, dulcis & pinguis, retenta diutius ad putredinem ruit, unde occulta antea & oppressa penitus principia seminalia, quæ & minimo seu, ut vocant, in atomo sensibus imperceptibili latere possunt, sui juris facta, destinationes naturales exequuntur, & in viva animalcula prouunt. Vid. Velschius *Dissert. de Vermic. Capill. Inf. pag. 336. annexa Tr. de Vena Medinensi.* item Borellus *Lib. 1. Observat. 80. & Sennertus l. 2. Prax. P. 2. cap. 24. pag. 302.* Nempè in Lacte, ratione alimentorum ex quibus generatur, non secus ac in pulte, milleformia insectulorum & vermiculorum latent semina, quæ in tenello infantis stomacho, non adeò exactè alterata, facilè data occasione evigilare, & in actum secundum erumpere valent: hinc & quidam Crinones hos, illis vermiculis seu ascaridibus similes asserere volunt, qui in antiquis caseis innasci observantur. Hi ipsi Crinones animati molestiam admodum prurientem & continuo laceissentem plus minus tamen, sub cuticulâ admodum sensili excitant, indeque inquietos, ejulantes, & vigiles reddunt infantes, quibus utut sapius porrigant mammas nutrices, quas etiam exhausti, tamen inquietudine, vigiliis, ploratu confecti, minus dictum alimentum concoquere aut ritè assimilare possunt, donec emacientur tandem, & ita successivè in Tabem prouant: ut ob id existimem, non tam ratione nutrimenti, à vermibus exhausti, quam ratione symptomatum ab istis inductorum, maciem & tabem consecutivè supervenire.

Intertriginis ortus.

§. 34. Intertrigo denique acerbodolore excruciat infantes, peccante in specie Urinâ, cujus continuâ humectatione, & hinc salina acrimoniâ tenerrima epidermis emolliiri & relaxari, & pedetentim penitus erosa separari solet, in locis præsertim inter femora & circa clunes sitis. Excoriationem istam, ulterius si processerit, læsarum partium gravis exulceratio, etiam ad mortificationem partis subinde tendens, subsequitur, aliaque pathemata pro partium diversitate subinde variantia. Præter Urinam & insensibilis transpiratio, aut sensilis transsudatio, in locis impeditis, nomina-

tim in articularum flexuris & sub axillis, modò dicti mali autor esse solet: in multis nempè sudor & Urina conveniunt, adeoque affectuum identitatem comitem secum trahere solent.

CAPUT III

Præservationem & Curationem Morborum Infantium docet.

§. I.

Cum tanta mala teneros circumdant infantes perversæ nutritionis causâ, maturè iis occurrendum; periculum namque est, ne tam malè stabilitis primis sanitatis fundamentis, in posterum omnis ærumnosè trahatur ætas. Quatuor Universalioribus ut occurramus causis, pro meconii purgamento nil æquè convenit, ac Colostrum infanti propinatum, ut *supra §. 10.* monitum. *Alimentum namque est medicamentosum, quod Natura cum in finem generavit, ut modicè nutriendo, leviter pro infantis imbecillitate purget per aliquot dies,* ut rectè asserit Spiegelius *Tr. de format. fæt. c. 3. p. 17.* Quod si fieri nequeat, studiosè in id incumbendum, ut pharmacis nihilominus evacuentur dictæ sordes. In hunc finem propinare solent recens natis Ol. amygdal. dulc. recens expressum c. saccharo albiß. quorum ope lubricatis & absterfis stomacho & intestinis, copiosæ impuritates, gestationis tempore collectæ, ejiciuntur, interdum & vomitu auspiciatò eliminantur; utut soli huic Oleo non fidendum sit, cum vel rancescendo facillimè, infanti propinatum, non leve incommodum in primis viis inferat, vel non rancidum licet, vix tamen omnia tam exactè eliminet, quin subinde aliquid sordium remaneat. Alii in usu positum habent mellis rosati solutivi tantillum propinare, feliciori sanè cum successu. Mihi convenientissimum semper visum & usu compertum fuit, si *pulpa pasfular. minor.* cum *ana syrupi de cichor. rhabarb.* mista, addito pauxillo *pulv. coral. rubr. præp. & Ocul. & præpar.* ana horum \mathfrak{z} i. \mathfrak{z} ß. ad illorum \mathfrak{z} ß. addendo, cum parvo cochleari leniter infundatur. Optatò sic rejiciuntur omnia excrementa, tam per inferiora, quam & interdum per superiora, & vitiosa meconii aliarum-

Ut meconium removeadum.

rumque sordium acescentia, futuro lactis suctui perquam nociva, optimè simul sic coercetur. Denique Syrupus de spina cervina s. domesticus est convenientissimum abstergens omnium sordium, & lavans infantum, speciatim si loco sacchari cum melle per se depurato sub insolatione confectus fuerit, vix unquam fallens, & sine ullo incommodo evacuans, inprimis c. pulv. Ocul. ☉ si subactus fuerit.

Insensibilis
transpira-
tio ut pro-
movenda.

§. 2. Ut verò insensibilis promoveatur transpiratio, ceu alter fons morborum infantilium, auspiciato solent mulierculæ recens natos infantulos immergere balneo aquæ dulcis tepido, s. subcalido, non, quia sperrimus & sanæ reluctans erat veterum Germanorum mos, V. Sennertus *l. de Morb. Infant. Part. 1. cap. 4.* ▽ frigida aut flumini, ut hujus medio abluantur sordes viscosæ, lanuginis instar investientes teneram epidermidem, & accedente blandâ frictione ita aperiantur & magis patuli reddantur conniventes aliâs cutis pori. Non ineptum est, quod in more positum, ut saponis adjumento removeatur hæc sordium coacervatio, & hujus alcalinâ lixiviali acrimoniâ, promptius detergentur ista caseosa quasi concrementa extracutanea, sicuti si reiterantur crebrius hæc balnea, postmodum ipsi ▽æ, quâ abluantur, modicum lixivii addere non inconsultum videtur, ut eò melius tam resolvantur & detergentur dictæ sordes, quàm hujus alcalini ☉is beneficio præcaveantur maturè cutaneæ infantum efflorescentiæ, ceu quas jam enatas optimè tollunt talia alcalia, ut infra monebitur. Reiteranda autem sæpius est hæc balneatio, quoties sanitatis, & in specie Virium, permittit ratio, idque in primâ septimanâ quotidie, reliquis alternis aut tertiis diebus, donec exactè purificatus, glaber, mollis, rubicundus, & ubique nitidus appareat fœtus. Non rarum est, flavedine quodammodo crocæ, adeoque lœteritiâ decoloratione, tinctos in lucem prodire infantes, quæ extraordinaria Tinctura vix meliùs quam dictis Balneis detergi penitus & deleri poterit: quibus ab aliis simul succurri solet gr. j. croci optimè triti, in lacte nutricis vel alio conveniente liquore exhibiti, & aliquoties in die propinati, quo ipso dicta cutis defœdatio promptius extingui potest.

§. 3. Lactis denique & Lactationis
Tom. II. Pars 2.

pernitiosa errata ex iis, quæ *supra* Quomodo lactis vitio sæ alterationes corrigantur.
§. 7. 9. 10. 11. 13. 14. 15. recensita fuerunt, facillimè quivis corrigere vallet. Ad hoc verò semper habeatur respectus, ut omnis ejus vitiosa acescentia, hincque grumosa coagulatio, ceu familiarissima vitia, quantum possibile, præcaveantur. Commendatissimus ob id nutrici sit anisi & hinc fœniculi usus, sive semina eorum post singulos pastus comedantur, sive posterioris saltem radix, herbaque, quacunque ratione usurpetur: præter lactis enim ubertatem, etiam saluberrimam vim ipsi simul conciliant aromaticâ volat. oleosâ naturâ, & acescentiam ejus præmaturam & coagulationem optimè prohibent, quin & tormina & flatus infantis feliciter tollunt. Caveat simul sedulo nutrix, ne aquæ frigida diutius aut crebrius manus immergat, & statim ab hoc lac infundat; nec enim infans tantum, sed & ipsa nutrix ventris torminibus ex tali occasione sapissimè observatur corripitur. Quod si inopinato terrore concussa vel irâ percita nutrix, lactis graviolem alterationem metuat, postquam lac ex uberibus prius emulserit, assumpto *spermatis Ceti* 3ß. ad 3j. c. ☿ *diaphor.* gr. XV. ad 3j. in haustu cerevisiæ calidæ, ad blandum sudorem se componat, quo omnis lactis corruptela sic emendetur; vel recipiat in tumore, dolore & duritie superveniente, & ita Inflammationis metu, *C. C. f. Δ 3j. ☿ ij diaphor. 3ß. ☉is. vol. viperar.* aut *C. C. gr. viij. M. aut C. C. f. Δ c 3ß. ☉is card. benedict. 3ß.* ad gr. XV. capiat in ▽ *flor. sambuci*, & pro sudorifero resolvente assumat; vel horum loco *spiritum ☉*ci* à 3ß. ad 3j. in ▽ *card. bened.* hauriat, & sudorem plus minus largum expectet; Imponendo simul mammæ, in leviori quidem affectu, Emplastrum de spermate Ceti Myns. in graviore verò inducendo mammæ emplastrum de galbano crocatum Mynsichti cum ana gummi ammoniaci, in ✕ sol. invicem liquefactis, & linteo denso inductis confectus, quàm calidè perferre potest: utroque in casu desuper sacculum interpassatum ex oryza confectum probè percalefactum imponat desuper, ut per sudorifera ista alcalina dissolutum lac horum adjumento promoveatur in motum, & stagnatio ejus ac grumescencia ita corrigantur maturè.

[Z z z]

§. 4.

Quomo-
do puls
emendan-
da.

§. 4. Pultis denique, post Lactis curam, restat correctio, quæ in hoc consistit, ut, omisâ farinâ, loco ejus panis triticeus, vel, ut vocant, similagineus, nonnihil exiccatus vel induratus, minutim tritus, cum lacte vel cum ∇ in pultis coquatur consistentiam mollem, tantillo seminis anisi pulverisato addito. Experientia me hætenus docuit, optimè conducere tenellis tale pulmentum, ubertimque eosdem nutrire; fermentatus enim panis, adeoque facilè resolubilis, promptiusque in stomacho digestibilis, quidni crudæ farinaceæ pastæ præferendus erit? Pauciores status inde elevabuntur, & liquidior mucus post ejus usum restabit, faciliusque longè qui abstergi queat, quam è communi pulte fieri solet. Quibus hætenus dictis ritè observatis, nullum dubium, quin infantes vitam sanam sint conservaturi diutius.

In Cura
morbo-
rum Inf.
 Θ ia vol.
prima-
tum ob-
tineat.

§. 5. Sed quàm facilè hæc imperantur, quæ tantum non impossibilia sunt, ut observentur, idque tam à matre, quàm à nutrice. Si recolentur superius *cap.* 2. dicta, non poterit tam rigorosum regimen institui, quin tandem succus acidus copiosior vel parciior, acidior vel temperatior, viscidior vel serosior, colligatur interdum, unde morbi infantiles plerique successivè propullulant. In genere E. pro horum Curâ remedia talia conveniunt, quæ acidum destruere, viscidum incidere seu attenuare, utrumque pro ratione occasionis evacuare valent; adeoque mox à natiuitate propinanda sunt, & subinde repetenda remedia temperata, his indicationibus satisfacienda. Quæ inter facile patet nil æquè præstare, quàm Θ ia volatilia, in specie oleosa, quæ optimè acidum corrigunt, & cum eo Θ sum tertium blandum componunt, diureticum pariter & diaphoreticum, prætereaque penetrando potentissimè attenuant & resolvunt quascunque obvias visciditates. Unde spiritus Θ *ci, inprimis cum aromaticis destillatus, sicque factus oleosus, item spiritus Θ * anis. aut caryophyllatus, & quem mille encomiis extollo pro curandis infantibus liquor C. C. succinatus, à B. D. Michaelis primitus in usum vocatus, & hætenus mille experimentis multis in casibus, adultorum pariter ac juniorum utriusque sexus, comprobatus, pro infantibus

curandis sunt optimi. Paratur modò laudatus liquor ex spiritu C. C. probè rectificato, & ab oleo empyreumatico depurato, qui affunditur Θ i vol. C. C. & Θ i vol. succini (ab omni oleositate empyreumaticâ crebrioribus c. aq. & S. V. solutionibus, & inde ∇ ationibus purificato) ana q. s. ut imbibat & solvat intimè dicta Θ ia, quæ mistura nunc effervescat primitus, cum succini Θ vol. acidum suavissimum, admodumque delicatum, conjunctum habeat, brevi tamen amicè coeunt, & digestionem debitâ ac cohabitatione reiteratâ liquorem hunc commendatissimum constituent. Nec est, quod generosa nimis, nimisque graduata putes Θ ia vol. pro infantibus; nam circumspèctus usus in Lacte nutricis, vel in Aq. & syrupo menthæ, fœniculi, &c. & limitata ad guttulas saltim dosis, tenellis pariter ac paulò robustioribus infantibus eadem optimè accommodare novit. Miratus sum sæpius, à quibusdam vel præconceptis opinionibus excæcatis, vel experientiâ debita destitutis Medicis, cum pavore quasi audiri Θ ium vol. mentionem, speciatim pro infantum cura, cum tamen sub legitimo & circumspècto usu Deorum manus eadem vocanda existimem. Volatilibus hisce alcalibus & fixa per spiritum Vini temperata in solutiones tinctas etiam subjungenda erunt, inprimis Tinctura tartari, & Tinctura scoriarum Reguli \S ij.

§. 6. Præter alia hæc volatilia, Deinde
acriora vel aromatica, etiam alia sub-
jecta aromatica oleosa, suo Θ c vol. oleosa.
non destituta, in genere infantibus ægris fructuosa sunt: quæ inter anisum & ejus semen mirè convenit, quod ad \S j. pulv. recens quoque pro levi evacuante commendat Heurnius *Method. ad Prax. lib. 2. cap. 26.* Juxta hæc Castoreum benedicta etiam est medicina, temperans mirè acidum austerum, & convulsivos spasmos quoscunque, torminosaque inde pathemata, optimè sistens. Quibus meritò annumeratur myrrha, omnem corruptivum acorem tollens, & balsamicâ vi quamcunque corruptionem putredinalem inhibens, indeque ad vitam longam ab Helmontio commendata, *Tr. Arcan. Paracels. p. 626.* Paracelsus ipse in Consil. Sterzingensibus commune ceu optimum pestis præservans, myrrham,

rhām, junioribus & infantibus commendat: Tinct. E. salutis Beat. D. Langii, ex myrrhā c. Spiritu Vini tartarificato extracta (loco cujus & Spiritus Θ*ci cum Spiritu Vini paratus pro menstruo capi potest) salutare erit pueris remedium, corrigens acidum, & resolvens viscidum. Facit huc etiam elixyr proprietatis absque acido paratum per alcalia; vel fixa, ut Θ tartari, vel volat. cum spiritu Θ*ci; hoc ipsum enim iis, qui adhuc lactis gaudent nutrimento, mirifice conducit; sicut post ablactationem, ad quod cum acido consueto modo vulgò conficitur, tutò concedi potest. Hisce denique suo modo Theriacam & Mithridatiam annumero, quorum non est, ut vel caliditatem vel narcosis opiatam pertimescas, modò à gr. dimid. ad gr. j. vel ij. pro ratione ætatis propines, quæ & acida vitiosa temperent, & inde illatas noxas dolorosas blando sopore fallant.

Denique
fixa &
paulò ter-
restriora.

§. 7. Hisce acida corrigentibus vol. partim Θinis, partim oleosis, adjungenda simul erunt denique concreta quasi terrea, & fixiora paulò, acidum, quod talia rodit, in se absorbentia; qualia sunt oculi ser. & (his vix nobilioris usus) margaritæ præparatæ, Coralia, C. C. tam communi modo, quàm Philosophicè, ut vocant, ustum, ut & Ebur simili modo tractatum, lap. bezoar. animalis, in genere omnes animalium partes ossæ, imprimis marinorum seu aquatiliū, & dentes; quo & Unicornu animale pertinet, item dens Hippopotami, & similia, ex quibus etiam pulvis marchionis compositus esse solet, ad tormina & epilepsiam infantum mulierculis decantatissimus; loco cujus feliciter usurpari potest sequens:

Rx. Ocul. ser. præp. ʒß.
C. C. f. Δe. ʒi.
Coral. rubr. præp. ʒß.
Myrrhæ cl. gr. vj. l. jx.
Theriac. gr. jv.
So destillat. anisi gutt. vj.

M. f. Pulvis pro puerorum affectibus quamplurimis convenientissimus:

Qui si acuatur aliquot granis Θ vol. C. C. vel cranii hum. vel viperar. erit usu ejus longè salubrior, magisque præsentaneus.

Quomodo
pur-
gandi in-
fantes.

§. 8. Temperatus ita partim, partim resolutus succu acidus, necesse

Tom. II. Pars 2.

interdum est, ut eliminetur foras, idque per alvum, imprimis obstetricante naturæ defectibus arte. Optatam operam huc ferunt Clysmata, cum Θ tart. similivè lixiviali acuta, quæ mukum in crassioribus intestinis resolvunt, optimeque educunt, & stimulo reliquis intestinulis ita injecto, cetero mucos descendenti vias patentiores reddunt. Parentur saltem ex *Decocti fl. chamomillæ* ʒj. ad ʒjß. vel ʒij. pro ratione ætatis, addendo *mell. rutac.* ʒß. Θ tart. ʒß. ad ʒj. ol. dest. anis. gutt. iij. l. jv. quæ injecta feliciter operantur: Vel loco talium Enematum ex lacte dulci cum terebinthinâ in Vitello ovi dissoluta misto, clysmata sunt admodum egregia, idque ubi dolorosa abdominis simul urgent symptomata: quin & fortius per clysmata, ubi stimulanda alvus, & detergendus mucus non rarò vitreus, etiam talibus ex simplici vegetabili Decocto paratis, pro fortiori acumine addendus est syrupus emeticus à ʒj. ad ʒij. pro ætatis ratione, aut etiam infusum quoddam ʒale, nomine ʒæ benedictæ aliàs cognitum: qualia pertinacioribus in malis, epilepsiam etiam jam minitantibus, quæ ferè semper in infantibus fomitem obtinet in abdomine, convenientissima. Quod si necessitas incumbat, ex lacte farinaque congestum mukum ex superioribus locis potentiùs eliminare, præter ea, quæ *suprà* §. 1. *hujus cap.* laudavimus, (quæ inter syrupus de spinâ Cervinâ vel solum, vel cum syrupo de fumar. mistus, & subinde exhibitus, omnibus palmam præripit) imprimis jalapæ pulvis, cum triplo C. C. usui l. f. Δe mistus, & ad gr. 2. l. 3. & plura, ætatis habitâ ratione propinatus, elegans est laxans, ordinatum à Ludovico *in accurat. Pharmac. Diff. 1. p. 191.* non minùs quàm dimidia l. unica pilula aloëtica ab eodem c. l. præscripta. Habitioribus paulò eadem, mutatâ saltem dosi, conveniunt, non minùs, quàm aliquot grana ʒii dulcis, in specie ubi ablactati fuerint, qui mukum resolvit, & præterea quoque verminationi resistit. Manna quoque Calabrina purior, pulvi addita, & tenellis propinata, quantitate plus minus auctâ, ʒij. ad ʒß. pro scopi vel ætatis ratione, suaviter & blandè eosdem laxare solet. Singulare aliàs pro reserandâ alvo infantum quid obtinet Muscerda, non nisi superflue delicatis

[Zzz 2]

horri-

horrida, cujus minutarum pilularum. j. vel ij. aut iij. pulv. & cum lacte vel pulte potius exhibitæ, ad imitationem Rulandi *Thesaur. l. 3. p. 220.* vel earum viij. aut x. in lacte maceratae, & per linteum leniter expressæ ac propinatae, egregiè laxant infantes. Non me latet, esse qui scammonii usum reliquis præferunt, & ejus aliquot granula in emulsionis formam redacta, admodum commendant, vel si ejus gr. j. aut ij. syrupo de cichorio addantur. Sed hæc vix, præterquam in ablaetatis & robustioribus, locum habent. Horreo esulinam vel tithymalinam scammonii virulentiam, adultis & robustis gravem, & subinde nocivam, tantò minus infantibus tolerabilem. Novi etiam per nutrices quosdam purgare velle infantes; quo pertinet aliquo modo, quando papillis pulvis quidam laxativus inspergitur, de quo Panarolus *Pent. 5. Observat. 10.* sed propter summam incertitudinem doseos; quæ in tali casu ad foetum certò determinari nequit, adeoque ob metum, ne plus debito purgentur tenelli, minus tutum existimo. V. Bartholinus *C. 2. Hist. Anat. 93.* Vomitus si in pusionibus interdum, in specie in asthmatis aut gravioris suffocationis metu, provocandus sit, vel per radicem ireos florentinæ ad gr. aliquot, vel parum syrapi antimonialis emetici, in s. qu. *œ* menthæ aut fœniculi dissoluti, etiam infantibus tutissimi, idque repetitis potius vicibus, quod tutius, quam semel pro unâ dosi, atque periculosius propinati, sufficit, suadente hoc itidem experto Ludovici *c. l. p. 197.* Nam faucium irritatio cum pennâ, oleo intinctâ molestior est, minusque efficax Vomitorium.

Quomodo infantes curandi.

Tormina.

§. 9. Hisce in genere ita prælibatis, facillimè patet specialium morborum infantilium curatio, quam & ipsam, ne aliquid deesse videatur, levi calamo perstringam. Tormina E. quod attinet, cum flatibus, aut viridibus porraceisque aliisvè dejectionibus p. n. conjuncta: non crebrò nimis præbenda est mamma, interea verò cum lacte potius *pulv. Corallior. & ocul. ser. præp.* additâ semper anaticâ portione *pulveris seminis anisi*, aut loco talium *pulv. Marchion.* aut qui præsentanei magis est auxilii, *supra §. 7. præscriptus pulvis*, infundendus; Vel istis acidum

absorbentibus castorei parum addendum, & quacunque ratione fieri potest, propinandum. Theriacæ etiam vel mithridatii pisi vel minoris vel majoris quantitas, sub vesperam exhibita, blandam quietem sopiendo tormina præstat. Sin pertinacius malum fuerit, nectalibus crebrius repetitis quiescat, ita ut jam vel epilepsia metuenda, supra dicti §. 5. spiritus & liquores *Θini* volatiles sacra erunt anchora; vel fiat mistura:

℞. *Syr. de spina cerv.* ʒss.

~ *Θ * ci anis.* ʒss.

Ocul. ser. præp. ʒi. ad ʒss.

Mista diluantur c. pauca *▽ fœniculi*, & ita cochleatim propinentur.

Aurum fulminans magnæ hoc in casu observatur efficaciam, ut non immeritò à quibusdam insigniter extollatur contra tormina Infantum, & pertinacem nimis alvi obstructionem, etiam imminens exinde epilepsiam: datur infanti aliquot dierum, aut etiam unius septimanæ, gr. j. cum gr. iij. *Θ depurati* vel *ʒiati*: datur etiam solum absque addito in iis, qui jam sunt aliquot septimanarum, ad gr. ij. vel iij. propinatur in lacte vel quod melius, in vehiculo *▽ œ destillatæ* idoneo, & præter alios affectus, quos aliquoties admiratus fui, tormina sistit, horridas dejectiones alvi promovendo, & insultus epilepticos sopit. Varietas observatur in ejus operatione: nunc citius, nunc tardius operatur, debilius itidem, aut vehementius, prout, uti suspicor, plus minus in Ventriculo infantis à grumo lactis, vel muco pituitoso irretitur, & quasi inviscatur. Suppetias hisce simul ferant inunctiones externæ, ex oleis destillatis cumini, carvi, anisi, fœniculi, chamomillæ, cortic. aurant. &c. oleo chamomill. per infus. ceu corpore, aut oleo nucistæ expresso, aut oleo stomachali Craton. exceptis, ne illorum destillatorum acrimonia dolorem ex excoriatione inferat, & circa umbilicum inunctis. Quod si tenacior mucus dictorum majorum fuerit autor, exterius specialius unguentum conducet ex *gummi ammoniaco in x. sol. ʒij. terebinth. aloës, à ʒi. sevi Cervini, & butyri non saliti*, q. s. pro consistentiâ debita, ulterius, quoties illiniri debet, oleo d. anisi irrorandum, & ita dictis locis umbilicalibus applicandum, quoties opus fuerit, aliquali portione fellis

fellis tauri acuendum. Cùm verò pathemata hæc insigniter exasperari soleant, alvus si clausa fuerit, ob id studiosissimè proficius clysmatum supra laudatorum usus observandus erit, attendendo sedulò, magisné acrimonia acida, an visciditas causæ peccantis urgeat? ut ita delectus aliquis instituat. Speciatim tenuia & liquida, laticis cujusdam instar plus minus flavedine tincta, utut acerrima, & præter gravia infantum tormina, etiam excoarationem podicis subinde inferentia, observentur excreta; in quo casu Clysmate simplici, ex Lacte bubulo cum paucis saccharo imprægnato, injecto, & dicta acrimonia temperari, & quæ imminet intestinorum crassorum gravis læsio ac excoaratio, tutò præcaveri potest. Recensita hætenus & ipsa, non absque felici successu, in inflatione hypochondriorum, aut tympaniticâ quoque abdominis distensione, in usum revocari possunt. Anisi præ reliquis proficius est usus, sive ejus pulvis cum dimidio Coral. præpar. crebrius infanti propinetur; sive eleosaccharum anisatum, aut spiritus Θ^* ci anis. sedulo ingerantur, & extrâ quoque oleum destill. cumini, anisi, cum oleo chamomill. vulg. calidè hypochondriis illinantur.

Vomitus. §. 10. Quod si Vomitus turbet infantes, isque per essentiam, ut vocant, fuerit, sinendus est, donec vitiosus mucus aut acris latex evacuatus fuerit, & cum moderato lactis usu interius pulv. ex nuce moschata, coral. & caryophyll. paucis propinandus, & subindè repetendus; vel temperatior cinamomi ∇ spirituosa infundenda. Theriaces etiam externus pariter ac internus usus in minutâ dosi non negligendus, idque etiam, si per consensum fuerit: quod si ablactati fuerint infantes, non immeritò Decocti caryophyll. 3ß. & mastiches \mathfrak{D} ij. in Vino commendat Joel. *Prax. l. 9. f. 4. membr. 3. p. 344.* Externè frustulum panis, Vino malvatico ebrium, stomacho imponendum; vel aliquot guttæ ol. destill. macis, ol. nucistæ expresso exceptis, stomachalis regio inungenda. Quod si variegata, multiformia Vomitu rejiciantur recrementa, cùm talia non abique perverso regurgitationis motu ex superioribus intestinis in Ventriculum eveniant, clysmatum modò laudatus usus non negligendus, perversum intestinorum

peristalticum motum irritando inferiora versus corrigens, & ita Vomitus Violentiam cohibens. Sed, ut suprâ monui, non est citò nimis cohibendus vomitus, imprimis quando nausea urget, aut stertor anhelando auditur, quin potius in tussis ex stomacho, præcoeteris tussis speciebus furibunda, difficilique respiratione & asthmatico affectu, studiosè, nisi Tussis & Asthma. sponte superveniat Vomitus, provocandus erit; præsens namque levamen affert. Pro reliquiis autem materiæ acidæ mucilaginosæ resolvendis syrupus de nicotiana legitimè paratus, ut & de crysimo optimè cum ∇ hyssopi vel menthæ propinati, conferunt; non minùs quàm raphani succus recens cum saccharo depurato temperatus, ingratus licèt, efficacissimus tamen est: in cujus locum, mitior quidem, non minùs tamen potens, liquor sacchari ex raphano in taleolas inciso, saccharoque largiter insperso, defluens, commodè sub-Catarrhi. stituitur. Quod si non ex stomacho, sed pectore aut larynge potius affecta, & à lymphâ acriori, vel aëre inclementiore irritata, tussis contumax sicca, sæpiùs nocturna, oriatur, sperma ceti, quacunque ratione commodissimè in jusculo vel cerevisia, aut lacte probè calido, propinandum erit, spiritus quoque Θ^* ci anisatus insigni hîc meritò extollendus encomio, etiam ubi dentitio difficilior talem tussim, quod interdum contingit, excitaverit; quo in casu vomitorium interdum præmittendum erit: sed præcæteris Liquor C. C. succinatus, supra pluribus laudatus, in affectibus infantum Catarrhalibus quibuscunque primum meretur locum. Nec contemnendum hic est euporiston mulhercularum, ex Cratonis, trium Imperatorum Archiatri, experientia ipsis compertum, nempe jusculum decoctionis raparum, cum saccharo sedulò infantibus porrectum. Adultioribus paulo, decoctum rad. helenii cum uvis corinthiacis in Vino, paucis addito saccharo, confert; non minùs quàm looh de passulis cum mucilagine seminis lini aut cydoniorum permistum, est blandum temperans. Externè in tali tussi sicca inunctio plantarum pedis vespertina cum pinguedine lucii piscis est proficua. Quod si Singultus. verò singultus ex quacunque causâ adfuerit, isque paulo pertinacior sit, vomitus

mitus imprimis conducit, evellendo acres acidas fordes, stomacho in specie sic dicto adhærentes propinando postmodum pulv. Joëlis, in omni singultu ab eodem æstimatum, ex C. C. usto & Coral. præp. an. mistis conflatum, gutt. j. vel alteram Ol. d. cinamomi aut anisi addendo, nec omitendo proficuum Theriaces usum, aut quod sæpius jam laudavimus, nostras aromas, anisum nempe, singultui etiam adulatorum appropriatum, externo pariter ac interno usu, non minus, quam polychrestum Castoreum.

Lumbrici. §. 11. Vermium otiosa proles, mille incommoda inferens, felicius vix exturbabitur, quam mercurialibus per os exhibitis, infusis tunc simul clysmatibus ex lactis vaccini vel muliebris ꝑij. ad ꝑijj. additâ sacchari s. q. ut illorum hostili impetu in fugam versi lumbrici, hujus dulcedine allecti, melius decipi queant. Usurpantur mercurialia vel in formâ ∇ x, ut vocant, Hermeticæ, s. quam Mercurius vivus in eadem bulliendo suo contagio infecerit, vel in formâ pulveris, si nempe ꝑ vivum cum cerro quodam succo, ut inquit Schræderus *Pharmac. l. 3. c. 15. pag. 389.* id est, cum saccharo, continuata tritura in pulverem redactum propinaveris in cochleari ligneo; loco cujus & in ablactatis ꝑ dulcis cum conservâ fl. persicorum, vel cum saccharo in rotulas redactus, commodè usurpatur. Quod si quis horreat ad mercurii nomen, is gentianæ pulverem cum C. C. f. Δ & tantillo myrrhæ, jurato lumbricorum hoste (vel quæ præsentaneam magis fert opem, Tinctura salutis) exhibere poterit; vel saltem spiritum & Θ vol. C. C. adeoque & polychrestum liquorem C. C. succinatum, applicare potest. Præterea unguentum ex aloë hepaticâ cum felle tauri subacta, & cum Ol. colocynthid. acuata, regioni umbilicali cum portione vesiculæ suillæ; sic namque facilè invisi hi hospites eliminabuntur.

Atropiæ. §. 12. Quod si denegatus alimentis transitus atrophiam inferat, laudata sæpius volatilia & alimenti depravationem ejusque visciditatem corrigent, & forti penetratione referabunt obstructos antea meatus, præmissio, & interdum iterato, subinde blando laxativo, quæ ob id lactationis tempore subinde iteranda erunt; sicut post ablactationem liquor tartari

à Barbette in *Prax. l. 3. c. 2. obs. 3.* commendatus, erit proficuum, ut & Tartarus Vitriolatus Tacheniano more paratus, ut & arcanum duplicatum Mynsichti, & Tinctura Vitrioli σ is Tartarifata, erunt utilissima. Externè ad resolvendam spissiore mucilaginem Linimenta ex gummi ammon. supra §. 9. laudata, item quæ fiunt ex Ung. Martiato, althææ composito, Ol. Philos. felle tauri, &c. erunt proficua, quorum formulæ vid. in Sylvii *Prax. lib. 1. c. 14. p. 167.* & Barbette *c. l. item Anat. Pract. l. 1. c. 14.* Ceu præsentissimum, sæpèque probatum, remedium ab Hœfero *Herc. Med. p. 349.* commendatur Pulmentum illud, quod Vertex ferreus rotæ molaris inter movendum colligit, extra illitum: cum hisce conferantur *Miscell. Acad. Nat. Cur. Anno 2. Obs. 152.* & speciatim *Anno 3. Obs. 250.*

§. 13. Quod si Cutanea, ex vitata nutritione, subinde etiam neglecta balneatione, efflorescant Vitia, in achores, tineam & crustam lacteam, &c. internè alcalinis Volatilibus sæpè laudatis, in specie viperinis, insistendum, tantillum Liquoris C. C. succin. aut Θ vol. viper. pulverisve cujusdam Viperini propinando, vel Tincturam δ ii supra laudatam crebrius guttatim exhibendo, vel C. C. f. Δ e aut δ diaph. aut Ocul. σ r. c. pauca myrrha iteratis vicibus usurpando. Externè mercurialia, quibus hoc in passu subindè abutuntur, vitentur, cum epileptica in tenellis adeo subjectis inducant symptomata, Timæo teste *Respons. 43. p. 106.* nec lotiones pro curanda tineâ ex Nicotiana instituendæ, pulverisve ejus insersiones; ebrietatem enim turbulentam, anxietates præcordiorum cum lipothymiis, Vomitus, & copiosos secessus supervenisse, talibus observatum est, à Celeb. Boyle *Usefulness. of Experim. Philos. pag. 211.* & à Fehrio *Tr. de Absinth. p. 90.* Potius pustulæ linimentis saturninis aut sulphureis, acidum absorbentibus aut temperantibus blandè inungantur: quibus si add. Θ Tartari modicum, exoptatus habebitur successus: v. g. pulv. fl. sulph. excipiatur ungu. de cerussa camphorato, vel diapomph. c. f. q. ol. nicotian. vulgar. addendo Θ Tartari plus minus, prout acius vel mitius postulamus linimentum, quo ipso illitæ pustulæ optimè exarescent

Tineæ & Achores.

& cu.

& curabuntur. Facit huc etiam unguentum expertum Panarolli *Pent. 5.* *Obs. 3 I.* ex sulph. axungia (porcina) & succo limonum, quo illitus locus tinea defœdatus aliquoties, & postmodum decocto malvarum ablutus, optimè restituitur. Vulgaria fugimus meritò Unguenta & Linimenta, ubi simplicia cerâ, oleis, terebinthinâ, pinguedinibus, resinis similibusvè, permixta, & partim saturata, partim obruta & subacta, nullam operandi vim exferere valent, nisi quod poros cutis densè incrustando malum longè deterius reddant. Merito autem duplex harum in Cute efflorescentiarum status, duplicem medendi rationem Medico insinuat: Interdum enim pustulæ hæ, ex aciori acido in manantia jam degeneraverunt ulcuscula, acrem plus minus tenuemque saniem jugiter plorantia, quibus leviter linteo, vel spongiolâ ∇ spermatis ranarum turgidâ, absterfis, inspergantur pulveres acida absorbentes, viscida modicè resolventes, & ita, ut vocant, exsiccantes & detergentes: qualia componuntur ex Creta, Lacte Lunæ, succino, C. C. usto, cerussâ, tutia, myrrha, fl. sulph. & similibus. Præ cæteris crocus σ ris, ex ejus Θ lo per lixivium Θ tartari præcipitatus & probè edulcoratus, ex nodulo leniter inspersus, mirabilis existit; cui tantillum Θ Tart. cosmetici summi, quantum nempè sine doloris sensu perferri potest, inprimis si contumaciores fuerint, aut subinde repullularint defœdationes dictæ, consulto permiscetur: His namque, absorpto acido, & deteriso viscido, spontè successivè coibunt ulcuscula, idque citra ullum recidivæ metum. Sic enim v.g. Lactumina, **der Ursprung/** faciei si offuscant nitorem, pustulis in specie manantibus inspergendum est:

℞. pulv. lap. calam. ʒj.

flor. Φ is ʒij.

cerussæ ʒss.

Θ gr. xij. l. xv.

M. f. Pulvis subtilissimus inspergendus.

Quod si verò mitius in dictis ulcusculis peccaverit acidum, idque jam sub sua Θ sedine temperata cum purulentia viscida coiverit, in tenaces & subindè spissas crustas, sufficiant simpliciter alcalia fixa crustas emollientia, & acidum vitiosum in radice penitus

destruentia: quem in finem vel lixivio vulgari blandè humectentur subinde dictæ pustulæ, vel oleo Tartari per deliquium eadem blandè quasi illinantur, vel ex dicto oleo per deliquium cum oleo expresso amygdal. dulcium fiat subtilis litus, dicto modo applicandus. Quod si grandiores tumores glandularum circa capitis protuberent confinia, applicandum est pro eorum dissolutione empl. de meliloto, malax. c. ol. Philosophorum; vel fiat composit. ex eodem cum emplastro de galbano Crocato Myns. & ita imponantur, aliquandiu relinquendo. Quæcunque autem modò recensita externa non, nisi præmissis internis, & fomitem morbosum tam in primis viis, speciatim in stomacho, quàm in latice lymphæ corrigentibus & delentibus, in usum vocanda sunt, ne pallietur morbus externus, & gravior internus inducatur affectus.

§. 14. Variolæ vel morbilli si affli. *Variolæ.* gant infantes, expulsionem earum, seu acidi viscidii peccantis ex lymphâ & sanguine separationem, indeque natæ febrilis effervescentiæ mitigationem, promovent optimè semina ista expulsiva dicta, napi videlic. card. bened. aquileg. nasturt. &c. & addita myrrha pauca, cum ∇ sambuci & scabiosæ in emulsionis formam, ad imitationem Zwelferi *Phar. Reg. p. 209.* redacta, quæ infantibus perquam salutariter porrigitur. De cætero δ diaphor. tam vulgare, quàm quod magis appropriatum hic creditur, ex Φ io Vitæ paratum, additis granis aliquot myrrhæ, item castorei, consulto in ∇ vel vehiculo appropriato iisdem, reiteratis vicibus, exhibetur; non secus ac C. C. f. Δ e simili modo salubriter convenit. Myrrhæ nunquam in Variolis aut morbillis negligendus usus, tot experimentis jam confirmatus; unde & essentia myrrhæ seu salutis suprâ laudata comprobata hic est efficaciz, uti & essentia castorei, tam simplex, quàm, quæ magis est composita, ex castoreo & asâ foetida, cum spiritu vini Tartarificato parata, ceu præservativa pariter ac curativa suo modo Variolarum, ab aliis est commendatissima. Dictis usibus (nisi superfluè delicati in remediorum selectu esse velimus) similiter infusio stercoris equini in potu ordinario mirè conducit: stercoris tamen ovilli usus

ulius huic adhuc præferendus est in Variolis; sicut in Morbillis Caprillum eminet. Promotâ sic pustularum eruptione, & corporis fervore tepescente, id, quod deest, ad maturacionem earundem pulv. ocul. \mathfrak{sr} . cum myrrha crebrius reiteratus absolvit. Quod si gravior acrimonia sub eruptione horum exanthematum epileptica intulerit symptomata, in tenerioribus spiritus C. C. succin. aut Θ vol. Cranii hum. par sibi vix inveniet remedium; sicut robustioribus paulo Cinnab. \mathfrak{z} ii, & super ejus basin constructum specificum Cephalicum, optimè confert, imprimis cum dictis Volat. sociatum. Nutrix interea in potu quotidiano diligenter gelatinam C. C. dissolvat & hauriat.

Aphthæ.

§. 15. Aphtharum molestiæ, quæ ut plurimum lactationem infantum impediunt, ut removeantur, egregiè confert raparum in ∇ coctarum, succus expressus, cui tantillum sacchari vel mellis additum fuerit, quo eluatur & abstergetur frequentius os eorum; vel, quod aliis perplacet, raparum supra Δ c, tecto vase, sine ∇ assatarum succus expressus, etiam sine saccharo optimus, dicto modo illitus; aut horum loco ∇ extinctionis chalybis, in quo salvia & parum mellis bullierint, modicè commodè pro eluendo ore administratur. Decoctum quoque veronicæ cum melle in ∇ simplici factum pro ore eluendo est usu frequenti compertissimum. Quod si maligniora, aut etiam serpentia oris fuerint ulcera, idque in ablaetandis imprimis; (nam lactentium nutrimentum lacteum pro medicina ex parte inservire potest) instar omnium sit linimentum ex melle cum tantillo spiritus Vitrioli, vel quod magis placet, cum spiritu Θ is imprægnato, subinde ori illitum.

Epilepsia.

§. 16. Epilepticos tandem insultus, eorumque prodromos, somnum turbantes pavores, ut curemus, nobile est remedium Sulph. \mathfrak{z} ii, ex hujus scoriis ultimâ vice certo modo præcipitatum, gr. j. & in robustioribus paulo gr. \mathfrak{ss} . dosi, epilepticos insultus, tam imminentes quàm præsentis, sistens, simulque mineram morbi, si quæ reperiatur in primis viis, auspiciatò vomitu exturbans: quibus locis repurgatis, etiam repetitis vicibus, sine tali effectu tutò propinari potest, blandâ quiete & diaphoresi

novercam hanc potius, quam matrem puerorum, sopiens. Interim non rejiciendum puto communia euporista, qualia sunt pulvis marchionis, rasura cran. humani, Unicornu marin. & hippopotami, vel Unicornu fossile, bezoar lap. &c. omnia enim hæc acidum, nervos infestans, absorbent, & ita malum non mediocriter levant, interdum planè tollunt. Quibusdam præterea, ceu inter secretiora, ad epilepsiam Infantum remedia, asservatur pulvis iste citrinus, seu farina musco terrestri clavato, h. e. lycopodio, insidens, sulphuræ prolapiæ, adeoque facile flammam concipiens, & instar pyrii pulveris crepitum edens, qui ad \mathfrak{ss} . ceu summum epilepticum puerile commendatur: cui tamen adhuc præferendam existimo similem sulphuream farinam in julis Coryli primo vere reperibilem: cum Coryli lignum mirabile istud heraclinum oleum, singulare antepilepticum Rulandi, fundat, ritè destillatum, sicut & viscus Corylinus nobile euporiston ad epilepsias esse solet. Sed ubi talia non suffecerint, omnibus præferendus est liquor C. C. succinatus, crebriori experientiâ ad pueriles affectus epilepticos comprobatus, & ex quacunque causâ originem traxerint, etiamsi dentitionis difficultas easdem excitaverit, suo tamen optimè officio satisfacit. Externè abdomini cordisque, ut vocant, scrobiculo inungendum est balsamum succini, ceu optimum euporiston.

§. 17. Dentitionis laboriosum, & Dentitio-
tenellis ob symptomatum gravissimorum syndromen subinde mortiferum, negotium ut promoveatur, & doloribus leniendis, & symptomatis supervenientibus mitigandis, omnis opera impendenda erit. Dolor ergò ut leniatur, & gingivæ minus sensiles, simulque meliores reddantur, eadem crebrius succo Cancr. fluviatiliū contus. c. ∇ fl. cyani extracto illinendæ, aut balsamo puerorum dentientium à J. D. Horstio in *Dispens.* p. 567. descripto, eadem inungendæ. Rad. althææ frustulum recens, vel aridum in ∇ malvæ maceratum, sæpius masticandum infanti præbeatur, ut hujus mucilagine, à saliva sub masticatione extracta, emolliantur gingivæ melius: cujus loco non inceptè alii frustulum corii lardi recentis substi-

substituunt. Sanguis ex crista galli parùm incisa recens collectus, & gingivis illitus, ad dentium eruptionem promovendam impensè quibusdam laudatur. Non secus ac leporinum cerebrum coctum, & melle permixtum, ceu unum ex potentissimis remediis simili modo applicatum. Aliis irritis, si protuberantia gingivarum, & superior ejus candidior reddita ora, dentis jam proximè absconditi signum exhibeant, scalpello eas incidit Paræus *l. 23. c. 67.* quod ceu tutum sibi que compertum & summè proficuum commendat Borellus *L. 1. obs. 97.* Extra maxillæ & regioni temporum loci dolentis pro spasmo doloroso dictorum locorum leniendo illinatur medulla crurum Vituli, oleum amygdal. dulc. chamomilla, ungu. de althea, mucilago rad. altheæ aut sem. psyllii, Theriaca, &c. Ut verò reliqua interea mitigentur supervenientia symptomata, qualia primariò sunt febris & convulsionones, optimum fuerit, si alvus, quantum possibile, servetur probè fluida: nam *quibus, cum dentes erumpunt, alvus crebrò demittit, minus convulsione tentantur*, inquit Hippocrates *de Dentit. Lib.* hinc vel sponte alvus fluidior servetur talis; vel eadem clysmatis, similibusque remediis, laxior reddatur: conf. Hæferus *Herc. Med. p. 355.* Idque speciatim iniis, qui ex nutricis cacochymia minus laudabilem sanguinis, reliquorumque contentorum, crasin obtinent; nam & tales ordinariò gravius sub dentitione laborare assolent. Internè gelatina C. C. recens crebrius quocunque vehiculo propinata, & hinc Liqu. C. C. succinatus, ob convulsionum inprimis metum medicamenta sunt tutissima & utilissima.

Febres. §. 17. Ad febres nunc devolvimur, quarum rarietas variam etiam medendi methodum exigit. Intermittentes, utut rariores, quocunque ætatis tempore affligant pueros, curat præmissis in specie Vomitoriis spiritus Θ *ci, aut loco hujus Θ absinthii fixum, vel denique Θ Holfaticum dictum, aliàs arcanum duplicatum Mynsichti. Continuas verò lentas, ex acido viscido, hisque cognatas catarrhales, ex lymphâ nimis acida, post laxativa & clysmata vix aliud remedii genus meliùs, quam spiritus Θ *ci simplex, aut anisatus, aut Liquor C. C. succinatus curabit, Tom. II. Pars 2.

in specie posteriores, ad quas etiam Tinctura myrrhæ salutaris existit. Quod si verò ablaetati sint, optime liquor Tartari suprâ laudatus, item Θ *cum cum dimidio Ocul. Θ r. sæpiùs reiteratum, eas profligabit. Continuae ardentes, hisque similes, utut raræ affligant tenellos, eos tamen Vomitu imprimis præmisso, aut aliis evacuativis, profligant δ diaph. ut & C. C. f. Δ e, & cum eodem compositus pulvis febrilis Ludovici in *Pharmacia p. 290. & 282.* quin & in potum ordinarium, quem præter lac avidè subindè appetunt, in nodulo infusum sterco equinum, vile quidem, sed non nisi delicatis supersticiosè contemnendum est euporiston; loco cujus tamen & Gelat. C. C. tam infanti, quam in specie etiam Nutrici, in potu ordinario frequenter propinetur, insignis his in affectibus usus. Alias si robustiores paulò extiterint, Θ diatum, uti & arcanum dupl. Mynsichti modo laudatum, cum modo dictis exhibita, sunt egregiè proficua: quin & nil impedit, quò minus etiam mistura blandè acidulæ, pro compescendo æstu sitique molesta propinentur; sicut & feri lactis cum succo Citri acidulati potus est non ingratus. Quod si malignitas conjuncta fuerit, præter modò enarrata etiam emulsio suprâ de Variolis laudata, cum C. C. f. Δ e, δ io diaphor. terra sigill. & similibus in specie convenit. Misturæ quoque cum diascordio Fracastorii, aut moderatâ Theriacæ dosi imprægnatæ, in paulo robustioribus tutò in usum revocari possunt.

§. 18. Crinones vero Vermes si *Crinones.* affligant pueros, post Tincturam δ ii Balnei repetitus usus, præservative pariter & curativè, eosdem remove. Pro maturandâ tamen genitorum remotione consultum est, ut Balneo ∇ æ dulcis mellis modicum addatur, quo sub lotionem hujus dulcedine allecti vermiculi per poros capitibus suis prominentes commodè, vel unguibus acutioribus, vel vossellâ exiguâ subtiliter extrahi queant; id quod aliquoties reiterandum erit. Aliis in more positum est, ut ablutos in Balneo infantes, manu melli intinctâ blandè perfricent, & hinc prolectos Vermiculos vel crustâ panis durioris in formam aciei cultri rescissa, idque tutius, vel scalpello, idque minus securè, abradant & removeant Petrus à Castro *Tr. de Colostro*

stro mulierum Lusitanarum experimento fuliginem Caminariam, cum melle & lacte mixtam, dorso illitam laudat. Præcæteris modò dictorum uno alterovè præmisso, convenit ▽ aloëtica Timæi, quotidie aliquamdiu inuncta: de cuius usu *vid. l. 5. Cas. 23. descript. c. l. cap. 4.* quinimò putarim, ▽ hermeticam seu Decoctionis gii vivi, uti lumbricis & scabiei optimè conferre solet, ita etiam eandem in Balneo cutimabluendo usurpatam, citra ullum periculum dictos Crinones necare & tollere posse. Plura de his *vid. in Velschio sup. citatis locis.*

Intertri-
go.

§. 19. Intertrigo, si tenellam Cutim cuticulæ tegmine spoliaverit, vix citius aut jucundius removetur, quàm croco & ex Vitriolo præcipitato supra laudato, sine nullo vel minimo seniu excoriata loca restituens; cuius defectu & Terra Vitrioli dulcis consultò substitui potest: Vel si macularum in linteis exinde nata flavedo sit obstaculo, usurpetur pulvis ex C. C. usto, creta, & pauca cerussa, quæ ipsa nodulo tenui inclusa suspensâ manu blandè inspersâ, superimposito linteolo, quicquid fuerit mali, sistunt.

§. 20. Hæc ipsa, quæ hætenus tractata fuerunt, uti primariò de tenerioribus, & quæ nutricis adhuc sustentantur Lacte, intelligenda veniunt infantibus; ita eadem mutatis mutandis de facili quoque ablaetatis & vegetiore robore jam jam adolescentibus applicari possunt. Modò consideremus, quoscunque infantes, & speciatim qui lautiori gaudent diætâ, & à teneris unguiculis luxuriosè magis, quàm salubriter educari solent, ob communem iis addiphagiam & quasi voracitatem obnoxios esse cruditati acidæ, ex qua, ceu uberri-
mâ scaturigine, similia iis, quibus sub lactatione, ex lactis p. n. accensentia & corruptione, &c. conflictari solent, mala in eisdem largiter redundare solent, quæ ipsa etiam, aut iisdem ferè aut similibus medicamento-
rum generibus profligenda erunt, quo tenera hæc proles in Divini sui Creatoris Gloriam, & Proximi Salutem, benè educari ac institui possit. Ipsi Conditori Cœli
& Terræ, sit
SOLI GLORIA.



DISPUTATIO VII. VIRTUS OPII DIAPHORETICA.

MICHAELE ETTMULLERO,
Phil. & Med. Doctore, & Facultat. Medicæ Assessore,

Examini Publico expolita

d. 11. Julii, Anno 1679.

R E S P O N D E N T E

JOHANNE ACOLUTHO, Uratislavia-Silesio.

I. N. S. S. T.

De Virtute Opii Diaphoretica.

*S*Terile, si quoddam aliud, in Scholâ Medica semper extitit dogma illud, à superiorum seculorum in Galenum & Avicennam Commentatoribus nobis relictum, quo simpliciter ex quatuor sic dictis qualitatibus primis, eorumque absque fundamento graduationibus multiplicibus, mirabiles corporum vires, & præsertim simplicium operandi rationes, tantum non omnium dilucidare satagunt. Superstructum fuit illud, & primam ejus perscrutemur originem, rumoso & arbitrario saltem Peripathetico Elementorum quaternioni, qui præter alias turbas, tam in Theoria Physices, quam hujus Praxi, Medicina, huic quoque asserto primas occasiones suggestit: adeo Dogmata Aristotelis nullum adjumentum, sed potius multum impediementi adferunt Medicis studiis, fret

*Sive tum Theoriae, tum Praxi: ut loquitur Eruditiss. Jungius in Doxosc. Phys. Min. P. 2. S. 1. Prooem. Aff. 1. Schol. 3. Sanè si ritè negotium hoc consideremus, nullas tales in corporibus deprehendere licet, cujusvis generis qualitates, quas ipsis ordinario affingimus, seducti nimirum per pluralitatem attributorum respectivorum, quorum originem ad tot distinctas entitates qualitatum malè referimus, cum ex pluralitate & diversitate occurrentium saltem objectorum externorum oriantur. Adeo nec Ignis est calidus, calorivè tantillum possidet, nisi in quantum organa nostri corporis ita sunt fabricata, ut ratione motionis celerrimæ ab acidis ejus particulis in iisdem excitata, quam caloris nomine appellamus, illic calorem attribuimus: pariter atque nec ferrum ab eodem calefit, nisi in quantum hoc ab igneis istis particulis in sui minimis motum, nostris sensoriis talem impressionem, caloris notione insignitam, facit. Potius qualitatis nomine, (*ποιότης* à *ποιᾶν*) cum Curioso isto Gallo facilitatem sive agendi facultatem intelligamus, quæ omnis, cujuscunque fuerit generis, nunc immediatè, nunc mediatè, ex corporum essentia & constitutivis principiis fluunt. Pluribus jam suspecta fuit ista, per qualitates præsertim primas putatas, Philosophandi in naturalibus ratio, unde Fernelius pariter ac Sennertus, insaniam opus esse dixerunt, ad manifestas qualitates omnia reducere velle. Quarum loco, cum occultas substituere nitantur, profectò negotium potiùs implicent, quàm explicent, dum manifestarum illarum æque abscondita sit, quàm occultarum qualitatum natura: & nemo illorum, caloris in igne naturam & operandi modum, clariùs explicare potuit, quàm magnetis ferri vim Locomotivam. Observarunt hoc plures in Theoria Physica excellentes Medici, unde sub ætatis suæ tenebris, si quis alius Lynceus Fernelius, hinc inde in eleganti & erudito, de abdit. rerum causis Tractatu, operationes corporum singulatiores à tota eorum substantia oriri statuit, pluribus applaudentibus Naturæ Consultis; id quod re ipsa idem sonat, ac cum Modernorum plurimi, audacis ingeniosique (ut Boyleo hæcenus incomparabili, in Præfat. introduct. in Chym. Scept. audit) Helmontii iterentes vestigia, ex seminibus & virtute rerum seminali, quaslibet concretorum naturalium dotes derivant. Nempe ut illi in rei substantia formam in specie considerarunt, per materiæ modificationem operantem, ita hi principium seminale, mediante speciali materiæ textura, ceu quorumvis attributorum & qualitatum fundamento, activam, respiciunt. Atque hic terminus est ultimus, ultra quem progredi nescit humana de naturalibus rebus cognitio; siquidem tam tota istorum substantia, quàm vis horum seminalis à priori nobis Mortalibus planè delitescit incognita, quia immediatè fluit ex imperscrutabili sapientia & omnipotentia Divina, cujus reverà sunt characteres, ab aliis Ideæ appellati, materiæ sub prima corporum creatione impressi, quorum beneficio & adhuc dum fecunda existunt rerum semina, & qui ipsi à priori nullomodo, sed à posteriori saltem per effectus à nobis cognoscibiles existunt. Exerunt autem se, tam in corporum productione, quàm productorum operatione, per multiplices materiæ Schematisinos, sive conformationes & permutationes mechanicas, ac propterea ex materiæ secundum minimam texture ac modificatione multiplici, & inde dependente varia ad alia concreta habitudine sive respectu, tam activo quàm passivo, ceu fonte tot attributorum, clarè magis, magisque distinctè, quàm ex qualitatibus, nominetenus saltem notis, quibusvis, admirabiles istæ operandi rationes explicandæ veniunt. Specialis autem ista à semine immediatè fluens, & in minimorum figura, magnitudine, situ, ordine & nexu. &c. proximè fundata textura, cum sub tanta specierum & individuorum varietate tantum non sit infinita, pro sublevando ab infinito abhorrente intellectu humano, in pluribus explicandis corporum Phenomenis, ad binæ universaliora ista naturæ in primis, hinc & artis, illius imitatricis instrumenta materialia, quasi mechanica, minima acidi & alkali, confugere omnino necesse habemus. Quæ omnia & isti agendi facultati corporum, horumvè partium, respectu cujus in animalium præsertim hominum corporibus, nunc alimentorum, nunc medicamentorum, nunc Venenorum nomine veniunt, applicanda sunt: quatenus illa, ratione materialis seu mechanicæ secundum minimam texture, partium nostri corporis texturam & constitutionem vel conservare, vel immutare, vel destruere valent, quas actiones necessario nostræ cognitionis sensualis, hinc & intellectualis respectu, variis conceptus & notiones multiplices comitabuntur, quarum occasione, tot qualitates in istis objectis vulgò statuuntur, quot attributa respectiva in iis deprehendere licet: quod ut perquam inconveniens est, ita multo magis multiplici errori ansam subministrare solet, si ex quatuor elementorum horumque primis qualitatibus, earumque Syzygiis, particularium istarum qualitatum originem & operandi modum derivare velimus. Illustrat hæc omnia, ut unicum in medium producamus, Opium, vi sua polychresta, nec unquam*

satis laudata, qua & somni nobis dulcedinem conciliat, & doloris suave lenimen præstat, & quævis in Republica nostra microcosmica turbata pacatiora reddit: cujus singularissimæ dotes, dum ab uno frigori ejus summo adscribuntur, quod tamen calidum intense ab alio affirmatur, dici nequit, quas lites excitant, de Lana caprina omnes. Quas ut impræsentiarum missas faciamus, vis ejus diaphoretica nos monet, quam solum considerare est animus, cui cæpto supremus annuere velit Archiater.

CAPUT I.

Effectus Opii in partes contentas considerat.

T H E S.

Opium quasvis excretionem sistit, præter sudorem, idque nec in partes solidas. nec in partes fluidas agendo, sed saltem spirituum animalium impetum refrænando.

§. 1.



Ravissimè licet decumbant ægri, & pessimo versentur in statu, modò somni blandâ frui datum sit illis quiete, præsentissimum solamen, & levamen exoptatissimum ex eo percipere assolent, adeò ut arcanum in Medicina supra omnes gemmas & Lapides pretiosos, meritò somnus audiat Crollio, *Basil. Chym. c. 7. p. 198.* Nam præter alios usus, & hoc simul ex eo sperare licet beneficii, quod juxta tritum Practicorum axioma, somnus omnes fluxiones, excepto sudore, sistere soleat.

§. 2. De somno naturali quod hic asseritur, hoc ipsum de eodem, quatenus artis beneficio per soporifera remedia, quorum antesignanum est Opium, hujusque nunquam satis laudatum Laudanum, adeoque de ipsis etiam auxiliis somniferis, affirmandum pariter venit, quod hæc ipsa, præter suavem ad somnum propensionem, quosvis humorum motus cohibere, & specialius quasvis excretionem, præter sudorem, compescere soleant.

§. 3. Quotidianæ hoc debetur experientiæ, quæ tam de naturali contentorum in corporea nostra machina motu hoc confirmat, quàm vel maximè de p. naturali eorum, vel in certa loca intra corpus effusione, vel per certa loca extra corpus excretionem, idem ostendit. Equidem naturalem contentorum fluxum per alvum & vesicam non solum cohibere aptum natum est opium, sed ipsum etiam sanguinis in orbem reditum sedationem suo usui reddit, cum pulsus exinde factus rarior & tardior, quàm ante ejus exhibitionem fuerat, quietiorem sanguinis circuitum innuat, & respiratio ipsa quoque minor & minus frequens exinde reddita, moderatè magis per pulmones sanguinis trajectionis restituit. Sub quo sanguinis blandiori fluxu

& refluxu lymphæ quoque tardior necessariò sequitur motus, proptereaque ex opiatorum usu subinde faucium ac Linguae aliqualis siccitas, & sitis urgentia, observari solet, minus copiosâ salivali lymphâ illas eluente. Quin imò in tantum etiam cohibuisse contentorum corporis reciprocos fluxus, ad vitam continuandam summè necessarios, opiata observata fuerunt, ut penitus cessantibus his ipsis, vita cum morte commutata fuerit. Ob id scilicet tam sollicitè monent Practici, ne nisi sub aliquali adhuc virium robore, remedia istiusmodi, nec nisi exactissimè correctâ, propinentur.

§. 4. Evidentiora sunt longè, quæ sub p. n. contentorum corporis motu ab opiatu contingunt. His & vomitus & diarrhææ auspiciò supprimuntur, dysenterix graviori absque opio succurrere difficile, ne dicam impossibile est, non secus ac Cholerae, Sanguinis quæ fiunt, eò periculosiores effusiones, quo vitæ nectar immediatè magis exhauriunt, per quæcunque loca, sive alvum, sive vesicam, sive nares, sive os, sive uterum, &c. frequenter ab Opii vi compescuntur. Diabeticorum urinaris nimbus per Opiata sistendus venit. Quas lymphæ effusiones catarrhales inducunt affectiones, præsertim thoracem cum aspera arteria, (ceu quæ frequentiores magis illius patiuntur inundationes) affligentes, ab opiatorum vi promptè reprimuntur. Ipsa copiosior, etiam à glio concitata, salivatio per Opium moderamen patitur. Ut taceam febrium universum exercitum, in corporis fluidis, præsertim sanguine, ferè omnia sursum deorsum miscentem, cujus impetus ferociore & reprimat Opium, ac refrænât in continuis benignis, in malignis verò utramque faciunt in cura paginam, ut loquitur J. D. Horstius *judic. de Chirurg. Infus. p. 47.* Dum intermittentium Paroxysmos sensibilibiter repellit, rigores potenter minuendo, & cætera symptomata mitigando.

§. 5. Sed in omnibus his contentorum ab opio quoad sui motum factis immutationibus sudor superest, qui tantum abest, ut ab Opiatis sufflaminetur, ut potius strenuè & profusè proliciatur, tam ab iisdem solitarie assumtis, quàm aliis præsertim diaphoreticis additis, quorum agendi potentiam, mirum quantum opium intendere satagit, adeò inter sudorifera excellere Opium dicatur Walz

lzo *Tr. Meth. Medendi* p. 65. cui constans Practicorum concentus omninò suffragatur, & ante Eum jam notarunt, tam Germanorum Plinius, Gesnerus *in Epist. l. 2. p. 61.* & 69. quàm Platerus *in Obs. l. 2. pag. 491.* & l. 3. pag. 633. & 727. Conf. Hochstetterus *Decad. 3. cas. I. Schol.*

§. 6. Considerandum jam ante omnia, qua ratione priores illos, liquidorum motum sistendi effectus perficiat Opium. Ubi imprimis observandus venit duplex in Medicina corporis nostri hydraulico-pneumatica contentorum sive humorum motus: Localis unus sive progressivus, alter intestinalis sive plus minus fermentativus. Localis, totius molis liquida per suos ductus & canales est translatio, respectu cuius in sanguine Cordis musculus antix vices subit, transvasando ex venis sanguinem per medios pulmones in arterias, præter quod officium, an aliud prætereà sanguini conferat beneficium? merito dubitatur, saltem hætenus ignoratur. Intestinalis ille secundus est minutarum illarum contenta nostra liquida sive humores componentium particularum continuus reciprocus motus, ratione cuius non tantum in fluiditate continuâ conservantur eadem, sed etiam fermentationis & turgescentiæ, tam naturalis quàm p. naturalis, & inde natæ multiplicis alterationis & immutationis, secundum minutarum istarum particularum syncrism, diacrisin & metastasin, subeunt vicissitudines, undecunq; etiam, minutiarum illarum continuatus dependeat principaliter motus, utut Θ ium sic dictorum varietas, præsertim acidi, instrumentaliter plurimum omninò conferat.

§. 7. Intestinum hunc motum ab Opio suppressi, à nemine hætenus assertum fuit. Ac obstat exilis illa, aliquot saltem granorum dosis, quo minus Crasin materialem illorum immutare, & consequenter dependentem ab illâ intestinum motum sistere plus minus valeat, de quo pluribus infra. Quatenus tamen, ut ex sequentibus patebit, localem humorum motum refrænât, & suppressit plus minus, etiam ad intestinum motum, ab illo certâ ratione, quoad aliquam modificationem dependentem, non nihil moderandum conferre poterit, præsertim si ex confluentiâ quorundam liquidorum hic ipse vel oriatur primariò, vel ab iis certâ ratione intendatur, qualis est Chyli cum felleis & pancreaticis liquidis, sanguinis cum his ipsis & lymphâ: &c. Hac enim ferè ratione ex parte & febrium impetum non nihil compescere, & intermittentium præsertim plura symptomata refrænare, probabile est.

§. 8. Localis ergò speciatim est motus fluidorum, quem Opium plus minus sistere

valet. Ut quando superiori anno Juveni ex incautiùs hausto Vino emetico ðiali, in hypercatharsi ultra 14. dies adeò copiosa, ut secessuum numerum referre, (mendacii suspicionem declinanti) non libeat, essentia theriacalis cum dimidio ess. Opii propinata, præsentaneam opem, 40. saltem guttarum dosi, attulerit. Circa hunc motum localem tria consideranda veniunt: 1. ipsum fluidum motum; 2. pars Organica, à qua & per quam instrumentaliter movetur; & 3. spiritus impetum faciens, à quo principaliter omnis oritur motus. Unde unius vel alterius horum trium respectu, Opium vim suam exercere, omnino necessarium erit.

§. 9. Humores fluidos quod attinet: horum motum, quâ talium cohibere nequit opium. Locali in motu fluida illa passivè se habent, & quæ naturali impetu deorsum saltem ruerent, intra certos corporis canales coercita, secundum horum conformationem promoventis impetu undiquaque distribuuntur, adeoque suprà & infrà nesciunt, suntque tam in fronte, quàm in pedibus, ut de sanguine loquitur Helmont. *Tr. Terra. §. 7.* cum quo *conf. Eruditiss. olim. Patavinorum Sanctorius, in Meth. Vit. Error. p. 710.* & 874. Opium ergò talem motum, quomodo in his fluidis inhiabit, dum alieno ipsi subsunt & parent imperio? In quem scopum finge, occasione spiculorum antimonialium, cum Vino infusionis croci metallorum aut Vitri ðii haustorum, & Vomitus multiplicis materiæ, & variarum sordium secessus provocari, quibus quocunque modo aut quanto societur opium, quid adjumenti hoc conferet fluido, qua tali, siquidem huius mole obrutum & abreptum, simul evacuabitur; Nam consistentiam fluidi, ab Opio minuari immediatè, nondum hætenus compertum fuit. Adeò ut Opium fluidorum motum cohibeat, absque ullâ in fluida ipsa actione.

§. 10. Considerandæ jam partes solidæ, quâ tales, an harum ex affectione ab Opio susceptæ, illæ in contentorum motu alterationes dependeant, cum ab his moveri liquida, & modo §. 8. dictum sit, & experientia ipsa commonstret? Sed quò minus & harum respectu Opium sistat contentorum Lationes, patet non solum ex parva istâ dosi, quâ propinantur, (de quo infra,) quæ non sufficiens est, ut partes solidas tam notabiliter in suis functionibus motivis cohibere queat; sed etiam ipsæ solidæ partes instrumentaliter se habent ad fluidorum motum, quatenus principium movendi ex seipsis non habent, sed ab alienâ potentiâ, ceu organa saltem moveri & ipsæ soleant. Ad hæc, quâ ratione in eas agit Opium, an ratione texturæ illarum materialis, & inde natarum multiplicium propria-

prietatum sensualium sive temperaturæ? an ratione conformationis suæ mathematico-mechanicæ, ratione cuius in esse organico constituitur? Non ratione huius, cum nulum immutatæ organisationis seu conformationis ab Opio inductæ innotescat vestigium: pariter atque in ipsâ texturâ materiali, & inde natis qualitatibus temperaturaque, ab opii usu ulla immediatè facta mutatio haud apparere solet.

§. 11. Dum ergò Opium proximè, nec in continentes seu solidas, nec in contentas partes seu liquidas, harum motus, & inde natas excretiones sistendo agat, supersunt spiritus, sive impetum faciens Hippocratis, quos consideremus, quid hoc in negotio vel agant, vel patiantur ab Opio? Hi scil. sunt, animales speciatim appellati, qui fibrarum motricium beneficio omnis in corporis Oeconomia localis motus existunt autores primi. Hi Rota sunt suprema sive magna, quæ alias Rotas in corpore humano (tanquam artificiosissimo automato) circumagit, ut eleganter loquitur *Illustr. B. de Verulamio, Hist. V. & M. p. 94. 193.* Horum ergo quamdiu viget impetus elasticus, etiam fibrarum motricium ritè fabricatarum tonus, & inde dependens tam ad externorum objectorum promptissimè recipiendam impressionem sensilem proclivitas, quam continuus ad motum nixus, debito in robore vigeant, adeoque quamvis partium continentium localis motus, cum contentarum promptissima undique distributione, quin &, pro occasionum varietate, inordinatâ commotione & nonnunquam exclusionem continuabit. Sufflaminatio autem nonnihil spirituum illorum impetu motivo, & inhibito quadantenus radio illorum influxu, cessabit etiam proportionaliter fibrarum tonus, remittet unâ sensilium facilis receptio, & languescet fibrarum motivus nixus, adeoque contentorum hinc sedatior longè ac tardior superveniet fluor.

§. 12. Refrænât hunc spirituum impetum, & segniores quasi reddit eosdem Opium, quod notissimi ejus in corporibus nostris effectus, somnolentiæ & indolentiæ, testantur. Ibi languescens spirituum impetus minùs vigorosè per universum systematis nervosi extenditur, unde præsentis licet undique, non æquè sufficientes tamen, pro sensationum & motionum externarum obeundis muniis esse solent. Hinc flaccescente fibrarum sensilium Tono, haud æquè validè ab objecto licet intensiori vibrari poterunt, unde nec spirituum jam in elatere suo remittentium sufficiens percussio ad primum commune sensorium fieri, nec fibrarum dolorosè commotarum superveniens spasmus ordinarius & convulsivatus tensio procedere poterit. Sub quo spiri-

tuum aliquali quasi stupore per Opium inducto, & sensationes externas, & motiones pariter locales, tam partium solidarum, quàm contentorum, in illarum alveis fluidorum remittere insigniter, necesse erit.

§. 13. Et horum duorum effectuum ratione, torpescens nempe tactus & remittentis fibrarum motricium Toni, accidit, quod Opium quovis humorum motus sistere, & speciatim qualvis excretiones, sudore excepto, compescere solet. Hæc duo enim ferè in quovis, tam naturali, quàm p. n. contentorum motu sunt obvia, partis scil. moventis irritatio, & hinc fibrarum ejusdem motricium contractio, indeque fluidorum contentorum multiplex motio. Nempe quotiescunque pars quædam sensu molesti vel noxii infestatur, fibrarum sensilium inordinata & vehementiore vibratione spirituum ad eam provocatur impetus, à quibus aucta & plus minus spasmodica earum tensio perficitur. Contractis sic fibris, vasa quoque tam sangui-fera quàm lymphatica, aliaque, & quicunque partis meatus stringuntur plus minus, indeque vel remorato contentorum transitu horum circa locum ita affectum stagnatio, unde superveniens tumor, vel copiosior per vias aut consuetas, aut insuetas, apertas tamen vel facilè aperibiles, pro circumstantiarum ratione, effusio.

§. 14. Pro quorum illustratione considera, acidum illud, mole subinde minimum, quod dentis plus minus cariosi radicem nervæam & fibrosam pungit & rodit, ac dolorosè irritat. Brevi exinde non faciei saltem ex illâ parte ac temporum, sed totius capitis hæmiphæerii tensionis & plus minus lacerationis sensus, spæsmi fibrarum manifestus index, cum non raro tumore malæ, nunc sanguineo, nunc lymphatico, h. e. phlegmonoso aut oedematoso supervenit, cum copiosissimæ salivæ limpidæ effluxu, pertinaciori fibrarum nervearum stricturâ ex glandulis immediatè, mediatè ex sanguineis vasis expressâ. Ast Opium si interno usu somnum provocarit, doloremque levarit, vel loco dolenti applicatione sensilitatem ejus stupefecerit, vel suâ sponte tandem dolor desaviecit, breviter & hemicranie affectio, & externarum partium tumor, & prurialissimi profluvium cessabunt. Quæ ipsa, & Oculi à tantillo asperiore pulvisculo læsus, & digitus à parvâ spinulâ in sui extremo infixâ molestatus, & stomachus à spiculis sili-bris irritatus, & recti extremitas à resinâ viscidior aloës infestata, & asperæ arteriæ sensibilissima tunica ab inclementiore aëre læsa, aliaque sexcenta in Corporis Oeconomiam quotidie obvia sufficientissimè mutatis mutandis confirmant.

§. 15. Spirituum ergò impetum sistendo, &

do, & motum eorum plus minus sufflaminando, adeoque tam sensus in parte acumen hebetando, & motum ejus fibrarum, præsertim peristalticum, impediendo, qualvis fluxiones sistit Opium. Hac ratione Opiata, v. g. Theriacalia, & Vomitus, & hypercatharises, & diarrhæas, & dysenterias sopiunt. Non secus achæmorrhagias, sensum in parte ex qua effluit vellicantem mitigando, & sanguinis impetum motivum nonnihil cohibendo, reprimit. Adeoque illis saltem hæmorrhagiis propriè convenit, quæ vel occasione molestæ sive sensilioris irritationis aut excitantur, aut continuantur, aut sæpiùs recidivant; (quas inter occasiones ipse serosior & acrior sanguis non ultimas tenet) vel quæ occasione inordinatorum spasmodorum in vasis sanguiferis subinde accidunt. Eodem ex fundamento & tenues Catarrhos sistere partim, partim incrassare dicuntur papaverina, Opii parentes, dum sensum molestæ in pharynge pariter ac larynge irritationis levant, & hac occasione factam lymphæ uberiores per fibras constrictas ex glandulis expressionem sive excretionem sistunt, eò quod de latice isto jam excretum fuit, exactò sui cum nutrimento asperæ arteriæ rorido chyloso, ante sui assimilationem simul transudante, miscelâ & unione, spissiore consistentiâ, & ex particularum activarum subactione debitâ, convenientem, & tactui laryngis proportionatam temperaturam intereâ acquirente, adeoque coctum & incrassatum apparente, facilius sub tali paulò viscidiori consistentiâ, ab impetu aeris elisionis & excretionis. Sanè Phthilici ex pulmone, sensile beneficium ab Opiatis recipiunt, ritè administratis; nam & sordium copia exinde minuitur, non supprimendo eandem, sed continuam regenerationem præcavendo, & eandem meliorem consistentiam nactæ, facilius cum conatu expectorantur. Sanè haud semel miratus sum Phthilicos etiam diutius, ac per aliquot septimanas, continuum Opii usum, citra ullam sensilem vel notabilem noxam aut alterationem ferre posse: id quod & olim observavit Crollius, *Basil. ubi de Elect. Laudan.* item Hartman. *de Opio. Theor. 8. quæst. 10. pag. 158.*

CAPUT II.

Vim Opii sudoriferam explicat.

T H E S.

Opium per accidens, mediante largiori pororum Cutis hiatu, sudoris profluvium, promovet.

§. 1.

O Opium ritè paratum, & in laudandum laudanum exaltatum, vi sudores ex-

citandi, & insensilem transpirationem, insensilem transudationem augmentandi, polere insigni, docente magistrâ experientiâ, supra insinuatum fuit, utut qualvis alias liquorum excretiones inhibeat. Investigatu itaque omninò dignum videtur ex Theoretico causarum scrutinio, hæc ipsa operatio, pro meliori sui ad Praxin, applicatione.

§. 2. Ad hoc, ut ritè extillet ex corpore nostro sudor, duo exactè distinguenda veniunt: qualis nempe 1. sit sanguinis status, à quo aptus reddatur, dimittendo promptius serosolatici, quibusvis tam ipsius sanguinis, quàm solidarum partium à nutritione privatâ, ex materiæ necessitate relictis superfluis aut effatis, & eatenus excrementitiis particulis imbibitis onerato; hinc 2. qualis cutis ejusque pororum, seu sudoris cribrorum necessaria sit conditio, pro transmittendo ritè sudoris latice, ejusque promovendâ plus minus excretionem.

§. 3. Prius cognosci haud poterit melius, quàm si ratio habeatur attentè eorum, quæ in spontaneo sudoris profluvio, sub exercitiis ac motu corporis, subsistentiâ in loco calidiore, &c. cuivis obvia sunt, & quadruplici Phænomenon differentiâ terminantur. Pulsus scil. 1. semper celerior & frequentior rapidiorem sanguinis per cor & universum corpus motum ostendit, (sive spirituum corpus musculum moventium immediatè, sive sanguinis cor pro crebriori motu stimulantis occasione eveniat) quibus adjuncta ejus magnitudo intensiorem turgescentiâ & fermentativum motum auctum innuit: quæ ipsa necessariò ex intestino particularum in sanguine motu, præsertim acidarum cum aliis alcalinis, & terreis, concitiorè; 2. sensilior totius corporis calor ac æstuatio comitatur; Supervenit his habitus corporis exterioris & rubor, & mollities, & aliqualis turgescentiâ, siquidem sanguis taliter alteratus, undique per quævis capillaria celeriori traiectione quidem penetrat, sed languescente nonnihil circa hæc ipsa impellentis impetu, vix tam promptè à venulis excipi poterit, quin ulteriori per arteriosa vasa affluxu, aliquali subsistentia copiosius solito partium solidarum poros undique repleta, indeque ista Phænomena exhibeat: unde 4. penetrans undique latex aquosus sub tali sanguinis alteratione, & in primis intensiori exæstuatione, & ipse rarefactus, & quasi porosior factus, adeoque imbibendis ex sanguine & abstergendis ex solidis partibus quibusvis heterogeneis, præsertim \ominus inis particulis aptior redditus, facillimè qua datâ portâ prorucere, & speciatim per cutim transcolari potest. Uterque ergò motus sanguinis, tam circularis, quàm fermentativus, ille quidem celerior, hic intensior, sanguinem

nem sub sudore necessario attenuatum, resolutum, & quasi liquefactum exhibent, cum non nisi tali sub sanguinis statu illa ejus Phænomena apparere queant. Unde etiam propriissimè dicta sudorifera, nempe *Θια* vol. tam manifesta quam occulta, tam libera, & sui quasi juris, quam in ol. concentrata, non nisi tali sanguinis in consistentia suâ & texturâ alteratione sudorem provocare videntur. Attenuatus ita sanguis, hoc ipso simul disponitur, ut seri, communis istius alimenti & excrementi vehiculi, facilem secessum & promptam separationem patiatur.

§. 4. Cutim quod spectat, hujusque sub sudore constitutionem: observanda venit curiosâ ejus & artificiosâ structura. Est hac rete sanè mirabile, ex fibris arteriarum, venarum, nervorum & tendinum variè inter se complicatis contextum, ita tamen, ut nervoso generi plus quam venoso, in sua structura acceptum referat, tanta & nervearum & tendinosarum fibrarum copia, cum intertextis arteriarum venarumque capillaribus, ut exilissimis sic numerosissimis gaudet. Necessario vero in taliter constructa corpus investiente tela, foraminula meatusque complures extabunt, ex quibus creberrima duo emergunt corpora: papillæ primo loco pyramidales innumeræ, nervorum scilicet extremi fines, horumque fibrarum ultimæ portiones cutim perforantes conglobantur, & ita in extimam cuticulam usque desinunt, genuinum scilicet tactus organum, quas oculatissimo debemus Malpighio, *Tr. de Exter. Tact. Organo*: secundo loco observanda sunt Lymphatica vasa, excretoria copiosissima, ex glandulis miliaribus, cuti sive substratis sive simul intertextis enata, quarum ratione interior cutis substantia Lindano carnea asserta, à Willisio potiùs glandulosa statuitur *Pharm. Rat. Vol. 2. S. 3. c. 5. p. 461*. Disperguntur excretorii hi tubuli in universo exteriori corpore, perque eos sudorum rivuli, quorum fontes illæ sunt glandulæ intercutaneæ, confertim adeò effluunt. Sanè, non sensibilis tantùm transudationis, sed etiam insensibilis transpirationis, officinas has ipsas esse, sunt, qui existimant, utut triplicem viarum, per quas aliquid in superficiem corporis exponitur, differentiam explicet Pechlinus, *de habit. & color. Æthiop. p. 87*. quod ipsum tamen ulterius rimari, ad præsens minus facit institutum, cum circa sudoris scaturiginem saltem occupati simus.

§. 5. Communis his vasis excretoriis, eorumque orificiis, cum aliis in corpore nostro obviis colatoriis officinis affectio erit, ut & aperiri & claudi queant, adeoque transmittendo humori faciliorem vel difficiliorem

transitum concedere. Cuius asserti hujus veritas obvia erit, alterationes, quæ peripheriæ corporis cutaneæ sub tempestatum mutationibus accidunt, consideranti; Æstivo tempore hiant apertius meatus isti, & continuâ laticis transmissione madescit ordinariò corpus, hinc vehiculi aquosi per cutim factâ traiectione rarior & parcior mictus: at dum hiberno gelu quælibet rigent, & rigidior, saltem asperior, deplumati anseris ad instar evadit cutis, & conclusis istis meatibus copiosior Urinæ secretio supervenit. Manifestum idem evadit ex alvi majore lubricitate, occlusionem meatuum sudoriferorum superveniente. Memoranda ob id Gabelchoveri, Practici multæ experientiæ, *Cent. 3. Cur. 73. Annot. p. 122*. est sententia: *qui sunt dense texture, & habent cutim spissam, & poros arctos, sæpius quotidie egerunt, quam qui poros habent apertos, ex quibus vapores & humiditates possunt resolvì, egestiones exsiccantur, & corpora sunt magis constipata. Hinc ergo colligi potest, quare in fine æstatis, & in principio autumnii, fluxus alvi sæpius accidant, &c.* id quod propriâ experientiâ convictus etiam ingenuè fatetur Malpighius: *c. l. p. 43. & 46*. his casibus non liquidi quâ talis, secernendi, sed organi secretionis saltem est diversitas, quo in peripheria corporis ocluso, per similia in intestina hiantia, & ipsa glandulosa texture colatoria, quæ eleganter demonstrat J. J. Peyerus *de Gland. Intest.* fit excretio. Ob id sedulò in Praxi fluore alvi quocunque correptorum dedi semper operam, ut pori meatusque cutis, quantum possibile, serventur aperti, & corpus ad diaphoresin blandam continuò sit dispositum, quo ipso non leviter sufflaminantur enormes istæ alvi defectiones, sed etiam, si quæ successivè effervescat febricula, faustâ istâ contentorum corporis per poros cutis transpiratione extinguatur. Adeò per plurium seculorum ætatem, hæc foraminum intercutaneorum vel hiscentia, vel conniventia fuit observata à Medicis, ut non ultimam febrium causam in pororum cutis occlusionem rejecerit Galenus, & per experientiam convicti Practici fateri necesse habeant, nullam febrem tutò, & absque recidivæ metu judicari posse, quæ sine sudoris evacuatione deferbuerit.

§. 6. Urget jam nostram meditationem, unde nunc patentes, nunc conniventes sint isti transudationis meatus excretoriique tubuli? Variæ equidem se offerunt causæ, tam connatæ, quas inter est naturalis cutis textura, vel rarior vel densior, quàm acquisitæ, partim per consuetudinem, secundum varium rerum non naturalium usum, partim per ægritudinis p. n. alterationem: unde meatus dicti

dicti vel ex staminum fibroso-
rum tensione nimia turbari aut obliterari, vel admotis aut excretis variis constringi, arrodi, vel iisdem viscidioribus aut glutinosioribus obstrui possunt. Præ cæteris, ceu frequentior causa, considerata venit Tubulorum istorum, imò, ut probabiliter arbitror, & ipsarum glandularum, à fibris nerveis contractis oclusio, vel ab his relaxatis reclusio. Tendinosum nempe maximam partem stamen esse & fibrosum, quod cutim constituit, supra insinuatum fuit: unde pro nervearum & tendinosarum natura non sensui saltem tactus externo, cui illarum extrema papilliformia sufficiunt, sed etiam motui cuidam dicata erunt, eoque pro fibræ motricis naturâ, abbreviationis, seu ut vulgò dicunt, contractionis & relaxationis: unde necessariò tubuli isti excretorii, & ipsæ simul glandulæ, nunc stringi, adeoque has comprimi, illos coartari, nunc relaxari, & has sic porosiores, illos patentiores reddi, necesse erit. Argumentum huius rei, & externus tactus & interna imaginatio suggerunt. Quoties vel ingrata humiditatis occurrit contactus mox corrugari cutis, pori claudi, anserinæ pellis facies hinc emergere solet. Evidentiori exemplo avium plumæ, feliumque pili hoc præsentant, dum frigoris occurssu erectiores situ animalia dicta hispidiora apparere faciunt, fibris istis intercutaneis nerveis, cutis poros sui contractura stringentibus, & simul plumas ac pilos ex obliquo seu declivi situ in rectam magis lineam erigentibus. Imaginationis vis, ut per totum microcosmi regimen se diffundit, ita & extremos ejus limites attingit: tantum tamen non quotidie occurrit, ut ex rei vel horridæ vel terribilis, aliusve similis, vel simplici saltem narratione, præsertim in delicatioribus mox cum horroris aut saltem frigoris quodam sensu, peripheria corporis undique contrahi, pori arctè claudi cutisque in anseris faciem corrugari soleat, quasi omnes, quotquot occurrunt, portas, ab hostili insultu præmunire velit conservationis suæ provida Natura. Observavit sane Malpighius *c. l. pag. 19. in extremo digito, cuticula per admotum ferrum detracta, ubi sudoris ista vasa excretoria hiant, convexam quandam pelliculam, interiora versus, non absimilem cucurbitulæ, extendi, ad edendum fortè valvulæ ministerium, ut interdum tensu detineat sudorem, & relaxatâ exitum permittat*: id quod ad præsens negotium illustrandum simul non parum facit, ut ut clarior & ulterior per experimenta anatomica confirmatio adhuc in hoc passu expectanda videatur. Ad hæc modo laudatus Autor *c. l. p. 39.* ad miliares istas sub cute glandulas, per transversum excurrentem ner-

Tom. II. Pars 2.

vum hiare, asserit: præter alios usus, ob id primario, ut excretionem per dictas glandulas, nunc eas stringendo, aut laxando, certâ ratione moderari possit.

§. 7. Sed in coarctationis vel relaxationis hoc negotio, tam glandularum, quam tubulorum excretoriorum, fibræ istæ cutaneæ non nisi instrumentaliter se habent, ipso impetum faciente, spiritu sc. influo, speciatim animali dicto, ceu principali agente, id muneris exequente: unde & vel externam sensationem, vel internam imaginationem, utrobique spirituum animalium motum prævium, & ad cutim concitatum impetum, sequitur saltem talis strictura nimia, aut relaxatio. Nempe uti à spiritu animali & sanguine vitali tonum debitum seu naturalem tensionem obtinent, indeque & irritari passivè ab objectis minus proportionatis, & simul iisdem reniti activè valent; ita etiam huius toni ratione & ipsa cutis, ejusque pori, vel arctius stringi, vel laxius dilatari possunt.

§. 8. Ex quibus hætenus prolixius declaratis, vel suâ sponte patet, ex parte cutis pro sudoris transmissione hanc saltem necessariam esse conditionem, ut meatibus quibusvis & tubulis glandularum patulis, ob fibras nerveas intercutaneas relaxatas, adeoque cute existente plus minus molli, rarâ, porosâ, undique sudor, ceu per cribrum aut filtrum, excerni & transcolari queat.

§. 9. Præmissis hisce, Opium examinandum, & quid vel sanguinem alterando, vel afficiendo cutim valeat? perpendendum: quod citra ejus materialem texturam, ex seminalibus primordiis natam, & inde varias ortas proprietates, & in alia corpora respectivas actiones, exactè evolutam, fieri haud poterit. Offert se hic in primis expertus per ignem Philosophus, Helmontius qui *Tr. Duumvirat. §. 8. p. 275. se in Opio salem acrem sudoriferum, & amarum oleum invenire; longè ab Opii odore recedens, at tamen soporiferum*, asserit, quod repetit *Tr. de Lithiasic. 9. §. 87. p. 728.* dum inquit: *quin imò nec soporiferum in Opio friget sulphur sed valde amaricat, ejusque acre est, & sudoriferum*: adeò ut 2. primaria principiata elementaria in Opio considerata sint, Sulphur soporiferum, & acre sudoriferum dictum, ex quorum alterutro vis diaphoretica derivanda veniat.

§. 10. Sanè Opium pro ratione succorum inspissatorum ex vegetabilibus gummosum concretum est, sed quod, ceu nucleum medicamentosum, resinam in se complectitur. Resina hæc est proximum virtutis, tam somniferæ quàm diaphoreticæ, subjectum, unde & S. V. mediante ex Opio extrahi, & hoc ipso, ceu appropriato in texturâ men-

[Bbbb]

struo,

struo, simul exaltari solet. Resinæ, concreta sunt singulariter concentrata, & ex pluribus diversæ naturæ minutis corpusculis invicem arctè complicatis, contextæ: Nempe quod in sicca consistentia resinam refert, hoc ferè totum per Ignem liquefactum seu attenuatum & resolutum, oleum destillatum existit. Res clara est per experientiam, quæ ex oleis destillatis per spirit. Θ i rectif. vel per ol. Vitrioli, nunc resinam perfectam, ut in ol. destillato anisi, aut pinguedinis humanæ, nunc concretum terebinthinatum, seu resinam liquidam, ut in ol. destill. terebinth. nucis mosch. juniperi, &c. representat. Sicut idem manifestum evadit, si ex lignis medicamentosis per Spiritum Vini probè rectificatum essentiam extraxeris, quæ facili labore vel cum ∇ communi præcipitando, vel Spiritum Vini abstrahendo, in resinam redigitur, ipso residuo ligno, per retortam Δ e aperto more solito destillato, nullum vel parcum Oleum suppeditante, quod alias copiosum & penetrans admodum fundebat, teste, præter experientiam, Willisio *Tr. Pharm. Ration. P. I. S. 5. c. 2. p. 214. & de Ferment. c. 2. p. 16.* Jam verò olea destillata, quæ mutata consistentiâ per aliqualem coagulationem resinas exhibent, nil aliud esse deprehenduntur, quàm Θ ia vol. à pingui occultè acido concentrata. Comprobant hoc non solum plura [nam de omnibus specialis adeò nondum facta experientia] ol. destillata, v. g. Tartari, terebinthinæ, C. C. &c. quæ mediante cum alcalibus fixis digestionem in Θ vol. abeunt; sed etiam fuligo, ex talibus oleosis maximam partem constans, Θ e vol. oleoso turgida. Nam quod sub clauso vase destillando seu per Δ m liquefendo, abit in oleum destillatum empyreumaticum, hoc in aperto Δ e deflagrando abit in fumum, & hinc maximam partem fuliginem. Hæc fuligo, præter Phlegma acidum, suggerit spiritum urinosum, & Θ vol. acerrimum manifestum, & Oleum empyreumaticum, simile oleo ex ligno aliàs destillando. Scilicet quantum pinguedinis, Θ volatile in resinam aliàs colligantis, concremando destructum fuit, tantum Θ is volatilis contagio oleoso adhuc affecti haberi potest; quantum vero resinæ attenuatæ oleo propter defectum deflagrationis haud liberatum fuit, oleum fuliginis constituit. Scilicet ut rectè loquitur Helmontius *Tr. Complex. & Mist. Elem. fig. §. 33. p. 89. Fuligo est partim Θ vol. concreti, præservatum ab inflammatione, propter ∇ e volantis commisionem, partimque est Oleum, quod evolandi celeritate combustionem præterfugit.* Tandem compertum est, Vegetabilia aromatica, & quæ per vesicam simplici destillatione Oleum destill. suggerunt, eadem

fermentata subministrare illorum loco spiritus ardentes, seu olea attenuata, & in essentiali Phlegmate soluta; putrefacta verò suggerere Θ ia vol. urinosa, satis copiosa, istis animalium Θ ibus vol. similima, oleosa nempe pinguedinis resolutæ per putredinem, adeoque sic simul acidi enervati occasione. Uadeò ferè concludendum videatur, Resinas & oleosa essentialiter non nisi consistentia differre; utraque verò esse Θ ia vol. oleosa, seu olei beneficio, ratione occulti hujus acidi, paulò intimiùs concentrata.

§. 11. In simili concreto resinoso cum consistat vis opii, tam andyna, quàm diaphoretica, dividere illud, & utrique effectui distinctum suum efficiens tribuere satagit Helmontius, ut ex supra allegatis manifestum est, adeoque sulphuri vim somniferam, Θ i vol. acri sudoriferam, adscribere. Equidem negari haud potest, Θ ia vol. præsertim oleosa, potissima esse, & efficacissima diaphoretica, eoque potentiora, quo aciora & penetrantiora, quæ effectivè sanguinem alterando, & quasi dissolvendo, sudoris rivos profundi faciunt, ut supra §. 3. insinuatum fuit, & per experientiam hætenus confirmatum. Sed pro hoc effectu requiritur omninò determinata, eaque tanta eorum dosis, quæ universæ massæ sanguinæ ad plures libras ascendenti, vel immediate, vel (si hoc minùs placeat) mediatè (per præviam fluidorum in primis viis alterationem) alterandæ, plus minus sufficiens: quæ ad gr. xv. & \mathfrak{z} j. subinde ad $\mathfrak{z}\beta$. extenditur: sed Opii, sive crudi, sive quocunq; modo preparati, dosis medicamentosa (nam de consuetudinis legibus & alimenta & medicamenta multipliciter determinantibus, non attinet dicere) ultra 2. l. 3. gr. ad summum haud extenditur, rarò siquidem hanc superare solet Medicus, sæpius infra subsistere, cum .vj. grana funesta admodum observata fuerint. Sanè, sicut non intelligibile esse, rectè Helmontio dicitur, *Tr. Duum-Viratus §. 5. quomodo unicum opii granum, sat frigoris in stomacho causetur, satque vaporis actualiter frigidi in caput egerat:* ut nempe ex Veterum quorundam asserto somnum inducat; ita pariter haud conceptibile existimo, quomodo unicum alterumve opii granum, etiamsi purum Θ vol. esset, sanguineam massam quocunq; modo alterare, & sudorem provocare possit; Nisi continuato diutiùs opii usu successivè alteratio quædam sanguini, & inde derivatis cæteris succis, inducatur, ratione cujus ad sudoris vel urinæ uberiores dimissionem plus minus disponatur: uti exempla à Willisio adducta, *Pharm. Rat. p. 1. S. 7. c. 1.* ostendunt.

§. 12. Accedit & hoc, quod ipsum proprium

natum opium necessariò quasdam, plus minus tamen, in viis primis subeat alterationes, tam in Ventriculo quam duodeno, unde si non infringi, certè non exaltari continget efficacia. Hinc enim quorum stomachus acidum digestivum intensius spirat, minus ab opio alterari solent, quia hoc magis subigitur, vel ab acido quasi caltratur. Unde nec adeò commodè Opium, quamvis humorum acrimoniam corrigere vel infringere dicitur à Sylvio *l. I. Prax. c. 15. §. 26. 27. 37. & 48.* obstante exilitate doctos, quo notabili adeò effectu, etiamsi repetitis quoque vicibus propinandum foret. Ut taceam alias rationes à Willisio *P. R. Vol. I. §. 7. cap. 1. pag. 291.* allatas.

§. 13. Haud equidem me latet, minima ut plurimum maximorum morborum esse initia, & mole minimum corpusculum maximos effectus præstare posse, attestantibus id apertè, alia ut taceam, venenis, in minimâ mole pernitiem universo corpori minitantibus, confirmantibus hoc contagiis, sub minimo & nullo perceptibili sensuum miasmate universam corporis œconomiam turbantibus; tam acutos quæ excitant morbos, ut febres malignas, quam quæ chronicos, ut in lue scæ & scabie manifestum est: Ita è contrariò & minimum subinde est medicamenti, à quo maximus & insignis effectus pro universi salute dimanat, quod sub reliqui corporis cortice, tanquam exilis, utut pretiosissimus nucleus est reconditus. Sed iis remediis, quæ alterando contenta corporis, & sanguineam massam in crasi & consistentia solitâ (saltem ad tempus) immutando, operari debent, idque corporali seu materiali sui miscelâ ac contactu, qualis modus in opio, ratione \ominus is sui volat. acris, putati sudoriferi, omninò requiritur, ista minimorum, quâ talium, maxima agendi potentia minus applicari potest. Talia enim minima agentia operantur saltem, vel quatenus vi alterativâ & plus minus fermentativâ immutare contenta, vel acutissimâ sui texturâ irritare sensibilia solida possunt. Neutrum opio convenit: non irritat, sed irritationis sensum potius tollit: non fermentat, quia nullum talis effectus vestigium in corpore observabile ejusque contentis est. Adeoque ad agentia ista maxima, sub mole minimâ, referri n. equit.

§. 14. Equidem inanis videri posset ille labor, qui virtutes operandi ex certis ingredientibus seu partibus integralibus concretorum investigare satagit, cum qualibet proprietates rerum, & inde agendi qualitates, tam occultæ dictæ, quam manifestæ putatæ, fluere è gremio seminis, rectè dicantur ab Helmontio *Tr. Progym. Meteor. §. 28.* unde

Tom. II. Pars 2.

etiam non nisi à feminali virtute, tam vis soporifera, quam diaphoretica opii, derivanda erit, unde etiam feminalem dormitivam vim opio adscribit is ipse *Tr. Natur. Contr. Nesc. §. 37.* Sed utut agens feminale in minimo fundatum sit, cum sui corporis saltem 2800. pars esse dicatur; tamen cum ens materiale revera existat, adeoque & generalissimis materiæ proprietatibus omninò obnoxium sit, (formali licet agendi potestate in concreti generatione instructum,) prætereaque corporum genitorum proprietates quæcunque, non nisi materiæ speciatim contextæ beneficio, immediatè explicentur, ac ex speciali tali materiæ texturâ immediatè fluant, & non nisi ab illa proxime dependant, pro ipsius quoque principii feminalis conservatione certam materiæ, cui inest dispositio, seu textura materialis requiratur, quâ destructâ, & ipsa vis feminalis perit, unde Δ feminum destructor dicitur Helmontio, forsan quod feminale concretorum principium non nisi sub sulphureo delitescat tegmine, proximè ab Δ e quod retextitur: ipsæ denique rerum multiplices, tam specificæ seu singulares, quam pluribus aliis communes, pro concreti textura materiali plus minus mutata & alterata, etiam & ipsæ mutabiles existunt. Sane ob dictas causas vis corporum operativa non nisi in certis materiæ, ex quibus constant, particulis, specifica harum textura, proximè investiganda venit, utut originaliter virtuti feminali omnia ista adscribenda veniant. In Opio ergo, utut cum tota papaverina planta, & quibusvis ejus partibus, tam solidis quam liquidis, & quibusvis earum proprietatibus, à feminali potentia vis sudorifera & soporifera omninò dependeat, tanquam à primo efficiente, proximè tamen in materia feminali seu formali per feminale ens facta textura, utraque consistit. Unde etiam pro mutatione texturæ illius Opii specialis materialis, secundum simplices mechanicas aliasve communes modificationes, ab aliis agentibus factas, tam vis sudorifera, quam anodyna, v. g. castrari per acida, aut nonnihil mitigari & corrigi per alcalia afolet.

§. 15. Cum itaque Opio nullum jus sit alterativum in sanguinem, pro eliciendo sudore, proximum est, ut consideremus, quâ ratione cutim pro sudoris adjuvandâ excretionē afficere valeat. Quo in negotio alius superest nullus modus, nisi ut tubulorum excretoriorum ac pororum aperturam, glandularum laxitatem, & hinc cutis raritatem promoveat, adeoque nervosorum flaminum relaxationi inserviat. Jam verò ex supra ostensis *cap. 1. §. 10.* manifestum evadit, opium nullam partem solidam quâ talem, adeoque, nec cutim, in excretionis negotio adeò

[Bbbb 2]

nota-

notabiliter afficere possè, adeoque nec fibrarum laxitatem, nec earundem contracturam efficere, cum huic operandi modo & rationes eadem, quæ modo contra ejus in sanguinem activitatem allatæ, repugnent. Necessariò ergò sequitur, cum ipsum cutis reticulum afficere nequeat, nec contenta fluida alterare, in spiritus animales, fibras cutis vario tono moventes, opium saltem agere, & horum adeò ratione, sicque mediante saltem fibrarum laxitate, hinc cutis mollitie, laxâ glandularum spongiositate, & tubulorum excretoriorum aperturâ, sudoris profusionem præstare.

§. 16. Suprà scil. explicatum fuit c. 1.

§. 12. Opii usû certam spiritibus animalibus quasi segnitiam & torporem, indeque in movendis partium organicarum fibris languorem induci, quo ipso vel spontè sequitur, eodem remedio & fibroforum cutis itaminum tonum & tensionem adeò relaxari, ut flaccidiore hinc redditâ cute, & copiosius emulgere ex M. S. glandulæ, & uberius per tubulos excretorios excernere valeant. Paucis ut rem explicem, Opium per accidens, aperturam pororum sudatoriorum procurando, uberiùs sudoris profluvium emanare adjuvat.

§. 17. Ut assertum hoc nostrum pateat clarius, somnus in confirmationem ejus accedat, qui promptissimè sudores profluere facit spontaneos, etiam in iis, qui vigilantes tale quid haud sentiunt, aut interdum non absque labore & difficultate elicere valent, utut quasvis alias excretiones sistere soleat, ut jam supra monitum. Languet in somno spirituum impetus visque eorum elastica, unde debiliori radio emanando, & saltem motibus sic dictis naturalibus pro necessitatis vitalis saltem urgentia inserviando, minus tendere ceteras motrices fibras pro motu animali in partibus, præsertim exterioribus, valent, indeque tardiores fluidorum motum localem hoc ipso procurant, qui utut cesset quibuscvis aliis in locis; per apertiores tamen nunc cutaneos meatus, ex remittente fibrarum stringentium tono, uberius profluit, & sudoris latice corpus largiter irrorat. Somnum talem arte conciliant opiata, unde clarum erit, quod & ejus consequens, sudoris profluvium, modò contenta fluida ritè ad talem excretionem disposita fuerint, parili ex ratione superveniat. Hinc scil. opiatorum ex usu sudor emanare vix observatur, nisi somnus illorum effectu vel obrepat, vel debita saltem quies aut indolentia, aut lassitudo quædam corpori ejusque partibus, conciliatur.

§. 18. Illustrant præsens negotium similes spontanei syncopizantium pariter ac

agonisantium sudores. Utut enim ex sanguinea massa non æquè hi elici solcant, cum morientium sudor, Autore Helmontio, *Tr. Latex Humor Neglect. non sit tam latex in sui natura, quantum ros alimentarius resolutus, cui mors imperat, quod patet; nam statim corporis habitus fidit, prout & in syncope.* Quod pariter de pavidorum & perterrefactorum frigidiusculo madore pronunciandum. Non tamen, nisi ex pororum hiatu, à fibrarum relaxatione nimia spirituum moventium, sive illas tendentium ex defectu, spontanei hi sudores erumpunt. Nempe jam olim Hippocrates *f. 5. aph. 71.* annotavit: *quibus arida & dura cutis obtenditur, sine sudore moriuntur; quibus vero laxa & rara, cum sudore vita defunguntur.* Hinc istis & urina interdum involuntariè profluit, aut alvus absque præviâ admonitione secedit. Iracundis ex opposito, vel furiosis, sudor nullus, spirituum ob concitatiolem impetum, & fortiolem fibrarum tensionem.

§. 19. Parili ex ratione, & magnis in doloribus præsertim capitis, aliarumvè partium vel sensilium, vel cum nervoso systemate singulariter consentientium, observavi, corpore etiam quieto existente nullum sudorem prolici potuisse, nisi forsan perniciosum, & quasi symptomaticum, eumque vel parcum vel saltem particularem. Non secus enim atque talibus occasionibus, ex continuatâ spirituum agitatione ac motu somnus impeditur, etiam non interrupto eorum in quaslibet partes, adeoque & cutis porosa stamina influxu, fortior horum tensio, tubulorum sudatoriorum oclusio, & inde sudoris suppressio secutæ fuerunt.

§. 20. Ea, quæ nos ambientia sudoris profluvium evocare solent, modo dicta roborant. Eminent hic calor ambiens, tam stragulorum, quam hypocausti, aliove artificio inductus. Fundit equidem hic ipse & rarefacit corporis fluida, & ita ad excretionem sub sudoris forma, eadem potenter disponit. Sed hæc ratio sola haud satisfacit, quin considerandum simul videatur, caloris titillantem quasi motum in tantum suavitatis conferre cutaneis fibris, in quantum molestiarum à frigore patiuntur: uti itaque hujus occursum irritatæ fibræ tendi, hinc pori quilibet occludi solent; ita illius gratâ applicatione demulceri sentius, indeque relaxari istæ, & ita sudoris portæ aperiri denuò videntur. Madeat enim, & tantum non diffluat sudore corpus sub stragulo, simul atque aëri liberiori hoc ipsum expositum fuerit, dictum factum, in naturaliter se habentibus obturari sudoris fontes videas, utut internam sanguinis fluctuationem, tam fermentativam, quam

quàm progressivam, pulsus adhuc commonstret, quam aura ambiens frigidior tam citò alterare non valet. Blanditiæ è contra moderati caloris, uti amicæ sunt universo systemati nervoso, cujus frigus inimicissimum existit; ita ejus occasione minus tendi, potiùs relaxari plus minus videntur fibræ etiam intercutaneæ, & tali occasione sudor promoveri.

§. 21. Par ratio est illius Phœnomeni, si sub sudorum effluxu manus vel pes denudetur, & exponatur frigori, non rarò sudorem breviter evanescere observamus in reliquo corpore, aut notabiliter subinde saltem imminui. Contrarium fit in difficiliùs paulò sudantibus, quibus calida, v.g. later calefactus plantis pedum admotus, mirificè sudorum proventum adjuvat. Scilicet mirabilis est membranarum universi corporis inter se, speciatim cutis cum omnibus suis partibus, consensus, continuatam quaten⁹ constituit telam, unde unâ ej⁹ extremitate affectâ sensibiliùs, & reliquam texturam simul idem quasi sentire & pati observamus. Sanè dum febrilis horror frigusque universam cutim convelli aut crispari facit, tamen ol. destillat. caryophyll. epigastricæ saltem regioni illitum, mirum levamen, & in universa corporis peripheria horrorem remissionem, procurare solet. Aut ergò per consensum partium quarundam circa ista præcordia universa cutis febrili rigore rigit, aut per consensum certè talium partium solum illitarum curatur. Plantarum præsertim pedum miras cum universo systemate nervoso & partibus membranaceis quibusvis notatur consensus, dum pavimento frigido inambulantibus, aut alvum laxari, aut intestina torqueri contingit. Caput etiam cum imis his partibus conspirat, unde & illorum noxam caput sui dolore, quasi lugere videtur, cum pediluvia interdum hujus dolorum leniant, & suavi somno temperent. Prout ergò consensus talis ratione cum brachio aut pede benè malevé affecto reliqua cutis vel blando vel molesto sensu afficitur, etiam vel relaxari hinc sudoris tubuli, vel claudi & stringi solent plus minus; accedente tamen simul ipsorum corporis & contentorum sensili plus minus alteratione, & hinc pro transudatione faciliore vel difficiliore dispositione, cum externa ista æqualiter ferè tam nervosas extremorum partes, quàm qui per eas ex arteriis in venulas circulator, sanguinem afficere videantur.

§. 22. Corporis quies quantum ad sudoris provocationem per medicamenta instituendam faciliorem necessaria sit, ex eo patet, quod inquieti qui sunt ægri, & membra totumque corpus inconditè jactitant, nunquam sudoris effluxum experiantur, et-

iam post generosissima propinata remedia. Crebriori enim istâ jactatione membrorum, & multiplici ab objectis externis toties mutatis simul impressione, inæqualis spirituum provocatur motus externam ad corporis peripheriam, quorum impetu stringuntur pori, & clauduntur sudatorii tubuli. Quicquid autem ab opiatas conciliatâ faustus ut plurimum sudoriferorum sequitur effectus. Optimè memini, Expertiss. istum Practicum, B. D. Michaelis, in febribus malignis, si inquieti sint ægri, diaphoreticis & alexipharmacis Opiata & addidisse, & ejus imitationem nobis suasisse, quod feliciter tunc operari observentur sudorifera. Hinc memoranda est J. D. Horstii *Judic. de Chir. Infus. §. 17.* sententia: *in febribus malignis petechialibus, variolis, &c. Opiata utraque paginam absolvunt, & gravissimorum autorum consensu & experientia multiplici constat, maxime palmarium Robur Theriacæ &c. accedere Opii miscela.* Nempe ut modo laudatus Vir dixerit: *Opiatorum Sulph. à quo spirituum motus efferos, & concitatoris sanguinis turbas, frenandi, domandi & sopiendi vim obtinent, feliciter sudorem desideratum conciliat.*

§. 23. Negari equidem nequit, sub fortiori corporis motu vel exercitio sudare omnes profusissimè: sed dispar planè hujus in sanis, ab illo, qui in lectis ex ægris eliciendus, sudoris est ratio. Ibi rapidissimè circumrapta & attenuata sanguinea massa vincit fibrarum cutanearum, intensiore calore suaviter affectarum, & copiosiore humore irroratarum, mediocrem resistantiam, spirituum copiis in musculis, tam cordis quàm artuum movendis, magis occupatis, unde nil miri, si copiosius effluat sudor. Aliter longè cum ægris vel lecto decumbentibus res se habet, in quibus minor impetus spirituum ad musculos, major ad fibras membranaceas & intercutaneas, in illis præsertim ægris, in quibus systema nervosum magis affectum à fermento febrili, v.g. cum inquietudine & jectigatione, fibras undique stringit, de quo infra pluribus.

§. 24. Illustrant hætenus dicta non mediocriter ea, quæ circa urinæ excretionem & hujus pathemata quotidie ferè in Praxi observabilia sunt; sicut aliàs urina & sudor in pluribus conspirare, & unius suppressionem excretio alterius quasi supplemento certo excipere solet. Nempe quod urina interdum supprimitur, aliam nullam ob rationem, nisi quod pertinacius stringantur renum nervi, & hinc quasi corrugentur eorum fibræ, & occludantur transcolatoria oscula, quo spasmo ex opiatorum usu remittente & hiant denuò

[Bbbb 3]

meatus,

meatus, & ordinariò tramite transcurrit urina. Notabile hujus rei Phænomenon observari subinde licet in calculosis, quorum altero affecto rene, & à calculo in pelvi hærente interruptâ urinæ viâ, & alter socius ren bene valens officium negligit, adeò ut penitus hinc sequatur urinæ suppressio: id quod & Forestus *l.* 24. *Obs.* 26. hujusque schol. observavit, pariter ac curiosum occurrit exemplum in *Act. Med. Haf. Vol. 4. Obs.* 33. *p.* 102. Ad sympathiam seu ad consensum partium mutuam referre hoc solent Practici: idque meo judicio, rectè. Sed quid est sympathia Græcorum, Latinorumve Consensus, inter partes corporis mutuus, quàm quòd parte unâ p. n. quid sentiente, alia idem sentiat? sensationis omnis externæ quidem, qualis hic saltem locum habet, subiectum sunt fibræ nervæ: harum ergò ratione pars parti consentire, seu idem omninò sentire videtur. Scilicet Consensus, seu in sensatione quædam communio, præsupponit sensum; sensus verò præsupponit fibras nerveas seu organa sensûs: adeoque consensus propriè dictus est simpliciter ratione nervorum; impropriè dictus verò est, qui ex metastasi variâ vel causarum occasionalium vel productorum morbosorum oriri solet. Renes ergò cum nervos, sensationis organa, habeant, partim utrinque ex propriis renalibus plexibus, partim verò simul ex plexu mesenterii maximo, Fallopiano aliàs dicto, conf. Willif. *Anat. Cereb. & nervor. Tab. II. p.* 263. sanè hujus ultimi ratione facilè unius renis affecti & hinc irritati nervorum spasmus seu crispatura convulsiva alterius renis nervulis communicari, & hinc utrinque idem effectus fibrarum & meatuum renalium contracturæ excitari potest. Nam parili ex ratione & renum calculum Vomitus, & Iliaca convulsiva tormina, non rarò comitari solent, ac contra: conf. Drawizius *vom Schmerzmachenden Scharbock. Tit. 9. p.* 370. Sed remoto calculo, & cessante irritatione fibrarum nervearum in renibus, vel sopito aliquandiu per opiata malo, & urinæ redit transitus, & melius hinc habent agri. Lucem hinc acquirunt observationes istæ, non curiosa magis quam elegantes, de usu Opii diuretico in ascite, aliàs seu lethali hoc in affectu proscripti, relate à Bartholino *Cent. 3. Epist.* 46. *p.* 192. & *Ep.* 49. *pag.* 201. cum quibus conf. simul Willif. *Pharm. Rat. P. 1. f.* 7. *c.* 1. *p.* 302. Nempe talibus in casibus non aliâ ex ratione urinæ promoverunt fluxum, quàm vi suâ, ut vocant, anodynâ, spirituum sufflaminando impetum, fibrarum nervorumque renalium spasmus inhibendo, & hinc per apertiores redditos meatus urinæ fluxum procurando: sicut in ultimo Willifii

exemplo, (propter internam successivam forsan contentorum alterationem) sudor & urina in desperato hydropico promanantes ex Opii usu, unam eandem efficientem causam, tam per se, quàm per accidens, talem agnoverunt.

§. 25. Occurrit pro dictorum confirmatione phænomenon, quod superioribus annis in mercatore hujus loci haud ultimæ notæ observare contigit. Laborabat hic ipse gravi dolore lumbari in latere sinistro, ad vicinam regionem se extendente, & protenso simul deorsum ad pubem, rodente, urente, & miserè torquente, interdii ferè quiescente, noctu verò, præsertim à media nocte, crudelius & tantum non intolerabiliter affligente, adeò ut lecto ob id surgere, & decumbulando, aliâque ratione insomnes noctes, & dolore molestissimo infensas, fallere cogeretur. Hoc imprimis notabatur evidenter, quoties dolores noctu urgerent intensius, toties urina matutina excernebatur tenuis, pallida seu moderatissimè citrina, eaque parca admodum: quoties verò vel Balnei & dulcis tepidæ, vel anodynæ Opiati usu, nox quieta absque dolorum urgentia procuraretur, urinæ manè insequente intensius tinctæ, rubicundæ, cum copiosis Sibus crystallisatis Urinalis parietes incrustantibus, visui occurrebant: sed recrudescuntibus doloribus mox urina pallida, tenuis, pauca manè viscebatur. Nullus aderat calculus. Oriebatur saltem malum ex Sibus scorbuticis acido-Sis, renes & vicinas membranosas partes rodentibus. Fibræ ob id partium vellatarum spasmus crispatæ, & contractæ, pororum angustiam inferebant, quas non nisi latex urinarius solus, absque contentis seu imbibitis Sibus, pertransire poterat: ast si Balnei vel Opii usu laxarentur denuò fibræ, & patefcerent renales meatus, Sibus scorbuticis saturata transmittebatur urina. Verissimum scil. est, ex affectu spasmodico à Sibus scorbuticis, nervoso generi insensissimis, adeoque tam in partium urinaryarum, quàm abdominis doloribus, præter alias occasiones suppressi posse urinam, ut accuratè hoc annotavit Drawizius, *l. supr. cit.*

§. 26. Videntur sufficere pro confirmatione partim, partim pro illustratione asserti nostri, Opiata sudoris profluvia excitare ratione spirituum animalium, sistendo illorum impetum, undecunque excitatum, & hinc tollendo spasmus seu contracturam fibrarum nervearum cutis rete ex parte componentium, adeoque removendo pororum constrictionem, & valorum glandularum intercantarum excretoriorum occlusionem, sub quo tranquilliori spirituum motu, & pacatior status in tota Republica microcosmica observabilis

vabilis est. Remittente enim undique fibrarum, ceu staminum partium solidatum, aut fundamentalium, aut compositionem mechanicam saltem firmantium, tensione fortiori, permeabiliores undique fiunt meatus, etiam alias exilissimi, promptius faciliusque quaquaversum penetrant contenta liquida quælibet, & perspirabilius universum sic reditur corpus. Ipsum sanguinis Nectar vel febrili turgescencia & quasi ebullitione rapidius per vasa raptum, aut fomentorum ac stragulorum calidorum applicatione notabiliter alteratum, & ad sudoriferi laticis dimissionem dispositum, sub tali corporis statu (sub quo & nimia effervescencia acutiori sub febre conturbant totam ejus massam, moderatio ordinariò observatur) liberiori motu undique corporis perrepat latebras, speciatim intercutaneas in glandulas serosam sarcinam, & hujus sub involucrio quælibet heterogenea separata, & quasi ex ejus massa præcipitata recrementa, copiosè disponit, quæ sudoris in rivulos pederentim concrefcit & effluit.

§. 27. Saltem quâ ratione & modo in spiritus agant Opiata, ita ut sub exigua adeò sui mole insignis sequatur alteratio in toto illorum systemate? inquirendum superest. Asserta & explicata fuit superius textura Opii pinguis seu oleosa vel sulphurea, quæ pro more concretorum oleosorum, speciatim oleorum destillatorum, in minimâ mole latissimè diffusiva existunt: declarat hoc v. g. ol. destill. anisi, ritè cum vitello ovorum subactum, cujus quot sunt guttæ, tot ferè & simpl. mensuras odore, sapore, & nonnihil colore, imbuere solet. Tale ol. est saltem resina vi Δ liquefacta, & à crassiore reliquo corpore separata, qualis resina condensata adhuc & ita concentrata viget in Opio, cujus oleosæ resinæ ratione quoque latissimè diffusibiles & explicabiles existunt Opii atomi seu minima, quæ dum in minimo undique se diffundunt, ferè odorum instar latissimè se explicantium, undique penetrantium, & obvia quæque plus minus afficientium, se habere videntur. Unde etiam probabile videtur, ab odore tali subtilissimo, qui solidas partes minùs tactu ob subtilitatem afficere, liquidas ob perexiguam molem minus alterare valet, saltem subtilem & delicatam spirituum texturam, ab odoriferis omnium maximè alterabilem, affici, & mutuâ utrorumque associatione notabiliter immutari. Odorifera hæc Opiatorum vis sensibiliter se explicare observatur, sub ejusdem secundum Langelotti methodum in *Epist. ad Curios.* præparatione, & quasi fermentatione. Nec ignota fuit veteribus, cum jam olim & Dioscorides illam observavit, de Opio referens, odorem ejus toto corpore expandi.

§. 28. Subtilissimorum talium odorum vis tantum non sensibili effectu se extèrit in summè debilitatis, & lypothymicis, quos odor vini generosioris, vel cujusdam aromaticis, & Cinnamomi penetrantioris, tantum non ad vivos revocare videtur. Pariter atque zibethi moschivè odor hypochondriacæ suffocationi obnoxias mulieres repentinâ syncope exanimat, quas castorei plumarumvè incensarum odor volatilia denno restituit, utut insigniter ægrarum idiosyncrasia hic varient. Odor dico, quatenus spiritus animales in Odoratus corporeo organo sensibile afficit, stupenda talia concitat symptomata. Tantum enim abest, ut in substantiis assumpta talia hostilia sint istiusmodi scæminis, ut etiam Paroxysmos hystericos dictos efficaciter sistant & refrænent. Comprobat hoc Experimentum Horatii Augenii Medici olim Eruditissimi, quod refert *l. 12. Epist. 7.* quodque cum nunquam fecellit:

℞. *Mosch. opt.* gr. v.
cinam.
caryophyll.
nuc. moschat. à ℥i. M.

In Vîno odorato hauriantur: in quo loco etiam pilulas de moscho, ceu præsidium efficacissimum commendat. Sed cave sis, ne fortè nares feriat talium Odor.

Sanè umbilico illita zibethum vel moschus Paracelsò ad hysterica talia mala, laudantur. Plura quoad odorum mirabilem efficaciam vid. apud Helmont. *Tr. Imag. ferm. imprægnat.* §. 16. & seq.

§. 29. Præstant tam singularia odores, dum per organorum sensilium transfennas taliter spiritus afficiunt, quid non facient propiori sub contactu ac miscelâ, si invicem coire illis datum fuerit. Utroque modo efficaciam suam exerit opium. Quoad internum usum res aliàs nota est; externè turundæ in formâ granum unum atque alterum laudari naribus inditum profundissimum bidui somnum inferunt, teste Timæo *Cas. l. 2. Casu 9.* ut taceam poma somnifera, spongiæque hypnoticas, naribus pro arcendâ agrypnâ identidem admovendas, Præcticis quibusdam usitatas. Sub tali ergò odore subtilissimo Opiata agunt in spiritus animales, quorum materialem texturam seu constitutionem, indeque dependentem impetum elasticum speciali suâ textura seu seminali dote, ut alii vocant, adeò alterant, & quasi irritant, ut à debitis expansionibus remittentes, minùs fibras sensorias aut motorias tendere sustineant, quia moderatiori sub motu somni larvam induunt.

CAPUT

CAPUT III.

Dubia nonnulla diluit.

T H E S.

Opium subinde Vomitus provocare, secessum & Urinam promoveri, Lochiorum fluxum adjuvare, sudores suppressere, Crises minus impedire observatur. &c.

§. 1.

Somno tam naturali, quam Opiatorum artificiali, quasvis excretiones, adeoque & vomitus sisti, supra innuimus, experientia quotidiana confirmati. Obstaculum non leve contra assertum hoc se offert ex eo, quod post opiatorum vespertinum usum vomitus matutinus, quin & interdum alvi fluxus, infecutus fuerit: id quod & Helmontius, non leviter aliàs Opio favens, observavit, *Tr. Jus Duumviratus* §. 62. & crebriori experientia in hoc confirmatus fuit Rolfinkius *Chym. l. 4. §. 3. c. 6. p. 248. Conf. simul eleg. Observatio Celeb. Wedelii, Opiolog. l. 2. §. 1. c. 5. p. 92.* Sed conciliatio apparebit facilis, modò consideremus, opiata irritationis sensum, in pyloro præsertim sopiendo, & spirituum animalium motum sistendo, adeoque fibrarum spasmus præcavendo, per se Vomitus compescere; per accidens verò interdum, saltem ubi priores istæ operationes jam cessaverint, eundem stimulare.

§. 2. Considerandus hic venit opii sapor amarissimus, acris, in subjecto viscidissimo hærens, qui ob id non nisi difficulter ex lingua, post levem etiam gustatum, elui potest. Amarietas ista singularis & specifica uti inimica existit linguae, ita hostilis admodum est stomacho, alias quævis amara, speciatim viscida, horrenti, cum acidis inprimis delectetur. Tetrum illum saporem mox horret Venter, & nauseam hinc concitatam, sive gustatum saltem sive assumptum fuerit Opium, tædium istud confitetur. Parili ferè ratione atque rhabarbari, aut aloës, scamoniivè odorem & saporem amaricantes singulariter mox nauscat stomachus, adeò ut quasi peculiarem tactum sive gustatum secundum Willisium *Pharm. Rat. P. 1. §. 2. c. 1.* vel odoratum juxta Helmontium, *Tr. Cust. Err. §. ult.* habere videatur. Nausea ista sopitur quidem aliquandiu primitus, quousque nempe Opii in spiritus viget actio, indeque & sensibilitas fibrarum ventriculi, & spirituum movendi eas nixus aliquantisper sufflaminantur. Ast si particulae istæ hostiles interea haud correctæ aut subactæ fuerint, sed viscidioris illa texturâ pertinaciùs agglutinatae hæreant adhuc interiori nervæ ac admodum sensibili ventriculi tunicæ, facile molestæ istius continuæ

impressionis occasione provocari spirituum impetus, & sub regimine pylori spasmus ventriculi, adeoque vomitus, concitari potest. Confirmat hoc meum assertum non leviter, quod ab Opio pilulari in formâ exhibito, & præsertim ab eodem spiritu vini saltem præparato, vomitus inprimis cieri observavit Wedelius *Opiol. c. 1. p. 92. & 93.* Viscidissimam enim & amarissimam sub hac præparatione opium retinet texturam & quæ pilulari in formâ diutiùs in ventriculo hæret, & non nisi successivâ dissolutione corrigitur, adeoque diutiùs parietes illius membranas afficit. His modò dictis socianda simul & alia concausa, qualitas nempe & situs recrementorum præter naturalium, circa primas vias plus minus stagnantium aut turgescientium, qui mediante Opii operatione in spiritus, in motu suo plus minus oppressi, illa cessante denuò, & interdum atrocius quam antea commoti, simul vomitus in stomachante jam ventriculo promovere solent.

§. 3. Sanè non leviter hostile videtur ventriculo Opium, cujus ut digestionem ordinariò turbare observatur, ita etiam gravaminis ac compressionis circa ventriculi regimen, sensum, & vix explicabilem ab ægris molestiam circa præcordia, Opiata inducere solent, idque præsertim sicca in formâ, omnium maximè pilulari si propinentur. Manu ergò hæc ipsa nos ducunt ad legitimam Opii, quoad hoc punctum, correctionem ac præparationem. Textura nempe viscida & glutinosa resolvenda, adeoque, quatenus oleosa seu sulphurea ad faciliorem sui diffusionem, simulque quasi promptiorem diffinitionem redigenda, & liquidæ essentiae seu Tincturæ sub formâ propinando. Promptioris sic operationis evadit remedium, & quod sine diuturniore in spiritus actione confortativi potius, quam stupefactivi rationem habebit, ac absque singulari ventriculi, primarum viarum molestia, citò, tuto & jucundè curabit. Quas intentiones haud melius assequi possumus, quam applicando generalia ista mechanica (si non semper Naturæ, revera tamen) artis instrumenta, acidum & alcali. Illud agendo primariò in alcalinas Opii particulas, & hinc etiam in oleosas, illarum medio universam ejus texturam alterando, urinofum nempe vol. figendo, oleosum verò condensando, castrat & plus minus enervat generosam aliàs medicamenti energiam: Idque eò magis, quo potentius acidum fuerit, quale istud mineralium esse solet, unde acetum destillatum saltem in hac præparatione aut citri succus eligendus, utpote ex eadem cum Opio, vegetabili nempe profapiâ. Parilis acidorum vis & in purgantia obvia, quæ omnia ab acidis, præsertim intensioribus aut.

aut fixioribus, castrantur insigniter. Præstat ergo pro supra insinuato scopo ad laudani ex Opio præparationem adhibere alcali quodcunque fixum, v. g. \ominus Tart. seu generalem omnium vegetabilium deleteriorum aut Oeconomiae nostrae hostilium, tam solutivorum, quam stupefactivorum, aliorumve correctorem. Agit scil. hoc ipsum, sive humidâ in viâ procedatur, in opii texturam resinofam, attenuat hanc ipsam nonnihil, dissolvit oleosum, viscidum incidit, acidum temperat, hinc nimiam acrimoniam corrigit, acita totum concretum promittit solubile & undique diffusibile, uti & cuivis fluido permiscibile reddit. Corrigitur hoc ipso simul acris & nauseosa ejus amarities, mitiorque & minus inimica ventriculo redditur; adeo ut considerationem ulteriorem mereatur omnino, utrum acrimonia ista resinarum, aromatum, purgantium, &c. non secus ac opiatorum, non ex acido potius, quam ex alcali, derivanda veniat? Cum quotidie observemus, olea destillata à calcinatis rectificatione mitiora & minus acia evadere. Correctum sic per alcalia Opium, optimè spiritus vini beneficio in essentiae Tincturæve consistentiam redigitur, commodè vel sub hac facie propinanda, vel imbibendo eadem pulveres qualvis, in pulveris larva obvelanda, aut spiritus dicti abstractione in extractum redigenda. Sunt nonnulli, qui ulterius \ominus Tartari, vel \oplus Vini, vel ipsum Vinum, addere amant, pro exactiori Opii correctione, methodo omnium certissimâ, quâ optimè præparatum Opium turissimum evadit remedium. Vereor autem ne nimis cicuratum Opium debilioris aut tardioris pro vehementius interdum urgentibus symptomatis operationis fiat. Dum ergo tam laudabiliter corrigitur Opium à \ominus Tartari fixo, quid non sperandum erit de eodem volatilifato, penetrantioris omnino & potentioris hinc activitatis? Cujus locum interea suppleat \ominus Tartari, triplo olei destillati terebinthinæ probè imprægnatum, & ita quasi elixatum. Præparatio reverà, quæ non absque præmeditata ratione primitus ordinata fuit à Starkey, peritissimo Chymiatro Anglo, & crebriori postmodum experientiâ confirmata, plus omnino in recessu habet, quàm ut obiter à Willisio *Pharm. Rat. P. 1. f. 7. c. 3.* ad empiricorum remedia referenda sit.

§. 4. Quæ modò de Vomitu, Opiatorum usui interdum supervenienti, explicata fuerunt, eadem pariter excretionibus per inferius guttur, aliquando ab Opii usu observatis, mutatis tamen mutandis, applicari possunt. Sed præter aliqualem ab acrimoniâ nauseosâ in particulis ejus viscidis intestinorum stimulum, alio modo alvi solutionem pro-

movere potest, quatenus in dolorosis intestinorum pathematis, eorumque fibrarum spasmodicâ contractura, constringi pertina-cius solent intestina, & contenta minus, cessante ferè successive eorum peristaltico motu propellere. Frustra sub tali articulo propinantur solventia alvum, quæ vel malum exasperant sensili stimulo absque desiderato effectu, vel inverso penitus superiorum intestinorum motu, vomitum potius provocant. Sin verò Opio leniantur dolores, ut remittat inde fibrarum spasmus, & durius antea emolliatur quasi abdomen, facile solutiva quæcunque, sive junctim sive seorsim modo dicta remedia propinentur, speratum sortiuntur effectum: id quod in Colicis & Iliacis pathematis probè observandum, docente hoc experto Wedelio *Opiolog. P. 2. f. 2. c. 5. p. 120.* & Praxi item confirmante in *Misc. Acad. Nat. Cur. Anni 2. Obs. 238. p. 340.*

§. 5. Urinæ excretionem, eamque post eam, quæ fit per sudorem, Opiatorum usui subindè supervenientem, uberiolem, quomodò per accidens promoveat Opium, jam supra §. 23. c. 2. pluribus explicatum fuit.

§. 6. Revocant hæc in mentem istud Phænomenon, quod persæpius in puerperis observare datum fuit, dum nempe primis duobus vel tribus diebus liberè fluunt lochia, quæ sub turgescente in mammillis lacte sponte, absque manifesta causa alia, sive præcesserit lactea febris, sive non, supprimi solent, tunc scil. temporis, dum dolere & tumere, simulque indurescere solent mammae: sed cessante dolore, & vel insensibiliter translato aliorum lacte, vel sensibiliter per papillas transudante, liberè fluunt denuò Lochia. Nempe doloris occasione intensioris in sensibili illo mammarum globo & turbatur spirituum ordinatus motus, stringuntur undique in corpore fibræ, & tenduntur simul uteri ejusque membranosa vagina fibrillæ, hinc excernendorum per hæc loca debitus supprimitur fluxus, qui largiter redit, simulac cessante in mammis dolore, cessat etiam fibrarum contractura. Nec est, quod fluidorum istorum impetum ex locis inferioribus ad mammas hic objicere velis; siquidem dum durat adhuc mammarum repletio, aut per papillas etiam lac excernitur, nihilominus, modò dolor illarum remittat, redit lochiorum profluvium. Par nempe hic est ratio, atque intensiorum post partum dolorum, quorum occasione, etiam supprimi plus una vice observavi lochia. Unde & memoratis in casibus (nisi in priori Lactea febris obstet) opiata cæteris remediis, speciatim misturæ polychrestæ ex Lap. Sr. c. aceto, additâ myrrha, permiscere fausto cum successu consuevi, cujus usu restituto spirituum motu in ordinem,

[Cccc]

& rela-

& relaxatis hinc fibris, tantum abfuit, fuppreffus exinde fuerit purgamentorum fluxus, ut aufpicatò potius redierit,

§. 7. Simile quidem obfervare licet in infantibus achoribus affectis, quibus fub dentitionis doloribus mox achores difparere folent, fuperveniente hinc febre continuâ lymphaticâ, plus minus acutâ, fubinde cum gravi tuffi, aut alvi fluxu comitata; ficut ceffantibus doloribus iftis, efflorefcere denuò aufpicatò cum febris aliorumque fymptomatum ceffatione folent achores. Nempe doloris occasione inordinatus fpirituum redditur motus, & fibræ aliarum quoque partium fenfili-um, præfertim intercutaneæ iftæ in facie, ceu proxima regione, ftringuntur, indeque achorofæ materiæ ulterior excretio impeditur, ifto, quod jam effloruerit, exarefcere penitus & decedente. Hinc turbatur fimul fanguiniftam progressivus, quàm fermentativus Motus, excernendis iftis per faciei ambitum retentis, febrili ebullitioni occasionem fubminiftrantibus, ac tuffim vel diarrhæam inducentibus, ubi de aciori illo acido Θ falympha vel ad tracheam arteriam vel in teftinorum tubulos aliquantulum excretum fuerit, donec ceffante dolore & æquabilis fpirituum redeat motus, & ordinatâ magis fermentatione fanguinis mediante particularum iftarum acido Θ farum plus minus vifcidarum fecretio, & quali præcipitatio, ac intra poros cutis per glandulas ob denuò relaxatas fibras fecretio fuperveniât.

§. 8. Tandem Opium egregium effe fudoriferum, fuprà pluribus excuffimus, dubium tamen affertum hoc reddere videntur tabefcentes. Notiffimum eft, phthificos, vel ad phthifin declinantes ægros, copiofis fudoribus nocturnis effe obnoxios, ita quidem, ut fimul atque perfectò fomno corripiantur, mox toti fudoribus diffluant. Obfervatio autem repetita in Praxi me hætenus docuit, præcaveri optimè poffe fudores huiusmodi, revera colliquativos, Opii vefpertino ufu. Aliquot faltem exempla recenfere juvat: Mulier plebeja 42. annorum pleuritide graviffimâ correpta, & jam ferè deplorata, feptimo fcilicet demum die opem meam implorans, per Dei gratiam fudoriferorum imprimis appropriatorum ope convaluit. Reftitabant autem adhuc Tuffis humida, difficilis nonnihil refpiratio, aliaque fimilis fpeciei fymptomata, phthifin minitantiâ, quæ ufu decocti hederæ terreft. & cherefolii fublata quoque fuerunt. Saltem fudores nocturni continui, pleno rivo emanantes, emaciantes infigniter & debilitantes, fupererant. Pro quibus coercendis præfentaneam Opem fenfit ex *Laud. Op.* gr. iß, cum *antihæct. Poter.* gr. xv. mifto, & fub introitu lecti poft mode-

ratam prægreffam cænam affumto, cujus ufu primitus ceffarunt ifti fudores, coque continuato penitus exaruerunt. Superiori anno Civis Academicus, Jurium ftudiofus, graviffimâ corripiebatur hæmoptysi, ipfo ex aliquot annorum tuffi humida, fpiritu minus libero, nativa corporis conftitutione, aliisque fimilibus fupervenientibus, ad Phthifin difpofito. Ufu convenientium remediorum contumax malum fævire defuit, ipfo ægro cætera commodè habente, faltem quod calor quali hæcticus ab omni pafu, cum tuffi moderata humida, copiofiffimis fudoribus nocturnis, etiam fub primis fomni horis, fupereffent. Pro quibus coercendis optimè contulit pulvis ex *arcani duplic.* ℥ij. *Lap. ær. antihæct.* *Poter.* ana ʒß. *Laud. opiat. per ferment.* gr. IV. ad V. M. pro 4. dofibus horis duabus ante cænam affumendis. Non fecus ac Viro perfectè phthifico, pro tuffi nocturna aliisque fymptomatis nonnihil coercendis præfcriptæ Pilulæ, ex *antihæct. Poter.* ℥j. *facch. Saturni* ʒß. *extr. croci.* gr. vij. *laud. ferment.* gr. iij. cum f. q. *bals. Peruvian.* in debitam confiftentiam redactæ, pro 2. dofibus vefpertinis ante cænam affumendæ, præter alios ufus & fudores copiofos noctu promanantes compescuerunt. Adeò ut talibus in cafib⁹ reprimat fudores Opium nimios, quos deficientes promovere optimè folet.

§. 9. Pro hoc Phænomeno fanè difficili dilucidando, duo præfupponenda veniunt: 1. Quod Phthifici omnium optimi Opiatorum etiam continuatum uſum ferre poffint, ut fuprà infinuat fuit, & cum eadem aliàs aliqualem languorem, & notabilem corporis laffitudinem poſt ſe relinquant ut plurimum, in Phthificis contrarium accidat, qui vegetiores exinde, & ut ipsis ſaltem videtur robuſtiores potius redduntur. Quo ipſo tamen non illos intelligo, qui jam ad extremum Tabis gradum perducti, ſupremâ ſpiritus difficultate laborant, & ſubinde ſuffocandi videntur: talibus enim narcotica omninò futura eſſent necrotica, qui in Chronico & Medicis tædioſiſſimo affectu, medio adhuc ſunt in gradu. Scilicet in præſatis Phthificis ſubtilis admodum ac rara deprehenditur ſpirituum animalium textura, unde & facilè diſſipabiles exiſtunt iidem, (indeque minimis motibus defatigantur tales ægri) & ſub ſomni præfertim quiete contratiores magis illorum radii minus extremas partes animant. Mutat autem eoſdem Opium, dum condenſando quaſi, aut figendo nonnihil, raram eorum texturam alterat, & facilem diſſipabilitatem coercet, ut vegetiores hinc reddantur Phthifici; 2. Quod in genere ad fluidorum corporis noſtri debitam in partes ſolidas receptionem, per eaſdem transmiſ-

transmissionem, uti & ex iisdem excretionem, requiratur omninò certus fibrarum nervearum, ceu staminum fundamentalium Tonus, ultra materialis texturæ rationem, à spiritibus influis in primis dependens, qui scilicet nec strictus sit nimis, nec angustatus aut occlusus plus minus poris intermediis, aut coarctatus præter modum vasculis tam trajectoriis quam excretoriis, impediatur debitus contentorum transitus, nec laxus nimis idem esse debet, ne flaccidioribus redditis partibus, aut pori meatusque earum ita permeabiles fiant, ut non tam transmitti fluida, quam spontaneo motu permeare eos undique, & ubique ceu per spongas penetrare videantur, aut orificiola vasculorum rectoriorum ex tono illo flaccidiore collabantur, ac ita debitam transmissorum fluidorum trajectionem sistant. Quibus præmissis, & ab omnibus facile concedendis suspicor, in Phthisicis tam copiosos effluere sudores nocturnos, quatenus sub somni quiete spiritus animales, rarioris, ut supra dictum, texturæ, minus irradiant partes extimas, adeò ut debito fibrarum tono conservando minùs sufficiant, unde per patentiores undique meatus, & poros partium intercutanearum, & speciatim glandularum, nutritius succus interdum ex alimentis congestus, sed ob sanguinis dyscrasiam non assimilatus, sponte suâ sub sanguinis circulo (simili ferè ratione, atque supra de syncopis monitum) penetret, & ita nec cum sanguine unitus, nec in meatibus partium solidarum debite coërcitus, promptissimè, quâ data porta, ruat, & sub sudoris facie diffuat. Compescit vero hunc Opium in Phthisicis, corrigendo istam spirituum texturam, ut Tono fibrarum conservando melius sufficiant, quo partim transmitti naturaliter queat nutritius succus cum sanguine per vascula intercutanea & meatus, ne proprio impetu elabatur, partim retineri diutius intra poros partium nutriendarum is ipse, eosdam irrorare, & nutritioni deficienti aliquantisper sic saltem succurrere.

§. 10. Dum itaque sudorem egregiè promoveat, quin & secundum superius monita nimios contentorum tumultus, quibus Naturæ Medicatricis negotium non raro turbari solet, nonnihil refrænet laudandum Opium, suspicio suboriri possit, an perpetuè sit veritatis Practicorum effatum, Opium instante Crisi haud adhibendum, quia Criticum Naturæ motum inhibere aut sistere soleat? Multa equidem de Crisibus, eaque ad pompam magis Theoreticam, quam usum Practicum facientia, hinc inde apud Scriptores medicos deprehendi solent, quæ ad nostra Climata, eorumque Incolas & horum Diætam, indeque natos affectus, minus ap-

Tom. II. Pars 2.

plicari possunt; unde etiam rari sunt veri motus Critici in ægris nostris, ut taceam incertum admodum dierum Criticorum computum, adeò ut bonus Medicus negligere debeat Crisin, ut loquitur Helmontius *de Febr. cap. XI. §. 18.* si scilicet eam possit anticipare, seu ante Crisim adventum morbum superare. Nihilominus cum ad quælibet attentum deceat esse Medicum, in acutis maximè morbis, quorum incertæ adeò sunt, Hippocrate autore, prædictiones, ne in his circa Opiatorum usum, adeò polychrestum, nocuum quid accidat ægris, omnino præcavendum. Distinctio autem motuum Criticorum observanda est, dum quædam excretiones Criticæ fiunt, mediantibus simul partibus organicis, quibus vellicatis, adeoque sensu earum affecto, & hinc peristaltico concitato motu, provocantur partim, partim promoventur per eas excretiones, & tales quasvis Crises impedit, plus minus sistit Opium, quales sunt, quæ vomitu, diarrhæa, hæmorrhagiis quibusvis accidunt, &c. Aliæ Criticæ evacuationes eveniunt sine tali partium activo & motivo concursu, per simplicem humorum concoctorum seu præcipitatorum motum transcolatorium, quales per sudorem, item per urinam, observantur, & hæc Crises minùs impedire arbitror Opium, dextrè & circumspèctè adhibitum. Quinimò promovere potius eas, quatenus graviora symptomata, motum contentorum Excretorium interdum impediunt, saltem plus minus turbantia sistere, & ita tutiorem ad minimum Crisin reddere valer. Idem asserendum videtur de istis Crisibus, quæ per transpositionem fiunt, & quibus tumores superveniunt, has ipsas, & materiæ ad sui incertis locis secretionem, & inde coacervationem dispositæ decubitus, qui impedire valeat Opium, non video. Circulari enim sanguinis motu mediante, cum omnes modò memoratæ contingant Crises, eumque rapidiorem, aut concitatiorem refrænet Opium nonnihil, hoc ipso ad meliorem cum sudore & urina excretionem, vel in apostema congestionem materiæ coctæ non parum conferre verosimile est. Intermittentium febrium quot paroxysmi, tot parvi morbi acuti, esse videntur, ordinariò ferè excretionem quasi Criticam per sudorem, interdum verò per urinam finientes, præmissum in his ante paroxysmum Opium, cum specificis antifebrilibus, ut multum minuere solet Paroxysmos, interdum penitus profligare, haud tamen sudorem in illis coërcere in fine, aut impedire observatur.

§. 11. Eo ipso autem, quod sudationem saltem promoveat Opium, rarò illo solo pro sudorifero utendum erit. Haud enim

[Cccc 2]

sufficit,

sufficit, quod Cutis Cribrum ad transcolationem per meatuum aperturam & aptam dispositionem ritè se habeat, nisi & sanguinis alteratio, ac quasi fusio, ambientisque debita temperatura, unà conspirent. Ob id appropriato sudorifero, quacunque formâ exhibendo, sociandum, & ita mutuâ unione utriusque operatio & effectus eò magis perficiendus. Opii nempe polychrestus aliàs usus ad sudorem sic specialius determinatur, sudoriferorum verò operatio, ne sit frustranea, præcavetur. Observavit hoc jam olim felicissimus Platerus, ob id *in Observat. suis l. 3. p. 633. & 727.* sudoriferis narcotica se addere ait, pro uberius sudoris provocatione. Quinimò hoc Veneranda antiquitas in Theriaces Mithridatiique compositione ac præparatione attendissè videtur, Opium insigni in dosi, cæteris quamplurimis ingredientibus, plus minùs sudoriferis addendo, & una fermentando. Sub quo fermentationis motu intestino, tam oleosæ & resinosæ plurium ingredientium, ipsiusque adeò etiam Opii particulae attenuantur & resolvuntur, ut inde penetrantiores ac magis activæ evadant, (unde & ad decennium fermentationem extendere voluerunt Arabes) quàm novum concretum ex mutuæ confermentationis unione, Θ inum vol. oleosum anodynum & sudoriferum emergit. Quod adeò rigorosè urgent Platerus *in Observ.* & Walæus *in Meth. Medendi*, ut illas compositiones absque Opio, ceu sua animâ, vi sudorifera carere asserant.

§. 12. Ex hæcenus allatis facilè est intellectu, quibus in casibus Opium sudoriferis sociandum sit? nempe quodcumque symptomata urgentia impedimento sunt, quo minus sudare queant ægri. Nullum enim symptoma urgere solet, quin spirituum animalium p. n. impetus vel causæ efficientis proximæ vel concomitantis saltem rationem habere soleat, unde de facili, occasione tali contrahi fibræ cutanæ, & coarctari excretorii pori possunt: ut taceam M. Sæ cæterorumque contentorum, vel perturbatos intestinos, vel concitados nimis locales motus, sub tali statu simul plus minus sudoris dimissioni reluctantes. Frequens scilicet causarum efficientium, utut subinde mutuo subordinatarum observatur Circulus in Oeconomiam animali, adeò ut & contentorum vitia plus minus vellicent partes solidas, quâ occasione irritantur spiritus, quorum impetus postmodum plus minùs modificat illorum motum. Qualis circulus non minus manifestus est in mutuo partium consensu, dum stomacho frequenter condolet caput, & hoc malè habente stomachus propriam subvertit Oeconomiam. Pariter & frequentissimè quibusvis urgentibus symptomatis per consensum

affecteda cutis claudit poros, sudorisque obdurat fontes.

§. 13. Varias autem inter partes, quibus consentire solet cutis, specialem sui considerationem merentur præcordia, hoc est, ista abdominis pars, quæ extrinsecus quidem regione epigastricâ & ex parte hypochondriacâ circumscribitur, intrinsecus vero stomachum imprimis complectitur, prout hodiè hæc Vox accipit solet, & à Celso inprimis *l. 2. cap. 3.* ferè describitur. Utut enim Doctissimus Fernelius *febr. l. 4. c. X.* præcordiorum nomine ventriculum, diaphragma, jecoris Cava, lienem, pancreas, Omentum aut mesenterium, simul complectatur, tamen Ventriculo ob eximium sensum, manifestum ejus cum cæteris partibus membranis consensum, primariò præcordiorum appellatio convenit; ipso ejus officio communiter superiori dicto, *præcordia* Veteribus appellato. Unde & Cellius præcordiorum dolorem stomachi infirmi indicium asserit *l. 1. c. 8.* *Hæc ipsa præcordia*, ut modò laudati *Trium Gallie Regum Archiatri* verba c. 1. mea faciam, & partes omnes, quæ circa hæc sunt, quia membranis sepiuntur, nervosque sentientes suscipiunt à sexta (secundum Veterum Anatomicorum ordinationem) *Cerebri conjugatione eximio tangendi sensu sunt prædita; Magnâ etiam societate tum principibus, tum externis corporis partibus connexæ sunt, iisque adeò consentiunt, ut affectæ mox principes partes, universumque corpus in consensum trahant.* Sic enim Vinum meracius, liberaliusque sumtum, tametsi Ventriculo nondum elapsum est, mox tamen exulceratæ Vesicæ, aut vulnerati Cruris, aut arthritidis dolorem exasperat: Ex hisce autem sedibus febrium horrores rigoresque, in quibus cutis manifestò afficitur, suscitari, eleganter idem docet Fernelius dum c. 1. ita pergit: *Sic & frigida potius liberalior corpus universum frigore horroreque concutit. Bilem Vomiturus rigescit, multoque magis, qui alienum vitiosumque cibum, velut fungos, sumsit. Rigescit & cui calidum mordaxque medicamentum ventriculum præcordiaque ferit, non minus quam si nudam cutem, aut ulcus acrius compungat, &c. &c.* Hoc quoque vel inde constat, quod si accessio- nis initio humidi fatus aptè calentes præcordiis imponantur, maxime vero Lienis in quartana, jecori in tertiana, aut cuicunque alii sedi fomes inesse deprehendatur, horrorem rigoremque leniant, quia nimirum ipsi mali fontem demulceant. Jam verò sudores non è solo corporis habitu, sed & interdum è præcordiis moveri; hinc sciri potest, quod qui vel exercita- tione,

tione, vel ☉ ardore exæstuat, si frigidam liberalius bibat, mox totus sudore diffuat, &c. &c. Hæc ipsa sanè, quæ hætenus eleganter disseruit Fernelius de præcordiorum cum habitu corporis cutaneo præsertim consensu, quotidiana ubertim confirmat experientia, & quod de fotu calente refert, comptior moderna Praxis per olea destillata feliciter præstat, quatenus ab his, præsertim penetrantioribus, v.g. caryophyll. aut macis, aut cinamomi, præcordiis illitis, fotu lateris calentis desuper admoto, rigores horroresque manifestò imminui, interdum ab iis maturè applicatis penitus præcaveri, observamus. Penetrant enim profundius talia olea destillata, & ipsum venticulum sui quasi afflatu tam sensibiliter afficiunt, ut meminere rim superiori anno crebrius vomentem ægrum, cui destillata talia oleo nucistæ expressio ventriculi seu præcordiorum regioni frequentius illinebantur, sponte sua afferuisse, se in rejectaneis illis per vomitum, linguæ judicio exactè sentire linimentum illud, cujus odorem sub illinitione aliàs perciperet. Jam verò in istis rigoribus horribusque cutanearum fibrarum contracturam, clausuramque pororum simul contingere, nemo facile dubitabit.

§. 14. Prout itaque diversimodè afficiuntur præcordia, etiam ipse habitus corporis cutaneus per consensum multipliciter constitutus, adeoque ad sudoris transmissionem magis minusve dispositus erit. Mirabilis sanè est membranosi generis in universa corporis machinâ connexio & consensus, mutuaque hinc, quoad tam actiones quam passiones conspiratio & concentus, iis in casibus, in quibus anatome nondum lucem subministrat sufficienter, adeò obscura, ut etiam ignotam actionem regiminis ingeniosissimus aliàs Helmontius fingere coactus fuerit. Ex quo consensu etiam nasci videntur horrores isti rigoresve, qui ex partium membranosarum abscessu, sponte suâ rupto, ordinariò ægros affligunt, ruptique abscessus haud postremi indices sunt, membranæ scil. perforatis, pus factum effudentibus, sicque sensibilibiter læsis, cætero membranaceo genere consentiente. Sed ut revertar in viam, illa inter pathemata, quæ ex præcordiorum consensu sudoris effluvia cohibent, eminent, vel maximè inexplicabilis ille circa præcordia seu stomachi regionem molestia, seu anxietates, quas vulgò *Derbens-Angst* appellant, quasi ipsum cor pateretur primario; quæ frequentes videntur occasione pororum contracturæ, sudorisque ob id deficientis, in morbis præsertim acutis malignis. Sæpius scil. in Praxi malignarum febrium observamus, æstuante maximè corpore, ægro ipso copiosius biben-

te, stragulis etiam cooperto, cum pulsu celeri, frequenti, plus minus vehementi & magno, (ut nihil dicam de illis, qui malignis in febribus, quoad urinam, colorem, &c. sanorum similes apparent) nullum sudorem, etiam post propinata sudorifera, elici posse, cute semper squalidâ & aridâ, ac quasi nonnihil corrugatâ existente, ægro aliàs naturali in statu facillimè sudante. Jam equidem concedendum est, alteratum his in febribus esse insigniter sanguinis statum, impediens plus minus laticis pro sudoris materia secessum: quod tamen hæc sola in tali ægri, præsertim siticulosi ac bibacis, statu tali cum pulsu, &c. causâ sit denegati penitus sudoris, equidem persuadere mihi haud possum, quin potius arctior fibrarum cutanearum strictura, & hinc pororum clausura, videatur sudorem impedire. Nempe ventriculo, ejusque superiori orificio malè affectis, speciatim fermento maligno, contagioso obsessis, ut anxii, inquieti, & agrypni, sine manifestâ causâ redduntur ægri, ita tantum non integrum membranofum genus consentire, hinc & cutaneæ fibræ contrahi videntur. Diffusio verò ulterius maligno fermento, & systema nervorum plus minus afficiente, eo magis & nervea cutis compati, hinc portas quasi undique claudere, & sudori quoque transitum parrinaciùs denegare pergit. Unde fermento maligno, quod acidum statuit, ab ðialibus fixioribus absorpto, relaxari pororum contractura, corpusque denuò transpirare, non ineleganter asserit Tachenius: *H. C. cap. 21. p. m. 165. 167.*

§. 15. Sed quod de præcordiis, fermento venenoso in febribus malignis obsessis, modò monitum fuit, cujus hostili præsentia anxietates ipsis ægris non explicabiles, inquietudines, agrypnia, excitantur, & per consensum hinc pororum corporis contractura inducitur, ulteriorem postulat explicationem. Nempe præ cæteris affectibus perquam contagiosæ existunt maligniores febres, quæ contagia fermentativa, vel fermenta contagiosa, utrumque rectè dici videtur, quæ inspirationis medio ut plurimum se nobis insinuant, quasunque etiam alias corporis partes afficiant, semper simul ventriculo communicantur, indeque nunc citius, nunc tardius, pro circumstantiarum tam in agente quam patiente differentiâ, nausea, inexplicabilis quædam circa præcordia molestia seu anxietas, alvi etiam constipatio, sitis intensa, vagus, utut primitus leviusculus, horror, (ut taceam cephalalgiam & agrypniam, nunc citius nunc tardius supervenientes) ægrum affligere solent, horrente universo systemate inimicam impressionem circa stomachum factam, & quasi undique

[Cccc 3]

contra-

contrahente ope motoris spiritus quosvis meatus, quo ab hostis peregrini insultu commelius se tueatur. Contagiorum hunc afficiendi modum expertus insinuat Lindanus, *Disc. super Hartm. Prax. Chym.* dum inquit: *Ita autem propagari contagium ego experimentis didici, tam in me ipso, tam in aliis; Miasma scil. fuisse primum attractum in ventriculum, & statim nauseam subsequutam. Nauseam autem supervenire est bonum; signum enim est, non statim transire ad massam sanguineam; & in constitutionibus epidemicis notandum, neminem nauseare, (nisi forsan ex ingluvie) nisi qui miasma acceperit, & si adest nausea, mox vomitus provocandus.* Hinc etiam febrium malignarum sedem principalem in ventriculo esse, res confessæ est apud Bartholinum *Cent. 3. Epist. 42. pag. 156. pariter ac apud Helmontium, Tumul. Pest. p. m. 843. 967. 891. Conf. Bartholinum Cent. 3. Hist. 68. 80. 50. item Diemerbroeck de Peste. l. 4. Hist. 15.* adeo ut semper ferè in febribus malignis ventriculus vel escharam vel inflammationem, vel alia hujus census contraxisse, observatus fuerit. Propterea etiam tam in malignioribus, quàm peste ipsâ, si contagii suscepti suspicio sit, initium curæ à vomitorio optimo cum Consilio instituitur. Sanè si ægros tales in morbi progressu anxie-

tatibus, inquietudinibus, jectigationibus, cephalalgis, &c. affectos interroges, in quam corporis regione ita malè habeant? *wo ihnen dann so angst und bange sey / epigastrium intento digito monstrant, & hoc ipso Medico insinuant, ventriculum imprimis pessimè affectum esse, per cujus consensum & capitis membranæ tendi, caputque hinc diversimodè dolere videtur: qua occasione & cutis contrahi pori sudorque suppressi, probabilissimum est.* Exinde enim in variolis, purpuris, petechiis, &c. anxii & hinc inquietis existentibus ægris, vix ac non nisi imperfectè, cutaneæ excretiones succedunt. Nempe ut membranæ sub epigastrio partes tendi ex fibrarum irritatarum spasmo tali sub statu solent, quod ipsi interdum fatentur ægri, *es sey als wann alles darum voll sey / und thone /* ita & per consensum cæteræ membranæ partes tendi, ut supra ex Fernelio deductum fuit, hinc & cutis pori simul per tensas & contractas fibras coarctari solent. Pro quibus symptomatis mitigandis Opium optimo cum consilio selectis additur, vel sudoriferis, vel alexipharmacis, de quocum supra jam actum fuerit, vela hîc contrahimus, & dissertationi præsentì imponimus

F I N E M.

DISPUTATIO VIII.
EXERCITATIO THERAPEVTICA
DE
PRÆCIPITANTIUM
vero USU, feroque ABUSU,
Examini Publico exposita
à
MICHAELE ETTMULLERO,
Phil. & Med. Doctore, & Facultat. Medicæ Assessore,
d. 1. Julii, Anno 1681.
RESPONDENTE
M. JOHANNÉ WILHELMO PAULI,
Lipsiensi, Medicinæ Baccalaureo.

Q. D. B. V.

Duplici basi rectè superstructa esse dicitur ars Medicinæ nobilissima, *Experientiæ sc. & Rationi.* Id quod de Praxeos non solum operosis valet tentaminibus, sed quicquid Theoriæ in eadem ex Naturali præsupponitur scientia, cujus quasi complementum Præcticum ipsa existit, dum, quicquid elegantissimè primitus construit Natura

tura in Microcosmo, id imitari quodammodo sub hujus artificiosa conservatione & redintegratione satagit, id omne pariter, iisdem Experientie & Rationis necesse est, innitatur fundamentis. Experientia enim Magistra ista est antiquissima, quæ necessitatis durissimo urgente telo, invenit primitus, quicquid in arte Medica deprehenditur, excuditque artem, exemplo monstrante viam. Ratio verò perficit ulterius, dum moderatur illius dictamina circumspicere, allucetque facem. Utrique insistant Medicus necesse est. Experientia sola inflat, & temeraria ut plurimum est, citra rationis Regimen. Ratio cæca est penitus & nuda, raseque Tabulæ similis, nisi ab experientia instruat. Illatio nidum, quia arrogantem, ut in empiricis, hæc timidum, quia incertum, ut in methodicis, reddit Medicum. Neutrum ipsi congruit. Experientie irrationalis prius, posterius rationis in expertæ indicium est. Ibi enim, dum non bene rerum ponderantur momenta, quod solius rationis est, temeraria arrogantia & jaçantia enascitur, inanisque pollicitatio, in hoc ferè Medicum talem beans, quod nesciat, quantum nesciat. Hic verò, dum cautè nimis, vel minima attenduntur, nec usu rerum ejusmodi defectus, & crebriores hæsitantiæ suppleantur, hæere ubique ꝓm, adeò, ut vel nimium agendo, nihil agat, vel minus agendo ægrum perdat. Timiditas equidem impotentiam, audacia verò ignorantiam artis significat, Autore Hippocrate de Lege. Sit ergo, pro re tamen nata, audax Medicus cum ratione; sic enim in subitaneis casibus, maturato consilio, in dubiis ancipiti potius, quàm nullo auxilio, in desperatis, tentativo molimine quodam, aliis forsan ægris profuturo, suum quod est, aget. Errant adcoque qui solum experientiam sequuntur, quod circumforaneorum ac agyrtarum, uno nomine, innumerabili ferè Medicastrorum turbæ proprium, & ignorantie comes est. Sed heu! quàm difficilis est in Medicina firma experientia, & cui tutò fidere liceat, & quàm infidus experimentorum successus, idque jam olim sobriè expendit sagacissimus Boyle de Insido Experimentorum success. pag. 119. Errant pariter, soli qui rationi litant, hac in pluribus cæcutiente, & veritate in puteo Democriti profundissime toties demersâ, crebrius aberrante. Unde non rarò vel ineptas, subinde ridiculas, rerum causas proferunt, vel Dæmoni Autori effectus naturales impiè adscribunt, quorum rationem ex præconceptis sc. suis hypothesebus reddere nequeunt. Rectissime ergo Septalius in Animadv. & Caution. lib. 1. §. 24. pag. 8. Nec ratione in curandis morbis solum nitatur, nec usu, aut nuda experientia. Claudicat enim Medicus, alterutro horum crure destitutus. Ratio igitur ab experientia incipiat, & in eam etiam desinat, experientia autem ducem habeat rationem, & in eam denique terminetur: utra enim per se indigens, altera alterius auxilio eget. Minores tamen ferè Empiricorum errores esse solent, quàm isti Methodicorum, qui nocentiores, ut eleganter exposuit Sylvius l. 3. Præceos, cap. IV. §. 59. pag. 163. Adeò ut subinde præstet, sæpe numero etiam necesse sit, pro Praxi feliciter exercenda, ut in Empiricorum castra, circumspicere tamen, aliquamdiu se conferat Medicus, in casu sc. quo rationis certioris aut evidentioris destitutus est adjuumento. Siquidem pro curationibus etiam feliciter perficiendis tam accurata Theoretica notitia, & profunda Physices cognitio, aut æconomiae animalis subtilis adeò perscrutatio, haud æquè, saltem non absolutè, necessaria est, quin sine his in arte sua excellere queat Medicus. Pari omnino ratione ac expertus nauclerus magneticæ acus beneficiorum navigationes etiam in remotissimas regiones auspiciatò instituit, ut ut nec ferri, nec magnetis naturam perspectam, aut directivæ illius in acu virtutis originem, causamve adhuc vel Eruditissimis dubiam, cognitam habeat: Nec, qui Automata conficit Artifex, virtutis elasticæ in spirationem aut fundamenta novit, ut ut totum ipsius huic innitatur opificium, quàm prout diversimodè determinare novit, opus nunc magis nunc minus artificiosum producit. Ut tacem, non semper adeò accuratam haberi posse cognitionem sui Objecti à Medico: id quod vel solæ subinde ostendunt idiosyncrasie uniuscujusque hominis, à priori sanè simpliciter imperscrutabiles, quas si cognoscere potuisset Galenus arrogans alias, & multum ab Hippocratis modestia alienus, æqualem se Æsculapio censuisset, ut ipse de se testatur. Hec sanè, alias ut taceam, causa est non ultima, quæ in quavis medicatione aliquid empirici semper occurrere facit. Præstat ergo experientia ratione illustrata, rationi per experientiam confirmatæ: hic enim præconceptarum opinionum, quarum mira est potentia, metus semper intercedit, dum omne, quod ratio possidet cognitionis cujusvis, simpliciter experientie acceptum ferendum est. Hec est, quæ Præcipationem ostendit primitus in Artificialibus: hæc est, quæ Præcipitantium usum monstravit in morborum medicationibus: rationis jam est, limitare debitè eandem, & subjectorum ac affectuum diversitati prudenter applicare, ut hujus manu ductione legitimus eorum ac rationalis pateat usus, & evite-

evitetur cautè empiricus eorumdem abusus. Id quod dum docere satagimus, Divini Numinis, seu summi Archiatri, auxiliatrices devotè invocamus opes.

CAPUT I. HISTORICUM.

Præcipitantium Remediorum in Medicinam Introductionem, eorumdem abundantiam & scopum, recenset.

§. 1.

ὄργας-
μος
humorum
quid?



quis alius, sanè aph. 22. f. 1. Hippocratis, à quibusvis Medicis, praxin præsertim exercentibus, maximi semper habitus fuit, dum eo ipso triplicem partium corporis contentarum fluidarum, sive humorum statum, scilicet, ὁμότητος, πῶμα & ὄργαςμος insinuat, in acutatum februm curâ attentè observandum. Oraculum appellavit modò laudatum aphorismum Galenus, & in ejusdem Observationem felicitatem, quâ in curandis ægris per 40. ferè annos fruebatur, maxime referre solitus est Septalius Mediolanensium Poliater, in animadvers. & caut. l. 3. §. 48. pag. 70. Quod speciatim ὄργαςμος attinet, consistit hic ipse in impetuosiori humorum & notabiliter exorbitante motu, tam intestino, quàm progressivo, ita ut p. n. quasi effervescentes, simulque tumultuosè per valâ & conceptacula sua delati, horrendorum subinde symptomatum occasionales causæ existant; Unde non ineptè ab interpretibus Latinis Turgescentiæ inprimis, hinc & Ebullitionis, fermentationis insignioris, & tantum non Effervescentiæ nomine vertitur: Alii ferociam materiæ morbificæ vocant; Poterius l. 1. febr. c. 37. p. 49. turgentis i. e. furentis materiæ impetum, appellat.

ὄργας-
μος
unde di-
ctus, &
quid pro-
priè signi-
ficet.

§. 2. Equidem τὸ ὄργας Græcorum, indeque descendens ὄργαςμος propriè, anxiam animalium & is appetentiam & furibundum in eandem impetum, quâ determinatis anni temporibus agitantur, summeque irrequieta redduntur, innuit, in quâ auræ genitalis acrioris & volatilioris ratione, præter genitalium pruriginosam titillationem, & hinc libidinosos & is stimulos, sanguinis & aliorum fluidorum turgescentiâ & impetuo-

fiolem agitationem ac commotionem, spirituum concitatiores impetum, intensiorem corporis æstum &c. patiuntur. Paucis negotium hoc expedit accuratus aphor. Hippocr. interpres Holler. Comment. in aph. Hippocr. f. 1. Aph. 22. p. 80. Verbum turgere, ὄργας, translatum ab animalibus, libidine titillatis, quæ ob concubitum desiderium stare loco nequeunt.

§. 3. Analogum quid, quoad sanguinis nimirum turgescentiâ, experiuntur foemina, menstruationis tempore, in quibus occasione auræ fermentativæ, à genitalibus inspiratæ, rarefcentis, & præter ordinarium modum turgentis, ac tantum non ferventis sanguinis impetu, dolor dorsi & circa spinam lumbosque pulsatio, ut & distendens molestia, artuum tensiva lassitudo & gravitas, dolor capitis, hypochondriorum inflatio, & inprimis ejusdem per uterinatum arteriarum anastomosin excretio, excitantur: quâ undecunque impeditâ ferociens sanguis, quâ datâ portâ, per nares, os, oculos, aures, mammarum papillas, umbilicum, pedum pollicem, vesicam, & nescio quæ loca alia? impetuosè proruit. Ut taceam menstruam febrim in quibusdam, dum lunare persolvunt tributum, observatam; Refert Lindanus: in Coll. M.S. sup. Hartmann: se nosse matronam, jam vetulam, quæ quoties menses accederent, febrem trium dierum pateretur.

Similis
observa-
tur in
menstrua-
tione mu-
liebri.

§. 4. Orgasmus talis metaphoricus, sed p. n. cum non rarò morborum sub motu, præsertim februm, in corporis fluidis observari soleat, appellationem similem, & hic adhibuisse placuit medicis. Prodit autem se manifestissime per varias tam excretiones quam translationes symptomáticas dictas. Humor enim æstu orgasmi modò in hanc modò in aliam partem insiliens, nullo subsistit loco, donec tandem irruptione factâ in aliquam nobiliorem partem exitialem inferat vitæ calamitatem, ut loquitur Poterius c. l. Unde & materia turgens, quæ stare loco nescit, quibusdam definitur: Vid. Castro: Quæ ex quibus

Ob simili-
tudinem
pariter ad
p. n. hu-
morum
motus ap-
plicatus.

bus *l. 2. c. 1. p. 67.* aliis humor mobilis instabilis, ferociens, &c. appellatur.

Causa Orgasmi humorum in genere est acrimonia eorum nimia.

§. 5. Turgescentia talis humorum, & inde ferè oriundæ translationes & excretiones symptomaticæ, sequuntur in genere nimiam materiæ occasionalis acrimoniam, tam benignam, quàm malignam; sive enim ex aucta effervescentiâ contentorum, sive ex irritatione partium continentium, & hanc insequente concitatori motu locali contentorum p. n. sive ex utroque derives turgescentiam & agitationem istam humorum, sanè ubique principale peccans erit acrimonia nimia. Scilicet non moventur suoapte impetu contenta fluida, sed per meatus canalesque consuetos, celi organa, fibrarum eorundem ministerio, & spirituum moventium potentiâ, tam naturaliter quàm præternaturaliter feruntur. Utrobique præsupponitur stimulus, qui sub humorum Orgasmo est in ipsis contentis, quæ potentiæ Hippocraticarum beneficio, cum saltem activæ existant, intemperatura eorum, cujus ratione nos lædunt, nil aliud erit, quàm acrimonia nimia.

In specie fermentum acrum volatile.

§. 6. Pressius ut loquar; fermentum acidum volatile acrius, (plus minus tale, sub morborum inde oriundorum latitudine) tam benignum, quàm malignum, sive intus (aut objecti, aut efficientis vitio) ex assumptis genitum, sive extrinsecus inspiratum, vel aliunde contagii nomine susceptum, origo est orgasmi cujusvis humorum p. n. hoc enim aut texturam sanguinis sive crasin temperatam pervertendo, aut chylum & lympham exasperando, aut bilem vitiosè aciendo, aut spiritus influos inquinando, primò motus horum intestinos, tam absolutè quàm respectivè tales, (in relatione nempe fluidi unius ad alterum, eorumque mutux miscelæ) p. n. vitiat, & in turgescentiam ac commotionem, effervescentiæ plus minus similem, concitat, hinc tam acrimoniæ quàm turgescentiæ humorum respectu partes continentis sensiliores irritat, quâ occasione spiritus impetum faciens fibrarum ministerio contenta diversimodè ac inordinatè, subinde tumultuosè admodum agitatur, & impellit per vasa naturalia, donec facta meatus cujusdam, vel turgescentis simpliciter & rarefcentis nimis

humoris, vel impeditæ ejus undecunque fiat (nunc meatus angustati, nunc ejusdem à fibrarum partis irritatæ stricturâ coarctati vitio) ordinaria transmissionis occasione, anastomosi, symptomatica illius aut *influxus* aut *metastasis* superveniat.

Motus humorum & intestinus & progressivus junctim Orgasmi humorum ratio saltem consti-ruunt.

§. 7. Uterque scilicet humorum motus, tam intestinus quàm progressivus, junctim in constituendo Orgasmo concurrere solent. Equidem à posteriori hoc progressivo p. n. ceu sensibus manifestiori, communiter Orgasmi humorum ratio saltem desumi solet. Vid. *Plempius Fundam. Medic. l. 6. c. 3. p. 336.* sed malè. Cum hic ipse potius sit adjunctum, ne dicam effectus, Orgasmi humorum principaliter talem concomitans; Non secus ac sup. §. 3. turgescenti sanguini excretionem variam supervenire sub menstruatione plus minus p. n. insinuavimus; Aut sicut mustum, vel cerevisia novella, fermentationis sub impetu turgescent, ac ita quasi intumescunt, ut vel vasis ora impetuosè excedant, vel arctius inclusa illud penitus dissilire faciant. Sanè altius quid, quàm progressivum saltem humorum motum vitiatum, per turgescentiam insinuare Hippocrat. *cit. aph.* vel ex hoc subsumere licet, quod coctis crudisque evacuationis respectu societ turgescentes succos, & eisdem quasi medio loco, inter hos non movendos, illos verò evacuandos, collocet. Uti verò texturæ humorum respectu, & heterogenearum particularum vel arctius connexarum cæteris, vel commotionis febrilis, adeoque motus intestini p. n. beneficio separatarum ab iisdem intuitu, cruditatis & coctionis ratio habetur, non motus eorum localis, cujus modificatio artificialis evacuatoria per artem, post coctionem factam, demum instituenda venit, sicut à Naturâ tunc demum institui solet; Ita turgescentiæ nomine, primariò humorum crudorum adhuc, sed impetuosius sub suo ad coctionem motu ebullientium, adeoque motu intestino p. n. agitatorum status insinuat, cujus occasione & vitiatum progressivus motus, adeoque excretiones aut translationes symptomaticæ superveniant, interdum à Medico, Naturæ ministro, imitandæ, nunc easdem provocando, nunc promo-

[Dddd] vendo,

vendo: qui genuinus dicti *aphor.*
Hipp. sensus videtur.

In quibus
affectibus
talis tur-
gescentia
humorum
contingat?

§. 8. Utut verò Hippocrati, non secus ac superiorum seculorum Medicis, turgescencia & orgasmus talis humorum, cum eorundem cruditate & coctione, saltem in febribus, tam intermittentibus, quàm in specie continuis acutis, benignis pariter ac malignis, asserta fuit, cum iisdem manifestiora illius observentur Phenomena; ab horum tamen successoribus, hodierni præsertim ævi Medicis, etiam aliis affectibus p. n. accommodata fuit. Sic enim sodæ ardores, pariter ac hypochondriacorum & scorbuticorum Phlogoses vagæ, ac æstuationes, & singulis momentis variantia symptomata, foeminarum tumultus hysterici, inflationes, sublimesque hypochondriorum dolores, borborygmi abdominis, diarrhœæ graviores, cholera acutiores, anxietates præcordiorum, cardialgiæ contumaciores aut sæpius recidivantes, dolores partium vagi, hæmorrhagiæ effrenes, Ictericorum pathemata subinde atrocia, epileptici per consensum insultus, & plures alii affectus, ex ebullientibus, turgescantibus, & ferocientibus contentis humoribus sub theoretico illorum scrutinio, derivati fuerunt. Hæc nihilominus observanda videtur differentia, quod Orgasmus talis primariò in febribus, iisque speciatim acutis, secundariò verò etiam in aliis affectibus, locum inveniat.

Turgescentiæ
humorum
remedia
præcipitantiæ
opponuntur.

§. 9. Turgescentiæ tali humorum præcipitationem eorundem per auxilia, ab effectu supposito Præcipitanti dicta, opponere satagunt Medici, iisque minutorum symptomatum stragem maturè avertere. Unde dum crebrius ebullitio effera & turgescencia humorum accusatur in morbis, sub eorum fiendi modo frequentissima quoque Præcipitantium remedium injicitur mentio, & implorantur suppetiæ. Ast quò facilior eorundem est usus Practicus, cò jejuniùs est scrutinium Theoreticum, dum vix apud quenquam distinctius evolutum reperias, in quo operandi eorum consistat ratio? & qua methodo rationaliter administranda veniant; Equidem de posteriori hoc nullibi aliquid invenire licuit; quoad prius vero istud, mirabilis confusio, & rei aliàs minus

claræ major obscuratio saltem, observatur, dum quidam præcipitationem cum solutione, alii cum coagulatione, alii cum unionem plurium confundunt, & ita rotundis quadrata miscunt: alii affectus à suis causis, aut harum operandi modis minus distinguunt: alii Præcipitantium nomen ac usum adeo latè extendunt, ut tantum non alterantibus in genere æquipollegant adeoque lusum saltem in vocabulo committunt. Passim de eorum usu & actione, quæ occurrunt, si in pauca contrahenda sint, huc fere recident, remedia præcipitantia fermenta præternaturalia destruere, ferocientes humores quosvis, tam in primis viis luxuriantes, quàm in vasis & visceribus sanguiferis & lymphaticis ebullientes sistere, eorumque impetum sedare, & Crasin vitiatam simul corrigere, quo alterati vel naturalem in Crasin & texturam coeant mutuo, vel subacti per convenientes vias debite evacuari queant.

§. 10. Primarius Scriptorum, & fere quoque primus, qui præcipitationis & præcipitantium mentionem ac usum pressius inculcat, est Senner-tus l. 2. de Feb. c. 17. p. 259. ubi de specificis intermittantium febrifugis disserendo ita inquit: *Ut quod mihi videtur, dicam, talia medicamenta præcipitatione quadam vim illam effervescenti, & paroxysmum excitandi in humoribus tollere videntur. Cujus rei documenta passim occurrunt; Ut jam non dicam de eo, quod cerevisiæ aciescentis vitium cretâ injectâ à vulgo emendatur & acetum cretâ injectâ aciditatem amittit, ac spiritus Glicum sale Tartari mistus aciditatem perdit: manifestum hujus rei argumentum est in ardore stomachi, quem Germani den Good nominant, cum à bilis in ventriculo ebullitione vapor quidam, & flatu ardens attollitur, & dolorem ac ardorem in orificio ventriculi & Oesophago excitat. Ad quem affectum tollendum, cretam, oculos cancri, bolum armenam, & similia, quæ acris & acutis liquoribus acrimoniâ præcipitatione quadam adi-munt, usurpari, vulgò etiam notum est.* Succenturiatur huic strenuè, si quis alius Kergerus, Tr. de Fermentat. f. 3. c. 3. q. 249. & seq. *Dum optimam & omnibus febribus salutari-*
bus

A quibus
Autoribus
primus
ac maxi-
mè intro-
ducta?

bus solam sufficientem esse præcipationem, asserit, ita ut in inquinamenti febrilis sive fermenti præcipatione totius curationis cardo vertatur, unda & unico ferè medicamento præcipitante ultra mille febricitantes, sine aliis remediis, sine aliarum circumstantiarum quarumvis consideratione, curasse se asserat p. 250. In malignis quoque optimum esse, aut præcipitantia cum alexipharmacis necesse, aut istiusmodi alexipharmaca eligere, quæ præcipitandi virtute simul polleant, ut hac ratione utrique scopo, & malignæ qualitati, & fermentationi satisfiat, p. 251. Accedunt his alii: Sic enim Mynsichtus in *Armament. Medic. Chym.* p. 115. Species diacretæ Tartarum in orificium ventriculi sublimatum efficaciter resolvunt & præcipitant. Peculiarem præcipitandi furias æstuantis sanguinis vim habent oculi \mathfrak{S} r. utilissimè itaque in pleuritide iidem à Prædicis adhibentur, notante Sachsio *Gammamol.* p. 662. & 719. Oculi sive Lapilli Cancrini etiam in aliis febribus adhibiti salutem sperare jubent. Quâ ratione id præstent? si queratur, respondendum, agere id vi præcipitatoriæ, Id. p. 732. Rectè moderni medici, novosedaptissimo vocabulo operationem oculorum cancrorum, in ardore ventriculi seu solidâ præcipatione dicunt fieri: & p. 736. & 737. In dysenteria, ubi fermentatio acrium humorum pulv. testarum Cancror. in \mathfrak{H} ococ. & præp. valet, imò oculi \mathfrak{S} crudi propter bezoarticæ vi additam præcipitandi facultatem, non secus, ac ut ad eundem effectum cortices ovorum induratorum, ossa hominis philosophicè calcinata, ossa sepia calcinata, C. C. f. & c. & præp. commendantur: siccissima enim hæc omnia, imbibendo humores orgasmo turgentes sive fermentantes, acredine spoliant. Testæ itaque \mathfrak{S} , eorumque oculi in dysenteria præcipitando conducunt.

Præcipitantia ex regno animali.

§. 11. Tot autem prostant præcipitantia medicamenta, ut potius de selectu laborandum, quàm de defectu & inopiâ querendum sit: adeò liberali manu omnibus in tribus regnis polychresta hæc medicamenta nobis Natura suggerit. Animalis quidem in

Tom. II. Pars 2.

Regno quævis animalium partes duræ, ut in genere cornua, dentes, ossa & ungulæ, v. g. C. C. ebur, dens apri, cranium humanum, ungula alcis, glossopetra: Quibus etiam associantur concreta alia lapidea, in quacunque corporis parte reperta, v. g. lapides ex cysti bovis fellea, bezoardici Orientales, & occidentales ex ventriculis capricervarum extracti, & qui his vix cedit vi bezoardicâ, calculus humanus: item aliis in corporis regionibus reperti lapides, sicut mihi est lapis ex teste castoris, castaneæ magnitudinis, durus, & fortiter castoreum spirans. Marina speciatim, & omnia ostracoderma huc pertinent, eorumque testæ, aut coagulata lapidea, v. g. Ostrearum testæ & gammarorum, speciatim horum chelæ, & lapilli, oculi \mathfrak{S} communiter dicti, Conchæ quælibet, & harum fructus perlæ, cochlearum testæ, ossa capitis lucii piscis, spina mustelæ piscis, Ossa sepia. Quibus adde & Ovorum ex Volatilibus testas, & speciatim illas Struthionis.

§. 12. Vegetabilium luxuria suggerit nobis concreta styptico-terrea, ^{Ex regno vegetabili.} plus minus aromatica, speciatim cortices, ut fraxini, quercus, quajaci, & qui primo loco nominandus fuisset, corticem arboris Peruanæ, Gannaperide dictæ, qui communi nomine China Chinæ aliàs audit, cortic. Cinamomi, & quævis Canellarum species, quo & Cortex Winteranus, Anglis in scorbuti cura adeò usitatus, pertinet: it. rad. tormentillæ, fl. ros. rubr. fructus istos anomalos quercinos, gallas, it. frutices ex arboribus crescentes, scilicet visca, in specie quercinum, tiliaceum, & cæteris quod præstat, corylinum; Item Nucleos osseos, mespilorum, dactylorum, aut nucleorum esculentorum involucria, quasi ossæ, ut cortic. avellana-rum, nucl. persicorum, &c. quibus addantur inter vegetabilia & mineralia mediæ quasi naturæ, de utroque scilicet participantia, coralia quælibet, & his cognatos poros ac madreporas, quin & alcyonia, &c.

§. 13. Minerale denique regnum, ^{Ex Minerali.} ditissimos suos prodendo thesauros, subministrat quævis terras fossiles medicatas, per artem ferè sigillatas, tam Europæas quàm Asiaticas, & quæ ad has pertinent, margas, cretam, lac Lunæ, medullam saxorum, unicornu

[Dddd 2]

fossi.

fossile, bolos: Lapidēs plures minus pretiosos, lyncis, osteocollam, crystallum, Lap. calcarium, speciatim σ ialis quæ sunt prosapia, fossilia, ut hæmatitem, magnetem, rubricam fabrilē, quin & laterum coctorum pulverem; metalla ferè quælibet, speciatim σ , ejusque Θ , & hnum item \mathcal{L} & \odot , & qui integræ pharmacopœæ vices supplēt, \mathfrak{z} & δ .

Eadem
Præpa-
rata.

§. 14. Præparata horum nativorum artificialia, speciatim mineralium, sunt varia ac multiplicia: Pertinent ergò huc omnia illorum præparata, in specie sic Pharmacopœis appellata, ut Corall. Lap. σ rum, hæmatit. præp. it. omnia calcinata, ut C. C. ustum, specif. febrile Tertianarum Strobelberg. aut Crollii, calx viva lota, ejusque ∇ , it. Θ ia fixa per vegetabilium calcinationem producta, horumque σ per deliquium, aut ex iis concinnatus Liquor præcipitans Clauderi, *Tr. de Balsam. Corp. l. 7. §. 8. p. 208.* Sane ut σ tart. per deliquium appropriatum præcipitationis instrumentum quibusdam dicitur, ita idem liquor inter præcipitantia, & quæ hac in classe eminent, febrifuga pariter excellit: quin & Θ ia vol. quælibet, tam vegetabili quàm animali ex regno petita, utut aliàs præcipitantibus minus associata: ex minerabilibus Terra Θ li dulc. δ ialia fixata quælibet, simplicia & composita, electra minora quibusdam dicta, ut δ Diaph. σ iale Ludov. antihect. Poter. ut & \mathfrak{z} ialia, quæ quò magistalia, eò præstantiora: hinc quædam sublimata, ut fl. lap. hæmatit. & ex his aroph Zwelfferi *Mantiss. p. 338.* it. flores Θ * σ ial. & ex his sedativum Archei ejusdem, p. 339. ut & primum ens \mathfrak{z} is Boylei, *Usefulness. of Experiments. Philos. p. 2. f. 1. app. p. 330.* cum quo conspirat \mathfrak{z} Θ li Philosoph. Cnocelii *Misc. Acad. Nat. Curios. Ann. 6. & 7. App. p. 36. & 70.* Ut & alia præcipitata, ut \odot fulminans, & plura ex Θ e parata remedia, quavis sub formâ aut consistentiâ sit \mathfrak{z} ialia, in specie \odot vitæ dicta, plus minus composita, ad quæ & Febrifug. Riverian. pertinet: It. particulares plures, mineralium præsertim præparationes, ut tot Croci σ iales, it. Tinct. σ tis, dictæ aperitivæ, Liquor σ Oris, Θ σ compos. seu Tinct. Θ li σ Zwelf. in formâ siccâ: tot tart. Martiales, & Tinct. Martiales cum tart. præparata, ut Tinct.

σ aperitiv. Θ lata Ludovici *Misc. Acad. Nat. Cur. Anno 3. Observ. 453.* Syrupus σ tartarificatus Lemery *Chym. pag. 157.* (à Willisiano artificio σ præparandi haud multum abludens,) it. Febure *Chym. p. m. 773.* uti & tot adstringentes, quos inter eminent, quæ vulgò Tinct. \mathfrak{z} is Θ li dicitur: hinc crystalli mineræ hni, magist. \mathfrak{z} i cum spiritu \odot præcipit. Saccharum Onis, &c.

§. 15. Ex quibus simplicibus plus minus talibus ingens compositorum turba emergit, quæ tamen facilè à prudenti Medico, Naturæ simplicium gnaro, & qui eorundem ad causas morbosas applicationem artificiosam perspectam habet, ex tempore diversimodè misceri possunt. Illa inter sunt v. g. pulvis antifebriciticus perlatus Timæi, in *Medic. descript. Cas. annex. p. 425.* Species diacretæ Myns. in *Armament. pag. 114.* pulveres antipleuritici, it. bezoardici, à Sachsio *Gammærol. p. 664. & seq. it. 715.* descripti, pulv. dysentericus Crollii in *Basilic. p. 344.* tot pulveres Cachectici, basi Martis superstructi, pulv. Comitæ de Warwick seu Cornachinus, Tinct. antiphthifica, Lapis Chymicus à Glaubero tantoperè laudatus, per experientiam confirmatus, in *Misc. Acad. Nat. Curios. Anno 2. Obs. 143. p. 227.* hæmatites artificialis quibusdam non adeò ineptè appellatus; Elixir præcipitans quorundam, ex aloë, myrrha, croco, nuce moschi. c. Tincturæ tart. extractum, cui spiritus \mathfrak{z} ci cum calce vivâ & flores Martis debitâ proportionē sociantur, it. Elix. propriet. aperitivum Clauderi: *de Bals. Corp. c. 7. p. 204.* aut Essentia purificans ejusd. c. l. p. 195.

§. 16. Veteres apud Medicos nulla penitus horum Principitantium, tali quidem sub consideratione, occurrunt vestigia, cum hæc ipsa ab iisdem remedium vires saltem secundum manifestas, sic putatas, præsertim primas, & hinc secundum occultas qualitates dimetientibus, modò inter refrigerantia & siccantia, ut animalium partes duræ, tam crudæ, quàm cum aut sine Δ e præparatæ ac calcinatæ; modò inter aperientia, ut Martialia & Θ lata; modò inter adstringentia, ut cortices vegetabilium, \odot , Terra Θ li; modo inter diuretica, ut Lap. σ rum, crystallus, testæ ovorum; modò inter sudorifera & alexipharmaca,

Et com-
posita.

Quo re-
spectu à
Veteribus
adhibita
fuerunt.

maca, ut Lap. bezoardici, & fixata, Terra sigill. recensita fuerunt.

Occasione
Chymiz
magis ex-
cultæ, à
modernis
in Thera-
peuticis in-
troducenda.

§. 17. Sed cum hoc nostro seculo, Chymicorum furni intensius calefieri, & pyrotechnia studiosius excogitasset, ita quidem, ut non processuum, quos vocant, nudæ elaborationi, aut remediorum saltem præparationi, sed Phænomenon, sub concretorum syncrifi & diacrifi artificiali, considerationi accuratiori & causarum eorumdem, fiendique modi scrutinio, inserviret, sanè insigniter mutata fuit, ut totius Naturalis scientiæ, cujus Clavigera est & thesaurorum custos Pyrotechnia, ita inprimis specialissimæ ejus partis, & quæ illius Praxis quædam existit, Medicinæ facies, dum ex Concreti, secundum minima, texturâ horumque affectionibus Mathematico-mechanicis s. quantitativis actionum & passionum in corporibus vicissitudines, variæque mutationes, formaliter, ex minimorum syncrifi, diacrifi & metastasi, in genere, & ex minimis \ominus inis, ceu cæteris potioribus in specie, materialiter per motus efficientiam, clarè magis & distinctè explicatæ, & medicamentorum quoque in ægrotis operationibus applicatæ fuissent: unde fieri aliter haud potuit, quin & operationes plures artificiales seu pyrotechnicæ, ut functionibus partium corporis naturalibus, ita & p. naturalibus accommodatæ, sed & pro explicando remediorum agendi modo adhibitæ fuerint, nunc quidem dextrè, nunc verò sinistrè, ut de fermentatione & effervescencia, \triangle atione, circulatione, solutione, volatilisatione, filtratione, &c. manifestum est: quas inter & Præcipitatio, operatio si quæ alia sub chymicis laboribus frequentissima respectu alterationis determinatæ, fluidis corporis per remedia quædam inducendæ, tantum non omnium suffragio recepta fuit, & quæ præcipitationis modo, ut hinc proximè simili activa existere putantur remedia, Præcipitantia dicta fuerunt.

CAPUT II.

Theoreticum.

Præcipitantium Naturam, Usum, & operandi modum, evolvit.

§. 1.

Præcipitatio
Chymica quid
& quorū
plex?

PRæcipitatio, (quantum quidem ad præsens negotium ejus consideratio pertinet) ceu separationis qui-

dam modus, in genere accepta, opponitur propriè & formaliter heterogeneorum plurium arctiori unioni, & effectivè ut plurimum \triangle ationi: Estque talis motus, quo unita antea exactius separantur ab invicem, ita ut hæc, quæ ita separata fuerunt, proprio impetu deorsum ferantur. Arctior talis nexus & unio, cui præcipitatio opponitur, haud melius quam solutionis nomine vocari potest, ita ut in specie præcipitatio talis sit motus, quo soluta à menstrui, vel propriè talis, vel huic analogi, compedibus liberata, proprio nisu subsideant. Effectus cujus ratione & \triangle ationi rectè opponitur, utur non adeò universalis sit hic præcipitatorum ad imum descensus, quin & ad superiora interdum ferantur, pro respectivâ nempe gravitatis præcipitatorum ad corpus, cui unita fuerunt, proportionem: In Vino fermentante, eodem præcipitationis actu, & feces ad fundum descendunt, & flos spumofus, ceu cremor quidam supernatat: Sialcool Vini vegetabile quoddam resinofum, unâ cum camphorâ, infusum fuerit, pro illius quidem extractione, hujus verò solutione, ∇ x postmodum medio factâ præcipitatione camphora reviviscens summa petit, resinâ ad imum descendente. Talis tamen separatio, in quâ superiora petit præcipitatum, non nisi in latiori vocis præcipitationis acceptione locum habere videtur. Præcipitatio omnis vel perfecta est, vel imperfecta: respectu separationis est pariter vel spontanea, vel quatenus ab addito perficitur violenta: fit denique vel viâ humidâ, vel viâ siccâ; illud frequentius, hoc rarius. Sub Hni calcinati scil. cum arena vel silicibus vitrificatione, \odot & \oslash cum Hno unita præcipitantur, & \oslash is beneficio regulus ex Hio fusione separatur, & infra scorias præcipitatur.

§. 2. Fundamentum cujusvis præcipitationis in genere (prolixa doctrina in pauca verba contrahenda venit) consistit formaliter in mutatâ textura

Ejusdem
funda-
menta
mecha-
nica,

mechanica vel corpusculorum continentium (unientium, solventium, voca ut lubet) respectu particularum præcipitatarum; vel contrâ harum respectu continentium, vel denique fluidi intermedi, respectu alterutrius, aut utrorumque. Textura consistit in particularum figurâ, magnitudine, situ, ordine, pondere, motu vel

[D d d d 3] quiete,

quiete, & hinc dependente respectivâ ad se invicem proportionem, unionem & nexum, quorum uno aut pluribus mutatur subito textura & cohesio, fitque vel quarundam separatio, vel earundem in novum concretum coactio, vel aliarum plures similes mutationes. In musto, ex mutata per attritum mutuum sub fermentationis labore minorum texturâ, retentâ ac solutâ antea communi unionis vinculo plures separantur, & fecum forma descendunt, ipsis cæteris in novum concretum se contextentibus, vini nomine notissimum, & hoc omne sub specifici acidi dominio: \mathcal{C} in ∇ soluta per laminas \mathcal{Q} is præcipitatur; hæc per bacillos \mathcal{O} is, hic per Cincum, hoc per alcali fixum vel volatile: quatenus in omnibus his acidâ ∇ particulâ mutato situ & ordine promptius se uniunt cum aliis metallicis vel alcalifatis particulis, ob maiorem figurâ, magnitudinis, ponderis, &c. cum istis congruitatem, unde \mathcal{C} res sic dimituntur, seu potius ab aliis extruduntur, quæ derelictæ ad fundum descendunt: idem effectus ex ∇ falsa infusa observatur, quatenus Θ inæ huius particulæ arctè & copiose simul adhærescunt \mathcal{C} solutæ mechanicâ ex congruitate (formaliter) undè huius particulæ figurâ, mole, pondere, &c. auctæ, retineri ab istis ∇ is nequeunt, quin \mathcal{C} æ corneæ nomine subsideant. Fluidum denique, tam Δ eum, quàm præsertim aqueum, tam quantitate, quàm qualitate, aut consistentia, aut motu, secundum minimorum coalescentiam mutatum, pariter ex mechanicâ necessitate præcipitationem nunc promovere, nunc impedire observatur: dum multa in frigido loco præcipitationem patiuntur, quæ in calido, sub æquabili unionis texturâ subsistunt. Ac in magisteriorum resinorum ex Vegetabilibus quibusdam præparatione, menstruis S. V. ad medietatem abstractio prævia requiritur, si cum ∇ com. præcipitatio commodè succedere debet.

Præcipitatio in fluidis nostris, in statu sano.

§. 3. Præcipitatio, eaque tam spontanea, quàm violenta, perfecta in viâ humidâ, quin in machina corporis nostri ejusque actionibus plurimispurè mechanicis, locum inveniat, haud quisquam facile dubitabit, sive naturalem, sive p. n. consideret statum. Quæ in primis intestinorum

viis, fecum, ceu excrementorum digestionis primæ, fit secretio, haud sine præcipitationis modo, bile & lymphâ pancreaticâ mediantibus, evenire, denegatus horum succorum eò confluxus, obstructis aut undecunque impeditis excretoriis valis, & inde nata cæliacæ affectionis ista species, in quâ alvi excrementa chylosa prodeunt, persuadet. Sub sanguificationis motu præcipitantur pariter crudiores chyli partes, & \mathcal{C} is latice absorptæ, ceu excrementum secundæ digestionis, foras emissæ, contenta in sanorum \mathcal{C} is constituunt, sive separata in illo fluctuant, sive soluta in illo dispareant, facile tamen per alcalifata præcipitabilia.

§. 4. In statu morbofo totum istud materia, ut vocant, morbificæ coctionis, sub febrium, præsertim acutarum, cursu, anceps negotium, in quo & salus & interitus ægri versatur, & quod unicum Crisium, tam per ecresin, quàm per apostasin, fundamentum existit, non nisi præcipitationis spontaneæ modo, mediante commotione minimorum in sanguine fermentativâ, hoc est, acidi fermentativi saturatione, & cum aliis heterogeneis particulis ex cæterarum consortio extrusione, accidit, \mathcal{C} Phænomenis secundum tincturâ, consistentiâ, opacitatis, & subsidentie vicissitudines successivas id attestantibus. In malignis pariter, petechialibus, purpuratis, cutaneæ excretiones & efflorescentiæ separationem heterogenei & corrupti ab alimentitio & vitali præcipitatoriam præsupponunt, cum sine hac præviâ secretio aut excretio laudabilis fieri ulla nequeat; scilicet, ut paucis multa complectar, sicut in mechanicis, ita & nostro in corpore, nulla heterogeneæ materiæ, fluido cuidam commistæ, per quodvis colatorium aut filtrum secretio fieri potest, nisi eadem prius, solutâ unionem firmiori, separatam fuerit, hoc est, plus minus perfectè præcipitata in illo fluctuet. Non ineptiunt illi, considerato scilicet Naturæ motu ordinario, qui ebullitionis & excretionis tempus, in Variolis præsertim, discriminant, cum ibi fermenti acidi morbofi specifici cum corruptis sanguinis particulis saturatio in acido- Θ sum, & ex aliorum nexu exclusio, h. e. præcipitatio, hic præcipitata substantiæ intra pororum & meatuum cutaneorum impedimenta

Eadem in statu ægro.

dimenta retentio, & sic demum ex sanguine ac lymphâ secretio, obtineat; utut certis temporum ac dierum momentis non adeò strictè alligandum sit. Chronicis in morbis, cachexiis, ejusque speciebus, chlorosi, Ictero, scorbuto, & similibus, cruda ☐æ, h. e. tenues plus minus, sic crassescunt, aut turbidæ, si copiosa sedimenta seponant, & sub horum secessu ad naturalem successivè redeant faciem, præcipitatorium heterogenearum particularum ex sanguine secessum, cum euphorîâ ægri, ostendunt.

De artificiali per medicamenta est questio.

§. 5. Sed missâ istâ naturali præcipitatione, de artificiali, per medicamenta in corpore nostro perficiendâ, in præsentiarum speciatim disquiritur, adeoque violentâ, per medium nempe præcipitans externum in viâ humidâ instituendâ, plus minus perfectâ: Qualis scil. arte in *Cerevisiæ acescentis, cretâ injectâ emendatione, aut ardoris stomachi per cretam, ocul. ☉, bolum Armenam, quæ acribus & acutis liquoribus acrimoniam præcipitatione quadam* (ut vocant) *adimunt, curatione*, ut verbis & exemplis Sennerti *de Febr. lib. 2. cap. 17. p. 255.* utar, contingere putatur. Aut *quando specificum antifebrile Crollii, horam unam ante Paroxysmum febricitanti Tertianario propinatum, materiam febrilem in vasis ac cavitatibus quasi oberrantem separat, figit, & ad fundum secum deducit: Sic Creta pulverisata ardorem ventriculi compefcit: sic biliosos succos æstuantem acidum vitrioli deprimit*, sunt verba Schenckii *Diff. de Ferment. Præcipit. §. 6.*

Quæ vix locum habet in cura morborum.

§. 6. Verumenimverò, uti Naturæ opera per ista, quæ sunt artis in corpore nostro mechanico more convenientissimè explicantur, cum non solum Deus & Natura ubique geometrizent, sed talis phænomena Naturæ declarandi ratio, præ omnibus intellectui ceu clara & distincta magis, utpotè immediate sensibus connexa, apprimè arrideat; tamen non absque cautelâ circumspectâ eadem, ne apparente similitudine decipiamur, applicanda veniunt. Quod si & hoc in negotio operationis remediorum per modum præcipitationis suppositæ rem accuratius paulò considerare velimus, revera ingens disparitas mox

manifestabitur, adeò ut sæpius, si non semper, nil minus quàm præcipitatio propriè sic dicta locum obtineat, si genuinam ejus considerationem applicare velimus.

§. 7. Scilicet triplex fere casuum morboforum est differentia, quibus pro medela Præcipitantia ab Autoribus opponuntur: 1. *Humorum nimia acrimonia*, iisdem compefcenda. Triplex casuum differentia in quibus in usum vocantur.

Genuinum enim præcipitans, acida extemplo dulcificat, verius signum adduci non potest; adeo enim acerrimum hac ratione ad dulcedinem vel gratum saporem reduci potest, asserente Langio *Diff. de Morbill. Addit. 11.* Tartarum crudum acidum sunt qui mutato nomine hic accusant, coraliis, perlis, & piscium lapidibus præcipitandum & corrigendum: conf. Glauber. *P. 2. Furnor. p. 55. & 56.* Hinc scorbuto, ejusque pathematis gravioribus, ista & similia multi usus esse solent; non secus ac in hypochondriacis affectionibus præcipitando edomandis extollitur, aut in dysenteria testæ cancerum, eorumque lapilli, it. ossa humana calcinata, &c. de quibus supra §. 10. commendantur. 2. Humorum nimia turgescencia & plus minus fermentativa ebullitio aut effervescentia istis mediantibus sopienda, & inde nata æstuatio intensior temperanda. Hinc enim præcipitantia, genuina quibusdam dicuntur refrigerantia, & furias sanguinis æstuantis in pleuritide præcipitandi vim habere lapillos ☉, supra §. 10. insinuatum fuit. *Febris nulla sine fermentatione aut ebullitione existit: Hinc si v. g. nux moschata, alumen, tormentillæ pulvis, aut antifebrilis Crollii, margaritæ, coralia, lapis bezoar, lapides pretiosi, & his similia simplicia febricitantibus propinentur, quandoque accidit, ut febris desinat. Cur? quia Cæcis aut ebullitio illa per ea ita sistitur, æque ac ardorem stomachi oder die Good / usu solius simplicis Cretæ pulverisatæ sisti novimus*, ut disserit *Veteranus Practicus Pauli, in Digress. de Febr. malig. p. 92.* 3. *Fermentap. n. undecunque oriunda, contenta corporis turbantia, illorum ope subigenda, ac per præcipitationem destruenda.* Hoffmannus *in Methodo medendi p. 258. 259. existimat, omnem ferè morborum progressum vitioso*

vitioso cuidam deberi fermentorum ortui, &c. &c. In horum autem everfione tota curationis ratio confistit, &c. &c. sic v. g. in omni februm curatione antequam fermenta febrilia ebullitionis in massa sanguinea causa proxima, ut magis urgentia figenda aut præcipitanda per specifica antipyretica diaphoretica & diuretica. Sennertus pariter *Tr. de febribus miasma putredinale* & *πρωτόμα σπυριονώδης*, quod instar fermenti se habeat, quod inquinamentum febrile specifica præcipitando destruant, passim inculcat. Quibus addatur Kergerus *de Ferment. l. 3. c. 3. p. 249. dum inquit: Si verò fermentum aliquod aliunde (ut per contagium, &c.) sanguinem intraverit, fermento per præcipitationem destructo illico fermentatio cessat, &c.*

In prima
eorum
non præ-
cipitatio
sed unio
locum
habet.

§. 8. Sed rebus benè pensatis, in neutro horum casuum per remedia, Præcipitantia dicta hætenus quidem usitata, & per experientiam quoque confirmata, in eorum operandi modo præcipitatio gemina locum habet. Prima in classe acrimonia contentorum corporis demulcenda 1.) non est falsa, quæ præcipitantibus non corrigitur, quin potius oblinentia, & inviscantia, & simpliciter temperantia requiratur, ut oſa, mucilaginosa, dulcia, &c. nec; 2.) Urinosa, cui, si unquam vitiosa in nobis observata fuerit, acidis obviam eundum, non præcipitantibus. Sed 3.) acida restat, plus minus corrosiva, præcipitantibus istis emendanda, sicut *aciditatem cretæ injectæ amittit, aut cerevisiæ acedentis vitium cretæ injectæ à vulgo emendatur*: Sennertus *l. supr. cit.* id quod moderni per ova recentia feliciter quoque tentant, ab acedentia hoc modo cerevisiam præservando: Vid. *Transact. Philos. Anglic. p. 400.* Acidum nempe rodit ista subiecta, & arctè se sociat particulis illorum terrestribus, juxta axioma; spiritus acidus rodens, rodendo aliud corpus coagulatur, novæque texturæ emergit ex ambobus concretum, in quo spicula acidi ita infixæ sive incuneatæ hærent, ut minùs consuetos effectus, sive in nostris sensoriis sive aliis objectis, edere possint: C. C. ustum notabilem etiam spiritus Δ vel Θ li quantitatem imbibendo, horum acrimoniam sub nova textura penitus obliterat,

qua ratione in dysenteriis & scorbuticorum vomitibus proficuum existit: σ cum iisdem spiritibus (non secus ac cum aliis acidis, \ddagger destillato, ∇ , spiritu Θ is) in dulce concretum coit, quale & in hypochondriacis accidit, non secus ac coralia, perlæ, & Lapilli σ r. eodem modo iisdem profunt; conf. Glauberus *c. l. p. 54.* Θ ia alcalifata quælibet iisdem acidis pertinaciter adeò connectuntur, mutatâ aciditate in Θ sedinem, nunc plus, nunc minus sensilem, ut subinde vel fortissimis Δ cuneis divelli possint. In omnibus his unio potius acidi cum objecto mechanicè proportionato, quàm separatio; solutio potius, quàm præcipitatio: Nulla hic diacrisis, sed simplex particularum in novum concretum syncrasis, cujus nova textura, ab ista ingredientium diversa, novas proprietates & attributa, in specie acrimoniæ carentiam, & corrosivitatis abolitionem, ipsi communicat. Perinde autem est, sive acidum corrigendum firmiori nexu secum retineat medium præcipitans, id quod locum habet, si fortis aut concentratum magis idem existat, ut in creta aut minio \ddagger destillato injectis obvium; sive hoc tandem ima petat, illo debiliori aut aliàs minus mechanicè proportionato existente; sicuti eadem creta in cerevisia acedente cum ebulliente tumultu descendit, aut coralia in succo citri soluta pariter subsident: Ibi quidem manifesta est solutio: hic verò nulla propriè dicta præcipitatio, cum præcipitatum corpus, acido superadditum, nunquam fluido unitum fuerit, ut denuò per præcipitationem separari debeat, quin proprio saltem pondere deorsum feratur, & absque præcipitante addito cadat, cui acidæ particulæ liquoris adhærescentes pertinaciùs, adeoque unitæ per accidens unà ad fundum rapiuntur, quæ fortiores aliàs in fluore secum retinerent. Adeoque præcipitantia remedia acrimoniam humorum, simplici in novam texturam cum illis coalitu, absque formali præcipitatione demulcent & temperant.

§. 9. Prima erroris hujus origo nata videtur ex eo, quod non probè distinxerunt in solutionibus per corrosiva acia factis, addito tertio præcipitatis, 1. præcipitantis cum solvente unionem; 2. soluti inde factam separationem. Illud causæ, hoc effectus ratio-

Erroris
hujus
origo.

rationem obtinet: ibi ex nova textura acidi alteratio, de quo §. anteced. & respectiva enervatio, hic simplex soluti antea invisibiliter separatio sensibilis, & genuina præcipitatio contingit. Uti itaque in omni hujus præcipitationis specie acidi corrosivi sub præcipitatione quidem, non autem per aut propter præcipitationem, fit quasi attemperatio, ita malâ conversione in omni acrium acidorum correctione à corrigente præcipitationem unâ induci concluderunt; aut saltem acidi saturationem ab insequente præcipitatione minus aptè distinxerunt, hoc est, causam cum effectu confuderunt.

in secun-
da non
præcipita-
tio, sed
nota at-
tempera-
tio,

§. 10. Uti itaque priori illo in casu malè acrimonie corrosivæ præcipitationem opposuerunt, cum Præcipitantia dicta etiam sine præcipitatione, simplici unione, acrimoniam istam infringant; ita posteriori in casu aequè inconcinne turgescencie aut effervescencie (§. 9. ebullitioni, fermentationi, promiscuè hic vocibus uti possumus) humorum præcipitationem eorundem opposuerunt. Tantum enim abest, ut præcipitando turgescencie & effervescencie, ac dependentis inde plus minus æstuationis impetus infringatur, ut sæpissimè hic ipse intensissimus concitetur, ut in præcipit. butyri §. ii per spiritum Mi, Ori fulmin. per §. i, Ois per §. i, ac præcipitationibus tantum non omnibus solutionum per menstrua acida, ab alcalibus præsertim fixis peractis, ad oculus patet, & in primis manifestum est, in impetuosissima illa effervescencia & intensissima æstuatione, quam observare licet, si σ c. ∇ solvas, & subito ϕ tart. per deliquium affundas. Equidem cavendum monet Kergerus de Ferm. p. 139. ab illa præcipitatione, quæ non nisi fermentescendo perficiatur, quin talis instituatursaltem, quæ blandè & sine insignibus turbis fermentationem considerare facit. Sed rara est talis præcipitatio, si in fluido præcipitando acrimonie acida sensibilis deprehendatur. Jam verò turgescencia fermentativa & ebullitio p. n. contentorum corporis concitatur vel occasione peregrini fermenti, aliunde suscepti, de quo postmodum; vel occasione dyscrasie eorum & in texturâ materiali, indeque dependentibus modis qualitatis, læsionis, unde potentie eorum Hippocraticæ, quatenus debite non fue-

rint contemperatæ, sed potius per se extiterint, nos lædunt. Basis potentiarum illarum Hippocr. est acidum: hujus ergò vitio læsa crasi humorum corporis nostri, p. n. organismi & ebullitiones ac æstuationes superveniunt. Sed ut generalius loquar, nimia contentorum corporis nostri acrimonia, præsertim volatilis, intestini motus p. n. occasio existit, quæ quo major fuerit, eò intensior ebullitio & effervescencia, comitante æstu insigni, accidet. Confirmat hoc mechanica chymica, quæ eò majores effervescencias & ebullitiones exsurgere notat, quò acriora fuerint illa, à quorum miscela & intestino motu illa tumultuatio concitatur. Quicquid adeoque præcipitantia auxilia opis ferre possunt in illo orgasmo, non nisi acrius quod fuerit temperando, adeoque in specie acidum corrigendo, & ita temperatam texturam per accidens sic restituendo, præstabunt, ita ut ea, quæ antecedente §. 8. insinuata fuerunt, contra præcipitationem, & hic commodè applicari possint. Requiritur denique pro genuinâ præcipitatione mediæ præcipitantis cum liquore ebullientemiscela sub præcipitatione, sive contactus corporalis, qui quomodo locum habere queat in Mæ. S. orgasmo ac turgescencia febrili, qualiscunque etiam fuerit, per præcipitantia scil. fixa instituenda, sanè haud percipio. Nec facile quisquam putabit, bezoardicum minerale, aut antihecticum Poterii, aut δ diaph. σ iale, aut δ diaphor. ex ϕ vitæ paratum, quorundam pro variolarum curâ decantatum experimentum, aut Strobelbergeri Crolliivè febrilia specifica, pro sistendis febrilibus Mæ. S. commotionibus & turgescenciis materialiter ipsi commisceri; vel pulverem dentis apri, vel capitis lucii ossium ad ipsam M. S. usque deferri, ad corrigendam ejusdem in anginâ aut pleuritide, in specie symptomaticâ, intensam ebullitionem; aut unicornu marinum, vel crudum vel f. Δ c præp. subire miscelam M. Sex pro sedando ejusdem in erysipelate æstu: quin talia in primis viis saltem activa existunt, non secus ac Osteocola fracti ossis occal'escenciam, aut crySTALLUS lactis in mammis scaturiginem, promovent, sine eo, ut materiali sui contactu ad partes affectas deferantur. Posito quoque, quod tamen haud facile asserturum quenquam arbitror, penetrare

[Eccc]

eò hæc

eo hæc ipsa, tamen alteratio ista in primis viis, quam necesse est subeant, à sapore fermentativo in ventriculo plus minus acido ita alterabit eadem, saturando plus minus illa ipsa, ut vel enervata penitus, vel parum admodum activa nihil, quod præcipitationi vel simile, vel analogum videatur, efficere queant. Adeoque præcipitantia, saltem acrimoniæ humorum temperatione, ex mutata illorum, cum his coalitus ratione, textura absque præcipitatione, illorum turgescencias, & fermentationes p. n. cohibent.

Erroris
hujus
origo.

§. 11. Erroris hujus occasio prima coincidit ferè cum ista §. 9. insinuata: Neglecta scilicet distinctio effectus, qui præcipitantis applicationem ad fluidum, plus minus fermentans & ebulliens, immediate aut mediate, ibi per se, hic per accidens, sequitur. Sistant subinde remedia præcipitantia dicta, tam in artificialibus quàm naturalibus, nimias turgescencias fermentativas, sed non quæ talia, sed quatenus acre istud dyscrasiæ, & hanc excipientis p. n. effervescentiæ, causam materiale corrigit & temperant, ejusque impetum, & inde intestinum ferociorem motum frenant, coërcent, sine eo, ut istud præcipitando separent, aut præcipitatoriæ talis operationis ratione effectum istum exerant. Quod si vel jungatur vel superveniat præcipitatio partium quarundam, antea in concreto cæteris colligatarum arctius, hæc erunt tales, quæ passivæ potius quàm activæ in ebullitionis tumultu extiterunt, & quæ saltem acris, istas rodentis, & cum iisdem aliisque in novam texturam coalescentis, infracti, & per præcipitans plus minus enervati, compedibus sic dimissæ, proprio pondere feruntur: quod, utut propriè dicta sit præcipitatio, tamen non hujus separationis ratione fermentativa ebullitio compefcitur, utut hanc illa immediatè sequatur. Hac ratione Calce viva fermentationem Vini, & tartari fermentationem musti, cessare faciunt, cum materiæ fecibus similis præcipitatione; unde & pulv. alabastrites, silices calcinati, pumices usti, reverà Vina depurant, & partes heterogeneas præcipitando deturbant; non secus ac ovorum cortice Vinum à fecibus depuratur, præcipitatione reali, de quo vid. Bartholi-

nus *Cent. 4. Hist. 23*. In specie Θ tartari consideremus, hoc aut ejus ϕ per deliquium musto additum, fermentationem omnem ut præcavet, ita & Vino intensissimè fermentanti commistum, illico hoc à fermentatione cessare facit. Jungitur simul partium quarundam utrobique præcipitatio, quæ tamen ad effervescentiæ vel præcautionem vel sedationem nihil faciunt, cum etiam, iisdem retentis licet, tamen effervescentia cessaret: acidum nempe alcalisati illius tactu & unione intimiore, ex mutata hinc concreti texturâ, à motu impetuosiore cessat, & sic pacata quies. Ut ergo rectè Becherus *Phys. subterr. l. 1. §. 5. c. 2. p. 359. §. 23*. acescentiam pro principio, vehiculo, & effectû fermentationis statuit; ita eodem teste *c. 1. p. 358. §. 12*. ϕ aut Θ tartari cuivis fermentationi, etiam fortissimæ, justa quantitate impostum in momento fermentationem sistit. Sanè allegata modò de acido fermentationis principio antiquissima Platonis fuit sententia, cui nec illius Anatomicus, Billichius, in *Anat. Ferment. Plat. c. 9. §. 106. p. 531*. nec hunc exercens Conringius, in *Exercitat. in Billich. p. 603*. reverà contrariantur, ignem fermentationis omnis proximam esse causam, omnium qui in fermentatione apparent motuum, asserentium, considerata Δ , ceu substantiæ ab acido realiter haud distinctæ, genuina natura, & fiendi modo, à modernis aliàs prolixè explicato.

§. 12. Fermentum deniq; p. n. per præcipitantia aut corrigendum aut destruendum, sui considerationem meretur, cujus notitia, ut in Scholis olim nulla jejuniore, ita nulla utilior. Brevitati cum studendum sit, à posteriori illud obiter dilucidandum, notitiâ ejus à priori, ut intricatissimâ, ita non, nisi plurimis latius diducendis, neque id adeò facile explicabili. Minimum nempe mole, activitate maximum, aliorum fluidorum plus minus symbolizantium, alterativum sicque simul multiplicativum, fermenti morbofi nomine ferè intelligitur. Ex similitudine effectiva, quam cum pistorum fermento specialissimè sic dicto, habet, cujus parum totam massam fermentat, appellationis ratione desumpta. Unde & odorum instar subtilissimorum, summe tamen penetrantium, ferè se

In tertia præsupponitur, quid sit fermentum?

rè se habere videntur, & hoc nomine etiam ab Helmontio fermenta in genere definiuntur, quæ auræ nomine insigniuntur à Tachenio *Clav. cap. 9.* Odor vasis scil. fermentativus Vinum infusum citissimè alterat & corrumpit, quod vitium alio odore, Δ is nempe incensi, tam præservatur, quàm curatur. Odor \ddagger i, oris halitu post dentium cum eodem ablutionem lagenæ inflatus, Vinum infusum accescere facit: Mulstræ odor vitiosus, quàm citò alterat & corrumpit Lac? Florescentis Vitis aut hordei latè diffusus odor, etiam in cellis recondita Vina, cerevisiamque alterat notabiliter: Parili modo odor talis est, qui in variolis, lue $\&$ ea, febribus petechialibus, scabie, dysenteria maligna, ipsaque peste, fermentum istud multiplicativum constituit, & in contagiorum, plurium itidem venenorum, in animali regno summa potentia conspicuum se exhibet: Talis odor fermentalis est, qui in labiis vulnerum & ulcerum, alimenti in pus, saniem aliasvé sordes corruptivum existit, & in cuius correctione primarium chirurgorum versatur negotium: Talis odor est, qui febrium intermittentium & continuarum primariorum causa existit. Subolsfecit hunc ipsum jam Sennertus, cujus ævo tamen nullus adhuc, aut saltem tenuis fermentorum odor scholas medicas infecerat, dum *l. 2. de Febr. cap. 6. p. 107.* inquit? *materia, quæ feбри dat originem, initio sæpe exigua est, fermenti tamen instar in continuis, reliquosque humores corrumpendi & putrefaciendi vim habet: it. C. 17. p. 244. illud putredinale fermentum, in corpore post paroxysmum relictum, initium effervescentiæ & putredinis dat, facitque, ut materia, quæ antea in suo foco coercita quiescebat, jam veluti turgens & exardescens multum de se & tetricum vaporem diffundat.* Certè neglecta minimorum morbificorum sive fermentorum consideratio, horumque alterativæ & sui multiplicativæ potentix materialis cum producto morboso confusio- nem, & hinc inversam penitus mendendi methodum induxit. Appositè iterum Sennertus *l. 2. c. 2. p. 66.* *Habet vitiosa talis dispositio, sive misina tale se instar fermenti, & subinde plures vitiosos humores gene-*

Tom. II. Pars 2.

rat, bonosque corrumpit: &c. vide plura c. l. huc facientia.

§. 13. Fermentum tale morbosum, mole minimum, adeoque subtile ac penetrativum, hinc summe mobile, adeoque spirituosum ac volatile, & potenter activum, seu mediante determinati motus impressione, humorum, quin & spirituum ad alterationem variam dispositivum, sicque simul sui multiplicativum, saporis, aut si mavis odoris, specifici (forsan generice acidi) præcipitatione mediante, per supra recensita auxilia corrigendum, & inde concitata plus minus humorum turgescencia sopienda. Ast non video, quomodo præcipitatio in genuino sensu locum comode invenire queat, circa objectum adeò subtile, activum & penetrativum, &c.? Equidem odore contrario destrui potest idem, qua ratione odor Δ is incensi, odorem fracidum fermentativum cadi, item pestis aliarumque febrium malignarum, extinguere observatur, (quod posterius camphora videtur in nobis præstare) quatenus his ipsis, illi promptè associabilibus, textura inverti, & sic activitas ejus enervari videtur; similiter ac $\&$ ii ex Cingulo sapientix tenuis odor (ut in simili termino pergam) scabiei, universum corpus inquinantis, fermentum ulcerum, etiam quorumvis, delet & extinguit. Absorberi etiam, ut sic dicam, ab objectis appropriatis, hinc concentrari ac quasi figi, & ita activitate sua spoliari potest: qua ratione fixa ista ex marinis calcinatis, febrilia specifica, fermentum concentrando & figendo, & ita in textura quasi invertendo, operari videntur. Non enim febrili contentorum corporis commotioni sedandæ, sed fermento morbifico coercendo, quod inserviant talia, ex eo fit probabile, quod in paroxysmo, in quo formaliter urget ista commotio, serè noceant, ut plurimum febrem multiplicent, adeoque ante paroxysmum propinanda sint, ut fermento saporis acidi, (de quo vix quisquam amplius dubitat) frenum mature injiciant, & nixum ejus motivum cohibeant. Fermentum febrile præcipitare hæc, & fermento per præcipitationem destructo, illicò fermentationem cessare, sententia est Kergeri *de Ferment. f. 3. c. 3. p. 249. quod tamen durum*

Ejusdem alterativæ, non præcipitatio, locum habet.

[Eccc 2]

vide-

videtur, nisi in terminis ludat; precipitare enim denotat unum ab altero separare, quod in tali fermento febrili non contingere potest, rectè reponit Becherus *Phys. subterr. l. 1. f. 5. c. 2. p. 389.* Bezoardicum minerale pariter, seu exhaustum concretum, & acidi vol. venenosi appetens, quale in Δ examine amiserat, uti & δ diaphoreticum, (Conf. Tachenius *H. C. c. 22. p. 164.*) malignarum speciatim, quin & continuarum febrium, fermenti volatilis (plus minus acris) promptè absorptivum & correctivum videtur. Quo in puncto etiam terræ minerales suam activitatem in malignis, speciatim variolis & morbillis, extèrere probabile est. Quin imò plura morborum specifica sive appropriata remedia, hoc imprimis modo proficua videntur, quòd determinatæ suæ texturæ ratione, fermentorum speciali naturæ & texturæ magis accommodatæ, horum motum & impetum ad se convertant, & hinc in iisdem concentrata, fixata, & in novi concreti moleculam invicem juncta, fermentorum activitas enervata torpescat: sic enim cruor hirci pleuritidis; priapus Ceti dysenteriae; myrrha morbillorum. &c. appropriatum remedium existit: semen aquilegiæ, Icteri; scrophulariæ hæmorrhoidalium dolorosa fermenta; viscus corylinus & quercinus epilepsiæ; lapis spongiæ strumarum coagulativum, enervant. Quin in genere Θ ia volatil. dum v. g. febrium comitatarum dictarum præstantissima existunt auxilia, saturando fermenta horum acida, & in Θ sum cum iisdem successivè coalescendo, per \square m aut sudorem eliminandum, non precipitando, activa existunt. Denique per sudorem quoque discuti, aut hoc mediante promptius extra corpus, tam ipsum, quàm ejus producta morbosa, unà excludi potest, ipsum cum sit subtilis & volatilis, adeoque prompte mobilis texturæ. Hinc enim sudoriferorum frequens adeò in praxi usus, sive fixa, sive volatilia fuerint eadem. Nulla propterea febris citra recidivæ metum tutò absque sudore curari solet. Quo mediante, acidi isti odores, qui tam sensibilibiter cruciant articulos, optimè expirant. Adeoque precipitantia dicta remedia, fermenta morbosa vel in genere absorbendo & figendo, vel in specie quoad texturam

specialem alterando, vel per sudores excludendo, sine præcipitatione reali corrigere, & ab illis concitatas humorum turgescencias compescere, probabilius est.

§. 14. Prima erroris hujus origo videtur dependere ex inconsideratâ effectuum plurium sub præcipitationibus artificialibus coincidentium confusione, qui non distincti à se invicem, communi præcipitationis notione in genere veniunt. Res exemplis fit manifestior: Solutionem \mathcal{C} æ in ∇ precipitat φ , hanc precipitat Mars: coincidunt in hac præcipitatione & acidi & Martis mutua absorptio ac unio, cui jungitur simultanea φ dimissio; hinc confusè Martis ista actio, qua sub acidi hypochondriaci fermenti rosione, & mutua hinc absorptione, illius noxam delet, pariter præcipitatio quibusdam dicta fuit, utut nulla præcipitatio contingat. Parili modo, dum acida expugnantur ab alcalibus, tam fixis quam volatilibus, & contra, cujus indicium præbent imprimis præcipitationes mutuae solutionum ab alterutro factarum destructio fermentorum acidorum morbosorum ab iisdem, ac alteratio eorundem præcipitationem quoque appellarunt. Adeò confusio uti ubique, ita & hinc quoque fecunda errorum genitrix extitit.

§. 15. Præcipitatio genuina ergò in operandi modo remediorum, Præcipitantia dictorum, locum nullum obtinet. Quin, si rem exactè consideremus, usus eorum passivus potius quàm activus erit, cum non tam ipsa, agendo in corporis partes, quàm aliorum impetum activum sustinendo ut plurimum, proficua sint; adeoque resultans inde effectus immediatè privativus potius quàm positivus existat. Acidum nempe vitiosum est in genere, quod per specificas aciditatum differentias, & junctas alias proprietates varias, mille modis ut variat, ita & mille malorum in corpore autor existit, cujus respectu auxilia ista, præcipitantia dicta, tam insigniter conducunt. Mechanica scil. conformatio aciditalis supponenda venit, cui aptè respondeat medicamentorum istorum textura, secundum poros & meatus non solum, sed etiam minutorum corpusculorum configurationem, &c. ità ut promptè coire mutuò, & arctè plus minus unifiqueant. Appropriati ergò talis objecti

Erroris
illius origo.

Præcipitantia
operantur
in genere,
acidum
p. n. corrigendo.

objecti occuſu acidi ſpicula mox ipſi ſe inſinuant, concretum findunt, particulis minutis ſe quaſi inſigunt, & ita potenter in illas operantur, donec mutuâ unione factâ in concretum novum, idque tertium, ab utroque extremorum diſtinctum, & in quo oblitterata acidi nociva vis corporis partibus minus hoſtilis exiſtit, coëant. Mechanica Chymica hoc ipſum, quoad σ , ψ , Θ ia \square oſa, fixa & Volatilia, oſtracoderma, gallas, oſſa animalium, &c. ad oculum ut demonſtrat, ita in corpore idem evenire, vel ex effectû, eorum uſum qui inſequitur, abundè conſtat: σ nempe humoris Melancholici correctivum ac digeſtivum ab omnibus aſſeritur, qui humor acidi nomine ab Hippocrate inſignitur: Sic bilis æruginoſa, ac inde ſuſcitatur cholera, alexipharmacum cryſtallus montana aſſeritur rectè à Langio, *Epist. 3. epist. 1. c. 4.* in quâ acidum bili committum inprimis dominari experientia anatomica hætenus comprobatum dedit: & ſic in pluribus aliis, de quibus in ſequentibus.

Unde potius invertentia, it. attemperantia dicenda.

§. 16. Roſio hic actus aliàs dicitur, quo acida agunt in iſta Præcipitantia, unde & vulgo *Die ſauren Spiritus freſſen ſich zu tode* / dicuntur: ſub quo actu ex ſocietate acidi cum corpore corroſo, & hinc novo emergente concreto, acidum morboſum hebes redditur, acerrimum quod erat, aut inſipidum, ut in animalium partibus duris, cum vel ſine Δ e præparatis & calcinatis; aut dulce, ut in σ e vel ψ o, aut Θ ſum, ut in oſtracodermis, it. Θ ibus \square oſis evadit; corroſivum quod erat, adſtrictorium fit, ut in terris medicatis, lap. hæmatite; mobile admodum & activum quod erat, torpeſcit, & quaſi incarceratum eſt; uno nomine: priſtinam naturam penitus exuiſſe videtur, adeò ut iſta remedia aptiſſimo vocabulo à quibusdam Invertentia, item propter reuſas, nocivas ex acrimonia nimia & hoſtiles qualitates, Attemperantia, ſpecialiori licet ſub acceptione, dicantur.

Aut ſaturantia.

§. 17. Quinimò, cùm diſſolven- di potentiâ objecti appropriati omne acidum activum exiſtat & eſurinum quaſi, quicquid poteſt, mechanicis ſub legibus devorare & abglutire avidè ſoleat, donec ad ſaturationis punctum uſque pervenerit, quo acquiſi-

to, quieſcit, & quaſi feriat; remedia verò iſta optimè huic fini ſatisfaciant, ob id commodè quoque Saturantia quibusdam audiunt: quale cognomen ſpecialim Θ ibus \square oſis, tam fixis quàm volatilibus, convenit, à quibus optimè ob arctiorem unionem ſaturantur iſti acidi ſapores & cum iſdem in Θ ſum tertium, & ipſum medicamentoſum coëunt.

Aut abſorbentia.

§. 18. Ut autem ſaturent aciditatem corroſivam acidi morboſi, tamen eo ipſo, quo ſub roſionis tali actu hoc ipſum unâ plus minus coagulatur, (prout textura objecti mechanica magis vel minus ipſius conformationi reſponderit: ſic enim v. g. ſpiritus \triangle is vel Θ li arctius cum Θ tart. quàm cum σ e coagulatur, ſpiritus Θ is arctius cum Θ e fixo quocunque, quàm volatili ſe unit) ita ut quaſi abſorberi aut avidè imbibere penitusque hinc occultari videatur, ob id appoſitè pariſer auxilia iſta Abſorbentia, item Imbibentia, pluribus vocantur. Quam abſorbendi vim terræ minerales, animalium partes duræ, & ex his parata calcinata, præ aliis potenter obtinent.

Poſſunt abſorbentia, ſano tamen ſenſu & commoda explicatione etiam Præcipitantia dici, eadem ſcilicet ratione, qua in artificialibus eadem id munus exercent, & id nominis inde obtinent; Nempe quatenus abſorbendo & enervando, vel mediatè in primis viis, ut calcinata aut ∇ ea, vel immediate, ut ſolubilia inprimis alcalia, illius medio in M. S. aliſve fluidis p. n. concentrata aut retenta, ita dimitti faciunt, quo per convenientes vias eliminantur: pari modo ac Θ ſolutiones per acida factas præcipitat, ac plus alabaſtites, vel ſilices calcinati vini particulas craſſiores, vel creta feces cereviſiæ aceſcentis deturbat: Sed hoc per accidens fit, non per ſe, eſt effectus horum remediorum non immediatus, ſed mediatus: eſt etiam non univerſale, quin ſæpiùs citrà præcipitationem ſubſequentem ſub operationis propriæ identitate activâ exiſtunt. Declarant negotium hoc exemplo: Quoad prius quidem membrum, quod ab eorum uſu ſubinde accidat præcipitatio, v. g. Cruditas in morbis febrilibus dependet ab acido concentrante contenta heterogenea cum homogeneis, quo enervato à remedio ſacili-

[Eccc 3]

or ac

orac promptior concentratorum antea heterogeneorum separatio adeoque præcipitatio fit. Quoad posterius verò, esse effectum suum mediatum & respectu proprii usus saltem accidentarium ac consecutivum ostendit. — Bl. qui si nudus recipiatur, & idem cum solutione & imprægnatus, utrique verò ϕ p. d. instilletur, utrobique effervescentia & acidi saturatio & concreti falsi emersio, ceu affectus proprii insequi solent; quod verò in posteriore saltem casu fiat præcipitatio, hoc confirmat, effectivè præcipitationem saltem supervenire, & propria activitate prægressa demum contingere. Nempe operatio & hinc effectus essentialis utrobique est idem, accidentalis verò, qui ex conditione subjecti supervenit, est varius, adeoque auxilio qua tali minimè attribuendus.

Aur figentia.

§. 19. Cum denique activa summe existant quædam morbosa acida, adeoque summe mobilia, idque eo magis, quo subtilia & spirituosâ seu volatilia magis existant, qualia in febribus acutis, pluribus malignis, suo modo & intermittentibus (in quibus sub Paroxysmo progressus acidi fermenti à statu fixiori ad volatiliorem esse videtur,) scorbuticis, ut vocant, biliosis, ac hypochondriacis manifestum est; hæc ipsa verò medicamentorum istorum attractu & societate minus mobilia reddantur, dum mutuâ cohesionem, atque ita ex texturæ mutatione, emergunt corpuscula, tam ratione ponderis, quam ratione magnitudinis & molis, quin & mutæ, (ut sic dicam) implicationis respectu, ad motum concitatiolem quemvis, tam localem, quam præsertim intestinum fermentativum & elasticum minus apta, adeò ut quæ volatilia antea plus minus erant, jam incarcerationa quasi & fixata torpescant: ob id remedia eadem, quæ Præcipitantia aliàs dicebantur, optimo consilio Figentia nominari solent. Qua ratione viscera fermentum epilepticum, Cort. Chin. Chin. item calcinata Ostracoderma, saccharum hni, fermentum febrile intermittentium figendo, auxiliares opes præstare videntur.

Adeoque acidi istius respectu universaliora sunt alterantia.

§. 20. Eò ipsò verò, quo acidum vitiosum contentorum corporis corrigunt, primaria & magis universaliora sunt alterantia, acido vitioso, uni-

versali morborum causa materiali & occasionali existente. Naturaliter omnia fluida corporis sunt temperata, & sub specifica cujusvis materiali textura, in genere Θ sa ϕ sa existunt, adeoque de acido & alcali, sub pinguis temperatura, variatâ tamen proportionem, & hinc texturæ modificationem, participabunt. Imò pressius si loqui velimus, non nisi ex acido ∇ & Terra, constabunt, quod tamen ceu Paradoxon hic obiter attingisse sufficiat. Infinita ergò seu sexcenta Hippocr. quorum ambitu cacochymiam sive dyscrasiam humorum determinat, ex istis derivanda erunt. Acidum verò ubivis informat alcali, adeoque illud agentis, hoc verò patientis, rationem obrinebit, ita ut hoc ab illo, plus minus vitioso, vitiari quoque soleat. Pingue temperans, ubivis ferè in rerum natura, atque adeò in microcosmo pariter acido junctum deprehenditur, quod ubi defecerit, p. n. majorem illorum acrimoniam, ubi abundaverit, p. n. visciditatem inducet, viscido ex acido & pingui oriundo. In causis E. morborum occasionalibus & materialibus, internorum pariter & externorum, ad acidum plus minus peccans, ceu basin omnis cacochymiae, & ex cujus aberrationibus sexcenta ista Hippocr. fundamentaliter dependent, respiciendum erit: Idque eò magis, si cum quibusdam vim rerum feminalem in acido specifico quoque fundatam asserere velimus.

§. 21. Si acidum ergò tantum non omnium morborum fons & origo prima, quid de bile fiet, & morbis biliosis, speciatim febribus acutioribus, æstuatione corporis p. n. siti clamosa, anxietate præcordiorum, choleris, diarrhæis, colicâ acerbiori, dysenteriiis, & similibus malis, simpliciter à Veteribus à bile exsuperante aut vitiata, à modernis ex Θ e ejus vol. ϕ so, vel copiosiore, vel acriore derivatis, acido reverà contrariis fiet? Sed ut paucis negotium hoc absolvam, ea, quæ de bile à Veteribus pariter ac recentioribus prolata hætenus fuerunt, arbitraria maximam partem videntur. Missis istis, horum consideremus hypotheses: Θ vol. ϕ os. bili inesse dubium; quod enim arte prolicitur, hujus potius, quam Naturæ, videtur opus; adeò ut probandum, formaliter in bile præex-

Sed quid de bile?

præextitisse, quod materialiter inde procedit. Posito hoc, quomodo caloris effectum in corpore producit? **Θ**ia vol. quâ talia, omnia notabiliter existunt refrigerantia, vel spiritu **Θ*** simpl. in febribus intermittentibus sensualiter hoc confirmante. Si ut **ο**sum est, quod **ο** revera in bile luxuriat, calefacit, de **ο** hoc inquirendum superest, an pinguedinis, an acidi occulti ratione, vim caloris sensum producendi obtineat? pari modo ac de **Δ**e quaeritur, utrum pinguedinis, an acidi ratione, sub deflagratione ardorem inducat? Sanè plura argumenta prostant, calorem naturalem, pariter ac p. naturalem, ab acido volatili materialiter dependere. Porro ad duo hæc quoque attendendum sedulo: (1) adscribi interdum bili affectus p. n. in quibus ipsa potius passivè se habet, & ejus p. n. alterationes qualescunque producta seu effectus morborum potius, quàm radicales causæ, existunt. **Æ**ruginosa bilis, ex qua in præcordiis & primis viis revera interdum atrocia mala, in adultis non minus quàm infantibus ex bile naturali, ab acido p. n. alterata, quod dependeat, mechanica anatomica docet; unde & acidum enervantia, speciatim crystallus, ejus alexipharmacum à Langio dicitur, de quo supra §. 15. Quæ rejiciuntur biliosa in intermittentium, præsertim tertianarum, Paroxysmis, vi spasmodicorum intestinalium, à fermento febrili concitatorum, evomuntur, sine eo, ut causa morbi materialis existant; quin potius amara omnia, bili symbolizantia, in earum cura sunt optima; non secus ac omnia reliqua febrifuga in hoc ferè conspirant; ut acidum fermentum febrile figendo & absorbendo seu invertendo salutaria existant. Ab **Δ**iali pharmaco artificialis concitata nunc cholera, nunc Diarrhœa, in quibus pro subjecti constitutione subinde tot biliosa *αἷμα καὶ κῆτω* rejiciuntur, naturalium, utut morbosarum, fiendi rationem docent bile scil. & cæteris excretis passivè se habentibus, (si non semper, saltem ut plurimum) (2) Eidem bili subinde affectus adscribi, qui ipsi penitus non conveniunt: v. g. Vulnera, ulcera, tumores inflammatorii, quo magis æstuant, rubent, & erysipelacei quid patiuntur, à bile taliter affici dicuntur plurimis, quos tamen refellit **h**, me-

delam asserens acidum absorbendo, docente mechanicâ chymicâ; quod quo magis volatile aut acre fuerit, eò magis ista symptomata producit: par ratio est podagræ, quæ calida, seu intensius rubens, ardens, & phlogosi erysipelaceâ junctâ, biliosa dicitur, ad differentiam alterius, pituitosæ dictæ. Sed utrobique simpliciter peccat acidum, in ista specie, acrius & volatilius, nec synoviâ debitè temperatum; in hac mitius, minusque acre, & à synoviâ viscidiori melius correctum, unde & isti sperma ranarum, aciditalis optimum corrigens, ut mechanica docet, hinc camphora, hincque eodem ex fundamunto opem ferunt. **Δ**æ intensior Tinctura in febribus, & rutilans ac flammeus ejus color, bili à plurimis adscribitur, quam tamen ab acido dependere, experientia mechanica docet, in naturaliter constitutis sanorum **Δ**is, per acida medicatis. Contenta in febrientium **Δ**is & copiosa sedimenta, bili à plurimis ceu materiæ adscribuntur, cum tamen Galeno teste, & experientiâ confirmante, *citat. Mœbio Inffit. p. 343. qui ex otio & repletione febricitant, si sanitati restitui debent, necessario in Δ plurimum subsidebit*, quod quomodo cum bile, aut inde productis humoribus, cohareat, ipsi viderint. Aut E. tales affectus bili falso adscribuntur ceu causæ, aut ipsa ratione acidi vol. non ratione **Δ**osi in talibus casibus peccabit.

§. 22. Scaturigo interna aberrantis ^{Acidi morborum origo.} acidi est ex ventriculo, sub cujus digestionem acidum vol. saporem plus minus contrahunt assumpta, sive ex inspirato fermento, sive ex assumtis hunc ipsum derivare velis, quoad præsens negotium perinde est. Hic in **Θ**sum **ο**sum temperatum in primis viis non rite correctus, toti corpori, omnibusque ejus partibus, extra ventriculum penitus hostilis existit, & mille calamitatum, pro specifici acidi saporis, & partium, quas affligit proximè, differentia, artifex existit. Hinc enim in fluidis partibus earundem dyscrasie, turgescencie & effervescentie, indeque Phlogoses, p. n. corporis æstuationes, variae coagulationes & concretiones, &c. in solidis verò inflammationes, irritationes, rosiones, convulsiones, contracturæ, dolores, alimenti proximi corruptiones, &c. &c. Nec opus est, ut sensibus

ſenſibus adeò manifeſtò ubique pateat, cùm non torrentis modo undique diffundatur, ſed odoris aut auræ inſtar ſubtiliſſimæ penetrando, appropriato ſubjecto ſe inſinuando, in fluido quidem hujus texturam & motum inteſtinum pervertendo, in ſolido verò ſpiritum inſitum imprimis alterando, operativum exiſtat: id quod fermenti nomine aliàs inſigniri ſolet, cum aptum ſubjectum alterando, ſequæ in eo multiplicando, fermenti ſimilitudinem repræſentet: qualis odor acidus fermentativus in lue ꝑea, ab alio hauſtus, & humores & partes ſolidas inſiciendo, ſequæ in iſdem multiplicando, vel manu palpari poteſt; id quod & in ſcabie, variolis, &c. extra dubium, de quo jam ſuprà ꝑ. 12. ſcil. præter internam acidi peccantis originem ſuprà inſinuatam, etiam ab extra, tam ab inſpiratis, quàm ſuſceptis aliunde contagiis, idem contrahi facile poteſt. Sanè quo ſubtilius idem, & quo facilius ſpiritibus ſociabile exiſtit, eò graviora & periculoſiora nocumenta, & quæ omnium diffiçillimè curabilia exiſtunt, inſert; cùm ſubtili tali acido compar objectum non niſi difficulter obtineatur; hinc enim morborum hæreditariorum, item contagioſorum quorumvis & gravis nocendi ratio, & diffiçilis curatio dependet, cùm humorum quorumvis vitia & inepti acidi ſapores facilius alterabiles exiſtant, modò non ſpirituum peregrinà tali aurà contaminatorum vitio illi foveantur continuo.

Latè diffuſus horum remedium uſus.

ꝑ. 23. Conſtat ex dictis, per univerſam morborum Therapeuſin, remedium iſtorum, aliàs præcipitantia dictorum, latiſſimè patens uſus. Acidi enim vitioſi ratione & tam potens quorumvis chronicorum morborum, ſub generali cachexiæ nomine comprehenſorum, utroque in ſexu exiſtit debellator: Lapillorum *gr.* latè diffuſus uſus, à Sachſio tam prolixè congeſtus, in Gammarol. hinc manifeſtus redditur, non ſecus ac aliorum oſtracodermorum. Cornuum Cervinorum acida abſorbentium creberrima exhibitio exinde explicanda: *ꝑ.* alia fixata, acidi vol. acerrimi appetentia, hujus ratione tam polychreſta remedia: *ꝑ.* alia pariter ritè fixata ex hoc fundamento ad univerſalium apicem propius aſcendunt, præſertim ſi vi anodynà minerali ſimul impræ-

gnentur, ſi ſcil. vera ſunt, quæ Helmontius ad Paracelſi imitationem de gio diaphoretico, it. arcano Coralino, decantat, & vel ex Cnoſelii gio fixo, ſive arcano coralino, nonnihil probabilia redduntur. Imò ex dictis patet in primis, *ꝑ.* vol. *ꝑ.* ſoſorum, ex animali & vegetabili regno parandorum, & vel ſolius ſpiritus *ꝑ.* * uſus planè polychreſtus, quæ utut minùs inter præcipitantia numerata aliàs fuerint, potiora tamen ferè inter illa ipſa exiſtunt, dum altiùs omninò penetrando, & ipſarum partium, tam fluidarum quàm ſolidarum, texturam ſubintrando, multis in caſibus ſummè activa exiſtunt, ubi fixorum effectus ferè hebecere obſervatur. Amica in primis ſunt nobis *ꝑ.* ia illa volatilia, cum tota noſtri corporis machina, omneſque ejus partes ſimilibus reſerta ſunt, unde vix præ iis nobis magis convenientia obtineri poſſunt medicamina, præſertim ſi temperata nonnihil & *ꝑ.* ſa reddita fuerint, adeoque nobis promtiùs aſſimilabilia.

ꝑ. 24. Nam fixa iſta, ut mineralia, *Fixa inſi-* terrea, metallica, lapidea, & vege- *pida ultra* tabilia ſtyptica, ac duræ animalium *primas* partes, exque his parata calcinata uſta, *vias non* ſoluta, &c. C. C. uſtum, ſpecif. fe- *pergunt.* brile Strob. terra ſigill. lapis hæmatit.

ꝑ. alia, & diaph. bezoard. *ꝑ.* Oc, Unicornu animale & minerale, ultra primas vias materialiter haud penetrant, quin utcunque alterata, & in primis viis præcipitata, cum ſcoriis recrementitiis per ordinarias portas denuò eliminantur, ut vel *ꝑ.* exemplo patet, ſcorias alvinas atramenti nigredine inſicientis, id quod & in *ꝑ.* ininis, & quam plurimis *ꝑ.* libus remediis pariter evenire obſervatur; non ſecus ac nativa vel artificialis *ꝑ.* ii Cinnabaris rutilante colore feces inquinare, & ita immediatè per inteſtina excerni ſolet: Quæ ſolubilia facilius, ac menſtrui medio hinc inde diſtribui apta nata ſunt, & præter *ꝑ.* ia fixa etiam *ꝑ.* rum lapilli, oſſa lucii & ſimiles animalium partes faciliùs ſolubiles, forſan altiùs intra corporis recessus, extra primas vias diſtribui, probabiliter videntur, hinc etiam talia *ꝑ.* ſo ſub acquiſito ſapore diuretica evadunt. Tamen conſideranti præcipitationem particularum metallicarum, v. g. Saturni in *ꝑ.* ſoluti, *ꝑ.* ri in ſpiritu *ꝑ.* is *ꝑ.* li *ꝑ.*, in primis viis, ſcrupulus facile ſuboriri poſſit, an non ſoluta licet iſta in ventriculo,

triculo, in intestinis tamen ante sui in lactea propulsionem pariter, si non ex toto, saltem ex maximâ parte, præcipitentur, quocunque fiat medio, & ita foras amandentur. Similiter enim & ossa à canibus soluta, aut teneriores lapilli à gallinis quasi liquefacti, excrementa eorum copiosè imprægnant, etiamsi à sanis, & quorum vis digestiva, ac si ita loqui licet, solutiva, potens admodum existit, devorata aut deglutita fuerint.

Duobus
tamen
modis
etiam re-
motiores
partes
malè ha-
bentes cu-
rant.

§. 25. Quod tamen non obstat laudabili effectui eorum medicamento, qui etiam ad longè distitas partes subinde extendere se observatur. Id quod duplici ferè modo accidere solet: [1.] quatenus vitiosum acidum fermentativum in ventriculo & primis viis corrigunt, absorbent, invertunt, & inde penetrantem undique odorem seu auram peregrinam figunt, & cohibent, ac natos inde defectus morbosos ita sistunt. Sic enim cancerum lapis in ventriculo absorbendo acidum saporem, vulneris etiam in pede ardorem, ruborem, ac inflammationem sistit, quæ pathemata Vini tantillum mox sensibiliter exasperat: Osteocolla, fixissimus lapis, calli generationem in ossium fracturis mirè promovet: lac Lunæ, ut & Crystallus præparata Lac nutricum uberius scaturire faciunt, absorbendo acorem vitiosum primarum viarum, chylumque à p. n. crasi & texturâ liberando, ut aptior sic fiat, quæ & facilius & copiosius ad glandulas mammarias penetrare queat: Hæmatites lapis hæmorrhagias narium scorbuticorum habituales, non secus ac unum idemque diale tam excessivas quàm defectivas menstruationes corrigit, neutro horum ad partem affectam proximè penetrante, quin acre istud specifici saporis acidum, cujus occasione tam immediate ex sanguinis acrimonia, quàm mediate, ex motus illius localis per fibrarum irritatarum strictionem modificatione varia, hæmorrhagiæ vel intenduntur, vel supprimuntur, in primo fonte alterando, & plus minus enervando: pari modo ac Poterius ☉ suo diaphoretico fixo ischiadam, ac contumacissimas paralyses, optato eradicat. Sanè si ventriculus sanitatis & morborum limes est, & ex ejus errato, indeque nato peregrino sapore, etiam largius distitæ partes plectuntur, pariter

Tom. II. Pars 2.

ex eodem sapore fermentativo aut odore primarum viarum correcto, evulsa quasi radice, fructus morbofi spontè emarcescent: conf. Becherus *Phys. subterr. l. 1. l. 5. c. 2. §. 98. 99.* ubi de modo, quo & diaph. coralia, testacea, C. C. ust. in febribus proficua & sudorifera existunt. Nec absorbendo saltem acida primarum solum viarum remotas inde partes à morbofis insultibus liberant, quin si quid similis saporis vel in corpore oberrarit, vel in sanguine aut lymphæ fluctuarit, vel quadam in parte solida certo subjecto humeroso mediante resederit, hoc ipsum per continuum humorum circulum, ad primas vias pariter delatum, promptè medicamento ibidem locorum, ceu appropriato magis subjecto, se insinuabit, & ita successivè concentratum ac fixatum à remedio, cæteris partibus minus hostile existet. Vigere talem mutuam conspersionem partium internarum & externarum, contentorumque earundem, mediantibus humorum circuitibus, confirmat alvi per clysterem, aut tantillum laxans in variolis vel purpura vel petechiis malignioribus, proritatio, cujus occasione illius perniciosus fluxus, harum vero recessus, & cum sanguine ac lymphæ renovata permistio; hinc purgantia temerè præscripta criticum & salutarem sudorem sæpè inhibent, observante Ballonio, & ex eo Bonetto *Pharos Medic. l. 3. num. 21. p. 73.* Sicut qui crebrius sudant; alvi ferè sicciore evadunt; Sudor verò ab aëre frigido cohibitus in morbis, nauseam movet: vid. Frider. Bayle *Problemat. Medic. Physic. 79. p. 122.* Hypochondriaci pariter, quo largiori fruuntur perspiratione, eò cæteris paribus melius habent, quo minus, eò circa hypochondria sensiliora patiuntur pathemata. Adeo Hippocrate asserente perspirabile & conspirabile totum corpus existit.

§. 26. Secundo modo quoque fixa, & his cognata medicamenta, quæ materialiter ultra primas vias non penetrant, etiam remotis in locis effectus salubres exerunt, quatenus in structura machinæ corporeæ, ratione admirandæ nervosi systematis fabricæ, & inde dependentis multiplicis partium solidarum consensu, ventriculi affectu sedato, etiam aliarum partium pathemata hinc sopiuntur.

[Ffff]

Hypo-

Hypochondriacis jejunis nunc caput dolet, nunc perturbatur, simplici cum ventriculo, nervorum insignium ratione, consensu, quibus vel panis buccella citò & jucundè medetur. Parili modo senum jejunorum caput frequenter vertigine rotatur, quin & scotomiam patitur, quæ tamen Zingiberis in India conditi frustulum assumptum, vel ex ficibus cum sinapi & cardamomo parati electuarii usus brevi cohibet. Qui universum corpus in febribus intermittentibus quatiunt rigores, ex præcordiis, speciatim ventriculo, excitari, litusejus cum o aromaticis penetrantibus, ceu optimum auxilium confirmant, unde & calcinata animalium eisdem interno usu multum imminuunt. Bezoardica mineralia, & animalium partes duræ, ex parte eatenus existunt sudorifera, quatenus in continuis, præsertim malignis, acidum istud acerrimum volatile, cujus in primis viis irritatione, uti præcordiorum anxietates, irritationes, tensiones, jectigationes, agripniæ, ita & per consensum universæ cutis pororum strictura, absorbent & figunt; unde relaxatis hinc fibris sub corporis quiete facilis sudoris profusio.

CAPUT III. PRACTICUM.

Præcipitantium Legitimam administrandi methodum exponit.

§. 1.

Abfot-
bentia le-
gitima
methodo
usurpan-
da.

Operandi modum & usum præcipitantium dictorum prolixius, quam instituti ratio exigere videbatur, prosecuti sumus hætenus, restat, ut debitum eorum regimen, seu legitimam administrandi pro salute ægrorum methodum, etiam subjungamus. Multum sanè hic interest, cum vel ex hac ratione diversos non rarò sortiantur effectus auxilia medica, ut quæ uni proficua, alteri nociva, tertio neutra existant, saltem ex variatâ applicandi methodo. Cujus respectu & trivialia subinde saluberrima deprehenduntur medicamina, & sublimia econtrâ auxilia nil, quod spei ab iis conceptæ satisfaciatur, præstant. Rectè ob id olim Capiuaccius, arcana ejus Practica sciscitanti respondisse fertur: disce meam methodum, & habebis mea arcana. Sanè unum

idemque remedium, quod rite administratum manum Dei auxiliatricem repræsentat, perversè usurpatum gladius est in manu furentis. De Præcipitantibus idem omnino asserendum: quorum tamen administrandi methodum rationalem in genere difficile est determinare, cum non tantummodo tam latè pateat eorum usus, sed etiam in unoquoque eorum, præter generalem absorbendi & acidum corrigendi vim, vel specifica ejusdem potentia medicamentosa attendenda veniat, prætereaque pro individuum agrotantium diversitate diversimodè eorum applicatio determinanda sit: pro morborum quoque plus minus complicatorum ratione, distinctis subinde modis dirigenda eadem, & nunc solitaria, nunc aliis sociata, nunc primo, nunc ultimo loco administranda sint, nihilominus generalibus sub axiomatis & specialium, quantum instituti fert ratio, mentionem subinde injiciemus.

§. 2. Quod itaque attinet adhibendi modum: usurpari possunt Remedia ista absorbentia, internè pariter & externè. Fundamentum scilicet curæ externæ, vulnere, ulcerum, & quamplurium tumorum, similiumque pathematum, v. g. erysipelatum, pustularum, serophularum, est fermentum acidum, nutrimenti partis proximi alterativum, & plus minus in pus, saniem, ichores, similesque sordes corruptivum, in cujus correctione & extinctione, balsamique partis naturalis, hoc est spiritus insiti, conservatione, totum chirurgorum versatur negotium: hinc pro priori isto scopo, fœna, Martialia, & ea, Glacea, terrea, mineralia, ut bolus, creta, lap. calamin. &c. utramque faciunt paginam, absorbendo vitiosa ista acida, unâ cum vulnerariis quibusdam vegetabilibus, alcali occulto, sive acidi blande saturativo imprægnatis. Adhibentur triplici ferè sub forma: I.) liquida, epithematis, in Vino præsertim cocta, quale est epithema ad erysipelata & inflammat. polychrestum Zwelferi in *Pharm. Reg.* p. 91. II.) sicca, sub subtiliss. pulverum forma: qualis est pulvis erysipelat. aut ad consolidandas variolas Mynsichti p. 136. & 134. III.) Mediâ unguentorum & emplastrorum: quale est emplastrum Miraculos. in *Miscell. Acad. Nat. Cur. Anni 8. Obs.* 16. p. 23. vel decoan-

Idque tam
externè
quam inter-
ne.

stionis primæ arduum negotium, in quo vitæ sanæ & ægræ, longæ & brevius, cardo vertitur, subinde, præsertim sub immoderatiore usu, impediunt, sui que permistione chylo consistentiam & proprietates plus minus vitiosas conciliant, unde & impedita ejusdem distributio, & p. naturalis fecum ex eodem separatio subinde contingit. Scil. ex quamplurimis (qualia sunt calcinata animalium, terrea mineralia, Martialia, &c.) dum acido saturantur, concretum novum quasi Osium adstrictivæ & incrassativæ facultatis exsurgit, quod sui cum chylo miscelâ aut hujus aut fecum consistentiam spissiore, simulque alvum contumaciorem, reddit. Sin ex quibusdam eorum (ut Osis, item marinis, testis, &c.) cum acido concretum Θ sum emergat, abstersivum ac diureticum, citata nimis chyli & fecum hinc distributio, ac per alvum exclusio, vitiosa pariter harum ex illo præcipitatio, supervenit. Quoties observare contigit ex Chinæ abusu febrifugo, vel intempestivo, vel in subjecto teneriori, pertinacissimam alvi inductam adstrictionem, cum abdominis tumore ac tensione molestissima. Repetitis quoque vicibus observasse me recordor ex intermittente tertianâ inordinato usu specifici Strobelberg. vel solius, vel cum Lap. Θ r. tandem oppressa, febrim continuam lentam cum virium prostratione, præcordiorum gravativa anxietate, mucicopiosi glutinosi in os scaturigine, & subinde crebriori excretionem supervenisse, ex chyli impedita fermentatione & volatilisatione oriundam, præmissio vomitu materiæ viscidæ per incidentia & attenuantia, præsertim tartarea & Θ *cum, hinc & aromatica curandam. Idem in continuarum cura observare licuit, quæ copiosioribus hujusmodi absorbentibus & figentibus, speciatim ex animalium partibus duris & δ ialibus fixatis, tandem curatæ diuturnum languorem, ex spirituum inopiâ, ob digestionis primæ impedimenta, comitem post se traxerunt. III. Acidum morbosum concentrant, ac nimis figunt, indeque motum ejus, licet corporis partibus p. naturalem, ac dependentes ab hoc fluidarum alterationes, vel in solidas impressiones, præmaturè sistendo, simul Naturæ medicatricis

conatum, illius occasione suscitatum, sub morbofo statu (qui nihil aliud est, quàm Naturæ conamen, materiæ morbificæ exterminationem in ægri salutem, omni ope molientis, ut rectè hoc asserere videtur Sydenham in *Obs. circa morb. acut. Sect. 1. c. 1. p. 1.*) hoc ipso cessare intempestive faciunt. Concentrant & figunt plus minus acidum morbosum absorbentia & invertentia illa, vel immediate, vel mediate. Immediate coeundo materialiter cum illo, unde novum concretum utriusque ex coalitu emergit, cui, ubi subjectum humorosum accesserit, hoc unâ in coaguli consortium assumptum aliquid tertium, texturæ & proprietatum peregrinarum, consistentiæ plus minus (pro elementorum sive ingredientium diversitate) viscidæ ac glutinosæ inde producitur. Simili modo ac acidum podagricum, ab alcali synoviae articulorum saturatum, in hac ipsâ in calcis vel cretæ simile corpus figitur, mutuoque omnia coagulantur; vel sicut acidum in calce vivâ cum terræ substantiâ ∇ mediante sub illius per hanc saturationem in lapideum ferè concretum coagulatur, quod longè firmitus fuerit, albumen ovi si accesserit. Mediatè verò figitur & concentratur acidum morbosum, si hoc in parte quadam solidâ, cœu minerâ, delitescens, partibus suis subtilioribus promptè remedio se insinuet, vel modo supra §. 23. insinuato, vel isto, à Tachenio curioso cryptographiæ exemplo in *Clav. c. 9. p. 237.* illustrato, & ab hoc absorbeatur, dum cæteræ in subjecto materiali (sive materia occasionalis antecedens, sive productum morbosum consequens fuerit) magis irretitæ, cum eodem firmitus coagulantur, & intimius eodem uniuntur. Qua ratione σ ialia, lienosis aut hepaticis, ad scirrhosam constitutionem vergentibus, subtilius quod fuerit acidum absorbendo, residuum ad majorem indurationem ac coagulationem disponunt, ut rectè annotat Tachenius *Clav. c. 8. p. 181. 192.* de quo plura infra. Est enim Volatilitas & fixitas modus quoque rerum saltem respectivus, qui uti texturam earum mechanicam insequitur, & vel Δ vel aëris vel utriusque respectu ita dicitur, ita mutatâ quoque undecunque texturâ, cum & sine additis, & variata particularum vel

vel mole vel pondere, vel implicatione mutuâ, etiam proprietatum harum mutatio: & ita in Δe est volatile, tamen mutatâ simpliciter sub hujus artificio texturâ multum volatilitate perdit, & ad notabilem fixitatis gradum perducitur, ut in \S io per se præcipitato patet, qua ratione & Δ com. in Δe aliàs Volatile, fixum tamen reddere nititur Polemanus *de Δe Philos. p. 201.*

Speciatim
Recidivas
prioris
aut gene-
rationem
novi mor-
bi infe-
runt.

\S . 4. Ex quibus ulterius patet, quare sub illegitimo usu hujusmodi absorbentia (nisi specifica fuerint) sæpius saltem morbum pallient, non eradicent, quin vel crudelior ejusdem recidiva superveniat denuo, vel prioris in alium, subinde aut deteriorem, aut magis chronicum, mutatio accadat. Prius illud quidem, acido utcumque oppresso & fixato, successivè, idque ferè rerum non naturalium occasione, denuo resolutum, & in motum pristinum concitato: postèrius hoc verò eodem partis cujusdam vel per essentiam, (materiali sui præsentia,) vel per consensum functionem impediente aut vitiante, indeque novas p. n. læsiones inducente. Idem ferè accidere hîc mihi videtur, (simili quodam rem illustrare liceat) atque in automaton aliarumve machinarum elateribus, in motu suo elastico oppressis aut impeditis, qui, ubi qualicumque occasione motionis restituendæ datur libertas, aut celerimâ agitatione, ac geminato vel triplicato impetu pristinos motus quasi compensant, aut saltem vitiatibus motibus machinæ ordinarios motus ac usus turbant & lædunt. Concentratum sanè acidum morbosum, dum motionis reiterandæ datur occasio, multiplicatâ quasi vi elasticâ, ex concentrata sui & mole & nixu motivo &c. ferocius resurgit, unde & irritata Natura intensiori conatu ipsi reluctatur, adeoque atrociores recidivæ erisurgunt: aut si utcumque alteratum pristinos motus ac actus repetere nequeat, nunc alienis saltem motuum rationibus initis, nunc naturalibus partium corporis motibus & functionibus plus minus læsis & hinc vitiatibus, novorum p. n. motuum morbosorum in machina corporea occasionem subministrat. Sæpius ex China Chinæ, aut spec. Strob. & Croll. similiumve abusu palliatæ, duplicatæ aut triplicatæ resurgunt febres

intermittentes simplices: aut iisdem fixioribus copiosius tractatæ, præter languorem totius dispositionem ad Icterus relinquunt; quin etiam fermento, in fomite materiali concentrato, utcumque denuo resolutum, aut in motum aliqualem concitato colicæ convulsivæ atrocissimæ excitantur. Qualem gravissimam cum ordinariis stipatam contumacibus symptomatis ex ϕ o destillat. juniperi, pro tertianâ chronicâ curandâ, continuato aliquando usu ante paroxysmum, pro hac quidem intentione felici, bis observasse me memini: idque ut suspicor, quatenus ϕ o destillat. cum acido febrili in chronica febris quavis ex causâ paulò fixiori, in concretum quasi resinosum, sed acre admodum, coaluit, simili ferè modo ac spiritus Oli rectificatus cum ϕ ois pluribus destillatis in resinam coire solet, quod pertinaciùs vel intestinis agglutinatum, vel glandulis mesenterii infixum, vel circa nervos hujus plexus depositum, irritatione continuâ occasionalis causâ torminum dictorum exitit. Simile dolorosum infortunium ex sacch. Hni cum Lap. & crebriori usu & copiosiori, ante quartanæ chronicæ accessiones usurpati, agrum quendam nobilemprehendit, quo licet denuo sedato, nihilominus tamen statim sub paroxysmorum periodo, aliquandiu vestigia torminosa adhuc persensit, quibus post aliquot periodorum intervallum, nihilominus ejusdem febris Recidiva supervenit. Rectissimè Schenckius *Diff. supr. all. §. 13. Præter materiam, termini motus hujus, (præcipitationis, ut eum vulgo appellat) sunt spectandi, ne plus obsimus, quam prosumus, materiam morbosam præter necessitatem figendo, veluti per sepe accidit, ut à datis hujusmodi præcipitantibus & propinatis epileptici quidem motus sistantur, mitescantque paroxysmi febriles; verum postea, quod præcipitatum fuit, circa nobiliores partes sedem figens circulationem sanguinis sistat, & mortem inopinatam inferat: & §. 15. Sic vidimus à præcipitantibus uterinis ortam fuisse dyspnœam, à tertiana intermittente cohibita per specificum febrile cotidianam & quartanam.* Motuum Epilepticorum præcipitantibus sive figentibus talibus inhibitorum men-

[Ffff 3]

rio

tio à Schenckio facta in memoriam revocat puerum ingenuum X. annorum, epilepsiâ habituali particulari, diaphragma saltem primariò, hinc & secundariò partes vicinas quatiente, correptum, qui præmissis præmittendis, alterantibus & evacuantibus, usu pulveris ex *Visc. corylin.* ʒiij. *Coral. rubr. præp.* ʒi. & *destill. succini* gutt. xvij. M. aliquandiu omni mane continuato à malo penitus liberatus videbatur. Sed corripiebatur post aliquot septimanarum intervallum feбри continuâ acutâ gravi, cum exquisitis abdominis convulsivis circa umbilicum doloribus. Suspicebar, fermenti morboſi spinam (secundùm simile suprà insinuatum) concentrantibus istis & figentibus nimis quasi intortam, & in motu ordinario impetitam, data occasione eò concitatori impetu, motus, si non eosdem, saltem novos instituisse, sicque vehementius Naturam ad extraordinarios morbosos motus stimulasse, idque partim solidas, quibus pertinacius affixum erat, partes, sensibilius irritando, (idque prout adhuc fixatum) partim Mæ. S. texturam & Crasin vitiando, (prout ex parte resolutum) donec extraordinariis his motibus remittentibus, adeoque præfatis malis curatis, ordinarios in motus rediret, pristinum epilepticum malum eodem tenore denuò affligeret. Curabatur hoc ipsum inſequentē demum anno perfectè, idque usu acidularum Egranarum, Marte fermentum acidum absorbente & enervante, spiritu acido minerali undique penetrante, & fomitem morbosum seu materiam occasionalem potenter resolvente & abstergente.

Confir-
matur per
exempla.
I. ex re-
gno vege-
tabili.

§. 5. Juvat hæc ipsa, ceu magni in praxi ponderis, paulò specialius per 3. materia medicæ regna considerare, idque præsertim, quoad intermittentium febrisfuga, quibus præcipitationis effectus primariò ferè adsignatus fuerit, ac quorum nocumenta ex illegitimo usu manifestius patere solent. Superius dixi, corticem Peruvianum, seu Hispanorum Palo de Calenturas, h. e. lignum febrium, fugare suo usu quasvis intermittentes, id quod verissimum arbitror: nec has solum, quin à modernis is ipse ad continuas quoque, tam benignas quàm malignas, quin etiam plures symptomáticas lentas sive accidenta-

les, item, quæ ex decubitu materiæ peccantis in quandam partem oriuntur, successu ab illis laudato adhiberi soleat. Sed hoc simul observari solet, quod ordinariò ferè alvi occlusio pertinax, tumor abdominis, ejusque durities ac dolores tensivi inſequi soleant, quibus vel successivè remittentibus, vel per purgantia propinata, aut spiritum Θ^* exhibitum, nonnihil irritatis, eadem febris simili, interdum intensiori, furore recurrat. Sanè aliquoties cum tædio contigisse memini, proſtigatas, ut videbantur, illo remedio febres, ex spiritus Θ^* usu promptè recidivasse; adeò ut casu hoc in consilium mutato, quibus ex corticis illius usu, vel proprio ausu, vel Medici præcoci consilio, febris ita palliata esset, ut evanescentibus licet insultibus, vel suprà dicta abdominis pathemata, vel artuum ostocopos quasi lassitudo, vel virium deficientia cum nocturnis sudoribus, pertinaciter superessent, adeoque quibus protrata, simulque cita cura, febriles Naturæ motus revocandi essent, iis per spiritus Θ^* propinationem mox eadem febris resuscitata fuerit. Adeò infidum sæpius est decantatissimum aliàs Chinæ Chinæ contra febres auxilium, etiamsi præmissis sedulò præmittendis, & accuratâ methodo eadem adhibeatur, ut frequentissimè recidivam comitem post se trahat, ut Willisius *de febr. c. 4. p. 153.* Chiffletius *de pulv. Peruv. c. 4.* Bartholinus *Cent. 5. Hist. 50.* Sydenham *Meth. Curandi Febr. p. 82. & Obs. circa morb. acut. p. 96.* quoque notarunt, quin interdum frustra & absque Paroxyſmi levamine adhibeatur: conf. Piens *de Febr. p. 2. cap. 12. p. 275.* Ut taceam singulare istud, quod refert Sydenham *Meth. Cur. febr. p. 82.* quosdam pulverem illum, immediate ante Paroxyſmum exhibitum, è vitâ sustulisse. Vix adeoque tutius exhibetur, nisi vel declinante jam febre, quod reverà tardius fit in quartanis, vel robustioribus subjectis & laudabili Viscerum eutoniâ præditis, in specie mechanicis, & laboriosam vitam agentibus, & qui post ejus usum motu corporis vehementiori exercentur, propinatum fuerit, instituendo simul aliquot abhinc diebus summè necessariam purgationem. Obvnet hoc de cortice dicto, ante Paroxyſmum, more hætenus recepto, exhibito,

hibito, quacunque etiam subministratur formâ, vel pulveris ad ʒj, vel infusi in Vino generoso à ʒj. ad ʒij. vel decocti cum ʒo Vini, cum & sine substantia, velessentia, cujus præter Rolsinccium *de Chym. p. 207.* & Zwelferum *Pharm. reg. p. 76.* optimam præparandi rationem docet Blegny in *Zodiac. Gallic. Anno 1. Obs. 1. p. 2.* cujus præscriptâ ratione diligenter præparatâ, & ad ʒss. ante Paroxysmum exhibitâ, quin & intermittentibus diebus continuatâ usu, nihilominus tertianas recidivasse haud absque tædio expertus fui. Concinnior adeoque ferè ac tutior ista videtur exhibendi methodus, quâ post Paroxysmum, & intermissionis tempore, idque præsertim in infuso cum Vino, repetitis tamen crebrius vicibus exhibetur. Videtur enim sic minus turbari Naturæ motus, minusque intempestivè concentrari, saltem non uno impetu quasi incarcerari & figi fermentum febrile, quin successiva hujus correctione, & blandâ sanguinis aliorumque humorum alteratione, citâ, tuta, & jucunda magis videtur cura. Docet hanc methodum prolixius Autor Anonymus in *Tract. de la Guérison des fievres par le Quinquina*, nuperrimè Parisiis edito, de qua ulterior tamen consulenda venit experientia. Saltem recorder, in quartana contumaci electuarium ad imitat. Sydenham. *Observ. de morb. acut. c. 5. p. 99.* diebus intermittentibus propinatum, spem meam fefellisse; sicuti in alio, similiter quartanâ diuturnâ conflictato, post repetitum crebrius cum ʒ diaphoretico permistâ Chinæ pulveris usum, idque diebus intermittentibus quotidie bis vel ter, ut & ante Paroxysmum, profligatam apparenter febrim aliquandiu siluisse, donec datâ levi occasione post aliquot septimanas pristinâ ferocia resurgeret.

§. 6. Modus curandi & supprimendi febres in hoc Cortice, est potum Eridos. Præcipationem fermenti febrilis multi asserunt. Non ineptè dicitur in *Cent. 2. Epist. 42.* Bartholini *p. 530.* *Fermentum istud quartanæ hoc medicamento quasi vinctum, & in unum compactum, nisi apti cujusdam & appropriati purgantis beneficio è corpore educatur, vim suam fermentativam tandem exserturum, unde perpetuum quartanæ fomitem derivare*

possemus. Si liberior paulò, in re aliâs intricata, philosophari licet, duplex substantiæ materialis differentia in cortice hoc observanda venit; prima particularum acrium insigniter amararum, & aromaticarum: altera particularum ferè insipidarum, (aut saltem subausterarum) stypticarum, districtivarum, quasi magis terrearum, & ex hypothese Tachenii *H. C. c. 17. & 19.* ad similitudinem gallarum & malicorii (quorum effectus colcotharis ex Glo præcipitatorius pariter in aliis adstringentibus radicibus & corticibus, v. g. cort. tamarisci, fraxini, quajaci, rad. tormentillæ, fl. rosar. rubr. &c. observatur) alcali occulto, quod vicinius est fixo, imprægnatarum. De Θ e enim essentiali, quasi Glato, ut vocant, ex subjectis talibus eliciendo, it. de vi vegetabilium adstrictoria, in sapore austeriusculo & textura quasi Osâ fundata, vitandæ prolixitatis ergò nil attinet dicere. Uta itaque hæ posteriores, fermentum febrile acidum absorbendo, illud figunt & concentrant, & ita quasi in unum compactum reduunt, (unde pathemata ista abdominis ex fibrarum & membranarum, occultè quidem, sed pertinaciter, irritatarum spasmò scilicet, oriri videntur) ita illæ priores attenuant fomitem materiale plus minus viscidum, resolvuntque eundem, detergunt simul nonnihil primas vias, & hac ratione, præter insignem, quem provocant, appetitum, Mass. Sangu. & speciatim genitæ inde bilis acrimoniæ volatilem, apprimè acuunt, eorundem dyscrasiam sub febrilibus paroxysmis contractam corrigunt, vique diaphoreticâ eosdem depurant; Uno nomine: Dispositionem istam in ægro, cujus occasione semper recurrunt paroxysmi, conf. Sennertus *de Feb. l. 2. c. 2. p. 66. & 69. 70.* & in quâ fundamentum quorumvis morborum chronicorum ponitur à Galenicis; vid. Ballonius in suis scriptis, in specie *l. 1. Conf. 106. & de Virg. & mulier. morb. c. 7. arnat. 13.* quam per specificum fermentum non inconcinne explicat Tachenius *Clarv. c. 9. p. 240.* id quod & Sennertus jam subodoratus est, ut loco cit. constat, tollere videntur. Uti ergò proficuum pro februm fuga cortex iste utroque ex puncto existit, ita ratione prioris illius figendo nimis, & intempestivè

vè concentrando plus minus febrile fermentum, febrim sistit, sed non semper extinguendo penitus, nec perfectè saturando acidum specificum febrile, recidivæ occasionem relinquit. Posterioris verò ratione evenire atbitror, quod mox melius multò sibi habere videantur ægri, & famem tantum non caninam subinde contrahere, quin & recidivæ, quæ superveniunt, ut plurimum, (nisi aliud quid obstat) facilius curatu existere soleant, quàm ipsa febris primaria, antea saltem suppressa. Dubitare itaque licet, utrum præter singularem acrimoniam amaricantem tam speciale quid in hoc cortice reconditum sit, quod per similes cortices ac radices, quin & per Visca, non æquè commodè suppleri queat? Si non ex toto, ob specificam cujusvis simplicis seminalem crasin, saltem maxima ex parte. Sanè uti saporis similitudine gentiana ipsi propius accedit, de quo paulò infra; ita suspicari licet, costum Arabicum seu Syriacum, cum & ipse de corticum sit familia, prout in officinis hodiè receptus est, illius vice fungi posse. Alios quod attinet cortices, sanè ex nupertima amici relatione habeo, se ob pretium Peruviani hujus corticis carius corticem ligni quajaci in quartana, parili utendi modo, & æque felici successu, substituisse: Id quod sanè haud improbabile videtur, præsertim si cortex ligni acrioris accipiat. Deprehenditur scilicet interdum quajacum, cujus decoctum piperis instar acerrimum est, quod etiam jam Hoffmannus observavit *de Medicam. Officin. l. 2. c. 128. p. 380.* & in hoc ferè differentia quajaci & sancti lignorum consistere videtur. Cortices tamarisci & fraxini, ac gentianæ (credo quod hujus radix intelligenda sit) cum Θ ibus additis fixis, illius Peruani loco cum fructu usurpavit Piens. *Tr. 2. de Febr. c. XI. p. 259. & c. 12. pag. 275.* Non secus ac Deckers, *Comment. super Barbette Prax. l. 3. c. 3. p. 112.* illius loco pulverem compositum, basi cortic. quajaci & fraxini superstructum, substituit. De Viscis par ratio, quæ cum cortice hoc Peruviano permutabilia quasi videntur: uti enim per viscum quercinum \mathfrak{z} j. dos. ante Paroxysmum robustioribus propinatum intermittentes aliquoties curatas novi, id quod pariter Primirosius ceu con-

tra quartanam proficuum observavit *de febr. l. 3. c. X. p. 300.* quæ aliàs, in specie corylinum, de quo supra ad epilepsiæ medelam specificâ laude cluent; ita & hodiè Peruvianum illum corticem in Anglia ad epilepsiæ curam auspiciatò adhiberi, pro certo relatum fuit; non secus ac ad hypochondriaca, ut hysterica pathemata, it. pallidos colores, & Mensium suppressiones, à quibusdam in Gallia, per experientiam confirmatis, commendatur. Gentianæ denique radix debito usu ad illius corticis (qui gentianæ Indicæ fruticis, respectu nostræ herbæ, esse videtur D. Glantz. apud Hœferum *in Herc. Medic. p. 291.*) vires propius accedit, sine eo, ut abdominis illa, de quibus supra, pathemata ejus usum insequantur; siquidem illa ipsa, saltem pulveretenus assumpta, ad tormina abdominis, it. ad passiones hystericas, egregii usus existat. Quantum verò febrifugâ vi polleat, notharum præsertim ac chronicarum tertianarum, &c. speciatim succus ejus inspissatus dos. \mathfrak{z} j. vid. in Schroed. *Pharmac.* ubi de gentiana: Gesneri *Epist. l. 2. p. 62.* Augenio *l. 7. Conf. & Epist. 8. p. 173.* Chiffletio *de pulvere Peruvian. c. 4. p. 35.* Certè \mathfrak{z} j. pulverisatæ ejusdem, in Vino generoso aut Vino absinthite macerata, sicque totum infusum ante Paroxysmum propinatum, quin & pro necessitatis ratione reiteratum, eosdem ferè cum illis corticis Peruviani effectus febrifugos exserere observare licuit. Unde etiam radicis hujus beneficio adulterari jam corticem Peruvianum fraus institorum didicit, surrogando ejusdem loco corticem quercinum, decocto radic. gentianæ, pro amaritie acquirenda, ebruium & imprægnatum. Præfero tamen ipsi pulveri extractum ejus cum spiritu V. factum, à \mathfrak{z} ss. ad \mathfrak{z} j. cum Θ is cujusdam \mathfrak{C} osi vel fixi, ut *absinthii*, \mathfrak{z} j. vel *volat. ut spiritus Θ xi \mathfrak{z} ss. lociatum, variatâ tamen dosi ingredientium, pro symptomatum, in specie caloris ac frigoris, ratione, in va appropri. ante Paroxysmum propinatum, ceu non contemnendum, etiam in quartanis, remedium. Equipollere cortici Chinæ gentianam ejusque extractum asserit expertus Ludovici *in Pharmac. p. 253. & 278.* præfert verò eidem Θ ia alcalisata pro febrium cura Barbette, multi usus Practicus,
*in Pra-**

in *Praxi* c. l. p. 112. Utraque ergò hæc juncta inprimis proficua erunt contraviolentam, ut sic dicam, fixationem, aut intempestivam concentrationem, attenuando fomitem materialem, saturando fermentum febrile, & per sudorem ac Urinam depurando massam sanguineam, unde eo ipso Recidivæ simul præcavebitur insultus.

(1) Ex regno animali.

§. 7. Animale regnum primariò partes duras suggerit, easque nunc Δe calcinatas seu ustas, nunc sine Δe præparatas. Omnia hæc acida fermenta, & inde producta morbosa similis saporis vitiosi, promptè absorbent, & ita concentrant ac figunt: idque omnium maximè calcinata marina, quæ inter famosiora sunt specifica febrilia ista Crollii, ex testis longis Cochlearum, in *Basilic.* p. 297. & Strobelberg. ex matre perlarum calcinatis, *Introduc. Remed. pro febr.* p. 13. Sanè hæc ipsa ad Calcis vivæ naturam propius accedunt, unde & recenter parata vix affusione effervescent & incallescunt, ac Θi*ci commista, hoc subito Θ vol. eructat, absorpto promptè acido Θ*ci; adeò sitientissima acidorum existunt, & ceu exhausta corpora promptè cuivis acido accessum admittunt, illudque intimè imbibendo potenter figunt, ac ita Paroxysmos febriles inhibent. Ac sanè legitimo usu, speciatim temporis & doses ratione, firmioribus subjectis exhibita, ut rectè hoc notat Hartman. *super Croll. Basil.* p. 300. quia infirmi talia non ferunt, sæpissimè febrim feliciter profligant; Sed eo ipso, quo potenter adeò figendo Naturæ motus suspendunt potius, quàm quod fermentum febrile exsaturent, crebrius non absque nocumento propinantur. Nil familiarius, quàm calcibus talibus recidivas supervenire, nunc simplices, nunc, idque crebrius, multiplices, & has ipsas prioribus febribus ferè contumaciores, nisi benè tractentur, quarum rationes ex suprà dictis facile crui possunt. Sin minùs hoc contingat, sanè abusu suo diuturnos languores, & interdum lentas febriculas, hæcticis quodammodo similes, post se trahunt, ut suprà insinuat. Aliquoties etiam contigisse recordor, quod languores illi haud priùs cesserint, quàm Icterus quidam supervenerit, isque cum ægrorum levamine, qui non tam ex hepatis bilis-

Tom. II. Pars 2.

vè vitio, saltem non primario, quàm ex læsa digestionè prima, ejusque in intestinis deficiente perfectione, oriri videtur, quâ chylus sanguificationi ineptus loco rubedinis, flavedine saltem vitiosè inquinatus, tandem spontaneâ per motum intestinum separatione & præcipitatione à reliqua massa secretus, Ictericam defædationem induxit, volatilibus cum junctis amaris, v. g. spiritu Θ* cum essent. cent. min. ac absinth. facile curabilem. Potius ergò, saltem tutius usurpantur non calcinata, sed saltem vel simplici tritura, vel præviâ cum *o secundum Mynsicht. *Armament.* p. 97. aut cum lixivio acri secundum Rolfinccum in *Chym.* p. 379. extractione præparata: Aut si ustis nihilominus, certas ob circumstantias, utendum, terrestria calcinata, C. C. ust. aut Ebur ust. præferrem, insigniter quoque absorbentia & attemperantia, aut non adeò concentrantia nec figentia, ac illa marina, quorum calces ad mineralem naturam ferè propius accedere videntur.

§. 8. Minerali in regno excellit & frequentioris est usus σ, ipsique affinia subjecta plurima, de quo cum sæpius in his thesibus detur agendi occasio, subjectum aliud, Glo ejus cognatum, multi pariter usus consideremus, & hoc sit O Simplex, ut inter febrifuga admodum decantatum, imò magis universale, utpote quod intermittentes præter, & continuis & hæcticis debitâ sub præparatione dicatum est, ita etiam quibusvis in morbis Laxis, à methodicis stricto oppositis, & huc pertinentibus inprimis fluxibus quibusvis, non contemnendi usus, qua ratione in diarrhœis, dysenteriiis, uteri quoque hæmorrhagiis, reverà utiliter adhiberi solet. Quoad vim præcipitatoriam in febris, equidem ad intermittentes vel crudum adhiberi potest, conf. *Exeges. Chym.* Tenzelii in *Salum.* p. 664. in specie in quartana laudare istud satis nequit Hartmannus in *Prax. Chym.* c. 238. §. 4. p. 324. & novè hanc ipsam contumacem, à Medico per plures Menses tractatam, tandem pulvere, ab empirico, ceu universale febrifugum decantato, ex Ois, Θi depurati & nuc mosch. ad 3j cum pauco sanguinis draconis pro fuco tincto, pro 3. dosibus, mox primâ ejus dosi ante Paroxysmum propinatâ profligatam: quod idem videtur esse remedium,

(3) Ex regno minerali.

[Gggg]

quod

quod alia licet sub compositione, super basi tamen Ois, ad qualvis laudat intermittentes Rhumelius in *Iatro Chym. C. 13. p. 427.* conf. Potio febri-fuga Piens de *Febr. l. 2. c. XI. p. 259.* & c. *XII. p. 276.* utut crudo tali præferendum videatur, ob causas, quæ ex infra dicendis sponte patebunt, magisterium illud Schrœderi *Pharmacop. p. 479.* præterea ad scorbutum, quin & Epilepsiam, nonnullis laudatum. Continuas verò quod attinet tam acutas, in quibus etiam simile artificiale Osum concretum, scil. sacch. Æni, aut crystalli mineræ hujus cum spiritu Oi parati, quibusdam multum extollitur, quam lentas Hecticas, in his præparatio & digestio sive coctio artificialis, ut dulcedo O sive ejus saccharum, ut vocant, acquiratur, necessaria videtur; de qua consulendus Poterius *Pharm. l. 2. c. 9.* & speciatim Dariotti de *præpar. Medic. p. 245. c. 24.* ut & Hoffmannus in *Clav. Pharmaceut. p. 349.* cujus tamen processus descriptio manca ex parte existit, ejus vero (ut obiter hoc interserere liceat) Θ crystallisatum abstersivum, *p. anteced. 348.* nil aliud est, quàm coagulum liquoris, qui Oi in ∇ soluto, & cum Θ tartari præcipit. supernatat, & Θ tertium, tartaro Θlatō æmulum, constituit. Ac sanè in dictis malis, & præterea aliis plurimis, in quibus præcipitatione, ut vocant, opus est, lege artis præparatum & exhibitum O, nobile est simplex, de quo mirari ferè liceat, quod rariùs in usum hætenus vocatum sit, cum debitè, ut dixi, præparatum sacch. Æni præferendum ferè videatur.

§. 9. Est O decompositum naturale, ex acido universali minerali, Δis embryonati, rodente terram petrosam s. calciformem, & ita cum hac ipsâ, mechanicâ necessitate, in crystallos octaëdricos coalescente genitum. Sicuti enim Θ ex acido simili Δis embryonati & vena metallica Ois vel Qis, ita O eodem ex acido & petroso corpore in pellucidam Θinam coaluit substantiam pari modo ac Θ, gallarum decocto præcipitabilem; adeoque spiritus sive acidum Δis, Θli, Ois, essentialiter coincidunt, qui tamen intimius longe in Oe quàm in Θlo concentratus, adeoque magis fixatus existit, vel Δe magistro sub destillatione docente. Unde etiam

multum O ubi generatur, ibidem quoque Θ & Δ plerumque reperitur: nec rarum est, ex una eademque vena Θ & O excoqui; sicuti quoque Ois sub præparatione □ humana multis in locis adjicitur pro Θli separatione, & Ois concinniori crystallisatione, ex qua spiritus □ & Θ vol. quod ex Ois cum alcalisato quodam destillatione prolicitur, natales suos derivat. Quæ omnia artificialis Ois productio ex creta, cum spiritu Δ soluta & crystallisata, confirmat, qui spiritus cum Oe aliàs & cum Qe in Θ artificiale coagulatur. Usus E. præcipitatorius & Organismi humorum, quibusvis ex causis concitati, correctivum quod attinet; non præstat hunc O sapore & texturâ suâ adstrictoriâ; adstringere enim partibus solidis saltem ratione fibrarum plus minus laxarum, canalium ac pororum vitiosè hiantium, competit, non fluidis concretis, qui coagulari aut saltem grumescere ejus usu solent, uti in lacte, non secus ac albumine Oorum conspicuum est; & qui effectus ab acido ejus primariò dependent, sicut adstrictoria vis à specifica ejusdem cum terreis particulis textura oritur. Interno ergò sub usu utcunque præparatum, præcipitatur mox in primis viis ab effluviis & contentis partium Θsis volatilibus, parili modo atque extra corpus ab □ Θsa ipsi accidere solet, & quale fatum Θlata Oalia assumpta pariter experiuntur, adeoque acidum ejus volatile sub Θso sic acquisito sapore, vi abstersiva & incisiva ac alterativa, quod suum est, agit, dum acidus morbosus odor vel sapor, plus minus fermentativus corporis, Θ præcipitatum aggreditur, à quo absorptus & concentratus, sive, ut vocant, præcipitatus, potenter adeò figitur, ut ceu incarceratus ac vinctus inermis penitus reddatur. Uti itaque O compositionis & texturæ ratione cum Θlo multum conspirat; ita etiam quoad mutationes, quas recipit in primis viis, passivas, & inde resultantes in corpus alterationes, cum eodem coincidit, ipso Oe ejusque Θlo vi adstrictivâ, it. febrifugâ, præsertim intermittentium, haud multum Oi cedente. Dum verò nimis figendo acida intimius fermenta morbosâ in suis mineris concentrat, quin & adstrictoriâ vi motum humorum plus minus remoratur, sanè illegitimo usu

usu palliare saltem morbos videtur, & vel diuturnos magis eosdem, vel recidivantes, vel in alia pathemata degenerantes, reddere; id quod de sacch. hni, concreto artificiali Oi simili, supra §. 4. relata observatio illustrat. Adeo legitimam administrationem saluberrimum quod existit, perverfo abusu, & insufficiente præparatione, nocivum esse solet. Legitimam administrandi methodum docebunt sequentia; quod verò præparationem attinet, hæc eò dirigenda venit, ut saturata nimis, adeoque fixior & austerior terra petrosa ceu calciformis separetur à subtiliori vel facilius solubili, quæ vel proprio acido minerali, vel ejus loco Φ i Natî suavi solutione, concretum magis Θ inum, minus stypticum, minusque adstringens & austerum, sed acidi quasi extraversi & potentioris ratione magis resolutivum; terræ subtilis verò respectu absorptivum blandius, & acidi morbofi exactius saturativum, evadat.

Cautela
pro legiti-
mo usu.

I.
Ritè sunt
præpara-
ta.

§. 10. Quoad legitimam ergò absorbentium horum adhibendi methodum pro usu interno, sequentes Cautelæ specialius observandæ veniunt: I. Ritè præparata, non verò saturata, propinanda sunt. Præparatio variat, partim pro ipsorum simpliciter præparandorum textura varia; sic enim alio modo partes animalium duræ, sive terrestrium sive marinarum, alio modo mineralia & metallica, præparanda veniunt; partim pro subjectorum, quibus exhibenda sunt, constitutione diversâ; sic enim σ crudus, simpliciter pulverisatus, ut in pulvere simplici Cachectico Hartm. *Prax. Chym. c. 171. §. 5.* robustiori qui sunt ventriculo, aut in quibus potentius dominatur acidum, convenit; conf. Hauptman. *Bol-æensteinischer warmer Bad- und Wassersaß / p. 221. it.* Glauberus 2. *Furnor. p. 57.* aliis delicatioribus infusionem ejus & solutionem mitiorem, cum succo quodam vegetabili acidulo factam, requirentibus. Non secus ac liquor σ Oris, seu solutio ista Φ li naturalis ritè parata, ac sanè multi usus, quibusdam sensiliori Ventriculo præditis perquam molesta observatur, quibus Tinctura Φ li σ Zwelferi, minus σ saturata, sed Θ e essentiali magis turgida, optimè contulit. Scopus ergò præparationis eò collimet, ut (1.) commodè respectu

Tom. II. Pars 2.

ipsius remedii, (2.) tutò ac jucundè, respectu subjecti ægri, (3.) efficaciter, respectu usus, propinari possint.

§. 11. Cum verò usus eorum in enervando p. n. acido inprimis consistat, manifestò sequitur, acidis sub præparatione sui non nimis tractanda esse, quia exuuntur aliàs vi suâ absorptivâ & inversivâ, adeoque frustra propinantur; quantum enim extra corpus saturantur magis acidis, eò minùs intra corpus inserviunt iisdem corrigendis. Quinimò acidis extra corpus tractata diversimodè, subinde ex mutata textura novas facultates, pristinis plus minus immutatis, acquirunt, sæpiùs absterivas aut diureticas, adeoque alienæ indicationi inservientes. Rem exemplis quibusdam illustrabimus: Priori ex fundamento meritò hodie rejiciuntur magisteria sic dicta, ex animalium partibus duris parata, tam præcipitata, quàm abstractitia. Præcipitata quidem, dum solutio per acidum facta præcipitatur ab alcali, vel fixo vel volatili, vel à spiritu Φ li: priora enim sunt calces terreæ, penitus insolubiles, occultè Θ sa, acido solventis & alcali præcipitantis tam arcto connubio particulis terreis cohærentibus, ut nullo edulcorationis artificio penitus liberari possint; exinde enim & ponderis augmentum. Dealbatur talibus assumentium Ventriculus, citra usum alium. Coralia cum acidis, speciatim cum spiritu Φ li, blande effervescento, hunc absorbent, qui tali eorum magisterio affusus sine motu, sine alteratione ulla, observatur, non secus ac perlæ cum quovis acido effervescent, quorum magisterium sine motu illis additur. Posteriora verò styptici quid in concreto suo possident, & dum exactè Φ li acidum elui minimè potest, gustui licet minus pateat, utpote in subjecto præcipitato, particulis alcalinis vol. plus minùs imprægnato, intimius concentratum, tamen vi absorptivâ, concretis istis aliàs appositè convenienti, ferè privata existunt. Nec est, quod dicas, posse ex his magisteriis denuò recuperari Θ vol. si scil. addatur eisdem alcalisatum quoddam seu Θ fixum, sic enim in examine Δ successivè ascendet Θ vol. quod hac ratione acquiritur, cum maxima ejus pars ab acidis, aut solventis aut præcipitantis, enervata ac destructa sit: Requi-

Non satu-
rata ab
acidis.

[Gggg 2]

lita

sita pariter hæc artis, alcalisatum & Δ impetus, dum deficiunt in nobis, neque illorum resuscitatio in corpore nostro expectari poterit. Altera differentia comprehendit abstractitia, per spiritum ☿, it. ☿, aut Vir. ær. parata, quæ utut solubilia, quin & quædam eorum usibus diaphoreticis aut diureticis convenientiora, quædam scopo adstrictorio accommodatiora; attamen cum sub solutione ista ab acidis crasis & textura concreti multum immutata sit, impossibile quoque acidum solvens penitus adeo separare, quin ejus multum, insensibiliter licet, concreto cohæreat, quicquid etiam de suo Vir. ær. spiritu jactitet Zwelferus *App. ad Animadv. p. 66.* hocque exinde novam plus minus, interdum solventibus ☿atis non exacte rectificatis, ingrati, aut nauseose ☿lici ac ☿ei saporis texturam acquirat, adeoque crudorum suorum simplicium absorbendi & invertendi vim nullatenus exferere valeat, ob id præparata talia simpliciter eorum magisteriis longè præferenda erunt. Præparanda ergo veniunt potius vel simplici pulverificatione & lævigatione, qualis in Coraliis, perlis, aut lap. ☿r. obtinet, vel Δ aut ☿æ adjumento, ceu duorum magnorum solventium, ut appositè audiunt Willisio, quibus & tertium illud, ær scilicet, merito sociandum fuisset. Δ adjumento quæ fit præparatio, suggerit calcinata seu usta, vi absorptivâ & inversivâ, cum effectû adstrictorio efficacissima: quibus tamen ob junctum usum potentius & positivè magis diaphoreticum præferenda Philosophica magis, quibusdam in secretis habita, calcinatio, dum v. g. *rasur. C.C.* aut *ebor.* aut *unicornu.* ☿ij. vasi circulatorio, cujusvis formæ, aut cucurbitæ duplici vel simplici, sed alembico cæco munitæ, inclusæ, digestionî blandæ, ne ingratum, quod ex neglecto Δ regimine facile fit, empyreuma contrahant, vel arenæ vel cinerum exponuntur: resolvitur enim sic phlegma spirituosum, particulis ☿inis ☿osis nonnihil aculeatum, & proprium circulationis motu recludit corpus ac penetrat, ita ut post 8. vel 10. dierum moram hoc promptè pulverisari ac in alcohol redigi possit, eo, quod nondum adeo resolutum est, vel solo, vel novo denno addito, digestionî

iterum exposito, donec totum ita calcinatum fuerit. Quoad præparationem horum subjectorum, quæ ☿ fit beneficio: hæc vel ☿æ simplicis vapore instituitur, modò à Rolfinccio *in Chym. 5. f. 2. c. 22. p. 336.* descripto; vel elegantius per lixivium perficitur, modò primitus in Bartholini A. M. H. *Vol. 3. p. 126. & 127.* insinuato. Iisdem ex causis suprâ allegatis meritò etiam suspectus videtur crocus ☿ quorundam aperitivus, ope lixivii nempe ex cineribus vegetabil. crebriori irroratione paratus: Inest scil. ☿ proprium acidum, facile vel simplici ☿â, adjuvante tamen aère, mobile, & quod in crocum sub vulgari rubiginis nomine proprium corpus arrodit. Huic dum additur alcali fixum, acidum istud rodendo ☿is corpus, simul arripit alcali, & ita coagulantur in ☿is corpore, emergitque exinde corpus occulte ☿sum, terreum, iners, vi absorptivâ maximam partem destitutum, nisi in quantum particulæ quædam ☿is crudi aliquantulum adhuc usibus his inserviunt. Nec immeritò rejicere videtur Glauberus *Furn. Philos. p. 2. p. m. 57.* crocum ☿is per calcinationem fusoriam, mediantibus magdalenibus ☿, illius laminis vel bacillis scintillantibus admotis paratum; rodit enim acidum ☿is liquefacti ☿, sed simul concentratur pingue ☿cum, non deflagrans, adeoque pulvis ex ☿e & ☿e compositus, hujus ob accretionem penitus insolubilis obtinetur, nulliusque adeo in corporeus, eo, quod acidi ☿ purioris ratione, ☿ modo solubile & alterabile in nobis existit, in ☿ supposita soluto & abjecto.

§. 12. Ut itaque saturantur ab acidis absorbentia plura remedia, adeoque primario scopo inepta redduntur, ita quædam eorum ab iisdem, mutua ex connexionem, novæque sub textura, novas vires medicamentosas acquirunt. ☿ tartari suggerit nobis exemplum, quod vel in sicca, vel per deliquium solutum humida sub forma, nobile absorbens, & acidi vitiosi corrigens, subministrat, speciatim intermittentibus in febribus, sive solitariò sive per infusionem sennæ sociatum, ad imitationem Riverii *Cent. 1. Obs. 39. 40. Cent. 2. Obs. 66. Cent. 3. Obs. 32. Cent. 4. Obs. 84.* administretur, sane utroque modo, tum ☿i per deliquium facie ad 30. vel 40. gutt. bis in die,

Quædam enim sic alienas vires acquirunt.

in die, quàm cum fenna infusum, alternatim usurpatum, ut in chronicis quibusvis febribus intermittentib⁹, ita speciatim in quartana proficuum admodum ejus usum expertus sum, triplicem quartanam aliquando hyemali tempore hoc ipso profligando. Sed si sub artificiosa præparatione acido vel \dagger destillati pro tartari regeneratione, sub nomine terræ sol. tartari; vel Θ in tartaro Θ ato; vel Π pro Θ e febrili quorundam, reverà Π o regenerato; vel Θ is in spiritus Θ * destillat. pro Θ e hypochondriaco, saturetur, vi acidorum saturativâ & fixativâ penitus depositâ incidens, abstergens, diureticum evadit concretum, sordibus primarum viarum resolvendis imprimis dicatum. Lapides Θ , uti absorbentium usu & effectū non postremi existunt, ita \dagger destillato soluta sub acquisita hinc textura Θ sa multum de facultate hac perdunt (utut à fortiori acido in corpore occurrente, præcipitata ex debiliori, illud imbibant plus minus, adeoque quâvis saturativâ facultate haud penitus careant, \dagger destill. juncto, viscidas sordes incidente & resolvente) & diuretica magis evadunt. Notabiliter quoque hoc patet ex ovorum, imprimis struthionis, testis, egregie absorbentibus, spiritu Θ is in tertium Θ sum solutis citra insignem vini saturativam, potenter incidentibus, & diureticis redditis. Terræ minerales sigillatæ absorbendo & figendo excellent, sed spiritu Θ li vel Π solutæ & saturatæ in liquoris styptici, seu ut Bartoleto *de Respirat. diffic. p. 586.* audit, Θ ri potabilis ex terræ sigillatæ præparatione, texturam Θ sam acquirunt, & stypticæ ac potenter adstrictoriæ existunt.

Non tamen quævis per acida præparatio rejicienda. §. 13. His ipsis tamen quamvis absorbentium per acida præparationem haud rejectam volumus, sed saltem illorum perfectam plus minus ab his saturationem. Tantum enim abest, ut istam penitus excludamus, ut in quibusdam subjectis omninò requiri videatur, præsertim mineralium quæ sunt ex familia, partim ut jucundius & tutius propinari, partim ut ului destinato melius satisfacere, partim ut præter effectum absorbendi aliis simul intentionibus medicis satisfacere queant. Pro quibus scopis assequendis Benigna mater Natura hic ducem se effert, quæ præter copiosa subjecta

alia, ne horum crudorum usu teneriora quorundam lædantur Illia, soluta eadem, & quasi Θ liatæ acidularum sub forma nobis haurienda offert. Jucundius longe præ crudo Θ e hæ ipsæ assumuntur, minusque præ illo præcordia gravant, quin & spiritus acidus \dagger embryonati sociatus incidendo attenuandoque viscosiores, aut hinc inde coagulatas sordes, qualvis obstructions, reverà tales, interiorum corporis viscerum potenter reserant, & canales meatusque quosvis eluit & abstergit: dum præcipitatus à sale vol. Θ so, undique in nobis præsentē, Θ is per præviam istam in acidulis arrosionem quasi prædispositus, & in minutias exiles redactus, acrius occurrens acidum morbosum quodvis p. n. nostris interaneis hostile, promptè absorbet & imbibit, illudque secum coagulatum sordium nigricantium sub schemate eliminat. Non secus ac ex vitriolo per alcali quoddam præcipitatus Θ , Terræ cujusdam mineralis aut Ochreæ facie cadens, cujusvis acidi promptissimè absorptivus existit. Ad imitationem ergò Naturæ pro scopo, ut vocant, aperitivo, seu potius absorptivo, inter tot præparata alia non ultimus est Liquor Θ Θ is dictus, ex magnesia vitriolata, sponte suâ in aëre in vitriolum efflorescente, qui in locum acidularum naturalium surrogari commodè poterit: sicut in forma sicca sic paratum exinde vitriolum Θ is ad albedinem, aut aliqualem saltem rubedinem calcinatum, ad imitationem nempe Excell. Cnæselii in *Append. Anni 6. & 7. Miscell. Acad. Natur. Cur. pag. 105.*

§. 14. Quantum ergo differant tam acida quàm simplicia absorbentia, & imprimis qualem ad se invicem respectum mutuò foveant? probè considerandum venit. Sunt enim acida, quæ subjecta quædam intimè penetrant, & arctissimâ ex minutorum corpusculorum associatione partim novum concretum constituent, partim vim absorbendi penitus deleant. Sunt è contra alia, quæ saltem arrodant, ut superficiali contactu passivis subjectis adhæreant, facile obid, quocunque fiat modo, potissimum tamen per præcipitationum modos, separabilia à se invicem, ita, ut utrumque destinationi suæ debitè satisfacere queat, quin & pro hac magis dispositum redditum sit. Differen-

[Gggg 3]

tia

tia hujus fundamentum in mechanicæ conformationis necessitate formaliter & proximè consistit, cui interdum & essentialis sive radicalis seminalibus ex principiis materialiter & remotè subest. Ut in exemplis iis, quæ hætenus considerata fuerunt, subjectis, analogis, iisque manifestioribus insistamus, quàm arctum connubium in eunt, spiritus vitrioli & ol. tartari per deliqu. quod vix ac ne vix quidem arte penitus dissolvi potest; hinc mutatur utriusque textura, & novum novorum attributorum emergit concretum. Quam laxè verò σ i idem vitrioli spiritus adhæret ita, ut vel facili Δ e, vel levi præcipitatione, separabiles invicem existant, σ e separato, vi absorbitivâ ob sui particulas in minutissimas contractionem, & ex textura metallica in magis apparenter terream alterationem, ut mechanica Chymica ad oculum docet, promptiori & potentiori sic instructo. Quanta differentia inter ejusdem σ à spiritu vitrioli & spiritu nitri factas solutiones, & hinc separati ejusdem denudò notabilis alterationis diversitas. Intimius longè penetrat & dissolvit nitri spiritus, idque tantâ cum violentiâ & impetu, ut insignis æstus exinde exurgat, & tam arctè sociantur solventis & soluti particulae, ut vix ullâ vi divelli penitus queant, quin magna illius portio huic arctissime infixæ cohæreat. Vitrioli è contra spiritus aut oleum artodit potius corpuscula σ ialia, idque lento magis (respectivè scil.) motu, minusque intimè invicem cohærent. Unde ibi quidem emergunt concreta texture perquam adstringentis, & saporis, insigniter styptici, scopo positivè adstringendi convenientissima, absorbendi usu minùs apta. Hic verò vitriolum dulce concrevit, scopo, ut vocant, aperitivo, sive acidorum vitiosorum correctivo, etiam præ crudo σ e longè aptissimum. Imò essentiâ utut convenient sulphuris & vitrioli acidæ stigmata, tamen cum sulphure, sive viâ sicca calcinando, sive humidâ, illius spiritum recipiendo, paratum vitriolum, præferendum videtur ei, cum vitrioli spiritu facto. Accuratè enim si rem considerare velimus, purius & quasi virgineum magis existit sulphuris acidum, & quod in corpus σ facilius penetrat, ejusque particu-

las subtiliores exactiùs dirimit, & quod interno usu amicum etiam magis nobis, & melius resolutivum & abstersivum existit. Vitrioli spiritu ob liquaminis metallici, plus minus sulphurei, societatem, nec rectificando quoque penitus separabilis, (nisi ante vitrioli destillationem artificiosâ depuratione mediante prius removeatur) minus puro, minusque subtili, nec σ e adeò exactè penetrativo existente. Vix itaque assensum mereri videtur Zwelferus in Mantissa spagyrica *P. 1. cap. 3. pag. 337.* dum crocum σ Cachecticum, adeoque aperitivum, hoc est, acidi absorptivum, cum nitro detonando parare docet. Equidem labor ipse ob alias, quibus ansam præbet, speculationes nec inutilis, nec injucundus existit, præsertim dum sulph. σ externum sic manifestum redditur in deflagratione ac alcalisatione nitri, effectu planè eodem, qui aliàs ex simili nitri cum sulphure, δ io, tartaro, carbonibus, sanguine animalium, ossibus aut cornibus animalium, tractatione accidit, adeò omnium trium regnorum sulphura hoc in effectu & operandi modo conspirant: quin & amici relationi debeo, in deflagratione ista flores σ is & nitri simul elevari, qui, in ret. tubulata si instituat operatio, pro eleganti colligi queant remedio, de quo experientia consulenda. De cætero, qui isto modo obtinetur crocus, non secus ac cum spiritu Vir. ær. exinde parata Tinctura, revera terreæ, stypticæ, exactè saturatæ, & minus aperitivæ, acidivè correctivæ est texture. Affusus huic croco spiritus salis lentè, & non nisi longo intercedente tempore, tantillum ejus dissolvit, unde ruberrimam quidem contrahit Tincturam, sed saporem exhibet horridè vitriolicum, potenter adstrictorium, & manifestæ adhuc aciditatis suæ participem. Saturatus scil. σ jam sufficienter, alio ab acido imprægnari recusat. Preparatio E. absorbentium plurium aut saltem comistio cum quibusdam acidis, nunc necessaria, nunc pro certis intentionibus etiam utilis, omninò existit, prout in acidulis §. 13. vitriolo σ c. l. Lap. σ rum §. 12. testis struthionis c. 4. hætenus illustravimus, modo saturationem perfectam, & hujus ratione virtutis absorptivæ destructionem evitemus.

Caut. II.
moderata
dosi exhi-
benda.

§. 15. Pergendum ulterius in debita absorbentium usurpandi methodo, ubi *Cautel. II.* Non nisi moderatâ dosi exhibenda sunt. Peccatur hic frequentissimè in excessu, dum aut sæpius reiterantur, aut diutius continuantur, aut copiosius una vice ingeruntur. Determinat doseos rationem in genere acidi morborum quantitas & exsuperantia major vel minor, quin & ejusdem qualitas sive acrimonia corrosiva, potentior aut debilior. Posterioribus in casibus uti minor omninò sufficit quantitas remedii; ita in prioribus major indicatur copia. Moderandus tamen ita eorum usus, ut partitis potius vicibus, quàm semel, idque eò succincta magis dosi, quo diutius iisdem insistere cogimur, adhibeantur, intermittendo subinde eorum usum, quamdiu symptomata non nimis urgent eundem. Observanda quoque morborum vel continuorum vel intermittentium differentia in istis, cum continuato ferè usu administrantur minori dosi unâ vice; in his verò cum interpolatis vicibus adhibeantur, copiosius unâ vice propinare licet. De cætero, uti semper in p. n. cujusvis remotione festinandum lentè, cum quævis subita mutatio sit periculosa; ita in his auxiliis quæ intenditur alteratio, tutior est successiva, quàm repentina. Utut enim minus nocere videantur, cum passivè potius se habeant, & privativo modo proficua sint, quàm alia alterantia, quæ positivè magis sensilius vel contenta immutando, vel solida afficiendo, operantur; immoderata tamen dosis etiam sua infert incommoda, de quibus suprâ, §. 3. utut ob modo insinuatam rationem magis lenta quàm acuta, seu magis successiva & diuturna, quàm subitanea, sed exinde etiam minùs citò denuò corrigibilia, inferant nocumenta. Nempe idem mihi videtur sub inconsideratâ horum dosi accidere, quod picantibus usu venit, qui moderato rerum ardentius desideratarum usu, ceu alimento medicamentoso, saturando specifici saporis acidum stomachale, levantur & melius habent; ast nimio eorundem abusu anorexias, dyspnœas, cachexias, febres lentas, & mille mala incurrunt. Stolidi quarundam virginum fert opinio, cretæ, præcipitantium sive absorbentium non postremi, usucandorem faciei se sibi conciliatu-

ras; quæ tamen, quantum continuatâ ejusdem ingestione lædantur, quoad primæ digestionis, & dependentium inde reliquarum negotium, quotidiana loquitur experientia. Quodsi ex picæ stimulo vel cretam, vel calcem viv. vel similia devorent, modò non nimio fiat excessu, auxilium potius exinde, quàm nocumentum experiuntur, quod iisdem sanis haud æquè impunè licitum foret. Ast si & in pica quoque excedant in dictorum usu, supra enarrata mala pariter effugere nequeunt.

§. 16. Præter dicta in rationali absorbentium & saturantium usu sit *Cautel. III.* Curiosus selectus eorum instituendus. Haud enim omnia æquè omnibus conveniunt. Nec postrema prudentiæ medicæ pars est, acutè hariolari, quale remedium ægro, præ alio simili magis conveniens sit. Cum itaque tanta luxuria sit absorbentium remediorum, meritò eadem curiosè discernenda, & quid convenientius sit? eligendum. In selectu tali instituendo respectus habeatur tam ad ipsa remedia, quàm ad ægros. Remedia quod attinet; selectus sub eorum usu instituendus triplici ex ratione: I. Propter eorum insignem varietatem; supra c. 1. §. 11. 12. 13. 14. 15. enarratam. Sunt enim vel nativa vel præparata; hæc vel simplicia vel composita: utraque à textura & proprietatibus nativis plus minus abeuntia: Sunt insipida, terrea, aromatica, amara, austera, dulcia, urinosa, eaque tam fixa quàm volatilia, &c. quæ universa & singula æqualiter adhiberi nequeunt, cum ubique certus respectus agentium & parientium omninò requiratur. Speciatim unam saltem notabilem urgebo, & quæ ad præsens negotium magis facit, differentiam: Acidi peccantis enervationi dicata sunt illa omnia, sed diversimodè hoc præstant, tam respectu acidi in genere, quàm hujus aut illius in specie. In genere acida enervantur sub rosionis actu, sed quædam cum insigni plus minus, quædam sine ulla effervescentia: & quando effervescentiæ contingit tumultus, acida quædam in specie insigniter, alia minus hos ipsos cient. De urinosis ceu acrioribus nihil dicam, quæ sine effervescentiæ motu cum acidis haud facile coeunt, celeriori quidem & breviori volatilia, vehementiori & longiori fixa, ut ex

Caut. III.
debitus
selectus
instituendus.

Isque vel
respectu
Remedii.

spiritus

spiritus vitrioli cum spiritus Θ^* , & cum ol. tart. miscela constat. Saltem insipida consideremus: Hæmatites cum acido nec vitrioli nec nitri commotionem ullam observabilem exerit; ast σ , ejusdem licet radicis fructus, cum iisdem validissimo impetu congregitur, idque longè vehementius cum spiritu nitri, quàm vitrioli, adeò ut explosivo quasi impetu intensissimè cum illo ipso exæstuet: id quod tamen multo remissius erit, si σ cum sulphure præparatus seu calcinatus recipiatur. Ut itaque crudus σ efficacior longè erit vi absorptivâ, & acidi promptius alterativâ, ita hic præparatus blandius, minoribusque cum turbis, sed simul debilius ac tardius, idem præstabit. Bolus Armena, terræque plures sigillatæ, absorbent acida promptè, tam vitrioli quàm nitri, & in Osa concreta cum priori illo coalescunt, ast sine effervescentiæ conflictu; qui impetuosus admodum notatur, Cretæ si associantur, ut sub præparatione Phosphori Balduini conspicuum est: C. C. crudum ebullit cum spiritu vitrioli, intensius cum spiritu nitri; intensior erit conflictus, si sine Δ calcinatum recipiatur; cum usto verò adhuc vehementior observatur: Testæ quævis cum spiritu vitrioli, intensius adhuc cum spiritu nitri effervescent, sed utrumque diversimodè, pro illarum varietate: σ testæ quidem insigniter, sed sine strepitu aut fumorum elevatione; ostrearum è contra intensius multo notabili cum strepitu ac fumis; unde harum pulvis quibusdam sub nomine Præcipitantis magni adhibitus fuit, qui aliis pro intermittentium fuga inservit: Coralia eodem spiritu vitrioli tractata moderato impetu cum illo congregiuntur citrà æstuationis aut effumationis insignioris apparentiam, unde & blandius, mitiusq; in nobis operari probabile est: Sabulum urinarium, calculique renales, ab ol. vitrioli ne tantillum alterantur; spiritus verò nitri solvit eosdem, nunc [pro ipsius specialis texturæ ratione] cum nunc sine effervescentiæ vestigiis, nunc in loco saltem calido, nunc etiam in frigido, nunc penitus dissolvendo, nunc in substantiam molliusculam convertendo, quæ & alia frustra à spiritu sulph. aut Θ lis expectantur: analogum quid in lapide ex cysti felleâ notatur, cum spiritu nitri successivè ebulliando, non

verò cum spiritu vitrioli. Sed quotidie cum talia occurrant, non est, ut prolixius diducam. Saltem in selectu absorbentium attendendum, facilius an difficilius effervescebilia in nobis sint contenta p. n. vitata? illud quo acriora, hoc quo mitiora; non secus an citius aut tardius acidum peccans infringere, quo magis vel minus effervescentiam cum eodem excitare conveniat, quo talium sub respectu circumstantiarum appropriata magis seligere queamus. Quin etiam, ut acidi sapes sub morbofo statu variant, ita & absorbentia quædam iisdem corrigendis aptiora existere, evidens est, unde artificiali stochasmo ut specialem illorum differentiam subinde scrutari necesse habet Medicus, ita & horum selectum debitum instituere.

§. 17. II. Propter speciales proprietates, quibus præter generalem corrigendi acidi morbofo usum ulterius prædita sunt. Salia enim volat. præterea vim diaphoreticam, terræ minerales insigniter adstrictoriam: obtinent. Viscum Corylinium vim antiepilepticam, cortex fraxini diureticam, Winteranus antiscorbuticam, cinamomi (post destillatum ol.) contra fluores alvi, cort. avellanarum contra fluorem album, ossa sepiae contra gonorrhœam, medulla saxorum contra stranguriam, osteocolla ossium agglutinativam, lap. σ vulnerariam, dens apri aut Ceti Narhual, aliàs unicornu marinum, antipleuriticam, & contra quasvis inflammationes partium internarum erysipela-ceas, Cran. hum. violenter interemti antiepilepticam, σ alia anticachecticam, ψ alia ac \hbar na antihecticam, &c. præterea speciatim exerunt. Talia ob id seligantur ubique, quæ præter generalem invertendi usum specificâ simul proprietate, aut effectui speciali appropriata, aut symptomati urgenti convenientia existunt. Sic enim variolis cum diarrhœa symptomaticâ complicatis, Terræ minerales; cum epilepsiâ affligentibus salia vol. &c. appropriata magis existunt. III. Propter texturas novas, quas vel sub præparatione, vel sub compositione, vel sub sui in primis viis alteratione acquirunt, ratione quarum qualitatibus & proprietatibus à nativis plus minus distinctis, his vel enervatis vel retentis, instruuntur. De Præparatione & alteratione per acida jam supra

præ §. 12. locutus sum, præter quam tamen & aliæ modò insinuatæ circumstantiæ quoque attendendæ. Alia sanè est ratio C. C. usti, ab eodem sine Δ e calcinato; illud potentius longè absorptivum, hinc eiam adstrictivum, præ hoc magis diaphoretico existit: Testæ concharum, ærum, aut ovorum calcinatæ, à se ipsis non calcinatis, quin & istis terrestrium animalium ustis, multum differunt: Calcis vivæ enim texturam exhibent, unde & recenter parata effervescent ∇ æattactu; acido Θ marini in ostracodermis, aut arenarum siliciumvè deglutitorum in ovorum testis, Δ ope resoluta, & cum particulis terrestribus laxiùs nonnihil sociata, per ∇ additionem resoluta. Sanè potentius effervescent, & promptius absorbere acida observantur præ illis non calcinatis, idque eò magis, quò diutius calcinationis Δ i expositæ fuerint. Febrifuga in specie sunt talia, quæ citra calcinationem cum spiritu Θ composita, falso sub sapore egregia sunt diuretica: quam vim, uti sub texturæ mutatione cum spiritu salis, qua ad alcalium fixorum naturam propius accedere videntur, in primis acquirunt; ita si eadem cruda saltem pulverisatâ propinentur, prout cum acido primarum viarum, magis vel minus acri, &c. in saporem plus minus falsum coalescunt, etiam unâ plus minus abstersiva ac diuretica evadent. Terra sigillata & cretaceæ, quo potentius sibi occurrens invenient acidum, eò Θ lam magis acquirunt texturam, eòque potentius adstrictoriam: σ prout magis vel minus sub præparatione multiplici acidi saturatus fuerit, eò faciliùs aut difficiliùs hypochondriacorum & cachecticorum acida corrigit: sicuti ipse pro acidi, quod sibi obviâ venerit, varietate, sub hujus alteratione vim nunc hæmorrhoidalium affectuum curativam, nunc mens. suppressorum aperitivam, nunc eorundem nimis fluentium restrictivam, acquirat, etiam si unum idemque ex eo adhibitum fuerit remedium. Antihecticum Poterii, prout sub præparatione ejus sulph. Ψ is externum, vel certa enchirisi separatum, vel communi more relictum fuerit, unde color ejus subcœruleus, hic simul vim laxativam, interdum emeticam, ibi verò diaphoreticam saltem exhibet. Ab-

Tom. II. Pars 2.

sumpto scil. sulphure Ψ is externo per deflagrationem, sub legitima præparatione calx γ ialis maximam partem, sive alcalinæ profapiæ, exhausta quasi aut vacua remanet, promptè acidi vitiosi Hecticarum & continuarum acutarum absorptiva, ut peregrini hujus accessu defectus acidi sulphurei, quod sub præparatione perdiderat, utcunque restauretur. Θ crudum acidi intensioris melancholico-hypochondriaci absorptivum est & correctivum, vid. Moglini Vellus aureum p. 8. & 9. quod cum salibus compositum, respectu Δ vim novam fulminantem, respectu corporis vim potenter resolutivam, abstersivam & laxativam, & in infantibus peculiariter antiepilepticam acquirat. Cæ magisterium artificiosè paratum, uti acidi melancholico-maniaci speciale correctivum suggerit, unde & ex effectu quibusdam **das Warren-Pulver** appellatum est; ita eadem Cæ cum acido nitri imprægnata, internè potens hydragogum, externè penetrans escharoticum, exhibet. Subselectu adeoque absorbentium horum, præter nativas facultates, & ad adscititias, sub præparatione & compositione, aut in primis viis alteratione oriundas, plus minus statui ægro accommodatas, respectus sedulò habendus est.

§. 18. Ægrum quod spectat: hujus consideratione selectus inter remedia absorbentia accuratius instituendus pariter, triplici ex fundamento: I.) Propter individuorum ægrotantium varietatem. Dum non hominem in genere, sed hunc vel istum in specie, tractandum habeat Medicus, ad $\tau\epsilon\chi\nu\alpha\sigma\tau\iota$ in curationibus quibusvis descendat, vel Hippocrate monitore. In omni verò subjecto tali, præter generales, quoad temperamenta, ætates, sexus, &c. rationes, specialis cujusvis individui Idiosyncrasia vel maximè attendenda venit, sive eadem nativa, sive adventitia fuerit, sive in spiritu insito aut influo, sive humorum corporis speciali Crassi, sive partium solidarum differenti texturâ radicata existat. Nam hujus ratione, ut ad diversas ægritudines plus minus declinat æger, ita etiam remedia quædam plus, quædam minus, appropriata existunt: Sunt qui saccharum \hbar ni admodum horrent, aliis nil inde sentientibus: Mulierem novi, quæ liquorem σ is Θ aris non

Vel respectu Ægri.

[H h h h]

benè

benè ferre potest, Tincturâ vitrioli ☉ Zwölferi, aut solut. ☉ cum succo pom. ipsi amica, idque ut suspicior, ob delicatam magis fibrarum ventriculi texturam, earundemque exquisitam sensilitatem. Sed cum frequentissima sint similia Idiosyncrasias exempla, ob id, non nisi ista adhibeantur absorbentia, quæ individuo ægro, ut tali, conveniunt, & speciatim Idiosyncrasia ratione ipsi non contrariantur. II.) Propter acidi peccantis distinctas proprietates: quod uti in artificialibus, v.g. sub præcipitationis negotio, pro sui varietate subinde aliis magis appropriatis alcalibus, aut his cognatis absorbentibus, saturandum venit; ita etiam in therapeuticis, aliis atque aliis subinde corrigendum venit invertentibus. Quò magis enim appropriatum saporì acido saturando fuerit auxilium, eo perfectius illud extinguitur, & tutius citra vel recidivam, vel alius affectus epigenesiam, curabitur morbus: uti enim mechanica ex figuratione spiritus vitrioli à sale tartari exactius saturatur, quàm à ☉, & ∇ fort. à ☿ quàm à ☽; ita & subordinatio talis saturantium, respectu acidorum diversorum in contentorum statu morbofo, omninò locum habet. Nunc enim acius existit idem, nunc mitius: illud quale in scorbuticis, ac quamplurimis hypochondriacis, fortioribus absorbentibus, in specie metallicis enervandum: huic quale in vulnere, vel stranguria, Lapillis ☿um sufficientibus. Molestiam pluribus creant salia urinosa, tam fixa quàm volatilia, in quibus scilicet acius luxuriat acidum, idque ob effervescentiæ motum, quibus insipida & terrea magis appropriata existunt. Fixius quorundam observatur acidum, in alio, quod volatilius; Tertianarum fermentum acidum præ ardentium continuarum fixius est; volatilius verò præ illo quartanarum: cujus mutati status respectu non rarum, permutari invicem has febres, adeò, ut quæ continua fuerit, in tertianam intermittentem mutetur & contrà, pro ut tertianæ in quartanam, & contrà; vel sponte æquinoctiorum sub mutationibus, & hinc contentorum fluidorum mediante aëre inspirato, ad majorem vel minorem resolubilitatem & volatilitatem dispositione, degenerare solent. Unde absorbentia

nunc fixiora nunc volatiliora, & hæc nunc macra, nunc oleosa conducibiliora. ☿ialia scil. fixa in ardentibus potius conducunt, quàm quartanis, & in his spiritus ☉*ci aromaticus potius, simplici pro tertiana sufficiente. Ante omnia autem specificus acidi peccantis sapor, & inde determinatæ dependentes determinatarum quoque partium læsiones, accuratè considerandus: Aliud enim acidum vexat hypochondriacos melancholicos, aliud Ictericos, aliud variolis vel morbillis correptos, aliud pleuriticos & hepatiticos, aliud podagricos, aliud gonorrhœa affectos, idque distinctum in benignâ, ab illo in malignâ, & sic tantum non in infinitum. Hisce ergo specificis saporibus appropriata superius insinuata opponenda remedia, utut à priori, non secus ac saporum vel fermentorum morbosorum natura, imperscrutabilia, adeoque à posteriori, per experientiam saltem comprehensibilia. III. Propter affectuum p. n. in ægris multiplicitem: quæ sive connexi sive separati existant, selectum absorbentium ita determinat, ut nonnisi talia, quæ nocere non possunt, respectu juncti affectus alterius p. n. adhibeantur. Saccharum Hni, & super ejus basi constructa Tinctura anti-phthifica, it. liquor alterans ex Oe, sudoribus nocturnis plus minus colliquativis, tam post febres diuturnas, quàm scorbuticorum, aut phthysicorum, optimè profunt, sed iis vix adhibentur tutò, qui siccioris sunt alvi, seu hujus obstructionibus obnoxii, hanc enim constipant, propterea in diarrhœis colliquativis, ut & dysenteriiis, proficua existunt: ☿ialia Cachecticis, Ictericis, & inde Hydropicis, sunt optima, non tamen quibusvis, quin noceant siccioris, & (apparenter) calidioris qui sunt constitutionis, vel quorum hepar aut lien, aliavè abdominis viscera infarcta, ad scirrhosam constitutionem degenerant, ut jam supra ex Tachenii Clave p. 181. & 192. indicavimus; sed illis saltem profunt, qui magnos lienes, & si non ∇, saltem amurcâ sanguineâ nigricante tumidos ac turgidos habent, ut dicit Borrichius *Hermet. Egypt. Sapient. p. 303.* salia volat. & spiritus urinosi multi usus sunt saturativi plurimis in affectibus, speciatim hystericis dictis, nominatenus spiritus ☉* simplex, aut aromaticus,

aut

aut Liqueor C. C. succin. qui tamen nimio mensium fluxui obnoxii non absque mali huius irritatione, aut gravidis vix absque abortus periculo, propinantur; sicuti idem spiritus Θ^* , qui debilioribus sunt oculis, interno usu inimicus ferè videtur, sensibilibiter eisdem lædendo, quod plus una vice observasse me visus sum, de quo tamen uberior consulenda experientia; Eadem salia volatilia primatum uti ducunt in febrium malignarum curâ, tamen sub hæmorrhagiæ faciliè inde concitandæ metu, ut bene monet Borrichius in Bartholini *Vol. IV. Act. Med. Hafn. p. 166.* prudenter propinanda sunt. Recordor juvenis, generosi spiritus, splenetici tamen, & hæmorrhagiæ habituali, subinde enormi, præsertim Vini sub usu, obnoxii, qui uti Θ alibus ab iisdem præservatur, in specie liquore Θ ori, ita spiritus Θ^* usu eadem provocantur. Hypochondriacorum vaga, præsertim quæ abdomen affligunt, pathemata, absorbentibus pluribus, in specie marinis, animalium partibus duris, it. salibus alcalifatis, sopiuntur, cavendo ab istis, quæ adstringendi vim vel habent, vel faciliè acquirunt, ut terris mineralibus; quo magis enim talium clauditur alvus, eò deterius affliguntur hypochondria, aliæque per consensum partes. Talia adeoque eligantur ubique Præcipitantia, quæ ab aliis simul permittuntur indicantibus, ne tantum ex una parte noceamus, quantum prosumus ex alterâ.

Caut. IV.
Ordo debitus observandus.

§. 19. Pergendum ulterius, & notandum pariter IV. quod in exhibitione eorum debitus Ordo non negligendus. Sub insigni scilicet remediorum talium Varietate uti primò selectus debitus, ita postmodum eorundem Ordo, probè observandus. Hujus ratione triplex illorum differentia in primis notanda, dum sunt vel temperata sive insipida, vel acria, qualia sunt urinosa salia, & hæc vel fixa vel volatilia. Scil. non rarum est, adeò contenta acriora acida in quibusdam fervere, ut cum urinosi in efferatam effervescentiam, contentorum insigniter alterativam, continentium sensibilibiter irritativam, coeant. Præterea motus morbi ratio hic ante omnia habenda est, celer is ipse sit, an verò tardus? & chronicum, an vero acutum sit malum, quod affligit? In chro-

Tom. II. Pars 2.

nicis enim præstat omninò temperata ista insipida præmittere, quorum tactu frangantur, ut sic dicam, dentes aculeati acidi efferati, quo minori cum tumultu ab urinosi postmodum saturetur. Semper enim insipida illa sive temperata præ acrioribus tutiora observantur, minori saltem cum tumultu proficua. Sed absorpto & fixato acido ferè aut saltem maximam partem ulteriori usu carent, dum acria sive urinosa præter hoc, quod acidum saturant, in falsi texturam cum eodem coeunt, & ita abstersiva, resolutive, & diuretica simul evadunt. Cum etiam nunc primas vias magis occupet acidus sapor, nunc altius intra corpus, huiusque partes, tam continentes quàm contentas, odor ejus penetrarit, utut ex ista regione ferè primario spirans, ob id fixis præmissis in primo sui fonte corrigantur prius acida, quibus volatilia, id quod altius penetravit saturando, & diaphoreticos beneficio eliminando, auspiciato subjunguntur. Sæpius hoc in ægrorum, chronicis morbis laborantium, visitatione observare contigit: Haud ita pridem curæ meæ se obtulit mulier mediæ ætatis, hysterico-scorbutica, simulque splenetica, præter sensibilia, eaque spasmodica, abdominis pathemata, ad melancholiam declinans, unâ cum mensium ultra 3. menses suppressione. Hæc ab exhibitio spiritu Θ^* p. iij. cum spiritus Cochlear. p. 1. mirè offendebar, omnibus symptomatis notabiliter exasperatis: sed seposito tantisper huius usu, & præmissis absorbentibus, Θ alibus, Coraliatis, salibus fixis, interpositis paucis laxantibus, & sic saturatis ac edulcoratis acrioribus primarum viarum contentis, repetito ejusdem spiritus usu, mirè recreabatur, & cum sensili levamine per plures dies ejusdem usum continuabat: Quartana, quæ omnium Practicorum consensu in principio blandius tractanda sunt, nisi subjecta robustiora & *ὑπερλαγνία* eadem corripuerint, quam faciliè ac insigniter acrioribus istis irritata, multiplicato furore resurgunt, de quo minùs metuendum, si Θ alibus, (aliis simul, præsertim attenuantibus non omis) amaris sociatis intermissionis die successiva alteratione temperentur contenta acriora, quo tutius ante paroxysmum urinosa ista, acriora licet, sed etiam nunc insipidis plus minus

[H h h h 2]

nus

nus maritata, propinentur. Scilicet acutis in morbis, aut saltem chronicorum gravioribus paroxysmis, fausto cum successu insipidis acris, item fixis volatilia, sociantur, & urgente praesertim affectu, quo plurimis indicationibus satisfieri queat, junctim propinantur, idque speciatim in casu, quo liberior diaphoresis unà promovenda. Hystericis sanè & hypochondriacis inopinatis non rarò paroxysmis, & quæ his propius accedunt, Colicis convulsivis, epilepticis internarum ac externarum partium convulsionibus, vagis scorbuticorum pathematis, & pluribus similibus malis, spiritus Θ^* ci, & quælibet salia volatil. cum fixioribus absorbentibus, juncto opere optimè succurrere solent. Nec ineptè plures specific. febrile Strobelberg. it. Coralia præparata, cum sale absinthii in tertianarum cura copulant: aut huic ipsi sali fixo, spiritum Θ^* ci potionis formâ, pro quibusvis intermittentibus profligandis jungunt, quam methodum & observavit Deckers in *Comment. ad Barbette Prax. l. 3. cap. 3. pag. 113.* saltem quod spiritus Θ^* ci dosis parior videatur. Continuis in benignis absorbentia Cervina & figentia ðialia cum sale volatili, aut Cervino aut Viperino, debitâ sub proportionem & forma eleganter propinantur: Id quod in pleuritide, hepatitide, & maturata operâ in anginâ, & quibusvis comitatis sic dictis febribus, pariter observari debet. Malignas verò quod attinet febres: quarum fermentativus odor mole subindè minimus, adeoque insensibilis, minùs fluida corporis, quam spirituosâ inquinat, quo ex fundamento contagiosâ quoque, si non omnes, pleræque sanè existunt, (non secus ac cæteri extra febres contagiosi morbi) alia ferè harum est ratio, in quibus, utut & similis fixorum cum volatilibus copula, haud adeò inepta existat; volatilium tamen inprimis, idque sub principio, etiam solitariò exhibitorum, potior omninò & ratio & operatio esse solet, id quod agendum restitit, pro contentorum, febrilibus sub turbis, plus minus vitiatorum alteratione p. n. emendandâ, fixis temperatis ferè absolvendis: de quo, ne nimis prolixus sim, conferendus Vir multæ experientiae magnique Laboris Ludovici in *Pharmac. p. 237. 261. 283. 284.*

& de sale vol. tartari p. 86. it. Pauli Digress. de Febr. malignis, &c.

§. 20. Præter dicta, in rationali absorbentium & saturantium horum usu sit Cautel. V. Convenienti tempore administranda veniunt. Cautel. V. Conveniente tempore usurpanda. Occasio enim, quæ aliàs præceptis, ritè observata, medicationis cujusvis est anima. Adeò & hîc in tempore venire, multum est. Triplici circumscribitur termino, præteriti, præsentis & futuri; debitâ ex quorum observatione legitimus agendorum ordo emanat. Quem triplicis differentiae hujus respectu Institutionistæ communiter insinuant, dum quid ante quid, quid cum quo, quid post quid, agendum atque curandum sit, attendere sedulò jubent. Omnia hæc primariò ex motu Naturæ plus minus ordinato aut turbato, & acidi morbosî impetu, vel imminente, vel nimis urgente, dijudicanda veniunt.

§. 21. Quodsi differentiae hæc temporis, & hinc administrandorum remediorum occasio debita, consideretur, ante omnia monendum videtur (I.) ratione temporis præteriti, quod non, nisi præmissis primas vias abstergentibus & purificantibus, usurpanda sint. Naturæ ex jussu intestinali recipiendis & excernendis sordibus, tam naturaliter ex assumtis, necessitate materiæ natis, quàm p. n. ex venoso genere per abusum quasi vasorum felleorum ac pancreaticorum, quin & glandularum intestinalium eò derivatis, dicata sunt; unde hæc loca nunquam colluvie plus minus vitiosâ carere solent: ut taceam, p. n. sub digestionis errato, quot vitiosa relicta in ventriculo & intestinis, ipsisque mesenterii glandulis, subinde stabulentur. Harum præsentia ne vel foveantur accidentaliter præsentis morbi, vel varia saltem excitentur symptomata, vel successivâ harum resolutione factâ per vasa lactea ad interiora corporis penetrent, vel impediatur remediorum absorbentium actio, id quod relicta mucosa seu pituitosa, hoc est, crudioris chyli portiones inprimis præstant, vel illa cum istis in novum concretum dictis partibus hostile, aut functiones earum impediens, coeant, propterea consultum est, ut abstergentibus & blandè istas partes irritantibus, hoc ipsæ maturè expurgentur & mundificentur. Præmissis primas vias mundificantibus. Quin etiam

etiam, cum non rarò foveatur morbus à mucò, seu pituitâ viscidiorè, fermenti morbosì subinde subjecto, sive materia occasionalis antecedens sive productum morbosum consequens fuerit, hujus attenuationi, resolutioni, ac repetitæ evacuationi, sedulò opera danda, (sicut hoc quoad quartanas in specie urget Sylvius: *l. 4. prax. Tract. 10. §. 484. 875. 877.*) antequam absorbentia hæc, præsertim fixiora & minus solubilia adhibeantur, quia aliàs aut morbi, v. g. febris, multiplicatio, aut inevitabilis diurnitas, aut ejusdem major pertinacia, istis scil. cum acido absorpto & subjecto fomite viscido in concretum magis tenax coeuntibus, ut probabil. supra §. 3. declaratum fuit. Perinde autem est, sive vomitu, ut in plerisque febribus, tam benignis quàm malignis obtinet, sive secessu, negotium hoc expediatur, modo eò, quò maximè vergunt, per loca convenientia ducantur evacuando, *aph. 21. §. 1.* sane ex cautionis hujus neglectu, quoties febres intermittentes vel multiplicantur, vel in Chronicos morbos degenerant? non secus ac continuæ acutæ in lentas abeunt, &c. aut dysenterix benignæ ac diarrhœæ contumaciores redduntur, aut palliato licet effectu, subinde crudeliùs recidunt, &c.

Idque ut-
pluri-
mum, sed
non sem-
per.

§. 22. Ut plurimum scil. hoc ipsum observandum, siquidem in pluribus simpliciter necessarium est casibus, haud tamen universaliter, aut rigorosè nimis huic insistendum axiomati. *Sæpè enim axiomatum nostrorum prætextus speciosus, ac mordicus facta observatio, in præcipitia quædam pericula ægros magno damno conjicit*, ut notat magnæ experientiæ Practicus Ballonius, *lib. 1. observ. 30. Hinc & stultum esse axioma, præmittenda semper esse Universalia, h. e. purgationes, & V. Snes in morborum curationibus* Asserit Lindanus *super Hartman.* scil. leviori in malo, v. g. ardore ventriculi, ut istorum præmissio est supervacanea; ita è contrariò graviori, vel subitaneo quodam urgente paroxysmo, suffocationis videlicet hypochondriacæ, aut concitationis cordis palpitationis, aut enormis sanguinis bullientis profusionis, eadem foret summè periculosa, in ancipiti subinde statu versante agro. Adeo-

que de præservatoria potius, quam curatoria indicatione, morbis habitualibus & chronicis debita methodo eradicandis, non subitaneis affectibus aut paroxysmis compescendis, ægris saltem cacoehymicis plus minus, non quibusvis, intelligendum venit axioma istud. Præterea duo sunt, quæ purgationes quasvis vel impediunt, vel difficiles, interdum quoque frustraneas reddunt; materiæ evacuandæ visciditas, & ejusdem acrimonia acida & pontica, quæ commota in scorbuticis, hysteriis, colicis convulsivis, quartanis, &c. quas non turbas subinde excitat, quibusvis si tantillum irritetur evacuantibus? In talibus adeoque ab his curationem auspicari, minus rationale foret, quin absorbentibus in genere saltem talibus præmissis, aut etiam ipsis purgantibus additis, de quo infra, tuta & jucunda magis reddenda evacuatio. Adeoque de absorbentibus fermenti special. alterativis, non materiæ evacuandæ digestivis seu præparativis, deque illis specificis magis & particularibus, minus de universalioribus, axioma istud explicandum.

§. 23. Præsens porrò quod attinet tempus: dum actu subministranda sunt absorbentia sive præcipitantia, circa hoc motus Naturæ, circa causæ occasionalis correctionem (quæ in fermenti vitiosè acidi contemperatione, fomitis verò plus minus viscidæ resolutione & attenuatione, utriusque correcti per convenientes vias exclusionem, consistit) occupatæ attendendus: ratione cujus vel continui vel intermittentes existunt morbi, ex quo emergit ista differentia, quod in istis tempora saltem morborum universalia, in his præterea unius cujusvis insultus particularia, observanda veniant. Notandum ergò: (1.) In continuis minus in principio, sed in incremento saltem, aut potius in itatu locum inveniunt absorbentia ista medicamina. Fluit hoc ipsum ex suprâ dictis; dum enim fomes morbosus materialis, prius attenuandus & resolvendus, primæque viæ expurgandæ sunt, vix præterquam in incremento ac statu locum habebunt. Nisi talis illorum vel selectus vel miscela instituat, ratione cujus talia exhibeantur, quæ modo insinuatiscopis simul plus minus inserviant, qualia vel salina, vel facilius solubilia erunt. Præterea

In acuto-
rum in-
cremento
& statu.

[Hhhh 3]

mini-

ministras operas Naturæ benè agentī ferre debet Medicus, id quod præstat attemperando successivè acre morbosum fermentum, quo eò faciliùs superari morboſo sub conatu à Natura ac saturari queat; id quod non nisi sub incremento, & omnium maximè in statu locum habet. Aliàs in principio si adhiberentur ista, fermentum acre præposterè figendo & concentrando, mala, quæ suprà §. 3. & 4. insinuata fuerunt, necessariò supervenirent. Nimius tamen Orgasmus humorum hic probè considerandus, cujus intuitu, & inde imminentium malorum, subinde etiam mox in aut post principium morbo acuto tali celeriori motu principii & incrementi tempora absolute, remedia talia figentia & invertentia subministranda veniunt.

In Inter-
mittenti-
bus ante
Paroxy-
smos.

§. 24. In Morbis verò intermittētibz si præmissa fuerint præmittenda, adeoque status morbi ferè appropinquat, attendendum, periodici an sint isti? an verò vagi? In illis enim Periodicis, not. (2.) ante Paroxysmos exhibenda sunt. Præstat enim occurrere adveniēti hosti, quàm admissum demum profligare. Saturandum nempe & figendum plus minus est acidum morbosum fermentativum, quo ab impressione motuque hostili desistat maturè. Antequam E. motus ejus & hinc Naturæ inchoaverit, adeoque ante Paroxysmum, auxilia ista opponenda. Frustra est aut insufficiens, quicquid in Paroxysmo his ipsis tentaveris, interdum quoque nocivum. Qui semel concitatus est spirituum motus, humorumque orgasmus, nullà arte perfectè & subito sopiri potest, non sufficientibus tanto operi remediis, utut attemperando, & successivè saturando fermentum acre, mitiores, (sed ut plurimum simul diuturniores) Paroxysmi reddi queant. Sin verò vel immoderatà subdosi aliorumvè associatione vi quasi orgasmum compescere velis, alterutrum horum expectandum erit, quod vel ex non sufficienti effectu, nimis jam progressà humorum turgescentiâ, multiplicatura Paroxysmorum insequatur, vel ex concentrato & fixato nimis fermento morboſo aut chronicum sive lentum continuum malum, aut multiplex saltem recidiva, hoc ipso exciteretur: quæ ex suprà §. 4. dictis jam constant. Quod si verò Paroxysmi nullas statas observent perio-

dos, sed erratico aut vago motu affligant, not. (3) ita modificandus venit Præcipitantium dictorum usus, ut partitis seu repetitis vicibus eadem, sub legitimo doseos moderamine, propinentur, jungendo simul, quæ blandè & successivè per convenientes vias evacuent; sic enim, quicquid mali metuendum foret, præcavebitur.

§. 25. Denique, sive continuus ^{Ventriculo vacuo.} sive intermittens fuerit affectus, ita dirigatur eorum usus, ut, Not. (4.) saltem jejuno ventriculo ingerantur. Adeoque nec in pastu alimentis permiscenda, nec immediatè ante aut post eundem propinanda; nisi forsan acida nimis assumpta, aut undecunque concitata loda, interdum eorum usum in aut post pastum urgeant. Ut enim hoc ipsum tantum non de omnibus medicamentis obrinet, iis saltem exceptis, quæ digestionis primæ, ejusque debitæ perfectionis, turbatum ac p. n. vitiatum negotium concernunt, ita & absorbentia hæc eò magis proficua, eò minus nociva erunt, quò magis vacuum subintrabunt ventriculum. Potentiùs sic attemperare & absorbere acidum valent, minùs verò turbabunt digestionem primam, adeoque minus metuenda erunt ista mala, quæ circa chylicationem suprà §. 3. eorum abusum insequi diximus, & ex iisdem, alimentis permistis, multò magis pertimescenda forent.

§. 26. Futuro denique in tempore <sup>Subjungan-
tut purgan-
tia.</sup> & post eorum usum ita porrò dirigenda medendi methodus, ut blanda purgantia & primas vias abstergentia subjungantur. Idque speciatim, si fixiora ac minus resolubilia, adstringentia item, vel in setalia, vel quæ in corpore, ex texturæ mutatione talia evadunt, usurpata fuerint. Ea siquidem horum est conditio, ut plus minùs saturata circa primas vias, nunc in peristromate ventriculi & intestinorum mucoso, nunc plicis & cellulis eorundem delitescant, idque subinde satis pertinaciter, forsan per ductus lacteos primi generis penetrando, in glandulis mesenterii infixæ hæreant. Recordor hac occasione mulieris annoxæ, hystericæ, &c. quæ acidularum Egranarum ad nos advectarum potu debito sub regimine usæ fuit: quæ purgata licet sub potionis sine, nihilominus tamen pluribus abhinc septimanis denuò evacuata, copiosas nigerrimas, adeo-

adeoque intensè tinctas dejectiones exhibuit; adeò quoque tamdiu intra primarum viarum anfractus stibulari potest. Ex ista verò in primis viis subsistentia, præter mala suprâ §. 3. recensita, & impedita ac depravata chyli transcolatio & distributio, & secum p. n. retentio, metuenda erit: quin & hoc modo tumorum ac abscessuum in mesenterio variæ species, ac inde oriundorum lentorum, ac symptomatum multiplici varietate intricatorum morborum, prima fundamenta subinde poni videntur; sicuti etiam Colicæ convulsivæ pertinaces non minùs quam crudeles his ipsis ex occasionebus inducuntur, non secus ac recidivis crebrioribus occasio subministratur, ut suprâ §. 4. monitum. His ipsis procellis, ceu prudens Naucleus, in tempore occurrat Medicus, & blandis laxantibus ac mediocri stimulo primas vias expurgantibus, sociatis resolventibus ac abstergentibus salinis vel gummosis, quicquid capitis mortui instar dictis in locis relictum fuerit, removeat. Unâ ac alterâ vice institutum hoc negotium sufficit, post acutorum, remediorum talium ministerio, curationem, nominatim febrium ardentium ac similiarum, ut & tertianarum intermittentium. Successivis verò & partitis vicibus, sive ut vocant per epicrasin, sub chronicorum tardiori progressu idem tentandum, adeoque absorbentibus talibus subinde interponenda, aut interdum socianda veniunt, ut in quartanis, hypochondriacis, cachecticis, &c. Tutius sanè sub declinatione morborum dictorum, enervato plus minus acri acido per ista figentia & concentrantia, instituuntur purgationes, quàm in eorundem principio, ob rationes ex §. 22. colligendas. Præstat tamen blandioribus evacuantibus, & quæ potius stimulando primas vias, quàm colliquando contenta corporis, operantur, uti; quævis enim copiosior ac vehementior purgatio plus nocet, quàm prodest, & imposturæ instar, activæ quidem in Medente, passivæ verò in patiente, mihi videtur: *adeò omne salutarium* (potentius paulò, ac propriè tale) *depredatur de viribus & substantia corporis nostri*, ut optimè docet Hippocrates.

ægrum ab exhibitione eorum instituendum, quo effectus eorundem promoveatur. Adeoque sit Cautela VI. sub illorum Usu motus concitior contentis corporis fluidis conciliandus. Non solum scilicet in fodinâ suâ primarum viarum acidi sapor & odores p. n. delitescunt, sed etiam altius penetralia corporis subeunt, ut aliquoties jam insinuatum, & morbosus effectus variis in locis palam illud profitentur; sive ut Helmont. loquitur: *Paradox. V. §. 9. p. 554. in nobis non raro oberrat sal quoddam resolutum, minerale; planè excrementitium, tartarus inquam resolutus, &c.* Illud ipsum pariter per absorbentia ista plus minùs saturandum venit, etiamsi hæc primarum viarum tramites, fixiora scil. & minùs solubilia, non transcendant. Jam verò, ut totum corpus secundum Hippocratis Oraculum, sit conspirabile & perspirabile, sive immediatè per insensiles cæcosque meatus & poros partium, prout illustratur à Tachenio *Clar. p. 237. supra §. 3. allegato*, sive mediatè per ductus & vasa, nunc magis nunc minùs oculis patentia, mediante continuo humorum circulo, de quo supra §. 23. c. 2. adeò, ut etiam remotiori ex loco hostilis aura acida à remedio in primis viis hærente absorberi & corrigi queat; nihilominus ut facilitetur hoc ipsum negotium, & acceleretur confluxus hostilis acidi ad suum compar medicamentosum in primis viis, concitior humorum motus progressivus & celerior in circulum raptus multum omninò contribuet. Ob id scil. tam studiosè Practici ab usu aliorum motum corporis injungunt, non quidem ut celerius sic descendant, hoc enim frustraneum foret, & absque sperato effectû, (ut congruâ sub explicatione, ceu usus accidentalis concedi queat) sed ut promoveatur acidi exorbitantis motus ad appropriatum magis activitatis suæ objectum, adeoque ab eodem promptius & uberius ita absorbeatur. Cum verò illum progressivum rapidiorem intentior etiam motus intestinalis particularum fluidi heterogenei comitari ordinariò soleat, quâ ratione agitatione vasorum, cerevisiæ & multiturgescientiam fermentativam, aut concussione vasculorum effervescentias commistorum artificiales augeri infi-

concitior motus conciliandus.

insigniter observamus; ob id sub isto rapidiori humorum circulo, dum acido peregrino, texturam ac motum intestinum plus minus vitiant, liberantur illi ipsi, simul sub ista celeriori commotione intestinâ in novam texturam eò facilius se component, & ad naturalem eucrasiam se ipsos, secundum syncrifeos, & diacrifeos & metastaseos minimorum leges restituent. Adeò, & quidem secundariò, intestini hujus motus ratione, & ejus medio redintegrandæ texturæ ac Craseos humorum causâ, post absorbentium usum motus illorum concitator progressivus quovis modo adjuvandus veniet.

Quor &
quibus
modis.

§. 28. Motum hunc humorum progressivum, circularem, duobus modis accelerare licet; primò quidem beneficio motus naturalis artuum, & hinc totius corporis localis; deinde citra hunc beneficio artificialis sudoris aut madoris saltem sensilioris, provocationis. Utroque in casu rapidior per vasa impetus contentorum, & concitator progressio, omninò contingere solet, ex causis vel sponte patentibus: Ille quidem ægris paulò vegetioribus, adeoque chronicis ferè in malis, & quàm diu Orthostadia in iis locum habet, magis convenit: Hic verò in acutis; chronicorum item gravioribus paroxysmis, dum lecto surgere vel nequeunt ægri, vel minus consultum hoc ipsum videtur, magis obtinet. Utrumque uti in fixioribus & minus solubilibus absorbentibus utile admodum, subinde necessarium quoque, existit; ita posterior modus in solubiliorum, ac inprimis volatiliū, vel solitariâ vel fixis sociatâ (secundum dicta §. 19.) exhibitione, summè proficuum existit. Excernitur autem hoc ipso simul, quicquid motus intestini aucti & restauratæ plus minus texturæ naturalis humorum beneficio, ceu heterogeneum, secretum fuerit, & deputatio quorumvis humorum vitiatorum, attenuatio eorum, quavis ratione condentatorum, & celerior progressio, quovis ex impedimento nonnihil stagnantium, hoc ipso obtinebitur. Pater ex his, quate ordinario post quæcunque febrifuga, fixa inprimis Terrea, sudoris excitandum esse profluvium, tam sedulò inculcent Practici, præsertim si fieri potest eo tem-

pore, quo aliàs recrudescere solet Paroxysmus, cum sic certiori planè juvenamine propinentur eadem, ac minori cum recidivæ metu, quàm si vel nullus sudor superveniat, vel hic ad Paroxysmi finem saltem expectetur.

§. 29. Haud postremum punctum rationalis absorbentia administrandi methodi fert concinna eorum cum aliis copulatio. Adeoque sit Cautel.

Caut. ult.
Aliis re-
mediis so-
cianda.

VII. ne saltim solitaria, sed etiam aliis sociata remediis, propinentur. Utrumque exhibendi modum & ratio primitus docuit, & experientia postmodum confirmavit. Indicationes prout variant, causarum p. n. & symptomatum ex varietate & complicatione, componenda etiam cum aliis, vel sola exhibenda absorbentia hæc, ostendunt. Utut autem larga seges aliorum sit auxiliorum pharmaceuticorum, quibus misceri commodè possunt, speciatim tamen ad quatuor classes commodè redigi possunt; purgantium scil. diaphoreticorum, anodynorum & appropriatorum.

§. 30. Purgantibus commodè sociantur, ubi acriora fluida movenda veniunt, quo temperata horum & inversa corrosivitate, citra graviorum symptomatum syndromen, jucundiùs & tutiùs evacuatio succedat, sicuti eundem in finem & præmitti interdum iisdem suprâ §. 22. insinuavimus. De sennæ & tartari sociatæ infusio laxativo polychresto jam suprâ §. 12. locuti sumus. Speciatim huc exempli loco pertinet famosus iste Cerberus triplex à Cornachino adeò peculiari scripto decantatus, aliàs pulvis febrifugus Comitum Dudlæi de Warwigg Angli dictus, à Spigelio de semiteriana l. 3. c. 8. & Kergero de fermentat. f. 3. cap. 3. p. 250. laudatus, remedium profectò polychreston, præsertim si scammonii sulph. loco ejusdem resinam recipias, ut rectè hoc urget Maxvellus in *Medicin. Magnet.* l. 2. c. 2. p. 68. idque propter vim aromatico-alterativam, solutivæ sociatam, nec acido sulph. fumo castratam vel inversam. Sicuti etiam præ & diaphor. simplici & diaphor. oīale, ceu præstantius absorbptivum, isti addendum, sive & istud cacheeticum Ludovici, prout tam in *Pharmacîa* p. 330. quàm *Miscell. Acad. Nat. Curios.* anno 8. Obs. 165. p. 108. Autor ipse parare illud docet. Pertinet huc pulvis iste multi usus, quibusdam in secretis

cretis habitus, qui fit ex §ii , *nitri*, ana libr. β , ¶is §j . invicem detonatis, & hinc cum triplo nitri calcinatis, & hinc edulcoratis, habebitur sic pulvis flavus, qui cum ana resin. scammonii mistus, vel illius p. ij. cum hujus p. j. paucis crem. tartari gran. additis, suggerit polychrestum remedium, ad quasvis febres intermittentes, continuas, pleuritides, obstruct. mensium, choleram, &c. dosi §j . ad §\beta . propinandum, & cuivis ætati tutò, limitando saltem dosin, porrigendum. Placet de cætero ista methodus, quâ in intermittentium Paroxyfmis solutiva blanda febrifugis connectimus, ut junctâ operâ, dum Natura movet, & Medicus moveat, idque præsertim viribus utcunque constantibus. Quibus paulò debilioribus existentibus præmittantur ita laxativa Paroxyfmo, quo maturè ante hujus invasionem suo fungantur munere, pro specificis tempestivè propinandis. De cætero, quam fausto radio ¶ recreet hypochondriacos & scorbuticos, ac cachecticos, laxativis sociatus, tot pilulæ hypochondriacæ, aperitivæ, cachecticæ, electuaria chalybeata laxativa, Vina ¶ ialia solutiva, malè à Geigero in *Microcosmo Hypochondr. cap. 23. p. 294.* rejecta, apertè loquuntur. Omnium loco sufficiat vitriolum ¶ ad albed. calcinatum, gummi ammoniaco cum debito stimulo solutivo sociatum, & pilularum in formam redactum, ad imitationem forquularum à Sylvio in *lib. 1. Prax.* passim præscriptarum; vel si *Mass. pilul. de tribus Ruffi, extr. helleb. nigri* ana §\beta . *vitrioli* ¶ ad albed. calcin. gr. v. cum *essent. gummi ammoniaci* in pilulas redigantur, & ita propinentur. Pertinet huc pariter ⊙ fulminans, concretum mirabile, ex ⊙ per δ depurato, cum spiritu ⊙ ¶ ci præcipitato paratum, vi incisivâ, & viscidissimorum resolutivâ ac abstersivâ, simulque singulariter laxativa instructum. Hoc in infantibus Unicornu vero sociatum in epilepticis eorum insultibus, convulsivis torminibus, similibusque malis, laudatissimum remedium existit, accuratâ tamen dosi pro lactationis, & hinc ætatis ratione exhibendum. In adultis pariter Coraliis præp. copulatum gr. vi. ad ix. pondere in quartanis egregium est remedium, non immeritò ab Hœfero in *Hercul. Medic. l. 6. p. 292.* lauda-

Tom. II. Pars 2.

tum, modò non inveteratum nimis malum, nec ipse ager robustæ adeò constitutionis fuerit; Non secus, ac in intermittentium recidivis arcano duplicato & ebori sine Δ additum, ante Paroxyfimum circumspècto usu planè egregium est. Nam convenientissimè absorbentibus cum laxantibus mistis simul quasi intertextuntur vel attenuantia, v. g. gummi ammoniac. in pilulari inprimis forma, vel abstergentia & resolventia salina ut tart. vitriolatus, arcanum duplic. &c. v. g. *arcani dupl. Coral. rubr. præp.* ana §\beta . ad gr. xv. *scammon. more Brendelii præpar.* gr. ij. ad iij. M. Sic enim absorbentis vis, interdum nonnihil adstrictoria sive formaliter eam obtineat, sive in primis viis demum ex alteratione passiva acquirat vim solutivam additi minus enervabit; hoc ipsum verò sub minori dosi illorum adjumento sufficienter, idque tutiùs ac jucundiùs, quod suum est, perficiet.

§. 31. Cum sudoriferis inprimis ^{Sudoriferis.} salubrem ægris societatem incunt, ex rationibus jam suprà §. 27. & 28. insinuat. Sunt equidem absorbentia hæc maximam quoque partem sudorifera; tam privativè, ut insipida ac terrea; quàm positivè, ut salina urinosa fixa, ac inprimis volatilia. Laudabilior verò effectus ferè observatur, si privativa ista positivis, præsertim volatilibus sudoriferis, copulentur, uti & suprà §. 19. quadantenus indicatum. Duplex autem volatiliū sudoriferorum, absorbentibus commodè admiscendorum, materialem quoad eorum texturam observatūr differentia: aut volatil. salina sive urinosa macra existunt, quæ & ipsa ad saturantium sive præcipitantium aliàs dictorum classē pertinent, ut modò, ac suprà §. 14. c. 1. dictum fuit: aut volatilia oleosa sive sulphurea, ut amara & aromatica, hisque plus minus cognata, (quorum farrago in Theriacalibus maximè conspicua est compositionibus) & pro basi virtutis sudoriferæ resinam plus minus acrem, libero in Δ inflammabilem, in clauso verò in ol. destillabilem, ferè obtinent: ex quorum duorum artificiali connubio quasi tertium compositum, spirituum aut salium volat. oleosorum nomine, ubivis jam cognitum emergit, quale v. g. exhibet spiritus theriacalis cum spiritu vel sale volat. C. C. aut viperarum debita propor-

[Iiii]

tione

tione & destillatione unitus, ac camphoræ s. q. imprægnatus, potentissimum sudoriferum, malignarum febrium nobile auxilium. Quibusvis horum absorbentia & invertentia fixa commodè sociari possunt, ut quando in Tertianis, graviori rigore molestis, cum successu ordinatur:

℞. *Theriac.* ℥ij. ad ʒj.

Specif. febril. Strobelb. ʒß.

℞o *destillat. caryophyll.* gutt. ij.

Mis. f. Bol^o, fortiter sudorem movens. Aut quando pleuriticis proficua admodum existit Mistura ex ▽ *papav. rhæad.* ʒij. *spir. theriac. camphor.* ʒij. *Mandibul. Luc. pisc.* ʒj. *salis volat. cujusvis* gr. xv. ad ℥j. *Laud. tartarif.* gr. iij. *syr. papav. rhæad.* ʒj. M. sicuti etiam nobile illud balsamum Loimicium Henisiaum, unicornu vero & bezoardico minerali, aut hujus loco Cinnabari ʒij. vel nativæ select. feliciter jungitur in malignarum febrium medela. Cum verò insignis sudorifera hæc inter volatilia sit differentia, selectus rationem determinabit status ægri, & symptomatum conditio, in specie major vel minor sanguinis commotio & æstuatio: Hæc enim aut imminuenda, & plus minus temperanda, aut excitanda & augenda venit; illud in nimia spirituum & particularum sanguinis oleosarum (in recessu, ut probabiliter statuitur, acidarum) volatilium turgescencia, & fermentativâ quasi ebullitione; hoc verò in deficiente tali spirituum impetu, & fermentativâ commotione. Utroque ergò in statu, cum nulla heterogenei aut vitiosi fermenti ab homogenea humorum texturâ secretio, nec prævia ejus correctio aut saturatio, fieri queat, ob id arte subinde eadem moderanda venit. Infringunt autem æstuationem sanguinis nimiam sudorifera inter volatilia omnium optimè urinosa macra, quæ sanè sensibiliber febrientium æstum compescunt, adeò, ut experienciâ teste pro tertianarum v. g. nimio ardore compescendo, spiritus ⊕* simplex in ipso paroxysmo subinde usurpatus, sit perquam proficuus. Intendunt è contra ardores volat. oleosa, quovis tempore usurpata; sicuti eadem ex absinthio, cent. min. gentianâ, piperibus, ante intermittentium paroxysmos debito cum regimine adhibita, horroris & frigoris mitigationem,

ardoris intensiorem, ordinario efficiunt. Cum itaque intendendus subinde veniat sanguinis æstus, ut in Cachecticis pituitosis, hisque cognatis, pro crudioris chyli correctione, bilis verò inertioris acuatione, item in petechialibus, præ aliis malignis, ut plurimum minori æstu comitatis, adeoque respectivè quasi lentis, pro fermenti maligni hujusque corruptivâ operatione geniti producti morbo si evacuatione, hic quidem alexipharmacis fixis, it. salibus volatilibus, diaphoretica oleosa optime permiscuntur; ibi verò, præmissis ut plurimum absorbentibus dialibus, illa optimo cum consilio subjunguntur, interdum etiam permiscuntur; quâ ratione aliquando in quartana Tincturæ vitrioli & *Zwelf.* ʒj. cum *Elix. febril. D. Mich.* ʒß. per mitionem ante paroxysmum proficuum observavi; uti eadem cum essentiis aromaticis amaris, quibus vel defectuosè vel laboriosè fluunt menses, sociata, optime propinantur.

§. 32. Anodynus denique jun-^{Anody-} genda veniunt hæc nostra absorbentia,^{ais.} sive ex minerali, quæ rariora, sive ex vegetabili, quæ frequentiora, desumantur regno. Urgent scil. interdum adeò symptomata quædam, ut aut vitæ nunc immediatè, ut hæmorrhagia aut cholera effrenis, nunc mediatè, ut dolores, periculum intendant, aut saltem morbum primum insigniter exasperent, ut dolor in pleuritide, ophthalmia, quibusvis inflammationibus, aut ejus curam periculosè impediunt, ut in ardentibus acutis, it. variolis, &c. coctionis scil. negotium, cui unice incumbit Natura, perturbando. Cunctatio omnis in his funesta. Absorbentia itaque & figentia quælibet, cum nonnisi debita interjecta temporis morâ effectus intentus insequi soleat, anodynus socianda, quo ab his spirituum perverso refranato impetu, à quo omnia symptomata urgentiora dependent, & suspenso hoc ipso aliquandiu nato inde paroxysmo, illorum ope occasionalis tantarum procellarum materialis causa inverti & alterari queat. Modificando nempe spirituum impetum, & diaphoresin liberio-rem, etiam sæpi^o sensiliorem reddendo, in quo omnia anodyna, tam vegetabilia, quam mineralia conspirant, quorumvis symptomatum (soporosis for-
san,

san, idque saltem in tantum, non in totum, exceptis) panaceæ existunt, & ita propriè sic dictæ, sobrieque explicatæ, Panaceæ & universalis remediï ideam quasi repræsentant, & possibilitatem suo modo confirmant. In cholera, dysenteria, scorbuticorum vomitibus enormibus, hypochondriacis suffocationibus, catarrhalibus repentinis faucium ac asperæ arteriæ affectibus, catharrhis suffocativis vulgò dictis, convulsivis quibusvis paroxysmis, pleuritide atrociori, & pluribus aliis vel gravioribus vel subitanis pathematis, tantum non semper istorum, Opiatorum quidem utilitatissimè, sociatam invertentibus & figentibus opem imploramus. Sicuti verò, quo generosius seu efficacius est remedium legitimo usu, eò periculosius & gravius quoque nocere solet perverso abusu, cum vel Galeno assertore nil magnificè profit, quod non multum nocere etiam queat, ob id & anodynorum, speciatim opiatorum, de quibus ceu usitatoribus imprimis loquuntur, cautus sit & circumspectus cum istis congressus. Sistendo enim hæc ipsa spirituum impetum, contentorum quorumvis motum simul plus minus imminuunt, adeoque materiæ peccantis sive occasionalis antecedens, sive productum morbosum consequens fuerit, alterationem & remotionem hoc ipso sufflaminant, eamque immobiliorem reddendo, simul quasi figunt. Propterea sub mutua societate volatilibus tutius quàm fixis, & hæc inter potius salinis, quàm terreis, copulantur; Illorum enim sub consortio diaphoresin ferè copiosiore reddunt, & fluidorum motus minus refrenant. Hinc enim Essent. Opii tartarificata Liquori C. C. succinato aut spiritui Θ *ci anisato maritata, multum in affectuum catarrhalium cura præstat; non secus ac Colicis in convulsivis, & huic cognatis hypochondriacis suffocationibus, eadem mistura; aut huic analogæ, ex spiritu Θ *ci, essentia castorei & opii, debito in vehiculo dilutis, potiuncula utramque absolvit paginam; sicuti & spiritus iste salino-volatilis oleosus, supra §. 31. ad febres malignas laudatus, eidem essentiaë auspicatorè jungi potest. Salinis fixis commodè etiam jungi potest laudatum Opium, cum vim horum abstersivam ac diureticam, saturativæ jun-

Tom. II. Pars 2.

ctam, minùs inhibeat. Fixis denique insipidis aut terreis pariter subinde jungitur; tamen ob nimiam hinc metuendam fixationem & concentrationem acidi morbosì, ac materiæ peccantis pertinaciorè immobilitatem, paulò circumspectius idem faciendum. Hinc patet ulterius, non nisi urgente malo gravius, aut graviori adhuc imminente, ibi curationis, hic præservationis gratia commercium tale instituendum, quo prima in herbâ suffocentur, ut sic dicam, tribuli ac spinæ morbosæ. Speciatim in acutis, atrocioribus symptomatis comitatis, sed saltem sub incremento morbi, dum turbantur subinde præposterè ordinarii naturæ motus, ob materiæ orgasmum, conveniunt, quâ ratione bezoardico minerali, Unicornu fossili & similibus pulveribus bezoardicis compositis, cum vel sine Cinnabari, extractum theriacale, aut theriaca cœlestis Greiffii, aut Laudan. Opiat. commodissimè, e. g. in variolis, malignis, aut purpuratis, &c. sociantur. In Chronicis verò affectibus, saltem in gravioribus eorum paroxysmis, tanquam tot parvis morbis acutis, sub lento illorum motu intercurrentibus, locum inveniunt, idque imminente potius paroxysmo, adeoque præservationis gratia, similibus ferè ex rationibus, quæ supra §. 24. allegatæ fuerunt.

§. 33. Observatis hisce, jucundissimus anodynorum quorumvis, speciatim Opiatorum, cum absorbentibus, & saporum ac odorum acidorum alterativis, est concursus, modò hæc debitâ correctione, vi narcoticâ plus minus exutâ, nobisque sic amica magis reddita fuerint. In quem finem pro acutis quidem cum Φ o Ω ato extrahendo in chronicis ac aliis quibusvis, cum alcalificato tartari digerendo, commodissimè præparantur. Cum verò præstet catholicum magis ex Opio semper in promptu habere præparatum, quo tanquam unicâ fideiâ omnes dealbari queant parietes, hoc ipsum optimè obtinebitur, si Opii & salis tartari ana, cum s. q. ∇ comm. irroratis, ad pulvis liquidioris consistentiam, blandoque digestionis calori aliquandiu expositis, pro concreti gummeo-resinosi meliori penetratione & dissolutione affundatur successivè & suspensa manu Φ Ω , fiet sic ebullitio cum formali quâsi fer-

Sed ritè correctis.

[Iiii 2]

menta.

mentatione, continetur hæc affusio ad punctum saturationis usque, de-
nuoque aliquandiu digestionem leni ex-
posita, filtrentur, & phlegmatis ex-
halatione inspissentur, cum spiritu
Vini per se rectificato extrahenda, &
ad debitam vel fluidæ essentia, vel
spissioris Extracti consistentiam redi-
genda. Habebitur hoc modo anody-
num vegetabile, ut mihi quidem,
ob rationes hic speciatim haud recen-
sendas, videtur, correctissimum,
adeoque tutissimum, quibusvis in
casibus adhibendum. Simplici labo-
re, magnoque temporis compendio,
obtinetur hoc modo, quod per tæ-
diosam cum succis vegetabilium, &
quidem horum potius, quam additi,
sed non soluti Opii, fermentationem
vix acquiritur. Remedium est prom-
tè in quovis corporis nostri fluido so-
lubile, adeoque ipsi facillime com-
miscibile, & hinc latissimè diffusibi-
le, citra diuturnam in primis viis mo-
ram, aut ullum ventriculi tædium.
In quo haud postremum legitimæ ve-
getabilium, præsertim resinorum,
præparationis momentum consistere
arbitror, ut reddantur contentis cor-
poris nostri promptè commiscibilia, &
longè lateque, in parva licet mole,
diffusibilia, citius sic, & ob mino-
rem circa primas vias molestiam,
quam aliàs ibidem præcipitata sub re-
sinosa sua & viscida textura inferunt;
jucundius, quin & ob parvam vel nul-
lam, quam dictis in locis aliàs susti-
nent, alterationem, potentius, &
minus sensibili in partes solidas impres-
sione vel immediatâ vel mediâtâ (in-
tercedente alteratione fluidis inductâ)
tutius operativa existunt. Quo in ne-
gotio alcalisata, præsertim illud sal
tartarati, principalium instrumento-
rum loco inserviunt.

Denique
Appro-
priatis.

§. 34. Ultimum locum eorum,
cum quibus societatem pro feliciori
Praxi amicam ineunt Invertentia no-
stra, obtinent Appropriata, in gene-
re ita dicta. Sunt enim absorbentia
hæc maximam partem, prout supra
c. 2. §. 20. & 23. dictum, generalia,
& magis universaliter alterantia, adeo-
que specialibus p. n. affectibus haud
adeò directè opposita. Ut ut verò par-
tim per debitum eorum selectum, se-
cundum §. 16. & seq. partim per su-
doriferorum & anodynorum concin-
nam associationem, secundum §. 31.
& 32. specialius determinari queant,

haud adeò tamen sufficere hæc viden-
tur, quin pro acidi specifici varietate,
ejusque fomitis materialis, plus mi-
nus glutinosi, distinctâ conditione
partium item vel primariò vel secun-
dariò, uniusvè plurium, solidarum
vel fluidarum affectarum diversâ habi-
tudine, & in specie humorum, unâ
plus minus alteratorum, contrariâ
subinde dispositione, morborum item
diversorum complicatione, & sym-
ptomatum plus minus molestorum
aut periculorum syndrome, his ipsis
frequentissimè, ceu coindicantibus,
per appropriata & quasi particularia
auxilia occurrendum veniat, & hæc
ipsa illis absorbentibus dextrè adjun-
genda sint. Sed tanta cum hic occur-
rat varietas, siquidem negotio huic
tota specialis Praxis innitatur, adeò
ut certis regulis, ceu tot limitibus,
circumscribi commodè nequeat,
exemplis saltem quibusdam illustrare
illud sufficiat. Dum Hypochondriaci
vagâ phlogosi toties æstuant, ebori
sine Δc & Coraliis nitr. vitriolatum
aut nitr. §iatum addendum; sicut in
suffocatoriis eorundem Paroxysmis,
absorbentibus tam fixis quam volatili-
bus, aut potius utriusque secundum
§. 19. committis, castoreata specia-
tim addenda. Bezoardicis dictis pul-
veribus, diversarum licet compositio-
num, in variolis & purpuratis myr-
rha, in malignioribus camphora, au-
xiliatrices jungit copias: quibus præ-
terea, nervoso genere gravius patien-
te, adeoque in convulsionibus im-
minentibus, Cinnabarina adjungen-
da, non omissis salibus volatilibus.
Aperitivis, ut vocant, & anticache-
cticis Virginum non menstruatorum
etiamlibus remediis vix absque croco &
Cinamomo utimur. Quæ sodæ ebul-
litionem figit Creta, aut C. C. ust. so-
cietate nucis moschatae hoc in affectu
inprimis gaudet, idque præsentaneo
magis successu, si conservæ aut syr-
upo summitatum sive gemmarum
quercinarum in foliola se explican-
tium, Electuarii sub formâ permi-
sceantur: quæ modò ex quercuum so-
liolis parata euporista, & dysenteri-
corum remediis temperantibus & ab-
sorbentibus eodem modo recipiendis
inserviunt. Gonorrhœæ dum succurrit
Os sepia, ol. destill. succini, vel bals.
copayvæ societatem ambit; simili
modo ac idem balsamus, aut ejus loco
ol. destill. cortic. aurant. Lapid. perca-
rum

rum & cancris calcinatis invicem mistis, pro stranguriæ curâ additur. Febrifugis fixis quibuscvis, rigore graviore sub Paroxyfmi initiis urgente, aromata acriora, in specie plebis istud contra intermittentes euporiston, debito usu non rejiciendum, piper album, aut potius longum, ad plura grana, aut ejusdem vel caryophyllorum ol. destill. ad aliquot guttas, commiscetur. Lentis in febris, præsertim aliis non benè curatis supervenientibus, Poterii antihectico Θ sum consultò jungitur. Vix quoque apud nos debellare li-

cet scorbutum melancholicum (ut cum Willisio loquar) nisi absorbentibus quibusvis, imprimis σ ialibus, appropriata ista, sale volatili acriori & penetrante imprægnata, vel adjungas, vel præmissis subjungas, quæ tamen in eodem bilioso minus tutò, & propterea majori longe cum circumspectione, administrantur, nisi cephalalgias, aut insigniores sanguinis Orgasmos, eo ipso concitare velis. Sed ubi finis foret, ulterius si pergere vellem? Hic ergo pedem figimus, tribuendo

SOLI DEO GLORIAM.



DISPUTATIO IX.

S E U

EXERCITATIO MEDICA

SISTENS IDEAM

PRÆSCRIBENDARUM FORMULARUM,

QUAM

Delineavit & Publicæ Perlustrationi exposuit

MICHAEL ETTMULLERUS,
Phil. & Med. Doctor, & P. P.

d. 8. Decemb. Anno 1682.

R E S P O N D E N T E

JOHANNE MATTHÆO MERCKELL,

Annæbergenfî Misnico, Medicinæ Candidato.

PRÆLOQUIUM

Excellentissimi DOMINI PRÆSIDIS

Disputationi de Formulis præscribendis ante Actum
Disputatorium ad Auditores de Cathedra præmissum.



Inter alia præscribendarum Formularum vitia non postremum etiam illud observari solet, si ex contrariis ingredientibus eadem confarcinentur, & hæc inter in specie acido & alcali, in Medicorum scholis à 16. annis, ex quo Tachenius sua scripta edidit, non tantum ingens strepitus concitatus, & usus insignis hujus doctrinæ, sed etiam simul abusus incredibilis observatus fuerit; ob id Præfationis loco de acido & alcali doctrinam, in paucas Regulas contractam, exponere placet.

Sit ergo §. 1.

Acidum & Alkali non sunt Principia formalia, sed tantum instrumentalia.

Equidem, quin in artis operibus, tam Chymicis quàm etiam Mechanicis, utramque faciant paginam, nullum dubium est, prout nempe Artifex illa aptè dirigere noverit; sed hoc in corporibus & subjectis jam constitutis seu genitis. De naturalibus pariter non est dubium, quin etiam hic acidi activitas in alcali, plurium motuum intellinorum & alterationum sit Autor. Sed de Principio movente quæritur; in se ipsis enim,

[liii 3]

ccu

ceu particulæ sunt materiales, motus principio carent. Materia subtilis Cartesiana, movens universale, equidem multum lucis contribuet: sed de particulari movente est quaestio, sub cujus directione adeò determinatos motus in concretis, generationi & corruptioni obnoxiiis, obeant? Equidem ignis coelestis scintilla, in quovis semine latitans, seu spiritus insitus, ex universali in semine concentratus, est operationum principium: sed hanc esse præcisè acidam, adhuc clariùs deducendum; quin ex activitate huius principii seminalis acidum occultum denuò fit manifestum, ab eodem augetur & propagatur, utut verum sit, dum spiritus iste seminalis sub oleoso tegmine reconditus latitat, proximè acido adhæret, ita ut alterum absque altero moveri nequeat; non secùs ac in luce candelæ lux acido iuncta alterum sine altero vix operatur; est tamen in seminalibus lux ista, sive spiritus, sive ignis coelestis, principale; acidum iunctum instrumentale est medium, quod, concreti vi seminali fatiscente, proprio nutu in varios impetus erumpere solet, in fermentatione, putrefactione, &c.

§. 2.

Acidum & Alkali non sunt Principia Concretorum materialia, sed tantum Principiata.

Quod non sint ex Elementis primis, sive ultimis, adeoque simplicissimis, constat ex eo, quod non, præterquam in concretis jam constitutis & genitis, reperiantur, extra eadem nuspiam acidi aut alkali vestigium deprehendere licet, adeoque ante corpora constituta & genita non existere, observantur; unde vi seminali ex materia alia generari eadem per transmutationem, & ita in concretum cum aliis coalescere manifestum est.

§. 3.

Acidum & Alkali interdum sunt invicem transmutabilia.

Exemplis brevissima est docendi via. Urgeo saltem hac vice Ram nephriticam Ammelungii, vel spiritum Carminativum B. Doctoris Michaelis: In his acidum tartari & Φ i quorsum abeunt? Prodit \sim \square osus ex Φ o, Θ in \square uo est purè alcalisatura, quod esset Θ sum, si acidum Φ i imbibisset: momentanea inflammatio non sufficit pro acido Φ i & Φ i discutiendo, præsertim cum ab oleo Φ i, unà deflagrante, Φ in alkali figatur. Nil ergò aliud restat, quàm acidum Φ i cum particulis vel tartari, vel additi alcalisati, Ψ trioribus, vi ignis colliquatum & concentratum, in copiosum alcalisatum caput mortuum abiisse. Sic formicæ, quæ acidum spirant intensè, si contusæ in vitro capaci benè clauso in loco temperato vel frigidiusculo expo-

nantur, ut putrescere queant, aëre in vase capaciore sufficiente, abeunt in massam putridam, non nisi spiritum urinosum, & paucum oleum suggerentem: Ubi ergò penetrans horum & Θ em rodens acidum, item flores violaceos in rubros convertens, illudque volatile, ut Δ io simplex probat, abiit, aut ubi residet, nisi per putrefactionem ex mutata minimarum cum acido textura etiam novum concretum urinosum emerfisse, dicere velimus. Quod pariter in aliis rebus putrescentibus observari velim, quæ omnia priùs fermentaliter acescunt, hinc ad putredinem tendunt, sub qua urinescunt, & copiosum alkali volatile suggerunt.

§. 4.

Alcalia non præexistunt in concretis formaliter, sed tantum materialiter.

De alcalisatis seu alcalibus fixis, lixivialibus, cinerariis, res jam clara est; Ex acido cum Ψ eo ortà colliquatione, cum connexo paulo pingui per Δ activitatem coalescunt. Nisi iunctum pingue obstaret, quo ad saponariam quasi naturam accedunt, reverà essent corpora, similia calci vivæ; sicut etiam plures huius proprietates reverà obtinent omninò, & contrà. Cum itaque his proximè accedant volatilia, quidni de arte similiter sperandum? Nam in Regno Minerali nullum datur; succinum quid sit, discere quàm docere malo. In vegetabili Regno nullum naturaliter observatur; saponem isti acres macri, ut Antiscorbuticorum, annon potiùs acidi volatiles oleosi; aromaticorum verò falso-acido-oleosi sint, disquiritur. Tribus verò modis arte ex illis potest elici:

1. Per putrefactionem fiunt sic, quæ non præexisterant; quia omninò ejusdem naturæ Θ volatile subministrant. Nempe infracto & resoluto acido per Δ rem hoc volatilatur, & Ψ m similem subtilem secum arripit, sicque sal volatile constituit, sed artificiale.

2. Per concremationem in fuliginem; scilicet, quicquid acidi nativi cum Ψ eo, & quicquid sulphuris cum Ψ eo concremationem & colliquationem aufugit, hoc ab Δ e resolutum, novâ texturâ subtile cum aliis in sal volatile coalescit artificiale; vase enim clauso si tractetur idem simplex, obtineri non poterit.

3. Per olei destillati resolutionem, sic enim ϕ o tartari, cornu cervi, viperarum, terbinthinæ, &c. cum Θ e fixo, ut tartari, mixta ac per digestionem in amplo vase, ob Δ is vim resoluta, acidum potens olei destillati, subtile admodum, haud omne ob disparitatem consistentiæ Θ i fixo se unit; hinc subtilius acidum in oleo resoluto, subtili Ψ x, quæ in omni oleo destillato monstrari potest, se unit,

seunit, novam texturam constituit, & ita ex parte in sal volatile se sublimat.

Animalia nutriuntur plantis: Ergò horum salia volatilia erunt novum genitum, ex vegetabilium plus minus fermentatorum acido volatili, hinc sub digestionem quasi putrescentium, cum φ a volatili mediante continuâ respiratione coitus, & ad volatilis salis texturam dispositio; neque enim ullâ arte, nisi per distillationem aut putrefactionem, Θ ia volatilia ex animalibus eliciuntur, & ita simul plus minus alterantur, quæ in gelatinosa per se existunt textura, unde & putrescendo prius plus quam simpliciter distillando, Θ is \square osi elicies. En notabile artis mangonium, adeò, ut nec in animali Regno Θ volatile \square osum formaliter, præcisè & accuratè loquendo, præexistere dici possit.

§. 5.

Adeoque loco alcali potius φ eum acido opponendum.

Nempe φ eum purum, ut C. C. ustum, φ -sigillata vel argilla, item calcinata vegetabilia, ut cineres fixè calcinati, cum acido effervescent, &c. ita, ut alcalia nihil aliud sint, quàm concreta ex φ & acido: ita, ut φ spissior, grossior, fixior, undecumque talis fuerit, cum acido fixo arctius combinata & colliquata, alcali fixum constituat, in quo ob φ ei prædominium, acidi tamen consortium, omnia ejus phænomena explicari possunt; alcali verò volatile est φ -talis subtilis, rarefacta, & ab Δ e attenuata, quæ simili acido volatilifato, sed sine absoluta saturatione, sociata, Θ volatile \square osum constituit, cùm impossibile videatur, acidum purum sine φ eo, aut alcali, h. e. φ eum sine acido, exhibere, &c.

PROOEMIUM DISPUTATIONIS.

Primo sub Medicinæ exortu, dum simpliciore facie eadem adhuc incederet, Medicus ipse vel præparabat, vel ex obviis & passim notis paranda docebat medicamina. Hippocratis hoc docebant Scripta, quod vulgatis Simplicibus, levi vel nullo artificio præparatis, curationes tunc temporis institutæ fuerunt. Confirmant istud pariter de Evporistis, seu facile parabilibus, tam simplicibus quàm compositis l. 11. sub Pedacii Dioscoridis nomine, ut ut dubio, qui adhuc prostant. Modò sanè laudatus Dioscorides l. 2. cap. 98. asserit, humanum stercus siccum, cum melle subactum, & gutturi impostum, quemadmodum & caninum anginosi opitulari, inter arcana reperimus: de quo loco vid. Johannis Antonii Saraceni Scholion in Dioscoridem libr. 2. cap. 98. p. 36. Crescentibus verò morbis, de ampliori remediorum cogitatum apparatu, in quo Arabes imprimis se sedulos exhibuerunt, rudi tamen simplicium pulverisatione ac mitione, & hinc cum saccharo aut melle conditurâ, contenti. Cùm verò postmodum per Barbaras gentes, ut aliis in artibus, ita & in Medicina, barbaries ingens exorta fuisset, hæc nonnihil excussâ, & resurgente tantillum Medicinâ, hujus Magistri, Medici, vel in sola visitatione ægrorum, odore lucri occupati, vel in Veterum Scriptorum per Commentarios illustrationem, stimulo ambitionis literariæ, solum intenti, ex socordia remediorum simplicem alioquin præparationem servis suis aut amanuensibus commiserunt, qui exinde in majorem erecti fiduciam, spe ditescendi promiscuè dispensare ista medicamina, ac publicè vendere, & ita specialem Pharmacopœas artem condere cœperunt: intantum etiam, ut luxuriosius propullulantibus Pharmacopœis illis Medici remediorum præparationes & compositiones non omiserint tantum penitus, sed etiam tantum non oblivioni tradiderint, non deficiente sublimiorum negotiorum ac laborum specioso prætextu. Simili omnino fato, quo & Chirurgia à Medicina hodiè ferè divulsa, à Barbitonsoribus sibi vendicata fuit. Diuruditas hæc scholas Medicas occupaverat, crescentibus interim morborum turmis, & vilipendentibus decantata aliâs remedia, non absque stupore, ne dicam dedecore, ipsorum Medentum, donec stentorea voce ex veterno excitare hos; & ignaviam pariter ac ignorantiam, cum avaritia nihilominus & superbia junctam, in os ipsis objicere inciperet Paracelsus, antecessore ejus Basilio Valentino, non nisi intra claustrum mœnia, se suaque continente. Quod maxime, idque justissime, urgebat, erat, quod purum ab impuro, medicamentum à stercore, nucleum interdum perpufillum à corticibus, delibare nescirent, taliaque propinarent ægris, ex quibus languens eorum ventriculus medicinam prius parare necesse habebat. Tetigit cordatorum Medicorum conscientiam hoc fulmen, potissimum cùm morborum violentiam spernere sua auxilia cernerent, & dum non æquè arcanorum Monarcham æquare possent, imitari saltem eundem gestierunt. Hinc furni incaluerunt, hinc φ , Θ ia, φ oa, φ . E. Extracta, flores, croci, Elixiria, Ræ, elaborari cœpe-

cæperunt, quibus ipsi privati Medici summo ægrorum cum fructu uti cæperunt. Cadebat hic Pharmacopæorum autoritas, donec à servis Chymicorum fugitivis, ut Helmontius loquitur, in spagyricis quibusdam operationibus instructi, pariter & Chymicâ arte præparata & concinnata remedia vulgatiore officinis suis insererent, quod vel sic in statione sua persistere possent. Ut autem summè necessaria, tam ægro quam Medico, est privata singularium, aut saltem diligentius elaboratorum quorundam remedium dispensatio, siquidem & conscientie & famæ sic optimè consulit Medicus sue, excitando in ægro simul & fiduciam majorem ac obedientiam; ita & debitus Pharmacopæo solerti ac industrio suus constat honos, præsertim hisce nostris temporibus, quibus superiorum jussu ordo eorum confirmatus fuit. Ut ergo selectioribus, & paratu curiosioribus & secretioribus quibusdam omnino instructus esse debet Medicus, eaque suis ægris dispensare, ita &, quæ in officinis hætenus recepta sunt, tam simplicia, quam composita, & debitâ sedulitate l. a. præparata, ex eadem ægros suos accersere jubeat, quin & quæ componenda & præparanda ulterius erunt, ordinet, & Pharmacopæi, seu Medici ministri servitio debitè utatur: quo tamen in negotio non inconsultum est, ut & hic sui instituti rationem habeat, & ordinatam præscribendi Pharmacopæis remedium formam observet. Equidem facillimum est, ubi jam officinalia intentioni satisfaciunt, eadem v. g. sub pulveris Bezoardici, aut mixturæ simplicis, aut essentiae theriacalis anodyne, aut Elixyr anticachectici, & Emplastrî Carminativi, vel solitariorum, vel etiam certâ proportionem, ut Ess. myrrhæ ʒij. cum Ræ ʒij. Misturæ nomine simpliciter, dosim debitam saltem annexendo, præscribere: Ast ubi compositio quedam extemporanea, pluribus ex compositis vel simplicibus conscribenda venit, sapius hoc opus, hic labor est. Sanè in negotio hoc præscribendarum formularum, quantæ trepidationes apud Tyrones Medicinæ non raro observare contigit, quasi res omnium difficillima, ipsis verò captu planè impossibilis foret: ut taceam ipsos ad Praxin se accingentes Medicos non raro præscribendo tantum non sudare; imò rei hujus minus conscios, inconditas, nunc ridiculas, nunc planè ineptas ac insulas formulas præscribere. Huic Philiatorum torture ut succurrerem, paucis hisce paginis totum præscribendarum formularum negotium includere volui, ut tanquam idea inserviat iisdem, cujus intuitu præscribendi & modos & differentias, si non æquæ omnes, aut secundum minutissimas varietates, saltem frequentiores & magis usitatas, comprehendere queant; quod enim deesse videbitur, sub exiguis etiam Praxeos auspiciis facillimè usus, rerum magister, docebit & perficiet. Saltim præscribendi formulas modum & exempla trado; usum ipsum & utendi modum Lectio Scriptorum Practicorum docet. In gratiam ergo Philiatorum & Medicinæ Tyronum solum, quicquid jam sequitur, mihi licet sterili, & ob id tædioso labore, præscriptum esse volo.

CAPUT I.

de

Præscriptione Formularum in Genere.

§. I.



Auxilia Pharmaceutica seu Remedia sunt vel simplicia vel composita: utraque rariùs hodiè cruda, potiùs plus minùs, diversimodè tamen, præparata adhibentur. Exemplo sit Theriaces, Compositorum antesignani fermentatio, ante sui dispensationem, necessaria æquè ac proficua: illius enim operæ mirabilis ista ac discors simplicium farrago, mutuo quasi attritu & subactione accuratâ in concretum concors, texturæ & inodora-volatilis, effectus anodyno-sudoriferi non nihil analeptici, ubi & ingredientium quorundam activæ magis particulæ, resinosæ præcipuè, re-

solutæ, hincque diffusibiliores, indeque penetrantiores redditæ, partim exaltantur, partim corriguntur, ob id 10. annos juxta Arabes fermentare debuit, & etiamnum hodiè longè diutius juxta Persas, quorû quidam 12. alii 30. annos ipsi pro fermentatione assignarunt: vid. Pharmac. Persic. Fr. Angeli à S. Jos. pag. 26. sulphur naturæ quibusdam dictum balsamum, crudum tardissimæ in nobis alterationis & appropriationis est, quod tamen à & reclusum, & destillato solutum, pro paranda exinde vel Rûmmè activa, vel extracto longè magis medicamentofo, quia magis resolvable, & undique per corpus, mediante quovis fluido diffusibile reddi solet. Attenuativa & incisiva gummi ammoniaci polychresta substantia potiùs in essentia cum tartarifato adhibetur, quàm integrum ejus concretum, licet solutum; siquidem sociata in hoc acri illi attenuativæ resinæ mucilago temperata & inspissans non potest non illius motum alterativum remorari, nisi Vterum,

terum, & hos inter Dioscoridis *l. 3. cap. 98.* ex præcepto ad *§. 1.* cum aceto propinare velis: Extractum gentianæ succosum præ crudo illius pulvere febrientibus sane accommodatius existit. Eò sc. quævis præparatio respicere debet primariò, ut remediî respectu vel vis plus minus recondita, ceu perla ex stercore, eliciatur, vel virulentia castretur, aut potius quasi invertendo corrigatur: *Ægri v.* intuitu, ut commodius assumi, quàm crudum, & ita melius ipsi applicari possit.

§. 2. Simplicibus verò aut compositis jam in officina quæ prostant, tam Medici intentioni, quam ægri saluti sufficientibus, artificiosa inprimis præparatione exaltatis, haud opus erit nova compositione; quin simplicissimè à Medico in schedula præscribuntur, & signaturâ vel generali, vel ingratiam ægri interdum speciali, subscribuntur. Quid opus est mistura ex *S. V. camphor. essent. theriacal. spiritu C. C. Nitri, &c.* nova diaphoresin ægri procurare, ubi Mistura simplex, aut genuina ejus proles, Tinctura bezoardica, ritè tamen, quod rarum est, paratæ, satisfaciunt? quid compositionibus novis theriacalibus, quas ordinariò theriaca ipsa simul ingredi amat, fatigare ministros? ubi theriaca sola ritè administrata, aut Diascordium Fracastorii sufficiunt. Pulv. Card. benedicti crebriori usu se curant febricitantes plebei, citra tot. pulv. aut composit. febrifugarum abusum. Balsamus Copayvæ quatenus interno sui usu gonorrhœæ resistere tam appropriatè valet, eo ipso tot aquarum & essent. castitatis, syruporum, decoctorum, pulverum, & emulsionum compositiones superfluas reddit; sicuti externè quodvis vulnus citò, tutò, & jucundè curando non secus ac *Ol. mommord. infus. aut. Ol. sem. hyperici express. & cum eo concinnatus bals. Sulphuris*, nos tot balsamis vulnerariis, *Ol. balsamicis emplastris & misturis* interdum monstratis, supersedere posse, ostendit. Talia itaque selecta, vel simplicia vel composita, facile ordinari à medicò ac præscribi citra alias insigniores cautelas poterunt.

§. 3. Si verò circumstantiarum plurium, ac præ cæteris symptomatum urgentium syndrome, in nostris morbis, ut plurimum complicatis, & ex intemperantia otiosa ferè anomalis, adeò urgeant, ut consuetis istis officinalibus consulere ægro nequeat Medicus, necesse est sapius, extemporaneas ut ordinet compositiones, & schedulæ inscriptas Pharmacopœo miscendas transmittat, quæ magistrales aliàs, (ad modò dictarum differentiam) dicuntur. Siquidem officinales ferè majoris apparatus esse solent præ magistrilibus, ob extemporaneam compositionem, necessariò promptius commiscibilibus. Or-

Tom. II. Pars 2.

dinata talis remedii ac circumspecta præscriptio, Formula aliàs dicitur, de cujus genuino tantum præscribendi modo, usum, applicationem, cautelas, &c. Practicis specialibus remittendo, hoc loco agimus.

IV. In his ergò præscribendis Philiatro 2. consideranda: 1. Materia, ejusque debitus inprimis selectus; 2. Formæ, externa scilicet materiæ istius concinna ad se invicem adaptatio, ut agrò melius & jucundius applicari, sive internè s. externè, queat, in quo Finis consistit. Materiam constituunt ipsa ingredientia, qualiacunque fuerint, ex penu 3. Regnorum depromta, simplicia l. composita. Formam v. absolvunt horum sub præscriptione situs s. ordo, respectiva proportio, præscribendi modus, & denique in certam texturam, à medico intentam coalescentia, quarum hæc principalis, illæ subordinatæ, dicendæ sunt.

V. Ingredientia non corpora elementaria aut omnium prima, sed jam plus minus (sub tali respectu) composita, adeoque formis suis specificis & dependentibus inde qualitatibus & proprietatibus respectivis instructa sunt. Unde in iisdem consideranda 1. quantitas, 2. qualitas. Circa quantitatem 3. materiæ dimensiones & hic suo modo attendendæ: longitudo secundum illorum multitudinem, latitudo secundum dosin, profunditas s. consistentia, h. e. ex mistis illis coalescens moles, & ejusdem color, sapor, odor, &c. Circa qualitatem v. consideranda in specie (apparens licet tantum nobis) similitudo & contrarietas, tam respectu sui ipsius in genere, quàm respectu ad corpus ægrum in specie. Atque his Materiæ habitus est expositus. Formæ ratio jam præcedenti *§.* ferè fuit declarata, & hujus in respectu in materia ista ratione longitudinis debitus Ordo; ratione latitudinis concinna proportio; & ratione profunditatis debitus præscribendi miscendique modus considerandus. Ex quibus tandem essentiale Formulæ, quasi mechanicum concretum, coalescit.

§. 6. Patet ex dictis simul, neminem concinnam, & quæ Medicum decet, formulam compositurum, nisi 1. exactam Materiæ Medicæ sibi comparaverit notitiam secundum omnia 3. regna; eamque tam externam, sive quoad attributa à priori sensuاليا, qualls in officinis Pharmaceuticis & Mercatoriis, comparanda, quàm internam, s. quoad attributa à posteriori cognoscibilia, h. e. operandi vires vel facultates non nisi per experientiam, vel propriam vel alienam (scriptorum Medicorum) cognoscibilem. In hunc finem vel ineptè etiam curiosum præstat esse Philiatrum sub studii Medici cursu, ut in omnia ubicunque obvia minutissima, quæ, qualia, quan-

[Kkkk]

quanta, &c. sint? unde nata? cujus usus, vel mechanici vel naturalis? &c. sive intelligat, sive non intelligat, inquirat sedulo, etiam si risu interdum excipiantur talia quaesita: dici non potest, quanta copia rerum in occulto & non sentientibus colligatur hoc pacto, quanta experientia, & denique quantus usus postmodum inde emergat. 2. Preparationem simplicium saltem planiorem exactè calleat, quod sine operationibus chymico-mechanicis fieri nequit; harum enim medio aperitur plus minus, alteratur, concentratur, respectu aliorum varia Phænomena exhibet idem simplex, &c. Propterea Laboratoria Chymicorum, Medicorum, Pharmacopœorum, quinimò juvat & mechanicorum, quicumque subjecta quædam ad materiam medicam spectantia tractant, visitare, attentus si sit, nunquam sine nova preparationis cujusdam, vel enchiriseos, &c. observatione discedet, nam & sic apud Oenopolas, zytopeptas, pistores, quæ menti curiosæ satisfaciunt, reperiri licebit; non secus ac apud aurifabros, claustrarios, stannarios, &c. quin & proprias manus adhibeat, & carbones tractet ad Helmontii imitationem, nec deterreatur à crebriori infausto successu, sive enim procedat ex voto, sive reluctetur tentamen, semper aliquid observare contingit, alibi quod proficuum esse potest, & hoc medio optima remedia, elegantissima artis opera, &c. inventa fuerunt; modò non saltum faciat, ac mox prolixos aut laboriosos, aut non nisi exercitatis imitabiles processus inchoet; tales enim nihil commodi, saltem funtuum perditionem, & in capite confusum Chaos Chymicum, reportant. 3. Compositionum officinalium optimè gnarus sit; partim ut adhibere debite easdem, partim aliis associare aptè queat; aliàs metuendum omninò, ne cæco imperu quid pro quo interdum arripiendo empiricum temerarium, non circumspectum agat Medicum. His ita primò observatis, certus sum, quod facillima erit quævis formulas præscribendi ratio: sub quorum ignorantia non nisi trepidante corde & manu, vel ob sanitatem in ægro, vel ob famam in Medico, utrumque ex inepta formula, periclitantem, aliquid in schedula consignari poterit. Quod si nimis latè extendi requisita talia videantur, restringi possunt ad ea, quibus in præscriptione sæpius & frequentius utimur, ut hæc saltem juxta supposita benè calleat; pro ulteriori vero artis incremento & aliis pro viribus incumbat.

§. 7. Jam ut specialius ista tam Mat. quam Form. requisita consideremus, se offert quoad materiam, i. ejus multitudo. Equidem felicem istum ægrum prædicat Helmont, cujus medicus novit curare simplicibus, &

dolus est, secundum Arnoldum de Villanova, compositis uti, ubi simplicia sufficiunt: scil. ut simplex victus saluberrimus & Naturæ convenientissimus, ita pariter Pharmacia: Natura utroque paucis contenta est. Quod si ex §. 3. compositis utendum sit formulis, quævis vitanda multitudo, quæ nec Medico, nec Remedio, nec Ægro, conveniens videtur: Non Medico, cum semper ignorantia cujusdam videatur indicium, tanta sub magistralibus compositionibus farrago, quasi inter tot ac tanta, simplicia aut composita, plus minus homogenea aut heterogenea, pro præsentī casu debitum delectum instituire nesciat, id quod materiæ Medicæ superficiale ferè cognitionem innuit. Laboramus abundantia potius & luxuria remedium, quàm penuria, selectu saltem opus est, qui vix quàm per experientiam, ac per cognitionem texturæ materialis secundum minima, ex vi seminis nata, ceu operationum instrumenti, obtineri potest: præsertim ubi non tam universalibus, sed quod magis expetendum, particularibus sive appropriatis ac specificis ægro succurrere est animus. Symptomatum (quam alii urgent) atrocitas & pluralitas ex unâ ferè vel immediate vel mediate propullulant radice morbosa, quâ plus minus correctâ, fructus isti morborum marcescunt; sin atrocius urgeant, en Opium ritè præparatum, infra dosi cæteris sociatum, tantum non omnibus succurrere solet, externa ut taceam delinimenta. Nec rarum est, quod Naturæ motum, nimium dum damus operam corrigendis symptomatis, vel impediamus vel turbemus. Nec minus adversatur Remedio ex pluribus compositio, siquidem horum genericæ saltem dotes, neglectis ut plurimum specificis, considerari solent, utrobique superfluo labore; facultates generales enim carminativæ, aperitivæ, absorptivæ, tribus l. 4. selectis simplicibus, aut uno concinno composito, obtineri possunt. Specifica pauca sunt, quæ paucioribus istis universalibus sociata, scopo satisfaciunt. Quod si sub plurium coactione neglecta specifica appropriatum activitatis suæ objectum, (ne per somnium quidem id cogitante medico) inveniant, necessario provocato hinc spirituum impetu, ex symptomatum novitate nova ægro turba, medico sollicitudo excitatur. Imò attendendum & hoc, ne talibus compositis vetex simplici mistione vel ex arctiori per determinatâ preparationem in novam texturam unione, novæ vires medicamentosæ, pristinis vel delectis vel infractis, emergant. Simili ratione ac simplici ex mistione pulv. pyrius, aut sclopetarius vim fulminantem acquirit, qui strepitus in O fulminante, simplici acidit intensioris additione,

ne, obmutescit, non sine virium detrimento. Quævis simpliciter saltem cum vino vivo mitione, diutiusque continuatâ trituratione, iuncta repetita edulcoratione, draco mitigatus sive dulcis evadit, de cuius usu tuto si dubites, saltim Docimasiam Davisonii *Philos. Pyroth. part. 4. c. 27. p. 178.* instituere licet. Jalapa ac colocynthis simplici cum Oleo tartari (hic quidem addito saccharo) miscela & tritura cicurescunt ferè penitus. Quid fieri jam putandum est, ubi præter mitionem, infusiones, decoctiones, &c. quibus vel exaltantur, vel castrantur, vel immutantur simplicium Vires, accesserit. Minus denique Aegro proficua est ista multitudo, cum perlæ c. stercore simul ingerantur Ventriculo, cui tum demum hic labor incumbit, ut digestionis simili labore concreta medicamentosa dissolvat, donec activæ & medicamentosæ particulae resolutæ, id quod possunt, operentur: sub quo actu ut non tantum immutantur plus minus ingesta medicamenta, ita ex opposito ipse ventriculus à tot diversis ingestis non nisi p. n. patietur impressionem: qui dum in ægris languet, & consueta horret, multo magis infueta medicamentosa nauseabit.

§. 8. Ut itaque debitis suis cancellis eò melius circumscribatur quævis compositio magistralis, omnia ingredientia ad 4. hæc puncta cardinalia, quæ sunt 1. Basis, 2. Adjuvans, 3. Corrigens, 4. Constituens, dirigenda veniunt. De Dirigente taceo, lite nondum decisâ. Basis est præcipuum medicamentum, cui ceu fundamento compositionis ac principali ingredienti, sive simplex & ipsa sive ex aliquibus composita fuerit, reliqua tantum adiunguntur. Cætera inter ingredientia minus principalia eminet adjuvans, quod effectum baseos, ut citius se exerat, promovere debet. In quem finem, cum interdum sensibilior quidam requiratur stimulus, præsertim in purgantibus, etiam stimulans interdum audit: v. g. Opii dulcis optimus stimulus est scammonium more Brendeliano præparatum. Quo verò tutius ac simul jucundius operentur ista, Corrigens subinde addendum: Nec enim tam benigna aut correctæ semper sunt remedia, quin aliqualem, plus minus notabilem, noxiam impressionem, vel ventriculo & intestinis, nervoso generi, ut purgantia; vel aliis partibus hostilem alterationem inferre valeant: corrigentia E. subinde permiscenda. Sennæ operatio Tartari cremore in decocto, Oleum in infuso, corrigitur; Opii malignitas pipere & castoreo emendatur, ut horum ope illius in spiritus impressio eò melius deleatur. Quin cum & ingrata subinde sint agris certo ex puncto, vel odoris vel saporis, &c. remedia, pro infringendis huiusmodi nauseosis

Tom. II. Pars 2.

qualitatibus subinde quædam, succus citri, & cinamomi, syr. sacch. &c. addenda veniunt. Cum denique pluribus modis remedia propinari ægro possint, & ita ex eisdem ferè ingredientibus plures formularum modi conscribi, determinat hanc indifferentiam Constituens, à qua reliqua mutuâ subactione certum consistentiæ modum acquirunt, ut vel solidum, vel fluidum, vel medii modi, evadat medicamentum.

§. 9. Exemplis binis negotium hoc declarare juvat: sit v. g. præscribendus pulv. vel bolus mediocriter laxans: basis sit Jalapa; adjuvans, (quod simul baseos dosin plus minus limitat) crem. Tartari; Corrigens Ol. destillatum macis; Constituens requiritur nulum in pulvere, cum hic per se ex mistura emergat; in bolo verò conserva fumar. aut fl. tunicæ adhibeatur;

Unde tales fiunt formulæ:

R. Crem. tartari gr. xv.
pulv. jalap. ℥ss.
ol. destill. macis. gutt. ij.

M. f. pulv. D. S.

Purgier-Pulver.

R. Conf. fl. tunic. ℥ss.
Crem. Tart. gr. xv.
jalap. ℥ss.
Ol. destill. macis. gutt. ij.

c. f. q. syr. rosar. solut. F. Bolus: D. S.

Purgier-Zucker.

Vel sit ordinanda potio antihypochondriaco-sive hysterico-diaphoretica, repetitis vicibus capienda. Basis sit vel composita, ex Ess. castor. & Liquore C. C. succin. vel simplex, Ess. Castor. c. spiritu O* vinoso parata: adjuvante opus est nullo, aut si pro scopo absorbendi vitiosos saponos in primis viis addendum aliquid foret, Lap. sr. Unicornu verum, sufficiunt. Corrigens saporis ratione sit succus Chermes, vel syrupus borragin. vel syr. cortic. aurant. Denique ∇ destillata, vel qualiscunque, vel aromatica, vel appropriata, ut interdum dicuntur, pulegii, fœniculi, fl. sambuci, omnia ista sinu suo excipiat, & ita potionem constituat hoc modo:

R. ∇ fl. sambuc. ℥ij.
fœniculi ℥j.
Essent. castor. tartarif. ℥ss. -- ad ℥iij.
Liquor. C. C. succin. ℥ss. ad ℥j.
Lap. sr. præp. gr. xv. ad gr. xxiv.
Syr. borrag. ℥ss. ad ℥vj.

M. F. Potio: D. S.

**Beitragende
Schweiß-Mistur, auf etliche mal.**

§. 10. Consideranda jam materiæ latitudo, sive parsenti in negotio Dosis, h. e. quanto pondere ac mensurâ ingredientia præscribenda, sive explicitè istud, idque frèquentius, secundum gr. scrup. drachm. uncias, & libras, sive implicitè, idque rariùs,

[Kkkk 2]

rius, tantum in vegetabilium quorundam partibus aridis, ob faciliorem dispensationem, secundum pugillos, manipulos, fasciculos, numerum parem vel imparem determinetur. Cum verò omne remedium non nisi respectu hominis sitale, cui alteratio certa illius occasione inducenda, sive activè sive passivè remedium ad hoc contribuat, ipsi vero homines multum inter se differant, tam habitualiter ex Idiosyncrasia seminali, quam accidentaliter ex vitæ generis, consuetudinis varietate, nullius remedii dosi absolute determinari poterit, quin respectu vel primariò ad individuum patiens, vel secundariò ad cætera associata ingredientia, habito, eadem demum limitanda. Subjectum patiens quod attinet: in eodem remedium vel facilius aut difficilius, vel fortius aut debilius, &c. effectum suum exerit. Siquidem pro partium solidarum majori vel minori eutonia ac robore, fluidarum texturâ concentrata magis & firmiori aut attenuata & subtiliori, acrimoniâ in specie volatiliori magis resolvente & remedium actuate, aut fixiori concentrante & remedium enervante, spirituum denique systasi rariori ac magis elastica, vel densiori, ejusdem remedii, etiam in eodem subjecto variat effectus. Quia alios fortiter exagitat Tartarus Emeticus Myns. in gr. iij. hypochondriaco-melancholicos vix tantillum etiam sub triplâ movere dosi: Dum ☉ fulminans infanti lactanti tutò ad gr. j. porrigitur, ceu polychrestum iisdem auxilium, ultra gr. ß. unâ vice vix dare poteris eidem non ita diu ablatò: illud ipsum ad gr. iv. cum paucò arcano duplicato Tertianario ultra x. secessus provocaverat, quod alia occasione in quartanario ad gr. ix. cum quibusdam absorbentibus ne minimum commotionis sensum inducerat. Mirum quantas doses, repetito etiam usu, opiatorum, optime ferant phthisici ac dysenterici? Apoplecticum vix potentissimus naribus insufflatus excitat helleborismus. Adeoque in quovis remedio toties variat dosi, quoties individuum vel numero diversum, vel numero idem, secundum 3. res Medicas diversimodè alteratum occurrit. Ne tamen in suspenso penitus maneat hoc negotium, nec nisi per experimenta dubia, adeoque suspecta, modò non periculosa, dosi remedii unicuique individuo conveniens expiscanda sit, ob id sicut rectum norma curvi, & juxta statum naturalem mensurandus quasi est præternaturalis, ad adultum, sanum, vel saltem neutrum respicere, & quæ alterationes insequantur certam remedii dosin attendere, eandemque in aliis similiter circumspectè observare convenit, & ista, quam ut plurimum (quod in contingentibus necessarii locum supplet) idem ac eodem fetè mo-

do desideratus insecutus fuit effectus, ceu media ordinariaque dosi statuenda venit, juxta quam postmodum pro individuorum conditionibus summa ac infima, & ita pariter extraordinaria, determinandæ: Sic enim Jalappæ dosi media est ℥j, summa 3ß, infima ℥ß, sed extraordinariè nec 3j. quendam movere observatur, dum alium gr. iv. l. vi. sufficienter exagitant: conf. Bartholinus *Cent. Hist.* 69. *Epist. cent.* 3. p. 130. 133. Ac in hoc sensu apud Materiæ Medicæ Scriptores doses speciales ubivis consignatæ observantur. At præter individuum recipiens, & alia ingredientia pro determinanda dosi remediorum simul conferenda; ab his enim impediri ac promoveri effectus medicamentosus assollet. Prout adjuvantia basin plus minus acunt, corrigentia hanc infringunt, aut refrænant, constituentia concentrant aut diluunt, &c. Jalapæ ℥ß, pro dosi sufficit, si crem. Tart. gr. xv. eam adjuvent, idque eò magis, si præterea scammonii pp. gr. i. eam stimulet: Theriaca longè potentius sudorem movet ☿ juncta. Opiata, quorumvis evacuantium, præter diaphoreticorum, effectus imminuunt: ☿ medicatæ efficacius adstringunt ☿ consortio, quasi Osæ factæ. Hisce ergo ingredientibus cæteris baseos dosi absoluta subinde varianda ac determinanda venit.

§. II. Superest materiæ profunditas seu crassities, hoc est, sub compositione exurgens moles, & hujus qualitates sensibus gratæ vel molestæ. Harum quædam ante mitionem jam partibus insunt, & compositione vel exaltantur, vel infringuntur; vel non insunt, sed in composito demum ex hujus nova texturâ emergunt. Essentiæ resinosa rubin. in aqueis vehiculis vel lacteum turbidum, minus gratum, vel lividum liquorem exhibent: quod non æque contingit, S. V. Tartaris. vel Tinctura Tartari si preparatæ fuerint, utut aliquali texturæ & virium alteratione ☿, succus citri, spiritus ☿is, qui gratiam de cætero multis medicamentis conciliant, absorbentibus marinis ac Ostracodermis copulata, ex dulci salissimum, quibusdam nauseosum, reddunt saporem. Sulphurea alcalisatis in via humida sociata, ingratisimum foetorem contrahunt. Sin electuariis spiritum Vitrioli in conservis, aut Oculis recipientibus, ☿ea absorbentia miscantur, super vasis ora motu fermentativo prorumpentia, vel visum, vel tadium ægro conciliant. Tincturæ, syrupi, pro acidorum vel alcalium commercio varias Tincturæ mutationes exhibent. Nauseosè dulce & adstringens ☿is Vitriolum, Tartari terræ foliatæ junctum, vel via sicca secundum Zwelferum, vel via humidâ in liquore ☿ ☉ c. ☿ hujus

hujus certo connubio, concretum tertium novarum plane tam externarum quam internarum proprietatum subministrat. In qualitatibus adeoque talibus sensibilibus, quantum citra ægri incommodum fieri potest, gratia aucupanda venit sub materiæ miscendæ selectu. Horret decumbentium ventritulus consuetorum alioquin alimentorum odorem & saporem, quidni infectorum remediorum? & multo magis sensuum cæteris quoque Organis horrorem incutientium. Arte Martequ tandem ubi ingesta fuerint, vel cardialgias, vel præcordiorum anxietates, vel post nauseas Vomitus expectandi. Minus metueda talia, ægri palato hinc & naribus accommodata melius si fuerint. Quod & de aliarum partium sensu quasi particulari non minus interpretandum, oculis scilicet propterea, præ aliis quibusdam partibus, minus acriter administranda. Ad hæc multum in recessu omnino habet imaginatio, pro cuius ductu, & hinc spirituum influorum modificato motu, gratius quod est palato remedium, propensionem majorem & quasi amicitiam erga illud in ægro excitabit, ut & assumatur lubentius, facilius retineatur, & suavius operetur. Quoties enim imaginationis ex iussu res alienæ & insuetæ, quia singulari appetitu, atque adeo voluptate assumptæ, remedii appropriatissimi instar aut diurnas febres, aut chronicos Ventriculi languores tollunt. Licito itaque stratagemate & hinc fallere interdum ægrum juvabit, ut sub fide desiderati à se remedii aliud ipsi simile, sed magis proficuum, propinetur, sanè consensus hic, & imaginationis motus an quies, multum ad remedii effectum promovendum aut modificandum facient. Sequiori in specie sexui crebrius se gratiosum his in punctis exhibeat necesse est, ob hystericas passiones, aut cardialgias his non raro simillimas, quæ uti per dulcia aut suavius odorata provocari subinde (idiosyncrasia summopere hic attendenda) solent, ita per ingratiora pariter medicamina ob nauseam & ventriculi subversionem, quam sæpius concitant, paroxysmos istos vel revocant, vel exasperant.

§. 12. Post quantitatem materiæ formularum, consideranda ejus qualitas, circa quam ante omnia vitanda Contrarietas, quin eligantur tam sibi, quam ægro Compatibilia. Contrarietas formalis equidem nulla in naturalibus, aut saltem nullibi, præterquam in animali regno; idque ferè quoque sub latiori acceptione, sed saltem effectiva, & quæ respectu nostri ita dicitur, quatenus quædam ex necessitate aut naturali aut artificiali nobis adversantur; vel quatenus sub unione se ita alterant, ut depositis pristinis proprietatibus sensuum ex judicio se destruxisse videantur.

Contrarietas hæc effectiva est, quæ in materia miscenda juxta formulæ præscriptum attendenda venit, tam respectu habito ad materiam miscendam, quam ad ægrum sanandum. In Materia non superficialis illa, quæ quædam non benè miscibilia sunt intelligenda, ut Oleosa, v.g. Ol. amygd. dulc. c. v. aut Vino, sperma ceti, &c. Sed quæ magis interius penetrat, & ipsam texturæ mutationem junctam habet, qualis in specie universalis inter ista duo Naturæ & Artis mechanica instrumenta, acidum & alcali, hisque cognata subjecta alia, notari solet. Ex nova enim in Θ sum textura neutrum propriæ satisfacit destinationi: idque eò minus, si simultanea particularum aliarum syncrissi vel diacrissi novum concretum emergat. Θ ia alcalisata hinc non præscribenda cum Θ *eo pro febrium cura, Θ vol. Urinos. avolat, concreto Θ c commun. æmulo relicto. Eadem, sive fixa sive vol. alcalia, Ois societatem citra sui notabilem alterationem non ferunt. Nec Lixivialia eadem Θ ialibus, præsertim Vitriolaceis, jungenda; illorum enim in Tartarum Vitriolat. saturatio; hujus in crocum ferè adstringentem fit præcipitatio. Nec acida, præsertim mineralia, ac Φ sa, fixatis metallicis aut mineralibus faciliè socianda, promptissimè aliud inde concretum emergit pristinis simul utrinque exutis potentiis: Elixyr. propriet. vulg. minùs cum spiritu Θ *ci miscendum, cum novum exinde, mirabiliter alteratum, sub præcipitatione emergat concretum; nisi interdum Medicus ex instituto compositionem talem ex contrariis componat pro obtinendo quodam tertio: id quod obtinet v. g. in portione febri-fuga Crolliana Basil. p. 298. ubi extemporaneus Tartarus Vitriolatus, ceu conveniens digestivum, ante paroxysmum propinatur: pertinent pariter huc Misturæ versatissimi in felici praxi Sylvii, passim in Lib. Ejus Pract. annotat. ex Σ o, lap. Θ . l. coral. & Diascord. &c. combinatæ: mens scilicet in talibus formulis non est saturare acidum, & ita aliud intra corpus absorbendi vim in Terreo destruere, sed arrodere saltem superficiali tactu ista objecta, quo intra corpus à potentiori acido promptius arripiantur, ac ex Σ o præcipitentur, seu quod dum in istis concentratur, seu ab iis absorbetur, Σ quasi regeneratum, in corpore in Θ f. mutatum, abstergendo & resolvendo, & blande stimulando, sui quod erat, faciat officii. Exemplo Tart. & Θ hæc illustrare placet: Decoctio Θ is c. crem. Tart. solut. mediocris (in qua superficiali tactu Tart. sibi Θ jungebat) coloris citrini, dulcoris Θ specifici non adeo intensi, inspissata, donec intense Θ rei esset coloris, instillato spiritu

[Kkkk 3]

 Θ *

Θ * simpl. aut Lixivio Θ Tart. vix sensibilibiter alterabatur, ab xvero, spiritu Θ & spiritu Nitti, turbabatur liquor Tartareo-σialis, & copiosum ponebat sedimentum, non σrecum σiale, sed Θinum, quasi granulofum, gustu subacidum, hoc est, perfectus Tartarus regeneratus, qui per præcipitationem per potentius acidum liberatus à σnativa in forma se representabat. Hinc enim, si modo dictis cum acidis intensioribus imprægnatis liquoribus filtro à Tart. separatis, lixivium Θis Tartari instilletur, veri σ fit præcipitatio, sub formâ sedimenti obscuri nonnihil viridescens, quod tamen in aëre libero in crocum flavum fatiscit: Simili modo suspicari licet, σem in liquore σis Tartarificati præfati intra corpus à potentiori acido saturari, Tartarum v. præcipitando regenerari ac dum consuetis muniis fungi. Ex Opposito Crem. Tart. & σana decoctio fortis & multum imprægnata, non tamen potenter adeò Martialis quam tartarei saporis decantabatur, & magna residuum cum nova ∇ diu beneque agitatum & decoctum, liquorem aurei coloris, ad nigredinem vergentis, saporis intensius Martialis, reddidit: quem ob fortiorem Mart. & Tart. amplexum, sive potius intimum congressum, nec x, nec spiritus Θis, nec spiritus Θi, nec spir. Vitrioli, tantillum immutabant, quin omnia hæc acidacitra sensibilem alterationem ipsi se permiscebant: par ratio cum alcalibus, siquidem nec à spiritu Θ * ci, nec à lixivio Θ Tartari, ulla mutatio, adeò perfectum Θsum ex σe & Tart. concreverat. Quod si liquori dicto, jam acidis imprægnato, alcalia instillarentur, post levem effervescentiam præcipitabatur materia grumosa & grossa, analoga quodammodo σi ex Vitriolo præcipitato. Sanè suspicari licet, σ extra corpus jam plus minus ita saturatum, minoris usus futurum pro Cachecticorum acidis imbibendis; sicuti ex opposito Tartari acidum, appropriato suo compari alcali Olcofo, per istâ in σe concentrationem & diuturnam coctionem spoliatum, minus regeneratum iri, sed odore saltem acido, si adhuc separabilis esset, parum vel nihil effecturum.

§. 13. Contrarietatem remediorum extemporaneè componendorum cum Aëro quod attinet: Idiosyncrasia hujus inprimis observanda, à priori licet non cognoscibilis, sive nativa sive adscititia fuerit. Sanè ut sensibus grata, & aliàs consueta, licet deteriora, in Hygiastico usu reliquis omnibus præferenda, teste Hippocrate; cum tantillum Casei averfati frustulum, clam licet ingestum, totam ex opposito digestionem turbet; ita in Therapeutico negotio, quæ agro accepta & compatiblea, nec hostilia, forsan melioribus præferenda erunt. Idiosyncrasia ista, tam

quoad sensibiles immediatè, alias manifestas remediorum qualitates, quàm quoad non sensibiles, sed occultas perpendenda. Istæ ex Aëri patent relatu; hunc enim amara, alium acida, dulcia, Θsa, &c. delectant; nunc pilulæ, pulveres, poriones, &c. appetuntur. Sed circa occulta illa, quæ nulli sensuum patent, major omninò difficultas; neque enim nisi per experientiam, adeoque repetitas observationes, cognosci possunt, nisi forsan vel ex hæreditario charactere per plures successiones innotuerint, aut ex ægri prævia observatione pateant. Sunt quos castorei sapor aut odor offendit plurimum, alios qui delectat: hi bene anisum, aut cinamomum ferunt, quod aliis fastidiosum est: ♣ quamplurimis in summis est deliciis, cujus tamen vel solo odore lipothymiam incurrit Mulier apud Horstium ex Fabricio *Append. ad decad. 5. quæst. 1. p. 117.* Sassafras lignum præ aliis suave, summè tamen abhorruit Vestalis, apud Panarolum *pent. 5. obs. 22.* Sunt qui gammaros coctos absque perturbatione insigni ne aspicere possunt, in M. A. N. C. *anno 1. obs. 135. p. 299.* quomodo eisdem in potionibus vulnerariis sustinebunt? Quicquid ergo agro haud compatibile, & primariò, quod ex Idiosyncrasia repugnat, ex formulis simpliciter exulet.

§. 14. Materia hæc fuit formularum: sequitur Forma; in hac se primò offert Ordo, quo situanda sint ingredientia. Libertate hîc gaudet Medicus, & pro lubitu ferè eandem instituere valet. Concinnior tamen ferè emergit formula, si quæ copiosius ingrediuntur, cæteris anteponantur, ut & ea, quæ prius dispensanda aut præparanda, ut in decoctis, misturis &c. Baseos locus simpliciter in arbitrio est præscribentis; non secus ac Constituentia nunc præponuntur, ut in misturis, nunc postponuntur, ut in morsulis; uno nomine, formularum crebrior inspectio, & præscriptarum præparationis observatio, omnia hæc facillima reddunt.

§. 15. In Forma sequitur ingredientium debita proportio, quâ dosis tam generalis eorundem, quam specialis, aptè limitatur. Generalis dosis est ista, quâ ∇, syrupus, ♣, succus, pulv. flor. folia, fructus, &c. pro hac, ista formula ordinariè & aptè præscribuntur, quam vide definitam in Erudit. Wedelio, *de Compos. Med. Extemp. sectione prima p. 31.* Specialis est, quam cujusvis remedii usus & effectus particularis circumscribit: nam alia dosis est C. C. f. Δ, alia Θ vol. C. C. alia Mercurii dulcis, alia turbith. mineral. alia rhabbari, alia lap. σr. &c. In utraque debita proportio observanda. In speciali est proportio inter basin, ejusque adjuvans accorrigens, ne nimis exaltetur potentia

tia baseos, nec infringatur ab iisdem, sed omnia pro effectu intento obtinendo mutuò conspirent, & junctim dosin legitimam constituent: conf. §. 10. circa finem. Ex hoc enim de judicio Medici præscribentis ferè judicari potest: Ob id in pulv. §. 9. jalapæ una dos. sufficit, ob adjuvans egregium Tartareum: quibus forsàn debilioribus gr. 1. scammon. additum, integram dosin proportionem debitâ compleret. Quoad generalem dosin, ingredientium mutuus ad se invicem quasi sit respectus, ita ut eadem proportionem duplâ, triplâ, 4plâ, 6plâ, 12plâ, &c. aut quocunque alio modo his plus minus analogo sibi invicem aptè respondeant, quo æqualis quasi ac elegans non v. hiulca aut aspera, fiat præscriptio. Non equidem de necessitate hæc sunt, cum ad ornatum tantum faciant, tamen de majori Medici præscribentis attentione loquuntur. Sic enim in mistura supra §. 9. præposita ∇ α β respondet Tincturæ s. Essent. β β . spiritus β β . pulv. gr. iv. syr. β β . ad β β . dant hæc dosin integram specialem, triplicata mutuo, pro repetito usu formulam istam subministrant: id quod majori omninò sit ornatu quam si ∇ β β . Essent. β β . spiritus β β . pulv. gr. xvij. syr. β β . vel vii. invicem confunderentur.

§. 16. Restat adhuc, ut formæ ratione præscribendi miscendique modum consideremus, qui vel materiam, vel formam præscriptionis respicit: Materia quidem præscribitur vel simpliciter, vel modificatè: ibi generaliter herb. malvæ, rad. gentianæ, Θ absinthii, Mercur. dulc. spiritus Θ *ci; hic vero specialiter comæ absinthii, rad. helleb. nigri præp. rad. chinæ non cariosæ, Mercur. dulc. ad extra, ad intra, spiritus Θ *succin. Θ vol. Viperar. camphor. &c. quæ tamen præscriptionum inspectio ipontè docet. Formam denique, quæ respicit præscribendi rationem, est hæc vel universalis, quibus ferè formulis communis, vel particularis certis quibusdam propria. Illa in anteposito consueto R. seu recipe, quod quare quidam adeò horreant, nisi forsàn, quod in Veterum scriptis non æquè reperiatur, sanè non video: & in postpositis M. F. I. a. D. S. hoc est. Miscantur, Fiat legentis, dentur, signentur: ferè consistit; quibus & illud ana sub æquali ingredientium dosi accensendum: Hæc in qualibet ferè formulâ aliquid peculiare obtinet, quando in pulveribus præcipitur, redigantur in alcool; in quibusdam liquoribus filrentur, colentur; stent in MB. per 12. vel 24. horas, hoc est, per ρ δ , & quæ sunt aliæ similes præscribendi rationes, non nisi sub speciali formularum tractatione exactè dignoscendæ.

§. 17. His omnibus ita observatis sub ipsa præscriptione emergit sponte suâ ipsum

Medicamentum seu quasi novum concretum remedii essentiale, magistraliter quidem seu extemporaneè, artificiosè tamen compositum, juxta Medici privatam ordinationem, ulterius adhibendum.

CAPUT II.

de

Præscriptione Formularum in specie.

§. 1.

FAcimus jam accessus ad ipsas præscribendarum formularum differentias & distinctos modos, istos scilicet, qui hodiernæ compriori Praxi accommodati, relictis jam antiquatis ac inusitatis, & qui pro magistrali compositione dirigenda, ex tempore à Medico præscribuntur. Applicatio præscriptorum per formulas remediorum, eorumque usus varius, Practicis demandanda venit. Vitabimus enim, quantum possibile, confusio-nem & prolixitatem, illa errorum, hæc tædii in Philiatro genetrix. Nihil ergò sumus acturi de syrupis, qui pro dispensatione sui semper parati prostant, nec magistraliter præscribuntur. Vina Medicata ad infusâ pertinent, nec peculiarem præscribendi modum exigunt. Ptilana pariter, sive Hordeatum, Hydromel, Oxymel, decoctionum speciales quidam modi, non secus ac Diæta sudorifera, sive lignorum decocta, tam primaria quam secundaria. Destillatum instaurans est non ens, etiamsi ∇ impinguans Epiphan. Ferdinandi in Hist. Med. foret, nudum nempe Phlegma, quod sine ullo usu hauritur. Decoctum Galli, sive junioris sive senioris, jam rarissimi usus Pharmaceutici, ad culinas relegandum, unâ cum jusculis medicatis ac restaurantibus, quorum omnium odor ægris vix tolerabilis, nedum ut ventriculus debilis sub appetitu prostrato eadem digerat, quin dum calore febrili interiora plus minus æstuant, cadaverisunt talia digestionis defectu, putrescunt, aut saltem in nidorem abeunt. Conditum idem cum Electuario. Eclegmata ferè inusitata, quorum locum syrupus quidam gravior, v. g. diacod. Mont. scabiosæ, vel misti, vel cum rob. passul. min. subacti, cum baculo liquiritiæ pro scopo temperandi sive demulcendi aut incrassandi supplebunt; sicut pro scopo attenuandi & resolvendi isti de prassio, de nicotianâ, emeticus Salæ, c. spiritus sulphuris paucis gutt. sufficient. Pandaleon, Pasta Regia, Massa Panis, pineolatum, cupediariis relinquendi, & quantum nutritii vel temperantis roris languidustabescentium Ventriculus ex istis hauriet? dum in pastam tenacem viscidam in eodem abeunt. Trochisci magistrales vix præscribuntur

tur ulli, cum ipsi officinales videantur quibusdam superflui. Epithema peculiarem haud exigit formulam, cum fluidi cuiusdam, vel liquoris, vel misturæ, vel decocti, vel emulsionis determinatam saltem externam applicandi rationem denotet. Idem dicendum de Clysmatis ac Gargarismatis, quæ saltem in medicamentorum liquidorum, variâ forma adscriptorum, speciali utendi modo consistunt. Fetus humidi, & quæ huc pertinent, Lotiones, Balnea, Infusus, ad decoctorum speciales modos, ex applicandi varietate natos pertinent, nam simili ac decocta modo præscribuntur: etiam si sicca sacculorum formâ, adhibeantur, eadem tamen præscribendi, alia saltem applicandi ratio. Nec scutum differt à sacculo vel emplastro, dum ventriculo admoventur. Frontale nunc sacculus, nunc epithema, nunc linimentum est. Cucupha est specialis saltem pulverum applicatio; Collyria oculorum sunt remedia, multiplici formulâ præscribenda. Idem de Errhinis valet, Sternutatoriis, apophlegmatismis, & dentifriciis. Cataplasmata ad decoctionum speciales modos reducenda, sicut interdum ad misturas spissiores. Vesicatoria peculiarem non constituunt formulam, quin prout pulverisati cantharides vel fermento pro cataplasmate, vel emplastro magistrali aut officinali includuntur, suum quod est, faciunt, quid? quod eorum essentia, cuti imposita, vesicas excitet. Suppositoria non præscribuntur sed officinalia ordinantur: ut taceam loco illorum globulos **die Biesem-Kuglen**/ commodius, si non ut plurimum, felicius applicari posse. Quod si extemporaneum desideres, promptè illud ex *One* ad imitationem *Salæ Append. Myroth. f. 4. §. 13. p. 840.* vel *Sylvii l. 1. Prax. c. XI. & XII. p. 119. 123.* concinnabitur. Quæ & qualia denique præscribuntur hodie pessaria, quin loco eorundem vel injectiones per metrenchytem, vel suffitus per instrumentum Glauberi ligneum, vel optimè per parvam aut Phiolam, aut retortulam vitream, longioris paulò colli, usurpantur, dum harum in specie orificium linteis tenerioribus munitum, sinui pudoris applicatur; fundus v. vasis cum remedio vel solido vel fluido Δ i carbonum leni propitiis admovetur, ut concitatis hinc effluviis uterius locaque vicina diversimodè alterentur. His ergò partim rejectis, partim ad stationes debitas relegatis, formularum quamvis differentiam 5. Classibus generalibus includemus, & specialius pertractabimus.

Sit ergò

CLASSIS PRIMA,
Quæ Pulveres, & iisdem subordinatas
formulas, sistit.

§. 1.

Simpliciter in his arida, seu sicca, in minutiores sui partes contundendo redacta, sive jam pulverisata prostent, simplicia ac composita, sive demum pulverisata sint, præscribuntur. Dos. general. pro una vice sit \mathfrak{z} i. ad \mathfrak{z} ss. rarò \mathfrak{z} ij. rarissimè ad \mathfrak{z} j. nisi indosi quorundam speciali, v.g. rad. asari ad \mathfrak{z} j. ascendere necesse sit. Usus eorum est tam internus, quàm externus. Internus ceu potior, (de quo modo dicta ferè intelligenda) est, dum capitur in vehiculo convenienti, aut domestico, quod privatim agro Medicus denunciat, aut officinali, mistura scil. quadam tenuiori, à Medico simul præscripta.

Pulvis absorbens acidum:

R. Lap. str. præp. 3ss.

Unicorn. fossil.

Coral. rubr. pp.

C.C. nsti, ana 3ss.

Θ *absinth. 3j.*

Nuc. mosch. 3ij.

M. F. pulv. D. S.

Dämpfend Pulver auf etlich mal.

Dosis quantum largior cultri cuspis capere potest.

Pulvis absque torminibus blandissimè purgans:

R. Jalap. 3ss. ad gr. xv.

Nit. purissimi. 3ss.

Scammon. pp. gr. ij.

Ol. destill. anis. gutt. ij.

M. F. pulvis: D. S.

Laxier = Pulver auf einmal.

loco folius Nitri etiam Nitri gr. vj. &

Θ *3j. gr. jv. recipi possunt.*

Pulvis laxativus antihypochondriacus:

R. Crem. Tart.

fol. fenn. f. st. ana 3ss.

zingib.

fem. anis.

cinamom.

cubeb. à 3j.

M. f. Pulvis.

Capiatur in jusculo calido vel in principio prandii, vel hora 1. ante prandium: dos. largior cultri cuspis.

Pulvis febrilis laxativus ante Paroxysmum:

R. Coral. rubr. pp.

Θ *absinth. ana gr. xv.*

scammon. pp. gr. jv.

M. D. S.

Eröffnend Fieber-Pulver.

Pulvis contra epilepsiam infantum ex consensu abdominis:

R. Raf. unic. veri

cran. hum. violenter occisi ana gr. v.

auri fulmin. gr. j. Misc.

Detur in duplo: S.

Sonderliche Pulver.

R. 3 flor.

℞. ♀ *flor. pæon.* ʒiʒ.
cinam. spirit. ʒj.
fyr. fl. tunic. ʒiʒ. M. D. S.
Wässerlein zum Pulver.

Pulvis contra variolas & morbillos, præsertim in incremento:

℞. C. C. f. Δ. ʒij.
Unicorn. fossil. ʒj.
Card. bened. gr. xv.
myrrhæ el. gr. xii.
 M. divid. in ʒ. p. xq. D. S.

Außtreibend Pulver.

Siccis hujusmodi, interdum & consistentiæ vel fluidæ, ut Ol. Destill. vel mediæ, ut theriaca, extracta, in dosi tamen exigua, sine infracta, addisolent: verb. gr.

Pulvis Puerilis, in Torminibus cum alvi fluxu:

℞. C. C. *ust. præp.* ʒij.
Unic. fossil. ʒj.
terre sigill. ʒʒ.
Theriæ. gr. jv.
Extr. castor. gr. iij.
℞o destillat. macis gutt. ij.
 M. f. Pulvis: D. S.

Anhaltend Ruhe-Pulver.

§. 2. Subtilissimè tritus pulv. alcool aliàs dicitur: grossior verò ex aromatibus & analogis subjectis, non adeò exactè tritis, cum saccharo mistis, Tragea vocatur. Hujus secundum Praxin olim usitatam cochlear semis vel integrum, aut ita in formâ siccâ, aut pani Vino malvatico imprægnato, inspersæ, masticando successivè assûmebatur, præsertim à pastu, pro corrigenda digestionè primâ, inflatione ventriculi, flatibus hinc crebrioribus, & in genere quibusvis malis chronicis, in quibus ventriculus frigidus & hepar calidum passim incusari solent, & exinde alias quoque peptici dicuntur: exempla vid. in Horstio *Observ. l. 4. Obs. 38. p. 210. it. lib. 5. Obs. 3. p. 266. & Obs. 4. p. 268. it. Sennerto Instit. l. 5. p. 3. f. 3. c. 14. p. 1415. 1417. & l. 3. Prax. p. 1. f. 1. c. 5. p. 24.* Sed comptior hodierna praxis pro puerorum potius delectamentis, præsertim dum confectiões saccharatæ subinde permiscuntur, talia destinat. Loco eorum enim, ex quibus necesse est, ut sub digestionè prius ventriculus medicinam præparet, potius spiritus aut Θ ia vol. aromatica seu oleosa in usu sunt; sive quovis in pastu, sive brevi post eum absolutum, assûmantur: in quem finem aptissima eorum videtur præparatio, si aromata selecta, præsertim simul carminantia, cum f. q. Θ * & *Calc. vivæ* mista, hinc ♀ communi humectata, mediocri Δ rigore per retort. destillentur, acquiritur sic spiritus seu Θ volatile Oleos. in forma humida, quod dosi gutt. 20. vel 30. ab istis trageis sperata auxilia, multum si non

superabit, certè aquè præstabit. Quod si tragea quædam delicata, variis condimenti loco inspergenda aut addenda, desideretur, præscribatur talis perquam grata:

℞. *Cinnam.* part. iij.
cardam. part. ij.
Caryophyl. part. j.
sacchari qu. pl.

Misc. pro pulvere, asservetur usui.

§. 3. Externum quod attinet pulverum usum, varius equidem & multiplex est, pro partis affectæ, & usus differentiis, ast præscribendi modus ubique est idem.

Pulvis ad Intertriginem, & similes externas excoriationes:

℞. C. C. *ust. præp.* ʒij.
Cretæ albæ ʒiʒ.
ceruss. ʒʒ.
pulv. ros. rubr. exsicc. q. f. pro gratia coloris.

M. f. Pulvis: D. S.

Einsireu-Pulver.

Nodulo raro includitur, & ita inspergitur.

Pulvis ad ulcera Inveterata:

℞. *Croci & ex Vitriolo præcip.* ʒiij.
Lact. Lunæ ʒiʒ.
Terr. sigill. ʒj.
myrrhæ.
aloës.
macis ana ʒj.
camphor. ʒʒ.

M. f. Pulvis: D. S.

Eusserlich reinigend Pulver.

Conf. Major *Diff. de Lactæ Lunæ c. XI.*

§. 2. & 6.

Pertinet huc etiam pulv. *erysipelatodes* Mynsichti: *Armament. sect. 5. p. 436.*

Pro oculorum usibus pariter pulveres externi adhibentur, sed subtilissimi, & speciatim Arabico nomine *Sief* appellantur, & modestè oculis insufflantur:

Ad oculum Ungue laborantem:

℞. *off. sep. pulv.* ʒj.
sacch. cand. ʒj.
Vitrioli alb. ʒʒ.
Tutæ pp. ʒʒ.

M. f. pulv. subtilissimus: D. S.

Augen-Pulver.

Vid. Poterius, felix Practicus, *Cent. 2. cap. 8. p. 16.* ex quo suppresso Autoris nomine abstulit Riverius *Prax. l. 2. c. 18. p. 184.* Pulvis sternutatorius, ad imitat. Helmont.

℞. *Rad. helleb. nigr. non præpar.*
sacch. albiss. ana ʒj.
Ol. Destill. majoran.

anisi ana gutt. ij.

M. D. S. **Niese-Pulver.**

Vel ad hodiernum morem:

℞. *pulv. tabac. Indic. Virgin.* ʒʒ.
majoran. ʒij.

Ol. Destill. lavendul.

anisi ana gutt. vj.

ambrae. gr. v.

mosch. gr. x.

M. F. pulv. D. S.

Haupt-und Nies-Pulver.

Pulvis dentifricus ad Mobilitatem, Putredinem, cruentationem, gingivarum.

Rx. fl. rubr. matv. arbor. ʒß.

C. C. ust. ʒij.

O usti.

nuc. mosch. ana ʒi.

M. F. pulvis subtil. D. S.

Zahn-Pulver.

Quo post oris collutionem, & dentium purificationem, bene fricentur gingivæ.

Pulvis pro suffimigio.

Rx. Sandarach. f. gumm. junip. ʒvj.

Succini ʒß.

Syrac. calamit. ʒij.

thuris.

maslich.

benzoës ana ʒij.

M. F. pulv. grossus: D. S.

Reucher-Pulver.

§. 4. Pulveres si excipiantur Conserva, & cum fluido quodam, maximam partem syrupo, pro meliori miscela subigantur, pro una dosi, internè saltem usurpanda, dant

Bolos:

qui cum ita simpliciter saltem deglutiendi sint, & quantitate, quantum fieri potest, exigua, ʒß. ad ʒi. rarò ad ʒij. gratia verò majori præscribendi.

Bolus Emeticus.

Rx. Conf. fl. tunic. ʒj. ad ʒß.

Sulph. ʒij. c. lixiv. detonat. ʒi

& ʒ per decoct. par. gr. vj.

Crem. Tart. gr. v.

M. F. Bolus D. S.

Brech-Zucker.

Bolus Laxativus contra vermes.

Rx. Conf. fl. persic. ʒij. ad ʒj.

& dulc. gr. xv. ad ʒj.

pulv. jalap. gr. viij.

(vel scammon. præp. gr. ij.)

c. f. syr. fl. persicor. f. Bolus:

D. S.

Parier Zucker gegen die Würmer.

Bolus in Vomitu nimio.

Rx. Conserv. ros. Vitriolat. ʒj.

Terr. sigill. ʒj.

laud. opiat. gr. i. ad ij.

Ol. destill. Cinamom. gutt. j.

Cum f. q. miv. cydonior. f. l. a. Bolus, miscendo & expectando, donec aliquis turgescencia cessaverit:

D. S. Magen stärkender Zucker.

Bolus Diaphoreticus febrilis expertus, sed nonnihil ingratus.

Rx. Theriac. ʒij. ad ʒß.

specif. febril. Strobelb. ʒj.

Ol. destill. caryophyl. gutt. ij.

M. c. f. q. syr. card. bened. f. l. a. Bolus.

D. S.

Fieber-Patwerge.

Nempe usitatissimè istis modis præscribuntur boli, loco tamen Conservæ etiam Pulpæ quadam spissiores, ut tamarind. it. Electuar. gratiora, ut rosarum, quin & Theriaca, ut in postremo exemplo, sed hæc rariùs, solent recipi. Dum enim vulgus inter cuporista sua rob sambuci vel juniperi cum C. C. f. Δc aut usto, pro scopo diaphoretico, in Erysipellate & similibus malis, porrigit, quid aliud, quàm bolum ordinat? sicuti ex opposito confectiones, extracta gratiora aliavè, conjungi aptè in boli formam possunt.

Bolus alterans in æstu Ventriculi & hypochondriorum.

Rx. Pulp. tamarind. ʒij.

Tart. Vit. Tachen. gr. xv.

Bezoard. min. simpl. ʒß.

c. f. q. syr. violar. F. Bolus: D. S.

Rühl-Patwerge.

Bolus Analepticus Hypnoticus.

Rx. Conf. fl. borrag. ʒj.

Conf. alkerm. ʒß.

Laud. opiat. gr. j. ad iß.

M. F. bolus: D. S.

Stärkender Ruhe-Zucker.

quin & si copiosior paulo pulvis fuerit, Conservæ Constituentis loco solus syrupus recipi potest, q. f. pro consistentia debita.

Bolus Purgans:

Rx. Pulv. hypochondr. laxativ. supra §. 1. descr. ʒj.

scammon. pp. gr. j. ad ij.

Cum. f. q. syr. ros. solutiv. f. Mucharrof.

F. l. a. Bolus: D. S.

Purgier-Zucker.

§. 5. Quod si simili modo, sub mole tamen majori tractentur pulveres, hoc est, si formetur bolus pro pluribus dosibus, erit

Electuarium.

quod modernis subinde Conditum, veteribus verò Opiatum, audit, & hoc ab opio, vel principali vel universali eorum ingrediente. Veterum ista Opiata, aut ad eorum similitudinem confecta alia, v. g. Diascordium Fracast. Antidotus Matthioli, aut Orvietana, Theriaca cœlestis Greiffii, &c. ceu officinalia transeant. Quoad Electuaria magistralia, proportio ingredientium ad constituentia est in genere vel 8pla, vel 6pla, 4pla, &c. prout potentius vel debilius remedium, dosi majori aut minori, idque crebrius aut rariùs, capiendum volumus. Usus est tantum internus, isque alterativus, solutiva Electuaria haud ampliùs in usu, idque

ob pur.

ob purgantiū partim horridum saporem, partim ob incertitudinem doseos, & consequenter operationis; siquidem nec subigi æqualiter per totum purgantia, nec electuarii dosis tam accuratè observari potest: quin talium loco in officinis vel passularum laxativarum, vel prunorum, præsertim ad Timæi imitationem præparatorum, it. Cydoniati laxativi, Conservæ ros. vel violar. laxativæ c. mannâ Timæi, & similis compositionum usus invaluit, quæ pro una vice determinata dosi optimè assumuntur. Pertinent huc elegantis compositionis electuaria purgantia, tam cholagogum quàm hydragogum Sylvii *l. r. Prax. c. 2. §. 46. & c. 7. §. 55.* quæ facile pro dispensatione ordinaria in officinis præparari possint.

§. 6. Quoad Electuaria Alterantia ergò, sit

Electuar. Antihypochondr.

℞. *Cons. cochl.*

fumar. ana ʒij.

Ebor. f. Δ. ʒij.

Lap. Er. pp.

Coral. rubr. pp. ana ʒi.

Vitrioli ♂ Div. ad ʒij.

c. f. q. syr. borrag. F. l. a. Electuar.

D. S.

Alterativ-Patwerge.

Loco Vitrioli ♂, etiam extractum ♂ cum succo vel pomorum, vel acetosell. vel tamarindorum ad ʒij. vel ʒʒ. recipi potest.

Elect. ad fluorem album.

℞. *Cons. fl. anthos. ʒij*

Ebor. crud. ras. pulv.

magist. succin. c. S. V. ana ʒij.

lap. osteocoll. ʒʒ.

putamin. avellanar. pulv. ʒʒ

c. f. q. syr. ros. rub. f. Electuarium:

D. S.

Dämpffende Patwerge.

De his electuariis, bis l. 3. de die capitur, magnitudine castaneæ vel nuc. jugland. & amplius, aut quantum binis ternisve cultri latoris cuspidibus capi potest.

Interdum sine conservis, solo syrupo convenienti excipiuntur, aut c. rob sambuci subiguntur, & hoc in compositionibus quasi theriacalibus, loco Veterum mellis, quibus tamen aliquid fluidi pro meliori miscelâ afundendum.

Electuar. contra Nimium Mensium fluxum.

℞. *Coral. r. præp.*

hematit. præp.

Boli Arm. præp.

Unic. veri præp. ana ʒʒ.

sem. plantag. ʒij.

Alum. crudi ʒij.

Tom. II, Pars 2.

laud. opiat. gr. v.

c. syr. plantag. f. Electuarium:

D. S.

Anhaltende Patwerge.

Hiscæ ceu ordinariis Elect. ingredientibus, interdum etiam rad. conditæ, confectiones, extracta, succi inspiss. it. spiritus, &c. pro circumstantiarum ratione & respectu bascos, item constituentis, infractâ, proportionatâ tamen, dosi commiscantur.

Electuar. stomachale.

℞. *Conserv. menth. crisp. ʒij.*

anthos.

meliss. ana ʒi.

rad. zingib. in Ind. condit.

pulv. Zedoar. ana ʒʒ.

cinamom.

caryophyll. ana ʒi.

Theriac. Andr. ʒij.

c. f. q. syr. month. F. Electuarium:

D. S.

Erwärmende Magen-Patwerge.

Electuar. pro senibus ab Apoplex. metuentibus.

℞. *Cons. fl. anthos.*

menth. ana ʒi.

fl. tunic. ʒij.

zingib. in Ind. condit. ʒʒ.

sem. sinapi.

eruce ana ʒij.

Coral. rubr. pp.

succini. pp. ana ʒi.

cardamom. ʒij.

cinamom.

caryophyll. ana ʒi.

⊖ vol. succin. ʒi.

c. f. q. spiritus ceras. nigr. f. Electuarium:

D. S.

Haupt-Stärkende Patwerge.

B. D. Michaelis aliquando seni cuidam non sine iudicio pro analepsi præscripsit.

℞. *Cons. anthos.*

salv.

tunic. ana ʒʒ.

Cons. alkerm. ʒʒ.

ambra gr. v.

mosch. gr. iij.

laud. opiat. gr. iʒ. ad iij.

c. f. q. syr. fl. tunic. f. Electuarium,

Irroretur ∇ cinamom. spirituof.

D. S.

Stärkende Mistur-

Electuarium contra Dyfenteriam.

℞. *Conserv. ros. rubr. ʒij.*

Diascord. Frac. ʒvj.

Tinctura f. Ess. Cinamom. c. S. V.

ʒij. ʒij.

ras. priapi Ceti subtiliss. pulv. ʒʒ.

troch. de carab. ʒij.

Coral. rubr. pp.

[LIII 2]

Off.

Off. sepia pulv. ana ʒi.
Extr. tormentill. rit. parat. ʒiʒ.
c. f. q. succi cydonior. vel mivæ cydoni-
or. aromatic. F. Electuar.
 D. S.

Anhaltende und Schmerzstillende Latwerge.

De quo creberrimè pro lubitu æger capiat.

In Hæmorrhagia narium habituali, junio-
 rum, ex hypochondriis, &c.

R. Pulv. passul. min. vel Conf. ros.
Rhabarb. el. (rubr. ʒiij.)
coral. r. præp. ana ʒiʒ.
Ebor. sine igne ʒi.
Dent. equi mar. ʒʒ.
Extr. Oiscum succo ʒiʒ. ad ʒiij.

Cum f. q. syr. rosar. rubr. misc. & fiat
 Electuarium:

D. S. Stillende Latwerge.

§. 7. Quod si pulveres loco constituentis
 consistentiæ mediæ excipiantur saccharo, in
 liquore conveniente soluto & denuò inspissä-
 to, & in planum per vasculum ad instar in-
 fundibuli cum parvo quasi pistillo in medio
 projecto, emergunt

Rotule.

seu, ut aliis audiunt, Orbiculi, it. tessellæ, ta-
 li ferè proportionem, ut pulverum sit p. j. sacch.
 excipient. p. i i i. iv. ad v i. prout potentio-
 res aut mitiores effectu medico easdem ex-
 petimus: quibus jam confectis subinde una
 alteravé Olei cujusdam destillati aut suavio-
 ris essentia aromaticæ gutt. inspergi possunt.
 Usus tantum est internus, isque alterativus,
 solutivus ferè in defuetudinem abiit: quin
 usitatissimè in faucium à lymphâ acriori qua-
 cunque occasione læsarum affectibus præscribi
 solent, ut demulceant istas, dum in ore de-
 tentæ successivè liquefunt. Quod si præte-
 reà in aliis usibus ordinentur, crebrius masti-
 candæ & deglutientiæ veniunt. v. g.

Rotulæ contra tussim siccam nocturnam,
 faucium asperitatem, conceptam earum
 Phlogosin, &c.

R. Spec. diaireos usit. ʒiij.
boli armen. pp. ʒi.
Succ. glyzyrrh. Hisp. ʒʒ.
c. f. q. sacchari, vel hujus ʒiij. ad ʒiv. in
▽ papav. rhæad. solut. F. Rotulæ.
 D. S. **Hust-Rüchlein.**

Conf. hic Rotul. Sylvii l. I. *Prax. c. 20.*

§. 37.

Rotulæ contra inflationem ventriculi,
 ructus, it. Colicam, &c.

R. Ebor. usit præp.
Coral. rubr. pp. ana ʒʒ.
Spec. diatr. pipereon ʒi.
Extr. Zedoar.
cortic. aurant. ana ʒʒ.
c. f. q. sacchari in ▽ fænic. solut. f. Ro-

tule, aspergenda in fine Ol. destill. fæni-
culi, macis, ana gutt. iv.

D. S. Bertheilende Rüchlein.

Rotulæ bibitoria quibusdam dictæ.

R. Sem. coriandr. ʒʒ.

fænicul.

carvi.

petrosel. ana ʒij.

nucmosc. ʒiv.

macis.

zingib.

cardamomi.

cubebæ.

caryophyll. à ʒij.

piper. alb.

longi à ʒʒ.

c. f. q. sacchar. in ▽ carminativ. Dorn-
crell. soluti F. Rotul. S.

Magen-Rüchlein.

Rotulæ confortantes:

R. Spec. diamb.

diamosch. d. ana ʒiʒ.

c. f. q. sacchari ad ʒiij. in ▽ ros. solut. F.
 Rotulæ. *sub finem mixtionis addendo con-*
fect. alkerm. ʒʒ. vel quantum potest irro-
retur Ol. destill. cinamom.

D. S. Stärkende Rüchlein.

Nempe interdum præter pulveres, & extra-
 ctà graviora, confect. Ol. destillata & similia,
 proportionatâ dosi recipi possunt: sic ex solis
 Oleis cum saccharo, loco Eleosaccharorum,
 quibusdam usitatorum, rotulas carminativas
 præparat Mynsicht. *Armam. f. 7. p. 163.*

Quod si denique delicatis admodum, vel
 pro Pueris, orbiculi purgantes præscribendi
 sint, hi methodo vel Sylvii *Prax. l. I. c. 2.*
§. 44. vel Timæi Cas. p. 427. præscribi pote-
 runt.

§. 8. Quod si præter Pulveres & alia,
 ad Electuaria recipi solita, dosi, quàm in his,
 minore, simili modo saccharo inspissäto exci-
 piantur, & in formam oblongam quadra-
 tam, planam, (in quem finem jam certi mo-
 duli lignei aliivè fabricati sunt) redigantur,
 communiter

Morsuli:

quia mordendo quasi assumuntur, it. ob in-
 gredientium identitatem Electuaria solida,
 aut Confectio solida, it. à figura Tabellæ,
 appellantur. De cætero ut Boli cognati sunt
 Electuariis, ita Rotulæ Morsulis, & contrà;
 item ut Boli se habent ad Rotulas, ita Ele-
 ctuaria ad Morsulos, & contrà. Res in fun-
 damento quasi eadem. In horum adeoque
 Morsulorum præscriptione proportio obser-
 vanda ea, ut pulv. p. i. ana vel duplum reli-
 quorum, conserv. condit. confect. respon-
 deant simul, ad 5 plum, 6 plum, imò 8 plum
 sacchari. Pro usu saltem interno, eoque alte-
 rativo, & potissimum confortatiyo, rarissi-
 mè

mè aut nunquam hodiè solutivo, obrationes suprà §. 5. allegatas.

Morsuli contra sódam:

R. *Spec. diacret. Myns.* ʒvj.
vel loc. harum:

R. *Cretæ* ʒij.

ebor. usti præp. ʒi.

lap. str. pp.

Unicorn. fossil.

coral. rubr. pp. ana ʒij.

nuc. mosch. ʒi.

Cumf. q. sacchari, h. e. ʒiv. vel ʒvj. in
▽ *portulacæ solut.* F. Morsuli.

D. S. **Dämpfende und kühlende
Morsellen.**

Quoad hos diacretæ Morsulos: annoto, quod pulv. ex latere cocto intensius rubescen- te, c. f. q. sacchari in morsulos redactus præ- stantissimum sódæ sit remedium: possit & nu- cis moschata aut macis aliquantulum addi. Vis hæc consistit in substantia Martiali, unde color, (etiam ꝓando ab illo separabilis) in crocum potenter absorbentem per calcina- tionem ignis mutatâ.

Morsuli Stomachales:

R. *Conf. anthos, vel menthæ* ʒß.

zingib. in Ind. cond. ʒij.

Spec. Imperat. ʒiij.

Extr. zedoar. ʒß.

Cum sacch. ʒviii.

in ▽ *fœnic. solut.* f. l. a. Morsuli.

D. S. **Magen-Morsellen.**

Morsuli Præservativi in Malignis.

R. *Conf. pulpæ citri* ʒj.

Theriac. ʒiij.

C. C. f. Δc

ʒiidiaphor.

ʒæ sigill. à ʒij.

Cum f. q. sacchari.

in ▽ *scord. sol.* F. Morsuli.

Irrorentur tempore usus aliquot guttis olei destillati Henif. & usurpentur.

§. 9. Cæterum hæ & similes formulæ sub hodiernâ Praxi multis suspectæ sunt me- dentum, quia hostiles manifestò pluribus ægrorum, idque ob sacchari abundantiam paucissimis nostrorum ægrorum aliquid hy- pochondriaci ut plurimum patientium, cu- iuscunque fuerint sexus, aut ætatis, tolera- bilem, quin fermentando & acescendo, mu- caginisque tenacioris forma adhærendo, quibusvis in chronicis morbis symptomata aut exacerbare, aut magis complicare, aut mor- bum ipsum procrastinare solent. Crebrior adeoque sacch. usus ut non convenit Ventri- culo, Autore Helmontio *Dispens. Mod.* §. 30. & 57. ita ceu perquam noxium pul- moni notatur à Garenzier *de Tab. Anglin.* p. 98. & 95. adeoque à crebriori ejus usu & præscriptione in Climate, ægrisque nostris,

meritò abstinendum. Accedit & hoc, quod hæ remediorum formulæ, sub tenebris igno- ratæ Pyrotechniæ natæ, blandimento potius palati ægrorum, aut aliquali remedii varie- tate, quàm efficacis medicinæ intentione, ordinatæ primitus videantur: quin potius concinniores pulveres, essentiæ, extracta- vè, spiritus, & iaque vol. tam minori ægri ventriculi labore ac tædio, majori verò cum euphoriâ, pro Praxi elegantiori adhibean- tur.

CLASSIS II.

Pilulas exhibet.

§. 1. A parvæ pilæ similitudine, aliàs Catapotia ab assumendi modo dictas. Vete- rum inventum, quo amarissima sua purgan- tia, ut aloën (apud illos quarumvis pilula- rum basin) scammonium & colocynthidem propinando, eaque cruda, mellis ope pallia- ta, palatum melius fallerent. Massam ita concinnatam ad ʒi. ferè præscribebant, cam- que in majores aliquot gr. v. vel vi. vel vii. re- ductam, quales apud Belgas ferè adhuc in usu sunt, deglutienda offerebant. Concinnior hodierna praxis sub frequenti Pilularum usu ʒi. in præscriptione totius molis vix excedit, adeò ut vix gr. i. attingant singulæ Pilulæ, siquidem quo minores, eò gratiores. Nisi ingredientia, sub parva mole ponderosiora, ut ʒialia majorem dosin admittant. Usus nobis est tam alterativus, quàm laxativus, & hujus quidem respectu Pilulæ vel extraordi- nariæ vel ordinariæ f. usuales dicuntur. Pur- gantes extraordinariæ vel 1. ex officinalibus Veterum cum recentiorum massis additis consuetis stimulis scammonii & troch. alhan- dal, interdum & aliis appropriatis, median- te liquido, v. eo spirituofo, Oleoso, &c. præparandæ ordinantur: vel 2. ex Extractis purgantibus, additis iisdem, præscribuntur. Idque pro una vel pluribus dosibus; ibi nu- mero indefinito, hic verò pro dividendis do- sibus, bene determinato. Capiantur manè, quacunque ratione fieri potest, jejuno ven- triculo, vel post haustum iusculum tenue.

Pilulæ Purg. Catholicæ:

R. *MP. de hier. c. agar.*

ammoniac. Qu. ana ʒß.

scammon. pp. gr. ij.

troch. alh. gr. i.

c. f. q. Ol. destill. macis. F. Pilulæ.

D. S. **Purgier-Pillen auf einmal.**

Pilul. Emetico-Catharticæ antè Paro- xysmum intermittentium.

R. *MP. de ʒb. Ruff.* gr. xv.

Tart. Emetic. gr. j.

scammon. pp. gr. j.

c. f. q. Ess. cent. min. F. Pilulæ: D. S.

Eröffnende Zieber-Pillen.

[LIII 3]

Pilulæ

Pilulæ ad Luem Veneream.

℞. *Extr. panchym. Croll.* gr. xij. ad xv.

℥ *dulc.* ℥j.

troch. alb. gr. ij.

c. f. q. *Ess. lignor.* F. Pilulæ.

Pilulæ Anti-hypochondriacæ.

℞. *MP. Tart. Querc.* ℥ij.

Vitrioli & ad albed. lenit. calc. gr. v.

scammon. pp. gr. j.

c. f. q. *Ess. gumm. ammon.* F. Pilulæ.

Capiantur bibendo desuper largum haustum calidum.

Pilulæ Hydropicæ:

℞. *Extr. Elater. rit. parat.* gr. xv.

Mercur. vitæ gr. ij. ad iij.

vel hujus loco

℥ *dulc. cum* ℥io *Vit. ad imit. Hartmann.* ℥ss.

Extract. troch. alband. gr. j.

cum f. q. *Ess. absinth.* F. Pilulæ.

Interdum soli pulveres, vel assumtu ingratiore, vel periculosiores, debito corpore excepti, in Pilulas compingipossunt: v. g.

Pilulæ contra gonorrhœam inveterat. malignam, scabiem ferinam, guttam rosac. contumac. &c.

℞. *Thurbith. minerale Croll.* gr. v. ad vj.

c. f. q. *theriac.* F. Pilulæ.

Sed vix præscribendæ, nisi robustioribus.

Pilulæ in desperatâ alvi obstructione:

℞. ☉ *fulmin. c. spiritu* ☉ * *pp.* gr. vi. ad ℥ss.

c. f. q. *extr. helleb. nigr.* F. Pilul.

D. S. *Eröffnende Pillen.*

§. 2. Atque tales sunt pilulæ, quas pro scopo sensilius commovendi corpus, & repetitis evacuandi vicibus, subinde sub morborum cursu præscribere cogitur Medicus. Cogitur dico; cum speciosus purgationis titulus ingentem tegat imposturam, cum quævis, præsertim fortior purgatio, tantum noceat, quantum proffit. Cum verò in plurimis morbis chronicis, generali Cachexiæ & affect. hypochondr. & scorbuti titulo comprehensis, copiosior talis evacuatio ferè nociva manifestò esse soleat, cum talia subjecta à leniori etiam evacuante facillè exolvantur, ut loquuntur Practici: ob id, ut saltem primæ viæ quasi per epicrasin à muco vel pituita plus minus viscidâ ac acida liberentur, & ita producta morbosâ, si non æquè semper radix morbi (h. e. à posteriori, si non à priori) removeantur, lenioribus, seu quorum vis primas vias non transcendit, ex evacuantibus, nunc solis, nunc appropriatis vel absorbentibus, præsertim ðialibus, vel incidentibus, præsertim gummatibus, sociatis, præscribuntur pilulæ, vel quavis septimanâ, vel quovis interlunio semel, idque vesperi, unâ alterâve horâ ante cœnam, unde & Pilulæ ante cibum quibusdam audiunt, assumendæ, ut ita sub

chyli vehiculo innoxie distribui, & circa primas vias saltem suo officio fungi queant. Cum verò aloës parte sui gummosâ in exili licet dosi, leniendi tamen huic scopo, dicto modo usurpata optimè interserviat, hinc crebrius ex hac solâ, ita tamen præparata, ut pars ejus gummosâ magis quasi extravertatur, resinosa vero infringatur, vel separetur, tales pilulæ usuales parari solent: quales sunt v. g. Angelicæ Francofurt. Glaslianæ, vid. Hoffmannus *Clav. Schræder. l. 2. c. 73. p. 105. & l. 4. f. 4. p. 635.* it. Ludovicianæ in Pharmacia *p. 179.* it. de ☉ *p. 79.* Tilemanianæ *Mater Med. p. 214.* it. majoris apparatus istæ de aloë violata, de aloë rosata, de quibus Schræderus *Pharmac. c. 4. cl. 3. p. 253.* ut nihil dicam de aliis huc suo modo revocandis, ut de ammon. it. Tartar. Querc. aloë phangin. c. scammon. de tribus Rusti, & ex his constructis Pilul. Balsamicis Cnœffeli, *Misc. A. N. C. anno 6. & 7. App. p. 19.* Verum hæc omnes, siue ex aloë solâ, siue ex aliis magistrali compositione natis, consistent, ferè ceu officinales vel pluribus in locis introducuntur, vel à Medico privatim dispensantur, adeoque ad magistraliter præscribendas minus pertinent: v. g.

℞. *MP. de aloë rosat.* gr. vi.

F. *Pilul. minim.*

D. S. *Eröffnende Pillen.*

Quod si v. paulo efficaciores, tam pro alterandi quàm pro abstergendi scopo pilulæ usuales ordinandæ, quales ferè omni menstruo spatio sub ultima Cæ quadra in hodiernâ luxuriosâ diatâ dicto modo ante Cœnam capiendæ, hisce ferè modis præscribi solent:

℞. *Aloës succotr. luc.* ℥ss.

g. * *ci c. & osyll. emoll.* ℥ij.

☉ *Blati* ℥ss.

C. f. q. *Ess. & F. Pilul. minores aut saltem mediocres, quarum no. IX. XI. ad XIIII. numero scil. ex vulgi superstitione, impari, capiantur.*

Vel sine aloës ex solis alterantibus cum stimulo sensiliore ad imitationem Præcos Sylvianæ præscribuntur:

℞. *Galban. c. & depur.* ℥ss.

troch. alband. gr. iv.

scammon pp. gr. iiii.

c. f. q. *Ol. Destill. carvi. F. Pilule no. XLV.*

pro 3. dos. vespertinis.

℞. *Gumm. ammon. c. & dep.* ℥j.

Vitrioli & ad albed. calcin. gr. v.

troch. alb. gr. ss.

scammon. pp. gr. i.

C. f. q. *Ol. destill. fœnicul. F. Pilule minores, pro una dosi quovis mense capiendæ.*

Vel

Vel ad imitationem Cnoscelianarum supra allegatarum:

℞. *MP. de 3b. Ruffi.*

Extr. belleb. nigr. ana. ℥ss.

Vitrioli ♂ ad albed. calcin. gr. v.

seammon. præp. gr. j.

c. f. q. Ess. gummi. ammon. F. Pilule.

Atque tales hypochondriacis nostratibus ferè proficiæ existunt: quibus tamen & pulvis suprâ præscriptus multum conferre solet, siccioribus nempe istis, magisque exhaustis.

§. 3. Pro alterandi denique scopo pilulæ præscribi ferè solent ex extractis, it. ex pulveribus solis, syrupo vel alio corpore in consistentiam debitam redactis, vel ex utrisque simul, pro varia intentione: e.g.

Pilulæ febriles in chronicis pro infringendo æstu.

℞. *Extr. gentian.*

imperator.

cent. min.

absinth. ana gr. v.

c. f. q. Ol. destill. caryophyll. f. Pilule
capiendæ ante paroxysmum.

Commodè etiam hisce febrilibus Extr. troch. alhand. gr. ij. ad iij. tam pro alterandi, quàm laxandi scopo, addi possunt, utut sub debita diaphoresi levior laxatio accidere soleat.

Pilulæ sudorif. anodynæ.

℞. *Extr. card. bened. ℥j.*

lignor. gr. v.

theriacal.

laud. opiat. ana gr. ij.

c. Ess. lignor. F. Pilule.

D. S.

Schweiß-Pillen.

In Phthisi confirmatâ pro tussi, sudore, &c. nocturnis inhibendis:

℞. *Antihæ. Poter. ℥j.*

facch. hni ℥ss.

extr. Croci gr. v.

laud. opiat. ferm. gr. ij. ad iij.

c. f. q. bals. copayv. F. Pilul. pro 2.
dosibus bihorio ante cœnam sumendis.

In Tussi ferina nocturnâ ex lymphâ acriori:

℞. *Extr. Sulph. pulv. gr. xvii.*

myrrhæ gr. iv.

Extr. crocigr. ij.

laud. op. gr. j.

c. f. q. papav. rhæad. syrapi. f. Pilule.
vesperi capiendæ.

Conf. Pilul. de styrace it. ad Tussim
Schroederi *Pharmac. l. 2. c. 73. p. 252. vel*
de styrace Sylvii: l. 1. Prax. c. 20. §. 36.

§. 4. Internus hic fuit Pilularum usus; moderni enim quidam easdem etiam usu externo, loco ferè trochiscorum Veteribus usitatorum, adhibere amant; sed rariùs hoc, nec nisi specialibus quibusdam in casibus, v.g.

in odontalgia, ex extr. ligni quajaci & laud. opiato c. Ol. destill. origani Cretici formantur pilulæ, denti dolenti l. cavo applicandæ: quo etiam pertinent Pilulæ de Calce viva, it. odoriferæ Myns. *Armament. f. 7. p. 145.* Sic apophlegmatizantes ex Extracto nicotianæ c. pauco & dulci, c. syr. nicotianæ; it. ex & dulci c. f. q. gummi tragac. & rosarum solutæ, pro juvante salivatione sub ptyalismo &c. &c.

CLASSIS III.

Misturas Varias depromit.

§. 1. Tertia Classis Misturas varias sub se complectitur, ex liquidis primariò & fluidis, secundariò etiam minus fluidis & aridis quoque omnibus multifariis concinnatas, & artificiosè compositas, usui tam interno quàm externo inservientes. Internè quæ usurpantur, ordinariò ab assumendi modo Potiones appellantur; externæ v. potissimum Epithemata audiunt. Internè latissimè patet earum usus, cum quovis fere in morbo adhiberi pro quovis scopo possint, nisi interdum atonia Ventriculi ac intestinorum moderatum earum usum suadeat. Usurpantur vel determinatis vicibus, **auff 2. oder 3. mal/** interjectis semper debitis intervallis, vel indeterminatè, pro lubitu cochlearia aliquot capiendo: illud ubi subitanea magis alteratio per sensiliorem operationem procuranda, viribus utcunque constantibus; hoc vero, ubi successiva mutatio, præsertim in debilioribus, aut in casibus, in quibus cautius nonnihil procedendum, magis locum invenit. Duo in Mistura autem distingenda 1. ipsa ingredientia multiplicia; 2. constituens fluidum, qualecunque fuerit. Proportio horum observatur p. p. talis, ratione sc. doscos generalis, quæ tamen per specialem cujusvis ingredientis dosin ratione facultatis specifica, hujusque sub præparatione magis vel minus concentratæ, determinanda ulterius venit. Compositio potionis ordinariæ $\frac{3}{4}$ iv. ad v. vel $\frac{3}{4}$ vj. ad summum, vix excedere solet: cui si arida & facilè subsidentia simul permisceantur, sub usu probè agitanda imperantur.

∇ simpl. destill. $\frac{3}{4}$ j.

spirituos. $\frac{3}{4}$ j. ad $\frac{3}{4}$ ij.

succi $\frac{3}{4}$ j.

Elixyr. $\frac{3}{4}$ j.

Vol. inflam. $\frac{3}{4}$ j. ad $\frac{3}{4}$ ij.

Urinosi $\frac{3}{4}$ ss.

acidi gutt. iv. ad v.

syrup. $\frac{3}{4}$ j. ad $\frac{3}{4}$ ij. vel iij.

Extract. $\frac{3}{4}$ j. ad $\frac{3}{4}$ ss.

pulv. $\frac{3}{4}$ j.

Essent. $\frac{3}{4}$ ss. ad $\frac{3}{4}$ j.

Tincturæ $\frac{3}{4}$ ss. ad $\frac{3}{4}$ j.

*Θ vol. $\frac{3}{4}$ ss. ad gr. xii.**

Ol. destill. gutt. ij. &c.

Potio

Potio Antipleuritica.

℞. ▽ *card. bened.*

papav. rhæad. ana ʒiʒ.

~ *V. bene camphor.* ʒiʒ.

mandib. luc. pisc.

dent. apri pp. ana ʒʒ.

⊖ *vol. cujus vis v. g. mand. lucii pisc.*
gr. xv.

Laud. opiat. gr. jʒ. ad ij.

syr. papav. rhæad. ʒvi. ad ʒj.

M. F. l. a. Potio. D. S.

Vertheilend Träncklein auf etliche mal.
Capiatur pro lubitu cochleatim, semper bene agitando.

Potio Antidysenterica:

℞. ▽ *scordii.*

plantag. ana ʒj.

Cinamom.

* *Vini* ana ʒʒ.

El. diascord. Frac. ʒij.

Extr. tormentill. ʒʒ.

Coral. rubr. pp. gr. xv.

syr. cydon. aromat. ʒij.

M. F. l. a. Potio. D. S.

Anhaltende Stärck-Mistur.

Capiatur cochleatim crebrius, bene agitando.

Potio febrifuga intermitt.

℞. ▽ *card. bened.* ʒj. ad ʒiʒ.

Cinamom. ʒj. ad ʒiʒ.

Extr. gentian. ʒij.

~ ⊖ * *simpl.* ʒʒ.

syr. card. bened. ʒiʒ. ad iij.

M. f. Potio. D. S.

Träncklein auf einmal.

Bihorio ante Paroxysmum, moderatè tegendo corpus: urgentem magis frigore, ut in quartanis, extracti dosis augeri, it. c. extracto theriacali acui potest, magis v. torrente aestu, ut intertitanis ordinariis, spiritus ⊖ * ci aucta dosi permisceatur.

Mistura alterans, in incremento & statu febrium continuarum, plus minus malignarum:

℞. ▽ *scordii* ʒiij.

~ *theriacal.* vel *simpl.* vel moderatè *camph.* ʒiij.

C. C. f. Δ. ʒij.

Bezoard. min. ʒj.

⊖ *vol. C. C. vel viperar.* gr. xv.

Conf. alkerm. ʒiʒ.

M. f. Potio capienda cochleatim. D. S.

Stärck-Träncklein.

Prout autem specialis dosis ingredientium subinde attendenda venit, etiam potionis particularis formula subinde variat.

Potio Emetica.

℞. *Julap. rosac.*

syr. emetic. Salæ ana ʒʒ.

▽ *Cinamom.* ʒj. M. D. S.

Brech-Träncklein.

Loco talium tamen Vina infusionis paratorum & alium aequè commoda videntur.

Potio Cathartica:

℞. *Resin. jalap.* gr. ix. ad ʒʒ.

⊖ *Tartarigr.* v. ad vj.

syr. ros. solutiv. ʒʒ. vel q. f. M. S.

Paxier-Säfflein.

℞. *Resin. scammon.* ʒʒ.

sacch. cand. ʒj.

Pulveris. exactè paulatim affunden-
do succi citri ʒj.

M. F. Potio: S.

Purgier-Säfflein.

Potio diuretica:

℞. ▽ *alkekengi.*

petroselin. ana ʒiʒ.

Malvatic. juniper. ʒvj.

Spiritus lumbric. Terrest. per putr.
ʒi. ad ʒiʒ.

Ol. destill. terebint. gutt. iij.

syr. heder. Terrest. ʒiij. ad vj.

M. D. S.

Eröffnender Trank.

Mistura Therical. sudorifera:

℞. ▽ *fl. sambuc.* ʒj.

* *sambuc.* ʒij.

Theriac. ʒj.

raf. Unicorn. ver. gr. xv.

Bezoard. min. ʒʒ.

camphor. gr. iij.

M. f. Potio pro dosi una.

Pro temperandâ acrimoniâ bilis, h. c. corrigendo acido volatili plus minus Oleoso in sanguine:

℞. ▽ *portulacæ.*

acetosæ.

fl. papav. rhæad. ana ʒj.

Diascord. Frac. ʒiʒ.

Spiritus Qi dulc. l. ⊖ dulc. ʒʒ. ad ʒj.

syr. portulac. ʒiij. M. D. S.

Alterativ-Träncklein auf etliche mal.

Potio digestiva præmittenda purgationi in affectu hypochondr. & melanchol. in subjectis præsertim siccioris & squalidi magis habitus:

℞. *Seri lactis benè depur.* ʒiv.

Ess. fumar. ʒij.

solut. & c. f. pom. ʒj. ad ʒiʒ.

syr. fumar. simpl. ʒvj. M. D. S.

Digestiv-Trank: pro 4. vicibus, dosin unam manè, alteram vesperi per biduum capiend.

Mistura s. potio Analeptica, sub & post sudorem in febribus acutis.

℞. ▽ *borrag.*

buglosæ.

rubi idæi ana ʒj.

Cinamom. ʒiij.

succi citri. rec. ʒvj. ad ʒj.

Conf. alkerm. ʒiʒ.

M. S. **Stärck-Trank.**

Perti-

Pertinent huc inprimis misturæ Sylvii ex ✕ c. *lap. ☉, coral. pp.* &c. revera in Praxi polychrestæ; quæ videantur in ejus Praxi l. 1. c. 9. §. 20. c. 13. §. 53. & c. 7. §. 13. c. 30. §. 135. & 182. & passim alibi.

Mistura Antiscorbutica.

℞. *Lactis caprill. vel seri lactis depur.*

℥ij. adde

succi cochlear.

nasturt.

fumar. express. & depur.

ana ℥ij. M. D. S.

Scorbutische Milch / auf etliche mal.

Dosis ℥ij. ad v. Edulcorari potest saccharo pro lubitu, & melioris penetrationis ergò, cuilibet dosi Ess. fumar. compos. c. ~ cochlear. parat. gutt. 30. instillari.

Vel in formâ infusi.

℞. *H. Nasturt. aquatic. m. iv.*

acetosell. cum flor. m. ij.

Contunde in mortario c.s.q. seri lactis: stent in loco tepid. vel in MB. per noct. Colat. manè ℞. ℥ij. D. S. ut antè

Dos. ℥ij. l. iv. quælibet dosis pro lubitu edulcorari potest.

Vel in Decocti formâ.

℞. *Lactis caprill. ℥jad iß.*

fol. cochlear.

nasturtii ana m. j.

contusa & mixta parum ebulliant in olla clausa, exprimantur & colentur.

D. S. ut suprà.

In scorbuto admodum proficuum. Colat: ℥iv. ad vj. bibat æger calidè manè, & bihorio ante cænam: quod si juncta sit febris, potius serum lactis recipiatur.

§. 7. Pro usu externo non minùs variæ quoque sunt misturæ ex iisdem quidem ingredientibus pariter compositiæ, sed pro varietate partium & usus subinde variandæ, in quo post experientiam judicium Medici omne fert punctum. Si externæ saltem corporis partium superficiei, mediante lintamine vel simplici vel multiplicato, aut panno scarlatino, calidè, tepidè, frigidè, repetitis vicibus applicantur, in genere

Epithemata

vocantur, quæ subinde pro specialium quarundam partium varietate etiam specialibus insigniuntur nominibus: ut pro Fronte Frontale, pro oculis Collyria humida, pro naribus Erthina liquida, pro dentibus & gingivis Liquores dentifricii, &c. &c.

Epithema refrigerans æstum sanguinis polychrestum.

℞. *succi semperviv. major. ℥iv.*

✕ *Vini acerr. ℥j.*

Qi depur. ℥ij.

M. D. S.

Eufferlicher Umschlag.

Tom. II. Pars 2.

Applic. v. g. scroto in æstu corporis nimio, in ebrietate, it. in hæmorrhagia narium, addita præsertim camphorâ; vel mammis in hæmorrhagia uteri, item regioni pubis vel plantis pedum, vel fronti, &c. frigidè cum linteis multiplicatis.

Epithema pro ventriculo in Cholera.

℞. *S. V. camphor. ℥ij.*

Theriac. ℥iß. ad iij.

M. pro Epithemate.

In Vomitu febrium malignarum & Pestilential.

℞. *S. V. rectif. vel apoplect. ℥ij.*

Theriac. ℥iß.

camphor. ℥iß. M. D. S.

Eufferlich Wasser zum Magen.

Calefiant in Vasculo clauso, & intincta lintea, celeri manu applicantur: idque crebrius.

Epithema contra dolorem capitis in febrium æstu, seu Frontale.

℞. *succi ☉ fluviatil. rec. ℥ij.*

▽ *fl. sambuc.*

betonic.

flor. papav. rhæad. ana ℥j.

S. V. Camphor. ℥ij. M. D. S.

Umschlag zum Haupt.

Applicantur cum linteis multiplicatis tepidè fronti & temporibus: sed à nimio camphoræ usu in Agrypniis abstinendum, ne somnus magis odoris penetrantiâ impediatur.

Vel aliud contra Cephalalgiam cum Agrypnia in febribus continuis:

℞. ▽ *fl. sambuc. ℥ij.*

apoplect. usit. 3vj.

Philon. Roman. ℥iß. M. D. S.

Eufferliche Mistur zum Haupt.

Epithema in Cephalalgia ex causâ frigidâ, &c. hemicrania, verticis pertinaci dolore, &c.

℞. ▽ *serpilli*

rosmarin.

salviæ ana ℥ij.

~ *theriacal. simpl. ℥j.*

C. C. l. ☉ ✕ ci cum Calc. viva ana ℥iß.

M. S. **Stillend Wasser zum Haupt.**

Frontale contra Hæmorrhagiam narium.

℞. ▽ *papav. rhæad. vel sperm. ran. ℥iv.*

✕ *rosac. ℥j.*

Boli comm. probè exsicc. pulv. 3iv.

Opii ✕ o sol. 3j.

M. pro Epithemate.

℞. *spermat. ranar. c. ☉ & O asserv. ℥iß.*

sacch. hui ad 3ij.

Camphor. 3j. ad 3ß.

M. pro Epithemate, D. S.

Anhaltender Umschlag.

Collo, item fronti, nec non testibus, in nimia narium hæmorrhagia applicabilia, it. mammis in hæmorrhagia uteri, ac regioni pubis, Hepatis pariter regioni talia frigidè appli-

[M m m m]

cari

cari jubent; sed præter alterationem sanguinis subitanæam, forsan & nimiam, visceris læsio, experientia hoc ferè confirmante, metuenda, ne tali occasione diarrhœa quibusdam superveniat, vel in aliis dispositio p. n. hepatis scirrhusa, aliavé chronica inducatur: haud ergo, quam casu ferè extremo huc recurrendum.

Epithema contra tumorem testis inflammatorium cum insigni dolore ac ardore.

℞. ∇ Calc. viv. rec. ℥ij. ad ℥i℥.

S. V. camphor. ʒ℥. ad ʒj.

ceruss. l. sacch. ʒni ʒi℥. M. F. Epithema. Urgente dolore etiā Op. ʒo sol. ʒi. addi potest.

Non rarum est, ex perversio ʒii sublimati externo usu sub cosmetici titulo phlogosin, tumorem, dolorem, cum summo cruciatu, interdum & periculo, partibus externis induci: optimum hic epithema, lac tepidum, crebrius applicatum, post cujus usum, vel etiam sub illius defectu mox in principio

℞. ∇ Calc. viv. rec. ℥ij.

~ V. ʒj.

ceruss. ʒiij.

Mixta applicentur calidè: D. S.

Pinderender Umschlag.

Occasione ∇ æ Calc. vivæ non omittendum Epithema polychrestum ad ulcera quævis, dysēpulota, ad scabiem ferinam, herpes exedentes, imminentem plus minus gangrænam, &c.

℞. Calc. vivæ f. Decoct. rec. ℥ij.

ʒii. dulc. ʒj. Misc.

D. sine vel cum Colatura laxiore: S.

Reinigender Umschlag.

Vel magis compositum:

℞. ∇ æ Ψ æ rec. ℥i℥.

~ theriacal. camph. ʒiij.

sacch. ʒi ʒj.

ʒii dulc ʒ℥.

Misceantur probè cum vel sine ebullitione. Sic pariter ∇ destillata ex pomis putridis, cui l. ʒ dulcis, l. sacch. ʒni, pro circumstant. ratione permistum in casibus chirurgicis plurimis, speciatim ulceribus telephiis, ambustis, &c. remedium multi usus existit.

§. 3. Quod si Epithemati immediatus cum parte affectâ concedatur contractus, ut in scabie, ulceribus, &c. mixturæ pro indicationum ratione componi poterunt. Ast si pro commodo partium internarum, & principaliter viscerum, hepatis, lienis, Ventriculi, cordis &c. adhibenda veniunt, obs. i. cum aliàs penetrare seque insinuare debeant, non nisi ex subtilioribus aut similibus particulis, quæ vehementiori paulo motu operationes suas exerant, constantibus ingredientibus, non verò adstringentibus, terreis fixioribus, &c. componenda eadem esse. 2. Cum applicata pro partium internarum commodo, ferè aut sanè

ut plurimum calide, minus diu calorem ascititium conservent, quin faciliè intepescant, ne dicam refrigerentur, verendum omninò, ne cutis contactu humido tepido aut subfrigido offendatur, quod quilibet in se experiri potest, unde fibrarum strictura, pororum contractura, interdum per consensum totius quasi horripilatio, adeòque non solum insensilis transpirationis notabilis imminutio, quin & metastaseos, quam Natura in acutis subinde intendit, ex universo ad membra particularia cohibitio. Unde in malignis, cum excretionē cutanea conjunctis, Epithemata præcordiis applicanda, meritò hodie suspecta, imò rejecta sunt. Conf. quæ §. 2. de Epithemate Hepati applicando, in alio sensu locuti sumus. Missis itaque epithematis, alias mixturas externas consideremus, v. g.

Collyrium pro Oculo polychrestum.

℞. ∇ solani.

Cyani.

calcatrippæ ana ʒj.

Vitrioli alb. ʒ℥. ad gr. xij.

Solut. filtretur per chartam.

adde Tutie pp. ʒ℥. ad gr. xij.

M. D. S. **Neusserliche Augen-Mistur.**

Applicatur tepidè cum linteolis, vel resupinato corpore canthis oculi instillatur.

Collyrium contra Inflammat. Oculorum.

℞. ∇ plantag.

flor. Cyani ana ʒj.

album ovor. no. i.

Onis gr. v. ad viij. vel x.

(modo non spissior paulò ex coagulo nascatur consistentia) conquassentur & agitentur invicem, & hinc linteis duplic. applicentur oculis.

Mistura Ptarmica.

℞. ∇ majoran. ʒiij.

Vitrioli alb. gr. xv. ad ʒj.

Solut. filtretur. D. S. **Abziehend Wasserlein.** Vel guttatim in nares insufflando, ut vocant, ex volâ manus recipitur; vel linteum eo leniter madefactum, contortum, naribus imittitur.

Mistura contra Ozœnam.

℞. ∇ majoran.

plantag. ana ʒi℥.

mell. rosat. ʒvj.

~ V. rectif. ʒiij.

M. & applicentur, vel modo dictis modis, vel etiam cum parvâ syringâ, in deterioris conditionis malo aliquantulum ʒss gr. vj. ad ʒ℥. addi potest.

Mistura contra Prunellam februm acutarum.

℞. ∇ semperviv. maj. ℥i℥.

succicancr. fluxvial. rec. ʒjv.

⊗ * depur. ʒi℥.

M. D. S. **Wasser zum Munde.**

Colluitur crebrius eodem os, quin & interdum gargarisuntur fauces, aut tepidiusculè in ore aliquamdiu saltem detinetur.

Alia

Alia magis composita.

℞. ▽ *cancr. fluviat. contus. aliquamdiu destillat.* ℥iij.

sperm. ranar. ℥ij.

semper v. maj. ℥i.

Phlegm. Vitrioli rorid ℥i℥. ad ℥ij

syr. violar. ℥i.

ros. rubr. ℥℥.

Ⓢ. *c. alcali depur.* ℥i℥. ad ℥ij. M.

Ubi rejectæ denuò misturæ tales fuerint, lingua palatumque blandè illinantur butyro recenti non salito, spermate ranar. aut ejus ▽ crebrius lota: quod si crusta livido nigricans illam simul obduxerit, aliquantulum sacchari albiss. butyro addi potest: lardum pariter non salitum, quin & salitum, sed utrumque in sperniola ista probè diuque maceratum, butyri loco recipi potest.

Mistura pro dentibus & gingivis à variis affectibus præservativa.

℞. ▽ *plantag.*

fedi min. ana ℥ij.

Ⓢ. *ci*

tart. ana ℥℥. ad ℥i.

M. filtra. D. S.

Zahn-Wässerlein.

Hâc ipsâ dentes ab omni pastu abluantur, & gingivæ blandè fricentur.

Sanè Ⓢ in ▽ solut. pro dentium ab omni pastu ablutione fœtorem eorum imprimit tollit; sicuti matutina mundificatio cum Urina humana dentes & gingivas à quam plurimis malis præservat.

Misturæ contra Stomacacem seu scorbutum oris.

℞. ▽ *fedi minor.*

prunell. ana ℥i.

Spiritus Coch. ℥ij.

mell. rosat. ℥vj.

Spiritus Ⓢ *q. f. pro grato acidulo sapore.* M. D. S.

Mistur zum Scharbock des Mundes.

℞. ▽ *prunell.*

salvia ana ℥i.

mell. rosat. ℥vj.

O usti ℥℥.

Spiritus Cochlear. ℥i. M.

His ipsis humectetur linteum, & fricentur eodem gingivæ ac aliæ oris partes, ex scorbuto malè habentes.

§. 4. Superest specialis, eaque duplex, Misturarum differentia, ulteriùs consideranda, quarum prior diffusior, adeòque majori in quantitate præscribi solita pro pluribus dosibus, unde & potando crebriùs assumi solet, est

Julapium.

Arabum inventum. Potissimum v. in febribus pro compescenda clamosa siti, temperando præcordiorum æstu ac ardore, & mitiganda eorundem anxia molestia, ipsis ægris non satis

Tom. II. Pars 2.

explicabili, portiones tales ordinari solent; unde ob crebriorem usum præ aliis coloris inprimis rubelli, saporis suaviter aciduli & leniter in recessu quasi pungentis, & odoris jucundioris, gratia in iis attendi debet. De cætero quò simpliciora, eò meliora talia sunt julapia, adeò ut in eorum locum vel Aq. simpl. aut Cerevisia secundaria, cum tertia vel quarta Vini parte diluta, cum infusione cortic. aut taleolorum citri, quibus & sacchari parum pro lubitu addi potest, subinde substitui queant. Cum enim quavis in febre humorum quorumvis p. n. commotio, perturbatusque in iisdem, in specie sanguine, observetur motus intestinus, viari hi ulteriùs à Julapiis magis compositis, & ita facilè fermentantibus, sicque vim digestivam debilem eludentibus, syrupis præsertim aut saccharo copiosius imprægnatis, poterunt. Unde si corpus julepi Decoctum vel Infusum quoddam constituat, cætera addenda, & pauciora & diluta magis esse debent. Quo simplicior ex opposito fuerit, eò minùs ventriculum gravat, nec præcordia inflat, facilè transit, primas vias diluit & abstergit, aciora contenta temperat, & diureseos ac diaphorescos negotium faciliat. Præscribuntur eodem modo ac aliæ portiones, saltem quod tenuioris debeant esse consistentiæ: e. g.

Julepus in nimia siti & æstu Tertianæ cuiusvis.

℞. ▽ *fontan.* ℥iij.

Cinamom. ℥℥.

succi citri rec. ℥i℥.

Spirit. Ⓢ *parum q. f. pro grato sapore.*

D. S. **Rühl-und Stärck-Julep.**

℞. *Aqu. endiv.*

acetos.

cichor ana ℥vj.

succi cydon. ℥i℥. ad unc. iij.

Tincturæ fl. bellid. ℥iij.

Syr. violar. q. f. pro grato sapore. M.

Julepus in Causo.

℞. *Decoct. rad. scorzon.* ℥i℥.

Tinctura ros.

Violar.

bellid. à drachm. j.

Syr. ros. rubr. unc. iij.

— *Vitrioli q. f. pro grato sapore.*

M. f. Julapium. D. S.

Rühl-Julep gegen die Nise.

Julepus in febre malignâ

℞. *Decoct. C. C.* ℥i℥.

▽ *cinamom.* ℥vj.

Gelatin. C. C. rec. ℥i℥.

Succi citri.

rubi idæi.

ribium. ana unc. j.

Syr. papav. alb. vel rhæad. vel berber.

q. f. pro gratia.

M. D. S. **Stärck-Julep.**

[M m m m 2]

Julepus

Julepus in Febre scorbutica, quæ alvum simul apertam servat.

℞. *seri lact. depurat.* ℥bj.
Decoct. Tamarind. ℥ss.
succi citrirc. ʒvj. vel ʒi.
fyr. de toto citro. q. s. M.

Interdum etiam per modum Infusi magistralis præscribuntur Julapia non ingrata, v. g.

℞. *fl. papav. rhæad.*
rosar. ana M. j.

Infund. in f. q. vel ℥i℥. ∇ comm. aut Aq. flor. papav. rhæad. aut seri lact. dep. acidulatæ leniter c. spir. Sulph. per campanam, stent in loco calido, in MB. ad extract. Tincturæ.

Colat. ℞. & adde
fyr. jujubin. ʒij.
Violar. ʒi.

M. pro Julebo:

Item secundum alios ex Conservis:

℞. *Cons. flor. tunic.*
rosar.
violar. à ʒss. ad ʒj.

succi Ribium ʒvj. ad ʒij.

Affunde f. q. Aq. commun. vel Destillat. cujusvis: dissolvantur in mortario cum pistillo, clausoque vase leniter ebulliant.

Colaturæ ℥i℥. adde

Tinct. fl. bellid. q. s. prograto sapore.

§. 5. Cæterum duo monenda hic restant: 1. potius Aq. fontanâ vel decoctio quodam C. C. eadem parato, pro corpore juleporum, quàm Aquis destillatis utendum esse, cum hæ pluribus ferè nauseosæ sint, quin & crebriori usu manifestam Ventriculi atoniam inducant. 2. Acidula Julebis commiscenda, vel esse succos vegetabilium, vel spiritus mineralium. Spiritus hi texturæ sunt firmioris, minus & tardius ob id in nobis alterabiles, potentius tamen resolvunt & abstergunt, magis diuretici sunt. At nimis à constitutivis nostris aliena sunt, vix citra ventriculi laborem & primarum viarum alterationes, nisi cautè administrantur, ferri possunt, adeò temperata in Praxi semper sunt optima. Succi verò isti Vegetabilium Sulph. medicati, ac ita ab alteratione quavis præservati, & qui sponte sua, quicquid est contentorum fermentescibilium, seposuerunt, adeò ut saltem acor natus, Phlegmate sufficienti dilutus superlit, longè suavius & blandius absque mali cuiusvis suspitione ferri à nobis possunt, unde horum potius quàm illorum, sub frequentiori Julapiorum repetitione rationem habendam existimo.

§. 6. Altera specialis misturæ differentia est contraciior, & quæ pro aliquot saltem dosibus, ad unc. iv. vj. vel ad summum unc. viij. præscribi solet, & à colore albo opaco, sapore subdulci aut saltem insipido dulci, substantia

ingredientium pingui & Oleosa, & usu temperandi, potissimum acrimoniam Θsam, Lacti similis cum sit,

Emulsio

dicitur. Scil. semina & nuclei, pulpa candida ac Oleosa turgida, mediante tritu subiguntur cum ∇ appropriatis; illorum drachm. j. pro harum unc. j. edulcoratur mistura pauco saccharo, & ita administratur usu & interno & externo: illo ad Potiones; hoc ad Epithemata refertur: v. g.

Emulsio Analeptica & Hypnotica.

℞. *amygd. d. ambros. drachm. ij.*

sem. papav. alb. unc. ss.

melon. drachm. j.

c. Aq. fl. sambuc. fl. acac. & nymph. ana unc. ij. F. Emulsio: edulcoretur parum rotulis manus Christi perlat.

D. S. *Stärkende Ruhe-Milch.*

Emulsio nephritico-Cathartica, it. in suppress. Urinæ.

℞. *sem. violar. unc. ss.*

lithosperm. cont. drachm. ij.

c. f. q. ∇ fragor. F. Emulsio ad unc. iv.

Edulcoretur paucosaccharo: D. S.

Eröffnende und Harn-treibende Milch.

Emulsio Epithematis modo ad agrypniam & Cephalalgiam applicanda.

℞. *sem. papav. alb. drachm. iij. ad ʒvj.*

c. f. q. Aq. Hypnot. Dorncrell. F. Emulsio.

D. S. *Eufferlicher Umschlag.*

Præstantior erit, si solutionis opii c. S. V. ʒj. ad ʒss. addatur, & ita tepidè applicetur; sicut omisso opio, addita S. V. camphorati unc. ss. vel camphora ipsa ad gr. ix. ad maniam magis accommodata foret.

§. 7. Manifestum ex dictis est, improprie emulsionis appellationem illis tribui misturis, quas soli pulveres candidi ingrediuntur, cum præter succum nil emulsionis adsit: quo pertinent superstitionis basi superstructæ die *Perlmilche*: Talis emulsio improprie est & fit,

In statu variolar. & Morbillorum.

℞. ∇ *napi,*

aquileg.

card. bened. ana ʒi.

cinam. spirituos. ʒi℥.

C. C. sine Δe ʒi.

Bezoard. miner. ʒj.

Unic. fossil. ʒss.

Sacch. albiss. q. s. M. D. S.

Stärk-Milch.

Cum verò suo usu non careant hujusmodi misturæ, hinc hodiernâ consuetudine, quæ legis vice fungitur, uterque modus commodè jungitur, adeoque emulsioni proprie dictæ jam paratæ isti pulveres pro efficaciori medicinâ adduntur: sic si in dato exemplo ex sem. aquileg. ʒiij. napi, card. bened. papav. albi

albi ana ʒi. c. istis ∇ in duplo assumtis fiat emulsio, & isti pulv. proportionē scrup. β. ad ʒj. cuius ʒ. emulsionis addantur, foret formula ad variolas hodie usitatissima.

Emulsio ad Gonorrhœam benignam.

℞. *sem. agni casti.* ʒβ.

cannab. ʒij.

c. f. q. ∇ *nymphææ* F. Emulsio:

adde

Off. sepia pp.

succin. pp. alb. ana ʒβ. ad scrup. ij.

edulcorentur parum c. saccharo.

D. S.

Anhaltende Alterativ - Misch.

Emulsio temperans lympham saltam acrem, pectus affligentem, natâ inde febre symptomatica.

℞. *amygd. dulc. ambrosin.* ʒiij.

sem melon. ʒiβ.

c. f. q. ∇ *scabios.* F. Emulsio:

adde.

mandibul. luc. pisc. ʒβ.

antihæst. Poter. rit. par. scrup. j.

Unicorn. fossil. scrup. β.

edulcorentur parum.

M. D. S.

Pertinet huc liquor alexipharmacus Zwelferi in *Pharm. Reg. p.* 209. sane in variolis egregius: ad cuius imitationem & alii similes præscribi possunt, utut saporis ratione ad strictè dictas emulsiones minùs pertineat.

§. 8. Observandum autem sub Emulsionum usu, 1. quod facillimè alterentur, corruptionem ac acescentiam incurrant; unde minori quantitate præscribendæ, & loco minus calido asservendæ, 2. quod ventriculorum multum resolvant, & facili rancescentia multum ejus functionibus noceant.

§. 9. Adjungendæ his quædam misturæ emulsionibus cognatæ, ex resinosis imprimis constantes, & ferè laxantes. Præter emulsionem seminis Carthami, additione vel rad. mechoacannæ, vel resin. scammon. aut jalap. acuendam, passim notam, resinæ c. ∇ artificiosè sociatæ, & ita resolutæ emulsioffi conformes potiones potenter laxativas reddunt.

℞. *sem. melon. excortic.* ʒβ. ad ʒi.

resin. jalap. gr. vij. ad scrup. β.

scammon. pp. gr. j.

misce in mortario marmoreo, sensim affundendo *Julep. rosat.* ʒj.

F. Emulsio D. S.

Purgier-Misch.

℞. *Resin. jalap.* scrup. β.

dissolv. inf. q. Vitell. ovi.

& c. ∇ *fœniculi* f. Emulsio:

adde

∇ *Cinnamom.* ʒij.

edulcorentur pauco saccharo.

D. S.

Laxier-Misch.

Potentius operatur, quàm ejusdem resinæ eadem dosi alia sub forma, dissolvente illius texturam Vitello ovi, ejus medio minutis sub particulis undique fluidis corporis permiscetur & associatur.

Emulsio Cosmetica.

℞. ∇ *rosar. vel spermat. ranar.* ʒiβ.

aut q. V.

Infilla Essent. benzoës q. v.

f. mixtura lactea.

quam pro faciei ac manuum leni ablutione cum spontanea exsiccatione adhibere poteris; quin & præterea de Cosmetico ex macerata aliquid addere licet.

CLASSIS IV.

Infusa & Decocta comprehendit.

§. 1. Quarta specialis formularum differentia Infusa & Decocta, quæ Græcis Apozemata, complectitur, quorum latè admodum patens est usus, internus pariter ac externus. Nempe ut purum impuro respectu nostri ubique junctum, tam in alimentis quàm medicamentis; ita, quod hodiernæ Artis Spagyricæ primarius ferè finis est, purum ab impuro in medicamento separare, nucleum à corticibus, Q. E. ab involucris elementalibus seu materialibus, idque Tinturarum, Essentiarum, Extractorumque ferè sub titulo, ita jam Veteres idem, rudi licèt Minerva, per infusiones & decoctiones tentarunt, mediantibus quibus vim rerum medicamentosam & in apto liquore, seu menstruo extrahente & solvente, loco crudorum simplicium acquirerent. Adeoque id Infusis ac Decoctis, sive seorsim sive junctim, ita ut altera alteram excipiat, instituantur, (differunt enim saltem in eo, quod pro infusione sufficiat specierum incisione, rasione, contusione, pulverisatione præparatarum, maceratio seu digestio in loco tepido, vel speciatim MB. cui in decoctione ulterius super ignem actualem concitatio omnium agitatio & ebullitio, & penetrantior solutio) ad duo semper attendendum; 1. ad objecta infundenda; ad Subjecta s. menstrua cum quibus fit infusio ac decoctio. Mutuus omnino requiritur hic respectus, tam quantitatis quàm qualitatis; quantitatis quidem, ut sibi mutuo sufficiant, qualitatis v. ut invicem appropriata sint: In his duobus enim primum Decocta & Infusa medicata præscribendi consistit artificium: *conf.* Zwelferus *Pharm. R. p.* 31. & 84. *it. Animadv. in Pharmac. August. p.* 146.

§. 2. Objecta ergo quod attinet: ex omnibus hæc desumuntur regnis: 1. Ex ani-

[M m m m 3]

mali

mali: partes solidæ duræ & sicciore quævis, v.g. C.C. Ebur, priapus cervi, ceti, splen bovis, viperæ, sterco equinum: ex quibus omnibus (exceptis excrementis) elicitur gelatina, quæ præter generalem nutriendi ac temperandi, adeoque confortandi & blandè refrigerandi usum, de vi specifica sui concreti omnino participare videtur, cum magnam illius substantiæ partem contineat, quæ sub rigore frigore de in \ominus vol. & Ol. larva se sistunt. 2. Ex Vegetabili, quævis plantarum partes & fructus, ut plurimum siccata. Resinæ saltem ac gummatæ minis his præparationibus, præsertim sub magistrali præscriptione inserviunt. Elicitur sic ex Vegetabilibus, gummeo in recessu, resinosa substantia, in cuius complexibus potissima vis medicamentosa quasi concentrata est, ut ex Decocto lignorum vel absinthii inspissato manifestum. 3. Ex Regno Minerali varia desumi solent: \odot candefacti in Vino vel Aqu. extinctionem magnificat Burrhus: \odot em Vino infundimus & decoquimus salubriter; eodem candefacto Lac dysentericis appropriatum reddimus; φ is infusio pro oculorum vitiis laudatissima: hni infusio aut decoctio usui Chirurgico multum inservit; & in qua crebrius h fusum extinctum fuit, alvum laxare solet; aqua z non solum præparatum sub Vitri, reguli, croci, &c. formâ infusioni apprimè inservit, sed vel crudum idem hodie Decoctis pro diæta sudorifera additur; quin & ejusdem crudi subtiliss. triti unc. β . macerata per noctem in unc. iij. l. iv. Vini aut aquæ pro dosi una, supra & infra purgare, asserit Poterius. De Mercurio res nota quoad aquam sic dictam Hermeticam, it. Decocta lignorum antivenerea. Vitrioli, Onis $\ominus*$, Calvis vivæ, pro usu externo decoctiones & infusiones in decocto nigro Myns. &c. it. sulphuris in Aqu. Calcis vivæ vel lixivii, passim pariter notæ sunt.

§. 3. Circa hæc v. Ingredientia, præter superius §. 1. monita, in specie attendendum 1. ad texturam eorum specificam, quæ volatilioris sunt naturæ infusioni saltem: aut cum juncta Destillatione Decoctionibus inserviunt, ut antiscorbutica acria, aromatica, sassafras ligneum, &c. nullam vel mediocrem decoctionem ferunt. Unde sub Volatiliorum cum fixioribus mistura, horum maceratio, & hinc decoctio vel ad medias vel ad finem ferè præcipitur, donec cætera illa simul adjiciantur. 2. quæ sunt solubilia, potiora, &c. minis diu infundenda, parcius coquenda, cum aliis ingratum, quia spissius, & facile alterabile, quia densius imprægnatum; & ventriculo hostile, quia digestionem ejus proprio motu magis reluctans reddunt medicamentum: Contra atque in durioribus & macerandis & diutius coquendis accidit.

3. Quæ denique vi medicamentosa sunt ditiora, parcius; quæ v. pauperiora, copiosius &c. recipiuntur, & paratum sic remedium, nunc cum nunc sine expressione colandum præcipitur. Et sic specialis dosis, ut ubique, ita & hic generalem determinat: observandum v. quoad specialem dosin, ferè duplum, interdum 3plum hic pro decoctione aut infusione recipi, respectu ejus, si in substantia propinaretur.

§. 4. Subjectum sive Menstruum Infusionum & decoctionum pro ingredientium Natura & Medici intentione variat. Communissimum est Aqu. simplex, hinc Vinum, z , serum lactis, &c. Idem vel simplex, vel compositum, hydromel, posca, cerevisia, juscula, Urina, lac: it. Infusa & Decocta jam præparata, &c. Circa hoc observandum: 1. si menstruum est Volatile, minus decoctioni, infusioni saltem, & huic circumspiciat, inservit, ut Vinum, S. V. 2. quo tenuius & dilutius fuerit menstruum, eò cæteris paribus plus imbibendo, potentius & substantiâ medicamentosa saturatius subministrabit remedium. Hinc Cerevisia præ aqua, Decoctum vel Infusum præ aqu. simplici, minus huic negotio apta existunt. 3. quo denique interioris & minus penetrantis erit texturæ, eò debilius fiet, minusque medicamentosum remedium; Hinc enim Vinum præ Aqu. ex quamplurimis longè plus elicit. Consultum ob id acuerè interdum menstruum pro meliori penetratione & extractione, quin & interdum aliquali ingredientium correctione: quibus usibus Tart. præ aliis inservit, ejusdem crystalli, \ominus , & \ominus essentielle. Crystalli Decoctionibus inserviunt, cum sine ebullitione non solvantur, utut post refrigerationem denudò coagulentur, \ominus Tartari magis in infusis convenit; \ominus v. essentielle in dosi paulò largiori utrique aptissimè jungitur.

§. 5. Proportio ingredientium ad menstruum, ob circumstantias hætenus insinuatæ; & alias plures tantum non infinitas, vix determinari potest. Pro aliquali tamen Idea tali proportionem sibi invicem respondere possunt.

lignor. unc. i.

cortic. unc. β .

rad. 3vi. ad unc. i.

herb. m. i. ad. ii.

flor. p. ii.

bacc. unc. β .

sem. 3ii. ad iij.

aromat. 3j.

Liquoris quantitas 4pla, 6pla, in mollioribus aut volatilioribus; in densioribus aut fixioribus 8pla & 12pla esse potest. Dum totius remedii moles ordinario hbi β . vel hbi vix excedit. Absumptio in Decocto ad medias,

dias, vel ad 3as, h. e. partes menstrui residuas, interdum saltem ad 4tæ partis consumptionem præcipitur; aut post colaturam demum ejus quantitas determinatur, modo tamen non adeò certe, nisi prius menstrui quantum determinatum fuerit; siquidem ad medias, item ad 3as decoctio instituta esse potuerit, & ita nunc debilius, nunc potentius remedium obtineri.

§. 6. Infusa ergo vel simpliciter menstruo infunduntur, & ita pulveris formâ c. liquore hauriuntur; vel nodulis linteis raris includuntur, à quo successivè, cum aut sine expressione, liquor hauritur; vel Infusum paratum à speciebus colando separatur, & nunc ita solitarium, nunc sociatis iis, quæ decoctis addi solent, propinantur. Decocta verò ebullitione absolutâ colantur per pânium vel linteum, & quia ingratiore ferè, quin & interdum incompleta sunt medicamenta, tam pro efficacia quàm pro gratia, addenda subinde quædam veniunt: pro efficacia quidem Electuarius, spiritus, extractum, syrupus, aut aliud quid à Medico pro intentionis ratione ordinandum, proportionem ferè illa, quæ supra de Potionibus monita fuit. Pro gratiâ, præter colaturam subinde clarificatio cum albumine ovi instituitur, ut oculis, quin & ventriculo, magis arrideat; sicut pro eodem scopo & aromatizatio superadditur, adjectis aromatis ventriculo gratis, & medicamenta plus minus corrigentibus: Ut nihil dicam de addendis dulcibus aut dulco-acidulis pro gustus suaviori alteratione, simili ratione ac supra in julepis vel misturis factum. Sed omnia hæc distinctius ex particularibus constabunt exemplis, per quæ brevissimum iter, præsertim cum totum hoc negotium & minus difficultatis hodie ac olim habeat, præsuppositâ solutionum & extractionum doctrinâ spagyricâ, & minus etiam utilitatis, siquidem Decoctis rariùs præ quotidiano veterum abusu internè uti soleamus.

Infusa Antifebrilia, in specie contra Quartanas.

℞. *pulv. Chinæ Chinæ* ʒvi. ad ʒi.
rad. gentian. ʒiij.
fl. cent. min. p. iv.
piper. long. ʒi.
sal Tartari ʒß.
 M. f. pulvis.

D. S.

Species in Wein.

℞. *Cortic. chin. chin.* drachm. vi.
quajac. drachm. ii. l. iii.
Comar. Cent. min. m. i.
cinamom. drachm. ii.
caryophyll. drachm. i.
Lap. æpp. drachm. iß.

sal Tart. drachm. iii.

M. f. pulv.

D. S. ut antè.

Infundatur in Vini vel absinthitis, vel Gallici, vel Rhenani, mens. iß. subinde agitando.

Tempore usus omnibus bene commixtis capiatur bonus haustus, idque ad imitationem Gallorum; præsertim D. Monginot. Tr. de Cura Febr. per Chin. Chin. usurpata, rarò fallunt, signa coctionis ubi præcesserunt. Locò Cortic. Peruviani & lignum Colubrin. amariss. præsertim in Tertianis, recipi potest. Delicioribus inclusus nodulo pulvis ita infundi, & præviâ expressione Infusum hauriri potest.

Nodulus alterativus & laxativus, in morbis chronicis vernali tempore usurpandus.

℞. *Com. absinth.*

fl. cent. min.

HB. cochlear. rec. ana M. ß. ad M. j.

rad. armorac. rec. unc. j.

gentian. unc. ß.

tarax. ʒij.

fol. fenn. s. fl. ʒvj. ad unci.

rad. helleb. nigri non præp. unc. ß.

esule non præp. ʒiß.

sem. fœnic. ʒiij.

anisi ʒiß.

Cinnam.

Zingib.

caryophyll. ana ʒj.

Θ *tart.* drachm. iij.

Incisa & contusa includantur nodulo:

D. S.

Pûschel in Wein.

Infund. Vini Rhenani mens. iß. capiatur omni manè bonus haustus cum vel sine expressione, prout fortius vel debilius se exierit: isquè vel calidus, vel præmissio tantillo jusculo frigidus. Jalapa, quæ ordinariò aliàs unâ infundi solet, omittenda; hæc enim & alia resinosa, ceu appropriata menstruo, nullam extractionem patiuntur. Θ *Tart.* partim pro usu proprio, dum c. acido Vini in Θ essentielle abit, partim pro scopo corrigendi solutiva, ac simul promovendi solutionem, additur. Loco ejus in hypochondriacis interdum Limatura ♂ additur, quicquid dicat Geigerus in Kelegraphia; acidum enim Vini hanc sufficienter rodit: sed nunquam simul; Θ *Tart.* enim ♂ alioquin præcipitat.

Infusus Antiscorbuticum.

℞. *h. rec. nasturtii aquatic.*

cochlear. ana m. ij.

rad. raphan. rustic. unc. i.

contus. & conquass. in mortario lapideo infundantur in f. q. hoc est lbii. l. iij. feri lactis depurati: stent in loco tepido per noct. in vase clauso:

Mane

Mane

℞. *Colaturam*,

adde

Aqu. Cinamom. unc. ℞. ad drachm.

vi. M. D. S.

Scharbocks-Trank.

Aut huius loco lac antiscorbuticum vide supra §. r. Class. III. Addi potest pro lubitu vel de saccharo, l. syrupo succo Citri, vel scelloryb. Foresti, non ramen copiosa ob facilem alterationem dos. unc. iij. l. iv.

℞. *H. cochlear. m.* ij.*rad. helen.**armorac.* ana unc. i.*bacc. juniper.* drachm. vi.*passul. min.* unc. j.

Mista infunde in Vinum vel serum lactis. Potentior est succus, si speciebus istis prioribus sub contusione affundatur feri lactis saltem q. s. pro meliori conquassatione, & ita succus exprimatur; qui vel ita c. pauco saccharo edulcoratus absorbeatur; vel illius unc. i℞. sub usu feri lactis q. s. addatur, & ita hauriatur.

Infusum Purgans pro unâ dosi.

℞. *fol. fenn. s. st.* unc. ij.*rad. helleb. nigri non pp.* ℥ij.*zingib.* ℥℞.*sal Tart.* drachm. i.

Infund. in f. q. Aqu. comm. l. fumar. stent in loco tepido per noct.

Mane

℞. *Colat.* unc. iij.

adde

Aqu. Cinamom. drachm. i℞.*syr. de pom.* drachm. iij.

M. D. S.

Purgier-Tranklein.

Infusum Emeticum.

℞. *℥ii Vitæ vel Croci metall. absinth.*
qu. v.

Infund in Vinum Rhenanum: stent in loc tepid. per noct.

Mane

℞. *filtrati liquoris per chartam emporet.* ℥j. ad ℥i℞. *consideratione agri.*D. S. **Brech-Wein.**

Nempe quantum Menstrui seu Vini hic ante omnia attendendum, ut rectè monet Walæus *Meth. Med. p. 59.*

Infusa Emetica.

℞. *fol. asari rec. no.* viij. ad x.*Minutim incisa infundantur per noct. in**Aqu. card. benedict.* unc. iv.

Mane

℞. *Colat. add.**Oxym. simpl.* unc. ℞.

M. D. S.

Brech-Tranklein.℞. *fol. asari rec. no.* ix.

Conterantur in mortario lapid. c. pistillio ligneo, affundendo sentim oxymell. simpl. unc. ℞. ad unc. j. tamdiu terendo, donec in potabilem succum sint contrita: tunc adde

▽ *card. bened.* unc. ii. ad unc. iv.

M. f. Haustus: D. S.

Brech-Tranklein.

Infusum passulatum laxativum pro hypochondriacis aliisque, qui siccioris sunt alvi.

℞. *Passul. min.* unc. ii. ad iij.*fol. fenn. s. st.* ℥vi.*cinam.* ℥i℞.*caryophyll.* ℥i.*Crem. Tart.* ℥i℞.

concisa & conquass. infund. in f. q. Aqu. com. v. g. ℥bij. ad iij.

stent in loco calid. per noct. l. per 24. horas, vase clauso: ubi omnia refrixerint, colentur per linteum densum.

D. S.

Größnender Trank.

Pertinet huc Infusum purgans ex fenna pro delicatulis, à D. Michaelè olim laudatum.

℞. *fol. fenn. s. st. pulv.* ℥j.*Passul. minor, lotar.* unc. ij.

Contunde omnia in mortario lapideo, ut fiat pasta, adde

Cinam. ℥iij.*Caryophyll.* drachm. i℞.

Hinc in vase fictili affund. ▽ ferventiss. unc. xv. misceantur optimè, & asserventur vase clauso in loco tepido vel in MB. per 6. l. 8. horas (aliàs sapor ingrator redditur) liquor filtratur & digestionem feces separentur, & clarus liquor per declinationem decantetur, & usui asservetur.

Dos. infant. ℥iij. ad unc. ℞. adult. unc. iij. robusto unc. v. quin & alia minus nauseosa purgantia unâ infundi poterunt pro subjectorum ratione; sicuti & de Tart. puro aliquid simul propter sennam addi possit.

Pertinent huc Vina infusione aromatum & sacchari medicata, Claretum it. à repetita per manicam Hippocratis seu marsupium laneum colatura, Vina Hippocratica dicta, apud nos ferè rariora, pro scopo analeptico, vel alterativo, vel simul laxativo.

Vinum Hippocraticum seu Claretum laxativum pro sene.

℞. *Bacc. juniper. rec.* ℥vj.*rad. acori veri.* ℥℞.*fol. fenn. s. st.* ℥iij.*rad. helleb. nigri* ℥℞.*Cinamom.**galang.**cubeb.**Zingiber.* ana drachm. j.*crem. Tartari* drachm. ij.

Infund. in Vini rhenani optim. q. s. v. g. ℥bi.

Stent

Stent in loco tepido per triduum, colentur, edulcorentur cum ꝑß. ad ꝑß. sacchari:

Coletur iterum bis vel ter per manicam Hippocratis. D. S.

Stärkend Payer-Claret.

§. 7. Hisce modis simplici specierum per menstruum extractione præscribuntur infusa: est tamen, quando præterea fermentatio intercedit, quâ mediante in textura gummeo-resinosa melius recluduntur species, ac ita exactius menstruo uniuntur, & sub minoris digestionis primæ labore altius partes corporis subeunt, & alterativas impressiones undique exerunt. Species infundendæ saltem in majori quanto, habitâ ratione liquoris, in quem fit infusio, præscribuntur, & hinc v.g. Cerevisiæ recenti, & à coctura fermenti, vel musto recenter expresso, infunduntur, vel ita nuda, vel nodulo raro inclusa, ut & in medio liquoris suspensa, ut sub alterutrius fermentativo motu potus medicamentosus emergat: v.g. talis est Cerevisia antiscorbutica Timæi in *Epist. l. 6. Ep. 14. p. 428.*

Cerevisia Medicata, anti-cachectica & antihypochondriaca.

℞. Rad. Cichor. rec. ℥ß.

helen. rec. unc. iij.

h. scolopendr. ℥ß.

card. bened. m. iij.

bacc. juniper. rec. ℥iij.

Incis. & contus. D. S.

Species zum Kräuter-Bier.

Mens. 30. ad 40. quorum quælibet ℥iij. Medicas constituit, infundendæ ante fermentationem, & ita in liquore relinquendæ, donec liquoris peractâ fermentatione fiat transvatio.

Vinum medicatum absinthiacum.

℞. h. absinth. ℥iij.

card. benedicti

rorisinarin. ana ℥ß.

Com. cent. min. ꝑß.

rad. caryophyll. ℥ß.

fl. sambuci

Cortic. citri,

aurant. ana ꝑß.

Incis. & contus. D. S.

Species zum bittern Wein.

Pro amphora, (60. mensurarum) una, vel cum semisse Musti, in quem debet fieri infusio.

§. 8. Differendi hinc prolixius daretur occasio de potibus medicatis fermentatis, ex succis & liquoribus vegetabilium parandis, in quo artificio Angli excellunt: sed quia ad officinales potius labores, quam magistrales præscriptiones pertinent, dimittimus. Unicum saltem potum medicamentosum fermentatum, Viennæ & Austriæ quibusdam in locis usitatum, hypochondriacis inprimis ac

Tom. II. Pars 2.

lumborum renumque phlogosi & æstu correptis crebrius vel loco potus ordinarii hauriendum.

℞. Bacc. junip. ℥j.

passul. min. ꝑß.

tartari Venet. ꝑß. ad ꝑß.

fruct. cynosb. cum arill.

acac. c. nucl. ana M. j.

Infunde in ∇ commun. ꝑß. in vase apto ligneo & prope fornacem, vel loco quodam calido fermentare permittuntur, hinc transvassantur, & pro potu non ingrato asservantur.

§. 9. Simili modo ac Infusa præscribuntur etiam Decocta; differentia enim saltem in præparat. accidentalis. Usus est ferè alterativus, adeò raro hodiè ob ingratas proprietates, doses incertas, & operationes diversas pro scopo solutivo ordinantur, nisi mitius quoddam sennatum aut helleborinum pro una dosi capiendum, &c.

℞. Rad. polypod. ꝑß.

helleb. nigri ꝑß.

fol. senn. s. st. drachm. j.

⊖ Tartar. scrup. j. ad ꝑß.

Coq. s. q. ∇ comm. leniter.

Colat. ℞. ꝑß.

adde

syr. de fumar. comp. ꝑß.

~ Cochlear. scrup. j. M. S.

Purgier-Trank wider den Scharbock.

℞. rad. polypod. ꝑß.

fol. senn. s. st. ꝑß. ad iij.

Crem. Tartar. ꝑß. ad scrup. ij.

c. s. q. ∇ com. l. seri lactis depurati leniter ebulliant ad dissol. Tartari:

Colat. ℞. ꝑß. adde

Aqu. Cinamom. ꝑß.

syr. de pom. ꝑß. M.

Cum tamen Clinico volupe fuerit adhuc Decoctum purgans pro pluribus dosibus ad Imitationem Veterum abligurare, tale præscribi poterit:

Decoctum purgans in scabie.

℞. Rad. lapathi acut. ꝑß.

helen.

polypod. ana ꝑß.

HB. fumar. M. ij.

scabios. M. j.

fol. senn. s. st. ꝑß.

rad. helleb. nigri non præp. ꝑß.

Crem. tartari ꝑß.

⊖ tart. scrup. j.

Coq. in Aq. com. ℥iij. ad ℥iij. clauso vase leniter. Colat. ℞. ℥iij. clarif. & aromatiz. cum cinamom. addendo

syr. violar. solutiv. ꝑß.

de fumar. compos. ꝑß. M. D. S.

Purgier-Trank auf etliche mal.

De quo capiat omni manè haustum ad ꝑß. vel v. calidè.

[Nnnn]

℞. Decoct.

℞. *Decoct. aperit.* ℥iij. l. q. f.
in quibus dissolve
Elect. dia-Cathol. vel *diaphæn.* ℥j.
(vel *Elect. de succo rosat.* ℥vj.
vel *Conf. Hamech.* unc. β.

Colaturæ adde

Syr. rosat. solut. ℥vj. ad unc. j. M.

Dum colantur post dissolutionem, in paulo majori dosi præscribenda electuaria, cum multum residui post se relinquant.

§. 10. Alterantia ergò sunt decocta, quæ ordinariò præscribenda veniunt.

Decoctum ad Dysenteriam.

℞. *rad. tormentill.* unc. iβ.

fol. plantag.

h. heder. Terrestr.

sanguisorb. ana m. j.

fl. ros. rubr. p. iij.

Ras. priap. Cervi vel ceti unc. iij.

Incis. & contus. coquantur in Aqu. comm.

℥iij. vel iv. ad medias

Colat. ℞. adde

syrup. cydon. aromat. unc. ij. ad unc. iij.

Aqu. Cinamom. unc. j. M. D. S.

Anhaltender Stärck-Trank.

Decoctum adstringens ad hæmorrhagiam uteri, ex vasorum laxitate.

℞. *rad. tormentill.*

histort. ana unc. β.

h. consolid. maj.

sanicul.

pyrolæ.

summit. hyperic. ana m. j.

Coq. in Aqu. chalybeat. q. f.

Colat. ℞. unc. xv. ad ℥iβ.

adde

syr. de symphyt. Fernel. unc. iij.

Aqu. Cinamom. unc. β. M. D. S.

capiantur ad unc. iij. tepidè sæpiùs de die.

Decoctum Vulnerarium internè & externè usurpandum.

℞. *Astacor. fluviatil.* no. xx.

rad. aristoloch. rotund. unc. j.

HB. bugul.

alchimill.

sanicul.

betonic. ana m. j.

Coq. in f. q. Aqu. comm- & Vini.

Colatura detur.

Hoc externè vulnera & ulcera eluuntur, vel etiam plagulæ in eo madefactæ imponuntur: internè adduntur syr. de symphyto Fernel. unc. iv. & hauriuntur bis in die unc. iij. ad iv. horis aliquot ante pastum.

Decoctum refrigerans seu temperans bilem, ut vocant, effervescentem.

℞. *rad. Cichor. rec.* ℥iij.

fl. ros. rubr. m. iβ.

santal rubr. ℥iij.

succi Citri rec. unc. j.

Coq. in f. q. aquæ comm.

Colat. edulcoretur pauco saccharo. D. S.

Rührender Alterativ-Trank.

Coqui etiam possunt in sero lactis, & si succus Citri omisus fuerit, accipi potest serum lactis cum Phlegmate Vitrioli acidulo.

Decoctum Vulnerarium in Renum exulceratione, &c.

℞. *Rad. Consolid. sarac. cum toto* m. ij.

fol. vineæ pervinæ.

alchymill.

heder. Terrestr. ana m. j.

summit. hyperic. m. β.

ras. glyzyrrhiz. unc. iβ.

Coq. in f. q. Aqu. simpl.

Colat. ℞. ℥iβ. ad ij.

adde

syr. de symphyt. Fernel. unc. iβ.

theriacal. simpl. unc. j.

M. D. S.

Hellender Trank auf etliche mal.

Aliud simplicius.

℞. *seri lactis* ℥iij.

succi citri rec. express. unc. ij. ad iij.

Ebulliant parum, & cum albumine ovi clarificata, & pauco saccharo edulcorata, colentur.

Prodest in febribus pro alteratione; sicuti simili modo cum succo pomor. Borsdorf. maturor. ad unc. iv. vel. vi. tractatum, convenit hypochondriacis æstuantibus, obstructis, melancholiâ affectis, &c.

§. 11. Interdum Infusa & Decocta simul eandem formulam ingrediuntur.

Decoctum alterans & laxans, quod etiam loco Julepi usurpari potest.

℞. *fl. ros. rubr.*

bellid.

papav. rhæad. ana M. β.

Tamarind. rec. unc. iβ.

▽ *comm. vel seri lactis depur.* ℥iij. ad ℥iv.

Ebulliant invicem: decocto ferventi infunde

Conf. ros. rubr. rec.

violar.

papav. rhæad. ana ℥vj.

factâ digestionem in loco tepido, colentur.

D. S. **Eröffnender alterativ-Trank auf etliche mal.**

De quo bibat æger vel pro lubitu, vel quotidie bis, manè & bihorio ante cœnam.

Decoctum Diureticum.

℞. *ras. ligni juniperin.* unc. iij.

Macerentur per noctem in MB. in ℥iij.

▽ *comm.*

Manè ebulliat ad tertiæ partis consumptionem:

Decocto ferventi infunde

bac. juniper. rec. unc. iij.

rad. fœnicul. unc. iβ.

flent

stent in infuso in loco tepid. per 24. horas;
manè factâ leni ebullitione,

℞. Colat. ℥ij.

adde

℥yr. de 5. radic. unc. iij. l. iv.

~ ♂ dulc. 3j. ad 3i℥.

vel hujus loco potius ~ acidi ex nucleis
persicorum & dactylor. destillat. unc. j. ad
unc. ij. M. D. S.

Harn-treibender Trank.

§. 12. Volatilia ubi decoquenda sunt,
jungatur destillatio; sicuti hoc imprimis ur-
get quoad aromatica carminantia Zwelferus
Pharmac. Reg. pag. 87.

Decoctum antiscorbuticum.

℞. Rad. raph. rustic. rec. unc. i℥.

HB. cochlear.

nasturt.

piperitid. rec. ana m. j.

conquass. in mortario lapid. cum Aq. com.
vel seri laet. caprill. ℥ij.

Decoquantur in cucurbita suo alemb. mu-
nita, & destillentur simul ad medias:

Colat. clarificat. ℞. ℥ij.

adde Aquam simul destillatam,
in quibus dissolve

Decoctum in affect. chronicis capitis, &
pectoris catarrhal. cum tumoribus glandula-
rum colli & faucium insignibus, ex lymphæ
motu & crasi vitiatis.

℞. ras. ligni juniper. unc. ij.

sassafr. unc. i℥.

cortic. lign. quajac. unc. j.

h. rorismarin. m. iij.

Bacc. juniper. unc. i℥.

solut. &c. f. pom. 3vj.

sacchari albiss. parum. M. D. S.

Scharbocks-Trank.

Decoctum in Paralyfi.

℞. ras. ligni sassafr. unc. ij.

h. rorismarin. rec. m. ij.

Bacc. juniper.

lauri. ana unc. j.

Coq. in Aqu. & V. ana ℥ij. in cucurb. cum
alembico operta ad medias:

Colat. & Destillato adde

~ bacc. juniper. ferm. unc. iv.

♂ * simpl. unc. ℥.

℥yr. fl. tunic. unc. iv.

M. D. S. **Glieder-Trank.**

De quobis vel ter, manè, vesperi, & sub
introitu lecti, capiatur bonus haustus.

Infund. in Aqu. & V. ana ℥ij. ad i℥.

Macerentur per 24. horas in MB. vase suo
alemb. munito, & decoquantur & destillen-
tur ad medias.

Colatura & Destillato adde

~ ♂ * simpl. 3iij.

℥yr. fl. calendul. unc. iij. M. D. S.

Zertheilender Trank aufserliche mal.

Tom. II. Pars 2.

Decoctum pectorale ad tussim, à frigo-
re externo natam, it. restituens læsiones pul-
monum, &c.

℞. ras. lign. sassafr. 3j.

Macerentur in ∇ com. mens. ij. f. ℥vj.

adde

rad. levistic. 3℥.

helen. 3iij.

h. heder. Terrestr.

scabios.

pulmonar. ana m. ij.

sem. anis.

fœnicul. ana 3iij.

Coq. ad tertias, addendo circa finem

ras. glyzyrrhiz. 3℥.

passul. min. conquass. 3vj.

Colat. D. S.

Brust-Trank.

§. 13. Pertinent ad Infusa & Decocta
etiam Hydromelita, it. Oxymelita, à men-
struo ita dicta, in affectibus pituitosis, vel pe-
toris vel senum proficua, &c. Propriè au-
tem dicta Mulsâ medicata fiunt, dum melli
cum ∇ fermentanti infunduntur simplicia me-
dicamentosa, ad instar Vinorum medicato-
rum, de quibus suprâ.

Hydromel resolvens & incidens pecto-
rale.

℞. h. marrub.

hyssopi ana m. j.

rad. helenii. 3i℥.

sem. fœnicul.

anisi ana 3i℥.

♀ & fol. tart. 3ij.

Coqu. in ∇ simpl. part. vj. f. ℥iij.

Mell. despum. part. j. f. ℥℥.

bulliant simul ad consumt. 3iæ vel 4tæ part.

in fine infunde

pulv. Cinamom. 3j.

Croci gr. xv.

Colat. D. S.

Lösender Brust-Trank.

Hydromel Paralyticum.

℞. ∇ com. ℥vj.

mell. optim. ℥℥.

despumentur sedulo, coquendo leniter
ad 4tæ part. consumptionem:

Colat. adde

h. hyssopi.

puleg.

salvia ana m. j.

fl. anthos, m. ℥.

stent in infus. per 12. horas; manè ebulliant
leniter, addendo

Cinamom. 3iij.

cardamom. 3j.

cubabar. 3℥.

Colatura D. S.

Glieder-Trank.

[N n n n 2]

Oxymel

Oxymel Diureticum Laxativum.

- ℞. *Rad. vincetox.* ʒi.
helleb. nigri ʒʒ. ad ʒvj.
HB. heder. terr.
parietar. veræ ana M. j.
bacc. junip. ʒvj. ad ʒj.
gran. alkek. unc. ʒ. ad ʒvj.
 Concisa & contusa infund. in
aquæ comm. ℥iv.
mell. colat. ℥bj.
 + *vini* ℥iʒ.

stent in infuso in Vitro clauso per aliquot horas; manè ebulliant leniter: Colat. clarificetur: aromatiz.

D. S. *Eröffnender Meth.*

pertinet huc Oxymel de Peto Quercet. quod & pectorale est egregium, & simul vim purgandi appropriatam in hydropse obtinet: it. Oxymel absinthites, euporiston Pravotii in morbis chronicis, *Fehr de absinth. p. 40. it.* Oxymel ad Asthma Poterii *Cent. 2. c. 4 + p. 50.*

§. 14. Referenda & huc hordeata, sive, ut aliàs audiunt, Prisanæ, quæ tamen aliæ apud Veteres, aliæ apud Modernos: ibi partim alimentum, partim potus: hic ut plurimum corpus pro Julebis, interdum, sed rariùs, ex hordeo ad crepaturam cocto, emulsio paratur, cujus paradigma exhibet Sylvius *L. 1. Prax. c. 14. p. 157.* Ast hordeata hæc non adeò frequenti hodiè apud cultiores Prædicos sunt in usu: 1. quia cruda sunt & ventriculum crudum reddunt, 2. fermentando flatulenta sunt; unde nunquam sine semine anisi aut cortic. citri decoquenda. 3. primis viis & hypochondriis utroq; modò inimica, si tamen pro Julebo alterante expetatur Hordeatum,

- ℞. *Hord. mund.* m. j.
rad. scorzonæ. drachm. iʒ.
rasur. C. C. unc. j.
cort. aurant. drachm. iʒ.

Coqu. lento Δ *ad crepaturam hordei:*
 Edulcoretur pauco saccharo. D. S.

Alterativ-*Trank.*

§. 15. Quæ frequentissimè adhuc sub hodiernâ Praxi usurpantur Decocta, sunt sudorifera, pro chronicorum morborum curâ ferè in usu, quæ cum ex subjectis fixioribus ferè præparanda, diutiusque continuanda veniant, omninò & fortius decoquenda, & majori quanto ordinanda. Cùm verò sub usu illorum strictum diætæ regimen observandum omninò sit, in specie Diætæ apud nos sudorifera dicitur, idque ad differentiam, Lactææ sub cura scorbuti interdum necessariæ. Veteribus ex uno vel pluribus 4. famosiorum hydroticorum parabantur, quæ sunt lignum quajac, s. sanct. ejusque cortex, sassafras cum cortice, rad. Chinæ & sarsaparil. quibus in curâ Luis 2æ isti principaliter usi fuerunt. His verò ceu exoticis, & ob id subinde suspe-

ctis, ligna nostratia radicesque commodè à modernis adjunguntur, v. g. lignum juniperinum, buxum, simul anodynum, sarmenta periclymeni, rad. tormentill. bardan. maj. &c. ex quibus nunc solitariis nunc aliis additis, Decocta primaria pro eliciendo sudore, & secundaria seu bocheta, pro potu ordinario ordinantur. Præscribendirationes tam Veterum quàm modernorum, præter Morellum *de Formul. Remed.* hic & prolixum & accuratum, apud Luis 2æ Scriptores imprimis videantur: sufficiat saltem in præsentî Idea formam præscribendi recentiorum, quibus 3 & 8 superaddere placuit, subjungere.

Decoctum sudoriferum primarium Zwelfero communiter adscriptum.

- ℞. *Raf. ligni sanct.* ʒvj.
Cort. Ejusdem
rad. sarsaparill. ana ʒij. ad iij.
ligni sassafras ʒj. ad unc. iʒ.
 8 *vivi per alcali dep. & in pet. ligat.*
 3 *crud. gr. mod. cont. in pet. ligat.* ā. ℥bj.

Incisa & contusa macerentur in ∇ comm. mens. XII. per 89 hinc coquantur ad tertias:

Colat. D. S. *Schweiß-Trank.*

De quo unc. iv. ad unc. vj. capiantur manè, & unâ alterave hora proliciatur sudor, &c.

Decoctum secundarium.

- ℞. *Resident. decoct. prior. totam, vel*
ubi aliud quid addendum, me-
diam:

Affund. Aqu. comm. mens. xviii.

Macerentur per 12. horas, coq. ad consumt. tertiæ partis:

- adde
Passul. minor.
major. enucl. contus. ana unc.
 i. ad unc. iʒ.
rad. glyzyrrhiz.
polypod. ana ʒvj.
coriandr. pp. unc. iʒ.

Colentur per manicam Hippocr. aut aromatizentur cum cinamom.

F. Decoctum secundarium: D. S.

Ordinari-*Trank.*

§. 18. Verùm præter Luis 2æ curam quibusdam in locis hodierno more receptum est, ut, qui corpora habent impuriora, ut vocant, & variis inde pathematis obnoxia, aut qui chronicis ac lentis plus minus complicatis affectibus conflictantur, viribus tamen utcunque constantibus, item qui luxuriosâ inordinatâque cum effreni potandi libidine utuntur diætæ, & succulentioris hinc fiunt habitus, Diætæ hujusmodi sudorifera quotannis verno, (vocatur *eine Frühlings-Schweiß-Cur*) interdum & autumnali utantur tempore, pro digerendis congestis cruditatibus, excernendis heterogeneis impuritatibus, firmando

tono

rono viscerum, & mundificando ac roborando universo corporis habitu. In quem finem, præmissa primarum viarum absterfione, omni manè decocto primario utuntur, expectantes in Conopeo largum sudorem, quem in lecto calefacto decumbentes sensim exsiccare permittunt: Decocto secundario loco potus consueti utuntur: Vesperis ante pastum, aut saltem sub introitu lecti, repentes decoctum primarium, citra sudoris tamen profluvium. Alimenta sint moderata, aërem externum vitent. Continuatur hoc per aliquot septimanas, & vegeti inde ac alacres fere redduntur. Præscribendi modus hæc decocta coincidit cum prioribus.

Decoctum Primarium.

℞. *Ras. ligni sancti* unc. i.
fassasfras ʒvi.
rad. Chinæ ponderos.
scorzonor. ana unc. i.
eryng. unc. ʒß.
sarsaparill. drachm. iij.
sem. fœnicul. drachm. ij.
Præparat. l. a. coq. in ℥xij.
 ▽ *comm. ad medias.*
 Colat. D. S.
Schwiz-Trank.

Decoctum Secundarium.

℞. *Rad. Chin. ponderos.*
scorzon. ana unc. iß.
Cinamom. acut. ʒiij.
passul. min. unc. iij.
sem. fœnicul. unc. ß.
 Resid. Decoct. superior.
Coq. in ℥xxxv. ▽ *simpl. ad remanent.* ℥xvi.
 Colat. D. S.
Eisch-Trunk.

§. 17. Sed præter usum per diaphoresin evacuatorium, etiam pro scopo alterativo, in affect. Chronicis, ex visceris cujusdam interioris læsione præsertim exulceratoria dispositione natis, v. g. in Phthisi pulmonali, ex sanguine aut lymphâ acrioribus nata, quam aliàs defluxionibus à capite catarrhalibus tribuunt, it. exulceratione renum, abscessu mesenterii, aliorumvè viscerum mundificandis & consolidandis, & similibus non nimis confirmatis malis, Decocta similia ex iisdem lignis & radicibus, potissimum radice Chinæ, additis aliis, vel vulnerariis vel abstergentibus, more & methodo hætenus insinuata præscribuntur, & quotidie bis l. ter haustus bonus ut capiatur, ordinatur: v. g.

Decoctum alterans, exsicicans & putredinem inhibens.

℞. *Ras. lign. sancti* unc. iij.
rad. sarsaparill. unc. ij.
scorzoner. unc. iß.
fragar.

consolid. maj.

minor.

glyzyrrhiz. ana drachm. vj.

h. Veronic. m. ij.

coriandr. drachm. ij.

passul. min. unc. iv.

præparat. l. a. Coq. in f. q. ▽ *simpl. mens.*
 V. f. ℥xv. *ad medias:*

Colatura D. S.

Alterativ-Trank.

Dof. unc. iv. l. v.

Aliud magis temperatum & consolidativum.

℞. *Rad. chin. non carios.* unc. iij.
sarsaparill. unc. iß.
scorzoner. unc. ij.
caryophyllat. unc. j.

macerata per noct. in f. q. *Aquæ simplic.*
ebulliant, manè addendo

h. scabios.

alchymill.

heder. Terrestr.

fl. ros. rubr. ana m. j.

violar. m. ß.

sem. fœnicul. drachm. j.

passul. min. unc. ij.

Decoct. trajiciatur per Manicam Hippocraticam.

Colatura D. S.

Stärk und heilender Trank.

§. 18. Pertinent huc denique Decocta ex Cymis, it. ex cortice abietis, contra affectus nervorum scorbuticos, speciatim arthritidem vagam, paresin, stuporem: v. g.

℞. *Cymarum f. turionum pingv. ac resinof. pinastr. it. Abietis,* unc. iij.
rad. Chin. in tal. incis. unc. iß.
bacc. juniper. unc. j.

Incis. & contus. coq. in ▽ *comm.* ℥viii.
ad 3iæ partis consumptionem. l. ubi fortius de-
sideratur, ad medias:

Colatura D. S.

Scorbutischer Glieder-Trank.

Capiatur bis, mane in lecto, expectando blandum sudorem. Si subjectum patiens constitutionis sit humidioris ac serosioris vel succulentioris, loco Chinæ radic. ras. ligni sassasfras ʒj. ad unc. iß. recipi potest. Quodsi ingratiior sit Decocti sapor, nam the-rebinthinæ proprietates nonnihil repræsentat, in fine decoctionis aliquid passul. min. conquassat. addi potest.

§. 19. Fuerunt hæc Decocta & Infusa, prout usui interno inserviunt; considerata jam pariter earum præscriptio, pro usu externo; circa quam quidem nulla essentialis occurrit differentia, utut ex partium affectarum, ipsorumque affectuum varietate accidentalitatis quædam diversitas subinde occurrat.

[N n n n 3]

Infus.

Infus. ad aff. Paralyticos, aut dolores fixos
scorbut. artuum.

℞. *Fol. nicot.*

H. salviæ ana m. j.

Rad. angel. ʒʒ.

aronis

pyrethri ana drachm. ij.

Flor. anthos.

lavend.

Stæchad. Arab. ana p. ij.

sem. erucæ drachm. vj.

castor. drachm. iij.

contus. & concis. infund. in ~ V. p. 2.

& ~ lumbric. Terrestr. p. i. stent in loco tepido, vase probè clauso, per aliquot dies, liqu. filtratus

D. S.

Eusserlicher Glieder-Spiritus.

Quo ipso tepido aut moderatè calefacto artus vel loca dolentia benè fricanda & illinenda veniunt: velidem infusum cum vel sine spiritu lumbricorum pro scopo discutiendi, resolvendi, attenuandi vario, instar fatus humidi tepidi crebrius usurpari & reiterari poterit.

Decoctum discutiens & resolvens ad Cephalalgiam accidentalem.

℞. *Rad. rhodiæ* ʒiʒ.

fl. papav. rhæad.

rosar. ana m. β.

capit. papav. no. iij.

Præpar. coq. in f. q. Aqu. simpl.

Colatura D. S.

Eusserlicher Umschlag.

Epithematis instar tepidè fonti ac temporibus applicatur.

Infusum pro Oculo, seu Collyrium multiusus, ad rubedinem, maculas, albugines, nebulas, ulcera, pustulas, scabiem oculorum, &c.

℞. *Decoct. Calc. vivæ c. ∇ calcatrippæ*
parat. tʒʒ. ⊕ * *depur.* drachm. β.

Mittantur in pelvim anciam per noctem, vel ipsi mistura parum limat. aurichalci immittatur, donec saphirinum ex cupro colorem contraxerint, filtrentur celeri manu.

D. S.

Augen-Wasser.

Vel instillatur oculo, vel cum linteo tepidiusculè applicatur, nunc, ubi acrior fuerit, pauca Aqu. fœniculi diluta, &c. Sanè solum ⊕ * c. Aqu. appropriata solutum, ita ut citra insignem sensum oculi illud ferre queant, ad maculas & albugines oculorum delendas, etiamsi à Variolis relictæ fuerint, multum confert.

Infusum ad oculos à causa externa, v. g. Aère pluvioso ac ventoso læsos, &c.

℞. *mucilag. sem. cydonior.*

fœnugr.

hormini.

per infus. in Aqu. fl. cyani extra-
ctæ ana ʒiij.

sacch. hni. gr. ix.

diluantur. c. f. q. Aqu. euphrasæ.

D. S.

Augen-Mistur.

Infusum ad Oculorum Epiphoram, Lipitudinem &c.

℞. *Torment. rad. grosso modo pulv.* ʒj.

On. gr. v.

Aqu. plantag.

flor. cyani ana ʒj.

stent in loco calido per hor. 24. filtrentur.

D. S.

Augen-Wässerlein.

Decoctum Polychrestum ad Erysipelata, Inflammationes, Exulcerat. humid. in metu gangrænæ, &c.

℞. *Lithargyr.* tʒʒ.

Flor. rosar. rubr. m. ij.

olibani.

myrrhæ.

mastich. ana unc. β.

Dec. f. Aqu. ♀ *rec.* tʒiv.

⊕ i tʒiʒ.

Coqu. simul, usque dum lythargyrium ferè sit solutum, in fine addendo

Comphoræ ʒʒ.

Colat. D. S.

Eusserlicher Umschlag.

Calidè cum linteis multiplic. bis l. ter & crebrius applicetur in die. Conf. Zwelferus *Pharm. Reg. pag. 91.*

§. 20. Sed huiusmodi Infusa & Decocta externa, quæ ad Epithemata reverà pertinent, alias proprio nomine

Fotus

appellantur, quia eisdem pars affecta suaviter afficitur & blandè quasi fovetur. Eadem horum, ac internorum Decoctorum, præscribendi ratio, saltem quæ ad gratiam his adduntur, in illis omittantur. Triplici modo adhibentur: cum enim species decoquantur, decoctum cum linteis, spongia (non cum vesicâ, nihil enim substantiæ medicamentosæ hanc penetrat) applicatur, & dicitur Fotus humidus, vel Decocti saltem vapor ac suffitus parte affectâ excipitur, & dicitur Fotus Vaporosus: species sacculo lineo interpassato includuntur, uno vel pluribus, qui nunc ita siccus, aut saltem spiritu quodam penetrantiori irroratus, probe tamen calefactus, nunc in liquore convenienti coctus, & ita humidus applicatur, & in genere Fotus Siccus, it. Sacculus, appellatur. Quantitas liquorum pro fotu humido, item specierum pro fotu sicco, ex partis & usus ratione variat: v. g. pro oculo liquor. unc. iv. ad vi. pro ventric. tʒi. Species v. pro Capite in Cucupha unc. ii. pro

pro stomacho ꝑij. ad iv. & amplius pro apomine.

Fotus contra Tenesmum.

℞. *fl. chamomill.*

Verbasci ana m. ij.

H. verbasci.

linarie ana m. j.

Incisa Dentur ad Chartam. S.

Species zur Behung.

Coquuntur in lacte, & æger in sella perforata decocto ferventi infideat, & fumum exurgentem ita excipiat.

Vel Incisa Coq. in f. q. lactis Chalibeati:

Colat. ℥ij. D. S.

Eufferliche Bähung.

Decoctum hoc calefactum cum linteis multiplicatis, eidem immersis & leniter expressis, frequenti repetitione parti affectæ applicatur.

Vel Incisa includantur sacculo interpassato laxiori: D. S.

Säcklein zur Bähung.

Hic l. calefactus ita siccus applicatur, unde tamen in hoc casu parum allevamenti sperandum, vel lacti incoctus, & leniter expressus, calidè admovetur, aliquoties hoc ipsum reiterando.

Fotus Vaporosus ad promovendos menses, lochia, foetum mortuum, &c.

℞. *H. matricar.*

puleg. ana m. j.

sabin. m. ij.

bacc. lauri.

juniper. ana ꝑj.

sem. Colocynth. ꝑj. ad unc. iß.

incidantur gr. mod. D. ad chartam: S.

Species zur Bähung.

Hæc ipsa ebulliant in ∇ comm. cujus vapor fervidus excipiat per infundibulum in sellâ undique clausa, idque ita aliquamdiu continuando, & crebrius repetendo: sin citius deferbeat liquor, injectione silicum cande-factorum, vel chalybis igniti intrusionem, denudè calefieri potest: Eadem species etiam saculo inclusæ post forum hunc vaporosum vel in formâ sicca, vel (in decocto macerata & expressæ,) humidâ regioni hypogastricæ applicari possunt.

Fotus humidus in contus. oculorum, aut Livore.

℞. *Fl. cyani.*

calcatrip. ana m. ß.

summit. hyssop. flor. m. j.

rad. symphyt. maj. ꝑvj.

sigill. Salomon. ꝑij.

Coq. in f. q. Vini: Colat. ℞. unc. iv. l. vi. adde

S. V. *camphor.* unc. ß. ad ꝑvi.

M. D. S. **Eufferliches Wasser.** applicetur calidè c. linteis multiplicatis.

Fotus humidus pro membro fracto, luxato, distorto, ante & post repositionem.

℞. *H. betonic.*

chamomill.

rorismarin. ana m. ij.

summit. hyperic. flor. m. iß.

rad. aristoloch. rotund. ꝑvj.

symphyt. maj. ꝑß.

sem. 4. calid. maj. ana ꝑiß.

Coq. in *Aqu. simplic.*

Colat. ℞. ℥iß. adde

Vini infus. fl. hyperic. ℥ß.

M. D. S.

Glieder-Bähung.

Fotus pro scroto intestinis repleto in Hernia.

℞. *Stercoris Ovilli* q. v.

Coque in f. q. lactis vaccini:

Colat. ℞. & cum linteis eidem immersis fomentetur scrotum aliquamdiu subcalide: remanentia postmodum cataplasmatibus formâ desuper imponi potest. Sicuti alias sacculus, ex stercore asinino c. †o subacto pubi impositus, crebrius reiteratus, in hæmorrhagia uteri nimia egregius est.

Sacculi contra Dysenteriam.

℞. *Fol. quercus.*

furfurum. ana m. iij.

Includ. sacculis. no. ij.

uni rotundo majori & quadrato, alteri minori: D. S.

Stillende Säcklein.

Sacculi hi †o Vini incocti applicantur, major quidem umbilico, minor verò podici.

Sacculus contra dolorem capitis à causâ externa, in specie à frigore.

℞. *mili* ℥ß.

⊕ *comm.* unc. iv.

h. verbenæ.

fl. chamomil. ana m. j.

rad. rhod. unc. j.

Sal & milium primum torrefiant in sartagine, & protinus calidè sacculo cum aliis præpar. induntur: F. sacculi interpassati nro. 2. & ita calidè capiti imponuntur. S.

Säcklein zum Haupt.

Sacculus pro Ventriculo.

℞. *H. menth. crisp.* m. ij.

nuc mosch. unc. ß.

macis.

Cinamom. ana ꝑj.

caryophyll. ꝑij.

F. Pulvis, qui excipiat Cotone, & includatur sacculo interpassato rotundo: Irroretur largiter S. V. theriacali, l. ol. destill. menthæ ac juniper. &c.

D. S.

Magen-Säcklein.

Pertinent huc Cucuphæ, h. e. pulv. aromatici Cotone excepti, & mitræ capiti imponenda ita

dæ ita insutæ, præsertim pro senibus; sed quia in desuetudinem ferè abierunt, ob levia & brevia emolumenta, cum præterea in præscribendi ratione nil peculiare occurrat, præstat de iis tacere.

§. 21. Major fatus dicitur Balneum, quod corporis partium respectu l. Universale, vel particulare: illud vel simpliciter tale, cui totum corpus ad collum usque immergitur: vel secundum quid, respectu medietatis saltem corporis inferioris, & Infessus vel Semicupium aliàs vocatur, quia ad umbilicum saltem aut regionem hypochondriacam eidem insideri solet. Particulare est vel Capitis, vel manuum, vel pedum, quod propriè Lotio appellatur. Nulla hic nisi in quantitate ab alijs fortibus aut Decoctis præscribendi est differentia.

Balneum in scabie.

℞. *rad. lapath.* ℥ss.
bryon. unc. iij.
Hb. parietar.
saponar. ana m. ij.
lapathi acut. m. iv.
Sulph. pulv. unc. ij.
Calc. v. rec. ℥ij.

Incisa & contus. D. ad Chartam: S.

Species zum Bade.

Coq. in f. q. ∇ dulc. addendo parum lixivii. Huic Decocto moderatè calenti insideat æger vacuo ventriculo. Possunt ante ingressum capi sudorifera, ut Ess. lignor. Tinctura Tart. ðiata, Tinctura Sulph. &c. sub egressu v. illiniri blandè corpus linimento appropriato, minùs viscido aut glutinoso.

Balneum in Ictero.

℞. *H. saponar.*
parietar. ana m. iij.
rad. bryoniæ ℥ss.
figill. Salom. ℥iv.
pulv. pisorum ℥ss.
Incisa. D.

Balneo huius decoctionis aliquoties æger insidere poterit, novam semper Aquam recipiendo: tunc pisorum pulvis nodulo laxiori inclusus esse debet.

Infessus s. Semicupium pro gravida, ad facilitandum partum.

℞. *Hb. malvæ*
alth.
melissæ
Flor. chamom. ana m. iij.
malvæ
melil. ana m. j.
sem lini.
fœnugr. ana unc. iij.
rad. Alth. unc. iv.
Incisa D. ad Chartam. S.
 Species zum Bade.

Decocto harum gravida insideat, quamdiu c. euphoria fieri potest, idque ferè alternis diebus, imminente partu: deterfo dolore in lectum se componat, illinendo postmodum lumbos, regiones umbilici & lumborum Linimento ex mucilag. sem. lini, fœnugræci, alth. ol. amygd. d. lil. albor. &c. Hæ ipsæ species modò additione bacc. juniperi magis quasi appropriatæ reddantur, pro semicupio in quibusvis doloribus nephriticis commodè eodem modo adhiberi possunt, ungendo postmodum partes dolentes ungu. de althæa, ol. scorpion. ol. destill. therebinth. &c.

Pertinet huc etiam Infessus Vinaceorum, vel per se ex fermentationis motu, vel inspersa C. vivâ sensiliùs incalescentium, in malo Ischiadico, doloribus crurum scorbuticis, præsertim nocturnis, aliisque contumacioribus, & inde paralytica dependente dispositione, perquam proficius.

§. 22. Quoad Balnea particularia s. Lotiones, nulla & hinc ab alijs præscribendi modis differentia.

Pediluvium ad firmandos articulos, podagrâ debilitatos; simul à crebriori recidiva præservans.

℞. *bacc. juniper.* ℥ss.
Hb. rorismarin. m. vi.
serpill.
salviæ. ana m. ij.
 D. S.

Species zum Fuß-Bad.

Lotio Manuum contra Maculas & pustulas, à scabie, variolis &c. relictas.

℞. ∇. C. *vivæ.* ℥ij.
Sulph. pulv. unc. i.
Ebulliant invicem.
Colat. adde
 ∇ *rosar.* unc. j.
 M. D. S.

Reinigend Wasser.

Additione & mitione simplici sacchari Saturni ℥ij. ad iij. erit lotio appropriata ad maculas hepaticas.

Coq. in f. q. Lixivii comm. non adeò acris. Decocto decantato, cum vel sine colatura, immittuntur pedes, coërcendo halitus integumento, vasi superimposito: conservando æstum, vel novum decoctum fervidum, vel filicem candefactum superaddendo: pedes extracti probè abluti, calidis linteis involvantur, & quies ipsis concedatur. Species hæ 3. l. 4. coqui dicto modo, & adhiberi possunt.

Lotio contra foetorem axillarum, pedum, aliorumve locorum.

℞. *H. scordii.*
plantag.
fol. quercus ana m. i.
 Coq. in f. q. ∇ comm.

Colat.

Colat. R. *Thiſſ.* adde
ſolut. lithargyr. Oei c. 40 fact.
unc. iij.

M. pro Lotione. D.

R. *Fol. quercus* m. iij.
ſummit. origan. m. ij.
fl. roſ. rubr. m. j.
Ois unc. iſſ.

D. S. Species.

coquantur in Aqu. comm. adhibeantur pro lotione, ſed ſemper cautè.

Lotio Capitis in Caſu Capillorum.

R. *Abrotan. mar.*
Capill. Ven. maj. ana m. j.
fl. roſ. marin.
Lavend. ana pug. iij.
rad. lapath. maj.
peuced. ana unc. j.
urtic. maj.
ſem. fœnugr. ana unc. ſſ.
ladan. el. z iij.

Affunde ſ. q. lixivii, ſtent in digeſt. per aliquot dies, ebulliant leniter & exprimantur.

Hoc ipſo caput abluatur, & linte ſtepidis detergatur: illinatur poſtmodum Ungu. Bucetii experto, &c. Dum verò horum beneficio denuò creſcunt pili, loco lixivii in Vino dilutiori vel modice adſtringentè ſpecies pro lotione capitis coquendæ. Facit huc Decoct. h. & rad. malvæ c. piſis in Urina humana, quod pro lotione capitis infantum in tinea, etiam graviffima, it. furfuratione capitis, multum valet.

§. 23. Hæc ſunt balnea propriè dicta, humida ſcilicèt; ſunt & impropriè dicta, fortuum vaporoforum inſtar, quæ ſpeciali nomine Balnea Laconica, it. Stufæ, it. Sudatoria, appellantur. In his Vapor ſaltem calidus plus minùs medicatus, vel univerſaliter vel particulariter corpus aut partes quaſdam afficit: idque pro ſcopo vel ſudandi univerſaliter, vel diſcutiendi & leniendi particulariter. Vapor uſitatiffimè hodie in Laconico excitatur, vel ex Aqu. fervente ſimplici, aut Decoctione certâ medicata, vel ex Sp. V. incenſo, quorum hoc præferendum illi: mirum quantum penetret univerſum corporis habitum Spiritus vini calor: d. ſubjectis humidioribus & ſucculentioribus, item quæ atonia Viſcerum laborant, magis, quàm qui ſiccioris ſunt habitus, convenit; his enim prior modus magis appropriatus. Perficitur utrumque in domunculo peculiari ligneo, notæ jam paſſim formæ, in quo æger ad collum uſque erectus ſedeat, dum ex fundo vapor exſurgens totum alterat. Eminent hæc inter balnea ſicca medicata, in ſpecie Balneum ex ſuffitu decocti cubilis formicarum, in artuum dolore, paralyſi, rigiditate & ſimilibus malis, ſcorbuti apud nos familiariori progenie, admodum laudatum. Præ-

Tom. II. Pars 2.

ter hoc v. cùm rara ſint balnea ſicca univerſalia medicata, ſaltem particularia interdum vapore medicato inſtrui ſolent, ſed nil à fortuum præſcriptione differente. Saltem exempli gratia quoddam peculiare addam:

Laconicum particulare, Cruribus dolore podagrico affectis, item in doloribus illorum ſcorbuticis fixioribus.

R. *Lixivii Coriariorum, jam ab ipſis uſurpati* *Thiſſ.*

Ur. human. *Thiſſ.*

M. D. S. *Eufferliche Behung.*

Ebulliant, & fiat inde ſuffitus pro membris dolentibus deſuper ſituatis, & fornicatim integumentis aptis munitis.

§. 24. Efficacioris ſortus ſpecies eſt

Cataplaſma,

dum maſſa medicamentofa pulſiformis parti cuidam applicatur pro uſu multiplici. Siquidem non rarum, ut poſt præmiſſum forum humidum Cataplaſma applicetur, imò ipſa decoctionis pro ſortu remanentia non rarò capitur, & l. a. tractata, ut Cataplaſma applicatur. Ordinatio nempe fiunt cataplaſmata, dum ſubjecta appropriata mediante lacte & oleo, ubi emolliendum; Vino & Aceto, ubi diſcutiendum & attenuandum; Urina, lixivio, ubi reſolvendum, &c. Ad talem rediguntur conſiſtentiam, ut per ſetaceum pulpæ aut pulſis formâ trajici poſſint, quæ pulſ Cataplaſmatis corpus, majus vel minus, pro partis affectæ & applicationis ratione, conſtituit; cui pro renata interdum & alia deſuper addi ſolent, oleum, mel, pulveres, Electuar. &c. eorumque plus minus, prout vel baſeos vel adjuvantis locum obtinent.

Cataplaſma emolliens & ſuppurans abſceſſus & inflammationes.

R. *Nidi hirundinum interior. c. excrement. abjectis ſtramine, paleis, & cæteris quiſquiliis, no. j.*

albigræci. unc. j.

rad. lil. albor.

althææ ana unc. ij.

fl. chamomill.

melilot. ana m. j.

ſem. fœnugræc.

pyſyllii ana z iij.

althææ unc. ſſ.

ficuum pingu. no. iv.

cepar. unc. ſſ. ad zvi.

Incifa & contuſa coq. in ſ. q. ∇ comm. l. ∇ hordei, vel cereviſ. vel lactis, vel ſeri lactis (pro indicationum ratione) ad conſiſtentiam pulſis: pulpæ per ſetaceum tractæ adde

ol. lil. albor. unc. ij.

chamomill. unc. j.

Croci Orient. z iſſ. ad z iij.

Vitell. ovor. no. iij. M. f. Cataplaſma.

D. S. *Erweichender Brey.*

[Oooo]

De

De quo q. f. calidè applicetur, &, quoties opus, reiteretur.

NB. Semina ista Decoctiōni addita omit-
ti, & illorum loco pulvi traject. farinæ sem. li-
ni, fœnugraci ana ʒß. rad. althææ unc. j. addi
possunt.

Cataplasma contra tumorem brachii,
expertusa in V. S. venâ, & læso nervo.

℞. *H. agrimon.*

chærefol.

chamomill. ana m. j.

rad. symphyt. maj. unc. iij.

sigill. Salomon. unc. j.

sem. lini.

fœnugrac. ana unc. ʒ.

Coq. in f. q. *Aqu. ad consist. pultis*: traji-
ciatur per setaceum.

D. S. **Brey wider die Geschwulst.**

Instillato prius ol. destill. terebinthinæ
vulnuscūlo, applicatur calidè, addendo cui-
libet portioni sub applicatione ~ theriacalis,
vel simpl. vel camphor. unc. i. aut q. f.

Cataplasma ad suppressionem Urinæ in
puerpera, ob admissum incautiùs frigus ex-
ternum à partu.

℞. *H. parietar.* m. ij.

chærefol. m. iß.

Coq. ad mollit. pulpæ per setac. trajectæ adde
butyri rec. unc. ij.

olei scorpionum unc. iß.

M. pro Cataplasmate, calidè regioni pu-
bis admovendo.

Subinde pulpa fructuum coctione emol-
lita, ceu cataplasma applicatur, cui & alia
addi possunt, v. g.

Cataplasma ad Bubones Pestilenciales.

℞. *H. parid.* M. iij.

rad. lil. albor. unc. iß.

ficuum pingv. no. iij.

Coqu. in f. q. *communis*: *pulpæ tra-*
jectæ adde

Theriac. unc. ij.

pulv. bufonum unc. iß.

fuligin. Camin. unc. j.

saponis Venet. ʒvj.

c. f. q. *ol. araneæ.* F. Cataplasma:

Cataplasma contra vulnera, dolorem,
percussionem oculorum.

℞. *pulp. pom. dulc. ad mollit. coct.* unc. iv.

mucilag. sem. cydon. c. sperm. ranar.

extr. unc. iß.

sacchar. albiss. ʒiß.

camphor. parum.

M. D. pro Cataplasmate.

Conf. Timæus in *Cas. l. i. cas. 21. p. 48.*

Interdum soli pulveres liquore convenien-
te excepti, cataplasma formant: v. g.

Cataplasma ad tumorem testium ex con-
tusione.

℞. *farin. fabar.* unc. iij.

pulv. sem. cumin. unc. ij.

Coq. in posca f. oxycrato q. f. ad consist. pultis.

D. S. **Bertheilender Brey.**

Sin scrotum ab aceto pruritus aut rosio-
nem sensiliorem incurrat, parum lythargyri
sub decoctione addi potest.

Cataplasma ad hæmorrhagiam Narium.

℞. *argillæ ustæ seu calcinat. ex furno*
pistorio v. g. extract. M. ij.

+ *acerrimi q. f.*

Commixta redigantur in form. Catapla-
smatis:

D. S. **Eufferlicher Umschlag.**

Frigidè immediatè fronti cum temporibus,
ac nuchæ cum linteo applicatur.

Imo ipsa interdum ingredientia propria
sub consistentia aut mistione mutuâ in Cata-
plasmatis formam coeunt, citra aliud artifi-
cium, succulenta scil. plus minus si fuerint.

Cataplasma contra tumores serosos, &
hydropes particulares.

℞. *Cochlear. c. suis testis cont.* lbj.

pulv. sem. carvi unc. ij.

stercor. caprill. unc. iv.

Misceantur, &, si opus, c. f. q. Vini aut poscæ
redigantur ad consistentiam Cataplasmatum.

Pertinet huc stercus vaccinum, quod
recens, ceu singulare anodynum, cataplasma-
tis forma imponitur, v. gr. podagrâ dolenti-
bus: succurrit pariter aliis doloribus ac tumo-
ribus, præsertim cuiusvis dolori inflammatorio,
vel solum vel cum ol. rosarum impositum:
Sic stercus suillum cum Aqu. fervida suba-
ctum, & abdomini instar Cataplasmatum inster-
nitur egregio successu, sub nimio mensium
fluxu. Cataplasma ex fimo equino in Vino
cocto, vel succus ejus cum micâ panis, se-
cretum est contra Gangrænâ: conf. Cata-
plasma compos. Barbette *Chir. l. i. c. 14.*

Ex fermento pariter solo, additis aliis
quibusdam, extemporanea fiunt Catapla-
smata, eaque propter acrimoniam vel vesici-
cantia, vel rubificantia, adeoque, ut vo-
cant, attrahentia & derivantia.

Cataplasma rubif. contra dolorem synci-
pitis insignem, sæpiùs recurrentem, cum
gravi oculorum dolore, occipiti seu nuchæ
applicandum.

℞. *Ferment. acerrim.* ʒj.

sem. sinapi contus. ʒß. ad ʒvj.

c. f. q. ~ V. subigantur, ad pultis consi-
stentiam: D. S.

Eufferlich aufzulegen.

Possunt, ubi opus est, *sem. eruc.* ʒij. adhuc
pro stimulo addi.

§. 25. Pro Ventriculo in ejusdem qui-
busvis symptomatis plurimis, laudatur catapla-
sma ex fermento c. aromatibus, ad imitatio-
nem Myns. *Arm. f. 37. p. 520. & 524.* sed quam-
diu hæc omnia probe calent, res benè habet;
simul

simul verò ac parum intepuerint, offenditur tactus & cutis, unde nil emolumenti. Expertus hæc scribo; sanè eadem difficultates, quas supra circa Epithematum usum insinuaui, premunt pariter læpius & fons humidus & Cataplasmata. Siquidem hæc tumoribus, præsertim calidis, applicata necessario ex allegata causa pororum constipationi occasionem præbent, & transpirationem, adeo in iisdem necessariam, impediunt, repellunt, & nervosiori loco gangrænam citius accersunt, &c.

§. 26. Communissimus usus extremus, Infus. & Decoctor. est, quando aptis instrumentis certis quibusdam cavitatibus injiciuntur, unde

Injectiones five Enemata,

it. Lavamenta seu Clysteres & Clysmata, ibi secundum Latinos, hic secundum Græcos, dicuntur, quæcunque in partem injectio fiat. Cum verò à potiori ac usitatiori fieri soleat denominatio, propter infusionum talium in anum ac intestina, ceu generalem corporis cloacam, crebritatem, Clysmatis ac Enematis vox ferè his saltem hodie tribuitur, cui consuetudini & nos cedimus. In Clysmate ergo 2. consideranda! 1. decoctus liquor; 2. addenda, vel dissolvenda in eodem, ex quibus emergens compos. ad ℥vj. p. p. adscendat in adulto, rarò ulterius ad ℥xv. infanti unc. ij. ad unc. iij. pro corporis ratione sufficiunt. Decoctum ipsum præ supra dictis nil peculiare obtinet. Addenda sunt Electuar. alterativa aut laxativa ab unc. j. ad unc. ij. mellia à ℥vj. ad unc. j. ol. cocta vel infusa ab ℥ss. ad ℥iij. ol. destill. à ℥j. ad ℥i. ☉ stimulans vel alterans à ℥ss. ad ℥j. subinde etiam Vitella ovor. no. i. vel ij. adjiciuntur. Quod si plura addenda simul fuerint, & horum respectiva proportio attendenda, ut ex omnium miscela una dosis completa pro usu intento exurgat, qui in genere est triplex: vel intestina stimulare & plus minus purgare, vel eadem demulcere, vel contenta in iisdem temperare ac alterare: Quibus ceu 2darius ac accidentarius accedit, aliis partibus variis ob consensum diversimodè prodesse; superstitiosus de cætero est delictus cephalicorum, pectoralium, nephriticorum, hysteri-corum, &c. qui in clysmatum præscriptione subinde instituitur; cum per consensum saltem aut deuteropatiam, vel per quandam consequentiam, aliis partibus auxilium ab iis afferatur. Injiciuntur repidè, vel unâ vel duplici vice, pro excrementorum, flatuum, podicis plus minus dolentis, &c. respectu, semper tamdiu, si possibile, retinendo, donec usui satisfecerint. Instrumenta ferè sunt triplicia: Vesica suilla cum parva fistula apud nos Germanos, siphon amplius apud Gallos, Instrumentum Graffii *Tr. de usu Clyster.* apud Belgas, magis usitatum. Opti-

mum videtur hoc Graffii instrumentum, ab eo tamen non descriptum, forsan imitandum, si intestinum quoddam longius & æquale avis cujusdam debito balsamo, vel terebinthinato, vel ☉* vino, &c. conditur, & aptè tractetur, hinc filo æneo & panno sericeo obvolvatur, &c. Clyster ex fumo Tabaci Anglorum, ceu Anomalous, huc non pertinet. De fumo Tabaci dico; nam qui ex Decocto Tabaci aliis addito parari posset, summè periculosus est, cum usum ejus subitò ac modo applicatus fuerit, præcordiorum anxietates, lipothymias, sudores circa frontem frigidos, totius feralem quasi pallorem, aliaque similia symptomata, insecuta fuisse, noverim.

Clyster Carminativus in Colicâ flatulenta.

℞. *H. chamomill.*

menth. ana. m. j.

bacc. lauri.

juniper. ana ℥ss.

sem. fœniculi,

anisi,

carvi ana ℥ij.

☉ *tart.* ℥iij.

Incis. & contus. coq. in f. q. ☐ *simpl.* vel ubi ☉ *tart.* non additum fuerit, in f. q. ☐ *humane.*

Colat. ℞. ℥ix. adde

Elect. de bacc. lauri ℥vj. ad ℥j.

mell. rutac. ℥ss.

☉ *destill. bacc. lauri* ℥ss. ad ℥j.

M. pro Clysmate. D.

Clyster fortiter stimulans, v. g. in Apoplex. passione hyst. graviori, &c.

℞. *H. salv.*

fl. chamomill. ana m. j.

rad. pyrethri ℥ss. ad ℥vj.

pulp. Colocynth. in pet. lig. ℥j.

(alias subtiliss. ramenta horrenda tormina inferunt, & aliquandiu post se relinquunt; quod non putassem, nisi experientiâ confirmatus fuisset)

Coq. in f. aq. Comm.

Colaturæ ℥ix. adde

Elect. hier. picr. ℥j.

mell. anthos. ℥vj.

castor. scrup. j.

☉ *gemm.* ℥ss.

M. pro Clysmate. D.

De Electuar. Purgant. Clysmatis additis dubitatur merito, an cujusdam usus sint? siquidem antequam textura crudorum purgantium resolvatur, ita, ut se commodè explicare & insinuare parietibus intestinorum queant, diu erit, quod jam Clysmate rejectum denud fuerit. Ob id potius ipsa fortiora purgantia infundantur, vel decoctum Croci metall. in vino, aut Aqu. bened. officinal. unc. iij. aut syrupus emeticus Salæ ad unc. ss. Decocto jam colato adduntur, præsertim ubi præsentanea magis ope opus fuerit.

[O o o o 2]

Clysmata

Clyfma anodynum antidyfentericum.

℞. *fl. verbasci* m. ij.

sambuci m. j.

Cap. papav. cum sem. no. iij.

Concifa & contufa coquantur in f. q. *lactis bubulichalybeati*.

Colat. ℥bj. adde

sevi Cervin. vel hircin. in vitello ovi diffol.

℥ss. ad 3vj.

M. f. Clyfma.

Loco Capit. papaveris commodè etiam *Philon. Rom.* drachm. j. aut *theriaces non adeo vetust.* 3ij. addi possunt.

Uficator hic fuit Clyfmatum præfcribendorum modus: interdum verò folâ fluidorum mifcelâ clyfter conficitur, citra ullos labores: e.g.

Clyfter temperans, & anodynus polychreflus.

℞. *Lactis bubul.* unc. ix. ad ℥bj.

tereb. Ven. in vitell. ovi diff. 3iij. ad 3ss.

mell. rofat. unc. ss. ad drachm. vj.

M. pro Clyfmate.

Sane terebint. additio plus in recessu habet, ex tali enim Clyfmate paulò diutius retento ☐m intensè violas spirasse, in puerpera olim notavi. Imò solum lac cum pauco addito saccharo, vel cinere clavellato, aut pro ratione Elect. lenitiv. vel de bacc. lauri jam pro Clyfmate anodyno, in scorbuticis præsertim abdominis malis, infervire potest. Ut nihil dicam de Clyfmate ex solis oleis sub secum induratione, aut pertinaciori alvi occlusione, ufitato.

℞. *Ol. rapar.*

liniana unc. iv. ad v.

diacolocynth. unc. ss.

Misc. pro Clyfmate. D.

§. 27. Juxta injectiones in Intestina, frequentiores cæteris sunt istæ in os, pro regionis hujus, & faucium, ac partium conterminarum levamine, variis sub eorum malis, & in genere

Gargarismata

dicuntur. Fiunt frequentius ex decocto appropriato, cui pro re natâ adhuc alia adduntur, omnia in quanto mediocri, nisi crebrius eodem uti conveniat. Utendi modus, sive eluendo, sive gargarizando, sive cum siphone injiciendo fiat, notus est. Præscribendi aut miscendi modus præ aliis Decoctis in genere, aut clysmatis in specie, nil singulare obtinet, nisi in quantum judicium Medici ista ad partem affectam specialem certò applicare norit.

Gargarismus resolvens & discutiens in principio inflammat. faucium aut tonsillarum, &c.

℞. *rad. levistic.* drachm. vi.

apii drachm. iij.

fl. sambuci m. iß.

fol. malv. Mj.

passul. maj. incis. unc. iß.

Coqu. in f. q. *comm.* vel *hordei* vasis opertis: Colat. ℥biß. adde

Θ* *depur.* drachm. ss. ad drachm. j.

M. pro Gargarismate. D. S.

Zertheilend Surget-Wasser.

Sanè loco gargarismatis domestici optimè in his casibus convenit Decoct. hordei vel avenac. in quo parum Θ* dissolutum est; imò sola ☐ humana calida aut calefacta, loco gargarismatis adhibita, subinde artificiosissimè composita superat. Superior gargarismus magistralis mutari etiam, & loco passul. majorum Colaturæ *Mell. vial.* 3j. ad 3iß. *spir. V. theriacal.* 3vj. ad 3j. (aut si malignum ac contagiosum videatur. malum *spir. V. camphor.* 3ss.) *spir. sal. amm.* drachm. ss. ad drachm. j. addi possunt.

Gargarisma anodynum & maturans in statu istarum inflammationum.

℞. *H. malvæ.*

melilot. ana m. j.

rad. althææ unc. j.

ficuum pingu. no. vi.

Coqu. in f. q. *Lactis*, aut ubi ardor & inflammatio intensior, in *sero lactis*:

Colat. ℞. ℥biß. ad ℥bij.

Et vel nude ita usurpetur, vel addito *sy-rupo violaceo*, aut *melle despumato* pauco, adhibeatur.

Sin suspicio sit materiam suppurandam pituitosiorum ac viscidiorum existere, *saponis Veneti* nonnihil unâ incoqui potest: quod etiam locum habet, ubi citius maturare abscessum est animus.

Gargarismus in loquela amissa post Apoplexiam.

℞. *HB. salvie.*

rorismar.

major. ana. M. j.

rad. pyrethri drachm. iij ad unc. ss.

sem. cruce.

sinapi ana drachm. iß.

caryophyll. drachm. j.

Coqu. in f. q. *Aquæ communis*:

Colaturæ unc. x. ad ℥bj. adde

~ *Ceras. nigr.* vel *bacc. juniper.* 3iß.

Θ* c. Ψ drachm. iij.

mell. anthosat. drachm. vj. M. D. S.

Mistur zum Munde.

Gargarismata contra scorbutum oris.

℞. *b. salvie.*

cochl. ana m. ij.

Coqu. in f. q. *lactis* vel *ejus feri.*

Colat. ℥bij. adde

succi Cochl. unc. ij.

syr. aquileg. unc. iv.

M. pro collutione oris.

℞. *salv.*

℞. *salv. m. iß.*

fl. malv. hortens. rubr. m. j.

rad. polypod. ʒß.

Coqu. in ℥bj. *Aqu. fontane:*

Colat. adde

mel. rosar. unc. iß.

℞ *uñi* drachm. j.

℞ *ʒiati, l. Di depur. ʒiß. M.*

Si serum lactis sumptum fuerit, *spir. sal. ʒj.*
vel q. s. addi poterit.

Subinde verò citra laboriosam præparationem simplex liquor, aut saltem miscibilium extemporanea unio, Aquis destillatis hic potissimum inservientibus, ad gargarismum constituendum sufficit; nam decoctum raparum siccarum in faucium inflammationibus, in incremento & statu optimum. Lac in asperitate faucium earumque phlogosis, cum paucosaccharo vel ℞ interdum abunde sufficit; Vel

Gargarisma in nimia salivatione.

℞. *Aqu. prunell.*

semperviv. ana ℥bß.

tinctur. bellid. ʒj.

alum. crudi ʒß. ad ʒij.

styr. rosar. rubr. l. myrtill. ʒß. ad ʒj.
M. pro Gargarismate.

§. 28. Fuerunt hi modi præscribendi Injectiones in Praxi frequentiores, præter quas aliis partibus, earumque cavitatibus, vel naturalibus l. p. n. vulneribus, ulceribus sinuosis, fistulis: &c. Injectiones variæ adhibentur; nunc in genere siphonis ope, unc in specie in uterum per Metrenchytem, in vesicam per Catheterem, &c. in quibus omnibus nulla ab antecedentibus in præscribendo differentia, nisi in quantum partis affectæ, & affectus ipsius ratio, materiæ selectum & quantum determinare plus minus solet.

Injectio in Vesicam exulceratam, it. in metu cruento & purulento, &c.

℞. *HB. agrimon.*

Plantag. ana M. j.

rad. liquirit. mund. ʒß.

Coqu. in ∇ *ferrar. ʒix. ad ℥bj.*

ad tertix partis casum.

Colaturæ ℥bß. ad unc. viii. adde

mellis rosar. unc. j.

Ess. resin. aloës cum spir. V. extr. ʒß.

M. pro Injectione: S. **Heilende Einsprühung.**

Imò solum lac, cui therebinthina cum Vitello ovi soluta permista, cum paucosaccharo sufficit, pro leniendi scil. scopo & temperandi, dum istud magis intentioni purificandi inservit.

Injectio in Penem, in Gonorrhoeâ Malignâ.

℞. *Aqu. Ψæ ʒiij.*

aloës hepat. ʒß.

(vel ejus loco *Essent. aloës ʒiij.*)

mell. rosar. unc. ʒ. ad ʒvj.

M. S.

Eusserliche Mistur zum Einsprühen.

Malum ubi pertinacius fuerit, cum vel sine aloë & dulc. simul addendus à ʒj. ad ʒß. imminuendo mel ad drachm. iij. præter propter.

Injectio in Uterum, tam hæmorrhagiâ nimia, quàm fluore albo affectum.

℞. *visci quercini ʒij.*

cortic. granator. unc. j.

aluminis,

thuris ana unc. ʒ.

mastic. drachm. ij.

flor. balauft.

ros. rubr. ana m. ʒ.

(in fluore albo ligni sancti unc. iij. illius loco capere amant.) Infund. in *Aqu. comm. ℥bij.*

Macerentur per 24. horas, ebulliant lento ligno ad medias, addendo sub finem

Vini rubri austeri ℥bj.

Colatura D. S.

Anhaltende Einsprühung.

Pertinet huc Injectio in nares, in nimia earum hæmorrhagiâ, vid. *Misc. Acad. Nat. Cur. Ann. 2. Obs. 223. p. 324.* In quem Narium usum de facili Decoctum magistrale præscribi posset, simile decantato illi liquori Stryptico de la Vigne Galli, v. g.

℞. *Alumin.*

Vitrioli ana drachm. j.

Phlegm. Vitrioli unc. j. ad unc. iß.

Ebulliant ad dissolutionem contentorum Liquor filtratus ~℥li aliquot guttis.

aciduletur. D. S.

Blutstillendes Wasser.

Vel in mistura extemporanea.

℞. *alum. crud. drachm. ʒ.*

Ψæ Vitrioli dulc. gr. xv. ad ʒj.

Phlegm. ̄li, spir. ̄li nonnihil acidul. ʒiß. ad ʒij.

M. D. Injiciantur naribus, &c.

Sed forsân spir. V. per se rectificatus, naribus paulò profundius injectus, omnibus his præstat; siquidem ab illo quivis sanguis fluidus, etiam calidus, & adhuc recens, citissimè, mirabili c. spectaculo, coagulari solet.

Pro auribus denique similes Injectiones fiunt, nunc laboriosè ex Decoctis, nunc simpliciori modo, concinnatæ: v. g. Injectionem contra Vermes, ex decocto, v. *Barbæ Anat. Præf. l. 2. c. 1. p. 110.* vel sola ̄a, aut Phlegma spir. ̄æ in ulceribus aurium crebrius injectum confert: in malo v. graviori:

℞. *Rad. aristol. rot.*

cortic. granator.

gallor. ana ʒß.

Coqu. in ana *Vini & ∇æ ferrar. ad ℥bß.*

Colaturæ adde

[O o o o 3]

succi

succi plantag.

polygon. ana unc. j.

mell. rosat. ʒss.

M. & injiciantur pro deterfione & cicatrifatione.

Si potentius deterfivum requiratur, Viride Aeris parum, v. g. ʒss. ad drachm. i. addi, & reperita colatura adhiberi poterit.

CLASSIS V.

Inunctiones varias comprehendit.

§. 1. Ultima Classis generalis præscriptionum usitatarum externa saltem subministrat illa, quæ inunguntur, & unguinosâ ac glutinosâ consistentiâ partibus externis adherent; paucissima enim talia sunt, quorum internus etiam sit usus, ut unguent. rubr. portabile, balsamus fœniculi Horstii *Obs. l. II. Obs. 42. p. 109. & l. XI. Obs. 22. p. 558.* Sed hæc particularia & planè singularia nos non remorantur. Basin & Constitutivum omnium externarum inunctionum ferè ʒo & Cera constituunt: Illi cujus 3plex alias nota est differentia, analogæ seu congeneræ & plus minus miscibilia censentur butyrum, pinguedo, medulla, axungia, sebum, fella, resinæ molliores, sâpones, utpote facili de liquabilia, & ʒo instar applicabilia: Cera v. accensentur colophonia, resinæ spissiores, gummata; quorum plura amphibia videntur, dum & in Δ e & ∇ vivunt, s. ʒosis ac ∇ osis menstruis solubilia existunt, quod ex mixture duplicis substantiæ gummosæ, cum incluso copioso nucleo resinoso accedit, tamen ob consistentiam & proprietates respectu Δ & nostri ad ceram referuntur, non secus ac aliæ resinæ spissæ, ut pix quævis, &c. Terebinthina medio intercedit loco, & præter hoc, quod ob vires suas egregias, ob quas meritò balsamum Europœum s. septentrionale audit polychresta sit, utrisque & ʒosis & cereis subjectis sociabile existit; adeò ut gummatis & reliquis uniendis optimè interserviat: ut taceam, resinam hanc & copiosum subministrare ʒo, ceram duriusculam & quasi piceam pariter suggerere: vinculi ergò instar, hæc interdum considerari, interdum, ubi ingredientis primarii vice defungitur, ad ʒoa referri debet. Ordinaria & potiora hæc inunctionum sunt ingredientia; quibus extraordinem non rarò penitus supervacaneè alia adduntur, ut pulveres varii, primariò metallici & minerales, hinc & vegetabilium, (quo & \dagger pertinet) tamdiu ob ∇ ei cum ʒoso incompatibilitatem coquendi, donec quicquid fuerit aquei, exhalaverit. Denique & mel, concretum, ob particularem texturam respectu hætenus recensitorum, sui generis ʒosum in recessu, aquosum tamen & gummosum in superficie, ob id vegetabilium

succis optimè sociabile. Muçilagine denique Vegetabilium quorundam, quæ butyro animalium, adeòque ol. vegetabilium hoc in passu analogæ ferè habentur. Miscentur hæc ingredientia vel sine vel cum igne: sine igne simpliciter per tritum, species cum ol. in mortario subigendo, sensim ol. affundendo, ita tritum continuando, donec debitam consistentiam acquisiverint; quod nutritum alias dicitur, & in Empl. Tria-Pharmaco Mesue locum invenit: cum igne, oleo & ceræ invicem liquatis alia addendo, interdum etiam, ubi opus est, colando: cujus exempla passim prostant.

§. 2. Prout jam variat ingredientium horum proportio, etiam coalescens inde variat inunctio: Dum enim ʒosa sola, aut cum illorum unc. j. ceræ ʒj. pulverum ʒss. miscentur, Linimentum dicitur; dum vero 2plum modo dictorum ad ʒj. ʒosorum sumitur, Unguentum appellant: Ex opposito ubi Ceræ est præ eminentia, ita ut Ceræ ʒiʒ. ʒo ʒj. pulveris ʒiʒ. ad ʒij. coeant, Ceratum audit; sin v. Ceræ & ʒo ana ʒj. pulv. ʒss. in genere misceantur, Emplastrum habebitur, cui tantum non omni terebinthina proportionem moderatâ solet addi: quod si emplastro liquefacto immergatur linteum cujuscunque figuræ, ita ut utrinque eodem educatur, Spanadrapum dicitur. Uno nomine; magna hîc de re exili fabula; promte enim ex Unguento Linimentum, ex utroque additione Ceræ Ceratum, hinc cum terebinthina emplastrum, & ex hoc per copiam olei unguentum fieri potest. Quod si pix baseos locum occupet in Emplastro, egregiè hinc penetrante & resolvente Picatio, it. Dropax, appellatur.

§. 3. Linimenta facillimæ sunt præscriptionis; quæ si ex oleis fiant destillatis, conveniente corpore exceptis, (aliàs acrimoniâ suâ pruritus, pustulas, ardorem, &c. excitant) quod usitatius est oleum nucistæ expressum, Balsami magistrales vocantur, ad officinalium differentiam, quæ ferè olea destillata composita esse solent.

Linimentum s. Balsamum Stomachale.

ʒ. ʒo destillat. bacc. junip. ʒj.

menthæ ʒss.

macis,

caryophyll. ana ʒss.

Cum s. q. *Ol. nucistæ ex pr. f. Balsamus.*
D. S.

Magen-Balsam.

Inungitur sine alio apparatu regioni ventriculi, præsertim isti, quam scrobiculum cordis vulgo appellant, & latere probe calefacto desuper imposito, vis penetrativa oleorum destillatorum animatur, ut eò citius & potentius interiora verius penetrent. Non est

est particularum volatiliū harum interior penetratio de nihilo. Memini aliquando, extali balsamo applicato ob crebriorem vomitum agrum à me interrogatum, cujus qualitatis & saporis sint ista rejecta? respondisse, percipere se in iisdem eundem saporem, qualem odorem ex Linimento applicato aliàs perciperet.

Linimentum contra gravedinem & narium obstructionem.

℞. *o. irin.*

nicot. ana ʒi.

nigell. per express. ʒß.

destillat. major.

anisi ana gutt. ij.

M. f. Linimentum:

D. S.

Eröffnend Sälblein zur Nase.

Quo nares crebrius internè inungantur. Olea, quodocunque absolute præscribuntur, per infus. aut decoct. intelliguntur.

Linimentum contra dolorem pleuriticum.

℞. *Pingued. murment.* ʒß.

liquefact. adde.

olei chamomillæ ʒij.

absinth. ʒj.

destill. cumin. ʒß.

croci scrup. j.

Camph. ʒß.

M. f. Linim.

D. S.

Pinderend Sälblein.

Litus Carminativus.

℞. *o. Chamom.*

anethi ana ʒij.

destillat. chamom.

anisi.

carvi,

lauri ana scrup. j.

c. f. q. *ol. nucist. express.* F. Balsamus:

Vel c. f. q. *cereæ* aut *empl. de bacc. lauri*

F. Unguentum.

quibus si addatur gummi Tacamah. c. f. q. tereb. malaxata, F. Emplastrum

Non rarum est unguenta recipi officinalia, & additione olei appropriati, aliorumve redigi in linimenta.

Linimentum somniferum.

℞. *Ol. express. papav. alb.* ʒij.

hyssyam. ʒß.

M. D. S.

Eusserlich Del zum Schlaf.

Vel *Ungu. alabastrin.* ʒiij. f. Unguentum:

D. S.

Schlaff-Sälblein.

Linimentum in dolore Nephritico.

℞. *Ungu. de althea.* ʒiß.

ol. lil. albor.

amygd. dulc. ana ʒß.

scorpion. ʒiij.

petrol. alb. ʒiß.

ol. destill. juniper. ʒß.

M. F. Linim. D. S.

Stillend Sälblein.

Interdum alia, modo sub mistione debitam consistentiam acquirant, in Linimenti formâ præscribuntur: e. g. sit

Linimentum ad pediculos.

℞. *pulv. Coccul. de Levante,* vel *rad. gentianæ* ʒiß.

hellebori alb. ʒß.

c. f. q. *ol. nicotian.* F. Linimentum:

Irrorentur sub mistione aliquot gutt. *ol. dest.*

spic. e. F. Linim.

D. S.

Sälblein gegen das Ungeziffer.

Linimentum contra Lumbricos.

℞. *Aloes hepat.* ʒij.

myrrhæ. el. ʒß. ad ʒij.

c. f. q. *fell. tauri* subacta.

D. S.

Burn-Sälblein.

Frustulæ vesicæ bubulæ l. suillæ palmæ magnitud. superinducitur, & ita umbilico applicatur relinquendo, quandiu adhæret.

Contra Odontalgiam & junctam Hemisraniam:

℞. *Theriac. Androm.*

Tacamahac. cum quarta sui parte

Bals. Peruv. malax. ana ʒß.

D. S.

Stillendes Sälblein.

Inducitur in mediocri consist. super lintum, & applicatur universæ malæ dolenti.

Quod si phlogosis quasi erysipelacea adsit, omissa Tacamah. *o. absinth.* ad ʒj. c. *Theriac.* ʒß. vel ʒvj. subigi, & ita admoveri possunt.

§. 4. Unguenta quod attinet præscribendi modum, cum hæc majoris subinde sint apparatus, ac tardius ob id perficiantur, ordinariò ferè unguentum quoddam officinale recipitur, & aliorum additione proportionatâ affectui conveniens redditur: e. g.

Unguent. contra scabiem expertum.

℞. *Ungu. enulat.* ʒj.

flor. ʒis ʒij.

o. drachm. i.

c. f. q. *ol. nicotian.* F. Unguent.

D. S.

Reinigend Sälblein.

Quod si loco ʒis, & sociandi ipsi semper alcalisati, recipiatur *Mercur. dulc.* ʒi. ad ʒij. iisdem, & longe pluribus usibus, in affectibus cutaneis hoc ipsum inserviet. Utrinque saltem articulationi crurum circa genua & poplitem, ac brachiorum, circa cubitum & carpum; in graviori malo etiam circa digitorum interstitia, illinitur: idque saltem vesperi sub introitu lecti, partes à frigore bene

nè muniendo, manè v. manum ☐a calidâ abluendo.

Unguent. in dolore capitis febrili.

℞. *Unguent. alabastrin.* ʒiij.

Philon. Rom. ʒß.

ol. nucist. express. gr. ix.

M. F. Ungu. D. S.

Sälblein zum Schlâffen.

Ungu. contra scorbutum oris, aut cognata symptomata:

℞. *Pulv. rad. bistort.*

fl. balauß.

ros. arbor. ana ʒi.

myrrhæ. el.

Oust. ana ʒi. ad ʒß.

mell. rosat. q. f.

Melli ad ignem liquefacto calenti inspergantur sensim pulveres, M. F. Unguentum. Illinuntur gingivæ hoc ipso bis l. ter de die, præsertim à pastu, deinde Vino rubro vel alio simplici abluantur.

Imò mel solum depuratum aut rosat. c. ☐is ad sufficientem acorem tinctum, ceu optimum Linimentum laudatur: vid. *Deckers Comm. in Barbette l. 3. c. 3. p. 156.* elegans ibi Linimentum contra scorbutum oris: Sicut ipse *Barbette l. 3. Chir. c. 6.* elegans unguentum magistrale per frictionem in butyro contra ambusta describit.

§. 5. Emplastrorum par ferè ac Unguentorum est ratio. Ob laboriosiore apparatum Officinalia recipiuntur, & vel sola, vel additis aliis ingredientibus, oleo vel liquore simili, ut eò commodius alutæ vel linteo crasso (*Parchend*) superinducantur, malaxata, in sua massâ, pro repetito usu præscribuntur, vel certâ sub figurâ aut notâ, ex partis affectû ratione, aut ignota, cujus Archetypus in charta simul transmittitur, ad cujus imitationem alutæ inducenda. Ipsum Emplastrum vel cuti immediatè applicatur pro meliori odoris medicati penetratione & operatione, vel mediatè, idque nunc in delicatioribus, quibus unguinum cuti adhæsiō molesta est, nunc in neutris, & quibus pruritus, pustulæ, excoriatio, phlogosis, &c. per emplastra, præsertim quæ gummata copiosius recipiunt, excitatur: Sin posterius, syndone obducenda præcipiuntur, si v. prius, absque syndone: Mihi ferè media placet via, ut saltem circa marginem, ad latitudinem digiti transversī syndo assuatur, uti ita intentioni Medici therapeuticæ, & Cosmerices ægri studio satisfiat: utut suprâ allegata incommoda minus hoc modo evitari queant, minus tamen defluere hoc modo molliora emplastra partibus, & facilius separari, quæ tenacius adhærent, solent. Calidis postmodum linteis vel lateribus operatio promoveatur.

Emplastrum stomachale.

℞. *Empl. stomach. Craton.*

gumm. tacamah. ana q. f.

malax: c. f. q. *ol. stomachal. Crat.* inducantur super alutam, fiat scutum stomachale in formâ usit: absque syndone: irroretur *ol. destill. menthæ.*

D. S.

Magen-Pflaster.

Contra Cardialgiam Emplastr. Magistr. & ob id simplicius.

℞. *Gumm. Tacamahac.* vel *Caranæ* ʒiß. l. q. f. l. part. iij.

bals. Peruvian. ʒß. l. part. j.

malaxata probè inducantur super alutam. F. scutum stomachale:

obduc. *syndone rubro:*

D. S.

Zertheilend Pflaster.

Emplastrum ad passionem hysterica.

℞. *Empl. matric. de galban. usit.* p. ij. f. ʒi.

gummi galban. in ☐ solut. p. i. f. ʒß.

malax. c. f. q. *olei castorei*, inducantur super alutam F. Emplastr. rotund. in forma orbis medii, vel paulo amplius, absque syndone: irroretur *ol. destill. succin.*

D. S.

Mutter-Pflaster.

Aliud Magistrale.

℞. *Gumm. galban. in V. l. ☐ ad pult.* consist. liquef. q. f. vel ʒiß.

Extract. castorei.

croci ana ʒij.

Ol. destill. succini,

spicæ, ana ʒi.

M. in consist. Emplastri, induc. super alutam &c.

Emplastra pro Splene dolente, tumido, &c.

℞. *Empl. splenetic. usit.*

de Ran. cum duplic. ☐ ana q. f.

malax. c. f. q. *ol. destill. succini*, aut *galban. Paracels.* inducatur super alutam F. Empl. in forma pro splene usitata absque syndone.

D. S.

Milch-Pflaster.

℞. *Empl. de Ran. cum ☐ duplic. ʒi.*

gumm. ammon. cum acet. ad pult. consist. red. ʒß.

Opii in acet sol. ☐ inspiss. ʒß.

malax. c. f. q. *ol. destill. juniperi* vel *Philosophor.* F. Emplastrum.

Emplastrum Saturninum pro usu externo vario.

℞. *Minii* vel *hi calcin.* q. v.

Ebulliat in f. q. ☐, quod calidum ita misceatur cum ol. amygdal. d. l. rapar. l. lini recent. continuò agitando, & nutritu bene miscendo: F. Unguentum (addendo circa finem camphor. cum ol. simili subacta q. f.) cum cera v. unâ liquefacta Emplastrum.

Aliud.

Aliud, rudiori Minerva laboratum, sed usu præstans.

℞. *Minii*,
cerussæ
+ *vini*

Ol. commun. ana qu. v.

Mista invicem stent aliquandiu in digestionem crebrius agitando, tandem calore aucto sub continuâ agitatione in emplastr. consist. inspissando, & dum liquidum adhuc erit, à crassamento superfluo in fundo removendo.

Emplastrum ex Pice, seu Dropax, contra dolorem Ischiadicum.

℞. *Picis naval.* ʒij.
Terebinth. ʒij.

Liquefactis, & ubi opus fuerit, adhuc cum ol. chamomill. q. s. subactis, adde successive inspergendo & benè agitando

pulv. succini,
maslich. ana ʒj.

flor. ʒis ʒij.

M. inducantur super alutam aut linteum crassum in forma quadrata oblongâ; vel in formâ transmissa absque syndone.

D. S. Zertheilend Pflaster.

Egregium in Ischiade, ut & in doloribus circa os sacrum, ac Ischium, ex nimia onerum gestatione, aut simili causâ externâ internum partium nexum plus minus lædente, natis, præscriptum ad imitat Poterii *Cent. 2. c. 13. & c. 58.*

§. 6. Equidem hæc ita pauca satis esse videntur; quoniam vero vix ulla in compositione plures errores committi videntur, quàm harum inunctionum, pauca quædam adjicere allubescit. Usus omnium harum inunctionum, ceu Topici saltem remedii, adeoque particulari tantum cujusdem privatæ usui destinati, ingenere triplex esse videtur: 1. Robur partis vitale, in spiritu insito fundatum, vi quasi balsamicâ firmare & roborare: Ab illo enim efficienter, ut nutritionis medio partis conservatio, ita & restitutio, unde vulnerum, ulcerum, fructurarum, plurium tumorum, curationes. Nil verò magis huic inimicum est, quam transpiratio prohibita, undecunque oriunda; hac enim ipsius tertie digestionis sordes principaliter evacuantur; quibus retentis œconomia partis turbatur, spirituum motus sufflaminatur, tandem ipsis quasi suffocatis gangræna inducitur. 2. Robur partis animale in eutonia fibrarum mediante spiritu influo conservare, quin imò relaxatam illam roborare, & appropriatis humiditatem lymphatico-ferosam discutere & absorbere; nunc contractam blande lenire, & quasi rigidiores fibras emollire, & denique vitiatam in dolore, cui semper aliquid spasmodici plus minus solet esse junctum, demulcere & spirituum sedato undecunque na-

Tom. II. Pars 2.

to orgasmo in naturalem tonum restituere: unde emollientia & anodyna, sæpius solent esse reciproca. Rarum est, quod irriteretur tonus fibrarum acrioribus, unde ex illarum strictura & pororum contractura, modificato contentorum motu, effectus attractionis, rubificationis, vesicationis, &c. ferè insequi solent. 3. Heterogeneum istud, aut p. n. topicorum affectuum occasionalem causam corripere & alterare, seu temperare & coquere, hinc & plus minus remove per illa, quæ humectare, resolvere, attenuare, maturare, suppurare, &c. dicuntur: in quo puncto, acidum quæ corrigunt, & hinc viscidum resolvunt ac attenuant, tantum non primatum obtinent.

§. 7. Quibus præsuppositis, 2. in legitimâ inunctionum, si non omnium, saltem usitatorum, compositione & præscriptione observanda moneo: 1. ut ex Volatili seu facile resolubili consistat materia; 2. nihil iis admisceatur, quod nequeat per totum homogenealiter resolveri; id quod Helmontius imprimis inculcat *Pharmac. & Dispens. Modern. §. 57.* Prius quod attinet, agunt in nos inunctiones vel mediata, vel immediata: ibi odorati instar penetrantiû, hic contactu suo corporali: ibi in affectibus externis, vel internis, sed profundius radicatis; hic in externis. Hinc enim passim pro ventriculi, &c. malis ol. destill. recipere consuetum est, cum externa in inflammatione Saturninum quoddam emplastrum, aut pulv. ex Creta, Saturno, &c. ut in erysipelate, inspersus, magis in usu sint. De prioribus E. ut imprimis intelligendum axioma, tamen & in posteriori quantum possibile observandum. Siquidem cujusunque intentionis gratiâ applicantur inunctiones, semper pororum oclusio præcavenda, qua superveniente necessario Œconomia vitalis partis privata turbatur. Ergo vitanda sunt nimis unctiosa, viscosa, glutinosa, tenacia quæ poros oblinunt & pertinaciter infarciunt, unde præter modò insinuata incommoda, partim, ipsa agere interius aut operari quicquam nequeunt, partim juncta alia impediunt: E contra, quæ subtiliora sunt, penetrantia magis, & ita poros potius aperientia, præter hoc, quod nullum nocumentum parti inferant, saltem in faciendo suo officio & speciatim alteranda causa occasionali, erunt optima. Burrho sane hæc debetur laus secundum Borrichium ad Bartolin. *Cent. 3. Epist. hujus epist. 89. pag. 387. omnia ipsius Emplastra ex volatili materia constare, adeo, ut unguentum pridie illitum postridie vix appareat usquam; damnatque medicos, quod crassa illa corpora in emplastri formas compingant, quæ pororum angustias in aegris nequeant subire.* Ac sane notabile est hoc ipsum in affectibus talibus, in quibus minus

[Pppp]

locum

locum habere hic modus externorum remedium videri queat, nempe in Hernia intestinali, tamen proficuum perquam observatum fuisse: Riverius *Obs. commun. prope finem obs.* 14. p. 371. Modi Unguentorum ex resolubilibus adeò, ac tantum non volatilibus, componendorum, forsam varii in veniri possint, modo consideremus glutinosum, ac viscosum, ac quod tenax simul hinc existere solet, materialiter ex acido & pingui, illo agente, hoc patiente, sub determinata formali texturâ coalescere: unde modo corrigatur acidum citra fixationem, oleosum seu pingue eo ipso simul resolubilius, diffusibilius, & cuiusvis acris potentius temperativum, effectivè refrigerans evadet. Ob hanc causam pluribus in Ungu. & Empl. butyrum recens non salitum, oleo expresso, præsertim olivarum communi, longè præferendum puto; præ hoc enim illud est tenerius, minus acido occulto concentratum, adeoque minus viscidum, promptius penetrat, citius discutitur, magis est temperativum, præsertim Θ si, & potentius alterativum. Scopus ergo iste unguinalia resolubilia præparandi variis forsam modis obtineri possit: suggestit jam quendam Decker *Comment. in Barbette Prax. l. 2. c. 2 p. 59.* Alius ulteriori scrutinio dignus fit cum terebinthina puta, cum Θ ibus vol. \square os. in f. q. ∇ x destill. solut. aut cum spir Θ * ci, in mortario trituræ ope benè miscendo, coeunt mutuò in crassamentum album, moderatè spissum, ita ut emplastri modo induci possit: quod cuti admotum promptè vim suam citra insigniorem remanentiam exercebit, & additione oleor. destillator. non adeò acrium ulterius determinari poterit. Tentaminis ergò in pleuritide notha cuidam graviter affecto præscripsi;

1. Θ vol. \square x $\text{z} \text{ij}$.
solve in ∇ destillatæ
therebinth. $\text{z} \text{ij}$.

Misceantur in mortariolo lapideo successivè, celerius tamen paulò solutionem affundendo, & concitatori tritu subigendo: adde (pro meliori saltem sub tentaminis primi auspicii, successu) Empl. de melilot. parum q. s. pro consist. emplastri. Applicetur; idque factum successu non contemnendo. Facere huc quoque videtur ∇ Ψ x cum ol. rosato, quæ ambo ritè mista coeunt in consistentiam butyri, ad ambusta, præsertim vulnera, ulcera, &c. egregii: cuius applicati vestigia pariter nulla sunt conspicua. Huic pro aliis usibus etiam sacch. $\text{h} \text{ni}$ aliquantulum addi, & inspergendo sub tritu in mortario uniri potest; v. g. *Aqu. Ψ x. $\text{z} \text{ij}$. olei rosat. $\text{z} \text{ij}$. sacch. Saturn. $\text{z} \text{ij}$. M. $\text{h} \text{no}$ licet obscuris suis vestigiis se prodente. Sed aliis alios hæc persequendi modos relinquamus.*

\S . 8. Alterum quod attinet axioma; sanè in genere, quæ vel misceri nequeunt, ut

∇ osa & oleosa, vel quæ mista se invicem obtundunt, ut pulveres varii, Cera ac ol. inviscati, frustra omnino compinguntur, cum vires debitas exserere nequeant. Officinalia E. Unguina, aut passim à Præcticis usitata, quanta egent correctione? Unde & non rarò simplicia quædam, & à Rusticis plebejis vè levi artificio conflata unguenta, subinde artificiosissimè compositis & selectis officinalibus præstant. Sanè ol. ex vegetabilium Decoctione & infus. parum valent, cum de gummosa horum substantiâ nil, de aromaticâ resinosâ in illa quasi concentrata, parum capiant. Pulveres vegetabilium ac mineralium, oleosis pinguibus & glutinosis inviscati, parum vel nil omninò præstant, adeò ut plures tales compositiones de Nihili dicendæ forent; cum econtrâ sub libertate sua inspersi, inflamm. erysipel. cuti exulceratæ, quæ Emplastr. ferre nequit, ulceribus manantibus, & similibus affectibus externis, suum quod est, faciunt, ut v. g. de lap. calaminari, lacte Lunæ, creta, C. C. usto, nuce mosch. aloë &c. notum est, quæ incarcerata squalent sine usu; simili ferè modo, ac farinæ Vegetabilium, fotuum aut Cataplasmatum sub forma subinde proficuae existunt, quæ ol. ceræque susceptæ, inermes redduntur. Unde & omnes inunctiones, quæ adstringendi, firmandi, exsiccandi, &c. scopo in herniis, imminente abortu, prolapsu uteri, ulceribus, &c. applicantur, ceu contradictoria rejicienda: pulveres styptici inviscati sunt frustranei, aut saltem ad extimam cutis superficiem sphœra activitatis eorum terminatur: pinguibus intereà calore actuatis, fibrarum, etiam profundius sitarum, resolutione ac emollitione contrarium intentioni Medici operantibus. Observarunt hoc jam plures, & quæ mutua solutionis actione in se agere plus minus, & se invicem unire, & ita citra impedimentum operari mutuò possunt, inunctionum in formam univerunt. Singulare quid h hic obtinet, qui 4ta Chirurgiæ hodiernæ videtur columna, quod vel in se solus, vel h o subactus, promptè cum acido olei cuiusvis, intercedente præsertim coctione, coeat, ac ita emplastrum polychresta constituat, dum ipsum in se arrosus quidem, sed nondum saturatus, acido suo compari, acidi p. n. tumorum, vulnorum, & ulcerum patris pessimi, potentioris spicula recipit & secum retinet, dum pingues & oleosæ, à concentrante in viscidum acido liberatæ non nihil, magis alcalinæ fiunt, & resolubiles, magisque penetrativæ & temperativæ. Ex quo fundamento tanta Saturninorum emplastrorum & compositio & varietas plus minus concinna enata fuit. Quæ tamen vel obiter saltem, cum præparationem ferè magis officinalem, quàm præscriptionem magistralem sapiant, ceu à scopo nostro aliena, insinuasle sufficiat.

DISSERTATIO MEDICA X.

DE

SINGULARIBUS,

Quam
LOCO DISPUTATIONIS ORDINARIÆ
proposuit

Gottfried Belsch /

Phil. & Med. Doctor & P.P.

RESPONDENTE

M. MICHAELE ETTMÜLLERO, Lipsiensi.

d. 2. Octob. Anno 1663.

JESU JUV A:

*S*ingulare hæcenus in Praxi Medicâ fuisse, quod Morborum, nisi omnium, plerumque tamen, Curatio non amplius ex præscriptâ & recepta Dogmaticorum Methodo, sed vel solo, vel maxima tamen ex parte, Singularium ita dictorum usu, à non paucis passim tractaretur, neminem esse auguror, quem lateat; Quod ipsum tamen cum Bonis, Eruditis ac Rationalibus Medicis omnibus, velex eo tantum maximè suspectum videatur, quod Singularium ita dictorum Natura, & agendi ac operandi Vis, ipsos ut plurimum non minus Autores, & Inventores non paucos, quàm alios Eruditos quosvis, latere penè, persuasum pariter ac compertum esset; placuit hac vice, dum Ordinariam habere Disputationem Ordinis ratio me jubet, de Vera ac Genuina Singularium Natura hoc tantum proferre, quod, nisi essentiam & formalitatem Ipsorum planè exhauriat, Doctioribus tamen aliis, in hanc subjectam materiam penitus inquirendi, & Publicæ adeò Ægrotantium salutis benè ac salutariter prospiciendi, ansam præbeat.

Ut autem in Publici gratiam, & Veritatis studio, id tantum dicatur, quod verum est, faxit Is, qui ipse Solus est Veritas!

Thesis I.



AD rem ergò accedens, circa Etymologiam pluribus non sum sollicitus, quàm quod dicam; Singulare vi Nominis id denotare, quod singulariter inherere, vel ita inesse alicui dicitur, ut nulli alii commune sit; atque adeo in Foro Medico id significare videatur, quod sub specie vel formâ latentis alicujus inhaerentia, hoc est, Singulâri, ac sibi propriâ Vi, Virtute, efficaciâ & proprietate, aliquid agat, faciat, & efficiat.

Thes. II. Ita, ut inter Arcana, Secreta, Specifica, & Singularia dicta (Panaceas enim propriè sic dictas cum Dogmaticis planè rideo) quandam Differentiæ rationem dare, non sit difficile: scilicet Arcanum & Secretum. II. Pars 2.

tum propriè loquendo Autorem præprimis ac Inventorem suum; Specificum verò, Partem in morbis Affectam, ipsiusque Robur, præcipuè respicere videtur.

Thes. III. Singulare autem describo, quod sit medicamentum, quod legitimè adhibitum, Singulâri planè Vi ac proprietate huic vel illi p. n. Affectui remediari dicitur.

Thes. IV. Et quamvis non ignorem, dari etiam in Parte Diæterica plurima, quæ, præter alimentosam qualitatem, Vi propriâ ac insitâ quadam proprietate non tantum huic vel illi humani corporis parti præ aliis amica, sed & quibusdam p. n. affectibus inimica sint; Cum tamen Vis hæc alimentis non competat, quatenus simpliciter alimenta sunt, sed quatenus sunt alimenta Medicamentosa, h. e. quæ præter alendi facultatem, de alterandi etiam Virtute aliquid participant; ideòque

[Pppp 2]

Singu-

Singularia quævis ad Fontem Pharmaceuticum refero.

Thef. V. Medicamentum ergò dicitur, quia Corpus nostrum alterando, à Statu Præternaturali ad Naturalem reducere aptum est; Et dividitur, ut quævis Medicamenta alia, in Simplex & Compositum; Simplex est, quod vel planè per se, vel leviter tantum præparatum, usurpatur; Compositum verò, quod cum aliis ingredientibus, vel paucioribus, vel pluribus mixtum, & lege Artis in hanc vel illam formam redactum est. Ac quamvis & Autoritate aliorum & rationibus probare satis possem, Simplicia tantum Vera esse & dici Singularia, nihilominus tamen de Compositis in præsentiarum solum sermo est, partim, quia de Simplicibus nullum est dubium, partim verò, quia Moderna Singularia ut plurimum Omnia sunt Composita.

Thef. VI. Nec latere oportet, esse non pauca Externa (Topica vel Localia dicta) quæ & ipsa in Morborum Curatione suâ proprietate ac singulari Virtute non carent, ea propterea planè excipere quidem nolo; hæc tamen, quæ impræsentiarum de Singularibus dicuntur, de Internis præcipuè intelligo.

Thef. VII. Porro autem, cum interna Medicamentorum Singularium forma, à qua Ipsorum promanare debet Operationis Singularitas, non in primarum, nec secundarum qualitatum mixtura, sed in singulari ac peculiari quadam vi ac proprietate, quæ propterea Singularis vocatur, consistere dicatur, nodum in Scripo quærere non videbor, si in Singularis istius virtutis & Efficaciæ Ideam, Naturam, ac Rationem inquiram accuratius; soli enim & hac in parte Experientia (quæ fallax) fidem habere, periculosum; Experientia verò Rationem conjugem addere tutius & quemadmodum illud Empirici, ita hoc Rationalis Medici, nota est.

Thef. VIII. Quod ut fiat, genuinam Singularis istius Virtutis Rationem ex reliquis, in Descriptione Singularium allatis Verbis depromere fas est. Dicitur enim, Singulare esse Medicamentum, quod singulari vi ac proprietate huic vel illi remedi dicitur p. n. Affectui: Jam ergò cum p. n. Affectus (παθήματα Græcis, vel παθήματα) in genere Res p. n. Omnes (κα-

λῆσιν τε παθήματα πάντες οἱ ἄλλοι, ὅσα παρὰ φύσιν ἐν τοῖς σώμασιν ἡμῶν γίνονται) denotet, & Morbum, ejusque Causam, & Symptomata respiciat; manifestum esse, existimo, Singulare quodlibet, sua Singulari Vi & proprietate, vel Morbo solum, vel ejus Causæ, vel Symptomati, distinctim, vel omnibus insimul, & conjunctim remedi debere.

Thef. IX. Cum enim Medendi Methodus, à qua Methodici & Rationales dicuntur Medici, ab Empiricis & Agyris quibusvis distincti, in primo statim cujusvis Curationis accessu, communi Lege, & Regula illud, quod p. n. in humano corpore est, tollendum esse præcipiat, præter morbum vero, morbi que causam ac symptomata nihil detur, quod p. n. in corpore humano & fieri, & generari, vel colligi, vel retineri, vel ab extra ipsi accidere possit; constat sanè, ad hæc ipsa quodlibet Singulare restringi debere.

Thef. X. Jam verò, si omnia, & Morborum pariter ac eorundem Causarum & Symptomatum intuear Genera, accuratæque ipsorum cognitioni, Veram ac Rationalem adjungam Medendi Methodum, Remediaque omnia per Indicationes, tanquam certa ac unica Methodi Instrumenta indicata atque inventa, Rationali lance expendam, Autoritate omnium Methodicorum Præticorum manifestum esse, experior, ex Classe Rerum p. n. nullam planè esse, cui Ars nostra ex Lege Methodi suum non destinaverit ac surrogaverit competens & indicatum Auxilium, & remedium.

Thef. XI. Sic (sed breviter) Morbis intemperiei sua satisfaciunt Alterantia; Morbis totius Substantiæ dictis Bezoardica & Alexipharmaca; Morbis Conformationis, & quidem, qui præsentem præprimis scopum respiciunt, Obstructionibus puta, Digestiva, Aperientia, & Præparantia; Duritiei Emollientia; Mollitiei Indurantia; Tensionis laxantia, &c. Morbis Solutæ Unitatis Maturantia, Sarcotica, Glutinantia, cicatricem Inducentia, &c.

Thef. XII. Morborum causas pro Indicantium ratione & diversitate remove satagit Methodus per Vomitoria, Purgantia, Diaphoretica, Diuretica, Sternutatoria, Expectorantia, &c. Utpote quibus auxiliis Causam Mor-

Hipp.
Sect. I.
Aph. I.

Galen.
Comm. I.
in libr. I.
Epidem.

Morbificam per vias nostri Corporis publicas & privatas exturbare & remove Ars docuit.

Thef. XIII. Symptoma tandem omne, ut notum est, vel curato Morbo sponte remittit; vel, si Morbi aut Causæ morbificæ naturam induat, nec ipsum suis competentibus destituitur Remediis.

Thef. XIV. Quæ ipsa dum perpendo, insimulque considero, quod Medicorum nullus, qui Methodicè in Morborum Curatione procedere nititur, quicquam Ægrotantibus suis tutò ac rationaliter ordinare vel præscribere possit, nisi, quod ab Indicante aliquo Lege Methodi indicatum, & à Ratione & Experientia approbatum sit, dubius hæreo: quodnam Singularium dictorum sit Indicans? ita ut primò hocce intuitu ipsa Singularium existentia valdè habeatur dubia.

Thef. XV. Facile equidem recorder; Amplissima ista Mineralium, Vegetabilium & Animalium Regna insignem materiæ Medicæ suppeditare nobis copiam, in eaque plurima suggerere Medicamenta, quæ, præterquam quod vel alterandi, vel aperiendi, vel purgandi Vim, &c. in Toto obtineant, peculiari insuper Ratione, ac insita quadam proprietate huic vel illi corporis humani Parti amica magis ac familiaria sunt, quàm aliis, & propterea etiam Appropriata vocari assolent: qua ratione Cephalica Capiti; Thoracica Pulmonibus & Pectori; Cordialia Cordi; Epatica Epati; Splenetica Lieni; Stomachica Ventriculo; Hysterica Utero, &c. familiaria, amica, & Appropriata dicuntur.

Thef. XVI. Neclatet, dari in specie inter Corroborantia Medicamenta, quæ & ipsa peculiari proprietate hanc vel illam Partem Nobilem respicere magis, magisque reficere solent, quæ proinde propriè loquendo Specifica, & cum adjectione Cordialia, Cephalica, Stomachica, &c. dicuntur; item inter Purgantia, quæ omnes quidem humores movent, alia tamen in specie Bilem, alia Pituitam, Melancholiam alia, alia Scrofos humores evacuare dicuntur, & propterea electivè Purgantia vocantur; quæ tamen omnia in Methodica Morborum Curatione sua habent Indicantia.

Thef. XVII. An verò Appropriata hæc nostra (Veteribus etiam non

incognita) sive sint Alterantia, sive Specifica, sive Confortantia sive electivè Purgantia; & Modernorum Singularia dicta, unum idemque sint? Non immerito quæritur; utpote in quo ipso totius controversiæ status consistere videtur.

Thef. XVIII. Sunt autem omninò Unum & Idem, vel non sunt: Si sunt unum & idem, cur præter necessitatem multiplicantur? cur confunduntur Artis Termini? Si non sunt Unum & Idem, nec eadem etiam utrorumque erit Virtus, Vis, & Operatio; & consequenter Singularia dicta nec Alterando, nec confortando, sed alia quavis ac Singulari planè & occulta ratione suam operationem exserere, morbosque per quoddam, quasi τὸ *ἄνω*, depellere, dicendum est.

Thef. XIX. Ut res clarius fiat, pono casum: Petrus & Johannes, Adolefcentes biliosi, corripiuntur Febre Tertiana Intermittente, & restituitur uterque; Illius Curationem suscepit quidam Titius, Hippocraticis & Galenicis fundamentis nixus: Hujus verò quidam Sempronius mera Singularium fiducia fretus. Patientes restituti quærunt singuli à suo Medico rationem curandi ac Methodum; Titius respondet: Ego, cum animadvertirem, adesse Febrem eamque Tertianam intermittentem, Lege Methodi Medendi formavi meas Indicationes; Febris autem, ut intemperies calida cordis & totius corporis, indicavit mihi Alterantia, eaque Refrigerantia; Febris verò causa, humor scilicet Biliosus putrescens, remotiorem sui per evacuantia; Utrique ergò Indicationi satisfacturus, diætā præscripta, ex fonte Pharmaceutico & Chirurgico convenientia desumsi Remedia, Intemperiem alteravi refrigerantibus, iisque appropriatis, & præsertim Epaticis, &c. Humorem biliosum peccantem *ἀνω* per vomitum convenientibus Emeticis; *κάτω* per alvum, & quidem per *ἐπίρροσιν*, & diebus intermittentibus Cholagogis electivè purgavi; secavi venam; reliquias, prout natura tulit motus, per urinam diureticis, vel per habitum Corporis benignis discussi diaphoreticis; Febrilium non minus, si quæ interea urgere vidi, Symptomatum rationem habui sedulò; viresque pro rei necessitate & urgentia corroborare pariter allaboravi; & hac ratione remis-

runt Paroxyfmi, ceffavit febris ipfa, & cum ea omnia fymptomata; atque ita integre reftitutus eft meus Patiens.

Sempronius contrà refpondet: Ego Hippocraticas & Galenicas iftas ambages non curo, fed longè breviori, agrotantibusque grata magis ac jucunda via procedere foleo, quapropter febricitanti meo ex Singularibus meis Antifebrile meum mifi, illudque paulò ante instantem Paroxyfimum in aqua mea febrifuga exhibere juffi, quo Singularem meo ter affumto perfectè curatus eft meus febricitans.

Thef. XX. Jam fi utriufque Curationis ratio & relatio à Collegio vel Facultate quadam Medica Collegialiter, & ex Artis fundamentis, & abfque omni affectu, examinari deberet, non aliam fanè expectarem fententiam, quàm quod Prioris Curatio fuerit conveniens, vera, & Methodica; Posterioris verò inconveniens, fufpecta, & Empirica; Ille enim Curationem fuam lege Artis fufcipiebat, nihilque, nifi quod per Indicantia pro Febris, ipfiusque Causæ remotione, indicatum erat, ~~in methodo~~ ordinabat; Hic verò, miffa omni Methodo, miffis indicationibus, fola fuo Singularem Antifebrili fe febrem curaffe jactitat.

Thef. XXI. Si quæret rationem hujus Sententiæ à Facultate Medica Sempronius; ita forfitan ipfi refpondetur: Quæcunque febris curatio non eft conveniens veræ medendi Methodo, illa falfa, mala, fufpecta, Empirica, & periculofa eft; Sed tua Curatio, dum Johannem febre tertiana laborantem fola tuo Singularem Antifebrili curaffe jactitas, non eft conveniens veræ medendi Methodo; Ergo &c.

Thef. XXII. Veritas Majoris non tantum tot Seculorum experienciâ, fed & Autoritate Principum Medicorum nititur. *Oportet enim*, inquit Hippocrates, *fe ipfum præftare opportunam facientem*, (hoc eft Methodicè procedere,) & *fcire oportet Medicum, opponere fe contrarium instantibus; & Morbis, & Naturis, & Aetatibus, & Temporibus, & diftenta folvere, & foluta diftendere; fic enim vel maxime morbum fedaverit, & mihi sane* (pergit Venerandus Senex) *hoc ipfum* (fcilicet fi fit, quod ex Arte & Methodi Lege fieri debet) *Sanatio effe vide-*

tur; Medendi autem Methodus partium Medicinæ omnium, ut ordine poftrema, fic certè fine & effectu longè utiliffima, ac veluti reliquarum omnium finis eft; Methodus autem eft via quædam univerfalis, quæ omnium particularium communis fit; finis verò ipfius eft, cujufque morbi invenire Remedia.

Thef. XXIII. Minorem jam olim Galenus probâffe legitur, dum ait: *Methodus quædam privata eft fanandi in fingulis morbis, commune tamen in omnibus genus unum eft: Auspicari namque perpetuo oportet* (arrige aures Pamphile: *perpetuo oportet*, inquit Galenus) *ab Indicatione, quæ ab Affectu, cui mederi paramus, accipitur, æftimare verò ac difcernere*, (fcilicet *perpetuo oportet*) *an caufa, quæ affectum excitavit, jam defierit? an nunc quoque ipfum tum augeat, tum faciat?*

Thef. XXIV. Jam demonftrèt, quæfo, Sempronius fuam Methodum, oftendat fuam Indicationem ab Indicante defumptam, proferat quoddam Indicans, à quo fuum Singulare indicatum fuerit. Si enim Indicationem ex Galeni præcepto, & ipfius Rationis & Experienciæ dictamine, ab Affectu vel Morbo, ipfiusque Causa accipere oportet, Singulare hocce aut febrem ipfam, aut ejus caufam reperiiffe, necelfe eft; Quod autem neque hanc, neque illam respexerit, manifeftum eft, non Febrim, quia Febris ut Febris, quippe cujus natura & formalis ratio in Caloris Nativi à ftatu naturali recessu & incendio confiftit, Alterantia contraria, hoc eft, Refrigerantia, indicat, non Causam febris, humorem fcilicet biliofum peccantem, quia hæc ipfa remotiorem fui per manifeftas evacuationes indicat: Neuter autem horum effectuum de Singularem ifto Antifebrili prædicari poteft, nec debet: alias enim Singulare non efferet, ita ut fatiritandem cogatur Sempronius, aut ipfum Singulare ipfius vel alterando, vel caufam removendo, febrim extinxiffe, aut alia infuper pro febris curatione fuiffe adhibita convenientia Remedia, aut, ut Galeni fe fubmittat fententiæ, opus habet: Si fatetur prius, propriam fatetur turpitudinem, dum, quod Medicis omnibus notum & commune eft, ille pro Singularem jactitat,

Sect. 1.
Aph. 1.
libr. de
Natura
humana.

Galen.
libr. Intro-
duct.
libr. 4.

Meth.
Med.
libr. 2.
Meth.
Med.

Libr. 4.
Meth.
Med.

stitat, quod candido Titio in curatione febricitantis Petri Appropriatum fuit Alterans, vel electivè Purgans, Diaphoreticum, Diureticum, Confortans, &c. id glorioso militi statim debet esse Singulare, cum tamen Singularis, vel singularitatis vix hilum in se contineat, atque adeò plus sit in titulo & inscriptione, quàm in charta, vel pyxide; Si fatetur posterius, fraudulentè egit, & procul dubio plus sibi, suoque Singulari tribuit, quàm tribuere vel deberet, vel fas esset; Si enim alia, & præsertim, quæ febrem febrilique causam respexerunt, adhibuit Remedia, quò, quæso, rationis oculo videre & cognoscere potuit, an ex Singularis ita dicti, an verò reliquorū potius convenientium usu, Dominus Johannes restitutus fuerit? Si verò neutrum fateatur, ex Galeni sententia Temerarius est, utpote qui nulla utitur Methodo, sed soli vel fortunæ, vel temeritati, sese suosque ægrotantes committit, & qui nec sibi ipsi, nec aliis, rationem Singularitatis sui Singularis Antifebrilis reddere potest; *Methodo enim invenire* (curationem) inquit Galenus, *opponitur ei, quod est, fortuito, temereque invenire.*

Thef. XXV. Sed ad Rhombum redire, ac perpendere tandem oportet: quænam Singularium ita dictorum vera ac genuina natura sit? quæstionem autem, an sit? ne id, quod hætenus tot Excellentissimorum Virorum fide & experientia comprobatum esse constat, in dubium (quod absit!) vocasse videar, missam planè facio; atque adeò de vera Singularium ita dictorum existentia ipse nec dubito, nec dubitare debeo, multò minus verorum Singularium Autoribus & Inventoribus, quicquam sive honoris, sive famæ & laudis, detrachere, sed potius labores & merita ipsorum hac in parte honorificè de prædicare ac commendare gestio.

Thef. XXVI. Genuinam verò Singularitatis istius naturam ac quidditatem penitus investigans, ea, quæ hæc de re suprà pro fundamento habui, hic ut repetantur, necesse esse existimo; scilicet quodlibet Singulare vel Morbum, vel Morbi Causam, vel Symptomata, absolutè respicere; cum ipsius Rationis consensu, & Galeni Autoritate, præter hæc tria nihil aliud sit (in humano Corpore) quod

curetur (vel curari possit ac dicatur) à Medicis.

Thef. XXVII. Quo posito, vera Singularium Requisita adinvenire, dextreque explicare, instituti equidem fer ratio; sed hoc opus, hic labor est? Ut tamen expediam, quod expediendum est, sic tandem de veris Singularibus sentiendum esse, existimo: nimirum veri, sinceri, genuini & infucati Singularis qualitates, conditiones, & Requisita hæc sunt: 1. Ut Autor & Inventor ipse sit eruditus, & Rationalis Medicus, ac exercitatus Practicus. 2. Ut soli Autori singulare & notum sit. 3. Ut singularem sibi que propriam, ac nullis aliis Medicamentis communem passim agendi vim ac rationem obtineat. 4. Ut Singularium quodlibet, Lege Methodi, suum agnoscat Indicans. 5. Ut dextrè, legitimè, & convenienter, adhibeatur, & 6. Ut usum ipsius singularis non minus ac certus sequatur Effectus & Operatio.

Thef. XXVIII. Omnino autem oportet, ut Autor & Inventor veri Singularis Eruditus & Rationalis Medicus, ac exercitatus Practicus sit; Medicamenta enim Medicorum sunt Instrumenta, & legitimè non inveniuntur, nisi ab Artifice Medico: Hæc autem Tria Veri ac Boni Medici notæ ac Characteres sunt; Eruditio scilicet, quæ Rerum Medicinalium præsupponit notitiam; Ratio legitimam docet Medendi viam ac Methodum; & Praxis, quæ rationi adjungit experientiam.

Thef. XXIX. Sic Singulare soli etiam Autori & Inventori Ipsius singulare, ac notum sit, necesse est, aliàs esset contra naturam Singularis; quod enim pluribus notum, ac commune est, qua ratione uni soli potest esse vel dici Singulare?

Thef. XXX. Singularem porrò sibi que propriam, ac nullis aliis Medicamentis communem, passim agendi Vim ac Rationem Singulare oportet, ut habeat; Si enim eodem planè modo, eademque ratione vel alterat, vel catholicè evacuat, vel electivè purgat, vel vomitum excitat, &c. vel viscera & partes nobiles specificè confortat, ac vel appropriatum & specificum est Cordiale, Cephalicum, Ephaticum, Spleneticum, Stomachale, qua centum alia suam operationem in Corpore humano habere, per

per tot secula à sexcentis Medicorum millibus observata fuerunt & approbata; qua quæso, ratione jamdum uni soli Singulare esse poterit?

Thef. XXXI. Præterea quoque opus est, ut singulare quodlibet, lege Methodi, suum agnoscat Indicans; cum enim omnis Medendi Methodus per Indicationem fieri dicatur; qualibet autem Indicatio à suo Indicante proveniat, nullum proinde Singulare, Rationaliter quidem molendo, exhiberi poterit, nisi quod à suo Indicante indicatum fuerit; si enim nullum adsit Indicans, seu agens aliquod in corpore humano præfens, quod Singulare, ut Singulare, Auxilii loco indicet, & Indicatum Singulare ad se dirigendum esse monstret, cui, quæso, fini, rationaliter adhiberentur Singularia? Non video.

Gal. lib.
Meth.
Med.
Sennert.
Lib. V.
Part. 2.
Sect. 1.
cap. 2.

Thef. XXXII. Quod si autem à suo Indicante indicatum jam sit Singulare, oportet ulterius, ut & ipsum dextrè, legitimè & convenienter usurpetur & exhibeatur; hoc est, si universalis, & quæ lege Methodi præmittenda erant, præmissa fuerint, exhibere tandem Singulare opportunum est.

Thef. XXXIII. Atque ita ex quasi necessitate requiri tandem videtur, ut cujuslibet Singularis usum singularis etiam sequatur effectus & operatio. Singularitas enim, quæ de Singularibus dictis prædicatur, non Autorem tantum, cui singularia & familiaria sunt, sed effectus & operationis imprimis singularitatem respiciat atque includat, necesse est. Nisi enim ex occulta quadam vi ac singulari proprietate singulis singularibus singularis inesset agendi potentia, quæ post legitimum & convenientem ipsius usum singularem etiam planè sibi quæ proprium, ac nullis aliis Medicamentis familiarem, vel communem Effectum, & operationem certò, ac manifestè producat, non video sanè, in quo differant vel differre possint Singularia ab Appropriatis vulgaribus, & Medicamentis aliis, utpote quorum ultimum idem sequitur effectus, eademque operatio.

Thef. XXXIV. Sed dum hæc dixisse satago, per transfennam quasi non paucas video objectiones & instantias, quibus ea, quæ de Singulare dictorum Requisitis hætenus relata sunt, impugnandi non parum, nisi plane

sibvertendi, animus est: Sic enim magnum existimatur postulatam, nullum esse nec dici debere Singulare, nisi cujus Autor sit aliquis Medicus; quasi verò (ut audio) soli tantum Medico Medicamenta & Singularia invenire comperat & concessum sit; Cum tamen Experientia & quotidianus rerum usus testentur, esse inter Magnates pariter, ac cujuslibet condiciones alios, non paucos, qui & ipsi, etiam si Medici ex professio non sint, egregia nihilominus Experimenta ac Singularia, & habeant, & præparare, ac componere sciant ac soleant, Item præparationes, labores, & processus (in Chymicis præsertim) esse diversos; & quamvis hoc vel illud Medicamentum, notum aliàs, omnibusque cognitum sit, singulari tamen artificio, singularique processu & labore ab hoc vel illo, sive ratione Coloris, saporis, odoris, jucundius, sive, dosis ratione gratius; sive ratione operationis reddi tutius; sic haberi, ajunt, Singularia, quæ, cum alia adhibita Medicamenta quam plurima nihil plane in hujus vel illius Morbi Curatione efficere potuerunt, ægrotantes vel sola felicissimè restituisse dicuntur; sic, dicunt, occasione istorum Singularium Chymia magis magisque excolitur, multisque proinde Naturæ Arcana & penetralia intimius scrutandi ansa suppeditatur & occasio: sic, ferunt, magnam esse simplicitatem, rationem singularitatis à Singulare Inventoribus quarere, quæ hoc vel illud Singulare huic vel illi p.n. affectui remediari dicatur; cum propterea sit & dicatur Singulare, quod Virtus & operatio ipsius nemini, quàm soli Autori, nota & singularis esse debeat; sic, perhibent, non esse necessarium, ut Singulare indicetur ab Indicante generali: Et tandem somniant, quosdam propterea tantum finistres sentire de Arcanis & Singularibus, quod vel Chymiam ipsi non exerceant, vel eandem planè non intelligant, & quæ sunt alia.

Thef. XXXV. Verum enim verò, etsi toti constet orbi, esse inter Magnates pariter, ac cujuslibet conditionis alios, non paucos, qui & ipsi, etiam si ex professio Medici non sint, egregia nihilominus experimenta, ac Singularia & habeant, & præparare ac componere & sciant & soleant; Certò tamen est certius, illa experimenta & Singu-

Singularia omnia, cujuscunque etiam sint formæ, virtutis, & operationis, medicos tanquam primos Autores solos ac semper agnoscere, & originaliter provenire à Medicis, ac per tertium vel quartum vel plures aliis esse communicata; Constat enim, & palam est omnibus, ipsis etiam Magnatum Laboratoriis vel Medicos præesse, ut laborum Directores; vel ipsis Laborantes dictos substitui: Hos autem, utpote qui Medicorum ministri sunt, quid boni, quicquid solidi sciant & sapidi, primario habere à Medicis; Et posito, esse quosdam, qui, & si Medici non sint, vera tamen & approbata (ab aliis pura communicata) Singularia habeant, legitimum tamen eorundem usum ignorant, quia Artis ignari sunt, & consequenter eadem facilitate ex ignorantia lædere ac interficere possunt, qua ex temeritate juvare ac sanare audent. Quod cum sit extra omnem controversiam, firmissimo stare talo existimo: Autorem cujuslibet veri singularis, primum & verum, semper esse Medicum; Hujus enim Professio est scire qualitates & virtutes Simplicium, ex iisdem Artis Pharmaceuticæ ope dispensare & ordinare Composita, scire Morbos, eorumque Causas, & symptomata, Scire Medendi Methodum, & in cujuslibet morbi curatione indicantia, Coindicantia, Permittentia, Prohibentia, Contraindicantia, & alia, quæ ad prudentiam boni Medici spectant, diligenter, prudenter ac circumspèctè attendere. Unde, quâ ratione quisquam alius, qui à pueris & ex professio hæc omnia non didicit, sed nescit planè & ignorat, Singularia invenire, eademque ægrotantibus salutariter exhibere valeat, judicet quilibet, qui candidus est. Bonis interea Medicis circa hanc objectionem non injusta suboritur indignatio, quod scilicet Chymicorum non pauci illiteratos ut plurimum quosvis, Idiotas, rudesque non rarò Asinos, in sua passim excipiant Laboratoria, ipsisque processus & labores suos concedant, alios verò, & qui sunt de communi studio, vel rarò, vel non, nisi ad vulgarium præparationem admittant; hinc enim pleræque illæ lachrymæ! hinc fit, ut incomitum illud vulgus, utpote penes quod nulla planè est alia rerum Medicinalium cognitio, quicquid præparari vi-

Tom. II. Pars 2.

deat, Secretum esse, Singulare esse, credat; ipsumque tandem hæc, quâ ducitur, phantasiâ persuasum abeat, Singularia jactitet; Magnates & Curiosos quosvis adeat, miracula prætentat, & nescio quid? Quæris successum rei & eventum? Fallunt, decipiunt, defraudant ut plurimum egregiè, speciosè, & singulariter, hoc tamen, ut verum & approbatum Singulare, semper habeant & possident, quod qui decepti ab aliis sunt, taceant, nil dicant aliis, sed, quod decepti sint, sibi tantum & pro Singulari ac in secreto habeant; sed habeant!

Thes. XXXVI. Medicamentorum porrò præparationes, labores, & processus esse diversos, non nego: quod autem sola præparationis diversitas & singularitas Singulare statim dictum, & novum Medicamentum efficiat, omninò nego; cum enim facilius sit, inventa corrigere, quàm nova invenire, non video, cur sola præparationis correctio debeat statim esse & dici novi medicamenti vel Singularis inventio? Præsertim cum tantum absit, ut hæc sola Singularis dicti naturam exhauriat, ut potiùs omnibus in universum Medicis communis esse soleat; quot enim capita, tot sensus; & qui nostris, quæ hæc Seculi felicitate prostant, Officinalibus vel addere quicquam, vel detrachere, vel quovis modo, si ex arrogantia stimulo velit, corrigere eadem nesciat, quid tandem ille sciat, quid sapiat? ipse nescio; hoc verò scio & fateor, quod si Eruditus Medicus, & exercitatus Practicus, ex multo rerum usu quicquam habeat, quod circa hoc vel illud Officinale, ipsiusque vel ingredientia, vel præparandi rationem, vel commodum utendi modum, in salutem ægrotantis proximi notari possit, dicere illud, notare, & corrigere, conscientia juxta quàm officii ratione, teneatur.

Thes. XXXVII. Hæc autem remedia, quæ, cum alia legitima adhibita medicamenta quàm plurima nihil planè, ut ajunt, in hujus vel illius morbi curatione efficere potuerunt, ægrotantes sola restituisse dicuntur; hæc, inquam, laudarem; hæc magni facerem; hæc pro verè Singularibus omninò habenda esse, censerem; nisi istud me moveret, quod restituisse dicantur, quæ ex præconcepta quadam

[Qqqq]

dam

dam opinione, affectu & confidentia ita esse creduntur, vera tamen non sint; difficile proinde hoc ipsum quoque æstimare Judicium; hoc enim illorum, qui Singularia crepant, ut plurimum est proprium, ut, cum suâ ducantur opinione, quemcunque bonum curationis eventum & effectum solis suis adscribant Singularibus; de quo tamen sub iudice lis est.

Thef. XXXVIII. Præterea, quod occasione Singularium dictorum Chymia magis magisque excolatur, multisque proinde Naturæ Arcana & Penetralia intimius scrutandi ansa suppediteretur, id, cæteris quidem paribus, facile largior; Fuerunt enim, & jam dum sunt plurimi, qui, cum persuasum sibi haberent, hunc vel illum, occasione hujus vel illius Singularis dicti, in summam apud ægrotantes & quosvis alios venisse gratiam & existimationem, & ipsi strenuam Chymia navare operam cœperunt, & eo quidem successu, ut non sine insigni Reipublicæ Medicæ incrementò, juxta quam publicâ multorum ægrotantium salute tot Medicamenta componendi, composita corrigendi, augendi, meliorandi, & rectificandi vias, totque egregios Processus ingeniosè satis invenirent, studiosamque juventutem in Academiis hac in Artis parte informare, atque adeò Bono Publico optimè consulere allaborarent; Ast verò, quot pessimos Abusus hujus Artis interea produxerit abortus, experimur quotidie; vix enim vigesimum invenies, qui talentum suum Bono mancipet Publico. Omnes quidem sub specioso Chymia excolendæ prætextu Publico aureos pollicentur montes, pauci verò Singularis quicquam præstant, & si quid præstant, sibi servant, adeoque non Publicum, sed Privatum quærunt commodum. Omnes Chymiam deprædicant, & Chymicos se esse jactitant, cum tamen nobilissimam Artem laboribus suis potiùs prostituunt, ac vix umbram, ne dicam Characterem, (quos Excellentissimus Rolfinckius recenset) vel notam veri Chymici præ se ferre videntur; Et hinc evenit, ut sordidus tandem Agyrta & Circumforaneus quilibet Chymiam eructet, & Singularia exclamitet! ó mores! ó tempora!

Thef. XXXIX. Magnam autem esse simplicitatem, Rationem singula-

ritatis quærere, quâ hoc vel illud Singulare huic vel illi p. n. affectui remedi dicitur, vix concedet, cui stat Ratio; Rationalis enim Medicus, quicquid agit, ejusdem rationem reddere tenetur, si fundamentalis est; & posito, esse Medicum, qui uno vel altero Singulari hunc vel illum curavit affectum, nihilominus tamen operationis rationem reddere potest absque omni præjudicio, etiamsi Singulare ipsum nec dicat, nec revelet; ita ut, quibus rationem Singularitatis quærere sit simplicitas, illorum Singularia videantur esse figmentum & Vanitas.

Thef. XL. Omnino verò necessarium est, ut Singulare quodlibet à suo Indicante speciali indicetur; scilicet, si illud à Rationali & Methodico adhibeatur Medico; Methodicus enim Medicus in Morborum Curatione non acquiescit in Indicantis generalis apprehensione, sed ex Medendi Methodo specialia insuper quærunt Indicantia, utpote quæ Curationem propius respiciunt, & ipsa Auxilia & curandi Media digito quasi monstrant ac indicant; quorum materiam tandem facile invenire poterit, qui peritus in Arte, & exercitatus est.

Thef. XLI. Et tandem merum esse somnium, fateor, dum dicunt; eos tantum sinistrè sentire de Arcanis & Singularibus, qui vel Chymiam ipsi non exerceant, vel eandem planè non intelligant; Sicut enim aliàs ab Esse ad Possè non datur consequentia; sic falsissimum & absurdum planè est, dicere; Hic Chymiam ipse non exercet, E. Chymiam non intelligit: Sic quale absurdum esset, si dicerem; Hic Medicus cadavera ipse non dissecat, E. Anatomiam ignorat; Hic venam ipse non secat, luxata ipse non reponit ossa, vulnera & ulcera ipse non tractat, &c. E. Chirurgiam non intelligit; & sic deinceps. Cum enim ex tripode dixisse Hippocratem visum fuerit Veteribus, quod vita brevis, Ars verò longa sit, prudenti juxta consilio quàm summo Posteritatis commodo Artem Medicam in Partes Principes & Ministras dictas dividere, decretum & statutum est; cum quidem in finem, ut, cum vitæ nostræ Brevitas, in comparatione & proportionem ad Artis longitudinem, & ingentem rerum discendarum & tractandarum copiam, vix sufficere valeat, sint,

sint, qui ex professo, quod dicitur, Principes Artis Partes tractare suscipiant, & Medici dicantur, & sint, qui Ministras & ipsi ex professo exercent & expediant, & Pharmacopœi ac Chirurghi vocentur; Ita ut utrique unam quasi constituent Oeconomiam Medicam; illi quidem, qui Directorium habeant in omnibus; hi verò, qui obsequiosum illis præstent Ministerium; quod si jam utrique, & Dominus & Ministri suo fungantur officio, benè agitur, & ægrotantium salutis salutariter prospicitur; Sin secus, malè; Præsertim, si invertatur ordo, &, qui debuisset esse Dominus, incipit esse Minister, & vice versâ.

Porro autem absurditas dicta velex eo etiam probari videtur, quod propositio hæc; Chymicus Singularia preparat; non sit convertibilis, ita ut dicere possem: Chymicus præparat Singularia; Ergò qui Singularia præparat, est Chymicus; aliàs enim Circumforaneus quilibet, Singularia jactitans, esset Chymicus; quod tamen de tanta tamque excellenti Arte, utpote quæ cum ad Utilitatem, tum etiam ad Splendorem ac Amplitudinem Reipublicæ Medicæ multum conferre videtur, dicere, Religio sit! Absurdè ergò sentiunt; qui ita statuunt, falsò sibi persuadentes, neminem esse, vel posse esse Bonum Medicum, nisi qui ipse Chymiam ex professione exercent. Cum enim Chymiam, utpote quæ est Pars Pharmaceuticæ, & à qua in hunc usque diem separari meritò nec potest nec debet, exercere, non essentialiter pertineat ad Medicum ut Medicum; sed penes cujusvis sit arbitrium; sufficit omnino, tantum scire in Chymicis, quantum vel ad modernas Galeno-Chymicas dictas Morborum Curationes necessario requiritur, vel ut, ex usu quæ videntur, methodicè adhiberi; quæ minus, cum judicio omitti, queant; ita ut prædominium semper habeat Legitima Medendi Methodus; præstat enim methodo quidvis, quam sola Experientia, facere; & hic succurrit mihi, quod in Albo Candidati cujusdam Medicinæ legi dictèrium, scilicet:

Methodus sine Chymia facit Medicum;

Chymia sine Methodo Carnificem.

Thef. XLII. Jam si ad Lydium Tom. II. Pars 2.

eorum, quæ dicta sunt, revocari lapidem, exactèque examinari deberent, Modernorum Medicinam passim facientium Singularia, non defuisse hætenus, nec adhuc deesse Viros doctos & Excellentes, qui magno rerum usu & longa experientiâ docti, certa invenerunt Singularia, certò quidem constabit certius; Ast cheu! quod econtrà dubia, quot difficultates, absurda, mendacia, fraudes, inconvenientiæ, calumniæ, lites, rixæ, & nescio quot malorum myriades, sub specioso Singularium dictorum prætextu nostram hinc perniciosè infecerint Artem? est sanè, quod non sine justo dolore omnes Boni Conscientiosi & Rationales doleant Medici; sicut enim legitimus ac conveniens Verorum Singularium Usus omnem laudis, honoris, & gloriæ meretur titulum; sic eorundem Abusus & lusus tantâ hætanus sacram Artem nostram affecit injuriâ, ut, quâ ratione in pristinum & integrum restitui Ars valeat, summè videatur difficile.

Thef. XLIII. Ne verò, dum scapham scapham dicere fas est, festucam aliorum vidisse, trabem verò eorum, qui meæ professionis sunt, vix observasse, nedum persensisse videar, fateri omnino cogor, ex cæco planè Singularium amore captos raptosque esse hætenus non minus etiam Medicos, & quod magis est, Viros alios Excellentes, eoque devenisse, ut in Morborum curatione Singularibus suis ita dictis, nisi omnem, præcipuam tamen, laudem impertirent & fiduciam: quò verò id factum non raro fuerit, & jam dum fiat eventus? dies testatur & Experientia.

Thef. XLIV. Hac etenim ratione, & dum spes omnis & confidentia solis tribuitur Singularibus, Rationalis ut plurimum negligitur Methodus; quâ neglectâ & sepositâ, non curatur amplius, qualisnam certò, qui curatur, p. n. affectus sit? An per essentiam, an per consensum affligat? An unus, vel plures, & complicati sint? An à causâ calida, an frigida proveniant? An marem corripit, vel foeminam? An senem, vel puerum? An Plethoricum, vel Caco-chymicum? An Biliosum, vel Pituitosum, vel Melancholicum? Et sic quæ aliæ notabiles ac necessariae occurrant circumstantiæ; Ut mirum proinde non sit,

[Q q q q 2]

sit,

Raymund
Minder.
Th. Med.
c. 8.

Minder.
l. c.

Rolfinck
l. 1
Chym. in
Artis
form. re-
dict. cap.
1. Gal. 3.
M. M.

Hipp. I. 6.
Epidem.

sit, quod Morbi aliàs Breves & facile curabiles, nec ipsi tollantur, nec removeantur eorum causæ, sed radices agant, & vel degenerent in alios, priori peiores, vel fiant Chronici ac diuturni; ipsique tandem ægrotantes contra Canonem & præter necessitatem moriantur ac pereant, nisi vel Audacem fortuna juvet, vel post Deum, Natura, morborum Medicatrix, errorem ipsa corrigat. Hinc contingere experimur, quod, si in Morbis gravioribus ac periculosus instantis vitæ periculum, vel mortis tandem causa à Cognatis & Adstantibus quaratur, Internarum partium, Epatis imprimis, Mesenterii, &c. Inflammationem, Gangrænam, & nescio quam Viscerum corruptionem, speciosè effingere ac mentiri, & inevitabilem adeò mortis quasi necessitatem credulis præcipuè mulierculis, Patheticè satis persuadere sciant ac fatagant. Cum tamen nullius planè, vel inflammationis, vel Gangrænae, vel Corruptionis, per totum morbi decursum, unquam apparuerit vel signum vel vestigium; Multò minus ex Receptis in Pharmacopolia missis quicquam doceri & remonstrari possit, quod ad profliganda ista mala præscriptum & ordinatum sit. Et hi ipsi sunt, qui morbos, & pericula fingere, non dubitant; Unde Credulum Vulgus, plerumque autem Divites, inani metu percellere nonnunquam aggressi sunt, Apoplexias, Epilepsias, Hydropses, Gangrænas, Viscerum Corruptiones, aliosque Gravissimos Morbos, hominibus imminere, mendaci planè linguâ præfagientes, à quibus pro præservationis Consilio, magna præmia expectant; Cum enim ab imminentibus Periculis sibi metuerent ægrotantes, Auxilium ab his petendum, aut magno pretio cõmendandum, rati sunt, quos pro Prophetis ac futurorum Periculorum nunciis suspexerant: Unde, si quando vel leve sabulum in Urina conspectum fuit, mox lapidem, novaculis exscindendum, subesse cominati sunt: &c.

Raym.
Mind.
Thren.
Med. c. 9.

Thef. XLV. Sic Consultationes & Concurrentiæ in Casu difficili & morbis gravioribus, & summè periculosus, cum Medicis aliis vel non, vel rarò admodum, & non nisi coactè, habentur & admittuntur; Quia unusquisque sua adhibere gestit Singularia;

Jam verò, cum alter alterius Singularium Naturam & vires nesciat, (nescit autem omninò, quia Singularia sunt) vel alter sua commendare Singularia; alter verò Medicamenta convenientia ex Officinis Pharmaceuticis ordinare nititur, animorum subinde dissensus pronascitur & æmulatio; Quà verò ratione, qua conscientia, & quò tandem successu & eventu talis habeatur Concurrentia, penes Rationales quosvis candidum esto iudicium.

Thef. XLVI. Et sanè, ut fatear, quod verum est, non video, quomodo Rationalis Medicus, ad Concurrentiam cum alio vocatus, prioris Singularia approbare, inque usum eorundem consentire possit, nisi Empiricum agere, ac eventum Curationis fortunæ vel temeritati committere velit? Si enim media ad Curationem necessaria ignoret, quomodo de ejusdem successu & eventu certus esse poterit?

Thef. XLVII. Nec levis subinde pronascitur Arrogantia; dum enim vident & experiuntur, hoc vel illud Singulare bono interdum adhiberi successu, eò tandem deveniunt, ut morbos omnes solis & paucis aliquot Singularibus curari posse existiment; adeoque salutem omnem ipsis solis attribuant; cum tamen, si quærantur, ipsi rationem reddere nesciant, an ex Artis præscripto, an verò fortuna, vel casu, vel ex Accidenti, processerit Curatio?

Thef. XLVIII. Arrogantia porrò hæcce parit Contemptum, pessimæ matris filium, qui alios pariter invadit & exercet Medicos, ac ipsos Pharmacopœos excruciat; Illos, dum misello vulgo ac credulo nimis popello speciosè satis persuadere fatagunt, quàm citò, quàm rutò, quamque jucunde suis Singularibus remedium morbis possint, quos Medici alii, Singularibus non instructi, vel vix, vel non, nisi longo tempore, portionibus longis, multoque medicamentorum, ad nauseam usque exhibitorum, usu curare valeant: Hos verò, dum eorundem vel ignorantiam in rebus Pharmaceuticis, vel in præparandis Medicamentis negligentiam vel in taxando avaritiam, vel in vendendo ac substituendo fraudes & malitiam, & nescio quot defectus allegare & accusare laborant.

Thef.

Thef. XLIX. Ne verò, si plura dicerem, veritas odium pariat, digito compesco labellum; hoc tantum superaddens, quod & summa Rei esse, & impium pariter ac invidum mihi semper visum fuit, scilicet, quod paucissimi hactenus de suis veris & Approbatis Singularibus dictis posteritati quicquam revelaverint, vel reliquerint; cum tamen secum reputasse debuissent, se non sibi, sed Reipublicæ natos esse; atque adeò, si quid utilis, si quid boni commodique, ad publicam Proximi salutem à se proficisci ac redundare possit, id ex quodam quasi naturæ debito exsolvi debuisse; & quamvis sciam magnum dici postulatum, petere communicationem, descriptionem, Processum &c. hujus vel illius Singularis dicti, utpote quæ longo labore, sumtuque interdum non parvo, comparata, & propterea non cuilibet statim propalanda, sed in secreto reservanda esse, dicuntur, ut & aliis subinde, in Arcana Naturæ penetralia scrutandi, surrogetur occasio; Larvam tamen esse hanc excusationem, ac latitare ut plurimum aliud quicquam, extrà omnem videtur controversiam; Christianam enim Charitatem, utpote quæ nos omnes, ut quilibet ramento suo salutem proximi promoveat, devincire invicem satagit, planè taceo; Nec meum prorsus facio, quod Renatus Moreau hæc de re scripsisse legitur, dum ait: Rutam contritam naribus, & ori Epilepticorum impostam liberare ægros, ac etiam perfectè sanare observat Michaël Savonarola, subditque hoc præsidium pro secreto, & Singulari tenendum, quod tamen omnibus propalandum sit ac revelandum; quoniam talia subtricare, videtur peccatum in Spiritum Sanctum. Ex quibus verbis (sunt verba Moreau) discunt Chymistæ, Agyrtæ, Circulatores, Circumforanei, Arcanorum Transcriptores, & quicunque se Remedia, Arcana, Secreta, & Singularia, habere profitebuntur, pessimè agere; non solum, quia ut plurimum falsa pro veris, inepta pro sinceris, vana pro certis prædiis, venditant; sed etiam, quia quæcunque tandem illa sint, subtricent, & ægris, & Medicis Dogmaticis, qui pro suspectis semper remedia illi *ἀλογα*, aut ab *ἀλόγους* hominibus suppeditata, habent.

Sed hoc tantum cujuslibet Spe-

culationi, Rationi & Candori perpendendum remitto, nimirum cum constet, omnes omnino homines, & præsertim qui literis addicti sunt, quicquid ingeniorum acumine inveniant, vel invenire studeant, id omne Famæ, ac nunquam interitura Nominis sui gloriæ gratiâ, vel sacra auri ac divitiarum fame, agere; Quæ tandem causâ sit, cur tot, etiam Clarissimi Viri, è viventium numero ad plures abeant, qui tamen de suis Singularibus dictis ne tantillum quidem Posteritati relinquunt? Tantum autem abest, ut ex sordida quadam avaritiæ, quæ Empiriæ Sectæ cognata quadam ac Nutrix est, à bonis Medicis id fieri, concedam, ut potius vitium hoc alienum planè ab iisdem esse, atque adeò de Impostoribus tantum dici existimem, quod dicitur: Reperti sunt complures, qui Experimentiolas aliquas, nullis forsân Rationibus innixas, nacti, easdem studiosè custodire, celare, velare, ac abscondere studuerunt; non quò Arti honorem, sed sibi lucellum aliquod majus compararent, ut, quod sine speciali eorum consensu, voluntate, ac deceptoris liberalitatis munificentia, remedium obtineri non posse putabant ægri, præmiis ab ipsis Celatoribus, tanquam ex captivitate, redimerent.

Non equidem latet, quod vulgò & verè quidem dicitur; Neminem esse obligatum, Arcana & Singularia sua in Vulgus propalare; Item, Medicamenta prostitutione vilescere, &c. Respondetur enim, aliud esse propalare Singularia in Vulgus, hoc est, illiteratis quibusvis, & à Medicina alienis, Mulierculis puta, Idiotis, &c. eadem manifestare, ac concedere; Aliud verò, Orbi Literato, Medicorumque familiæ, communicare eadem; Aliud item esse, quod de Jure, aliud autem, quod ex Christianæ Charitatis debito fieri dicitur; Unde Medicamenta, etiam singularissima, quæ in Ægrotantium Salutem, & Artis Incrementum, aliis communicantur Medicis, nec prostitui, nec prostitutione vilescere, dici possunt, nisi quis dicat, (quamvis absurdè dicat) Artem nostram & olim, & à primis ipsius incunabulis, egregie fuisse prostitutam, & jam dum prostitui enormiter; Quam ingenuè enim, & quam candidè primi artis Parentes quicquid in imis scientiæ & experientiæ Medicæ habue-

Raym.
Mind.
Thr.
Med. c. 7.

[Q999 3]

runt

In Ani-
madvers.
ad C. 37.
Schol. Sa-
lernitan.
P. 435.

runt penetralibus, Posteritati communicaverint, negare non potest, nisi qui Artem negare ipsam audeat malevolè; Et quantâ quæso ipsorum Laude, (ut quicquam tantum de nostro hocce dicam Seculo) quantoque Posteritatis Commendo, sua nobis Inventâ, verè Singularia, communicarunt hætenus Anatomici, Venas putâ lacteas Mesaraicas, Ductum Pancreaticum, Glandulosa Chyli Receptacula, Vasa lactea Thoracica, Vasa Lymphatica, Ductus Salivales, Nobilem item Sanguinis Circulationem, & singulares circa eandem habitas, eisdemque accommodatas Observationes, curiosam de ossis cribriformis usu speculationem, &c. Sic à Pathologicis, & Practicis Celeberrimis, quibus novi vel rari quicquam observare licuit, integras habemus Morborum Historias, Observationes Medicas, Casus raros, Enarrationes, Epistolas Medicinales, Consilia, Consultationes, Annotationes, Curationes insignes, &c. ita ut Charta defecere videatur, si præclara omnium, qui hæc in parte de Artis Incremento & Bono publico optimè mereri allaborarunt, exprimere deberem nomina; Sic Exoticorum Periti suam nobis non subtraherunt Herbam Thee, Chinam Chinæ, Cavee, Crapp, Terram Catechu, &c. Quemadmodum nec curiosi alii Inventâ sua, quæ quo vis modo ad Artis vel Incrementum, vel Ornamentum, facere visa sunt, occultare rati sunt; Quæ inter insignis Modernorum Instrumentorum Anatomicorum, Chymicorum & Chirurgicorum apparatus, de Inventorum Candore testatur ingenuè; ita ut tantum absit, ut Ars nostra, sincerâ eorum, quorum jam mentio facta est, communicatione & propalatione prostituta esse dici queat, ut porius insigne exinde Incrementum sumsisse videatur.

Soli verò Singularium Inventores plerique sua unâ secum sepeliri malunt, quàm ut eorum hæres fiat Posteritas; Quamvis enim hocce nostro seculo non defuerint Viri Excellentissimi, quorum ingenuus in Bonum Publicum Candor tantus fuit, ut ea, in quibus vel novi vel Singularis & Arcani quicquam longâ experientiâ deprehenderunt, non sibi servarent, sed in publicam omnium Ægrotantium salutem, & nunquam inter-

morituram eorum memoriam, Literis consignarent, ac usui fecissent publico; Plurimi tamen, & præsertim, qui suis singularibus nimium quantum fidunt, iisdemque omne Curationis punctum præ aliis soli absolvere gestiunt, Experimenta sua planè subtrahunt, adeoque nec sibi de honesta Nominis existimatione, nec Arti de incremento, nec Proximo de emolumento, prospicere laborant.

Thes. L. Aliud ergo quicquam latitet, necesse est, quod ipsum vel Invidiam quandam, quæ quandam pudorem esse, existimo; si ex invidia subtrahuntur Singularia, fit istud vel respectu Ægrotantis proximi, vel Curantis alterius Medici: si respectu illius, impium planè, inhumanum, & Christiano Medico indignum est, subtrahere, ac sibi servare ea, quæ, si vera sunt, Sanitati, Vitæ, & Summo adeò proximi Bono, prospicere possunt; Idem enim si superiorum Seculorum fecissent Medici, nec aliter Rei Medicorum consulissent Publicæ, per Apollinem Medicum & Æscu-
lapium jurarem, nec eos, qui Singularia quicquam subtrahunt, tantum scire & habere, unde & ex quo sua Singularia dicta conficere valerent; Si verò respectu hujus id fiat, ab Eruditis, Dogmaticis & rationalibus Medicis aliis, nihil vel parum curari, auguror, præsertim cum per DEI gratiam, & Clarissimorum ac de Republicâ Medicâ & Proximi salute optimè meritorum Virorum studia & diligentiam, tanta nobis in Pharmacopoliis publicis, & Privilegiariis pariter, quam apud Classicos Autores quovis, suggeratur remediorum & Medicamentorum approbatorum copia, ut, quod ex invidia paucorum Publico denegatur, Multorum Candor utraq; manu liberaliter satis nobis porrigat & exhibeat. Et sic, e.g. idem malum Hypochondriacum, convenientibus appropriatis, omnibusque Bonis Medicis notis Medicamentis, curatur in Gallia, quod per ignota Singularia dicta Antihypochondriaca ab uno vel altero dicitur curari in Germania; quid tum postea? Ita, ut Varandæus, Regius in Academia
Monspelienfi Professor, scite satis dixisse, legatur: Illa Remedia esse optima, quæ minime sint Secreta & singularia, sed notissima, utpote certiori experientia confirmata.

Jus. Hip.

Primer.
l. 1 de
Vulgi Er-
roribus
c. 12.*Thes.*

Thef. LI. Cum verò de Christiano, Bono, ac Conscientioso Medico, talem præsumere & prædicare invidiam, nefas sit; in alteram potius abire sententiam, scilicet ex modesto quodam pudore plerumque subriceri Singularia; ita enim hujus nostri præprimis sæculi genius fert & conditio, ut quemadmodum in aliis plurimis, sic etiam in Medicina, Novitati plus, quam par est, indulgere, nil novi sit; unde tantus ingeniorum excitatus pruritus tantaque singularitas, ut quilibet ferè Nova invenire, Singularia tractare, Singularia præparare, iisdemque, nisi omnes plebrasque tamen, Morborum Curationes, perficere gestiatur; ita ut in tantum Singularia dicta succrevisse videantur numerum, ut & Tituli ac Nomina tandem deficere, & integra Pharmacopolia iisdem, si colligantur, impleri posse, plus quam manifestum sit.

Thef. LII. Pudet autem omninò plerosque, ut de suis Singularibus dictis quicquam certi proferant, multò minùs Ingredientia ac præparandi rationem, utendique modum, candidè manifestent; Hoc enim factò, emérito ut plurimum suffunduntur pudore, propriaque confessa turpitudine, ipsi tandem fateri coguntur ipsorum Singularia, vel planè esse Vulgaria, vel aliorum Inventa, ab ipsis vero mutata quodammodo, correctà, inque aliam vel consistentià, vel colorem, vel formam quamcunq; redacta; sic enim quotidiana experientia testatur, quod pleraque, etiam vulgarissima non raro Officinalia, vel per se, & prout in Dispensatoriis publicis præscribuntur, ac à Pharmacopœis nostris, & ipsorum ministris, quotidie dispensantur, vel leviter tantum mutata & correctà, sub specioso Singularium prætextu & titulo, gassatim quasi circumferantur, vendantur, & exhibeantur; quod ipsum Primerosius innuisse creditur, dum, Observavi, inquit; multos astutè sua [hoc est, Singularia & Secreta dicta] occultare, ne, si aliis Medicis innotescerent, risum moverent; Vulgaria enim Remedia, forsan inepta, pro magis secretis à multis prædicantur, quæ nemini revelare volunt, prudenti sanè consilio, quia nihil habent, quod Secretum vel Singulare dici debeat.

Thef. LIII. Et, quod majus est, mi-

rari meo quidem loco satis nequeo, quod & Novelli quidam Prædici, qui nudius tertius Medicinam facere, atque Ægrotantes visitare inceperunt, hodie statim de suis Experimentis & Singularibus gloriari audeant; quæ tamen res, sicut admiratione, juxta ac risu digna est, ita altioris sanè indaginis, quamvis pauci momenti, esse videtur; Judicii enim imbecillitatem an dicam? an arrogantiam? vel ex eò tantum apparere constat, quod, dum majorum ac Præceptorum suorum æmuli fictitiis ac opinativis suis Singularibus dictis tales sæpe imponant Titulos ac Nomina quæ risu & cachinno digna sunt, rem ipsam, virtutem scilicet sui Singularis & operandi rationem, vix ipsi intelligere videantur; Sicc. g. inter alia (integros enim possem, nisi partim honoris ergò, partim risus compefcendi gratia abstinere, allegare Catalogos) dicta Singularia. datur Pulvis in Acutis, Pulvis in peracutis; sed quæ? qualis? quanta? Ergone omnes morbi acuti, & peracuti, unius ejusdemque erunt generis? Non est; cum enim dentur, qui sunt à causâ frigida, ut Apoplexia, Catarrhus suffocativus, Lethargus &c. in senibus, cum dentur, qui sunt à causâ calida, & totius dicti Substantiæ, ut Febres ardentes, malignæ, cum & sine petechiis, &c. Cum dentur, quorum natura in inflammatione consistit, ut Phrenitis, Peripneumonia, Pleuritis, &c. qua, quæso, Methodo indiscriminatim exhibebitur? qua ratione in morbis, à Causis contrariis productis, & quomodo contrariis Indicationibus unicus æque satisfaciet Pulvis in acutis & peracutis? non video.

Thef. LIV. Et hac occasione, & ex tanto rerum abusu, evenit tandem, ut, quibus nulla unquam facta nec concessa est Medicinam faciendi potestas & licentia, indifferenter, impunè, & non sine summâ sacræ Artis ignominiâ, multorumque ægrotantium damno & interitu, Medicos agant, Medicinamque faciant; Ita enim Pharmacopœi plerique, Barbitonfores, Balneatores, ac Dentifrangibuli non pauci, Pastores Pagani, Agyrtæ, Circumforancique quilibet, Artem exercent Medicam, Singularia effingunt & jactitant, insignesque Artis nostræ Doctoribus excitant molestias: Idem passim facere audent, qui per

Raym.
Mind.
Threu.
Med.
cap. 9.

Mind.
Thr. Med.
cap. 8.

Minder.
ibid.

per aliquot temporis intervallum Chymicorum Laboratoriis inhæserunt; hi enim statim, atque vel ignis tantum gradus moderari, vel unum alterumque processum expedire didicerunt, in mundum universum abeunt, Chymicos se profitentur, ac nil nisi Singularia, Secreta & Arcana, olent, & sapiunt; cum tamen omnis plerumque literaturæ planè expertes sint, & curiosum non tantum Vulgi genus, sed magnos interdum etiam Medicos, magnosque alios Singularium & Atcanorum amore raptos, egregiè ut plurimum decipere, sumtuososque processus fugâ non raro absolvere soleant; Nihilominus tamen soventur hi à Magnatibus Impositores, ac in Aulis in hominum perniciem nutriuntur, cumulantur honoribus, præmiis, amplisque afficiuntur Stipendiis. Et qua denique Artis injuria quodvis aliud hominum genus, ut sunt Pastores, Laniones, quadrati item Rustici, Opiliones, Carnifices, Vetulæ, Sagæ, Præcentrices, Cingari, Harioli, Crystallantes, nescio quæ hominum farrago, falcem non temerè minus, quàm insolenter, in nostram messem immittat, est, quod (vel hic etiam loci) insigniter doleat Medicorum familia, atque ita tam scitè pariter quàm verè cum Medicina lugente exclamare cogatur: Donius mea domus Medicationis est, vos autem fecistis eam speluncam Latronum; Nam & hæc malè feriatorum hominum turba illud, ad quod nata & educata est, vitæ genus petulanter deferit, ac Arti Medicæ illotas & pestiferas manus malitiosè admovet, Aquas destillat, Simples, Compositas, Pretiosas; Medicamenta varia præparat, Singularia, Secreta, Arcana jactitat, ægrotantes visitat, Medicamenta exhibet, curat, necat, enecat, mortificat; Et hæc quidem omnia impunè, & re quasi optimè gesta, & quasi nullus amplius supersit Magistratus, qui tantam malitiam, fraudes, & scelera, severè vindicare aut velit aut valeat. Impudicum enim hoc hominum genus toti Arti multum fastidii, tædii, difficultatis, ærumnæ, despectus, ac odii peperit, cum de cogenda magis pecunia, quàm de mortalium salute sollicitum, & emungendis solummodò crumenis addictum fuerit, nihil autem re ipsa, vel, quod collaudandum foret, parum præstite-

rit. Ac neque hoc adeo condolendum forsân existeret, nisi, præter ejusmodi rapinas, tot hominum cædes, ac homicidia Respublicæ clamarent; Proh dolor! quot ab Agyrtis his interfecti? Quot in extremam pauperiem, simul ac corporis calamitatem, acti? quot in florida juventute præmaturæ neci sunt traditi? Medicinam, in manu inficii positam, esse gladium in manu furiosi, quis nescit? At quid furiosus? mactabit, non defendet, occidet, non proteget, lædet, non sanabit. Ita igitur hi, omni arrogantia ac fastu referti, Præceptiones omnes Medicas illudentes, Indicationes, ad curationis viam instituendam necessarias, negligentes, concurrentium symptomatum observationes despicientes, æratum, temperaturarum, climatum, anni temporum, ac constitutionum, imò & causarum prægressarum, vix ullam rationem habentes, vespertilionum more in Medicina involant. Et revera plaga est hæc Hominum, iusti DEi Judicio iis hominibus irrogata, qui sese à veræ Medicinæ Legibus, Præceptis, Fide, ac Experimentis, subtrahentes, hisce Aucupibus Corpora sua credunt.

Thes. LV. Et sic tandem verum esse experimur, quod dicitur: Dato uno absurdo, sequuntur plura; Et, si Medici ipsi in tantos rapiantur Abusus, quid mirum, si ex malo Exemplo idem faciant & alii? sic enim omnes ruunt ac dissolvuntur bonæ leges: sic nullus amplius observatur Medicinalis ordo! Ita quidem, ut iis etiam nonnunquam in locis, unde abusus istius emendationes expectandæ erant, exlex quilibet sit, vel esse tamen velit, nec ulla extet Medicinalium Taxa, nec tot annorum spatium habeatur Pharmacopoliorum Visitatio, sed rerum medicinalium omnium extrema suboriatur confusio!

Thes. LVI. Quam tamen Motuum & Geniorum Dyscrasiam, easque, quæ exinde promanare assolent, inconvenientias & exorbitantias, maximè detestantur & abhorrent, quibus Proximi Salus, Posteritatis amor, & Bonum publicum cordi magis est, quam ut ipsos purum putum, & sordidum istud privatum Commodum occidere planè valeat, atque adeo unanimi voto mecum vovent, ut in pristinum restituatur Ars Tandem!

Sic

*Sic Pudor, & tandem Veri Respectus
& Æqui!*

Et hæc sunt, quæ de Singularibus dictis dicere constitui. Quæcunque autem de moderno istorum pariter, quàm Nobilissimæ Chymix Abusu incidenter passim dixi, bono (sanctè testor) dixi animo! Atque adeò solenniter protestor, me contra sincerum veræ Chymix exercitium nec dixisse quicquam,

nec unquam dicendi habuisse animum. Si quisverò est, cujus

Conscia Mens falsi de se putat omnia dici,

Is secum habitet, ac consideret, in quantam per tot tantosque Abusus Medicina, & Moderna præprimis Praxis, abierit hæcenus Barbariem! atque ita nec Vitio, nec Invidiæ mihi vertat, quod Verum & palàm est omnibus.

~~~~~

## EXERCITIUM MEDICUM,

DE

DOLORE HYPOCHONDRIACO,  
vulgò sed falsò

*putato*

SPLENETICO,

\* quod sub Præsidio

*Viri Nobilissimi & Experientissimi,*

MICHAELIS ETTMULLERI,

Phil. &amp; Medicinæ Doctoris,

Publicæ Philiatrorum Censuræ submisit

AUTOR RESPONDENS

EMANUEL BLUM, Hamburgensis.

d. 4. Maji. Anno 1671.

Q. D. B. V.

P R O O E M I U M.

**E**Legans certè est illa comparatio quam inter hominis annique ætates instituit Ovidius lib. Metamorph. 15.

*Nam tener, & lactens, puerique simillimus ævo  
Vere novo est, tunc herba recens, & roboris experts  
Turget, & insolita est, & spe delectat agrestes,  
Transit in æstatem, post ver, robustior annus:  
Fitque valens juvenis, neque enim robustior ætas  
Excipit Autumnus, posito fervore juventa,  
Maturus, mitisque inter juvenemque senemque;  
Inde senilis hyems.*

hominis & anni ætatibus illæ Scientiarum Artiumque respondent; nam, ut rectè Sapiens loquitur Seneca: Multum egerunt majores nostri, sed non peregerunt, multa agenda restant posteris, nec ulli post centum annos exercendi ingenii decrit occasio: ita legimus, Artis Pictoriæ adeò tenera principia fuisse, ut rebus pictis nomina addiderint, eandemverò progressu temporis ab Apelle vel optime excultam, ac Maturæ matris factum egregiè adumbratum fuisse: Ita medicamentorum luxuriosa jam seges, de eorum singulatim agnita virtute surrexit, Inprimis tamen cum illis comparari potest partium humani Corporis structura & usus cognitio. Nec olim paulo obscuriori caligine mersa erat, indeverò ab Harvæo, Conringio, & forsan prius à Paulo Sarpa Veneto, motum sanguinis indicantibus, nonnihil firmitati talo inniti cæpit, ac

Tom. II. Pars 2.

[Rrrr]

etiamnum



etiamnum novas vires & robur acquirit, majores à seculi hujus felicitate expectans. Maxime verò omnium controversa fuit hæc sententia de vera structura & usu lienis, veteribus huic multos morbos adscribentibus, recentioribus vero ipsi patrocinantibus. Et horum quidem Clarissimorum Virorum vestigiis insistentes, & nos impræsentiarum lienem à doloribus ipsi vulgo tributis vindicare, eosdemque colo potius adscribendos esse, demonstrare conabimur.

## CAPUT I.

*Historiam doloris Hypochondriaci recenset.*

## §. 1.



I quæ alia totius corporis regio, utique tertius venter, abdomen qui vocatur Anatomicis, variis ac frequentissimis cruciatur doloribus. Inter plurimas autem, quas hic includit partes primariò intestina dolorosè affliguntur, in morbo scilicet iliaco, dysenteria, tenesmo, dolore lumbari, colica, passionibus Mulieribus hysteris, doloribus in & post partum, doloribus scorbuticis, convulsivis, nephriticis, aliisque similibus. Causas frequentię horum dolorum inquirentes principem locum tenere videmus confluentiam succi biliosi salino volat. oleosi, & succi pancreatici salino-acidi, cum chyllo, ejusque relicto intestina incrustante mucos; nam ex horum sub finem duodeni concursu non potest non à particularum imprimis salinar. hos liquores componentium diversimodâ constitutione, insignis oriri agitatio & effervescencia, quæ in sanis quidem blandè ac sine omni molestia peragitur, in statu verò morbofo hæc ipsa sæpius augetur, subinde etiam insigniter depravatur, quando videlicet vel chylus in ventriculo non benè coctus contumaciter spernit Imperium Triumvirale (ut hoc nomine succum biliosum, pancreaticum, & pituitam intestinalem indigitare cum Sylvio liceat) vel etiam, quando horum unus alteri prædominari studet, vel ex læsa constitutione vitiosè cum altero effervescit, hinc enim illæ lancinationes, distensiones, tormina, frigora, æstus, similesque molestiæ, modo vagæ, modo fixæ, in abdomine oriuntur, de quibus ægrotautes acerbè ut plurimum conqueri solent. Altera ab hac causa est frequentia flatuum, vitiosa effervescentiæ pernitiōsa proles, quibus dum à pituitosa intestinorum diluta crusta, similiter ac à præcipitatis partibus debito terrestrioribus, feculentioribus, viscosioribus, via intercluditur, fit, ut intestina distendantur vehementius, & quasi inter divellantur cum acerbis patientium cruciatu. Accedunt his tertio loco nervei funiculi, intestina frequenter cingentes, ex insignioribus ac mira-

bilibus eorum in mesenterio plexibus, ut ad alias abdominis partes, ita specialiter ad intestina distributi, à quibus, sive per essentiam irritatis, sive per consensum cum aliis corporis partibus affectis, varii spasmodici, convulsivi ac acerbissimi dolores, modò in unâ abdominis parte separatim, modò verò conjunctim in omnibus fere simul, excitantur.

§. 2. Hos inter dolores, si quis alius, acerbis, contumax & sæpe recurrens, est iste dolor abdominis, qui percipitur sub hypochondrio sinistro, & quem ad imitationem *Clariff. Sylvii lib. 1. Prax. cap. 14. §. 6.* Hypochondriacum vocabimus, percipitur scilicet dolor gravissimè lancinans & pungens, interdum simul distendens & vehementer vellicans, fixus sub hypochondrio sinistro, & tam cavitatem illam, quam ibidem costæ spurix efformant, occupans, quàm se etiam interdum latius extendens, ac partem illam molliorem lumbis conterminam obsidens, intumescencia sæpius ibi locorum manifestè apparet, nunc mollis & compressioni cedens, nunc verò tactui pertinacius resistens. Gravius ut plurimum urget dolor, dum ægri supini jacent, uti & dum inspirant; tunc enim punções atrociores percipere se conqueruntur: admotâ verò manu regioni dolenti, hæcque compressâ, remissio doloris & quoddam levamen percipitur; respiratio adest simul difficilis, non tantum ob punções tunc perceptas, sed quod inspirando thoracem sufficienter distendere nequeant, quin impedimentum aliquod in hypochondriis, mediaque regione epigastricâ, se opponere videatur. Præterea appetitus ferè semper simul est prostratus, superveniētibz interdum, si atrocior fuerit dolor, vomitibus contumacibus tam ingestorum quàm liquaminum flavescentium, viridum, viscidorum, crassorum, tenuium, &c. sub quo vomendi conatu ægri miserabiliter de dolorum exacerbatione conqueruntur. Denique alvus ut plurimum est obstructa, rariùs naturaliter fluida, rarissimè nimis laxa, urgetque simul flatuum copia, quorum excretionē levamen aliquod, sed parvum, nec diu durans, percipiunt ægri. His interdum accedunt, & vel potissimum in sexu sequiori, dolores totum abdomen occupantes, & ad genitalia excurrentes, qui parturientium dolores ferè imitantur; hinc ad lumbos dorsumque

sumque reflexi tandem disparent, successivè denuò recurrentes. Clysmata injecta, & primariò quidem ex emollientibus & abstergentibus, hinc & carminantibus, malum levare solent. Similiter quoque remedia externa ex oleis destillatis penetrantibus, aromaticis, regioni abdominis stomachali, s. scrobiculo cordis, ut vocant, item hypochondrio sinistro, & ubi totum abdomen occupatur, umbilici orbitæ successivè illita conducunt. Interiùs verò egregium usum habent blandè laxantia & viscida abstergentia, nec non aromatica, item semina & radices, sapore nonnihil acri, ac odore suavi, pollentes. In genere verò omnia salia volatilia, partibus oleosis & spirituosissimis attemperata, item opiata addita, magnarum hinc virum esse, experientia docet.

§. 3. Adstantes, ubi audiunt ægrorum querelas, subito Lienis & affectum & culpam incusant: His pleno ore assentiuntur ipsi ægri, lienis pessimum viscus execrantes, quin non raro ipsi Medici aut falsâ opinione seducti, aut ut auram plebeculæ captent, similiter morbum lienis vocant, *die Milz-Beschwerung*. Applicantur ob id emplastra splenetica usitata, de ammoniaco, de cicuta, meliloto, mucilagine seminis psyllii, &c. fiuntque inunctiones cum oleis capparum, oleo & extracto nicotianæ, oleo amygdalarum, irino, lil. albor. nardino, tamariscino, juniper. laterino, rutæ, anethino, quæ diutius continuata, tandem non sine fructu sunt. Assumuntur etiam per os usitatæ Spiritus cochlear. nasturt. aquæ & essent. splenis bovis, fumaricæ compos. Tinct. essent. flor. croci & salia, Martialia, saccharum Saturni, remedia ex tartaro parata, similiaque quibus & aperiatur obstructus lien, & dissolvatur ejusdem infarctus, ut humoribus liber exitus concedatur, indeque isti dolores sopiantur.

## CAPUT II.

*Subjectum Doloris Hypochondriaci declarat.*

## §. 1.

**S**plenis viscus usitatè incusari, ex dictis non minus, quàm quotidianis vulgi querelis patet: Nos tamen adæquatum affectus hujus Subjectum esse dicimus intestina sub hypochondrio sinistro delitescantia, tam tenuia, quam primariò crassa, & ex his quidem frequentius intestini coli istam partem, quæ hypochondrium sinistrum occupat, & ubi colon ex ampliori cavitate arctius nonnihil constringitur, ut optimè observavit C. Bauhinus, simulque angulari figurâ curvatum ad renem sinistrum descendit; Est enim hic locus aptissimus, in quo aut scybala indurata

Tom. II. Pars 2.

harere, aut mucilagines acidæ stagnare, aut flatuum impetus cohiberi, retrudi, ac retroflecti possit; Ex quibus quid aliud, quàm dolorum varii cruciatus, lancinationes, rosiones, punctiones, distensiones, subnasci possunt? teste Hildano *Cent. 5. Obs. 58.* ubi ita habet: *Cum excrementa, in superiori & capacissima intestini coli parte, in globos magnos, prout capacitas ferebat, indurata, à flatu versus hanc angustiam magna cum violentia pellantur, accidit, ut non nisi summo cum dolore permeare possint;* Ex intestinis verò tenuibus, *eam jejuni partem, quæ à lumbis liberius in hypochondrium sinistrum assurgit, ibique incurvatur,* simili dolore interdum quoque, sed secundariò tantum, affici, omninò cum Sylvio asserimus: Vid. Sylvius *in Prax. p. 147.* utut rariùs hoc ipsum contingere soleat.

§. 2. Quod si exactè consideremus, quæ circa tales ægros eveniunt, vel spontè asserti nostri veritas se manifestat; Situs enim doloris exactè ad coli situm & conformationem ibidem locorum se conformat, descendens subinde deorsum nonnihil ad renem usque sinistrum, aut extendens se sub costis nothis, non parùm versus hypochondrium dextrum; Imò evenit interdum, ut similis dolor, qui antè erat in hypochondrio dextro, successivè transferatur ad sinistrum, ibique fixâ sede firmatâ atrocius affligat; Unde etiam est, quod Clysmata tam potenter ferant opem, præsentaneumque interdum sint remedium, quod & contractus & virtus eorum hinc inprimis pertingat. Accedit, quod quò contumacior est alvus, eò dolor sit atrocior, & quo illa fluidior, eò hic remissior; Item quod excretio flatuum malum levet, quos ex liene proficisci quis asserat? quin hi ipsi potius nullibi magis quàm in Intestinis, specialiter verò in colo stabulantur. Econtra lien ratione situs, qui est sub costis, ita ut ultimam harum infimo suo extremo vix ac ne vix quidem contingat, tumorem vel visibilem oculis offerre, vel manu palpabilem tactui repræsentare nullo modo potest, id quod tamen veterum volunt asserta, nisi forsân laxata admodum vel rupta sint vinctula, quibus diaphragmati, omento, ventriculo, locisque vicinis annectitur, quale exemplum in *Obs. 3. M. Bogdani* affixis Cultro Anatomico Lyseri prostat, vel ab humore in eo stagnante in immensam molem assurgat, de quo vid. Malpighius de structura & usu viscerum, ubi de liene, vel etiam ipsum lienis parenchyma, modò texturam hanc membranosam ita appellare fas sit, enormiter excresecat, observante Bartholino *C. 1. Ep. 62. p. 254. & C. 4. Ep. 13. & Horstio Institut. Med. Disp. 3. Coronid. 1. p. 131.* nec non Vesalio *l. 5. de Corp. hum.*

[Rrr 2]

fabri-

*fabrica* c. 9. Quæ omnia tamen rarissimè fiunt, cum dolor hypochondriacus sit frequentissimus, & posito illa adesse, talia symptomata, qualia hypochondrio sinistro dolentes habent, non inferunt, de quo infra. Præterea ratione parenchymatis adeò inflari nequit lien, ut in sinistro hypochondrio extuberet, & admotâ manu cum murmure tumor intus occulteretur: id quod soli colo ibi locorum proprium; Nam splenis parenchyma, adeò ineptum est extensioni à flatibus, ut etiam nisi magnâ vi in exempto exsiccatoque fieri possit. Omnes itaque splenis dictas inflationes, potius flatuum aut in jejuno, aut potissimum in colo sub hypochondrio sinistro coacervationes, dixerim. Exemplum sit inflatio ista splenis, quæ est apud Forestum *l. 20. Obs. 4. p. m. 276.* quam in colo fuisse cæcus sit, qui non apertè videat. Propterea namque etiam evenit in tali hypochondrii dolore, quod manus loco dolenti cum forti compressione admota, quatenus flatuum agmina disjiciuntur, dolorificæ distensionis, lancinationisque levamentum adferat.

§. 3. Sed ne solis speculationibus indulgere videamur, vel observationes Practicæ idem oculariter testantur: *Vid. Salmuth. Cent. 1. Obs. 24.* Quæ observatio luculentissima est ad confirmandam nostram hypothesein, scybalis per sesquiannum in colo retentis, affectum & dolorem vulgo habitum splenicum, exactissimè cum omnibus symptomatibus inferentibus. Cui simile, sed magis adhuc stupendum, infarctus talis per sexennium continuati, pro scirrho contumaci habitus, exemplum recenset Fernelius *lib. VI. de partib. morb. & sympt. c. 9.* Nec minus eleganter nostram opinionem illustrat *Obs. 58. in Cent. I. Hildani.* Quibus adjungatur observatu dignissimus affectus & cura relata à Sylv. *Prax. c. 14. p. 168.* Pertinet etiam hinc *Casus 36. Cent. I. Gabelchoveri,* quem splenis dolorem, colicam hypochondriacam fuisse, curatio ejus testatur. Vix dubito, quin & *Obs. 21. Panarolli. Pent. 2.* huic albo inscribam, scilicet, quia mucilaginosæ sordes à jusculo cum spir. vitrioli attenuatæ solutæq; fuerunt, unde transitu per anum reperto, splenicus putatus liberatus fuit. Hinc cautè monent omnes Practici, cavendum, ne dolor hypochondrii sinistri, cum dolore lienis confundatur: Videtis Hildanum *cit. loco,* & Forestum *l. 2. Obs. 2. Schol. p. 275.* quo loco libenter concedit, dolorem colicum distendentem acutum & interdum mobilem, dolorem verò lienis grativum tantum esse. Reliqui Practici, ubi ad diagnosis doloris ex vitio & affectu lienis perveniunt, potius alia signa adducunt, quibus is affectus cognosci debeat, quàm ut proprium splenis

dolorem monstrare possint: Et tamen hæ ipsæ notæ, quibus splene laborantem exprimere conantur, de gravitate, videlicet in hypochondrio sinistro, de dolore à longa ambulatione, equitatione, aliove vehementi exercitio, de appetitu prostrato, fluxu hæmorrhoidum ablato, spiritus difficultate, mæstitiâ, somniis turbulentis, de utilitate supervenientis diarrhœæ, dysentericæ, humorumque acidorum, vomitûs; item quæ de colore cutis atro, excretis nigris, rugitu & murmure in sinistro hypochondrio referunt, ea omnia partim Colo & intestinis affectis vel maximè convenire dicimus, partim verò antiquam istam Galeni & Avicennæ Doctrinam sapiunt, & falsæ ac præconceptæ illi opinioni de officio Lienis circa humorem melancholicum superstructa sunt. Nimirum Lienem ex epate per vas venosum attrahere crassum ac limosum succum, ipsis vocatum Melancholicum, illum alterare, ac ex ipso conveniens sibi alimentum elaborare, reliquo inutili ad Ventriculum per vas breve amando: Quod si jam eveniat, addunt, ut si transitus hic denegetur, excrementum hoc, in totum corpus redundans, id ipsum necessariò inquinat, variosque morbos, in primis verò icterum nigrum, scorbutum, affectionem hypochondriacam, inducit, simili modo ac ex obstructione vesiculæ felleæ icterus flavus generetur. Quorum tamen omnium explicatio ex aliis longè fontibus haurienda.

§. 4. Res ut pateat ulteriùs, consideremus saltem dolorem istum punctorium hypochondrii sinistri, qui post vehementiores corporis motus & exercitia accidere solet, & in specie post equitationem torquet, uno ore *das Milk-Stechen* vocatus; unde etiam natum vulgare illud dogma, eximi posse aut saltem debere cursoribus Lienem, ut citra punctorias has molestias citatiori cursu pergere possent, de quo consulatur Cl. Mœbius in *fundament. physiolog.* Verùm hunc dolorem non esse Splenicum, ipse Sennertus, qui tamen aliàs ex hypothese vulgari Lienis ejusque dolori multum adhuc tribuit *l. 3. prax. pag. 498.* libenter fateretur. In eo tamen à nostra opinione declinat, quod Peritonæo illum acceptum ferat, cum potiori jure intestinis ibidem locorum arctatis, & in specie Colo, ejusque angustiori peripheriæ in curvatura sit adscribendus. Unde etiam est, quod post pastum crebriùs assurgat talis dolor, quando scilicet & copiosiores flatus ex alimentorum recentia assumptione & distributione intestina distendunt, & colon à vicino ventriculi fundo magis comprimitur, & angustatur: ita & impressio digitorum in locum puncturæ, aut fortior manus applicatio dolo-

rem



rem sopit, quatenus flatuum impetum retrudit ac retroflectit, quorum emissionē dolor sensibiliter levatur; id quod ex Liene, quomodo deduci possit? non video. Præterea dolores huiusmodi eis in specie graviores incumbunt, qui affectione hypochondriacâ laborant, ac inde largiori flatuum ditati sunt proventu. Dum E. per motum & exercitium in concalefactis intestinis flatus impetuosiore turgescētia vagantur, sub hypochondrio sinistro, ex quacunque causâ hærent, dolorum istorum punctiorum causâ existunt.

§. 5. Intestinorum si consideramus substantiam, Doloribus acutis concipiendis aptissimam; (sicut reverâ, quàm acuti sint & torquentes, tantum non quotidie experimur) è contra verò Lienis parenchyma quàm his ipsis sit ineptum, magis magisque nostra confirmatur opinio. Est enim totum Lienis corpus membranarum congeries, in Cellulas & concamerationes efformata seu distincta, quæ apud veluti favos aptè repræsentant. In his cellulis copiosissimæ & ferè innumeræ sunt glandulæ ovales, coloris albi, racematim, tanquam uvæ botrus, invicem contextæ, cum septem vel octo singulus quique botrus conglobetur: Has inter sparguntur arteriarum & venarum capreoli, quibus intertextuntur fibræ copiosæ, cum numerosâ ramulorum seu fibrillarum sobole, prognatæ ab interiori membrana Lienis, sive à capsula ejusdem ad robur mollioris substantiæ, sive ut sint tanquam trabes pro firmandis parietibus vasorum sanguineorum & nervosorum ac cellularum. Hanc Lienis structuram, hætenus omnium Anatomicorum sedulitatem, (Hoffmannus enim & alii parenchymatolam carnem appellant, Highmorus verò concretum sanguinem vocat; omnesque Anatomici uno consensu sanguinem congruatum circa fibras nerveas pronunciant; decepti, quòd vel levissimâ cultelli admotione arteriarum & venarum quasi filamenta sanguinem pro supplemento spatiorum, quæ sunt inter glandulas illas, effundant, ac sic densam caliginem oculis offundant) uti primus lustravit Malpighius, ita & idem ad absconditas symptomatum hujus visceris causas facilius penetrare potuit: Nimirum vel à copioso humorum per arterias nervosque affluxu ad glandulas has vel vitio vasis auferentis, vel appulsæ materiæ energiâ, Lienem interdum laxum, & ut plurimum amplum reddi, continuato nihilominus perpetuò sanguinis affluxu in tumore jam factò. His ita trutinatis dolorem pulsatorium ex sanguinis arteriosi motu, aut gravativum ex parenchymate ejus, variis excrementis infarctò, aut Teste Bartholino *cent. 4. Ep. 14.* ultra molem naturalem excreſcente, ipsis li-

benter concedimus: imò ut largiores simus, & tensivum quendam, obscurum tamen dolorem, ex distensione ejus membranæ, tandem largimur: sed acutum, pungentem, lacerantem, terebrantem, & tam atrociter torquentem dolorem ut inferat parenchyma ejus minùs sensile, & cujus structura huic omninò repugnat, nulli admittimus; quin hos soli Colo, & aliquando Intestino tenui ibidem locorum inclusò, constanter adscribamus; Nam & duri tumores & scirrhi Lienem infestant, qui tamen, citra ullam insigniorem molestiam, sæpè etiam insensibiliter succrescere solent, pluresque ad annos circumferuntur.

§. 6. Dolenda intereà est Lienis conditio, cujus structura & usus legitimus, uti hætenus planè stetit incognitus, ne dicam neglectus; ita nihilominus tot malorum morborumque à vulgo ignaro habetur sentina, ut tantum non relegare istud & exterminare ex Republica microcosmica, volupe ducant: Sed innocentiam ejus egregiè defendunt Sylvius Disp. de usu Lienis, ob id à quibusdam malevolis titulum Patroni Lienis adeptus, item Conringius *hist. de Gener. & Usu sangv.* Nam neque scorbuti, neque Mali Hypochondriaci, neque icteri nigri fomes & focus est Lien obstructus, vel alio modo vitiatus; nec magis Quartanæ cubile est Splen, quam Tertianæ Hepar. Et posito, quod Emplastrum Helmontii *de febr. p. 776.* splenis regioni oppositum centenas Quartanas tutò persanarit, nihilominus tamen hoc ipsum non magis sedem esse ejus in splene probat, quàm quod Emplastrum febrile B. D. Michaelis ex fuligine, tereb. camph. &c. quo carpis manuum applicato, in senē decrepito aliquando eandem Quartanam curavit, (non secus ac similia externa sæpiùs mirabiles edunt effectus) probare deberet, eandem aliaque intermittentes residere in carpis manuufm. Plura alia Helmontii de Splene lepidè asserta, tam quoad jus duumviratus, quàm quoad somni vigiliarumque radicem, necnon vim genitalem ex eo derivatam, sufficienter infringit canis sine splene optimè se habens, & omnes actiones, quæ vitales quæ animales & genitales, alacriter obiens. Neque tamen hæc ita accepta volumus, ac si in totum Lienis morbos negaremus, ac universaliter omnes ejus obstructions rejiceremus, nam inquisitiva Anatomicorum manus plus satis eandem ad scirrholam lapideamque duritiem impactas, nobis detexit, sed hoc tantum urgemus: I. Sæpius incusari Lienem ejusque parenchyma, tanquam obstructum & infarctum in morbis Chronicis, in primis verò affectibus appellatis melancholicis, utut id solâ præconcepâ opinione, sine ratione manifesta,

[Rrrr 3]

fecta, sine signo saltem probabili adstruatur, quod confirmat experientia, Cl. Sylvii, qui *Diff. de Liene* testatur, se in cadaveribus longè ultra 100. dissectis, & ex his plurimis per omnem vitam Malo Hypochondriaco, melancholiâ, &c. laborantibus, imò ob illam extinctis semper satis sanum ac floridum observasse hoc viscus, nunquam verò inflatum, induratum, vel obstructum. 2. Tumores, scirrhos, & infarctus hujus visceris, qui non rarò in morbis Chronicis deprehenduntur, & quidem specialiter in Quartana, non tam radices esse horum morborum, aut fomites, quàm producta morbosa istis inveteratis supervenientia, ac ex vitio primæ digestionis orta, simili modo ac calculus productum est morbosum, excerta ista ametria salium, quâ eadem se facile coagulant, ipse verò morbus est lithiasis: adeoque hi Lienis tumores obstructionesque effectus potiùs morbofi erunt, quàm causæ radicales.

## CAPUT III.

*Causas Doloris Hypochondriaci materiales & formales scrutatur.*

## §. I.

**C**Ausarum dum studemus evolutioni, has melioris doctrinæ gratiâ in proximas & remotas, ex rebus non naturalibus desumptas, dividemus; Inter proximas I. se offerunt scybala s. feces alvinæ induratae, id quod fit 1. dum vel à diuturna retentione exsiccantur, quatenus aliæ fluidæ chylosæ partes à venis lacteis absorbentur, & forsân aliæ tenuiores, agiliores & volatiliores perpetuò per poros cutis transpirant, unde partes crassiores & terrestriores suo vehiculo destitutæ, magis concentrantur & compinguntur, ac ob molem suam neque motu illo peristaltico, neque compressione à partibus vicinis, promoveri queunt: Tale exemplum est in Salmuth *C. 1. Obs. 24.* quando per sesquiannum scybala fuisse retenta dicit, item in *Cent. 3. Obs. 45.* Id quod etiam accidere potest à sudore copioso, vel ab exercitio vehementi, &c. 2. dum à coagulatione nimia indurantur: id quod imprimis accidit aut vitio succorum sub finem duodeni miscendorum (quod Graßius succi pancreatici vitiosæ aciditati ac austeritati adscribit) aut assumptorum, quando hæc duriora, viscosiora, ac in ventriculo non bene cocta, neque in intestinis cum bile & succo pancreatico satis permista fuerint. Ex his enim & similibus causis scybala prædicta facile subsistunt, in cellulis Coli, in specie tamen ubi sub hypochondrio sinistro angustatur & incurvatur, ac adeò dolores, & sæpius duritiem tactui resistentem, inferunt. Teste, præter

*Obs. Salmuth. suprà allegatam, Schenckio in Obs. lib. 3. ubi plura adducit similia exempla: Quo simul facere videntur Colicæ aureæ ex nummis aureis deglutitis observatæ à Bartholino Cent. 3. Ep. 69. Berello Cent. 2. Obs. 77. pag. 94. nec non C. 4. Obs. 25.*

§. 2. Post scybala sese offerunt sordes mucilaginosa & viscida, eæ scilicet, quas vulgò pituitam vitream nominant; Paracelsus verò in sensu latiori Tartarum fecalem & mucilaginofum, quod succo illi, qui in vino circa doliorum parietes concrevit, quodammodò similis, & acidum subtile, coagulans feces, ejus sit primordium, appellat. Producentur autem hæ sordes in nimia copia modò ab alimentis difficulter digestibilibus, viscidis, &c. de quibus inferius dicendi erit occasio; modò à fermento stomachico, deficiente in digestionis negotio, & loco chyli volatilis falsi liquamen viscidum tenax mucilaginofum, & ut plurimum vitiosè acidum, producente; interdum etiam ex inertia s. deficiente acrimonia succi pancreatici & biliosi, non abstergentium nec solventium mucum intestinorum superfluum. Ab his & similibus causis pasta crassa, viscida ac tenax, sæpius acida & pontica, generatur, ventriculi & primario intestinorum lateribus agglutinanda & infercienda. Teste Salmuth *Cent. 5. obs. 78.* Vidit Dn. Peucerus in Italo quodam, Colica consumpto dissectoque, totum Colon pituita obductum relicto saltem foramine digiti crassitie. Huic proximè accedit, quod refert Sennertus *lib. 3. Prax. de Cl. Lipsio*: hunc scilicet aliquando materiam adeò lentam & tenacem, paulatim in tota intestinali fistula à vita sedentaria ac in studiis contabescente, coacervatam, ejusque figuram retinentem per alvum rejecisse, ut se omnia intestina effudisse putarit. Affinis his est locus ille Fernelii suprà allegatus, ubi Coli ex toto à pituita infarcti legitur exemplum. Hæc pituita, si simul, id quod ut plurimum contingit, vitioso acore, sive ex stomachi errore, s. ex succi pancreatici vitioso acore, omnibus partibus membranosis hostili, inquinata, ac in Colo sub hypochondrio sinistro collecta fuerit, fixum continuò lancinante, & quasi aculeis pars perforaretur, atrociter pungentem, apto vocabulo terebrantem appellatum, dolorem infert.

§. 3. Frequentes denique dolorum vulgò dictorum splenicorum causæ flatus, sub hypochondrio sinistro inclusi. Hi ipsi non à calore, neque à frigore, ut Veteres voluere, & in quam mentem loquitur Forestus *lib. XX. obs. IV. in schol.* Generatur igitur flatulentia, Teste Actio, ex frigiditate membrorum eundem producentium; & cit. loc. addit: aromatica propinare nolui, ne materia illa

illa frigida in flatus dissolveretur; sed per vitiosam generantur fermentationem, probante id Kergero *tr. de ferment.* 3. c. 4. p. 223. prædominante in hac vitioso ac p. n. acido, idque sæpissimè in subiecta materia viscida. Generari dixi flatus per fermentationis modum, ita ut reverà non inexistant assumptis, sed de novo producantur ex eisdem, sive in stomacho sive in intestinis hoc fiat; Non secus ac ex musto fermentante eructatur Gas copiosum flatulentum, quod antea in eo non erat, sed per fermentationis demum modum excitatur. Hinc est, quod hypochondriaci ex quibuscunque ferè assumptis copiosos generent flatus: cum contra robustus stomachus vulgò flatulenta dicta citra eorum proventum potestate sui fermenti digerat. De quo vid. acuratiùs Helmontius *tr. de flatibus*. Sunt nempe flatus novum quoddam ens spirituosum, spiritus scilicet sylvestres incoercibiles & non coagulabiles, quos ex defectu Erymi nomine Gas appellat Helmontius in suis scriptis, & quos neque præcisè salinæ, neque sulphuræ naturæ esse, sed ex utriusque actione aliquod emanans tertium, aptè asserit Becherus *Phys. subterr.* l. 1. §. 5. c. 2. Hi E. flatus impetuosius per amplitudines Coli delati, impingunt in lateris sinistri eà parte, quâ id incurvatur ac angustatur, unde in se coacti cum murmure & borborygmis non rarò sensibilibus retro fluctantur, & molestum distensionis lacerationisque sensum inferunt, tunc imprimis, quando respirationis actione diaphragma deorsum pulsum, Colon ibidem substratum premit, ac ita flatus in angustum spatium cogit; unde non rarò tumor elevatur, qui affectione hypochondriacâ laborantibus potissimum familiaris est, & male inflatio Lienis dici solet.

§. 4. Fuerunt hæ Causæ proximæ: accedo ad remotas, ex rebus non naturalibus desumendas: has inter 1. est aer frigidus, abdomine vestibus non benè munito susceptus; quod si enim juxta Hippocratem, densam ac duram cutim habentes faciliè offenduntur, quod excrementis in corpore contentis non pateat liber exitus per cutim, multò magis frigus, non modò poros claudens, sed etiam per eos se forsan in corpus insinuans, subindè intestinorum varios dolores inducere, puitantque ipsam inspissando malum hoc excitare posse opinamur; Sic Forestus dicit, fratrem ipsius statim à refrigeratione pedum dolorem Colicum incurrisse *l. XXI. obs. IV.* id quod etiam Hippocrates *S. 3. Aph. 5. & 17.* item Fontanus *in l. 2. cap. 2. pag. 37.* Methodi Generalis testatur. 2. Assumpta vel quantitate, quâ fermentum stomachale ob-ruunt, ita ut hoc tantæ activitati insufficiens

reddatur; vel qualitate suâ, sc. quatenus aut difficulter sunt coquilia aut viscida, aut mucilaginosa, aut adstringentia, ad hanc passionem disponunt. In horum classe constituti sunt pisces frequenter comesti, item castaneæ, mespili, & alia vulgaris notitiæ; ita ex Mœbii *Instit.* p. 453. patet, ex spirarum in nimia copia assumptione dari alvum obstructam; ita Schenckius *l. 3. obs.* ex cerasorum cum nucleis devoratione alvum per 3. septimanas clausam fuisse, & eodem post id tempus per alvum demum exiisse notat. Ita Cornarus ova indurata & comesta alvum adstringere observat *Cons.* 4. Ita Sennertus ex Platero annotat, quendam Colicis cruciatibus diu vexatum, post clysmatum usum, casei (quem copiosum antea assumpserat) concreti induratique magnam copiam per alvum excrevisse: ita Uvæ cum pelliculis comestæ lethalem alvi contumaciam aliquando induxerunt; pelliculæ enim harum cum facultati digestivæ reluctentur, ac insigniter acidæ stomacho in intestina elabantur, fit ut coagulentur excrementa, ac sic pertinacissima obstructio sequatur. Consideranda venit etiam ipsa stomachi cruditas acidæ, ex qua in intestinis postmodum per vitiosam fermentationem producuntur flatus, infarciens eadem de causâ copioso muco intestina, & in specie colon ejusque cellulas: Id quod in iis ad oculus patet, qui affectione hypochondriacâ laborant, in his enim acidi hoc nimium & vitiosum in stomacho modò dictos effectus, tanquam pedissequas, secum ducit.

§. 5. Præter alia & flatulenta, & in specie fermentativa assumpta, dolorosas has in sinistro latere dant turbas; Est scil. quorundam assumptorum hæc natura, ut sub digestionem stomachi fermentativa, copiosum Gas eructent, v. g. ex uvis comestis, it. ex cepis, quod partim sub ructuum nomine per os exhalat, partim per pylorum erumpens intestina flatibus replet, unde talia flatulenta dicuntur; sed & imprimis fermentativa assumpta hinc consideranda sunt, ut fructus horcei, item musti potus, omniaque mellita ac saccharata, quæque ad horum naturam accedunt; talia enim in passione hypochondriaca viro- rum & suffocatione hysterica mulierum, quæ ferè coincidunt, cum vitioso acido effervescente copioso flatus producunt, & sic doloris hypochondriaci fomitem ministrant. Novi mulierem, quæ ex potu vini tenuis cum saccharo probè edulcorati in atroces abdominis & in specie hypochondrii sinistri cruciatus incidit: Cumularat autem ea antea ex inepta diætâ copiosam puitam, unde ex potu fermentativo superingesto flatus excitati, ac in colo hinc inde coerciti & ober-  
rantes,



rantes, tamen atroces dolores inferebant: simile exemplum refert Forestus de mercatore quodam, cui ex flatulentulorum ciborum ingestione, & potatione musti, & tumor insignis & ingens dolor in latere sinistro exortus fuit, qui cum copioso flatuum exitu finit.

§. 6. Somnus & ipse nimis ad intestinorum infarctum ac scybalorum aut viscidiorum excrementorum in Colo hasionem, plurimum disponit. Id quod etiam de quiete valet. Quemadmodum enim motu ac exercitio corporis sanguinis circulatio, ejus vitalis fermentatio, ac spirituum volatilium generatio augetur, unde & alimentorum fermentatio, assimilatio, distributio, & heterogeneorum separatio promovetur; ita e contrario somnus nimis generandis & coacervandis crudis succis inservit, & omnes excretiones sensibiles consuetas, dum dormiens 7. horarum spatio occultè, salubriter & sine violentiâ perspirare solet, duplò magis, quàm vigilans, teste Sanctorio *in Med. Static. f. 4. aph. 2.* tam propter rituum animalium tardiorum motum, quàm propter partium agiliorum transpirationem insensibilem, transudationemque sensibilem, impedit, unde & ipsa excernenda imminuta, indeque intestinorum retenta plurimum aucta, tandem dolorem nostrum inferunt, ut ex dictis patet. Ut namque aliàs legitimum sanitatis conservativum est motus, vicarius nempe omnis V. S. nis, purgationis, aut alius cujuscunque sanguinis correctionis, id quod rusticorum & mechanicorum gens præ aliis sana confirmat; ita somnus immoderatus & nimia quies plurimis, in specie diuturnis agritudinibus fenestram aperiunt. Animi affectus ad motiones spirituum & humorum commodè referuntur, unde in quibus minùs hi agitantur & moventur, ut in mœrore, tristitia, metu, &c. ad dolorosum hunc affectum disponunt; in quibus verò iidem vehementius moventur, ut in ira, gaudio, &c. potiùs hunc ipsum curant.

§. 7. His ultimo loco ex rerum naturalium genere annectenda venit peculiaris quorundam Idiosyncrasia, quâ miræ stipticitati alvi quidam sunt obnoxii; quod, utut citra insignius incommodum fieri soleat, tamen periculo non vacat, quin diutiùs retenta scybala in Coli anfractu sinistro, dolorem hunc inducant. Cujus Idiosyncrasiae exempla videantur in Sennerto *l. 3. Prax. P. 2. S. 2. c. 4.* Item Bartholino *C. 4. Hist. 40.* Panarollo *Pentec. 1. obs. 1. & 17.* Sylvatico *Conf. 46. l. 3.* Rhodio *Cent. 2. Obs. 81.* Salmuth *C. 2. Obs. 65. & Cent. 3. Obs. 36.* Schenckio *l. 3. obs. Meibomio, de Usu flagror. p. 7.*

§. 8. Fuerunt hæ causæ materialiter consideratæ: videamus jam earum efficaciam for-

malem, seu rationem, sub qua talem inferunt dolorem, sæpè miseros ejulatus extrudentem; sic quicquid obstinatiùs tanquàm hostile irritat sensum intestini Coli, in ea parte, ubi angustatum & incurvatum sub hypochondrio sinistro incedit, hoc ista irritatione molesta, sub qua intestinum dolere incipit, istud in contracturas & spasmos convulsivos cogit, à quibus doloris mira exacerbatio & crudelitas, cum intestina velut per crampum contracta corrugataque dolorem manifestent suum. Nam contractura est equidem sensationis irritatæ s. doloris effectus s. consequens; nihilominus tamen hac accedente mire augetur dolor, adeò ut qui antea ferè insensibilis esset, nunc crudelibus torminibus partem spasmo convulsam quodammodo dilacerare videatur. Oculari exemplo hoc confirmat Helmontius *Tr. de flatibus §. 38. & de Lithiasi c. 9. §. 132.* Mitiora hæc sunt, ubi scybala indurata solum intestinum obsident: ast si mucilago tenax acore peregrino rosivo imbuta pertinaciter ipsi adhaerit, hujus ponticus acor in viscida materia obstinatè hærens, & continuò rodens, partem perforare quasi videtur, & ad ejus propulsionem, frustra tamen irritata intestina scilicet convellunt & corrugant, unde crudeles lincinationes & torsiones, subindeque recurrentes pungentes lincinationes misero modo agros torquent; simili ratione atque purgantia medicamenta, quatenus eorum particulae subtiliores, intestinis inimicæ, his pertinaciùs affixæ hærent, horum spasmos ac dolorificos cruciatus inducunt; sic antimonium in substantia assumptum membranas Intestinorum vellicando, torminosam hypercatharsin infert, uti & resina vegetabilium; item arsenicalia incautè usurpata horrendos vomitus ac hypercatharses dolorosissimas inducunt. Periculosior est flatuum procella, qui ex vitiosa, à p. n. acore, fermentatione excitati, & sub hypochondrio sinistro nonnihil coerciti, sui acrimoniâ & exoticâ impressione gravem dolorem inferunt; unde convulso contractoque intestino & exitus ipsis præcluditur, & simul retropelluntur, unde vagos & oberrantes, in primis tamen sinistro in latere frequentius recurrentes, cruciatus excitant: Distendunt namque hi intestinum, & hæc violentiâ sensationem dolorificam inferunt, authorem contracturæ & consequenter torquentis convulsionis: Vid. Helmontius loco supra cit. Dictis lucem affundit experientia ocularis Magnif. Dn. D. Welschii, Mœcenatis & Hospitis mei omni observantiâ colendi, qui dum Anatomicas fœces generet, in sectione colicis cruciatibus enecatì deprehendit totum Colon à flatibus immentum distensum, sub insertionem v. in intesti-

testinum rectum, ubi simili modo ac media sui parte sub hypochondrio sinistro in gyros contorquetur, adeo coarctatum, ut nil magis visum fuerit, quàm planè ibi coaluisse; ipse v. defunctus per quatuordecim dies sævissimis torminibus cum sonitu ac fragore sæpius horrendo dilaceratus fuerat.

§. 9. Quod si spasmi hi intestinales frequentius incurrentes per nervulos eorum ad plexus communes in mesenterio deriventur, ex his ipsis contracturæ istæ spasmodicæ in alias quoque vicinas partes ex iisdem plexibus nervos accipientes (nam vix in infimo ventre datur pars præter diaphragma, quæ non de iis nervos participet) contorquentur, unde totum abdomen excruciantes dolores & vago & inordinato hoc spirituum motu occupant; quare & vomitus pertinaciores subinde superveniunt, quin & in mulieribus similes cruciatus, ac si foetus enitendus foret, inferuntur. Id quod clarius patet, modò consideremus Colicam Nephriticam, s. istos abdominis dolores ac vomitus sæpe crudeles, qui calculo Renum tortori superveniunt; nam & hi ipsi non nisi per tales spasmos à renum nervulis mesenterii plexibus communicatos, & hinc ad intestina & stomachum vibratos, ibique convulsivos tales dolores inferentes, producuntur.

## CAPUT IV.

*Signa Diagnostica & Prognostica proponit.*

## §. 1.

**D**iagnosis Doloris Hypochondriaci ex historia c. 1. recensita per se patet; saltem distinctiva evolvenda sunt signa, quibus & causæ inferentes à se invicem distinguantur, & quomodo à cognatis sibi affectibus discriminetur, intelligatur? Ex quibus iudicium formari poterit, an brevi vel diu duraturum sit malum? & an graviora symptomata malum redditura sint periculosius? an v. minus periculosum ista remissiora?

§. 2. A scybalis malum oriri dolor fixus sub costis nothis, cum quodam gravitatis & ponderis sensu; tumor tunc durus, interdum ad coli situm deorsum versùs protenditur, ut hoc in exemplo à Sylvio *Prax. c. 9. §. 57.* recensito, elucet: Adest contumax alvi obstructio; Præcesserunt causæ externæ ad excrementorum indurationem & retentionem disponentes: quales sunt balneum, sudores, exercitiaque nimia, assumpta duriora & viscidiora, potus parcius hauritus; uti & vitam sedentariam dispositivè concurrere, & urinam copiosius redditam illas producere testatur ipse Hippocrates *Aph. ult. Sect. 4.* & Hollerius in *Comment.*

Tom. II. Pars 2.

§. 3. Mucilaginem ponticam, acidam, pertinacius coli cellulis in sinistro hypochondrio adhaerentem, esse causam huius doloris ex eo ferè patet; quod dolor sit perterebrans, fixus, & ferè continuus, quod adsit sensus contorsionis in isto loco admodum dolorosus, & punções continuatæ: qui dolores si fuerint graviores, subinde & reliquis intestinis & mesenterio per consensum affectis per totum abdomen successivè, & hinc ad lumbos detorquentur. Eandem ulterius manifestant ciborum fastidium, singultus, vomitusque pituitosi, ætas consistens, crapula frequentior, & alvi reseratio sine doloris remissione.

§. 4. Flatus esse causam horum dolorum ex hoc elucet, quod vagi sint, & modò cessent, perinde recurrant, adsint simul borborygmi & murmura abdominis, regio hypochondriaca tumeat & turgeat, non secus ac sæpius totum simul abdomen, manu sinistro lateri admotâ cesset dolor, flatus per inferiora erumpentes malum levent, subinde etiam ructus per superiora missi dolorem minuant, adsit difficilior ac impedita nonnihil respiratio, ipse æger sit Hypochondriacus, & aliàs flatuum generationi obnoxius, præcesserint assumpta aliàs dicta flatulenta, item effervescentia, de quibus cap. præcedente dictum.

§. 5. A cognatis sibi affectibus discriminatur facile, & 1. quidem à peritonæi & musculorum doloribus; quia hypochondriacus est profundior, & quod musculorum ille facile tactu deprehendi possit; nam compressi leviter dolorem inferunt, teste Sennerto *Prax. p. 488.* 2. Minus facile à cardialgia oriunda, videlicet ex iisdem ferè causis in stomacho, ex quibus hic noster affectus in intestinis, unde &, inconvenienter licet, colica ventriculi vocatur: Hæc ipsa sæpius per *συνάθνη* dorsum supremamque lumborum regionem affligit, interdum etiam inferiora petit, ac egregiè dolorem Colicum mentitur; unde non raro errores in curatione nascuntur, observante id Schenckio de quibusdam Medicis, ægrum de dolore anteriori stomachi conquerentem pro cardialgia laborante habentibus, qui tandem Clystere utiliter applicato, dolores hos à Colo provenisse cognoverant. 3. Ab Iliaco dignoscitur, ratione loci, quod hic circa umbilicum magis torqueat, idem quod scybala *αἰώ* magis quàm *κατὰ* rejiciantur, quodque brevioris sit moræ. 4. Inter dolorem Hypochondriaco-colicum & nephriticum, ob vicinum situm, & per plexus mesenterii nerveos conjunctionem, sibi multum affines, id discriminis observatur, quod hic minus sit tensivus, sed gravans & fixus, deorsum tendat,

[Ssss]

ac

ac ureteres lædat, & urinas colore lacteo ferè cum copioso sedimento tingat: id quod non fit in illo; Licet etiam §. hæc passio hypochondriaca sæpè complicitur cum hysterica passione in mulieribus, dum dolores in hypochondrio sinistro incipientes, in medium abdomen contorquentur & ad spinam dorsi lancinantes, vehementes præcordiorum angustias inferunt; imò interdum in inguina descendunt, & qf. fœtus enixum repræsentant: qualem dolorem mulieri inde à tempore abortûs sæpiùs recurrentem, & semper ex hypochondrio sinistro incipientem, & abdomini tormina inferendo, ad inguina & lumbos descendentem, carninantium tamen & pituitam acidam evacuantium usu cessantem, observavit Dominus Præses. Attamen à se invicem discriminantur, quod rariùs in suffocatione hysterica fixi hypochondrio sinistro inhæreant dolores, & quod in passione hysterica majores borborygmi ac tumultus oriantur in medio abdominis, quod item majores præcordiorum angustiae ac anxietates, non raræ quoque lypothymiae adsint, id quod in dolore nostro evenire non solet; ut raceam faucium angustias, ac horrendos, sæpius etiam ridiculos gestus, qui passionem hysterica comitari solent. Quibus notis ulteriùs distinguendus sit hypochondriacus à reliquis abdominis doloribus affinis? dicere superfedeo, & facile cuivis patebit, qui partem affectam situmque ipsum doloris attendet.

§. 6. Prognosin quod attinet: caret malum hoc omni ferè periculo, si pars modò coli, inprimis verò circa finem laboret, clysteribus eò faciliè penetrantibus; minus verò facilem medicaminibus se præbet, si totum intestinum fuerit infarctum; tunc enim diuturnâ morâ, sui acerbitate, vigiliis, inquietudine, similibusque, vires insigniter dejicit: idque eo magis, si malum hæreat in intestino tenui, hypochondrio sinistro substrato. Contumacissimum curatu est, si à mucilagine pontica & pituita vitrea oriatur; nam supervenire solent convulsiones, abdomen sæpiùs quasi excavantes, & umbilicum interiora versus trahentes. Nec minus periculosa est hæc passio, si oriatur à scybalis diutiùs retentis; periculum enim est, quin ad volvulum aut inflammationem partem affectam disponat; si verò à flatibus originem ducat, in tympanitidem abire potest, aut distendendo nimis abdomen, ad umbilici intumescantiam, aut herniam disponere, observante

id Foresto *lib. XXI.*

*Observ. V.*

## CAPUT V.

*Medendi rationem Doloris*

*Hypochondriaci docet.*

§. I.

UT denique compescatur tam atrox furia, salutare opem ferunt Medicorum manus, quæ procelloso morbi turbine sedato, exoptatam corpori serenitatem reddunt; remedia scilicet hæc afferunt, quibus malum auferunt, inventa per indicationem mediante ratione, confirmata per experientiam, illustrata per analogismum. Ut dolor equidem sistatur, anodyna in genere dicta, item in specie narcotica requiruntur. Ut causa removeantur variae, varia tentanda sunt, scybalis dura emollienda & evacuanda, mucilago viscida incidenda, abstergenda & expurganda, flatuum proventus inhibendus, & eorum ex acido origo destruenda: Quibus coronidis loco, præservationi ab hoc malo dicata, adjungenda erunt.

§. 2. Fontes, ex quibus hauriuntur remedia salutaria, pro his scopis sunt Chirurgicus, Pharmaceuticus, & Diæticus: prior vel pauca vel nulla subministrat auxilia, pro nostro equidem affectu, mitioribus ferè succumbente, nec crudelem Chirurgi opem postulante; ob id ea, quæ à Pharmacia ex tribus regnorum divitiis, & ex diætica suggeruntur, inprimis producemus, initium faciendo à causarum remotione, ut eò tutiùs postmodum ipse affectus dolorosus deleri possit.

§. 3. Si induratae faeces obsederint coli cellas, & quæ sub hypochondrio sinistro sunt, angustias, optimum erit, eas primâ quâque occasione per consuetam portam inferiorem educere: Convenit tamen his præmittere emollientia, quibus humorum crassities attenuetur & diluatur, ac viarum impedimenta amoveantur. Utrique scopo satisfaciunt inprimis clysmata, licet enim Helmont. eorum usum ceu pudibundum, & quod vix citra ruborem à Medico suaderi possit auxilium, rejiciat, tamen argumentis ejus non nihil satisfacit Hoffmannus opere de methodo medendi *c. X. l. I.* & quotidiana experientia ipsi aperte contradicit, quæ saluberrimum clysmatum usum creberrimè ostendit; quem etiam ulteriùs sufficienter confirmat Mœbius in Dissert. Eruditâ & Eleganti de usu clysterum medico, cuius verba sunt: *Clysmata cunctis intestinorum aegritudinibus levamento sunt, s. calida s. frigida adsit intemperies, eam corrigere poterunt;* & paulò inferius addit: *Ut autem abusus non à fecibus exsiccat tantum sed etiam flatibus induratur; ita & illis exterminandis &*

*disflo-*



*disflodendis clysteres intervinunt; & rur-*  
*sus: in affectu hypochondriaco, melan-*  
*choliâ hypochondriacâ, febribusque in-*  
*termittentibus, ubi alvus ferè semper est*  
*adstricta, incredibilem ferunt fructum*  
*clysmata s. molliendo s. purgando rem tra-*  
*ctare velis, &c.* Clyisma itaque tale pro usu  
 emolliendi injecisse è re erit.

℞. Rad. alth.

lil. albor. ana ʒß.

HB. malvæ

summit. melil. ana m. ij.

Coqu. in f. q. ꝛa hordei.

Colaturæ ʒix. adde.

El. bened. laxat. ʒj.

Ol. lil. albor.

rapar. ana ʒß.

Vit. ovi No. j.

Misc. pro Enemate.

Vel hujus loco lac vaccinum cum melle  
 gali instar clysmatis injectum, & fæces emol-  
 lit, & lubricando vias educationem faciliat;  
 Clyster etiam ex solo oleo lini & rapar. ana.  
 ʒiv. ad ʒv. injectus, & ad tempus retentus,  
 mirus est ad alvum à scybalis impeditam re-  
 solvendam: Clyster hic acui potest cum ʒß.  
 vel ʒvj. olei diacolocynthid. Quercetani.  
 Hic namque ferè simili ratione alvum per tres  
 hebdomades pertinaciter à fæcibus induratis  
 obstructam, aliis omnibus irritis, reseravit.  
 Rulandus injectis singulis horis ʒiv. olei oli-  
 var. unde emollitis post ʒ. horas scybalis, his-  
 que præduris copiosè rejectis, ager est resti-  
 tutus: Vid. Thesaurus Rulandi p. 233. Qua-  
 lem successum idem author. cit. loc. p. 236.  
 per oleum lini ad ʒv. nunc solum, nunc cum  
 ʒß. trochiscor. alhandal injectum obtinuit.  
 Quod si tamen contumaciora stercora hæc &  
 similia lenia non promoverint, ad aciora  
 pergendum, & clysmatis lenientibus ʒis  
 gemmæ ʒi. ad ʒij. permiscendum; hoc enim  
 ex experientia luculenta Foresti lib. 21. obs. 5.  
 scybala emollit, ac intestina ad eorum ex-  
 pulsionem irritat; ubi tamen observetur:  
 omittenda tunc esse oleosa & mucilaginosâ  
 ingredientia, ne his ipsis obtundantur acu-  
 lei incidentes, emollientes & stimulantés ʒis  
 gemmæ. Quod si v. neque hæc sufficere vi-  
 deantur, pulpa colocynth. in peria ligata istis  
 incoquenda est, v. g.

℞. Flor. meliloti,

verbasci,

chamom. ana m. j.

sem. lini. ʒvj.

pulp. colocynth. in pet. lig. ʒß. ad ʒj.

Coq. in f. q. ꝛa simpl.

Colaturæ adde

El. bened. laxat. ʒß.

ʒis gemm. ʒj.

M. F. Enema.

Tom. II. Pars 2.

Hiscæ Enematis injiciendis externa emol-  
 lientia applicanda loco dolenti, aut fomen-  
 ta ex sacculis emollientibus vulgò notis, in  
 lacte coctis, item alia decocta emollientia  
 adhibita suppetias ferunt, uti & oleis, lini-  
 mentis ac unguentis emollientibus, cum fel-  
 le tauri, aut unguento, v. g. de artanita, di-  
 althææ acutis & hujusmodi aliis, opompha-  
 licis dictis, simul stimulantibus illitis, natura  
 adjuvatur.

§. 4. Quin & non incommodum erit,  
 assumptis simul per os emollientibus dura, aut  
 lubricantibus intestina, scybala dolorifica lo-  
 co suo sub hypochondrio sinistro deturbare.  
 Usitatus hic est usus largior butyri, aut oleum  
 amygdal. dulc. ab ʒj. ad ʒij. seu plures, in jus-  
 culo calido sumptum; quo potentius adhuc  
 & certioris effectus est oleum lini, singula-  
 rissimum hoc antipleuriticum, de quo Vid.  
 Gabelchoverus C. 4. Cur. 68. quo ab ʒj. ad  
 ʒij. cum syrupo de jujub. vel violar. & aliquot  
 gutt. olei destillati anisi (ut hoc odor fastidio-  
 sus, illo verò sapor nauseosus corrigatur) ex-  
 hibito, mire solvuntur ac abluuntur scybala  
 dura, torminum Hypochondriacorum au-  
 thores. Pertinet hæc mica panis tosta, &  
 oleo olivar. irrorata, manè deglutita, re-  
 medium à Borello l. 2. obs. 14. commenda-  
 tum. Lactis quoque largior haustus, aut,  
 quod melius est, serum (cujus vis ① ofa in-  
 testinorum abstersiva mira hic præstat) vel so-  
 lum, vel cum melle attemperatum, assu-  
 mpsisse conducit. Inprimis verò passulæ mi-  
 nores saltem hic ferunt opem, sive pulpa  
 earundem, sive decoctum cum stimulo ① of  
 assumatur; hoc namque blandissimè alvum  
 subducendo fæces induratas hinc inde hæ-  
 rentes abstergit, emollit atque lubricat, un-  
 de speratus vix faller successus; Idque eo  
 magis, si uno alterovè blando laxativo acue-  
 tur eorum virtus. Hypochondriacis sanè,  
 quibus ob induratas alimentorum scorias, si-  
 ve ob acidum pancreatis austerum, nimis eas  
 coagulans, s. ob pituitam acidam vitio dige-  
 stionis stomachicæ prognatam, eas glutino-  
 sas reddentem, tantum non continuò ob-  
 structa est alvus, optimè conducunt passula-  
 ta, quæ inter seqq. potio palmam obtinet.

℞. Passul. minor. ʒiß.

Contundantur in mortario lapideo, ad  
 consistentiam pultis:

Coque in ꝛ simpl. lbij.

Colaturæ ferventis lbijß. infunde

Fol. sem. s. stipit. ʒijj.

Flor. violar. p. iij.

Crem. ʒi ʒi.

Stent in loco calido per noctem:

Colatura manè filtretur,

D. S.

Eröffnender Tranc.

[Ssss 2]

Cujus

Cujus haustulus mediocris esuriente stomacho assumendus, palato gratus, & blandissimum Hypochondriacis laxativum existit, faecesque induratas aut viscidas suavissimè educit.

● Aut usurpetur pulpa passular. cum cremore & Tartari subacta & aliquot gran. extracti trochisc. alhand. acuata, quæ dat Electuar. non inconueniens ad scybala suaviter promovenda, & ibidem natos dolores hypochondriacos sistendos. De passulis & prunis laxativis communiter notis, nil addere placet.

§. 5. Juscula quoque, & ex blandis emollientibus parata Decocta, quibusdam in usum sunt: quorum formulas præscribit Barbette *Prax. p. m.* 73. 75. It. Horstius *C. 5. Obs. 8.* Quibus emolliendo dura ac sensim lubricando intestina subducitur alvus. Sed his levioribus missis, si pertinacior fuerit induratarum secum infarctus, ad æum vivum ceu sacram anchoram confugiendum erit, & propinari poterit ab ℥j. ad ℥ij. & plures, pro ratione circumstantiarum, & sanè hujus permeans fluxibilitas, etiam impactissima stercora permeabit, & excernibilia reddet, quin & volvuli hinc oriundi metum omnino eximet, cujus felicem usum deprædicatum vid. apud Henricum ab Heer *Obs. 2.* Fontanum *Cons. & Respons. pag. 85.* Moinichen *Obs. 7. ad cultr. Anatom. Lyseri annexa.* Præceteris efficacia ejus ex sequenti patebit *Epist. ad B. D. Michaëlem à Celeberrimo Erbenio exarata: adhunc vocor febricitantem & pertinaci constipatione, variorum cathartecorum fortissimorum enematum per XI. dies contemtrice, ad brachia usque tumefactum: Jussi alvo applicari ex arte follem ferrarium, ut beneficio inflationis excrementa illa, indurata & perusta febrili calore, ab intestinis coherentibus liberarentur, sed irritò conatu: Unde ipsi propinavi ℥iij. & vivi, qui mole sua & mobilitate patientem inter deambulationes primum, mox saltationes, deniquevectionem curru über Pflaster und gebaute Acker / alvo rebelli & morti imminenti eriperet; Sed omnis conatus fuit vanus. Lento processu suo & labore & excrementa ita liquefecit, ut nocte ab assumpto æio blande effluerent, dormiente nec advertente patiente, donec expergefactus stratum accubiculum pollutum, atque ex æio a menstruo microcosmico resolutò, inargentationem videret, sine sequentibus convulsionibus.*

§. 6. Quod si v. non tam indurata feces, quam, quod frequentissimè contingit, mucilago acida & austera parietibus coli inflexi adherens, cruciatuum hypochondria-

corum terebrantium & contorquentium extiterit causa, (licet cum hac flatus ut plurimum concurrant, de quibus inferius dicitur) hæc incidenda, attenuanda, & per inferius guttur rejicienda venit. His usibus nunc injecta clysmata, nunc applicata fomenta & emplastra, nunc appropriata pharmaca propinata, inserviunt. Clysmata itaque incidentia & resolventia superius allegata, inprimis ex Θgemæ & colocynthide, hic etiam erunt appropriatissima: item quæ sunt ex jure pisorū cum saccharo, melle & Θgemæ nam & hæc eleganter detergunt mucilaginosas sordes viscidas: quibus ubi fortius agendum est, addit suam & benedictam Rulandus, (loco cujus infusum vel decoctum vulgaris croci metallorum substitui potest) dum in desperatis ferè abdominis doloribus sequ. clysterem subindè repetendum, felici cum successu applicat.

℞. *Juris pisor.* ℥vii.

*Sacchari* ℥ss.

*¶ & bened. nostr.* ℥ijss.

*Olei commun.* ℥iv.

Misce ea, & injice quavis horà doloris recrudescentis calidè.

Confer. Riverius, *Cent. 1. Obs. 67. & Cent. 2. Obs. 12. & Cent. 3. Obs. 22.*

§. 7. Hisce succurrendum est externis emollientibus, & pituitam viscidam solventibus: quæ inter excellunt gummata, emplastri formâ loco dolenti, ac à pituita obfesso, applicata. Gummi ammoniacum hic cæteris palmam præripit, unde & emplastrorum spleni tributorum, non minus quàm ad tumores scirrhosos quoscunque, etiam scrophulas, applicandorum ferè existit basis: convenienter itaque usurpatur emplastrum spleneticum Aquapendentis, ex duabus partibus ammon. in 4o soluti, unâ succi nicotianæ, dimidiâ resinæ & terebinth. & succi ebulli, cum oleo de capparibus, & q. s. ceræ mistis paratum; Item emplastrum de cicuta & ammoniaco Heurnii & Sennerti, ad splenis scirrhos aliasque obstructions usitata, malaxanda cum oleo succini vel capparum. Præceteris elegans est emplastrum carminativum Sylvii, quod exhibet Praxeos ipsius p. 169. ad liquefcendam & emolliendam viscidam hanc pituitam optimum. Alii tale emplastrum applicandum suadent:

℞. *G. \*c. in 4o sol.* ℥j.

*Tacamahac.*

*Empl. de mucilag. ana* ℥ss.

*Θ \*ci* ℥ijss.

M. f. Emplastrum, in forma debita loco affecto imponendum.

Ante v. horum applicationem non incommodum fuerit præmittere inunctionem loci ab hac pituita obfessi, cum oleo laurino, cap-

no, capparum, lil. albor. nicotianæ, cum oleo deſtillato laterino, vel ammoniaci, foetido licet, permittis: Item adhiberi commodè poterit unguentum martiatum purgans, his ipſis oleis dilutum.

§. 8. Sed rarò ſufficiunt externa, aut infuſa clyſmata, ut plurimum internis pituitam acidam ſ. auſteram detergentibus, reſolventibus ac evacuantibus, ſimul ſuccurrendum. Pruratum denuò hic obtinent gummata vulgò nota, in ſpecie ammoniac. unde etiam eodem paratæ pilulæ & potiones ad corrigendam & detergentem hanc pituitam ſunt optimæ; ita proſtant pilulæ Quercetani ex ammoniaco, item lac ammoniac. Bartoleti *Encyclopæd. lib. 5. c. ultimo*, paratum ex ammoniaco, cum  $\frac{1}{2}$  ex citri ſucco deſtillato. Facit & huc ſpiritus ex gummi ammoniaco cum viride ar. &  $\frac{1}{2}$  de deſtillatus, admodum incifivus, penetrans, & reſolutivus pituitæ viſcidæ vitreæ. Ad ammoniaci vires proximè accedunt reliqua gummata vulgò nota: bdellium, tacamah. ſagapen. opopan. myrrha & maſtiche, &c. Ad evacuandam v. pituitam iſtam viſcidam, colocynthide, & ex hac paratis extract. trochiſc. alhand. ac aliis nullum præſtantius datur, quemadmodum & ſequi. hæc potiuncula, licet ingrata, expertiſſima tamen eſt in ſimili doloꝛe à pituitâ vitreâ & ponticâ, tam in inteſtinis, quàm in ſpecie ſub hypochondrio ſiniſtro ſtabulante.

R. *¶ menthæ* ʒi.

*cinam.* ʒß.

G. *¶ ci in ¶ oſol.* ʒi. ad ʒß.

*tartari ¶ lat.* ʒß. ad gr. xv.

*Scamm. roſat.*

*Extr. troch. alhand.* ana gr. ij.

*Syr. de pomis* ʒß.

M. F. potio. quæ unâ vice hauſta 10. & 12. interdum ultra 15. vices, viſcida & mucilaginofa, cum præſentaneo ægri levamine & doloris ceſſatione eduxit.

Præter hæc eſt & g duleis, cum laxantibus propinatus, pituitæ vitreæ præſantiſſimum detergent; unde huius optimum eradicator non ſine ratione has pilulas appellat Deodatus in Valetud. p. 246.

R. *MP. Coch. min.* ʒj.

*Aquil. albæ dulc.* gr. xvi. aut ʒj.

ʒo *Aniſi* gutt. ij.

M. f. pilulæ pro una doſi.

§. 9. Nec hic prætereunda ſunt ¶ ea, quorum virtus pituitam hanc viſcidam & acidam incidendi & detergenti manifeſta erit, ſi attendatur, conſtare ¶ rum primariò ex copioſo acido ſubtili, quod junctum eſt ſufficiente ¶ e volat. de natura alcalium, præter ſeculentias quaſdam terreſtres cum pinguedine quadam ¶ ea intertextas: ratio-

ne quorum ¶ ium experti uſus eſt cremor tartari, imprimis cum ſale tartari junctim propinatus: ſimiliter quoque conducit tartarus ¶ latus, ſed non communi modo ex ſpiritu ¶ li, ſed ex ipſo ¶ lo ſoluto modo Tacheniano paratus. Vid. huius Clavis ad Hippocratem chym. Non minus quàm ſpiritus tartari volat. imprimis v. ex fecibus vini prolicitus, beneque rectificatus, aut qui ex tartaro cum ¶ o per Retort. tubulatam in Sp. vini propellitur, & poſt rectificatur, ac ſaporem & odorem perfectè urinoſum volatilem acquirit, ſpiritus carminativi nomine alias decantatus; Cui præferendus adhuc eſt ſpiritus volatilis, qui ex tartaro, cum proprio alcali fermentato, inſtar ſpiritus ¶ \*ci ſubtilis elaboratur: Hi ipſi enim convenientiſſima ſunt auxilia ad corrigendum ſaporem acrem, ac conſiſtentiam tenacem pituitæ iſtius viſcidæ. Horum tartarorum vires exaltari poſſunt, ſi cum oleis aromaticis convenienter fuerint marſata; ſic namque potentius hanc ipſam mitigant & corrigunt, cum ipſa aromatica non ſint ultima, quæ hanc pituitam alterent, & inde orta mala corrigant; De quibus cum jam occasione ſtatuum plura dicendi anſa ſuppeditetur, ea vel inuiſſe ſufficiat.

§. 10. Nam ſtatus ſunt, qui ut plurimum cum pituitâ viſcidâ & acidâ juncti, doloꝛes immenſum augent, & varia ſimul abdominis ſymptomata inducunt: quorum originem jam ſuprà ex vitioſa fermentatione, ab acido peregrino in inteſtinorum muco viſcido deduximus. Compeſcent E. optimè eorum vim & impetum aromatica, hiſque cognata alia de ¶ e volat. oleoſo participantia, mediante quo & acidum fermentativum, tanquam huius contrarium, alteratur & deſtruitur, oborta fermentatio tollitur, & mucilago viſcida reſolvitur. Uſurpantur talia, quatenus nunc clyſmatum formâ infunduntur, nunc unguentorum ſpecie abdomini illinuntur, nunc liquidorum modo propinantur. Simplicia carminantia naturæ aromaticæ, ordinaria clyſterum horum ingredientia, in vulgus nota ſunt: ſufficiat formulam (ut ex ungue Leonem) hic annexiſſe.

R. *Rad. angelic.*

*leviſt.* ana ʒß.

*H. chamom. Rom.*

*menthæ* ana m. j.

*bacc. lauri* ʒi.

*junip.* ʒß.

*ſem. aniſi*

*carvi,* ana ʒij.

Coqu. in ſ. q. *¶ e ſimpl.*

In Colaturâ ʒix. diſſolve

*El. de bacc. lauri* ʒj.

[Ssss 3]

*mell.*



*mell. rutac. ʒß. f. ʒvj.*

*o destillat. anis.*

*fœnic. ana ʒß.*

*succini gutt. v.*

*Vit. Ovi No. j.*

Misce pro Clysmate.

Huic opem ferat loci dolentis inunctio, parata primario ex oleis destillatis insigniter penetrantibus (cum nihil aliud sint quam  $\Theta$ ia volat. ab acido volat. subpingui in corpus oleosum concentrata) quorum virtus exaltabitur, ponendo desuper lapidem probe calefactum. Parantur tales inunctiones ex oleo chamomillæ, anethino, castor. laurino, destillato corticum aurantior. carvi, cumini, fœniculi, anisi, rutæ, Zedoar. angelicæ, macis, & similibus, modo separatim, modo conjunctim inungendis. Stœckeri experimentum fuit litus ex olei laurini ʒß. cum ʒj. castorei paratus. Parari etiam potest unguentum h. m.

*ʒ. o castor. ʒj.*

*destillat. angel.*

*cort. aur.*

*cumin.*

*anisi, ana ʒß.*

*chamom. ʒj.*

Cum f. q. corp. pro Balsamo misc.

D. S. *Salblein gegen die Blähung.*

Pertinet huc etiam Galbanetum Paracelsi, ut aliàs in colicis & iliatis doloribus conveniens, ita & in nostris non minus egregium.

§. 11. His associanda sunt debita interna & ipsa aromatica; quæ inter agmen ducunt sem. calida, dicta majora, (Helmontio minora,) scilicet anisi, cumini, anethi, fœniculi, carvi, dauci, &c. quorum sapor & odor aromaticus in oleo volat. fundatus, miras habet acidum vitiosum Gas flatuosi generativum, corrigendi & flatus inhibendi dotes; cum præterea singulariter intestinis stomachoque sint amica, & ob id intestinorum solamina rectè ab Helmontio vocantur *Tr. de Flatib.* §. 57. Non enim flatus discutunt, quod inimaginabile, qui aliàs spontè, modo viæ sint apertæ, exitum quærunt, sed materiam undè flatus exsurgunt, alterant, corrigunt, & istam fermentationem vitiosam sistunt, ac ita impediunt, quò minus concretum materiale in flatus. s. in Gas spirituosum vertatur: id quod etiam reliqua vulgò appellata carminantia, & in genere quæcunque aromatica, præstant. Modus utendi est, ut in vino semina hæc propinentur, in quo leniter prius ebullierint, ad imitationem Helmontii; Vel ut frequentibus cohobationibus Spirit. vini benè rectificatus earum virtute imprægnetur; aut, quod elegantius evadit remedium; spiritus vini cum  $\Theta$ e volat.  $\Theta$ \*ci rectè conjunctus, ab iisdem sapius

est abstrahendus; aut cum eorum destillatis oleis conjungendus, sic enim egregium contra flatum habebitur remedium. Sed præter hæc semina & aromatum, in specie v. galangæ, zedoar. mac. caryoph. cardam. cubebæ. virtus in  $\Theta$ e volat. acriori; oleoso tamen, fundata, stomacho & intestinis flatibus infestatis potentes fert opes: Quibus ex nostratibus cognata & qf. occidentalia aromata sunt bacce juniperi, lauri, cort. pom. aurantior. chamomilla, mentha, angelica, cuminum, salvia, & sim. quorum spiritus & essent. sic dictæ omnibus sufficienter cognitæ. Singulares inter has obtinet virtutes essent. chamomillæ in specie Romanæ, combinata cum rad. aromaticâ Zedor. & cum spiritu proprio parata, usurpanda à gutt. XX. ad XXX. Nec ultimo loco reticenda est virtus amygdalar. amarar. quæ artificiosè præparatæ singularem planè vim carminantem obtinent. Hisce vegetabilibus animalium aromata addenda: c. g. castoreum, & omnia ex eo parata, it. Zibeth. interno pariter & externo usu commendatissimum, & à Paracelso in Colico dolore umbilico inunctum: Quibus & stercora animalium, non minus interdum fragrantia, specialiter v. equinum, addo, quod in flatulentis abdominis affectibus præsentissimam affert opem, undè pariter colicæ ac hystericæ passioni succurrit. Excreta hæc animalium manu nos ducunt ad  $\Theta$ , mirabile concretum  $\Theta$ inum, ex iis ut plurimum petens natales, & inter carminantia vel maximè enitescens. Inprimis v. spiritus ejus probe cum Spiritu vegetabilium dulcificatus, & ab acore nimio temperatus, hîc convenit. Eligendus v. pro hoc scopo erit spiritus vini ab aromaticis cohobatus, & horum partibus volatil. probe imprægnatus, cujus descriptionem egregiam suggerit Sylvius *Prax. p. 90.* hujus duplum cum spiritu  $\Theta$  part. i. junctum, & cohobando unitum, egregium subministrat spirit. carminantem. Non dissimili ab hoc modo Spiritus anticolicus B. Michaelis paratur, quo excellentius pro hoc malo eradicanando non datur.

§. 12. Et hac ferè ratione causæ tolluntur: quibus extirpatis cessare etiam atque evanescere solet ipsa dolorifica passio. Verùm si torminosa hujus subinde recurrant vestigia, aut si mox in principio talis sit vehementiæ, ut aliis prætermisiss huic, ceu primario urgenti, occurrendum sit, sui remotionem innuit per anodyna & narcotica usurpanda, quæ inter papaverina emicant remedia, horumque princeps opium, inprimis si in laudatissimum exaltatum fuerit laudanum, cujus saluberrima usurpatio omnes dolores, ex spasmodicis intestinorum convulsionibus obortos, à quacunque hi ex-

hi excitentur cauſa occasionali, exoptatò ſedabit: inprimis ſi cum aptis ſpecificis combinetur, in ſpecie quidem cum ſeminibus iſtis calidis ſuprà laudatis, aut inde elicitis remediis, aut cum caſtoreatis medicaminibus, quæ ſingulare virtute convulſivos inteſtinorum motus, indeque natos dolores, ſedant & quietant. Laudanum commendavi opiatum. ſ. iſtud, quod ex correcto hoc paratur: Cujus correctiones omnes ſuperat, quæ ſit per fermentationem cum ſucco cydoniorum, videnda in *Epiſt. 45. Cent. 3.* Bartholini. Eandem etiam cum ſucco pomorum Borſtorffiorum inſtituere Dn. Præſes in more poſitum habet. Juxta hanc & optima ea, quæ per alcalia fixa, primariò quidem  $\text{Qi}$  hinc  $\text{Di}$ , per  $\text{A}$  vegetabile carbonum præparat, inſtituitur. Quibus modis paratum opium tutum, ac omni laude majus evadit remedium, quod ipſum etiam pro circumſtantiarum urgentia cum purgantibus propinari poteſt, præeunte nobis non tantum Rhumelio in compoſitione pilular. antipodagricarum, quas ob laudanum admixtum vocat: Veni Amice, ſurge & ambula; jatreo-*Chym. p. 725.* Sed etiam Stockerus, in *Prax. c. 36. p. 197.* ceu expertas inſigniter ad colicum dolorem commendat has pilulas.

*R. aloes ſuccot. vel*

*• pil. alæphang. 3j. ſ. Div.*

*opii.*

*croci, ana gr. j. l. ij.*

M. F. Pilulæ.

Jejuno ſtomacho exhibendæ, quas I. dolorem lenire, hinc etiam blandè evacuare, aſſerit, cum ſperata denuò ſalute: *Conf. Riverius C. 1. obſ. 63. & C. 2. obſ. 1.* Poterius *3. c. 27. &c.* His & ſimilibus internè uſurpatis, nullum dubium eſt, quin ceſſaturus ſit dolor. Nec minus hos ſedat opium cum Clyſmatis ano injectum à gr. iij. ad x. miſtum, ſed cautè, & ultra quam doſin vix aſcendendum: Vid. Borellus *C. 4. Obſ. 92.*

§. 13. Hæc ſunt remedia ex fonte Pharmacæutico contra dolorem hypochondriacum deſumpta; Diæticum quod attinet fontem, hic circa 6. res non naturales dictas, medias inter ſtatum ſanitatis & ægri tudinem, & vel ad hunc vel ad illum pro varietate circumſtantiarum diſponentes, primariò verſatur. Eminent inter has aër, qui vitetur frigidus; moderatè verò calidus eligatur. Ab hoc ſunt aſſumpta, ex quibus reſpuenda ſunt

crasſa, viſcida, dura & cruda, ut carnes fumo induratae, aut conditæ copioſo  $\Theta$  e comm. quia ſcilicet proprio  $\Theta$  volatili exuta, difficilis coctionis, parci nutrimenti ac copioſi & vitioſi excrementi, hinc pilceſ, caſtaneæ, cydon. pyrus, &c. it. quæcunque adſtringentia, & fructus horroci, quia hi fermentando facilè acceſcunt, & copioſas flatulentias producant. Nocet etiam, ſi quod aliud, vinum largiùs hauſtum; nam aciditate ſua volat. extra ſtomachum toti corpori peſtiferâ, inteſtinis tormina colica, artubus v. paræſes inducit. Lactis uſus eſt ſuſpectus, ex eodem verò, ſeparatâ parte caſeoſa & butyroſa, emergit ſerum, medicina malo hypochondriaco non inconveniẽs, videlicet, quatenus abundat  $\Theta$  e volat.  $\text{Oſo}$ , de natura armoniacali, & ita ſordes primarum viarum abſtergit, ſimulque alvum blanè ſtimulat: Convenit etiam aromatum uſus, omniaque aromatica, it. allium & alliata, cepaceaque colicæ ex mucilagine acida & inde productis flatibus, ſunt remedia. Capparum eſuſ eſt optimus, cum detergant & incidant ſordes mucilaginoſas. Panis ſeligendus eſt benè fermentatus; huic enim, & inſtutis ſecalino, ineſt ſpir. acidus vol. ſtomacho amicus, quia quodammodo ejus fermento eſt homogeneous; quâ ratione coctionem reliquorum ciborum multum adjuvat. Condimenta ex ſinapi utiliter adhibentur, item pruna, & hinc decocta. Potus ſit cereviſia probè fermentata, non triticea, quæ ſapiùs eſt crasſa, hinc fermentativa, & conſequenter flatulenta, non recens, non acida. Vinum abſinth. & heleniatum conducit, ſi malum non ſit ab induratis facibus. Somnus moderatus ut dolorem lenit, ita quies egregie ejus exaſperationem prohibet. Motus nimius in lecto & jactatio inquieta dolorem exaſperat, ac violenta corporis contorſione, abdominiſque compreſſione, mutuum inteſtinorum in ſe invicem ingreſſum, ac tandem ileum, inſerre poteſt, demonſtrante hoc Cl. Sylvio *Prax. C. 15. §. 19.* Alvus, quantum fieri poterit, ſervetur aperta; eadem obſtructa arte provocetur. Vomitus hic eſt uriliſſimus, cumque ſingulis menſibus ſemel provocandum eſſe, vel optimè monet Langius *l. 1. Ep. 30.* id quod inprimis vitam ſedentariam agentibus dictum eſto. Denique ne malum exaſperetur, cum vehementiores animi affectus, tum præcipuè ira, viperino ſanguine pejus eſt vitanda.

F I N I S.

DISPU.

# DISPUTATIO XII. CEREBRUM ORCÆ

vulgari suppositiâ

*S P E R M A T I S C E T I  
L A R V A D E V E L A T U M,*

Indultu Inclutissimi Colleg. Medici,

S U B P R Æ S I D I O

*Viri Nobilissimi & Experientissimi,*

**MICHAELIS ETTMÜLLERI,**

Phil. & Medicinæ Doctoris,

Publicæ Velitationi subjecit

A U T O R R E S P O N D E N S

**ADAM SIGISMUNDUS Scholz /** Uratisl. Siles.

d. 27. Octobr. Anno 1671.

## P R O O E M I U M.

**U**T aurea Hygæ Pax Microcosmico in Regno ad Fata usque suprema vel inviolabili tenore perpetuetur, vel seditiosis inopinanter insultibus labefacta, ad pristina subinde revocari queat Halcyonia; universa Natura, omni Argo vigilantior, Excubias agit. Immensa enim DEI Bonitas, quippe quæ nec Mortem nec Medicamentum Exterminii in perniciem humanam creavit, gaudens mortalium Vitâ & Salute pro abyssali Benignitatis suæ Faventiâ, omnia, quibus hoc Universum abundat, in emolumentum illorum desponsavit. Hinc, quoties novercantior Hostis Sanitatis nostræ inducias disrumpere molitur, videas certatim quasi concatenatis viribus Cælum, Terram ac Mare Imbecillitati nostræ succenturiare, & unanimi juxta nobiscum conatu ad debellandum illum insurgere. Irino hoc Murorum hæneorum circumvallati aggere, tanquam ex inviolabili Securitatis Palladio tuti ridemus Morbonæ stomachantis frustraneos insultus. Ex inexhaustis enim hisce Promptuariis interminabilis Telorum Redundantia ad conquassanda hæc multifida Hydræ Capita nobis subindè repullulat. Cælum nempe arctiori fæderis copulâ nobis oppignoratum, quam pugnantolim Herculi, cui exhausta Tela spisso lapidum Nimbô ad delendos Hostes redintegavit, num nos sub gigantea Morborum servitia succumbere, permittat? Cælum, inquam, quod jam olim propitium in æternantis quasi Assistentiæ Obsidem, divina desuper Arma, Acilia, Romanis demisit, num hodiè dilectos suos Quirites à depeculatorum Morborum Tyrannide, nullis protegat ægidibus? Quin & hic repulsi & conjurato quasi Malorum agmine prostrati, simul ac Terram Matrem exosculati fuerimus, ceu Antæus, resumptis viribus alacriores resurgere possumus. Hæc nempe ut patrocinarctur Cladibus nostris, plures quam quondam ex satu Dentium Viperinorum Cadmæo auxiliares in Subsidium nostrum fundit cohortes. Quoties morbosus Hirudinibus depasti, ex sanguine labascimus, denudatis mellifluis uberibus vitali Nectare funerata jam penè Corcula revivificat. Taceo inæstinabilem divitiarum penum, qua intus & extus abundat, nosque indies ad præpropera sufflaminanda fata sollicitè ex Parcarum manu redemit. Restat tandem ut Terra Rateem solvamus, & audaci Velô

foro-



fororiantia huic æquora perlustremus, indagantes, quibus & ipsa saluti & sanitati nostræ ancillantur. Sub ingressum autem statim nostrum quot <sup>Helm. d.</sup> spumantes exurgunt fluctus, quot <sup>Lithiaf. C.</sup> crispata æstuant undæ, tot nos circumfluunt commoda. Ipsum Sal marinum, potens Lithiascos Demolitor, <sup>3. 5. 30.</sup> licet copia vilescat, ineffabili tamen Oeconomiam humanam beat Emolumento. Desinet sanè quis mirari, cur ingeniosiores olim de Pago, Venerem, Matrem hujus fœcunditatis ex ferventi Maris spuma ortam, & nutantibus hisce fluctibus ceu Cumis agitatum finxerint, qui Naturam ejus penitiùs paulò ruminabit. Non prosequar jam ulterius pretiosas incolas Perlas nec indigena venabor Coraliorum ramenta, aut quasunque alias prædives Oceanus suggerit opes. Juvât saltem in præsentiarum cum Borealibus captare uti parabiliorem, sic usu mediconulli secundam Materiam illam pinguidiusculam in Mari hinc inde fluctuantem, Ceti sperma vulgo fabuloso cognomine insignitam. Hujus enim natura & Essentia cum dubia adhuc inter Scriptores volvatur, exactiori non indigna videtur scrutinio. Sed antequam altum petentes Anchoram suspendamus, ad divinam respicientes Cynosuram, votis submissis supremum nostrum Architalassum, DEUM, sollicitamus, accendat nobis desuper lucidam Gratia suæ assistentis Pharum, qua discussis caliginosæ Mentis tenebris Delio Natorum feliciùs procellosis his emergi undis exoptatum salutemus Portum, sacrabimus ipsi devotam Cordium nostrorum Tabulam, tutelare ejus nomen sine fine de prædicantem!

## CAPUT I.

*Historia Spermatiss Ceti*  
*Physica.*

## §. 1.

**T**Riceps Neptuni sceptrum è Ditis Regni ejusdem finibus tribus quoque potissimum, & præ aliis mirabilioribus subjectis (ejusdem Essentiæ in radice quibusdam æstimatis) sacram nostram Medicinam ditavit, quæ quemadmodum insignibus virtutibus Medicis exundant, ita vel maximè genuinus eorum Ortus vel exactissimos Naturæ Mystagogos ancipites huc usque tenuit. Ambram puta, excellens illud Refectivum & Confortans, circa divitis Bengalæ Peguque famosarum illarum Indiæ Orientalis Provinciarum oras, vel his opposita Mosambique & Capo Verde Africæ adhaerentia Littora à marinis fluctibus eructatum. Succedaneum huic est Succinum <sup>o.</sup> lychrestum multis in Affectibus Herculeum, ad Maritima Borussiae freta in copia reperibile. Tertium denique sibi vendicat locum Ceti sic dictum Sperma, Congruratorum Resolutivum & acriorum Temperativum decantatissimum, maximè in Oceano Boreali juxta Norwegiam & Grœnlandiam Islandiamque, aut conterminas Balænarum capturâ celebres

Tom. II. Pars 2.

Regiones, Mari supernatans. Hujus igitur in præsentiarum Quidditatem, Naturam, Ortum, præparationem & usum studiosius paulò expiscari, & uberiori Velitationi Exercitationis gratiâ subicere cum in animum induxerimus, remoto ulteriori ambitu arenam hanc subibimus.

§. 2. Venit autem Spermatiss Ceti <sup>Quid sit?</sup> nomine substantia quædam pinguis, tenera, mollis, vernali potissimum tempore, horis matutinis Mari, dum nullis inquietatur fluctibus, innatans, calore, licet remisso, diffluens, unde & solaribus resoluta radiis Olei sub larvâ amplis Tractibus subinde Æquori vecta, appellitur. Frigidior denique concrefcens aura, colore albicanti, livescenti interdum & quasi subflavò, Squamarum minutarum vel furfuris sub amicimine ut plurimum se repræsentat. Aquæ societatem per se respuit quidem, interveniente tamen Lixivio Alcalizato amplexus intimant mutuos. Sic & oleo maritata, compectoratæ hæ invicem materiæ amore ac si diffuerent, de facili resolvuntur. Gustus tandem Sperma Ceti examinatum Trutinâ, butyri quasi liquamine faucibus primùm abblanditur, subsequo demum aculeò Linguam lancinante, & nonnihil rancoris imprimente, plus tamen minus, prout depuratum fuerit diversimodè, aut vetustius recentiusve extiterit. Odor ipsi nullus per se inest, nisi quod sapor analogus levi rancore interdum nares

[Tttt]

corru-

Trina  
marina  
curiosa.

corruget, recens tamen extractum undisgari Odorem referre perhibent, ob piscositatem, quam obtinere videtur. Quod si verò Prunis torreatur candentibus, sub hâc Tortura sebaceo nidore nares perstringit, extincti ellychnii fuliginem referens. Utut verò Calori admota hæc Materies facillimè lique scat ac purioris ac tenuioris Olei ad instar diffuat, & per se tamen flammæ admota non ardeat, benè tamen cum ellychnio absque omni strepitu lucidam & tranquillam nutrit flammam. In crassamento ejus progressu temporis surgunt nituli nigri, instar granorum milii, qui tandem adolèscentes debitam magnitudinem acquirunt. Sulcantur sæpiùs à frequenti Balænarum concursu loca illa marina, ubi uberius hauritur. Excipitur verò Corbis vimineis, vel quibusvis pertusis Vasis, ut liquore secedente tantum sicca remaneat Concretio. Hanc postea penitus exprimendo, student quàm candidissimâ purissimæque inducere stolâ, ut in Officinas lubentiùs recipi, ibidemque sub Spermatidis Ceti supposito nomine queat dispensari. Vid. hæc uberius declarata in Libav. *Singular. p. 3. libr. 3. c. 3. & 4. idem in Wormii Mus. p. 34.*

An sit semen Balænarum?

§. 3. Innotuit autem primitus Orbis sub spermatidis ceti, aut, quod idem est, Balænarum seminis appellatione mucaginosa hæc substantia, ex eò, quòd communis divulgari Rumor, reverà eandem esse Balænarum genituram, fortuitò impetuosa harum copulâ in mare effusam, aut portionem saltim ejus à coitu regurgitando eliminatam, ut quacunque ratione ab uteri deviantem Claustis. Ulteriori elumbe hoc commentum pedamentò stabilivisse videtur, quod illis in oris specialiter reperiatur, ubi Balænarum tumultuatur frequentia, & cum pinguem Spermatidamque adeò ac viscidam simulet substantiam, exinde magis magisque adolevit ruditer concepta primitus opinio. Sed prout sequior hæc persuasio non sedat avidam curiosæ mentis Orem; ita multò minùs rigidum sagacis Naturæ perscrutatoris perfert Examen. Labascenti enim inclinans Hypothesi mutuâ necessum est sepeliantur ruinâ. Quis enim quæso Sperma unquam Ceti in libidinosas corundem Conjunctiones, seminisque postea feminino è Cunno reciprocationem sub

undoso vellere oculo tam acclinanti sollicitus Indagator rimari potuit? Hinc sanè subiit Mentem admiratio, Cordum ex professo singulari Tractatu de Spermate Ceti agentem, hanc opinionem ut certam & ipsa Experimentiâ affirmatam asseruisse: Videlis Libavium *c. l. c. 8. & 12.* Ac ex trita jam hâc, non multum quoque abaudit dubia Gesneri Sententia: Hic enim & ipse incertus de Spermatidis Ceti natura, autumat hoc vel Lac Balænarum esse, quod rictus ludificaret Catulorum sugentium, cujus postea pars pinguior ad Maris emerferit peripheriam; vel saltim vult esse adipem Cetaceum, Maris planitiem hinc inde pererrantem, in quâ posterior Conjectura còpropinquiùs Veritati approximatur, quantò remotiùs absuit in priori.

§. 4. Evellenda jam ulterius & proleteria eorum est sententia, qui Sperma Ceti nomine Ambrae albidæ vel Ambrae purgatæ propalant: Nam hi ignotum per æque ignotum extenebrare dum tentant, res duas distinctissimas turpiter à Veritatis Obrusâ abnormantes confundunt. Omnibus sanè in aprico est, res plane differentes esse, qualitatesque & attributa, Essentiarum in rebus indices, obtinuisse diversissima, Ambram propriè sic dictam, & Sperma Ceti nostrum. Ut taceam è latenti Veritatis puteo nondum penitus erutam esse certam ipsius Odoriferæ Ambrae Naturam & Originem. Non ignoramus equidem & hujus Natales in Balænarum intestina referri, V. Clusius in *Not. ad libr. 1. c. 1. Hist. Arom. Garcie*, cum non rarò Ambra hujusmodi in his apertis reperta fuerit, teste Monardo *Hist. simpl. c. 7. & M. P. Venet. l. 3. c. 39.* ut alios jam præteream: hoc tamen nondum sufficit pro deducenda Origine Ambrae ex Ceti interioribus, quin potiùs iis ad stipulamur, qui Balænas tales, in quibus reperta fuerit aliquando Ambra, eandem à marino æstu anteà agitatam forsitan cum alimentis deglutivisse contendunt, ut ita Casu postmodum in iis fuerit reperta. Reliquas quod spectat, de Ambrae Origine & natura Opiniones, eæ omnes sub polymorpho incertitudinis militant Vexillò. Bituminis ex fundo maris scaturientis certam quandam esse speciem, non minùs satisfacit quàm simile assertum succinum declarat. Fungorum instar crescere in Maris fundo Ambra, probatione caret. Eandem

An Ambra sit species?

Avium

Avium esse Excrementum Insularum Maldivensium, figmento similis videtur. Plura quoad Originem Ambræ aptè disposita & collecta Vid. in Francisci *Indischen und Sinesischen Lust-Garten* / p. 1179.

An sit Halosanthos Veterum?

§. 5. Gravior omnino tam conspicua Defensorum Autoritate, quam probabili Argumentorum apparentia, est ista sententia, quæ Sperma Ceti nostras cum Halosantho Veterum idem esse statuit, vel hæc duo potius confundit. Pro hac sententia præter Fuchsum *Tr. de Medic. Compos.* tanquam pro aris & focis dimicat Libavius *c. l. Singular. p. 3. l. 3.* De Halosantho, sive Florem Salis cum Vulgo, sive Florem Maris ipsi innatantem cum Fuchsi interpretari velis, Veterum monumenta nil referunt, præter pauca, quæ à Dioscoride *libr. 5. c. 88.* consignata sunt, & à Plinio *libr. 31. c. 7.* ex eodem mutuata videntur. Juxta horum tamen descriptionem, eorum Halosanthos nos latet, quæ reverà fuit Substantia Nitrosa, seu aliquid  $\Theta$ is  $\Theta$ osi pinguis, quod ex Nili Aquis,  $\Theta$ o feracissimis, eoque omnino prægnantibus (à cujus  $\Theta$ i turgescentiâ & fermentatione intumescentiâ Nili, fecundantemque Ægypti inundationem, deducere conatur Mons. de la Chambre *Tr. du debordement du Nil*) in superficie natans colligebatur, aut lacubus stagnisque  $\Theta$ lis innatare solebat, unde & Nilo flumini, tanquam loco Natali, imprimis adscribitur à Dioscoride. Unde sicut verum  $\Theta$  nobis est incognitum, cum Autore Bellonio *Obs. lib. 2. c. 71.* in Europâ ne mica quidem Nitri extet, utut in Ægypto res vulgarissima sit, & crebri usus & vilissima; Conf. præterea *Lettre del Signor Burattini al Signor de la Chambre cit. Tr.* ita etiam cognatum ipsi Halosanthos hodiè nascitur. Congruunt cum hæc Nitrosa Materia etiam reliqua Halosanthos attributa, tam acrimonia ejus quam ferventia Salina & absterfiva vis, in Ulceribus delendis cacoëtheis; aliisque cutaneis averruncandis affectibus.

Est Pinguedo animalis.

§. 6. Ut nos ergò Halosanthi veterum perdidimus notitiam, ita nostras Sperma Ceti ipsis etiam nondum innotuisse arbitramur, adeoque minime pro uterinis hæc duo invicem habenda erunt Gemellis. Nam cætera ut taceam, nostrum Sperma Ceti tan-

Tom. II. Pars 2.

tum abest, ut Nitrosæ aut  $\Theta$ inæ sit indolis, quin potius reverà  $\Theta$  ex natura, in tantum etiam, ut ob id à maxima Eruditorum parte ad bituminosa referatur Corpora, quorum Materia aliunde in Mare influens in hæc admistione  $\Theta$ is ejus & falsedine aliquali & piscositate imbuatur. Tamen cum & hoc generale nimis videatur, adpositum quid potius & pingue ex animalium Classe nobis videtur, in specie aquatiliū, cum Rancor facilis, piscosus sapor, sequax liquabilitas, & Odor, quem spirat Gari, similiaque attributa manifestè hoc declarent. Id quod ulterius mox patebit, dum jam veram Naturam & Originem, non minus quam infucatam ejusdem præparationem, eruderabimus.

§. 7. Esse enim indubiè ex Cetis <sup>Spermatis Ceti Originem vera.</sup> hanc Spermatis Ceti dictam Materiam, continuatæ Modernorum Experimentiæ & Observationes in Balænarum Captura, extra omnem ponunt Dubitationis aleam. Non quidem quod Genitura earum, aut ex partibus genitalibus ejus sit origo deducenda, sed ex Capite potius eorum provenit, & tam ipsum est pingue Cerebrum, quam oleosus huic Cerebro circumfusus liquor. Scilicet varias inter Cetorum species, Borealem Oceanum juxta Islandiam Grœlandiamque Insulas incolentes, una est singularis, 25. ad 27. vel 30. ulnarum longitudinis, 10. ad 15. crassitie, dentibus mediocribus armata, sed capitis prægrandi instructa mole, adeò ut secundum Wormium hoc tertiam totius Piscis partem serè adæquet, vel ut Bartholinus loqui amat, Caput gibbere adeò prægrandi extuberat, ut quasi Domuncula ipsi superstructa emineat, à quo gibbere etiam ab Islandis Burbualur vocari <sup>Barth. c. 4. Hist. 24.</sup> solet, à Latinis aliàs proprio nomine Orca appellatur, Belgis *Potvisch* audit. In hujus igitur Cranii Cavo continetur Materia talis pinguis & oleosa, quæ exinde collecta & præparata, vel in Mare effusa, Sperma Ceti postmodum appellari inceptit. Nec parva est hujus quantitas; reperitur enim in Cranii his tantâ Copiâ, ut ex uno Balænæ captæ Cranio dissecto plusculæ amphoræ depromptæ fuerint. Materia hæc inde collecta vasculis inclusa minoribus quaquaversum postmodum transportatur per

[Tttt 2]

Euro-



Europam, ut præparata Officinis sub Spermatis Ceti nomine divendi queat. Talia ex oculatis testibus hausta videtur Bartholino & Wormio *c. l.* id quod & alii horum conscii interrogati unanimiter nobis affirmarunt. Cum istis conf. Clusius *l. VI. Italic. C. 17.* ubi figura talis Balænæ ad littus occidentale Hollandiæ tempestatum impetu ejectæ ad archetypum delineata, ex cujus Cranio etiam tale Sperma Ceti collectum fuisse testatur.

§. 8. Hæ ipsæ Balænæ, in dicto Boreali captæ mari, etiam à Nautis ad Littora Bayonæ, & S. Joh. de Luca insulæ advehuntur, ex quorum capite hæc materia eruitur. Sed hoc saltem in masculorum Craniis reperiri asserunt, cum foeminarum Cerebrosa substantia liquidioris instar pinguedinis sit, oleum in usum lucernarum suggerentis; hinc, ut compacta magis Marium substantia, in dictum sapius sperma commodè præparari nequit. Videatur peritè hæc de re differens Excellentiss. Naturæ Curiosorum Symmista D.D. Joach. Georg. Elshnerus, quem loco Parentis ejusdem incomparabilis Propatris & Evergetæ mei maturius heu nuper & publico mihi erepti, lugubris nostra deveneratur Mula, *Misc. Curios. Ann. I. Obser. 136.* Præter hunc Oceanum septentrionalem etiam in Indiâ Occidentali, ad Bermudas & novæ Angliæ Oras ejecti observati fuerunt hujusmodi Ceti, insigniter tamen dentati, qui partim Spermatis talis Materiam suppeditarunt, partim cum spermate hoc toto ipsorum ventre fuerunt resperfi, ut videri potest è *Transact. Philosophic. Anglic. Tom. 1. pag. 132. T. 2. pag. 567. & T. 3. pag. 792.*

§. 9. Modernorum ergo Nauticæ Observationes in aprium ponunt ex Capite certæ cujusdam Balænæ, dentatæ, macrocephalæ, esse spermatis sic dicti materiam, adeò ut potius Cerebrum Ceti ob id appellandum veniat; ita quidem, ut nunc immediatè ex Cranio talium Cetorum, aut captorum, aut aliàs mortuorum, in littora ejectorum, eruat; nunc verò amplis tractibus Mari innatans modò suprà dictò colligatur. Saltem dubium restitat, quâ formâ ac modo è Balænis in Mare effundatur? Sub genituræ ratione hoc fieri nulla persuadet probabilitas, quin

potiùs in Wormii acquiescimus iudicio *Mus. c. l.* asserentis: reperiri hanc Materiam in Mari, quando aut Cetus hic pugnando cum aliis occubuerit, aut quando hanc Materiam certo tempore instinctu Naturæ per appropriatos meatus evacuarit. Mari ergò immissa pinguidiuscula hæc materia, seu, ut Bartholino *Ep. 1. ad Burrhum p. 3.* audit, liquidior adeps, tactu marini salis cogitur in se paulisper & spissescit, concurrente simul marino frigore, unde & salis dicti admittance nonnihil quasi adulteratur. Non secus ac succinum salis Marini tactu & societate albescit, frustra ob id nobilius æstimatum flavo. Ob id ignobilius ferè habetur illud sperma, quod innatat mari, utut Nautis notius, sicut pretiosius est, quia & purius illud, quod ex Cranio hauritur, teste Bartholino *C. 4. Ep. 70.*

§. 10. Materiam spermatis Ceti <sup>Præparatio Spermatis Ceti.</sup> proximam hætenus vidimus: superest ut explicemus, quâ ratione præparetur, ut in formam istam candidam nitidam squamosamque evehat, sub quâ ordinariè in Officinis dispensari solet. Sed hæc ipsa non ubique est una eademque: Nam integrum Ceti sperma, prout ex Mari hauritur, autore Libavio *loc. supr. cit.* dat oleum tam pressum, quàm transmutatione per vasa rara seu lignea seu fictilia: Reliqua pars vis puris calidis abluitur, incoquiturque, & factâ post refrigerationem Consistentiâ, auferitur Pinguedo, verum sperma Officinale, ipsa coagulatur in salem, illum scilicet, qui ex aquis Marinis antea permixtus fuerat. Hæcque ferè ratione ex Mari collectum præparatur sperma Ceti. Istud verò, quod ex Capite Balænarum ad Bayonam & Joh. de Luca Insulam advehtarum conficitur, per simplicem fusionem, & crassioris à tenuiori aliqualem separationem, præparatur. Modum docent Jacob. & Paul. Contant. in Comment. Gallic. suprà Dioscoridem *l. 1. c. 51. p. 63.* Nempe postquam fustum est Cerebrum, infunditur in ollam, in quâ aliàs solet purificari saccharum, postea clauso foramine inferiore tamdiu relinquitur, donec congelescat & concresecat, relinquendum verò est in loco modicè calido, tandem aperienda olla in loco inferiore, sic istud opus purificatur, & spatio

tio aliquot dierum invenietur massa istius Cerebri tota albicans, & squamarum instar: *Vid. Miscell. N. C. cit. supr. l.*

§. 11. Concinnior longè Præparatio est, quâ utuntur Dani in præparando Ceti Spermate, quàm à Pharmacopœo Hafniensi expertò Clariss. Domino Præsidi, Studiorum meorum Palamoni colendissimo, communicatam, ex amicâ ejusdem participatione huc apponam. Conficitur nempe lixivium acre ex Cineribus & Calce vivâ, ita tamen, ut hujus minor sit quantitas, quam illorum: Signum sufficienter acuatî Lixivii est, si intra digitos ad tactum lubricum & quasi pinguidiusculum percipiatur, hinc filtratur per saccum laneum, ut purum clarumque evadat. Ubi præparatum fuerit lixivium, recipienda est Massa, & Cranio Balænarum supra dictarum exempta, eaque si pinguis, flava & liquamine oleoso superfluo perfusa fuerit (*Wenn sie sehr trahnicht ist*) per saccum ex pilis confectum (*ein härin Beutel*) (nam per pannum lineum Transmissio est impossibilis) mediocriter est exprimenda, ut omne liquamen pingue superfluum per Saccum transiudet: quò factò restitans in sacco Materia Spermatîs lixivio supra præparato, immittenda, & manibus in lixivio probè subigenda, & cum eodem permiscenda, perque diem & noctem ita reponenda est. Altero die mane per saccum pilosum Lixivium denuò exprimendum & separandum, & id, quod restiterit, super lintum explicandum, & digitis blandè diducendum, & in aère libero, vel sub tepidiori solis radio (ne scilicet liqueat) exsicccandum, atque ita præparatum erit, quod postmodum Spermatîs Ceti venit cognomine: Magna nempe candidum & squamosum friabile, promptè liquefcens. Circa hanc verò Præparationem duæ adhuc observandæ sunt Enchireses: scilicet si Materia ex Cranio collecta minus pinguis ac oleosa fuerit, sed candidior, & per se aliquatiter friabilis, tunc citra præcedaneam expressiorem per saccum pilosum immediate Lixivio est permiscenda, aliàs paratum exinde Sperma rutescit: Deinde ipsa Lixivii quantitas nec copiosa nimis sit, respectu infundendi Sperma-

tis, nec etiam acrimonia ejus nimis intensa; aliàs immittâ spermatîs Materia coit cum alcalibus lixivii in saponem. Acidum scilicet occultum sub omni, tam animali, quàm minerali aut vegetabili, Pinguedine reconditum, arripitur ab Alcalibus, iisque se unit, ut inde compositum saponiforme necessariò emergat. Idem præparandi modus etiam obtinet, si rancidum forsân & Vetustate nonnihil fuerit corruptum. Hoc enim simili Lixivio subactum, cum eodem immittitur in Cadum aquæ frigidæ, à quâ dilutum lixivium separatur à spermate, tunc supernatante sordibus ejus rancidis flavescentibus cum lixivii salibus omninò separatis, & in aquam frigidam translatis.

§. 12. Hoc est propriè sic dictum <sup>Adulteratio Spermatîs Ceti.</sup> Officinarum Ceti Sperma, ejusque genuina Præparatio. Non mitiorem interim præ aliis simplicibus Pharmaceuticis experitur sortem, dum variis adulteratur sutelis. Simili enim planè ratione etiam, præter Balænas, ex aliis majorum Piscium Cerebris, simillimum Sperma apparari posse, imposturarum harum conficîi asserunt: sicuti & Pinguedo oleosa ex sauciatis mortuisque Balænis emanans, marique innatans, & hujus salledine pariter ac frigore densata spermatîs locò à quibusdam divulgatur; Quin & adeps pinguis Ceti, aut in loco frigido reconditus, hinc expressione à tenuiori parte separatus, aut lixivio supra dicto aliove modo subactus, pro spermate Ceti intemerato venditur, sed ignavior longè in Operatione, prout & ignobilioris extitit Originis.

§. 13. Cùm ergò Spermatîs Ceti <sup>Generatio Spermatîs Ceti.</sup> pinguis & oleosa materia tam copiosè interdum & aliquot amphoras, è Ceti Capite extrahatur, quin & vasta Balænarum Corpora tam densa Pinguedine incrustata & penitus obducta sint (adeò ut Autore Clusio *l. c.* ex ista Balænâ 40. dolia similia iis, in quibus asservantur Haleces saliti, pinguedine ejus repleverint, præter magnam ejus quantitatem spontè effluentem ab aliis collectam, aut in undas Marinas redeuntem) meritò cuidam mirum videri possit, unde tanta pinguedinis ubertas in animali aquas incolente, in iisque omnem

[ Ttt 3 ]

quæri-

quæritante victum, cum notum sit aliàs, quàm distincta attributa pingua & aquosa, adeoque differentes obtinuisse naturas, credantur. Nam utut diversa distinctæ Cetorum species habeant edulia, dum aliæ piscibus (in ejus enim, quem Gesnerus describit, Ventriculo, &ia dolia crudorum pisciculorum, inter quos Salmo unus ulnæ longitudinis, inventa sunt) aliæ gramine & musco submarinis vescantur, *Vid. Philos. Tr. T. 1. p. 12. T. 3. p. 292.* nihilominus hæc omnia copiosâ aquâ diluta hauriunt, & continuò Aquæ Maris haustu ebrîi quasi maximam sui partem ex Aquâ constare videntur; unde & pinguedo eorum liquidior, fluidior, & in liquamen rancidum corruptibilior videtur. Probabilitatem ergò summam habet Helmontii Opinio *Tr. Complex. atque Mist. Elem. Figm. §. 2.* alia concreta naturalia, ita & pisces materialiter nil nisi vnam transmutatam esse, adeoque & eorum pinguedinem hæc solâ constare sicut omne Oleum eidem Auctori vnsimplex est, quam pauculum semini in Massam conflagrabilem transfert, luditque larvam  $\Phi$ ris. Unde & Pinguedines per alcalia semine propriè de acidi profapia spoliata, in aquam maximam partem redeunt; comprobante hoc per Mechanic. in Oleis Tach. *Hypp. Chym. p. 57.* Hinc & humana Pinguedo ex Lacte Chyloso licet proximè condensata, fatiscit tamen interdum denuò & sub Urinæ aquosæ formâ resoluta, & aquæ Elemento approximata excernitur. Unde & Burrh. *Ep. 2. de Cer. p. 15.* refert, quod Vitellini Cerebri pinguis & oleosa Substantia 3. partes sui ponderis dederit vna insipida, quæ tamen antea de Pinguedinis concreto etiam fuerat, dum quædam ejus adhuc retinet vestigia, quia non benè clauso vase asservata, vetustæ muris fætorem contrahit. Ex quibus & Sperma Ceti aquosæ Profapiæ esse concludendum videtur, particulis aquosis juxta Mechanicas leges in situ & textura ita translocatis & transformatis, ut in aliud planè Corpus degenerasse videantur. Ut itaque jure meritò concludamus cum Medicorum Coryptheo Hippocrate *Libr. I. de Diet.* exclamantes: omnia similia sunt dissimilia existentia:

## CAPUT II.

## Usus Spermatum Ceti

Medicus.

## §. 1.

Cum Simplicia palmarium ad sub-lucandam morborum sylvam suppedient Robur, ob id in corticandis illorum Essentiis, enucleandisque eorum viribus, omnem Sanitatis humanæ Procuratores moveant Lapidem. Sperma Ceti exinde intactum non erit prætereundum, sed & quid hoc in recessu habeat examinandum, & quousque Experientia Ratione comitata viam paraverit sequendum. Prima equidem Cura esse deberet, quali Temperamento ex Qualitatibus sic dictis primis polleat hoc nostrum Subjectum? i.e. calidum an frigidum, humidum siccumve primario existat? si vulgo trita relegere vestigia velimus. Sed cum ceu <sup>Temperamentum</sup> Rolleas has Qualitates falsè perstringat <sup>Spermatum</sup> post Paracellum, Veterum Errorum <sup>Ceti.</sup> Vindemiator acutissimus Helmontius, nec procedat ex dotibus rerum seminalibus, sed rebus saltim constitutis ceu modi materiales superveniant, nucleumque Cratæos ex salinis Principiis primariò deducendum non attingant, ob id minus scrupulosi erimus in hoc negotio. Ut tamen Consuetudini receptæ aliquid demus, Sperma Ceti ceu temperatum admodum subjectum cum blando Calore humiditatem prædominantem obtinere asserimus. Potius verò Pinguedinem ejus temperatam oleosam consideremus, quæ, utut in recessu acidum subtile & occultum habeat, vim tamen temperantem quascunque humorum acrimonias in lignem obtinet, & cum ex miscela cum lixivio acidum ejus occultum non tantum maturatum fuerit, sed præterea ipsorum Alkaliū consortio ipsum Sperma leviter tinctum, ob id imprimis ad Acida vitiosa similiaque acra mitiganda & corrigenda, indeque oriunda in Corpore mala tollenda, cum fructu uturpatur:

§. 2. Temperata ergò & oleosa <sup>Vis ejus</sup> cum sit substantia, dulcis ferè <sup>& ca.</sup> nostrum Ceti Sperma, ob id nutritiva, & succi lactescentis in Corpore augmentativa videtur. Unde non mirum, quod ad Venerea exercitia expetatur, quatenus citra vim stimulantem lactei spermatum copiam uberiorem



riorem suggerit. Quibusdam scilicet in usu est positum, in specie Francofurti ad Moenum, ut crudam Spermatiss massam Oleo suo adhuc perfusam, antequam suprà dicto modo in Sperma depuretur, pani ad instar Butyri illinant, & non absque nausea horrore, ob ingratum, piscosumque gari instar, Saporem ita deglutiant, ut strenui magis in Veneris se gerant militiâ. Duplicis alias speciei sunt, quæ ad Veneream alacritatem augendam expetuntur; quædam Seminis locupletant penum, qualia sunt temperata, succo lacteo quasi chyloso turgida, ut sunt amygdalæ, pineæ, pistaceæ, lac, Ova forbilia, & similia; quo etiam ex Cacao amygdalinis fructibus composita Chocolate pertinet: quædam ex alterâ parte acriori sale eidem stimulum titillantem ad genitalium pruritus quali inducendum addunt, qualia imprimis sunt aromata, & his cognata aromatica, Piper, Caryophylli, Zingiber, Cubebæ, Cardamom. sem. crucæ, linguæ avis, ambra, Zibethum, spiritus sanguinis galli, formicarum, &c. Tertiam hûc facientem Classem, quæ singulari modo Ideali quibusdam operari dicuntur, v. gr. Rasura Cornu tauri in coitu abrasa, Cerebrum passeris in congressu interfecti, Sanguis & Testiculi Cervi in Orgasmo Venereo transossi, studiô, tanquam aliena à præsentis scopo, omittimus. Sperma Ceti crudum ad primam seriem pertinet, dum seminis abundantiam largitur, cui commodè pro stimulo aromata pulverisata, ambra modicâ permixta, addi possunt. Nam sola Spermatiss augmentativa ad Venerea exercitia sunt nimis ignava, sola stimulantia acriora sunt nimis nociva, spirituumque depauperativa, ob id utrorumque amicabili consortio tertium medium, magis jucundum, minus nocivum, producitur.

Vis ejus Anodyna. §. 3. Pinguis & oleosa Spermatiss Ceti materia, ut acidorum est temperativa, ita blando suavique popysmate demulcet partes membranosas & fibrosas sensiles, ut exinde anodyna dolorumque egregiè lenitiva concilietur. Sive enim à succis acris rosio & Vellicatio, sive distensione, contusione, &c. laceratio sit, unde tam dolorosa dictarum fibrarum motiones & repetita spasmodicæ crispaturæ inferantur, utroque in Casu Sper-

matiss Ceti egregius erit usus, in specie internè; sicut externè optimum anodynum est oleum istud superfluum, quod in præparatione reprimendo separatur, calidè illitum inunctumvè.

§. 4. Præ ceteris commendatus est ejus usus in Cruciatus Colico similive intestinali, & per os exhibitum, & cum Clysmate ano immixtum: Cum enim ab Acido ut plurimum oriatur Colica, sive mucus sit acidus, pertinaciùs ejus Cellulis implicatus, sive sint indurata inde stercora, sive vitiosa fermentatione ab acido elevati flatus; cò ipso sanè, quò acidum temperat Sperma Ceti, & vi anodyna dolorem mitigat, & pinguedine suâ faciem emollitioni & fluxilitati confert, non potest non Colicis convenire. Usurpatur in dictis Casibus commodè permixtum c. oleo amygd. dulc. in jusculis calidis, autore Sennerto *libr. 3. prax. pag. 265.* sicuti Crato Celebris ille trium Imperatorum Archiater, inter secreta efficacia contra Colicam passionem Remedia habet, Potionem compositam ex Vino Malvatico & oleo amygd. dulc. cui Spermatiss Ceti 3℔. admiscet, & ita propinat. Vid. Scholz. *Consil. collect. 168.* Libavius *sæpe cit. loc. c. 3. Schol. Mannatæ Potioni* (Cujus descript. V. in Sennerto *c. l.* sicut felicem ejus successum in Thoneri *Observ. p. 158.*) Sperma Ceti addit contra colicam, in quo affectu etiam per Clysterem ægris se istud injecisse affirmat. Ergò fieri poterit Clyster Anticolicus ex Urina Pueri calefact. ʒix. quibus addi possunt ad imitationem Deodati Valetudin. *p. 197. Syrup. Papav. ʒi. & spermat. Ceti 3℔.* plus minus, pro ratione circumstantiarum, *Vitell. Ovor. num. j. M.* pro Clysm.

§. 5. Colicæ in multis cognata est Hysterica passio, modernis dicta Suf. focatio hypochondriaca, nisi quod hâc spasmodicæ convulsiones ex dolorosè convulsis intestinis & abdomine aliorum in alias partes subinde continetur, cum fortiori spirituum animalium perturbatione. Causa remotior & hic videtur esse acidum vitiosum, austerum, facilè effervesceus, & flatuosum Gas hinc excitans. Supervenit in graviore malo tandem sanguinis quodammodo congruati stagnatio in Præcordiis, indeque omni-

Virtus Anticolica.

Vis Antihysterica.

omnimoda suffocatio, de quibus alii ex professo. Pro compescendo hoc malo, & temperando acido, tollendoq; sanguinis coagulo, facilitandaq; spiratione difficillima, non inconveniens est spermatis Ceti usus, etiam à Libavio *c. l.* propositus, sive solitariè, sive Castoreatis sociatum, aut volatilibus locupletatum simul usurpetur. Quemadmodum Mulieribus Hystericis quibusdam, non sine notabili successu, similiter cum aliis permistum aliquoties nostrum Dn. Præsidentem propinasse, novimus: Has inter cum esset quædam 34. præter propter Anorum, sterilis adhuc tum temporis, licet maritata, quæ instante aliquando Mensium fluxu ex hujus difficultate hystericos patiebatur insultus non leves, præscripto sequente,

℞. *▽ hirund. c. Castoreo. ʒiʒ.*

*Carminat. ʒi.*

*Ocul. cancr. præp. ʒi.*

*ʒ diaphor. ʒi.*

*Spermat. Ceti. ʒi.*

*Syrup. Cortic. aurant. ʒiʒ.*

M. probè, capiat subindè 2. l. 3.

Cochlearia.

Et passio levata, & mensium fluxus inde promotus fuit. Similis mistura foret forsàn non inutilis, ubi à rigore externo, & inde nata sanguinis congrumatione, supprimerentur ex improviso Menstrua vel Lochia: magis efficax futura eadem, si Castoreo addito parum adhuc acueretur. Hanc conjecturam per experientiam confirmat Timæus von Gildenslee *l. 2. Cas. 7.* dùm mulieri ex subitaneâ refrigeratione Menses fluentes suppressi Pleuritidem gravem intulerunt, quæ tamen, præmittendis præmissis, pulvere Spermatis Ceti ad ʒi. c. tantillo Castorei, & à Mensium Suppressione, & à Pleuritide, admirando successu fuit curata.

Usus ad  
tormina  
Infantium.

§. 6. Pueris abdomine dolentibus non minùs salubre est Sperma Ceti. Sæpiùs namque evenit, ut ex Lactis coagulo in eorum stomacho, indeque nata Cruditate acidâ, Lac corrumpatur in Bilem dictam Porraceam, i. e. liquamen viridescens acidum spirans, intestina tenella infantum continuò rodens & vitiosa ibidem cum bile excitata effervescentiâ flatus abdomen distendentes excitans. His Infantum cruciatibus Sperma Ceti opitulatur, quatenus acidum vitiosum in stomacho & intesti-

nistemperat, coagulatum lac dissolvit, intestina lubricando blandè adhærentes mucos ponticos promoveret, & virtute anodyna dolorosas torturas lenit; idque eò potentiùs, magisque præsentè juvamine, si cum pulvere sem. anisi imprægnetur: Hinc enim & acidum præsentius corrigitur, ac flatuum impetus ac generatio cohibetur, quin & stomachus intestinalque exinde egregia percipiunt solamina, unde à dolorosis contorsionibus cessant. Nam etiam quibusdam in usu positum est, ad educendum Tenellorum meconium, sperma Ceti recens natis propinare, non citra felicem successum; Non secus ac ad reserandam & lubricandam eorum paulò adultiorum pertinaciùs clausam alvum Spermatis Ceti cultelli cusps in Cerevisia calidâ commode propinatur.

§. 7. Lac coagulatum dissolvi ab usu Spermatis Ceti, dictum fuit præcedente Paragrapho. Id quod imprimis salubriter experiuntur Mulierculæ, quibus quacunque ex causa remota Lac in coagulum in Mammis coit, Mammæve ex Lactis retentione vitiosa & tument & dolent. Acidum hic subest p. n. quod lac cogit & in grumos conspissat. Unde & studiosè sibi caveant Mulieres à quocunque Acido assumendo, ne Lac caseosum generent, infantibusque Tormina à vitioso ejus acore inferant. Frequentior causas inter externas est, si mulierculæ Mammæ sudore madentes incautè aëri frigido exponant; exinde enim insensilis Transpiratio, sensibilisque Transsudatio, subito suppressa acescit sub mammarum naturalibus integumentis, & lac suo quasi afflatu spissat ac cogit: non secus ac sanguis in Præcordiis cogitur in grumos, & dat pleuritidem ab acido in eodem enato, si subito sudore roridum Corpus ex quacunque causa frigori exponatur. Destruendum ergo est hoc acidum lactis coagulativum. Remedia inter huc conferentia non ultimum Experientia docuit esse sperma Ceti, sive intus extusvè exhibeatur. Internè quidem, sive solum bis in die propinetur sive mixtum cum pauca myrrha, aut s. q. Oculorum cancr. præp. usurpetur. Externè usu compertissimum hîc est Emplastrum de spermate Ceti Mynsichti, *Arment. Chymic. p. m. 520.* cujus felicem

Lac dissolvit coagulatum.

cem successum sæpius expertum etiam prædicat Timæus à **Guldenlee** *Cas. Medic. l. 4. Cas. 36. p. 234.* Quin & ipsum Sperma Ceti in Cochleari ad flammam candelæ liquefactum, fomentisque calidis desuper applicatis, interiora versus propulsum in lactis retentione, indeque Mammarum Tumore & Dolore, aut lactis coagulatione non foret inconveniens.

§. 8. Præter Lac & sanguinis sunt grumi, qui resolvuntur à spermate Ceti, unde in Casu ab alto, indeque orta sanguinis suffusione & Ecchymomate, vulgarissimus sit Spermatismus Ceti usus, ut Sanguis, qui ex propriis conceptaculis effusus corrumpitur, & ad putredinem tendit, indeque acorem p. n. contrahit, sicque spissescit & coagulatus grumescit, resolvatur, & cohibito à spermate Ceti ac temperato isto vitioso acido attenuetur: Forestus sanè per experientiam *in lib. 16. Observ. 15.* & huic annexo Scholio allatam, confirmat, se optimo cum successu usum fuisse in ægris talibus Mumiâ & Spermate Ceti ad 3ss. in Cerevisia calidâ butyracea: quibus etiam præceptores sui Itali sint usi: Timæus **von Guldenlee** quoque *lib. 4. Cas. 30.* se nihil unquam ad grumos sanguinis dissolvendos potentius deprehendisse affirmat; Unde etiam Sperma tale pulverem ad Casum Augustanorum ingreditur. Miror ob id, quare citrà ullam rationem ab hoc usu rejiciatur sperma Ceti à Langio. *Ep. 31. l. 2.*

Catarrho  
suffocati-  
vo me-  
detur.

§. 9. Ex eo, quod sanguinem grumolum hincque stagnantem resolvit Sperma Ceti, etiam Catarrho suffocativo sic dicto mederi valet, qui revera nihil aliud est, quàm Syncope cardiaca Veterum, nata ex stagnatione sanguinis circa Cor, quam ubi spuma ex pulmonibus in fauces elata insequitur, ferè desperata res esse videtur. Ridiculum enim est istud commentum, quod catarrhum suffocativum è Cerebro in fauces subito proruentem fingit, ut hoc & alia de Catarrhis figmenta sufficienter discussit Helmontius *Tr. Catarrh. Delirament.* & qui huic succenturiavit Atlanti famigeratissimus Schneiderus, antehac studiorum nostrorum Fundator ætatem colendus, de Catarrh. in specie *l. 5. c. 4. p. 297.* & seq. Arbitramur nos potius Catarrhum suffocativum esse talem affe-

ctum, in quo sanguis ex ramis Cavæ, tum adscendente quàm descendente, in Cor influens, indeque in Pulmones erumpens, in harum partium vasis in motu suo nonnihil remoratur & stagnare incipit, unde suffocationis periculum, & præcordiorum anxietates quas ex crebriori aëris, frustra neâ licèt, reciprocatione necessario spuma consequitur. Id quod ad Oculum patet in Cane moribundo, cui moderata quantitas, ʒij. ad ʒi. p. p. Sp. ʒis per Camp. ʋæ sufficienti quantitate diluta, in Venam cruralem fuit infusa: Hic enim perfectissimo Catarrho suffocativo, cum copiosissima, fauces laryngemque & bronchia pulmonum pariter opplente, spuma interiit, ex sanguinis ob aliqualem grumescentiam per vasa præcordiorum impedito motu: Talem Catarrhum suffocativum exactè delineatum Vid. à Cratone in Consil. 19. à Scholzio collectis: Nempe ut sunt quædam Apoplexiæ species, ex motu sanguinis in Cerebro impedito, ita Catarrhus dictus suffocativus ex motu eodem in pulmonibus & præcordiis nonnihil sufflaminatò oritur. Unde & tandem tali apoplexia interentorum idem est interitus, ac eorum, qui Catarrho suffocativo intereunt, cum in iis tandem & sanguis in præcordia stagnet, unde post mortem pulmonum vasa à sanguinis impetu rupta reperta fuerunt, Vid. Car. Fracass. *Dissert. Ep. de Cer. p. 414.* Sanguinis ergo ordinatus per Thoracis contenta viscera motus impeditus dat Catarrhum suffocativum, sive ejus Copia, sive Crassities & visciditas, sive congrumatio incipiens, sive regurgitatio ex suppressione ejus in alio loco erumpentis, sive viarum vasorumque impedimenta aut infarctus, v. gr. in Polypo Cordis, similibusque concrecentiis, vid. Bartholinus *C. 2. Ep. 86. p. 683.* in causa fuerit, ut collectus uberius aut detentus diutius in præcordiorum vasis sanguis angustias tales suffocatorias inferat. Ad has anxietates sublevandas, præmissis, si urgentia affectus permiserit, Clystere acriori ex aromaticis vegetabilibus, cum Colocynthide in petia ligata, & ʒgemmæ q. s. mox Vena tundenda erit, ut minuto sanguinis quanto impetus ejus in præcordiis ex stagnatione minuatur, quo facto vel in momento Respiratio liberior

[Uuuu]

perci-



percipitur: Postmodum, ubi vel sanguinis grumescencia, vel inchoata ejus coagulatio, in causa fuerit, ad Sperma Ceti confugiendum erit, propinando sequentem Potionem, à quibusdam in Catarrho suffocativo magnoperè celebratam:

*R. Sperm. ceti ʒß. ad ʒj.*

*Dissolv. in f. q. ∇ hyssop.*

*adde parum*

*De syrupo hyssopi.*

*Misc. pro dosi.*

Specialiter pueris tenellis, Catarrho tali suffocativo derepentè correptis, optimo cum successu datur, secundum experientiam Nævii *Consil.* 309. apud Scholz, si dissolutum in Lacte Nutricum calido, pisi unius alteriusve quantitate in os pueri instilletur: Vid. etiam Schenckius *Obs. l. I. p. 148. 149.*

Asthmati  
succurrit.

§. 10. Nec verò in Catarrhis saltem suffocativis proficius est Spermat. Ceti usus, sed vel maximè etiam in asthmate, in cuius Paroxysmo ad ʒj. in Cerevisia calida exhibitum, secundum Experientiam Timæi *l. 2. Epist. XI. & libr. 2. cap. 2.* est instar omnium, quod eum nunquam fecel- lit, modò non sit rancidum. Jam verò & distinctæ Asthmatis species humanum delassant pectus, & in ab- dito admodum earum delitescit natura. Est Asthma humidum ex mu- cilagine viscidâ, tam Bronchiorum Pulmonum quàm in specie stomachi enatum, item quod sanguinem sta- gnantem nonnihil in præcordiis se- quitur. Est Asthma contra siccum & convulsivum, Nervorum & Spi- rituum animalium vitiò enatum. Ex his Sperma Ceti succurrit inprimis isti speciei, quæ ex sanguinis vitio in præcordiis generatur, ut ex modò di- ctis de Catarrho suffocativo clarum est: Hinc isti, quæ ex viscida mucila- gine non absque difficultate resollen- da & expectoranda, guttur oblinat. Ut ut enim hoc in casu, præter Vomitus, reliquis ferè præferen- dum remediis, commendata & sanè egregii usus experta sit Potiuncula Brunneri ex Gummi Ammoniac. c. V. Rhenano; huic tamen, ceu feliciori successu, expertum præfertur Sperma Ceti à Timæo *l. c.* Lenit enim acri- moniam muc. expectorandi, resol- vit visciditatem ejus, & mobiliorem eundem pertinaciùs agglutinatum reddit, dum simul asperitatem fauci- um egregiè lubricat: Imprimis si in

pernaciori malo bis tervè per septi- manam ejus usus sub introitum lecti repetatur: Unde & Infantibus com- modè propinatur in eorundem diffi- cili Respiratione, ex pituitosis crudi- tatibus in eorundem stomacho con- gestis inprimis enatâ.

§. 11. Prævalens Asthma nos ducit ad Tussim, cum hæc ipsa Asthma humi- dum, ceu Pedisequa, ordinario com- mitari soleat. Sed pensiculemus saltim hæc vice Tussim nocturnam, quæ in- terdiu ferè silet, sed sub Vesperam us- que ad mediam noctem marcida Affli- ctorum pectora inprimis flagellat, cum majori minorivè Materiæ aquosæ nonnihil viscidæ rejectione. A mate- riâ tenui ex Capite destillante, adeo- que Catarrho, vulgò Originem hujus deducunt. Nos potius hic Lymphæ Vitium consideramus, cum Catarrha- les dicti Affectus ex Lymphæ Vitio primariò proveniant. Peccat nempe & hic Lympha, fauces Asperamque Arteriam continuò obliniens, ex vi- cinis ibidem copiosis glandulis effusa nimia aciditate, à quâ & irritatio di- ctarum partium, superficialis Exco- riatio, Dolor & levis Inflammatio oriuntur: Quin & depravato exinde dictarum partium nutritivo Officio, muc. copiosa Lymphâ diluti, genera- tio supervenit. Præcessit ut plurimum aëris inspirati Vitium, dicta loca quæ transit, lædens, simulque insensilem Transpirationem nonnihil impedi- ens, unde & acrior acidiorque Lym- pha redditur, ac præterea in locis di- ctis læsis uberius scaturiens, tempore vespertinò nocturnoq; Tussim talem molestam, ut plurimum Coryza, ex iisdem Causis oriundâ, comitatam, inducit. In hoc Affectu, ut temperetur Lympha vitiosa, & tollatur tussis ista periodica, post laudatissima Opi- ata Sperma Ceti est egregium, sive cum succinatis, similibusve propinetur: v. gr. ad talem Tussim compescendam

*R. Sperm. Ceti ʒß.*

*Succin. præp. ʒj.*

*Laud. Opiat. gr. iij.*

*M. pro 2. dos. Vesperti ante Cœ- nam, & hinc sub introitum Lecti, capiendis. Vel*

*R. Sperm. Ceti ʒj.*

*Fl. Benz. ʒj.*

*Myrrhæ*

*Θ volat. succini ana ʒß.*

*Laud. Op. gr. jv.*

*M. F. Pulvis pro tribus vel 4. Dos. vespertinis.*

Ex

Ex eodem fonte nata raucedo ex lymphâ copiosiori & actiori, Asperæ Arteriæ Caput inundante, commodè & Spermate Ceti curatur, si manè vesperique cum vehiculo calido usurpetur: Novi quendam pertinaci raucedine affectum, qui aliis irritis tandem Spermate Ceti ad ʒij. assumpto fuit restitutus.

Ufus  
Miscel-  
laneus.

§. 12. Hi fere fuerunt usus primarii, quibus inservit nostrum Sperma Ceti: inservit tamen & aliis, quibus subinde adhibetur. Langius namque *lib. 3. Epist. 1. p. 866.* componit Unguentum Magistrale, cujus etiam ingrediens est Sperma Ceti, quod ad Nervos contractos, spasmodum, & eorum dolorem, commendat. Levino Lemnio *l. 4. c. 9.* ad Ossâ fractâ, fissâ & rimosâ hiantiaque ferruminanda laudatur. In Peste ejus usum Paracelsus suadet sudoriferis permistum. In epilepsia succino sociatum conferre asserunt. Sic etiam reperiuntur, qui ablatis Variolarum pustulis maturatis, Cicatriculas Spermate Ceti inungunt, ut hujus beneficio temperetur acor iste in Variolarum pustulis, Cutis corpus fibrosum exedens; & in foveas excavans, quò resarciatur debito alimento jactura, & restituatur id, quod absumptum fuerit.

Utendi  
modus &  
dosis.

§. 13. Consideravimus Usus Spermatidis Ceti: superest adhuc usurpandi rationem addamus. Dosis est in adultis à ʒj. ad ʒij. Infantulis tenellis recens natis pisi majoris quantitas sufficit, quæ in paulò vegetioribus à gr. j. ad iv. vel viij. extendi potest. Propinatur commodissimè in substantia, cum, præterquam quod in tam simplici &

homogenea substantia, per se innocua, omnis præparatio superflua videatur, etiam præparata quædam artificialia exinde elaboranda nondum innotuerint. Ad Essentiæ enim formam (si corruptionem sic impedire, vel remedium paulisper obnubere quispiam voluerit) induendam penè ineptum est, etsi extractio vel dissolutio rectificatissimo Vini Spiritu (cum vel sine addito Alkali) tentetur, juxta Ludovici *Pharmac. Disf. 1. de Nervin. & Resolventibus pag. 654.* Hauritur idcirco commodè in vehiculo calido, cum in hoc promptè liquefeat, & ita saporem suum nonnihil nauseosum optimè occulter. In Cerevisia enim calidâ butyri instar diffuit, & facilè est assumtu. Cum Ovi sorbilis vitello promptè similiter subigitur, permiscetur, & ita facili hauritur labore. In frigidis aquosis contra Vehiculis assumtu est difficilior, licet enim saccharo probè tritum, & per minima fuerit subactum, vix tamen permiscetur frigidis, aut citra Nauseæ cujusdam difficultatem deglutitur.

Et hæc de natura & Ufû Spermatidis Ceti dicta sufficiant: Hoc unicum ubi adhuc monuerimus, quod sicuti Usus legitimus suis extollendus est encomiis, ita illegitimus seu nimius Abusus meritò culpandus; Ex Encellio enim Wurmius *cit. supra loco* refert, periisse honestissimam Matronam ad Ostium Tanager ex nimio hujus Spermatidis abusu. Verùm ne & nos Otio nostro abuti videamur,

tandem subsistentes, facimus

F I N E M.



## DISPUTATIO XIII.

DE

MEDICIS BALNEIS  
ARTIFICIALIBUS.

QUAM SUB PRÆSIDIO

*Viri Nobilissimi, Excellentissimi atque Experientissimi,*  
**MICHAELIS ETTMULLERI,**  
 Phil. & Medicinæ Doctor.

Publicæ Philiatrorum Censuræ, die 6. Septemb. MDCLXXII.

subjecit A U T O R

**THEOPHILUS Müller /** Dresdensis,  
 Philos. & Medicinæ Studiosus.

I. N. J.

P R O O E M I U M.

*IN* quantum olim Romani Balneis se delectaverint, id si non aliunde, satis ex Plinii Junioris Epistolis constare potest, qui Balnea, gestationes atque secessus inter maxima Romanorum delectamenta refert; Tanti enim temporis lavacra æstimabantur, quorum finis prope solum delectatio animique relaxatio erat. Si itaque hæc, quæ tamen nullum insignem usum, præter voluptatem, habebant, eo tempore tantopere laudibus efferebantur, quidni Medicinæ Balnea ad sanitatem utilissima ad cælum usque feramus. Quoniam igitur intra proximos dies Disputationem nostram Medicam primam conscribere nobiscum constituimus, ex multis materiis denique hanc tractandam consulto elegimus. DEUS, qui opem tuam implorantibus præsto esse soles, & nos Spiritus tui Sancti gratiâ rege atque gubernæ.

## CAPUT I.

## SECT. I.

## De Nomine.

## §. I.

**N**ominis explanatio est ipsius rei explicatio.

NOT. Nam dilucida vocum interpretatio intelligentiam, uti Scaliger ait, aperit, adeo ut hinc etiam illa, Arian. l. i. differt. c. 17. ἀρχὴ παιδείας non inconcinne salutetur.

§. 2. Nomen absolvunt Etymologia, Synonymia, & Homonymia.

NOT. Etymologia nominis seu vocabuli originem exponit. Synonymia ejus æquipollentias tractat. Homonymia diversum illius significandi modum tradit.

§. 3. Vocabulum Balneum natales suos Græciæ debet; βαλανεῖον enim

Græcis dicitur, quod anxietatem ex animo peliat.

NOT. Eustachius ad Homeri Iliados K. ita observat, de quo & Augustinus lib. IX. Confessionum cap. XII. legi potest. Alii, inquit Buchnerus in Thesaurο erudition. Scholast. Fabri, in vocabulo Balneum παρὰ τὸ τὰς βαλάνους αἰεὶν ita dictum volunt. Suidas enim glandibus veteres vesci solitos fuisse, earumque putamina succendisse docet: vid. Coelius Rhodiginus lect. antiqu. lib. XVII. Cujus quoque Martinius in Lex. Philolog. in eadem voce mentionem facit.

§. 4. (α) Balneum & (β) Balineum dicitur: it: (γ) Balneæ & Balineæ: Stupha, lavacrum, lavatio. Germ. Ein Bad. Gall. (δ) un Bain.

NOT. (α) Inter Balneum & Balnea seu Balneas ut plurimum ita distinguunt Autores, quod Balneum privatum, Balnea publica, sint. Varro autem lib. VII. de ling. lat. Balnea dici planè negat.

(β) Ita



(β) Ita Plautus, Cicero & Plinius habent; Cicero *ad Attic.* inquit: Balneum calefieri jubebo: Quanquam hæc tanquam antiqua & obsoleta lectio ab elegantioribus hæcenus explosa, & non in puram latinitatis prononciationem recepta fuerit.

(γ) Balnea & Balneæ in multitudinis numero inveniuntur; De quo Buchneri *Lex. intit. B.* iterum evolvi potest.

(δ) Hinc maître des Bains où estuves eadem lingua *ein Bader* / & *baigner baden* / it. imbuere ut baigner en quelque liqueur dicitur: De quo Dictionaire François-Alleman-Latin par Jacob Stœr à Geneve impressum, habet ac refert.

§. 5. Balneum Athenis etiam lusus quidam scholasticorum erat. Genus potus quoque, non delicati, audit.

NOT. Non hic Martinii jam modo citati verba, qui in *Lex. suo Philolog.* totum hujus lusus modum & formam delineat, exscribam; Hoc saltem noto, non planè dissimilem fuisse, uti idem Martinus loquitur, iis, qui in Academiis hodie depositiones vulgò appellantur. Gregorius Nazianzenus in Epitaphio Basilii M. & Photius in excerptis ex Olimpiodoro quoque hujus rei mentionem faciunt.

## CAPUT I.

### SECT. I I.

#### De re ipsa, Balneorumque Differentiis.

##### §. 1.

Nominis explicationem sequitur ipsius rei expositio.

NOT. Cognito consideratoque nomine, ad rem ipsam accedimus; quæ nullo modo alio melius nobis se sistit, quàm in definitione. Definitio enim, Græc. ὁρισμός, secundum Aristotelem *lib. 1. Top. 5. §. 2.* est λόγος, ὁ τὸ τί ἦν εἶναι σημαίων i. e. oratio, quæ, quid res sit? significat; seu, uti *1. de anima t. 11.* habet: πάντῃ ἀποδείξει ἀρχὴ i. e. omnis demonstrationis initium.

§. 2. (α) Definitur autem (β) Balneum, quod sit (γ) corpus subtile & liquidum, nos addimus interdum & siccum, (δ) corpori circumferentialiter occurrens, vel occurrere aptum, ut sit ipsius secundum qualitates manifestas vel occultas actualiter immutativum.

NOT. (α) Definitionem hanc ex Joh. Mich. Savonarolæ *lib. 1. de Balneis c. 1.* desumimus.

(β) In omni autem Definitione considerandum venit tum Definitum, tum Definitio. Definitum, seu quod definiri debet, hoc loco est Balneum, quod melioris distinctionis gratiâ, uti mox sequetur, in hac nostra Disputatione dividimus in siccum & non siccum.

(γ) Definitio, seu quod definit, constat genere, & differentia specifica. Genus est corpus subtile & liquidum, &, quod nos adjecimus, interdum siccum. Corpus dicitur, quoniam omnia Balnea materiâ corporeâ constant, aut enim ex aëre calefacto & incenso, aut ex aqua constant: si ex aëre calefacto & incenso, Balnea sicca sunt, si ex aqua, Balnea minus sicca seu Lotiones audiunt. Dein corpus subtile dicitur ex eo, quoniam Balnea tantam vim penetrandi habent, ut etiam hominis seu ægri constitutionem planè immutent & alterent. Quod autem Balneum corpus vel liquidum vel siccum à nobis pronuntietur, id propter duplicis generis Balnea, nempe cum sicca, tum minus-sicca fecimus.

(δ) Differentiam specificam absolvunt reliqua Definitionis verba: Corpori circumferentialiter occurrens &c. Quæ ab objecto, modo & fine desumitur. Objectum est corpori occurrens, &c. Modus, quomodo nimirum Balneum corpori occurrat vel occurrere aptum sit, consistit in adverbio circumferentialiter, i. e. ut corpus penitus cingat & circumscribat, vel ad minimum circumscribere possit, sive id aquis in Balneis liquidis fiat, sive aëre incenso & calido in Balneis siccis; quamquam hæc definitioni nostræ aliquantulum contradici posse videatur, tanquam hæc circumferentialis circumscriptio non omnibus Balneis nostris siccis competeret, tamen in discursu, si aliquis Dn. Opponent. fortè hoc dubium moveret, defendemus.

§. 3. Sunt autem Balnea vel sicca, vel minus sicca.

NOT. Quoniam supra §. 2. Sectionis hujus, hujus divisionis mentionem fecimus, non opus est, ut prolixiores simus in hac distinctione exponenda; Et statim ad Balnea sicca accessum facimus, Lectori benevolo, si non plurima, multò minùs omnia, tamen aliqua horum Balneorum genera referentes.

## CAPUT II.

### SECT. I.

#### De Balneis siccis.

##### §. 1.

Balneum siccum est corpus subtile & siccum, corpori circumferentialiter &c.

[Uuuu 3]

NOT.

NOT. Integram hanc Definitionem repetite ex *Cap. I. Sect. 2. §. 2.*

§. 2. Dispersimus autem Balnea sicca in octo classes: 1. in Balneum siccum secundum excellentiam; 2. In Balnea spiritiosa, seu cum spiritibus. 3. In Balnea fumida 4. In Balnea cum lapidibus & ferro ardenti. 5. In Balnea cum candelis & lampadibus. 6. In Balnea cum Oleis spirituosus. 7. In Balnea cum brodio decoctorum. Et denique. 8. In Balnea lecti, ut sic loquar!

NOT. De his Balneis omnibus siccis exactè dicere, eorumque naturam candidè exponere, spatium temporis sat magnum videretur parvum; In tantum illorum explicationis fines sunt extensi, ut etiam in re Medica exercitatissimus in horum tractatione tam amplam copiam inveniret, de qua non sine labore dicere posset. Nos pro ingenii modulo de quibuslibet pauca proferentes, eorum descriptiones qualescunque simul addimus.

§. 3. Est autem Balneum siccum (α) secundum excellentiam ita dictum, ejusmodi Balneum, ubi (β) in arcula, ex quatuor asseribus compacta, æger (γ) exerto capite, & (δ) peculiaris fornacis carbonibus incenso aëre sudat.

NOT. (α) Nominamus hoc Balnei genus secundum excellentiam siccum, cum, quoniam omnium siccorum est maximè siccum, tum etiam, quoniam, uti *cap. ultim.* sectione ultima, ubi de Balneorum usu loquimur, dicemus, reliqua nostra omnia virtute antecedit.

(β) Arcula hæc ex quatuor asseribus lateralibus constat, ita tamen compactis, ut aer incensus non possit evolare & exspirare; In hujus arculæ superiori parte lateralibus asseribus firmè inferuntur asseres foramen rotundum, per quod æger caput extrudere potest, habentes; In inferiori arculæ parte verò, seu in pavimento, canalus ligneus edolatur sudorem de corpore ægri cadentem, si fortè in nimia copiâ adestet, uti in robustorum corporum sudatione vehementiore interdum fieri solet, excipit, & ad vas extra hoc Balneum in terra positum transmittit. Ubi verò foramen, per quod caput hominis exit, est, nimirum in anteriori parte, & ubi janua hujus Balnei, ibi sella ponitur, super quam æger sedens sudare, Balneoque uti potest;

Posteriorem autem partem seu locum hujus cistæ tenet fornax, de qua mox.

(γ) Porro dicitur exerto capite. Exferere enim caput æger debet, ne à calore affligatur, & hoc modo morbi periculum adeat. Ne verò, si hoc modo caput eminet, calor omnis exhalet, collum ægri circumvolvere & munire possumus linteis, & ita caput à calore, & calorem ab omni exitu prohibere; Et ut etiam cor ægri ab omni calore tutum existat, pectori ejus itidem lintecum affigimus, quod calorem cordi inimicum sustineat & repellat.

(δ) Fornacem hujus Balnei melius cerâ fingere, quàm verbis Tibi Lector Sincere, depingere vellem. Est autem fornax hæc cum tribus pedibus, duo in latere habens ostiola, unum in superiori, alterum in inferiori parte lateris: per superius ostiolum immittimus carbones ardentes, per inferius ostiolum recipimus cineres, quanquam etiam cineres per tubulum fornacis per hujus Balnei pavementum transeuntem extra hanc arculam in vase terreo colligantur: Medium autem hujus fornacis itidem tubulum habet, extra Balneum in posteriori ejus parte eminentem, & quod admiratione dignum, totum hoc Balneum regentem. Huic tubulo enim operculum ex argilla factum intrudimus, quo operculo Balneum pro lubitu, tanquam equum freno, gubernare possumus; Nam si illud operculum huic tubulo penitus aut ad dimidium inferimus, ad modum Balneatorium erit calidum, si verò planè eximimus operculum, tunc statim æger vehementiorem calorem sentiet, & sic porro.

Et hoc modo in ejusmodi Balneo sicco è corpore sudoris 3vj. plus minusve provocari posse, certò certius est.

§. 4. Balnea cum spiritibus sunt ejusmodi balnea, ubi in pari (α) arcula, modo aliam formam habente, æger exerto capite, aëre (β) à spiritibus oleosis calido & incenso, sudat.

NOT. (α) Diximus notanter: hanc arculam aliam formam habere; nimirum etiam ex asseribus collateralibus constat, in medio autem fracturam admittit, & unam partem hujus Balnei, ubi nimirum æger caput exierit, reddit altam; alteram ubi vasa cum spiritibus per ostiolum in latere existens imponuntur, reddit ad dimidium minorem.

(β) Hi spiritus sunt Sp. Vini, Sp. baccar. Juniperi, florum sambuci, &c. Quibus duo vel tria vasa ad tertiam vel dimidiam partem implentur, & ægri capite, pari modo ut supra

pra linteis munito, cum charta inflammantur.

§. 5. Balnea fumida sunt ejusmodi Balnea, ubi morbo Gallico laborans ex arcula, priori arculae simili, sedendo caput exerit, & membrum virile per fellam excavatam demissum, & consequenter totum corpus pulveribus atque trochiscis fumigat.

NOT. I. Fumidum hoc Balneum nominamus ideo, quoniam in hujus Balneatorii pavimento rotunda foramina reperiuntur, sub quibus locus quidam ostiolo clausus, & vasa ignem habentia continens est, super quae pulveres seu trochisci ex vario gummi, Mercurio, cinnabari, sparguntur, quorum in morbo Gallico utilem fumum foramina rotunda recipiunt, & ad infecti membrum virile transmittunt; A latere autem hujus Balnei foramina duo habere utile est, ut mox per illa videri possit, an fumus sufficiens in Balneatorio sit. Caput autem etiam ideo æger exerere debet, ne noxam capiti fumus creet.

NOT. II. Alias hoc in morbo Galli & Itali Balneatoria quoque parva alia habent, in quibus fornaces minutissimas cum caminis ædificant, & supremam balnei partem multis foraminibus rotundis conspicuam reddunt; Si itaque ægrorum magnus numerus est, sex vel septem simul in ejusmodi Balneum relegantur, & ita illud sæpius calet, ut multi interdum animam præ nimio calore expirare necesse habeant.

§. 6. Balnea cum lapidibus & ferro ardenti ejusmodi Balnea sunt, quando (a) aqua, vel (β) alio liquore utili, in lapides & ferrum excandescens fuso, fumus excitatur, (γ) & æger hoc modo sudat.

NOT. (a) Potest autem ejusmodi fumus duplici modo excitari: aut ut aquam in lapides candentes fundamus, aut ut lapides ignitos in aquam ipsam immittamus.

(β) Diximus autem etiam vel alio liquore utili, ut constaret, decocta atque lixivium, præter aquam, alia ad hujus morbi curationem facientia, parari, similique modo affundi posse. Uti etiam hoc loco non simplicem tantum aquam intelligimus, sed & aquam thormarum atque acidularum &c. Uti & hac in ferrum ignitum fusâ largum sudorem elici posse Mart. Mayerus in tractatu suo, quem *Kurze Beschreibung des Egerischen Schleder Sauer-Brunnens* inscribit, p. m. 141. ait.

(γ) Et æger hoc modo sudat. Dupli-

ci modo hoc fieri potest; vel ut stando seu sedendo fumum è lapidibus, scoris, &c. calidis excitatum recipiat; ita tamen ut fumus, quò velit, volare possit, & propter liberiores exitum suum hoc modo non omnis ad ægrum perveniat; vel ut, ægrò ad vas ex uno latere & superitis, ne fumus alibi inutiliter feratur, linteis clausum sedente, fumus capiatur, omnisque ad hominem hoc modo feratur.

§. 7. (a) Balnea cum candelis & lampadibus ejusmodi Balnea sunt, ubi (β) in vase amplo atque rotundo, fumò atque calore peculiaribus candelis excitato, æger sudat.

NOT. (a) Balnea hæc apud Ægyptios admodum fuere in usu, quos candelas singulari modo preparatas habuisse, illisque vasa ampla atque rotunda, in quibus æger inclusis sedebat, calida fecisse, illumque hoc modo ad sudorem adegisse antiquitas narrat.

(β) Vasorum autem horum structura talis erat; Globorum rotunditatem referebat, sed satis amplam; in hujus Balnei pavimento foramen erat, sub quo candelæ ex variis resinis & gummi factæ stabant, & hoc modo Balneatorium hoc calidum reddebant. In superiori autem ejus parte, uti in cæteris Balneis, foramen magnum atque rotundum cum aliis parvis foraminibus erat, per quod ægri caput eminebat, & per quæ fumus expirabat.

§. 8. Balnea cum Oleis spirituosis sunt ejusmodi Balnea, ubi in vase, caveæ magnæ simili, linteisque madidis quoad rimas clauso, exerto capite, oleisque spirituosis incenso aëre, æger sudat.

NOT. Baculi in Balnei hujus basin induntur, ita tamen, ut omnes se in perfectam rotunditatem componant, & ita habitaculum quoddam rotundæ caveæ magnæ simile reddant; Baculi itaque cum linteis obducuntur, ne calor per rimas adeò magnas evanescere possit. In basi verò hujus Balnei foramen satis amplum est, per quod Olea spirituosæ, e. g. baccarum Juniperi, pini, petrae, &c. in loco concluso sub Balneo hoc incensa, fumum ad ægri, in suprema Balnei regione caput exerentis, corpus mittunt.

§. 9 (a) Balnea cum brodio Decoctorum ejusmodi Balnea sunt, ubi in arcula stannea, seu stanno obducta, Balneo nostro sicco, secundum excellentiam ita dicto, fermè simili aere (β) folli-



folliculorum spirantium, & aquis pretiosis ac odoratis & aliis decoctis impletorum, brodio incenso aliquis fudat.

NOT. (α) Apud Principes atque Magnates ejusmodi balneatoria valde in usu fuisse constat. Erant autem magnitudine non admodum magna, & ut pari modo, uti in aliis caput exstaret, elaborata.

(β) Ejusmodi autem folliculi ex metallo & cupro, quos Germ. *Blas- oder Wind-Kugeln* / appellabimus, vel seorsim existebant, vel in fornacem Balnei erant inserti atque intrusi, ut hoc modo eò citius calefierent, & per tubulum vel collum angustum fumum vel brodium amœnum eò melius spirare possent.

§. 10. Sequuntur Balnea lecti, quæ iterum in duas classes dispescimus; In Balnea lecti suo modo considerata, & Balnea lecti accidentali modo considerata.

§. 11. Balnea prioris generis sunt, quando (α) medicamentis ad sudorem facientibus sumtis æger (β) vulgari modo in lecto fudat.

NOT. (α) De his medicamentis in cap. seq. dicendum veniet; quanquam hic obiter noto, quod Sp. C.C. cum ∇ Sperm. ran. cum & sine aliis medicamentis sudorem facientibus, ut plurimum, antequam sudamus, magna cum utilitate sumi possit.

(β) Dicimus vulgari modo: id est, uti promiscuè ægri sudare solent lectis undique circumvoluti & clausi, modo ut sequentem in lecto sudandi modum ab hoc distinguemus, qui non vulgari, sed alio & accidentali modo fit.

§. 12. Posterioris generis Balnea sunt, quando æger tam morbosæ constitutionis est, (α) ut neque stare, neque sedere possit, & si in igne incenso balneatorio sudare vult vel debet, (β) peculiare Balneum in lecto sibi ædificari necesse habeat, quò hoc modo supinus fudet.

NOT. (α) Ut neque stare neque sedere possit &c. Nimirum quando forte arthritide, aliâque convulsione corporis laborat.

(β) Appellamus hoc Balneorum genus peculiare Balneum ex forma; Nimirum ad utrumque lecti latus tria vel quatuor ferra, foramina oblonga habentia, affiguntur, in horum feramina arcus, ad rotunditatem se componentes, in anteriori parte lecti mi-

nores, in posteriori vero majus spatium capessentes, induntur, qui, uti supra retulimus, madidis liñteis circumvoluti, ne calor dimanet. In posteriore hujus Balnei parte clausa calefaciendi causa fornacem habent; Uti Mantellum hoc ligneum sudoriferum seu Laconicum Andr. Tentzelius in *Exegesi Chymiatrica* prolixius describit, quem vide p.m. 762.

§. 13. Præter octo Balneorum siccorum universalium classes, in quibus Balneis ut plurimum totum corpus sudare solet, sicca particularia Balnea etiam addimus, quæ communiter suffitus nominantur.

NOT. Ejusmodi Balneum siccum particulare est, quando e.g. in suffocatione uteri pennarum perdicum suffitus naribus admoveatur. Quando in retentione mensium hæc vel illâ re, in specie scorpi reguli antimonii in ∇ solutis, uterus fumigatur; In odontalgia buccæ cum thure, ladano, mastiche, &c. Et quæ Balnea particularia alia in Autoribus hinc inde leguntur, & à singulis excogitari possunt.

Et hæc sunt Balnea sicca, quæ in præsentem non definire, sed saltem leviter describere, animus erat: nunc bono cum DEO ulterius pergentes, ad Balnea non sicca seu lotiones accessum maturamus.

## CAPUT II.

### SECT. II.

#### *De Balneis non siccis seu Lotionibus.*

##### §. 1.

**I**nnumeræ ferè sunt lotiones, nos thermis, aliisque pluribus omissis, nostras lotiones, & quidem omnes ex herbis aliisque medicamentis constantes, in quatuor saltem classes dividemus.

NOT. Thermas consultò mittimus, quinam enim consummata eruditionis Medici non fuerunt, qui non de thermis, acidulis, &c. elegantes ediderunt tractatus: inter quos Langius, *Phil. & Med. D. Professor hujus Academiæ olim Celeberrimus*, non ultimum locum tenet; ut ego itaque, tenuium profectum adhuc homo, si plura de his stylo prosequi vellem, in tanta copia aquis aquas viderer addere, & quidem claris ac pellucidis turbidas, quoniam id, quod illi experti scripserunt, ego inexpertus fortè confunderem.

##### §. 2.

§. 2. Est autem nostrarum quatuor classium lotio prima, quando in communibus Balneatoriis, in quibus corporis sordes abluimus (α) corroborationis aut odoris gratia (β) herbas benè odoratas in vannum injicimus.

NOT. (α) Dicimus corroborationis aut odoris gratiâ: nam nemini non constat, corpora nostra multum relaxari Balneis, imprimis si præter consuetudinem tempus balnei trahitur, hinc utile est, corpora iterum corroborari: quod autem duplici modo fit, vel tactu, vel odore. Tactu fit, quando nos in aquas sparsæ herbæ ambiunt, & corpus ita attingunt & roborant; vel quando super sacculos herbis utilibus repletos sedemus, & ita membrorum corroboracionem quærimus: Odore autem fit, si eadem vel aliæ herbæ in Balneis tam suavem Odorem spirant, ut & hoc modo homo vires Balneo amissas recuperare queat.

(β) Herbas benè odoratas &c. quando e.g. serpillum, majorana, &c. communiter in vannum mittitur, siue herbæ illæ maneant integræ, siue antequam in aquam injiciuntur, ut majorem odorem spirent, conscindantur.

§. 3. Lotio secunda est, quando in vannò, (α) medicamentosis aquis impleta, & superiùs clausa, (β) exerto capite aliquis sudat & se lavat.

NOT. (α) E.g. Medicamentosæ ejusmodi aquæ sunt, quando in scabie, aliisque ejusmodi affectibus, ☿ cum calce viva per se seu cum ferro coquitur, & aquæ seu lixivii hujus flavi quantum sufficit, cæteris aquis affunditur, aut si bonam quantitatem baccharum lauri, & ☿ in aqua coquo, & etiam cæteris aquis affundo.

(β) Si vannus amplæ magnitudinis est, etiam duo capitibus exertis sedere, & se lavare possunt.

§. 4. Lotio tertia est, quando (α) Nitrum in vannum immittitur, & æger thermas (β) aliquatenus quasi æmulatur.

NOT. (α) Ad quamnam rem hæc lotio utilis censeatur? in ultimo hujus Disputationis capite exponam.

(β) Dicimus aliquatenus: Nam ad quas lotiones etiam ☿ accedit, hæc magis thermas æmulari videntur; quales excogitare posse Joh. Rudolph. Glauberus in *Furni sui Philosophici Parte tertia* scribit.

§. 5. Denique lotio quarta particularis est, quando nimirum (α) hanc vel

illam corporis partem, morbo obnoxiam, (β) in hac vel illa medicamentosa aqua æger lavat.

NOT. (α) Hanc vel illam corporis partem morbo obnoxiam dico; quoniam interdum, ut totus homo sese lavet, non requiritur, sed ut offensæ saltem partis rationem æger habeat, necessitas postulat: E.g. Ut fieri solet, si nervi morbo aliquo connexionis, uti ab Institutionistis nominatur, laborant, & ad partem aliquam sunt incisi: Si pectus in hoc vel illo morbo hujus vel illius intincti lintei indigeat: Si mulieres in hoc vel illo morbo pedes medicamentosis, & cum herbis, floribus & radicibus coctis aquis, immittunt: si caput hoc vel illo lixivio in tineis, furfuribus, defectu capillorum perfunditur: si hoc vel illo liquore dentes in odontalgia lavamus. Et quæ hujus generis lavationes plures sunt.

(β) In hac vel illa medicamentosa aqua, &c. Multa enim ejusmodi brodia atque Decocta medicamentosa sunt, quæ quilibet ex Autoribus petere seu ipsemet pro lubitu sibi præscribere & componere potest.

Et sic, benevole Lector, Balnea tum sicca tum lotiones aut minus sicca habes. Accingimus nunc nos bono cum DEO ad Disputationis nostræ caput tertium, & quid circa horum Balneorum utendi modum observari debeat, paucis exponimus.

### CAPUT III.

#### SECT. I.

#### De utendi Modo.

##### §. I.

Circa utendi modum tria observentur moneo: nimirum quid ante Balneum, quid in Balneo, & denique quid post Balneum agendum sit?

NOT. Si ullæ res sunt, quæ immutabilem aliquam consequentiam requirunt, certè inter has primum nomen suum Medicina proficitur; Quæ tanquam divina & nunquam satis laudanda ars ita suas periodos & tempora observat, ut ceu annus nullum diem, ita & illa nullam ordinis rationem, prætermittat; In tantum enim in unum quasi orbem omnia Medicinæ adminicula redeunt; Ut hinc id etiam in Balneis nostris observandum venire videatur: Si enim in antecedentibus illorum non rectè procederetur, quomodo illis sequentia ex assè respondere possent? Quapropter sit

§. 2. Ante Balneum ad res sex non-naturales imprimis attendere æger necesse habet, quæ sunt aer, cibus & po-

[X x x x]

rus,

tus, somnus & vigiliæ, motus & quies, excreta & retenta, atque animi pathemata.

NOT. Nimirum tota nostra Medicina, inquit Joh. Riolanus in *Universæ Medicinæ Compendii parte secunda*, quæ *ὕγιαν*, diæta sanorum appellatur, *cap. 1.* in tribus capitibus consistit, Rebus Naturalibus, non-naturalibus, & contra naturam. *Res non-naturales*, paulò post *eodem capite* pergit, *medicæ sunt inter naturales & eas, quæ sunt contra naturam: Neque enim naturam nostram constituunt, ut res naturales; neceandem ledunt ut affectus contra naturam: sed sunt promiscuæ & indifferentes. Benè utenti bonæ; malè utenti malæ. Ejusmodi sunt aer, cibus, potus, somnus, &c.*

Ne itaque & nobis in Balneis malè utentibus eadem malæ sint, sed benè utentibus bonæ, curam geramus, ne bonæ illæ res malè à nobis administrentur.

§. 2. Aer (α) ante Balneum sit (●) maximè purus, ab omni (γ) vitio planè alienus, & (δ) qui ventis salubribus perfletur.

NOT. Dicimus hoc loco ante Balneum, cum tanquam in ipso actu Balnei, postque ejus executionem, non par aeris ratio habenda sit, quum tamen purus, ab omni vitio alienus, semper conferat; sed adjicimus hoc loco vocabulum ante, ut temporis distinctionem eò melius faciamus.

(β) Maximè purus; quò purior enim aer, eò melius hominis natura ad sudorem præparatur, dum hoc modo omnes corporis pori aperiuntur. Si autem aer impurus est, terrestri & impurâ suâ materiâ poros claudit, quò minùs sudor rectè & benè propellatur.

(γ) Ab omni vitio planè alienus, i. e. qualitatum & substantiarum.

(δ) Et qui ventis salubribus perfletur; Venti enim puri sunt, qui aerem maximè purum in cubiculo quodam reddunt; hinc etiam omnibus cum sudantibus tum dormientibus autor sum, ut in cubiculis suis ejusmodi caminos, Germ. *Windlöcher* / mediis quibus aer illius loci sese corrigere queat, habeant.

§. 4. Cibus & potus sit (α) Euchymus, (β) paucus, (γ) temperatæ naturæ.

NOT. (α) Euchymum, secundum citati Riolani *c. 12. dicitur, quod bonum sanguinem generat, in quo quatuor humorum quantitas, qualitas, & proportio legibus naturæ conveniens servatur.*

(β) Paucus autem cibus & potus à nobis statuitur, ne nimia eorum Ingurgitatione pori claudantur. Nullus verò ideo non admittitur, quoniam nimis valdè calor natus sudatione debilis redderetur, nisi priùs cibi boni & pauci illi irent auxilium.

(γ) Tandem sit temperatæ naturæ. Illud autem cibum ac potum temperatæ naturæ voco, quorum uterque inter calidum & frigidum medium tenet. Hoc enim modo fit, ne cibus & potus nimis calidus ad sudantis [cujus spiritus aliàs à sudoriferis magis quàm alio tempore fieri solet, incalescunt] excedentem calorem ansam præbeat, neque nimis frigidus crudam & frigidam materiam in illo præparet, quæ deinceps sudatione, poris omnibus per illam clausis, vix se propellere patitur.

§. 5. Somnus & vigiliæ etiam intra mediocritatem consistant.

NOT. Somnus longior humectat, refrigerat, cruditates multas sudore deinceps vix dissolubiles generat, quæ vigiliis mediocribus non tanta incrementa sumere queunt. Vigiliæ verò immodicæ etiam sudantibus non usui esse videntur, quoniam illorum spiritus, qui aliàs sudatione incendi solent, per illas adhuc magis incenduntur, & ita calidum nativum nimis debilitatur.

§. 6. Motus & quies etiam intra terminos suos se contineant.

NOT. Nimius enim motus spiritus nimis incendit; nimia autem quiete totum corpus refrigerat, pituita multa & excrementa congeruntur, quæ omnia mediocrius motus dissiparet, seu ut sudorifera melius dissipare possent, ansam præberet. Ubi etiam, si tempus esset, de utilitate frictionis ante Balnei usum multa dicere possemus.

§. 7. (α) Excernantur, quæ excernenda sunt, (β) retineantur, quæ retinenda sunt.

NOT. (α) Quoniam juxta Riolanum *excrementa quædam benigna sunt, & sola quantitate sunt excrementa*, de quibus mox; *alia planè inutilia, quæ non tantum quantitate sunt excrementa, &c.* cum planè inutilia generalia, e. g. alvi proluviem, lotium & sudorem, tum planè inutilia particularia, e. g. mucum cerebri, &c. simpliciter abjicienda & excernenda statuimus; quoniam sudorem magis cohibent quàm promonent, sine periculo etiam excerni possunt.

(β) In excrementorum autem benignorum, e. g. feminis, sanguinis menstrui, &c. excretionem, de quibus supra; ut rationem magis consulamus, suadeo; quoni-



quoniam illorum retentio, prout conditio fert, interdum magis utilis esse quam nocere videatur.

§. 8. *Απαθής* vacuus & liber, ab omni perturbatione sudans sit.

NOT. Nam quamdiu animus æger est, tamdiu etiam non de salute patientis desperandum; & non credibile, quam citò patiens pristinam possit recuperare sanitatem, si animo tranquillo morbi exitum expectat.

Et hæc sunt, quæ 6. res non-naturales seu diatam concernunt. Antequam autem cum ægris nostris in ipsa Balneatoria nos conferamus, adhuc observandum venit, an materia illa, quæ per sudorem evacuanda est, in ejusmodi statu sit, ut sine præcedente purgatione vinci queat? an verò, si purgatio ejusmodi præcedat, melius se vinci patiatur? Si prius obtinet, purgationem interdum intermittere possumus; si posterius verò, Purgationem proreadmodum necessaria reputamus; quamvis hoc loco cautè agendum, ne in febribus ardentibus, aliisque ejusmodi morbis, qui purgationem recusant, purgemus; hoc enim modo multos citius, quam aliàs factum fuisset, ad vitæ suæ exitum properasse novi; si autem Purgatio magis prodest, quàm obest, tunc illa admittenda.

Quapropter sit

§. 9. (α) Nonnullos dies ante Balneum, si ægri constitutio & materiæ conditio admittit, (β) Purgantibus evacuare, & hoc modo sudorem futurum magis promovere suadeo.

NOT. (α) Nonnullos dies ante Balneum idèò dicimus, quoniam si purgationem statim B. sequeretur, nimis valdè sudantis vires debilitarentur: Ne itaque illud fiat, ut aliquod temporis spatium interveniat, utile judicamus.

(β) Vel sub specie pulveris, e.g.

℞. *Crem.* ʒi.

*Pulv. jalappæ* ana gr. xvj.

*Scamm.* ʒati gr. vij.

ʒi *depur.* gr. iij.

ʒo *destillat. succini* gutt. j.

M. D. S.

**Purgier-Pulver.**

Vel sub specie Electuarii, e.g.

℞. *Cons. Rosar.* ʒiβ.

*Crem.* ʒi.

*Pulv. jalap.* ana ʒj.

*Diagryd.* gr. vij.

ʒi *puri* gr. iij.

M. D. S.

**Paxier Zucker auff etliche mal.**

Vel sub specie Syrupi, e.g.

℞. *Syr. ros. solut.* ʒiij.

Tom. II. Pars 2.

ʒ *cinam.* ʒi.

*Pulv. jalapæ* ʒj.

*Scamm.* ʒati gr. vij.

M. D. S.

**Purgier-Safft auff etlich mal.**

Vel sub specie Noduli, e.g.

℞. *HB. menthæ crispæ* rec.

*Rorismar. rec.* ana M. iβ.

*Fol. sennæ sine stipit.* ʒvj.

*Rad. helleb. nigri crudi* ʒβ.

*Rhabarb. el.*

*Sem 4. cal. min.* ana ʒij.

*Bacc. junip.* ʒvj.

ʒi ʒiij.

Incisa includantur Nodulo:

D. S.

**Paxier-Plüschel in Wein.**

Quam formulam ab excellentissimo Dn. Præfide præscriptam hîc loci in Officina ad Nigrum Æthiopem, uti vocant, vidi atque legi. Et sub qua alia forma purgationem instituere tibi animus est.

Sed tempus nunc instat, ut ægrum discalcemus, eundemque vestibus exuentes nos cum illo in Balneatoria ipsa recipiamus.

Singula autem Balnea nostra iterum ad manus sumere, quidque in singulo inter balneandum agendum sit, seorsim exponere, quàm Disputatio nostra aliàs præter opinionem excreverit, nimis longum foret; quapropter quid inter balneandum tractandum sit, in tribus §is sequentibus exponentes id ipsum unâ facie & vice depingemus.

§. 10. Utèd melius æger sudet (α) morbo, tempori, personæ, loco, &c. convenientibus (β) sudoriferis, quum jam sudare incipit, melioris sudationis causâ utatur.

NOT. (α) Addimus morbo, tempori, personæ, loco &c. convenientibus; Ex aliis enim medicamentis sudoriferum constet, quo aliquis in morbo Gallico utatur, ex aliis, quod in morbillis usurpetur. Tempus etiam discrimen facit: nam tempore hyemis & autumnus, quo corporis pori magis clausi sunt, & materiæ peccantis copia in corporibus humanis major est, Sudorifera sint vehementiora validioraque quàm æstate & vere, quibus temporibus pori magis dilatati conspiciuntur. Porro personæ ratio etiam habenda est, cujus temperamentum atque natura optimus in hac re tibi magister erit. Et denique locus etiam, in quo sudatio instituitur, diversa Sudorifera postulat: ubi enim calor vehemens est, ibi Sudorifera mitiora propinari; ubi autem calor non admodum excedit, ibi Sudorifera fortiora locum habere possunt.

[Xxxx 2]

(β) Dies

(β) Dies me deficeret, si Sudorifera omnia, quæ tempore Balnei usurpari possent, recensere vellem: potest itaque quilibet ex pulveribus, syrupis, aquis, spiritibus, &c. ad sudorem facientibus, pro morbi conditione Sudorifera ipsemet componere. Ne tamen hæc planè sicco pede transire videar, paucas illorum Descriptiones saltem hic addam. De spiritu cornu cervi autem, cum ∇ sperm. ranarum sumpto, supra diximus, quo, si non multam simplicium Compositorumvé adammus compositionem, promiscuè in omnibus Balneis securè uti possumus. Sequentes sunt formulæ longiores. c. g.

℞. ∇ card. bened.  
flor. samb.  
sperm. ranar. ana ℥i.  
— C. C. ℥i℥.  
fl. samb.  
℥i rectif.  
card. bened. ana ℥i℥.  
C. C. S. Δe ℥℥.  
lapill. ser. præ. ℥i.  
Oli puri gr. v.  
M. D. S.

#### Schweiß-Träncklein auf zwey mal.

Quamquam hæc Potiuncula ut plurimum in Balneis lecti, ut ita loquar, à nobis usurpetur; Et dimidia illius parte vespertino tempore, si cubitum ire volumus, alterâ dimidiâ parte manè, antequam à lecto surgimus, magna cum utilitate utamur.

In reliquis Balneis, uti & in hoc, usurpari possunt sequentia: c. g.

℞. Theriac. Androm. ℥℥.  
D. S.

#### Schweiß-Latwerge auf etliche mal.

℞. Pulv. Bezoard. Senn. c. lap. Bez.  
gr. xij.

margarit. præp. gr. vii.  
Ois card. bened. gr. v.  
Oo destillat. citam. gutt. j.

M. D. S.

#### Stärckendes Schweiß-Pulver.

Morbo Gallico verò laborantes non solum Sudoriferis morbo illorum convenientibus utantur, sed etiam peculiare potiunculas ex ligno Guajaco, sassâfras, radice sarsaparillæ, Chinæ, &c. compositas habeant, Imò sequentem essentiam, illis non inutilem, etiam usurpare possunt, nimirum:

℞. Essent. ligni sancti ℥℥.  
— C. C. ℥i℥.

M. D. S.

Essentia alle Tag 2. mal / auff 1. mal 40.  
Tropffen in einem Träncklein  
Bier zu nehmen.

§ 11. Sudet autem æger corde & capite à calore probè munito.

NOT. De hoc quoniam supra diximus, plura addere non libet.

§ 12. Non ante tempus justum sudatio finiatur.

NOT. Finis enim hoc modo non impetrabitur, e. g. morbilli non satis emergent, nisi sudatio sufficiens præcesserit; It. in morbo Gallico non satis sanguis se purificabit, nisi justo sudore ille corrigatur.

Et hoc modo omnibus, quæ ad sudationem pertinent, probè perpenſis, iterum nos cum sudantibus in hypocaustum vel cameram conferimus. Sit itaque.

§ 13. Post Balneum (α) sudorem æger abstergat, (β) in lectum vel hypocaustum calefactum se conferat.

NOT. (α) Statim autem id fiat, ne iterum, si forte illi, antequam in hypocaustum aut cameram pervenire potest, loca frigida perambulanda sunt, sudor ille falsus & inutilis se retrahat, sicque novi morbi causa sit.

(β) Id suademus ideò, quoniam tum ex nimio calore in frigidum statim se conferre corpori valde noxium esset, tum etiam, si in Balneis sudatio non iusta fuisset, hoc modo, & in primis in lecto, de novo & ad satietatem quandam absolvi posset.

§ 14. Hoc factò (α) bonam dietam iterum observare, & (β) confortantibus sudore resolutum corpus corroborare sive.

NOT. (α) Hujus quoniam supra mentionem fecimus, de eadem iterum de novo dicere supervacaneum esset; quapropter Candidum Lectorem ad §. 2. & seq. hujus capituli amicè remittimus.

(β) Ejusmodi confortantia autem consistunt tum in cibis, tum in medicamentis; De cibo & potu hinc non agam, quoniam partim ad hujus §i. (α) ubi de diætâ agendum esset, hæc tractatio spectat, partim quoniam aliàs, quid cibi boni succi sint, & quo modo hi corpora nostra optimè corroborare queant? cuique facile constat. Medicamenta verò confortantia multa sunt; & in primis hinc locum habent illa, quæ Germ. **die Krafft-Brühen** / nominamus, ex Phasianis, caponibus, &c. per brodium calidæ aquæ in lagenis stanneis expressa, & deinceps cum cinamomo, saccharo, Caryophyllis aliisque aromatibus & succis condita atque mista. It. huc spectant Julebi, cum syr. e. gr. cerasorum, acetositate citri, papaver. Rhœad. &c. uti & cum aq. cinamomi, it. sp. Oli seu Atris mixti & compositi. Porro varia genera Morſulorum cum carne citri, cydon. &c. Confect. Alkerm. saccharo, & aliis pulveri-

pulveribus confortantibus parata; It. Electuaria ex confervis, e.g. rosar. borraginis, &c. cum speciebus variis. e.g. de hyacintho, de gemm. calid. & frigidis, &c. facta. Et denique balsami, omniaque illa, quæ iterum robur & vini corpori, calore enervato, addere possunt.

Et sic, DEO adjuvante, hujus capitis tractationem etiam absolvimus, progredimur itaque Bono cum DEO ad ejusdem capitis sectionem secundam, seu ultimam, quæ horum Balneorum omnium utilitatem & usum monstrat.

### CAPUT III.

#### SECT. II.

#### De Horum Balneorum utilitate & usu.

##### §. 1.

**B**alneorum siccorum usus, & in primis illius, quod Balneum secundum excellentiam dicitur, multiplex est; A morbo enim quocunque, si homo illum imminere sentit, illud Balneum non solum ut plurimum præcavet, sed etiam amissam sanitatem sæpissimè ægro restituit.

NOT. De hoc, quod universi corporis poros aperire, interius penetrare, coagulata resolvere, & hinc corpus totum præ omnibus aliis Balneis maximè à peccantibus humoribus per sudorem evacuare possit, jam nihil dicam.

§. 2. Balnea cum spiritibus oleosis (a) vi penetrandi imprimis nota sunt, nervis conducunt, & (β) fumigando interdum illud præstant, quod aliàs spiritus hi illiti efficiunt.

NOT. I. (a) Insinuat nimirum ille fumus se imprimis poris corporis propter oleosam substantiam, quæ à membris sudantis calidis facilè intus trahitur, ut totum corpus hoc modo pervadat.

(β) E.g. sp. Juniperi, sambuci, &c. qui uti nervos induratos, aliaque corporis membra callosa, inungendo flexibilia calidaque visui sulphuris reddunt; ita etiam fumigando sp. hos illud efficere posse planè mihi persuasum habeo.

NOT. II. Non autem æque ac primum hoc Balneum mihi arridet, causam in conflictu vel discursu proponam.

§. 3. Balnea fumida morbum Gallicum, aliosque contagiosos morbos,

pellere (a) sanguinemque impurum corrigere, creduntur.

NOT. (a) Hæc sanguinis purificatio autem non una vice fieri solet, sed patiens sæpius ut sudet, variisque sanguinem corrigentibus, uti suprà dictum, potiunculis ut utatur, necessum habet.

§. 4. Balnea cum lapidibus & ferro, &c. duplicem usum habent; tum (a) ut ejusmodi lapidibus ignitis in aquam immisis, & hoc modo brodio aliquo excitatum, æger magis sudet; tum (β) ut illa multos morbos curent, eorundemque dolorem tollant.

NOT. (a) Hoc imprimis cum silicibus communibus expeditum datur, quanquam etiam alii lapides sint, qui idem efficere possunt.

(β) Uti e.g. calculi ejusque doloris curatio iisdem silicibus à quibusdam adscribitur, quanquam id nonnullis, uti & nobis, impossibile videatur. Interim tamen interdum aliqua mineralia & lapides dari qui hoc efficiunt, non simpliciter negamus; Joh. Rudolphus Glauberus enim in Furni sui Philosophici Parte tertia c. 33. ejusmodi materiam seu lapides reperiri ait, qui sine igne etiam suis exhalationibus sudorem elicere, morbosque curare possunt: si hoc verum est, quantò magis lapides quidam igniti in aquam immersi fumo vehementiori sudorem promovere, variosque morbos hoc modo curare poterunt.

§. 5. Balneorum cum candelis & lampadibus usus apud Ægyptios vehemens sudoris extractio fuit.

NOT. Legi quidem de hac re nihil, sed ex alicujus relatione aliquando audiavi Ægyptios per ejusmodi candelas tantum interdum ab ægris extraxisse sudorem, ut sæpius statim illi animam efflaverint; Causam verò, ob quam isti id fecerint, nullam aliam puto esse, quàm quod hoc modo omnem materiam peccantem ad unguem se abstrahere, causaque morbi penitus remotà eò melius hoc modo ægrum se curare posse crediderint.

§. 6. Balnea cum Oleis spirituosissimis Balneorum cum spiritibus oleosis effectum fermè habent.

NOT. De hoc vid. §. 2. hujus sectionis.

§. 7. Balnea cum brodio decoctorum non solum, sudans ut benè oleat, efficiunt, sed etiam corpus roborant atque confortant.

[Xxxx 3]

NOT.



NOT. Apud horum Balneorum inventionem non solum utilitatem, sed etiam delectationem multum potuisse existimo; Nam uti jam juvenes alicujus conditionis sequioris sexus gratiam inunctione variarum rerum bonum odorem spirantium impetrare conantur; Ita etiam olim per ejusmodi Balnea magnates uxoribus suis sua corpora commendasse credo.

§. 8. Balnea denique lecti ad omnes morbos (a) citò, atque etiam (β) tutò, usurpari possunt.

NOT. (a) Citò usurpari possunt, e. g. in morbillis; convenienti enim sudorifero propinato citò sudare possumus.

(β) Imo etiam tutò; Etenim non faciliore tutioreque methodo morbi alicujus naturam Medicus expiscari potest, quàm si sudoriferum agro propinans, in lecto illum sudare cogit; Hoc modo enim non solum tutò illius morbum, qui per sudorem sapissimè se prodit, addiscit, sed etiam sæpè sæpius auxiliatrices manus illi affert.

Et hic est aliqualis saltem usus Balneorum siccorum: sequitur breviter etiam usus saltem aliqualis Balneorum non siccorum seu lotionum; Sit itaque

§. 9. Lotio nostra prima ut plurimum corroborationem atque odorem pro fine habet.

NOT. Quoniam *cap. 2. Disputat. nostr. sect. 2. §. 2.* usus hujus mentionem feci, non altè illum huc reperam.

§. 10. Lotio nostra secunda ad innumeros morbos utilis est, & pro in-

gredientium natura ac compositione effectum edit.

NOT. E. g. Uti *suprà c. 2. Disputat. nostr. sect. 2. §. 3.* lotionem ejusmodi ex  $\Delta$  cum calce viva in scabie multum posse diximus. In *iq̄xela* seu urinæ suppressione etiam ejusmodi lavatio prodest: it. in suppressione mensium, modo si etiam ex ejusmodi herbis ac medicamentosis aquis, ad hunc vel illum morbum facientibus constat.

§. 11. Lotio nostra tertia in extrahendo resolvendoque multum posse creditur.

NOT. Robustam autem ut habeat naturam, qui illà utitur, necesse est.


§. 12. Lotio nostra quarta denique (a) ad hanc vel illam partem ægram, imprimis à Chirurgis, (β) ad hujus vel illius partis nervorum emolliationem usurpatur.

NOT. (a) Supra etiam de hujus lotionis utilitate verba quædam fecimus; Nolumus itaque iterum ad manus sumere.

(β) Chirurghi hæc Balnea vocant *die Behungen*.

Et hoc modo etiam lotionumstrarum virtutes delibando saltem consideravimus. Sed, mea navis, ingredi nunc iterum portum, sat diu in alto fuisti; Tuo autem Navarcho ac protectori summo, cujus auxilio scopulos præternavigasti, honoris ergò in prora hanc votivam tabellam suspendo:

DEO SIT LAUS ET GLORIA  
IN SECUA.





DISPUTATIO XIV.  
ABSTRUSUM RESPIRATIONIS  
HUMANÆ NEGOTIUM,

Exulante Famosa VACUI Fuga,  
Ex genuinis gravissimi hujus Argumenti *Φαινομένων* causis  
*plenius erutum,*

Simul cum ardui istius Harveani, Doctis omnibus, L. de  
Gen. Animal. Exerc. de Partu propositi, nec non bi-  
membris hujus Problematis solutione; Cur Animalia  
tàm propter Aëris Inspirati cohibitique Præsentiam,  
quàm in Machina Boyliana Pnevumatica exhausta,  
propterejusdem aëris absentiæ, tàm velociter, quasi  
ex anima succumbant, brevique moriantur?

SUB MODERAMINE

*Viri Nobiliss. Excellentissimi & Experientissimi,*  
DN. MICHAELIS ET TMULLERI,  
Phil. & Medicin. Doctoris Celebratissimi,

*Dissertationis Philosophico-Medicæ loco publicè propositum*

AB AUTORE

ZACHARIA NEUKRANZ, Hamburgensi,

Ab ipso B. DN. AUTORE revisum, & multis in locis auctum.

---

P R O O E M I U M.

**C**hristiano Philosopho dignissimum sanè ac pervenuste dictum est illud Basilii Ma-  
gni, Mundum hunc vocantis: *παιδείαν τὴν θεολογικὴν καὶ ψυχῶν λογικῶν διδασκα-  
λίαν.* Tam admirandus etenim ex vasto creatorum tam concinnè coordinatorum syste-  
mate, veluti ex tot speculis reflexus, mentisque pariter ac corporis profundè contem-  
plantium oculos tantopere percellens sapientiæ splendor non potest non de summi cujus-  
dam, Omnipotentis, Æterni, ac infiniti, omniumque perspicacissimi Numinis ineffa-  
bili existentia, plenissimè testari; adeo ut ipse Gentium Doctor ad Rom. I. v. 20. lucu-  
lentissime stabiliat: *Quæ sunt, inquit, Invisibilia illius (scil. DEI) ex creatione  
mundi, dum per opera intelliguntur, pervidentur, ipsaque æterna ejus potentia ac  
divinitas. Hinc quoque rerum creaturarum curata Observatio, quamque hæc in homi-  
num animis prolicit, Admiratio, haud incongruè causa προκαταρκτικὴ Philosophiæ stu-  
dii nonnullis censetur; imò in nil admirando Philosophiæ finem perfectionisque colo-  
phonem situm esse opinati sunt Pythagoras, Plato, ac Stoicorum ordo. Nec possum,  
quin insignissimo omniumque ferè primo hujus seculi Realis seu Experimentalis Philo-  
sophiæ propugnatori, Doctissimo Galileo, promptè ad stipuler; Esse nimirum grandem  
illum Naturæ Librum veræ Philosophiæ genuinum ac proprium objectum. Cum autem  
miranda divini Creatoris opera non nisi sensuum nostrorum, tanquam totidem excubi-  
torum, interventu Intellectum feriant, à quibus quippe omnis sapientiæ humanæ,  
quantulacunque demum fuerit, prima omnium extremaque pendet origo; adeoque ho-  
minum nulli nisi volanti ad præmemoratam διγνωσίαν animæque διδασκαλίαν via sit  
præclusa, hinc meritò cum Bernhardino Teleſio, Italo, acerrimi ingenii Viro, ac*  
*Peripa-*

Peripatium vehementer exercente, ægerrimè ferendum dolendumque, naturæ rationem per tot secula non tam ex ipsis creaturarum *Φαυκίους*, quam ex Aristotelicis aliorumque voluminibus accersiri solitam. Nam brutum profectò homineque prorsus indignum est illud *Masii* Stagyritæ, interpretum haud postremi, effatum; dum, (de loco verba faciens referente *Ballio*) Ego, inquit, nisi me Aristotelis & D. Thomæ compelleret autoritas, manibus pedibusque in sententiam de Intervallo libenter abirem, quam & intellectu faciliorem, paucioribusque difficultatibus patere, si attentè & argutè superiora, & quæ de natura illius diximus, contemplemur, facile deprehendimus: Verum quia ingenii fasces submittendi sunt Aristoteli & D. Thomæ, fateamur Locum superficiem esse, & non intervallum, quia hi gravissimi Philosophi tradiderunt. Sed valeat infelicissimi ingenii *Masius*, similiaque mancipia; solius quippe Naturæ operibus optimo jure Pythagoricorum illud *ἀντὶς ἰσῆα* competit; utpote ab ipso summi Creatoris ineffabili, quodque facta sequuntur, Verbo FIAT, ortum suum repetentibus. Ex horum itaque numero innumero, quam jam præ manibus habeo, nobilissimam, at insimul maximè abditam, Materiam selegi, ad eamque pro tenelli ingenii viribus perquirendam animum induxi. Constitueram equidem primitus perfectam de Aëre, per universam Medicinam considerato, nec non, ob Materię affinitatem de vacuo Spatio, deque Spiritu Mundi Catholico, *διακίψαν* Orbi Literato proponere. Verum cum eandem elaborando prolixiorē repererim, quam Academicarum Dissertationum mos ferre solet, nec accurtari commodè ob laxum Argumenti ambitum spinosamque naturam potuerit; idcirco ad plenius otium id differendo, Respirationis interim penetralia ingredi placuit. In quo negotio si vides me magnorum Autorum Hypotheses deseruisse, libereque in rei naturam inquisivisse, ne quæso sinistrè interpretare. Sapientiam enim, inquit *Lactantius* Lib. 2. *Divin. Institut.* sibi adimunt, qui sine ullo iudicio inventa Majorum probant, & ab aliis pecudum more ducuntur. Sed hoc (pergit ulterius) eos fallit, quod Majorum nomine posito non putant fieri posse, ut aut ipsi plus sapiant, quia Minores vocantur, aut illi desipuerint, quia Majores nominantur. Præterea sola Natura est Arcanorum suorum interpretes fidiſſima: Nam quæ in uno aliquo genere obscurius exhibet, ea luculentius in alio explicat. Et quamvis (ut cum celeberrimo Mathematico Cæsareo, *Kepplero*, Introduct. in Martem, loquar) in Theologiâ Autoritatum: in Philosophia tamen non nisi Rationum atque Experientiæ momenta sunt ponderanda. Autoritatum enim vastissimus est numerus, selectus earundem dubius, fundamentum plerumque lubricum. Neque id operam dedisse me scias velim, ut ex aliorum libris Centonem consuerem; sed ut Experimentis, tum propriis tum aliorum huc collatis, ad investigandam mirabilem Respirationis Humanæ naturam intellectum exercerem. Nec omnes Autorum opiniones pugnaciter examinasse iuvabit, quod vel ipso Aristotele *Judice Eth. 1. c. 2.* vanius fortè foret: Satiùs verò maximè insignes, aut quæ videntur niti aliquâ ratione excussisse. Tandem etiam pro Tractandi Methodo *stylovè* veniam mihi impetranda erit abste, qui cum Romanis Musis familiarius forſitan vixisti: Eum siquidem ad scholarum normam non esse compositum optimè novi. Sed voto apud æquos rerum arbitros me facile patiturum confido si causam ipsis exposuero: Scilicet vix à limine salutarem Literas, cum Anno ætatis XIII. nondum elapso mihi rursus easdem eriperet inevitabilis Pharmaceuticæ Artimè addicendi necessitas. Quotēmpore quantus Demosthenes, quantusve Cicero fuerim, tu ipsemet iudica. Illa porro per octennium pro viribus excultâ, Pyrosophiæ Chymicæ iucunditate allectus, in vulcania castra transii. Quorū sanè tum ardore igni vomo, tum quoque carbonum ardore amœniores itidem nitidæque per integrum biennium procul fugabantur Musæ. Donec tandem Virorum pietate, prudentiâ ac eruditione præstantium suasu, vix triennio abhinc, in Alinâ hac Philurea Literatorum Albo insculptus, Medicæ Arti me totum dederim. Cujus vastissima amplitudo omnem mihi hætenus ad humaniores Literas tramitem præclusit. Sed solatur me sublimis ille ingenii Vir Galilæus, in Dialog. de System. Mundi p. 66. in aliis quidem artibus, inquiens, dicendi promptitudo Scriptorumque varia lectio & autoritas locum invenire possunt, ut qui rebus præſtet, is suam quoque rationem probabiliorem plausibilioremque efficeret. At in Scientiis naturalibus, quarum conclusiones sunt veræ & necessariae, ubi nullus arbitrio humano locus est, nil efficiunt. Nam ibi mille Demosthenes & Chrysippi, milleque Aristoteles, vel à mediocri ingenii homine unico, qui meliori fortuna, libertate, ac candore verum amplexus est, prosternuntur. Hæc in Dictionis meæ patrocinium sic uberius diducta volui; quæ ut alicujus apud Te momenti esse patiaris, Ingenue Lector, est, quod maximè rogo. Rerum verò quod attinet momenta, ea præter tuum in judicando candorem, propriæ

in super




insuper probabilitati confidunt; Nunc ad Te, Sanctissime JESU, Verbum Patris, supplex devolvor, ex imo pectore ingeminans, velis mihi æternum, qui Tecum habitat, Sapientie Spiritum largiri, qui hosce meos conatus dirigat in summi Nominis Tui gloriam, Proximi emolumentum, operumque tuorum salutarem cognitionem, Amen!

## CAPUT I.

*Respirationis* ὀνοματολογίαν, nec  
 non πραγματολογίαν, succinctè  
 adumbrat.

## §. 1.



Audabilis moderni seculi in steriles Logomachias non adeò proni; sed rerum potiùs momenta pensantis, mos haud duriùs feret, quòd ὀνοματολογίας scrutinio non curiosius inhæreamus; ipso quippe Scaligero Judice, ceteroquin sat spinoso, in Carminibus suis:

*Stultum ac supinum plumbei que deliri est:  
 Rebus relictis consensescere in verbis.*

Horum autem nescio an oblitus, an verò subtilitatum suarum (in quibus mirum quantum sapiusculè sibi complacere videtur in Exerc. contra Cardanum) dulcedine nimium allectus in *Comment. in Aristot. Histor. Animal. Lib. 1. c. 2.* (quorsum, cui hæc sapiunt fercula, remitto) multa de Respirationis Etymologia verbosè disserit, ne curiosa magis quàm fructuosa vereor; cum nihilo feliciùs in absconditam nobilissimæ hujus Functionis naturam, vel ab illo aliisve consimilibus farinae Scriptoribus penetratum, penitiùsve deventum sit hætenus.

§. 2. Veruntamen ut quadantenus morem geramus Galeno dicenti *Lib. 1. M. M. c. 5.* ἐπὶ πάντων ζητεμένων εἰς λίγην χρόνον μισαλαμβάνεσθαι τὸ ὄνομα: in omnibus, de quibus queritur, ad rationem oportet assumi ipsum nomen: paucissimis saltem attingamus, Respirationem, Græci ἀναπνοή & ἀνάπνευσις, dictam, esse vocabulum generale binos distinctosque Actus denotans; nimirum tum Aëris Admissionem, Inspiratio in Medicorum scholis communiter vocatam, græcè εἰσπνοή & ἐμπνευσις: tum ejusdem aëris illapsi Expulsionem, Exspiratio communiter nominatam, græcè ἐκπνευσις & ἐκπνοή. Reciprocus enim hicce aërem in pulmonum antra admittendi indeque rursus expellendi exprimendive motus, unâ voce Medicis audit Respi ratio seu Respiratus.

§. 3. Quibus decenti brevitate prælibatis cæterisque Homonymiæ ac Synonymiæ tricis ad Philologorum verbosa volumina ablegatis, recto tramite ipsum Argumenti substrati nucleum degustaturi ad πραγματολογίαν properamus. Ubi primâ fronte illi-

Tom. II. Pars 2.

cò sese offert Definiendi necessitas omnium suffragio inevitabilis; Ast sanè, sive Autorum tantis opinionum divortiis fluctuantium farraginem, sive irretitam ipsius rei naturam spectes, tam operosa, ut, nisi forsitan temerè quid dicere velimus, aut precariam penitus Doctrinam afferre, in hocce diversorum Agentium atque Effectuum simultaneo concursu vix arbitrer, me insulsè licet paradoxologicè facturum, si cum profundo Philosopho Democrito, Hominem definiente id, quod omnes scimus: referente ex Empirico Gassendo *Exerc. Paradox. 5. adversus Aristoteleos* pariter & ego Respirationem definire id, quod omnes scimus esse Respirationem. Facilius quippe totum ferè Respirationis Causarum ac Modi fiendi nexum analyticè exponere, quàm hæc omnia concisò verborum firmate, unicâ scilicet paucarum linearum Definitione, prout Dialecticæ Leges (quo jure hic non disquiram, cum doctè solideque id fecerit solidè doctus Gassendus *l. c.*) exigunt, compingere; Ita quidem, ut ne verbulum gratis aut improprie dictum, calamo elabatur.

§. 4. Ne tamen nostros conatus dissimulemus, spretis aliorum placitis, Respirationem Humanam definite liceat, quod sit Functio hominis nati atque viventis arbitraria, bipartita, ac non nisi sub vitæ periculo ferians, quâ indefessò reciprocationis motu, nunc amplior fiens thorax, aëri per os narsive pulmones irruenti, eos expandendi locum cedit; Nunc rursus illico sese coarctans eundem pulmones constringendo, simul cum roridi halitus sarcinâ maximam partem expellit; nonnullâ interim, utut minimâ, aëris parte in Massam Sanguineam, pulmones ex circuli lege, vasorum pulmonalium sanguifluorum beneficio, permeantem, transeuntem; ad varios tum vitæ simpliciter, tum ejusdemmet commodiùs ducendæ Usus infra plenissimè disquirendos adornata.

§. 5. Respirationem esse Functionem hominis viventis nati notanter dixi. In infra sequentibus quippe aliquot argumentis probatum dedi, Fœtum in utero ac secundinis sepultum neutiquam respirare posse. Quod autem Respi ratio sit Functio arbitraria, cui libet facilè patebit, Instrumenta, ejusdem Causas, agendique modum, ac Usus in subsequeturis attentè perlustranti. Accedunt historiæ illorum, qui Spiritu cohibito sefemet ipsos spontè jugularunt: quarum unam refert Galenus *lib. 2. de Motu Musc. c. 6.* binasque

[Yyyy]

sugge-

suggerit Valerius Maximus *Histor. L. IX.* nec sufficit objecisse, Respirationem etiam in somno nobis insciis fieri, hincque evincere velle, esse illam à numero Actionum naturalium. Somnambuli enim atque somniloqui eruntne naturaliter seu involuntariò, an verò pro arbitrio animali agentibus annumerandi? Quà occasione non possum quin mirabilem ex Helmontio *Tr. de Formar. ortu §. 53.* historiam adnectam. *In classibus literariis, inquit Autor, mihi sodaliserat iu cubiculo, honestis civibus ortus. Hic clausis oculis noctu plerumque surgebat, & oberrabat; clavem verò secum deferebat, seramque post se clausam rediens aperiebat. Vespere itaque surgo, & clavem clanculum subter pulvinar abscondo; ille verò in somno surgens abditam clavem velut sibi visam capit & abit. Sequor illum arrepta tunica. Ille verò scandeat antiquum parietem terminum Collegii musco ac feno obsitum. Arcus enim erat, quo trans flumen sustinebat paries murum horti vicini. Plenilunium erat & nox pruinosa. Ad spectaculum horruì, & præ frigore rediì. Sodalis verò mox revertens tam inhesitanter clavem in foramen claustrì abdidit, quod vix ullus videns, & sub meridiem æque incunctanter id faceret. At manè omnium immemor erat.* Haecenus ille. Alius quidam densâ nocte surrexit, ignem ex chalybe suscitando candelam accendit, versus latinos composuit, contubernali monstravit, in illis sibi complacuit & manè itidem omnium immemor fuit. Hæc qui consideraverit, meritò mecum distinguet inter Actiones nobis insciis quidem, non tamen nolentibus à nobis editas: & inter illas, qui nullo modo arbitrio nostro subsunt; in quo tamen Respirationis perfectè posita est, ita, ut illam voluntatis allubente Imperio accelerare ac retardare, varieque modificare, imò planè cum morte subsequente suspendere possimus, uti ex memoratis liquet. Præterea altiùs forent repetendæ corporis viventis Actiones atque Motus, eorumque causæ, cur nobis aut consciis aut insciis, volentibus aut non volentibus, aut denique penitus nolentibus eorundem nonnullæ fiant, si huius loci essent, quam solis distinctiunculis in Naturales & Animales, acquiescere. Causam enim solidam ac perspicaci ingenio satisficientem attulisse, cur anima in somno somniis somnambulis, Ecstatis, similibusque casibus alio penitus ac anomalo modo (respectu Actionum nobis consciis ac præmeditato quasi consilio contingentium) agat, hoc opus, hic labor.

§. 6. Porro bipartitam Functionem esse *ἀναπνοήν* jamdiu innui, cujus pars prior, dum

primâ omnium vice respirare incipit natus ac secundinis exutus infantulus, Inspiratio est; quâ thoracem dilatat, ad cujus dilatationem aer præ trachæa foribus quasi expectans, illi- cò ponderis sui mole in pulmones irruit, illosque expandit, atque hæc ratione vasa pulmonalia ab accumbentibus pulmonum vesiculis, suâque concidentia illa hætenus comprimantibus liberat, sanguinique patentem transitum præbet. Pars Respirationis posterior est Exspiratio, quâ aer sponte illapsus rursus à thorace coarctato è pulmonibus exprimitur expelliturque: aliquantilla interim, sub utroque Respirationis Actu, aeris parte in sanguinem aliasque consequenter corporis partes transmeante. Sed omnia hæc ætate singula rudi saltem penicillo hîc adumbrata in subsequentibus uberrimè deducenda ac dilucidanda erunt.

## CAPUT II.

*Peculiarem Sciagraphiam*

*Principiorum omnium Respirationis  
Actus Universæ constituen-  
tium delineat.*

## §. 1.

Quoniam valdè opere vereor, ut numerosa Autorum quotquot hætenus evolere contigit de recondito ac intricatissimo hocce Argumento tractantiù, cohors accuratis ac circumspectis ingeniis satisfaciat, quippe aut non omnes Respirationem integrantes partes explicantium, aut diversam Causarum ac Effectuum huc concurrentium indolem haud satis distinguunt; idcirco, ut cuncta *ὑπερόδωκε* peragamus, rem, quod ajunt, ab ovo exordiendo, methodicam quandam cunctorum universò Respirationis Humanæ negotio, seu activè seu passivè inservientium Principiorum Sciagraphiam præmittere haud inconsultum duximus.

§. 2. Dicta proinde principia bifariam potissimum considerari possunt; vel quatenus ceu homini propria intra ejus penetralia præexistunt; vel quatenus ceu communia illi, æque ac omnibus animantibus, extrinsecus circumfusa datâ occasione intrò adveniunt: intrinseca rursus vel immediatè sub sensus cadunt, vel non cadunt. Insensibilia sunt: Anima, Causæ primariæ aut principalissimæ [ respectu scilicet ad rerum creaturarum cancellos restricto, ineffabilique ac immenso causarum universè omnium Chorago æterno, DEO, ubilibet reverenter præsupposito ] Efficientis munus: & spiritus animales, Efficientis secundariæ vices gerentia. Bina hæc Principia semper subintelligendo cum sensibilibus hîc potissimum nobis res erit. Sensibilia itaque principia intrinseca iterum bis-

bisecanda erunt in causantia sive Activè, & Instrumentalia, Passivè respectu priorum, se habentia. Causantia seu Activa Principia sensibilia intrinseca causantur vel efficienter; vel finaliter. Finaliter causantia videbimus infra, ubi de variis Respirationis Humanæ Usibus dispiciendum erit. Efficienter Causantia intrinseca vel Inspirationem vel Expirationem causantur. Inspirationem quæ efficiunt, sunt Musculi omnes ( Animæ ac spirituum animalium influxu ubiis præsupposito ) costas elevare valentes: idque immediate in naturali ac moderatâ Inspiratione, quales sunt Serrati postici superiores & inferiores, Levatores costarum Srenonii, & Cervicales descendentes à Diemmerbroccio descripti. In auctâ verò ac intensiori Inspiratione, quin mediantibus Scapulis, per Musculos subscapulares aliosque dorso affixis, Levatores seu Patientiæ & Rhomboidæi mutuam aliquatenus possint conferre operam, non est, quod dubitemus; cum id ipsum situs ac connexio digito quasi commonstrent. His adde Diaphragma, præter diductionem, quam à thorace patitur, propriâ sed modicâ saltem contractione sua ad pectoris cavitatem augendam aliquantum contribuens, adeoque eodem Inspirationis momento geminâ motus Causâ, intrinseca unâ, alterâ extrinseca, attamen ad eundem functionis scopum collimant, gaudens.

§. 3. Hactenus de Principiis internis ad Inspirationem efficienter concurrentibus. Expirationem quod concernit, videtur eadem, si ordinaria seu moderata saltem fuerit, à solâ costarum, sterni, clavicularum cum brachiis integris, omniumque adhærentium partium ut & ipsorum pulmonum mole, consueto gravitatis ritu deorsum (remittentibus causis sustollentibus) tendente, effici posse; Si addideris Sacrolumbum utrinque ab ossè Sacro & lumborum spinis exortum, costisque inferioribus intus & extus affixum: nisi quod quadantenus symbolum suum conferant Abdominis contenta, versus Diaphragma tantillum relabentia. Quæ tamen, quod non simpliciter ad Expirationem necessaria sint, suadet Experimentum, quò, remotis iisdem in cane Diaphragma nihilominus expirando sursum ferri demonstratur. Si verò præter solam aëris admissi halituumque expulsionem fortior Expiratio (in quemcunque denique finem instituat) fieri debeat, præmemoratis Expirationis causis insuper auxiliatrices jungunt manus musculi Abdominis, Recti præprimis atque Obliqui.

§. 4. Huc usque fuerunt Respirationis Principia intrinseca sensibilia efficienter aut Inspirationem aut Expirationem causantia: nunc locum sibi poscunt Principia interna in-

strumentaliter seu passivè ad hocce Respirationis negotium concurrentia. Ubi præliminariter notandum, quòd, nisi ἀνυπολογίαν committere velimus, solidè philosophantibus exosam, nec musculi suprâ inter Activa seu Efficientia Principia numerari; nec spiritus animales respectu ad Animam; nec ipsa denique Anima, nisi in æternum Numen (quod Christiani meritò omnium Motorem absolutissimè primum ac prorsus independentem veneramur) injurius sis, Causarum propriè Efficientium nomine ac munere æstimari queant, uti suprâ jam innuimus. Attamen cum respectivè ac indulgenter in prioribus musculos ibidem recensitos Principiorum Activorum seu efficienter causantium officio dignati simus, quatenus scilicet Efficientium in Respirationis actu causarum primæ in sensum immediate incurrunt; idcirco Instrumentalia ac passiva Respirationis Principia intrinseca, partim in Inspiratione, partim in Expiratione, partim etiam, (diversò licet respectu,) in utroque conducentia erunt omnes, tum Spiritus animales, tum Atmosphæram aëream, aut transmittentes aut excipientes continentes: nec non thoracis cavitatem circumsepientes corporis humani partes; quarum præcipuæ aut peculiarem considerationem promerentes sunt Nervi, (ut ipsius Respirationis ordinem observemus) Cervicis, Dorso, ac Lumborum, Ossisque Sacri, Vertebra, Costæ omnes tam Legitimæ quàm Nothæ, Sternon, Claviculæ, Scapulæ cum Musculis, quibus Dorso nectuntur; Musculi subclavii, Intercostales externi ac Interni, Triangulares (quos Marchettus pro Intercostalium porcionibus agnoscit) Pleura, superficiem concavam thoracis succingens ac proximè integrans & Diaphragma quatenus à thorace diducitur: Hinc Nares Osve patulum, aut horum quadantenus Vicarii Ductus Tulpiani seu verius Fallopiiani, fauces, Larynx nec Epiglottide clausa, Trachea, ac vesiculosa pulmonum moles integra; Hinc sanguis, succique reliqui, Venâ pulmonali, Corde ac toto consequenter corpore, vasis tamen præcipuè arteriosis circumerrantes &c.

§. 5. Hæc de Principiis humanæ respirationis homini propriis, inque ejusdem tum Ergastulo corporeo præexistentibus, tum arbitrio positis, sufficere queunt. Restat ut de altero Respirationis principiorum summo genere mentem aperiamus, quippe quod non tantum Respirantibus creatis omnibus commune respectuque Respirationis futuræ, (non præteritæ) extraneum penitus, sed nec horum nutu nisi accidentaliter & ex consequenti solummodò ad respirandum concurrat, in quo tamen



totius ferè Respirationis Cardo vertitur, unde & concursus ejus, rei quippe omnibus animalibus ad vitam simpliciter tantoperè necessariæ, tam universalem excludendum ordinasse utique videtur Summus rerum omnium ac Sapientissimus Arbiter, ut, etiam si nulli penitus animantium in istud Principium ullatenus nisi ex accidenti duntaxat, jus sit; Attamen quam vastus etiam eorundem per totum terrarum orbem sparsus sit numerus, licet omnia ac singula unico eodemque momento pectus Respirandi gratiâ expanderent, non possit non paratissimo affluxu ad vota eorundem explenda irruere; adeò, ut vel ex hoc solo meritissimè ab harum rerum contemplatore sedulo cum Propheta Esaia *c. XXXIII. v. ult.* tantis qui insigniatur elogiis, dignissimus sit; Esse scilicet in consilio stupendum, in operatione Excellentem. Hæc proinde principia extranea atque extrinsecus intrà, data portâ spatii, ruerentia sunt Atmosphæra aërea, omniaque inibi diffusa atque natantia effluviis Globi Terraquei agmina. Quæ cuncta tamen in subsequens collectivè sub uno eodemque aut Aëris aut Atmosphære nomine salutabimus.

§. 6. Atmosphæra itaque eadem tum activè tum passivè ad Respirationem concurrere reperitur: quod, nisi distinctis fieret temporum momentis, implicare videri posset. In inspiratione quippe Aër Agentis ac efficienter pulmonum expansionem causantis munus; subsequenti verò Expiratione reverà Passivi vices subit, è pulmonum quippe cavernulis à thorace subsidente expulsus atque expressus. Sed hanc de Aëris Naturâ ac Motu Doctrinam fusiùs explicandi infra commodior dabitur locus, in quantum scilicet ad hanc functionem pertinere videbitur.

### CAPUT III.

#### *Thoracis Structuram in Respiratione præprimis attendendam ejusdemque Motum inculcat.*

##### §. 1.

**S**ic fuit præmemorata Principiorum, quatenus Universam Respirationis Humanæ Functionem constituunt, Sciagraphia ac series. Porro subnata nobis dilucidius reddendi hoc argumentum spes de quorundam majoris præ ceteris in Respirationis negotio momenti, Principiorum structurâ, indole, situ, motu atque effectibus peculiari scrutinio mentisque indagine dignis, nec non perplexo eorundem ac intricatissimo agendi aut patiendi Modo exactius perquirendo nos admonet.

§. 2. Sedulo autem corporis totius situs in explicandis Respirationis partibus atque phænomenis observandus ac distinguendus est, ne error nobis in enunciando, Lectori autem benevolo in concipiendo obrepere possit. Notet proinde semel pro semper B. L. nos impoliterum ubique de homine loqui, quatenus is, erecto ad sidera vultu ac corpore pedibus innitens perpendiculariter ac per angulos rectos (si non mathematico rigore, saltem sensu physico, quem itidem semper in infra sequentibus subintelligimus) horizontali globi nostri plano insistit.

§. 3. His nullibi non præsuppositis, in spinosissimâ ac contentionum feracissimâ hac Materiâ, Analyticâ utar Methodo, phænomena scilicet ipsò sensu nota præmittendo; hincque ad ulteriorem causarum investigationem accurato ac circumspècto ratiocinandi modo progrediar. Notandum itaque arcuatam costarum structuram cum spinâ dorsi neutiquam, nec consequenter cum sterno, committi per angulos rectos, ita ut rectangulam cum illa crucem referant, sed declivi admodum situ spinæ vertebrae esse affixam, præsertim inferiores ac spurias, angulosque à parte inferiori acutiores, à superiori verò obtusiores constituere; hinc & versus curvam sui partem depressiores esse, adeò, ut, si linea secundum costæ alicujus ductum in altero laterum sita duceretur, eadem cum globi Terraquei superficie non parallela ac pari semper ab eadem distantia curreret; (quod fieri necessum foret, si transversim ac cruciformiter cum spinâ conjunctæ essent costæ) sed oblique deorsum ad terræ planum properaret, brevique ad id pertingeret. Hinc sequitur infallibiliter, quò magis costæ, dicto modo spinæ inarticulata, erigitur, eò obtusorem fieri angulum ejus inferiorem, qui antea fuerat obrusior, sicque utrumque angulum ad rectanguli figuram accedere propius, ac consequenter semicirculares costas magis extorsum, id est, versus omnia semicirculi costarum puncta magis protuberare, quo altius costæ erigitur, id est, quo magis accuratè costæ media pars à spina, per sui elevationem, recedit, magisque ad lineam transversam, respectu spinæ conceptam, costæ appropinquant. Hæc omnia in Inspiratione dicto jam ritu, contrario autem penitus per omnia in Expiratione quod eveniant, mechanicâ necessitate sensuumque ministerio liquidissimè constat.

§. 4. Notandum ulterius, totam costarum cum claviculis, sterno & scapulis affixis compagem esse mobilem, imò & actu in moderatissimâ quoque Respiratione sursum ac deorsum moveri, seu, accuratius loquendo, motum in orbem progrediendo, eadem-

demque, quâ iverant, viâ regrediendo, incipere sive attentare. Attentare notanter dico, quia neutiquam integrum circulum, imò ne quidem octavam circuli partem describunt, verùm describere attentant solummodo; nec tamen rectâ sursum aut deorsum, sed circulariter moventur, seu potius moveri incipiunt, tum quando à musculis huic officio dicatis attolluntur, tum quando propriâ totiusque thoracis mole gravitante subsident, perque musculos Sacro-lumbos & Abdominis Rectos atque Obliquos deorsum trahuntur, Thoracis hunc motum etiam in liberri-  
ma Respiratione observabilem contra industrium Bartholinum nec non plerosque alios noto. Neque Galeni lenem, à solo diaphragmate dependentem, ejusdemque nec fortio-rem, musculis intercostalibus concurrentibus factam; nec tertiam illius sublimem, diaphragmate, Intercostalibus & thoracis musculis simul agentibus, Respirationem admittere sensum accuratè observantium, ad quod appello, tribunal indulget. Neutiquam enim ratione Diaphragmatis aut musculorum intercostalium Respiratio differre potest; cum nec ab his, nec ab illo, nec ab utrisque, junctâ licet operâ agentibus, Respiratio fieri possit, nisi costarum motus per musculos ad id destinatos celebretur. Sed de his fusius infra.

§. 5. Quod autem motus costarum tendat in orbem, optimè intelligere poteris, si, ut rudi utar exemplo, Siphonem recurvum ac bicurum (non verò rectangulum) binis suis crurum extremitatibus (costæ recurvæ trunco spinæ adhaerentis instar) arbori cuidam, quocunque modo transversum affixum concipias, ita quidem, ut in alterâ extremitate recurva sursum deorsumque, non recedentibus interim ab arbore binis cruribus, moveri queat. Bicuris hicce siphonem, si incurvatâ parte aut elevetur, aut deprimatur, semper circulum describere gestit; imò licet funiculum supernè alligatum ac non nisi versùs unicum idemque punctum rectâ sursum trahentem concipiat; nihilominus tamen in substrato hoc simili motus affixi siphonis specificè simul modificabitur in orbem, propter sui structuram & nexum cum arbore. Pari penitus ratione semicircularium costarum extremitates binæ in utroque latere sterni & spinæ, veluti siphonis crura arbori, inarticulatæ sunt, ut semicircularis earum circumferentia à musculis in Principiorum Sciagraphiâ enumeratis sursum deorsumque; ratione autem nexus cum sterni & spinæ, motum in orbem determinantis, circulariter moveri queat. Hinc quia costæ non exactè transversum cum spinâ junguntur, quin potius semicircularis earum cir-

cumferentia infra transversum seu horizontalem lineam deorsum mergatur, ac ex consequenti spinæ, perpendiculariter Terræ aquei globi plano innitenti, propinquior sit; idcirco, dum à suprâ descriptis musculis attollitur, dicta costarum recurva pars, atque ad transversam rectangulamque, (respectu spinæ animo fingendam) lineam propius accedit, & à spinâ recedit, inevitabili necessitate extrorsum magis protuberat; idque spatio majori, in medietate semicirculi costarum; paulo minori verò in punctis, costarum extremitatibus, sive sterni & spinæ, propioribus. Adeoque costæ in inspiratione sursum extrorsum moventur, partim, idque primariò, musculorum Inspirationi destinatum motu cogente; partim verò, idque ex accidenti, ipsarum costarum structura, situ, ac nexu cum spinâ & sterni, necessitante. Si itaque Autores, de musculis costas extrorsum trahentibus loquentes, rem ita intelligant, ut ex accidenti extrorsum, propriè autem sursum, (seu, ut sæpius antedictum, accuratius loquendo, in orbem) costæ moveantur, tolerari possunt. Sin verò velint, costas per se extrorsum abduci, (quorum in diversis locis inclinare videtur Bartholinus & alii) errant. Costas enim propriè nec abduci nec adduci posse, cuilibet facillimè patebit, firmum earum cum sterni nexum intuenti.

§. 6. Dicta hæc de thoracis Structura ac Motu observandum insimul suggerunt, præter explicatum in præcedentibus costarum motum sursum extrorsum fientem, necessariò consimili lege itidem moveri partes costis affixas, quarum structura atque connexio cum costis, mixto harum motui, non tantum per se, sed & vicinarum partium respectu, convenientissima atque ad id sapientissimo naturæ Autoris consilio coaptata. Hæc proinde partes costarum motui, tanquam efficienti causæ, obsequium præstantes ac præstare valentes sunt duplicis generis: Aliarum enim motus ad Respirationem necessarius est eandemque juvat; quales sunt Sternum, cum claviculis, Musculisque intercostalibus atque subclaviis & Diaphragma; de quo infra plenius. Aliarum non ita necessariò requiritur; ceu sunt Scapulæ, quatenus à costis simul attolluntur; & abdominis viscera atque contenta ab iisdem motis diaphragmatis inventu, propulsa, de quibus *αὐτοψία* frequentè examine in proprio erectoque corpore, ac pedibus insistente, factò, firmata dictitat, eadem in Inspiratione naturali ac liberâ supra umbilicum vix ad digiti auricularis transversum crassitiem antrorsum protuberare, expirandoque rursus sublidere. In extremâ autem, quæ fieri potest, digitum auricular-

rem transversum extumescendo vix transgredi, de quo paulò post, ubi Diaphragmatis structuram & Motum dilucidamus. Sterni itaque ac clavicularum motum, æque ac costarum, sursum-extrorsum Inspirando; ac contra deorsum-introrsum Exspirando fieri, sensuum sedulò observantium testimonio liquet.

## CAPUT IV.

*Intricatam Musculorum  
Thoracem in Respiratione moventium  
Doctrinam sedulò perquirat-  
que elucidat.*

## §. I.

**H**Actenus de Costarum ac Sterni potissimum structurâ, situ, connexione ac motu; nunc congruum sibi locum in ordine, vindicare videbitur Musculorum, præter Diaphragma, ad Respirationem, tum moderatam, tum auctam, facientium, inque Principiorum Sciagraphiâ nostrâ nominatenus duntaxat memoratorum, plenior explicatio, munerisque eorum fundata assertio. Ubi tanta sese primo statim intuitu offert Auctorum adversâ fronte pugnantium diversitas, ut, cui tutò assentiaris vix reperiās. Diligentissimus Mayowius *Tr. suorum Part. I. p. 283.* vult, costarum sublationem fieri à solis musculis intercostalibus utrisque, inque officio conspirantibus. Schwammerdamius verò *Tr. de Respir. c. 2.* in Inspiratione Subclavium, intercostales exteriores, costarum Levatores, & Sacrolumbum; in Expiratione contra intercostales interiores, triangularem, ac itidem sacro-lumbum, ut & Abdominis Musculos, præprimis Obliquum descendentem, agere dicit. Alii alios addunt, ac prædictorum aliquos omittunt. Sed cum non tam probent quam dicant Auctores, nec mihi, nec aliis forsitan, satisfaciunt. Enim verò cessarunt hoc die Oracula, dudumque excusserunt brutum illud simpliciter assentiendi jugum ingenia liberè veritatem perscrutantia: idcirco & nostram de Musculis Respiratoriis sententiam, rationibus inductivis munitam, candidis ingeniis exponere, nulla ad aliorum Autoritates factâ reflexione, haud verebimur; de Diaphragmate quidem capite sequenti; de reliquis autem hoc in loco.

§. 2. Sed ne *apud idos* procedamus, Axiomata quædam huc spectantia, & per se, attento animo rem perpendentibus, indubitata veritatis futura, præmittere, consultum duximus; quorum primum erit: omnem musculum agere sui contractione, ex interno principio ortâ, hinc & intumescentiâ duriusculâ, cæque, tum actioni tum corpori

suo, proportionatâ. Secundum sit: omnem musculum, partibus tum structurâ, tum loco, tum mobilitate respectiva differentibus, utrinque affixum, trahere versus partem immobiliorem; sive id fiat immediatè; quale quid sit v. gr. in Musculis Abdominis rectis, imò plerisque totius corporis musculis, rectâ versus terminum fixiorem moventibus; sive mediante corpore quodam interposito, tractum prius aliorum determinante, licet tandem nihilominus, si tractio continuaretur, pars mota perveniret ad partem, cui musculus est affixus. Exemplum subministrat Musculus Trochlearis oculi. Is enim licet versus partem trahat, à quâ oritur; attamen non trahit immediatè versus terminum partis istius; sed potius versus terminum Trochleæ, quam pertransit tendine suo; sicque eventualiter saltem, si tractio continuari posset, ocululus pertingeret ad ortum Musculi istius, non verò immediatè.

§. 3. Binis hisce Axiomatibus subjungo Postulata totidem, tum Rationi, tum principiis Anatomicis optimè quadrantia. Primum sit: Musculos, licet parti movendæ non immediatè insertos, posse eandem nihilominus movere mediantibus aliis, quibus immediatè affixi sunt, partibus, si nulla adfuerint impedimenta. Secundum sit: Musculorum Actionem immediatè sensus non ferientem, posse tutò investigari atque concludi ex partium, quibus affiguntur, structurâ, situ, motu, &c.

§. 4. Huncce præmissum Quaternarium ad substratam de Musculis Respirationis primariis materiam sic applico: Primò, cum sensuum evidentiâ constet, Thoracem respirandi actu, primarioque sursum ac deorsum moveri, ejusque respectu spinam integram cum ossæ sacro, Os Ilium, Pubisque esse partes fixiores, omnemque denique motum in corpore organicum fieri à musculis: hinc sequitur, vigore posterioris Axiomatis, ac Postulati utriusque omnes Dorso & Abdominis Musculos, alterâ sui extremitate partibus dictis, alterâ verò Thoraci, aut immediatè, aut mediantibus aliis partibus ad id idoneis affixos, eundem versus Partes istas minus mobiles aut movere semper, aut urgente necessitate movere posse. Cum autem porrò, tum propriâ observatione, tum Virorum in Anatomica Arte facilè Principum, Julii Casserii, Placentini puta, Veslingii, Bartholini, Diemerbroecii, aliorumque consentaneâ relatione, sensuali experientia innixâ, pariter liquidum sit, Musculos, in Principiorum Respirationis Sciagraphia, sub efficienter hanc functionem causantium titulo descriptos, esse (Diaphragmate excepto) alterâ sui extremitate dictis



Etis partibus immobilioribus, altera verò Thoracis compagi, vel immediatè, vel mediatè affixos: Ergo concludo, eosdem pectus in Respiratione, vel sursum, vel deorsum, partim movere, partim, & quidem auctâ Inspirandi Exspirandique necessitate, movere posse. Notet autem B. L. me hic saltem de motu sursum deorsumvè fiente loqui, hic enim motus proximè & primariò à solis musculis dependet. Nam quod Thorax in Inspiratione, præter motum sursum, simul etiam extrorsum: in Expiratione verò, præter motum deorsum, simul & introrsum, moveatur, id Musculis per accidens solummodo ac secundariò imputandum, quippe quod propriè ab ipsâ costarum structurâ mechanicâ, situ, & connexionione provenit, uti ex superioribus liquet.

§. 5. Immediatè itaque Thoracem pro Inspiratione elevant Musculi Serrati Postici superiores & inferiores, Levatores costarum Stenonis & Cervicales descendentes Diemmerbroccii. Oriuntur enim omnes à vertebri, respectu costarum sustollendarum superiori loco sitis, & descendunt in costas singulas, hisque tendinibus suis inferuntur, unde non possunt non costas partesque ad unitas sursum trahere. Mediantibus autem Scapulis, ad tollendum, pro Inspiratione intensiori, Thoracem, Musculos Levatores seu Patientiæ & Rhomboidæos operam suam conferre posse, probabile est, quia oriuntur à colli & superioribus dorso vertebri, ac paulisper descendendo Scapulis, Dorso affixis, inferuntur. Accedit, quod in Asthmaticis & moribundis extremo conatu spiritum haurire adnitentibus Scapulæ quàm maximè eleventur. Quod ipsum etiam in sanis alta suspiria ducentibus, nec non in patibuli candidatis, Aëra jamjam ultimato reddendum trahentibus, observare licet. In Expiratione autem, eaque naturali ac moderatâ, unicum saltem Musculorum par, scientissimo Naturæ Autoris consilio, agit; Sacrolumbi videlicet, ab Ossè Sacro & lumborum spinis, eodem cum dorso longissimo musculo Principio exorti, ascendendo autem ab illo deflectentes & singulis costis pinnis suis inferri. Nec enim opus erat ad liberam hanc Expirationem pluribus musculis, cum ex indole rerum naturalium gravia cuncta, qualis etiam est tota Thoracis sublata moles cum omnibus partibus annexis, vel spontè deorsum relabantur. Industrius interim Schwammerdamium miror, quomodo tantoperè labi, ac contra Anatomicorum Principia non tantum, sed & sanam rationem sensuum testimonio fulcitam tam insigniter impingere potuerit; Musculo sacrolumbo contrarias prorsus actiones assignando: Scilicet tam Inspi-

rando thoracem elevare, quàm Exspirando deprimere ac coarctare; cum ἀδύνατον prorsus sit, quod unus idemque numero musculus immutatis situ, nexu, contractionisque modo, diversas planè ac oppositas actiones celebrari possit, scilicet nunc sursum, nunc deorsum trahendò. In auctâ denique quacunque Expiratione Musculi Abdominis reſſiatque obliqui concurrunt, utpote ab Ossè Pubis & Ilio, vertebriſque lumborum oriundi, ac parti Thoracis inferiori affixi: quorum Actio insuper & ipso sensu accuratè scrutanti nota dest.

§. 6. Intercostales tum internos tum externos quod attinet musculos, novi equidem, illos omnium ferè Autorum Anatomicorum pariter ac Medicorum, unanimi consensu, costas attollere inferioresque superioribus adducere debere. Nam (uti quidem vult Mayowius) superiores costæ magis fixæ sunt inferioribus. In diversas quidem hac etiam in parte abeunt opiniones, Alii enim externos ad Inspirationem, nullos verò eorum ad Expirationem facere contendunt, quibus Diemmerbroccius contrarius. Quæ cuncta tamen cum non tantum ab illis non probentur, sed nec ullâ probabilitate gaudeant, simpliciter nego; I. Quia respirando nullam in illis contractionem sentio, quod utique vi prioris nostri Axiomatis fieri deberet: II. Quia costæ neque inferiores, neque superiores, sibi invicem, neque his illæ adducuntur, ita, ut spatium inter ipsas immineatur Inspirando; Exspirando autem rursus ad pristinam distantiam redeant, quod itidem necessariò ad sensum mihi multoties experi-  
enti patere debuisset, præsertim in corpore, quale mihi concessit natura, neutiquam obeso: III. Quia costæ omnes ab aliis modò enarratis Musculis moventur, idque simul, eodemque tum temporis puncto, tum mobilitatis gradu: Intercostales itaque nec non subelavios musculos costis, parietum instar, ad complenda interstitia intercostalia, pectusque integrandum, ac costas connectendas, intertextos esse, probabiliter concludo, quo munere Triangulares etiam, cum pro intercostalium portionibus cum Marchetto haberi queant, fungi, rationi consentaneum est.

## CAPUT V.

### *Genuium Diaphragmatis in Respiratione Motum, huiusque Causas penitus discussas exhibet.*

#### §. 1.

Postquam itaque Thoracis structuram atque motum, huncque efficientes Musculos

seculos respiratorios lustravimus, quidnam Diaphragma in Respiratione conferat, proximè dispiciendum sese offert. De istius proinde structurâ, situ, ac nexu cum vicinis partibus, hincque emergente motus possibilitate notandum: claudere id ipsum ab inferâ parte Thoracis cavitatem, cæteroquin apertam, non quidem situ exactè transverso, ita, ut cum spinâ per angulos rectos committatur, ac cum plano terræ horizontali lineâ parallelâ feratur; sed obliquo penitus, anguloque inferius multò obtusiori, quam est superior Thoracem versus spectans. Ab anteriori enim pectoris parte per costarum circumferentiam arctissimè adhærens, declivi ac obliquâ paulatenus lineâ descendit ad lumborum vertebra; [nisi quod in medio gibbosum quodammodò fiat versus pectoris antrum] quibus, intermediis lumborum musculis, per carnosa sua appendicula bina affigitur, sicque declivius evadit, quo magis ad posteriora approximaverit. Nec minus tum notatu, tum mentis libratione dignum est, Diaphragma in tali situ declivi, quem imprimis ratione circumferentiæ observat, insuper versus centalem suam medietatem sensim globosum, ut jam innuimus, non nihil, atque convexum esse versus superiora; hincque concavum, facie quâ spectat Abdomen; adeoque non planum æqualis superficiæ, sed in tumorem elatum, parte quâ respicit pectus; sinuosum verò, quâ Abdominis viscera tangit, referre dissepimentum atque parietem. Ab hac siquidem gibbosâ Septi transversæ structurâ, situque declivi, præcipua ejusdem in bipartito Respirationis Actu pendere phænomena, mox innotescet.

§. 2. Hicce de Diaphragmate prælibatis, inoffenso pede ad ipsius, quem in Respiratione edit, præcipuè tamen patitur Motum progredior. Ubi in primo statim limine, quod dicam Diaphragma ad Respirationem, inspirantem præprimis, magis patiendò quam agendò conferre, quos à permultis seculis huc usque tulit ætas, medicos pariter ac Philosophos offendi prævideo, qui omnes uno ore Septum transversum primariò efficientem, imò secundum plurimos, in naturaliac liberâ Respiratione per se & solum sufficientem Respirationis Musculum venerantur, unico forsân Johanne Baptista Lambzwerdio in suâ Respirationis Schwammerdammiæ Expiratione, excepto, per quem & ego, quod hac in parte quodammodo, nam non penitus in puncto de Diaphragmatis motu cum illo facio, profecerim, ingenue fateor, haud immemor Pliniani effati, benignum scilicet esse, & plenum ingenui pudoris, fateri, per quos profeceris. Rationes quidem, quas affert Lamb-

zwerdius nullatenus me movent pro exautorando Diaphragmate, Efficientisque principalis in Respirationis negotio munere privando; cum contra eos potissimùm directæ videantur, qui Thoracem à Diaphragmate primario in Respiratione moveri asserunt; cui inconsideratæ opinioni Anatomicorum ac Medicorum paucissimi (quantum quidem hætenus ex eorundem evolutione mihi constat) favere videntur, nisi quod Clariss. Bartholinus de Motu & Substantia *Pubn. sect. 4. scribat: Diaphragma musculus Thoracis primarium esse, eoque vulnerato Thoracem concidere, quo concidente Respirationem cessare.* Hinc denique concludit, in liberâ Respiratione Thoracem primariò moveri à Diaphragmate, & à Thorace pulmones. Cæterorum enim plerumque fert opinio, Diaphragma eatenus saltem primarium Respirationis musculus esse, quatenus sui, musculorum omnium ritu factâ contractione, Inspirationis tempore, Thoracis cavitatem auget; remissione verò rursus imminuit: non verò Thoracem ab illo moveri. Quamquam haud ignorem ingentes adhuc inter ipsos vigere lites, an scilicet Septum in Inspiratione, an verò, in expiratione versus Abdomen descendat; Quas tamen in subsequentiis ex nostrâ hypothese optimè dissolvi confidimus.

§. 3. Enim verò accuratam structuram, situm, ac nexum diaphragmatis atque Thoracis, à Lambzwerdio omnium exactissimè, circini evidentiâ delineata, si cum experimentis quibusdam hanc in rem facientibus liberè, ac sine præconceptæ opinionis labe perpendam, menteque sedulo volvam, non possum non audacter animi sensa ingenuis arbitris exponendo dicere: Diaphragma videri panniculum quendam nerveo-musculosum, ventrem inferiorem à medio dissepientem, Respirationis si spectes Actum, præter aliqualem contractionem propriam, præcipuè passivum, nec Musculi primariò respirantis (uti hætenus ab omnibus ferè creditum) vices gerere; moveri autem in Inspiratione partim carnosarum peripheriæ suæ fibrarum conspicuâ, & (peculiari encheiresi canem ad duas ferè horas absque convulsivo aut alio jactationis in corpore motu in vita, respiratione, & pulsu, servando) cuius à me demonstrabili contractione, abbreviatione, ac duriusculâ tensione, globositatem ipsius deorsum-antrorsum protrahendo explanationem reddente; partim verò, & quidem præprimis, eodemque momento à musculis Inspiratoriis suprâ enumeratis, costarum interventu ac ope, sursum-extrorsum in circumferentiâ, hinc & consequenter in centrali parte paulisper deorsum-antrorsum, gibbere scilicet

scilicet plus explanato; unde etiam Mediastinum, cum annexo Pericardio ac Pulmonibus aliquantilla tensione motuve tentatur, nec non Abdominis viscera (hepar præprimis, ventriculus, intestinum colon & lien) deors-antrorsum, licet vix ultra calami anterini, crassitiem, propelluntur. Ex quo immixto Diaphragmatis motu spatii Thoracis concavi capacitas necessario increfcit; sicque aëri [ ubicunque loca aliis corporibus non obsita occupare nunquam non gestiendi] copiam facit, pulmonum diductilia ac sinuosa membranacea antra subeundi eisdemque obsequio promptissimos explicandi & expandendi. In Expiratione è converso, costis, ob remittentes musculos, deors-introrsum tendentibus nec non Diaphragmatis fibris à tensione contractioneque cessantibus, illius itidem circumferentia rursus deors-introrsum; centrum verò ejusdem sursum ad pristinam globosamque convexitatem, simulque retrorsum, partim à Mediastino è paucillâ tensione sese restituyente; partim à visceribus Abdominis relabentibus promotum, tendit; adeoque in totius Respirationis serie, præter modicam contractionem, præcipue raptum costarum pressuramque Abdominis viscerum patiando confert, iisque partibus obsequium præstat; nec ullatenus, ut multi, iique non infimæ notæ Autores volunt, immoto Thorace, solum respirare potest.

§. 4. Nec obstat tantorum virorum aliter sentientium ac Diaphragmati in Respirationis officio primas deferentium tantus numerus, tantaque autoritas, quippe qui, ut cum Seneca loquar *nulli eorum me mancipavi, nullius nomen fero; multum sanè, (fateor) magnorum virorum iudiciis tribuo, aliquid tamen & meo vendico.* Imò ipse Galenus, scriptor post Hippocratem in Medicina vetustissimus, maximæque apud Antiquarios autoritatis, *Seç. 5. Commentar. 1. in Hippocr. de humor.* haud obscure mihi patrocinator; in Medicina, inquit, non est par, priscis [ addo ego; & Neotericis, nisi Rationum & Experientiæ illorum pondera id suadeant ] *fidem simpliciter adhibere, ut si quid illi dixerint, statim credamus, sed potius Experientiâ & Ratione, verumne illud sit, an falsum, perpendendum est: quod qui non faciunt, ne illi vehementer errant, & in errorem alios inducunt.* Rationes autem & argumenta Lambzwerdii, cum, uti dixi, non tam pro adstruendâ hac doctrinâ, quàm ad diruendam eorum opinionem, qui Thoracem à Diaphragmate moveri sustinent, militare constet; æquum erit, ut præmemoratum, de adimendo Diaphragmati in Respirationis munere primatu, ac passivâ potissimum ad-

Tom. II. Pars 2.

struendâ ejus sorte, hypothesin, ne precario hæc attulisse videamur, argumentorum robore muniamus, explicatioremque reddamus ipsi.

§. 5. Primò itaque Visu ac Tactu, tanquam Criteriorum in Philosophiâ hujusque genuina prole Medicina, certissimis, cuilibet accuratè attendenti planum sit, costas sursum extrorsum Inspirando, & contra deors-introrsum expirando moveri. Præterea motus costarum extrorsum etiam probatur experimento, quo pectus, omni Aëre efflato, fasciâ commensuratum in Inspiratione, intensiori præsertim, manifestè amplius fieri fasciâ prolongata, rursus mensurando docet; quod & præter *avroſiav* affirmat Bartholinus *de Mot. & Subst. Pulm. seç. 2.* idemque magni ingenii Vir Helmontius *Tr. Cath. Delir.* Hinc sequitur infallibiliter: quicquid costis undique per totam earum concavam circumferentiam est affixum, illud, si structura præsertim ac situs conspirent, eundem cum costis motum subire: atqui Diaphragma, per totam costarum circumferentiam, Peripheriæ suæ extrema ora, costis est firmiter annexum, & præterea, tum situs, tum structura respectu, ad parem cum costis motum subeundum, aptissimum; Ergo. Major omni exceptione erit major. Minorem probo per partes; prior liquet sensu; posterior minoris pars patet 1. quia Diaphragma est corpus sequax & diductile. 2. quia non est in planitiem extensum, sed in medio globosum ac fornicatum, unde si peripheriæ puncta extrema, præsertim anteriora & lateralia, costis sursum extrorsum movendis affixa, per istas dicto modo motas, sursum ac insimul quaquaversum à medio extrorsum abducantur & protendantur: necessario pars media globosa fit plana & aliquatenus descendit. Hinc consequenter contenta Abdominis Diaphragmati contigua non tantum deorsum, sed & simul antrorsum propelluntur, quia scilicet septum cum superficie horizontis nostri non est parallelum, sed situ declivi versus posteriora, lumborum vertebrae puta, fertur. Unde, si ex gibbositate in planitiem extenditur, necessario etiam antrorsum protuberat. Confirmatur id ipsum expirandi difficultate ob ventriculum plus æquo alimentis aggravatum, aut viscerum Abdominis præternaturales tumores, aliaque Diaphragmatis concavo anata impedimenta exoriente. Tale quid de Steatmate carnosæ Diaphragmatis parti adnato insignemque Dyspnœam creante ex Veslingii *Syntagm. Anat.* refert Charleton *Oecon. Animal. p. 159.* Insignissimus Kerkringius in egregio suo Spicilegio Anatomico *Observat. 89.* patiter recitat exemplum auctæ paulatim respirandi Difficultatis, ac denique

[ Z z z z ]

nulla



nullâ præcedente tussi, aliisve pectoralibus Symptomatis, mortem inferentis, oriundæ ex corpore cavo, crassâ tunicâ donato, Diaphragmatis concavæ faciei accreto, nec non (horrendum dictu!) quadraginta circiter aquæ insipidæ ac foetidæ uncias asservante. Præmemoratus autem Diaphragmatis inspirando deorsum-antrorsum fiens motus adeo exiguus est, ut Abdomen exinde vix ultra calami anserini crassitiem (uti supra experimento notavimus) sub Thorace protuberare conspiciatur; cuius ratio hæc est, quia Diaphragma non solum versus omnia peripheriæ suæ puncta quaquàversum à costis motis extenditur: sed & simul, in omnibus ejusdem peripheriæ punctis marginalibus, sursum ab iisdem costis sublatis, sustollitur, sicque centro ejus propter extensionem à costis motis, & propriâ quadantenus Contractione, factam, deorsum ad planitiem moto, ora ejusdem Septi marginalis, contrario motu, ab iisdem costis, præter extensionem quaquàversum extrorsum factam, simul sursum fertur, atque hac ratione centri descensum, ac per consequens abdominis protuberantiam, imminuit, exilioremque reddit. In explorando autem Abdominis, ab Inspiratione facta, tumore cautissimissimus oportet; Musculi enim Abdominis ad quemcunque corporis motum promptissimè concurrunt, agendo intumescunt, ac protuberantiam ex Inspiratione alias oriundam mentiuntur. In Expiratione postea naturali ac moderatâ viscera abdominis non propelluntur ab hujus musculis, Diaphragma sursum retrudendo; sed propriâ mole Abdominis contenta septum versus relabuntur, cum non simpliciter deorsum, sed & simul antrorsum submota fuerint, unde si gravium ritu reclinent rursus, nil mirum. In auctâ verò Expiratione quacunque, etiam in solâ loquelâ, Abdominis musculi utique concurrunt, licet non tam Abdominis contenta versus Diaphragma compellendo, illudque ulterius thoracis cavo intrudendo, quàm costas cum Sterno deorsum trahendo, sicque thoracem ac consequenter pulmones coarctando, utpote quod sensus sedulâ curâ intuentem docet. Hinc sequitur, quò magis costæ ac Sternon per musculos abdominis detrahantur os Pubis versus, eò minus Diaphragma sursum per viscera abdominis compelli posse, cum in totâ circumferentiâ costis sit affixum, ac consequenter Thoracis cavo non ultra, quàm costæ id permittunt, impelli poterit.

§. 6. Ulterius, ac quidem secundò, thesin nostram de passivo Diaphragmatis obsequio stabilire pergo, ducto à membranosis quorundam animalium Septis argumento. *Aves*, inquit Thrustonius *Diatrib. de Re-*

*spirat. p. 121. respirant ope Diaphragmatis, non quidem carnosî, sed membranosi.* Univerſus prætereà ranarum grex non nisi pellucidam pro Diaphragmate monstrat membranulam albescentem ac tenuissimam, quod vel centies repetita experimenta me docuerunt, ut plura omittam. His sanè, nisi præjudiciis captus, musculi primariò Respirationem in hisce animantibus efficientis officium assignare non poteris, quin potius veritati litando mecum concludas membranosa hæcce septa passiva solummodo moveri, cum tamen aves ranæque multo strepitu ceu Respirationis effectu, coaxantes non minus felicissimè respirent. Imo in ipsis canibus Diaphragma non admodum robustum & crassam ferè membranam carnosam saltem refert; Hæc itaque ut in homine quadantenus valeant, quid vetat.

§. 7. Tertium porrò argumentum ex Diaphragmatis totali in vivo homine absentia depromo. Cum priora duo passivum septi obsequium in functione hæc potissimum conferre monstrant, hoc tandem Primatum ipsius impugnabo, ostensurus, quod, licet septum fibrarum suarum contractoria abbreviatione quodammodò in Inspiratione, ceu digniori atque secundum excellentiam dicto Respiratu, Cavo thoracis augendo subserviat, neutiquam tamen primarii, minime autem juxta nonnullos, per se solum sufficientis seu musculi seu organi respiratorii dignitate ac titulo jure affici queat, sed potius thoraci hanc prærogativam concedere cogatur; idque hunc in modum: Si Diaphragma, vitâ nihilominus per aliquot annos superſtite, planè abesse potuit, utique non erit Respirationis, pari quippe cum vita fere passu ambulantis, primarius Musculus: sed prius est verissimum; E. & posterius. Refert namque (ut antecedens demonstrarem) ex testimonio D. de Goyer, D. Wassenæ, & duorum triumve Chirurgorum Diemmerbroccius *Anat. p. 122.* puellum quendam 7. Annos supervixisse Diaphragmate penitus destitutum. Et quamvis in vitâ asthmaticus levi de causâ frequenter validèque tussiverit, id tamen aliis conformationis vitiis ibidem recensitis meritò imputandum, nec argumento meo ullatenus officit, quin potius firmius id ipsum reddat, quia tussis omnis, multò magis valida frequensque, sit aucta plurimum atque intensior Respirationis actio, quam tamen in hoc puello absque ulla septi ope contigisse palam est. Pro Thorace denique contra Diaphragmatis primas quartò & ultimò ex ipso interno ac proximo Respirationis fine (Pulmonum liberiores Diastolen innuo) sic argumentor: Quæcunque partes suo, dum Respirando moventur ac dilatantur, ambitu ma-

tu majus capaciusque Aëri, pulmones eò tumidiùs inflandi, spatium concedunt, illæ certè majorem vehementiusque expetitam, adeoque & potiore dignioreque pro Respiratione operam opemve conferunt, quam aliæ minorem capacitatem procurantes: At qui subsumo de Thorace &c. proboque primo Majorem Consequentiarum legitimo nexu ex Cap. X. huc mutuando, quem ibidem plenius probatum dedi, nimirum; Principalissimum functionis respirantis Utum esse, ut sanguis Peridromus imperturbato itinere per pulmonum vasa procedat; id autem postulat, ut dicta pneumonica vasa succo pererranti liberè pateant; Hoc rursus requirit, ut pulmonum vesiculosa moles illa cæteroquin subsidientia sua comprimens ab Aëris expansione submoveatur: id autem ex Aëris inferius explicando asserendoque Motu aut Indole fieri nequit, nisi spatium in pectore debitum per pulmonum Diastole ab Aëre illabente causanda præsto sit: sed hoc ipsum optimè tandem, multoque meliùs, capacius, laxiùs suâ comparat Diastole Thorax, quam Diaphragma, quod vel pueri ex ambitu illius multò ampliori ipsos sensus feriente (en habes quoque secundò stabilimentum Minoris!) inhaesitanter cernere poterunt. Fusiùs itaque hucusque dicta de Diaphragmatis in Inspiratione præprimis motu, in pauca quædam notabilia ita constringo: 1. Motum Diaphragmatis non adeò magnum validumque esse, ut thoracis operà insignius quid in Respiratione naturali ac libera ad spatium pectoris valdoperè augendum conferre queat. 2. Moveri tamen sat manifestè, fierique ex globoso planius, nunquam verò penitùs explanari: 3. Motum autem hunc à duabus differentibus causis oriri, utut ad eundem scopum colliment & ille, & hæ; quarum altera est propria atque ex intrinseco Agente orta, fibrarum carnosarum à centro ejus membraneo ad musculosam peripheriam tendentium costisque circumcirca adnatarum contractio, ita ut in Systole ipsius cum thoracis pulmonumque Diastole isochronicâ fibræ hæ colligantur, indurescant, tumeant, abbrevienturque (ad auricularis transversæ circiter mensuram in cane) hic & globositatem ipsius centalem nerveam paulisper deorsum trahant, atque hoc pacto cavitati pectoris aliquale incrementum afferant; quod ad sensum, ut suprà innui, peculiari modo canem tractando, demonstrare possum, adeò ut nec querelis, quas de difficultate & obscuritate Septi motum investigandi fundunt Lambzwerdius alique, nec frustraneo, reque indecisâ permanente discessu, quem Clariss. Plempio cum fociis suis Diaphragmatis motum perscrutaturis contigisse constat,

Tom. II. Pars 2.

ullatenus opus sit: altera verò est Thorax ritu superiùs exposito amplificatus, simul Septum, propter figuram ejus, situm & nexum, diducens, ac quodammodo explanans: attamen 4. hinc haud quaquam sequi, esse Diaphragma Primarium, multò minus autem per se tantum sufficientem Respirationis Musculum, utpote quod de Thorace potius optimo jure prædicari potest ob rationes allatas: Tandem 5. sub Expirationis tempore Septum, relatis quippe fibris propriis, nec non thorace rursus constricto ad majorem globositatem pristinamque convexitatem præcordia versùs redire. Notanter autem dico Majorem; nam in Inspirationis actu neutiquam omnem, sed tantum aliqualem globositatem amittit, ac aliquatenus depressus evadit, adque planitiem accedit propiùs; nunquam verò penitùs explanatur, unde & non adeò insignem opem ad spatii pectoris concavi amplitudinem augendam contribuere potest.

§. 8. Jam denique ut insigniora quædam nobis apparenter advertantia, obstacula summoveamus, necessitas monet. Apparenter dico, cum reverà nos non feriant, sicuti circumspèctè pensitanti ex dicendis mox patebit. Primum eorum subministrat experimentum Lowerii in *Act. Philos. Anglic. Edit. Lips. p. 441. & à Thrustonio l.c.* iridem propositum. Putat enim Lowerius, probari optimè posse Diaphragma esse præcipuum respirationis organum, nervos ejus in utroque latere juxta Pericardium decurrentes dissecando, utpote à quibus motum ejus fieri supponit. Operatio autem ipsius sic se habet: Primò alterum latus aperit vulnere unius digiti longitudinem longo. Deinde immittit digitum nervumque ad vulneris os protrahendo dissecat, atque sic canem dimittit. Eundem processum etiam in altero latere servat. Hinc duos notabiles effectus sequi scribit, 1. enim in hoc cane, præsertim si illum post sectionem agitaveris, admodum anheloso, inspirando abdomen contrahitur in tenuem longitudinem; expirando verò tumescit rursus; utrumque hoc sanorum respirationi est contrarium: 2. Costæ in hoc casu solito amplius in extremam ac possibilem distantiam dilatantur. Quod fieri constet Autor ex necessitate naturæ, defectum motus Diaphragmatis, propter nervos dissecatos ingruentem, majori costarum dilatatione supplere intentis. Sed condonet mihi Vir Doctissimus, in experimentando fortassis, quàm circumspèctè concludendo felicior, si ipsi fallaciam non causæ pro causâ in præsentī negotio monstaverim; nimirum commemoratos binos effectus non agnoscere pro causâ immediata ac

[Zzzz 2]

genui-

genuinâ nervorum dissectionem, sed potius aëris per vulnera utriusque lateris irruentis in pectoris concavo præsentiam, pulmonum debitam inspirationis expansionem imminuentem. Sicuti etiam ejusmodi promptam aëris aperto pectore irruptionem notat perspicacissimi accandidi ingenii Vir Doctissimus Gassendus in *Append. de Pulsu & Respir.* commemorans, candulam à Chirurgo negligentius admotam, in vulnus thoracis ab aëre illabi conante fuisse adactum. Primum enim effectum, quod attinet, videmus in quavis intensissimâ Inspiratione Abdomen etiam in sanis, post aliquam intumesceniam liberæ Respirationi propriam, attenuari ac in tenuem longitudinem, uti loquitur Autor, contrahi. Quod autem in hoc cane fiat hujusmodi ad extremum aucta inspiratio, secundus effectus liquidò testatur, per costarum ad possibilem distantiam elevationem. Causa autem intensissimæ hujus Inspirationis non est nervorum dissectio, hincque motus Diaphragmatis privatio: sed pulmonum requisita, ab aëre, per tracheam illabente, oriundæ, insufflationis denegatio: Denegationis autem hujus causa est spatii, pro pulmonum expansione in pectore requisiti, imminutio: hujus rursus causa est aëris per vulnera, digiti longitudinem æquantia, irruptio in thoracis cavitatem. Hinc etiam in Expiratione canis abdomen tumescit, quatenus scilicet per thoracis subsidentiam aër illapsus quaquaversum, hinc & consequenter Diaphragma & Abdomen versus propellitur, atque hac ratione Diaphragmatis interventu abdominis extumesceniam suscitatur. Vulneris siquidem antea per digiti intrusionem patuli libera deinceps concidendo aërem, non pari, quâ admiserant, promptitudine, exire sinunt; quod & ex vivisectionum ἀντιψία experimentis certò sibi constare asserit ingeniosus Mayowius *Tr. suorum Part. 2. p. 87.* Cætera quæ Lowerus de eorum anhelosorum cum prædictis canibus similitudine addit, propriè huc non spectant, cum ipsè ibidem fateatur, occurrere in ejusmodi equorum asthmaticorum pulmonibus manifesta vitia.

§. 9. Alterum obstaculum suppeditare videtur Pecqueti experimentum à Bartholino *p. 341. in Anatomia Nova* adductum. Omnibus nimirum thoracis & abdominis musculis penitus abscissis, exceptis intercostalibus & Diaphragmate, animal nihilominus respirare. Sed vellem Pecquetus specialius commemorasset, Thoracis, quos absciderit musculos, quippe in quorum numero non omnes conveniunt. Imò non obstante musculorum thoracis dissectione, animal optimè respirare poterit, modò (uti ex suprâ diductis liquet) serrati Postici superiores &

inferiores, Levatores costarum Stenonis & cervicales descendentes Diemerbroccii fuerint salvi; hi enim propriè & efficienter præcipuam respirationis partem, Inspirationem puta, absolvunt, costasque sursum extrorsum ducendo thoracem distendunt. Hæc pro enervandis, quæ ex Loweri ac Pecqueti experimentis necesse quis posset, conclusionibus.

§. 10. Dixi porrò superius, ubi, quas ex mente nostra in Respiratione Diaphragma habeat partes, explicui, Mediastinum, hinc & partes annexas, inspirando aliquantillâ tensione affici atque moveri. Quod pariter, ne gratis dixisse videar, experienciâ probo: Sublato nimirum Sterno, per cartilaginum dissectionem, videbis, motu Diaphragmatis simul tendi atque moveri Mediastinum cum adhærente Pericardio & pulmonibus; qui quidem pulmonum motus multis Viris doctis suppeditavit hætenus argumentum, infirmum equidem, pro demonstranda pulmonum in Respiratione activitate, cum tamen in hoc casu pulmones neutiquam Expansionis & coarctationis Motum Respiratorium subeant; sed solummodò Mediastini adminiculo à Diaphragmate & costis per musculos respiratorios moveantur sursum caput versus ac deorsum, idque motu nullius ferè, respectu alterius illius momenti; imò planè contrario alteri. Hic enim amplificato pectore attenuantur pulmones à tensione Mediastino & Diaphragmate mediantibus facta, & vice versâ. In alterò verò & ordinario Inspirationis motu, amplificato Thorace simul etiam expanduntur pulmones, & contrà, quamvis Thoracis dilatationem nullatenus pro immediata pulmonum expansionis causâ agnoscam, veluti infrâ contra Clariss. Dn. Bartholinum & Sylvium firmissimè demonstrabo. Accedunt experimenta hæc parallela ex Bartholino *Anat. Reform. p. 284.* & Charleto *Oecon. Animal. p. 158.* Hic enim, *pulmones*, inquit, *diu & validè moventur, aperto Thorace, modò (arrige aures) Mediastinum à Diaphragmate non fuerit separatum.*

## CAPUT VI.

### *Pulmonis Structuram atque Motum in Respiratione perscrutatur.*

#### §. 1.

Dictis proinde nec non probatis de Diaphragmate, cæterisque ab internis principiis respirando motis, quæ dicenda atque probanda nobis incumbabant, rectà ad irretitam Pulmonum tam substantiam quam motum progredimur. Et primò quidem substantiam eorum ex accuratiori Neotericorum sensu



sensu describemus. Notandum itaque sese offert, Pulmonum texturam, non, uti vulgò hætenus Medicorum atque Anatomicorum trita tulit sententia, carneam; sed præter vasâ sanguiflua & asperâ arteriæ tubulos penitus vesiculosam esse. Quod ipsum ex vetustissimi Coi monumentis doctè eruere studet Clariss. Bartholinus *Tr. de Pulm. Subst. & motu*. Hippocrates sanè divino ingenio Vir, & Adeptorum, judicante magno illo ex Igne Philosopho Helmontio, particeps, pleraque quasi per nebulam divinando vidisse, ac ruditer adumbrasse videtur, quæ scientiarum ferax hoc seculum ipsis sensibus palpanda sistit, ac in lucem protrahit. Scribit enim *Libr. de Principiis seu Carnibus text. 9. Version. & Edit. Linden. Cor ex humido, quod glutinosissimum erat, calefaciens citò exsiccat veluti spumam, fecitque antrosum, & venulas multas in ipso*. Quibus verbis tria tantum nominantur à venerando Sene Pulmonum Molem constituentia: Spuma scilicet, antra & venulæ, prætereaque nihil, nec non aliud parenchyma proprium carneumve. Pariter & post Coum notavit Cornelius ab Hogeland. *Oecon. Animal. p. 66. pulmonum parenchyma ex tenuissimis pelliculis, parvas cavitates (quas poros nominari posse censet) efformantibus, constare*. Hisce consona ferè sunt Plinii verba dicentis *Lib. 2. c. 37. Pulmo spongiosus inanibus carnis est*. Sed cuncta multò clariùs ex ipso naturæ fonte per experimenta sensu visus armato peracta hausit celeberrimus Malpighius. Is enim in binis suis ad Johannem Alphonsum Borellum datis, ac à Bartholino editis Epistolis notat: Universam Pulmonum molem vasis excurrentibus appensam, non carneam, sed aggregatum quid esse, ex levissimis & tenuissimis membranulis, quæ extensa & statu sinuata infinitas pene vesiculas orbiculares & sinuosas efformant, veluti in apum favis alveolos ab extensa in parietes cera conspiciamus; Hæ talem habent situm & connexionem, ut ex tracheâ in ipsas, mox ex una in alteram, patens sit aditus, & tandem desinant in continentem investientemque membranam: Quæ vesiculæ, sanguine ex vasis per aquam immissam elato, subalbida & ferè diaphanæ apparent; adeò, ut trachea, interior præsertim tunica, sensim in orbiculares has vesiculas cellulasque efformari ac terminari videatur: Ex vasis autem utriusque, arteriæ scilicet & venæ pulmonalis, exilissimis propaginibus annulatim & tortuosè immixtis ac confusè pertextis efformari quasi Rete quoddam mirabile undiquaque extensum, singulasque extuberantes vesiculas vinciens ac colligans, per quod, tanquam per vasorum Synanastomosis, sanguis

tenuissimis rivulis fertur, neutiquam verò extravasatur: adeoque Rete illud non esse nerveum; sed ipsa vasâ sanguifera.

§. 2. Hæc ex Malpighii utraque Epistola studiosiùs sic collecta volui, quò exinde notanter constaret 1. Pulmonum Molem esse substantiam promptissimè diductilem, rursusque plicabilem: 2. vesiculosas eorum cellulas esse ad recipiendum fluidum aliquod corpus sui extensione, mutuâque communicatione aptissimas: 3. Nullas fibras musculosas, multò minùs rubicundam musculorum compagem (sunt enim vesiculæ albidæ & ferè diaphanæ) in ipsis reperiri: 4. Fluidum illos intrans corpus non aliorsum, quam immediatè ex tracheâ in Pulmonum membranacea antra primariò labi; cùm hæc propagata quasi sint trachea: 5. Sanguinem licet non extravasetur, nihilominùs per subtilissimum vasorum Rete, ad omnes quippe vesiculas attextum, sua transpirare effluvia aquea cum expirato aère in conspectum venientia: 6. Rete illud non esse nerveum, multò minus fibrosum, sed ipsorum vasorum sanguifluorum mirabilem texturam. Imò licet Rete illud non tam vasorum Synanastomosis, quàm ex filamentis nerveis exilissimis contextum credatur; attamen nec Inspirationi nec Expirationi conferre deprehenditur. Non Inspirationi; Constrictio enim illius pulmonum dilatationi penitus obesset; Non Expirationi; cani quippe si celeri manu sternum auferas, tracheam à Larynge dissecas, à musculis & cute separes, pulmones infles, ac illicò tracheam vinculo arctissimè constringas, ne unicum quidem in pulmonum superficie contractionis constrictionisque conatum ullumve vestigium attentis licet oculis observare poteris, quin potiùs pulmones æquè ac ipse thorax in continuâ diastole, donec vinculum laxaveris, persistant, qui tamen levi digito aliquantum facillimè comprimi possunt, quod & à nervei Reticuli, si qua foret, constrictione, saltem inchoative fieri deberet. Omnibus his probè notatis, cum inspirando sensuum adminiculo doceamur, fluidam illam, quam aëra vocamus, nobis circumfusam Atmosphæram manifestè per os narevè (quoniam acta motore posthæc investigabimus) in Pulmonum cavernulas irruere; sequitur, eandem non posse non vesiculosam Pulmonum compagem dilatare ac in omnes cellularum recessus (inter se quippe communicantium) sese insinuare, sicque auctum illud pectoris spatium inspirando procreatum, mediantibus Pulmonibus occupare. Præter os naresque etiam, urgente necessitate, per aures, ductus à Tulpio *Observ. 35.* annotatos atque in os patulos trajiciendo, aër ingredi potest.

test. Forſan hūc reſpexit Alcmaeon Crotoniates, qui, teſte Ariſtotele, caproſauribus ſpirare docuit. Aërem autem ſub inſpiratione illabentem Pulmones expandere ſic probo: 1. quia alius locus non datur, quò ſe recipiat: 2. corporum autem penetratio ex naturæ legibus eſt impoſſibilis: 3. quia præterea nulla adeſt aërem condenſandi, ac in ſe, ad minus ſpatium occupandum, cogendi cauſa efficiens: 4. quia experimentum, quo, pectore ſub dilatatione aëriſque ingreſſu pertuſo, pulmones etiam per vulneris hiatus erumpere tentant, idem probat. Mane itaque ratum, aërem, cum pectore ad inſpirandum dilatato, pulmones ingredia-tur, ipſos neceſſario Thoracis concavitati coëxtendere. Exſpirando autem, cum pectoris ſpatium non nili ab eodem ſeſe rurius deorſ-introrſum coarctante imminuatur; neceſſariò etiam aër ex pulmonibus complicabilibus ab eodem thorace ſimul exprimitur.

§. 3. Hæc omnia, cuicumque tūm veterum, tum modernorum, tam inutiles de Pulmonum Motu rixas agitantium, facillimè conſtare potuiſſent. Nec video, quonam argumento negligentiam atque hinc ortam ſupra hac re diſcordiam veriſimiliter tueri valeant. Si quæſtio foret; quam ob cauſam Aër inſpirando Pulmones ingredia-tur? forſitam patrociniū aliquod, licet infirmum, quærere poſſent, dicendo: deſuiſſe ſibi tam clara de Aëris Natura & Motu experimenta, quibus Nobiliſſimus ac æternâ nominis memoriâ digniſſimus Vir Otto de Gœricken, florentiſſimæ Magdeburgenſ. Reipublicæ Ampliſſimus Conſul, huiusque veſtigia legens ille naturæ Atlas, illuſtriſſimus Boyleus, nec non ingenioſiſſimus Sinclarius orbem literatum hætenus bearunt. Jam verò, cum ſenſu convincantur, imò ipſimet fateantur, 1. Thoracem inſpirando fieri ampliorem: 2. aërem (quocunque demum motore, perinde hic eſt) inſpirando, tracheam & pulmones ingredi: 3. Pulmones eſſe molles flexilesque, muſculolis fibris ceu propriæ explicationis organis deſtitutos, ſed potiùs tum expansioni tum conſtrictioni patiendæ aptiſſimos: ac denique 4. expandi ſub Inſpiratione; idcirco miror ſanè tanta ingenia ex his præmiſſis talem concluſionem non eliciuiſſe: Ergò neceſſariò aër irruens (à quacunque etiam potentia moveatur) ſequaces pulmones expandit. Hoc enim ſi feciſſent, ulterius negotium hoc rimantia ingenia fortaiſſis ad miram ipſius aëris Naturam Motumque (de quorum exactiori Cognitione meritò ovant, æternasque præmemoratis pereximiis Philoſophis neſcunt laudes cuncti huius ſeculi veritatis Sectatores) per-

veniſſent. Sed imaginaria, quam poſtea perſtringemus, famoſaque illa Vacui Fuga unicè in cauſa fuit, quò minùs Aërem pro efficienter expandente pulmones principio agnoverit. Huius enim Vacui Fugæ ergo Pulmones Thoraci coexpandi maluerunt, quos deinceps tanquam dilatatiores præexiſtentes Aër ingrederetur, quam hunc pro dilatante ipſorum cauſa venerari. Naturam enim non tam è Natura, ut cum Doctiſſimo Morhoſio Orat. de Studior. Intemperant. loquar, quàm è cerebri ſui anguſtiis depromptam ſaſtidioſis Commentariis magis intricarunt, quàm explicuerunt. Unde & tanta inter ipſos nata ſunt diſſidia, tantaque opinionum farrago, ut ingenuis, & ſolidam doctrinam, non verò putatitia Autorum figmenta avidè ſitientibus, naſeam penitùs pariant, cum tamen veritas ſit una ac ſimpliſſima.

§. 4. Hinc alii voluerunt, Pulmones ex ſe propriâque vi moveri. Inter quos Ariſtoteles, Averhoes, Sennertus, Horſtius, Platerus, Burſerus, Riolanus, &c. Williſius ait, *Pulmones primos motuum inſtinctus accipere per nervos, quibus tūm Diaphragma & motus thoracis ſuccurrit.* Lambzwerdus tantâ inconstantia ac incertitudine, ex matre ignorantia oriundis, circumvagatur, ut recensitu indigna videatur ejus ſententia. Sed his omnibus oppono 1. Pulmones thoracis integritate quocunque loco ſublata, ſtatim ſubſidere, nec amplius expandi aut coarctari, uti in Reſpirationis actibus contingit. Quod præter *ἀντοψία* experti ſunt Highmorus *Diſquiſit. Anat.* Galenus *Fragm. de Thorac. Motu*, Bartholinus *Anat. novâ*, Deuſingius *de Reſpir. & Sylvius Diſp. Med. 7.* Videantur etiam hūc Theſes noſtræ de Diaphragmate: 2. Pulmones fibris & muſculis proſus carere, à quibus tamen omnis in corpore motus organicus dependet. Imò etiamſi fibris eſſent donati, uti pluribus viſum eſt, ab iis tamen tantum abeſt, ut expandi poſſent, ut potiùs contrario motu conſtringerentur, uti id ipſum Veſicæ, Ventriculo, Intestiſtis &c. contingere obſervamus. Nec valet nervos Pulmoni datos objeciſſe; cum nec Lien in motus gratiam datos eſſe tam copioſos arbitrandum; nec demonſtratum ſit hætenus, nervos nulli, niſi aut ſentiendi, aut movendi officio, eſſe deſtinatos; nec adeò multi Pulmonibus conceſſi ſunt nervi: 3. Nic. Fontanum *L. I. Reſp. & Curat. Medic. pag. 55.* (quem citant Bartholinus *de Pulmon. Motu & Subſt. atque illuſtriſſimus Boyleus de Vi Aëris Elastiçæ pag. m. 423.*) teſtari, puerum quatuor annorum vice pulmonum membranoſam quandam veſicam oſtendiſſe, quæ aëre reple-

repleta, & minutioribus vasis referta, ab ipsâ Aspera Arteria originem duxit. Huc quadrant exempla, de vesiculis pulmonum, aut pure stagnantibus, aut ore rejectis, à Zacuto, Foresto, Schenckio, aliisque annotata:

4. Animalia pellucidas vesiculas pro pulmonibus habentia, uti sunt Ranae & serpentes: De his quippe M. Aur. Severinus *Zootom.*

*Part. 2. c. 1.* prodidit, quod Pulmonum loco fistulosas vesiculas oblongas, & sacculi ad instar fenestellis & complexibus distinctas gerant. Quæ cuncta pulmones non ex se, propriâque efficientiâ, sed passivè tantum in Respiratione moveri clarè commonstrant. Quid autem Clarissimus Willisius per metaphoricos motuum primos instinctus per nervos allatos sibi velit, me liquidò non capere, ingenuè fateor. Si forsân Spiritus, uti videtur, intelligit, eos pro motu hic non advehi exindè patet, quia nec Spiritus vecti, neque vectores eorum, nervi puta, unquam in corpore motum organicum tanquam proxima instrumenta causantur, nisi musculorum aut fibrarum musculosarum interventu: quorum tamen utroque pulmones destitutum oculus inermis, tum armatus oculati Malpighii visus certò edocent. Vesicæ igitur ex se otiosæ & solo Aeris illapsu explicabili vesiculosæ pulmonum cellulae optimo jure assimilantur.

§. 5. Alii concedunt, Pulmones moveri à corde. Inter quos Hoffmannus, Cæsalpinus; Maurocordatus, Dunus, aliique. Quibus oppono 1. Pulmonem & cordis motus non esse Isochronicos, imò ne quidem synchronicos: 2. Columbi experimentum, quò canem corde exsecto vulnereque obligato, currere, latrare, adeoque & respirare monstrat, refer. Bartholino de Pulm. subst. & motu. Imò & eodem notante *Anat. Reform. pag. 232.* Galenus victimas refert ad aras corde exsecto clamasse; & Magnus Baconus Verulamius hominem, postquam cor esset avulsum & in carnificis manu, tria aut quatuor precum verba pronunciasse, testatur: 3. Insectum confertissimo impulsu liquorem in Arter. Pulmonalem Pulmones expansione Inspirationi propriâ neutiquam dilatare, quod ipsemet expertus scribo: 4. Morientes pulsu ferè penitus extincto Respirationem nihilominus celebrantes. Quod notat Gaspar de Los Reies *Elys. Camp. Quæst. 32.* Et ipse non ita diu in magno quodam attentè observavi Theologo, coque, uti per totam officii annosam seriem, ita inprimis hæc mortis horâ verè Theologo. Tàm sonorâ quippe ac lætabundâ voce cantuque permagna, quæ intra Animæ suæ penetralia Divinus peragebat Spiritus, opera decantabat, tamque indicibiles cœlestis gaudii præ gustus

ore ac gestu promebat, ut nullus eosdem tantâ, quâ spectabantur, vivacitate, calamus depingere valeat. Interim tamen forti, quem dixi, cantu ac voce nullatenus obstante, per integrum ferè, mortem proximè antecurrens, semihorium vix pulsus ac ne vix quidem attentissimè mihi sapius exploranti sese offerebat: 5. Quia cor, quantum sanguine à se impulsio distendit, tantum & repleat, adeoque, si motus pulmonum inde oriretur, nullus aëri ingredienti daretur locus; quem tamen inspirando manifestè irruere notamus: Experimentiâ tum propriâ tum Clariss. Lugduno-Batavor. Professoris Sylvii demonstrari, Thorace aperto, etiamsi cordis adhuc aliquamdiu haud interruptus persistat motus, sanguinisque propulsio, pulmones tamen haud quaquam expandi ac dilatari, *Disp. Med. 7.* Adeoque & dictorum vigore cordi adimitur causæ efficienter pulmones respirando expandentis dignitas.

§. 6. Tandem & alii à motu thoracis, quod pulmonum dependeat explicatio, arbitrantur. Quorum quidam hanc ob causam id fieri asserunt, ne thorace dilatato in ejus cavitate oriatur Vacuum, terribile istud, uti vulgo opinantur, & à quo tantoperè Naturam abhorreere sibi firmiter persuaserunt, monstrum. Ex horum censu sunt, Galenus, Laurentius, Plempius, Mercatus, Highmorus, Sebizius, Bartholinus, multique alii, plus asseclarum numero cœtu, quàm rerum ac rationum pondere stipati; imò tota ferè Circumambulonum caterva. Sed hisce postea simul satisfiat, ubi Vacuum ejusque Fugam disquirendi, quantum quidem Theorematum nostrorum exiget necessitas, dabitur locus.

§. 7. Alio præterea modo à thoracis motu pulmonum expansionem dependere volunt alii, scilicet à thoracis & Diaphragmatis motorum integritate. Hæc opinione omnium primus Respirationis negotium accumulasse videtur prænominatus in Academia Lugduno-Batavâ Professor Celeberrimus ac meritis Fr. Sylvius. Is enim, postquam *Disp. Med. 7. Th. 33.* concluserat, pulmones ab aëre ipsos subeunte non expandi, rationem hanc afferendo *thes. 32.* quia scilicet læso thorace aut Diaphragmate, licet aëri per nares & fauces in asperam arteriam ingressus pateat, attamen pulmones non observantur expandi explicarique tandem *thes. 40.* sic argumentatur: *Quo posito ponitur, & sublato tollitur aliquis effectus, id omnino habendum pro efficiente illius effectus causâ; Atqui posita motorum thoracis & Diaphragmatis secundum sui continuitatem integritate ponitur pulmonum expansio; sublata verò eadem illorum motorum per-*



*patulum vulnus integritate, tollitur cessatque pulmonum expansio: Ergo thoracis & Diaphragmatis motorum secundum sui continuitatem integritas pro efficiente causa expansionis pulmonum est habenda.* Sed mitius ferant, obsecro beatos præclari istius Viri manes, ejusdemque vitali adhuc Aurâ vescentes Tutores, si illum alteram de Aëre pulmones non expandente opinionem, non tantum non destruxisse; sed nec suam de thoracis ac Diaphragmatis motorum integritate sat firmiter asseruisse palam fecero. Primam, quam negat, quod attinet, *thes.* 32. & 33. propositam, notandum, plus esse in ejus conclusione, quam erat in præmissis. Sic enim ratiocinatur: Aëris, apertâ thoracis cavitate, in asperam arteriam ingressu patente, pulmones non expanduntur: Ergo nec ab eodem, ipsos in Respiratione naturali subeunte, salvâ thoracis cavitate expanduntur. Sed paucis respondeo, non valere Consequentiam à statu hoc præternaturali, in quo thorax est apertus, ad naturalem, in quo arctè est conclusus. Hic enim aëri solus pulmo duntaxat est attollendus; ibi verò si pulmonem expandere deberet, tota insimul vastissimi ponderis Atmosphæra pulmones circumstans ipsi quaquaversum esset loco dimovenda, quod ipsimet per se est impossibile, cum nullum principium qua tale in ipsum agere queat. Sic nec aër, pulmones si subiret, thorace aperto, se ipsum intermediis pulmonibus potest movere. Imò ipse Autor *thes.* 24. fatetur, Pulmones, simul ac aëri liber in thoracis cavitatem datur introitus, confestim subsidere, nec amplius, nisi vulnere obturato, explicari. Unde patet, non sublatam pectoris integritatem, sed aërem irrudentem per vulnus esse proximam concidentiam pulmonum causam; Quem proinde si idem aër pulmones subintrans horum interventu non dimoveat, hosque expandat, neutiquam concludendum, uti fecit Autor, Ergo nec pulmones, quâ tales, aër in naturali Inspiratione subiens expandit. Nam ut aër constituatur efficiens expansionis pulmonum causa, nihil magis requiritur, quam ut illos solos, remotis impedimentis circumstantibus, explicare ac sustollere valeat, utpote quod promunere ac titulo isto ipsi assignando sufficit: non verò in hoc casu ab ipso exigipotest, ut pulmones expansurus simul vastam eos undique circumstantem atmosphæra molem dimoveat. Satiùs proinde fuisset, si Clarissimus Autor potius in causam inquisivisset, cur aperto pectore aër non intret pulmones, quàm cur pulmones in hoc statu non expandantur, câ enim detectâ pulmonum expansio facillimè explicari potest; præsertim cum ipsemet fateatur *Zb.* 25. pulmones per tubu-

lum valde inflari posse. Unde concludere potuisset, aërem eorum vesiculas subeuntem esse principium aptissimum, easdem omnes, intimo etiam loco sitas, commodè explicandi; cum contra thoracis & Diaphragmatis motorum integritas, licet tanquam causa expandens supponatur, in externâ solummodò pulmonum superficie actionem suam perficere posse videatur.

§. 8. Ad propriam ejus opinionem ut porrò me conferam, dicendorum ordo monet. Ubi notandum, quod & per integram de Motûs pulmonum causis doctrinam dictum nullibi non volo, quæstionem hîc non esse de causis secundariis occasionalibus explanationis pulmonum; sed proximis tantum atque immediatè efficientibus. Quibus prælibatis Argumenti ab Autore propositi Majorem non esse illimitabilem ac prorsus universalem apprimè advertendum. Illam proinde sic limito: Quo, tanquam causâ immediatè efficiente posito ac sublato ponitur ac tollitur effectus; id omninò pro efficiente illius effectus causâ habendum. Hinc cadit minor Propositio. Nam Autor nunquam probat Diaphragmatis ac thoracis motorum positam aut sublatam integritatem esse causam immediatè pulmones aut expandentem aut concidentiam eorum causantem: sed saltem hoc experimenta ejus evincunt, câ positâ aut sublata poni aut tolli pulmonum expansionem, quod concedo. Sine illa siquidem pulmones explicari nequeunt, cum statim aër per vulnus irruat, eorumque expansionem impediat; nec tamen proxima est dilatationis pulmonum causa, sed potius sine qua non. Quomodo enim Diaphragma & Thorax pulmones extendere poterunt? cum non sint iisdem ullo modo affixa aut agglutinata, sed contigua duntaxat, idque solum ob aërem pulmones subeundo expandentem; alias enim ne quidem pulmones thoraci ac diaphragmati contigui forent, quod patet, dum thorax & Diaphragma vulnere patulo pertunduntur, ubi pulmones multum intra thoracis concavam superficiem subsident. Ut taceam Pulmones ab externo principio commodè per totam substantiam cavernulosam expandi non posse, cum tamen in interioribus vesiculis expansio potissimum requiratur. Hactenus de pulmonum Motu inspirando fieri solito. Exspiratio enim nullis difficultatibus est exposita, cum in eadem à thorace rursus se coarctante pulmones comprimantur, atque eatenus Aër antea illapsus ex iis expellatur. Non tamen penitus aëre evacuantur pulmones exspirando, sed saltem, quousque thorax constringitur, nec ulterius. Adeò, ut semper aëre scateat pulmo, sive inspiret, sive non, sicque thoracis concavæ superficiem conti-

contiguus fervetur. Unde, si thorax hianti perforatur vulnere, prorsus denique subsident pulmones.

## CAPUT VII.

*Aeris, tanquam Respirationis Materię, Indolem ac Modum ex Neotericorum Experimentalis Doctrinā declarat, nec non fictam Vacui Fugam perstringit.*

## §. 1.

**E** Lucidato itaque plurimam partem Pulmonum Motu atque Substantiā, indicatoque Principio eisdem expandente, aëre scilicet, aucto Pectoris spatio, irruente, eisdemque simul concavæ Thoracis superficiēi coextendente; Superest rerum concatenatarum necessitate, ut in Naturam Aëris Causasque, cur pulmones intret atque diducat, penitus inquiramus. Ubi prius notabimus, aërem solum esse veram & adæquatam Respirationis Materiam, idque præprimis saltem in confiniis globi Terr-aquei, ob certam aëris requisitam densitatis consistentiam. Nam in altissimis Peruanæ montibus, vulgò Perixaca vocatis, præ quibus Alpes ipsas tanquam humiliores domus sibi fuisse visas ad altas turres comparatas, ait Acosta, se sociosque cum transirent subitaneo & violento vomitionis impetu (non sine sanguine emissio) fuisse perculos. Aër enim, inquit, ibi adeò subtilis atque immixtus est, ut cum respiratione hominis nullam proportionem habeat. Quod ex sequentibus magis elucescet, aërem scilicet quò altius pertingas, sese magis magisque Elateris ratione expandere, quia accrescente altitudine copia, ac consequenter ponderis pressura, imminuitur, adeòque liberius sese extendendi spatium datur, donec tandem tum moles ejus, tum Elateris usque debilitentur, ut pulmonibus expandendis prorsus impar evadat. Pari ratione etiam, si à calore aër rarefit, id est in quantitate, eo in loco, ubi calor existit, diminuitur, Respirationi ineptus evadit, v.g. in balneis, locisque similibus æstuantibus. Sic enim refert Scaliger *Exerc. 31.* in Lusitanorum navigationibus nautas aliquot sub æquinoctiali penè animam efflasse, quanquam in medio Oceano, liberrimoque cælo: ipsoque præsentē Itali quidam in Lipsiæ Vaporariis Animæ Deliquium passi sunt. Quòd autem quidam ex Aristotele narrent, illos, qui Olympum ascendunt, vix vivere posse, nisi spongas secum portent humidas, quarum ope aërem ibi insugere possint, aliàs Respirationi præ tenuitate inutilem: id meritò cum Illustriss. Boyleo in dubium voco, cum nec ipse Boyleus Alpes transiens, nec Generosus

Tom. II. Pars 2.

Anglicus Scriptor in Ascensu suo ad summum montis Tenarissæ apicem, Olympo longè altiore, (cujus meminit Illustriss. Boyleus *de Aeris Vi Elasticæ p. m. 444.*) nec Frœlichius in memorabili suo ascensu ad summum Hungariensis montis Carpathi vel ad prodigium elevati, mense Junio 1615. factò (qui Alpibus Italicis, Helveticis, ac Tyrolensibus altitudine longè præcellit) ullam ejusmodi difficultatis in Respiratione mentionem faciunt, qualem in Olympi summitate accidere ex Aristotele isti referunt. Nec ullā probabilitate liquet, quomodo aqua spongiis contenta tam subito in halitum resolvi, sicque aërem densiorem ac pro respiratione aptiorem reddere possit. Quamvis enim aër aquam absumat, atque secum sub subtilissimarum atomorum formā abripiat, attamen id non illicò, uti nunquam ferians respiratione exigit; sed horis atque diebus tandem fit. Præterea aër rarissimus ille adhuc tardius aquam extenuabit, quàm propè terram, quia in quantitate paucior. Ingens insuper adhuc Postulatum esset, aquam, etiamsi in minimas particulas subtiliaretur, aëris vices in Respiratione gerere & posse & debere. Quemadmodum autem aër nimium rarefactus, sic & ab extraneis globi Terr-aquei fuliginibus atque halitibus nimium onustus Respirationi prorsus incommodus evadit, quod testantur Plumbi-fodinæ Devonix, aliaque antra subterranea atque cryptæ, in quibus operatores non semel extincti fuerunt æquè ac lampades ipsæ. Nec tamen venenosæ aporrhæarum qualitati cuidam (quamvis sæpè concurrere possit) quam effluviis crassiorum, aëremque specificā gravitate longissimè superantium, hincque in eo subsidentium, illumque sursum exprimendo abigentium (ut ex Staticis liquet) quantitati nimium auctæ hujusmodi effectus annumerandi veniunt. In cellis siquidem turmatim assurgentibus musti fermentantis halitibus infarctis suffocatio præstò est, nisi candentium carbonum ope ori admotorum dissipentur, rariorque aër advocetur.

§. 2. His in antecessum notatis ad ipsam aëris Doctrinam accedimus. Cum autem densissimas, quibus nobilis hæc Physices pars obvoluta torpuit hætenus, ignorantix tenebras fulgidissimo Experimentorum jubare mirum quantum dicussit Nobilissimus Philosophus, ac, solius veritatis ardore calcar subdente, tot labores, totque sumptus expertus Vir Consularis Dominus Otto de Guericken in *Experimentis Magdeb. de Vacuo*: perque illum allectus, uti ipsemet fatetur Illustrissimus Boyleus, Anglicæ gentis Decus, ac Regiæ Societatis ibidem splendor, in *Experiment. Physico-Mechan. de*

[Aaa aa]

Aeris

*Aeris Vi Elasticâ*; quibus etiam qui subjungatur, dignus est doctissimus atque industrius Sinclarius in *Arte Nova & Magna Gravitationis & Levitatis*: idcirco, eorundem hypothesein, tam irrefragabilibus experimentorum demonstrationibus firmatam sectando, potiora quadam doctrinâ de aëris Elatere ac Pondere, hincque resultante illius Motu, capita huc pro explicandâ Respirationis obscuritate plurimum spectantia, mutuanda veniunt.

§. 3. Tenendum itaque 1. aërem, cum sit materia sensibilis, multisque insuper globi Terr-aquei aporrhæis perfusa, corporum omnium lege, manifestâ ac positivâ gravitate, id est, tendentia ad globum Terr-aqueum, donari; Quicquid etiam in contrarium Scholæ Peripateticæ non tam rerum naturalium experimentis, quàm præjudiciis cæcis ut plurimum instructæ, doceant. Constat enim experimentis vitreum ac rotundum vas 32. mensurarum capax fieri uncia unâ & tertiâ propè uncia parte levius, si aër exhaustus sit, quàm antea dum erat aëre plenum. Ipsum hoc vas aëre evacuatum, si ille rursus immitatur, ad pristinum pondus redit. Præter jam memoratos celeberrimos Autores positivam aeris gravitatem confirmant insuper Bartholinus de *Pulm. Substant. & Motu*, Sanctorius *Comment. in I. Fen. Avicennæ* Casp. Ens *Thaumat. Mathem.* Ricciolus *Almagest. Nov.* Merfennus in *Phænom.* Casp. Schottus in *Mechan.* aliique. Imò tanta reperitur aeris globo Terr-aqueo perpendiculariter incumbētis gravitas, quanta foret aquæ 20. circiter ulnas Magdeburg. altæ, si loco aeris globo nostro circumstaret. Imò ipse Aristoteles aeris gravitatem experimento confirmat, dicens *Lib. 4. de Cælo*: *Uter inflatus gravior est quàm compressus.* Hinc quomodo hujus Autoris sequaces aeri gravitatem denegare possint non video. Ex his sequitur primò, aerem omnia corpora suo pondere premere, omniaque loca seipso aut aliis corporibus vacua seu irruendo occupare, seu alia corpora fluida aptaque in illa impellere: Secundò, aerem inferiori loco ac propè terram sito esse graviolem superiori, sicque successivè fieri leviolem quo altior evalerit. Quia scilicet aer inferior plus aeris sibi rectâ incumbētis gerit atque sustentat, qui cum altitudine incrementum decrescit. Tenendum 2. aerem esse ejusmodi corpus fluidum ac flexile, quod in angustius spatium cogi potest, atque coarctatum rursus sese extendere nititur, actuque, ut & eatenus se quaquaversum extendit, si, & quatenus, causa coarctans ac comprimens, tanquam extensionis obstaculum, tollitur. Unde & commode comparari potest spirulis parvis,

vel lanæ, aut velleri vel denique optime plumis istis mollissimis in Dania usitatis, quas *Eider* vel *Otterdunen* ab avibus Islandicis *Eider* dictis, vocari scribunt Bartholinus *Cent. 11. Epist. Med. 5.* & Reiherus *Dissert. de aëre c. 4. tres*, inquit, *libræ talium plumarum in palmarem globum cogi possunt, quæ suæ expansioni relictæ culcitram vel stragulam quinque pedes longam & latam explent.* Hic aeris sese expandendi nîsus dicitur Vis Elastica sive Elater; aut uti Reihero *Dissert. de aëre c. 3.* placet, Vis Elastica vel Elaterium. Tenendum 3. cum aër sit positive gravis, imò quò inferior eò gravior, aërem nostrum, quo degimus, esse necessario maximopere compressum ac coarctatum, ab aëre per passus 6867. juxta Sinclarium *l. c. p. 138.* in altum exporrecto, sibi que perpendiculariter incumbēte, pressio-nemque superstantis Atmosphæræ aeræ fieri minorem, quò altius pertingas, hinc & aerem laxius se quaquaversum expandere, ob minus scilicet tum sibi innitens aeris pondus. Hinc in Experimento Paschalii Harpastum prope terram leviter admodum inflatum magis magisque intumescit, quò altius ad montis verticem portatur, ac in descensu rursus detumescit. Vid. Illustriss. Boyl. *Defens. contra Lanum.* Imò vesica paulisper inflata & in vitro rotundo collocata non tantum ad extremum intumescit, quando aer per Antliam pneumaticam exhauritur, sed & tandem dirumpitur, quia aer circumstans aufertur, unde inclusus vesicæ aer spatium sese quaquaversum expandendi libertatemque acquirit. Tenendum 4. aerem non tantum per circumcipientis aeris ablationem, verum etiam à languidissimo tepore, hinc & aucto imprimis calore, minus aut magis expandi posse. Quod ipsemet expertus, vesicam ruditer inflatam ac vinculo constrictam, ad ignem detinendo vidi. Eatenus enim à Calore intumescibat, ut rupturam minaretur. Frigore autem rursus adventante tumor remittebat, ac tandem ad pristinam flacciditatem vesica redibat. Unde & hyemali tempore multo densior est aër compactiorque, quam sub æstivis caloribus, utpote à quibus insigniter expanditur, hinc & Mercurium in Experimento Torricellii altius tunc deprimat, quam gelidis temporibus.

§. 4. Omnibus hisce de aëris Indole ac Motu attento animo observatis facillimâ operâ explicari potest causa, cur aër inspirando pulmones subeat, eosdemque expandat. Nimirum dum spatium in pectoris cavitate inspirando augetur, non potest non aëris ingens ponderosaque moles eodem momento per Asperam Arteriam in pulmones confluere, cosque solius gravitatis vigore eò



re eò usque illico explicare, quo usque à pectore dilatato spatium illi conceditur alio corpore reniti valente non occupatum. Si enim tantus est aeris, spatia ab aliis corporibus sensibilibus non repleta, irruere conantis impetus ex gravitate sua oriundus, ut etiam vitra evacuata, si nimio gurgite in illa admittatur, frangat, ut id experimentis compertum est; quidni levissimas flexibilissimasque pulmonum vesiculas, simul ac modo datur in pectore spatium, absque ullâ interposita mora ingrediendo pectori amplificato coextendet? Aliter sanè ex ipsis corporum inviolabilibus legibus experimentis fere innumeris pervestigatis ac innotescentibus fieri nequit. Adeoque (quod contra Clariss. Sylvii *Disp. Med. 7. thes. 45.* noto) aer non influit pulmones, quia hi præexistunt expansi, utpote quibus spontaneæ expansionis instrumenta deesse supra probatum est; sed inverso ordine pulmones, dilatato pectore, extenduntur atque in singulis suis vesiculis explicantur, quia aer tanquam explanationis causa immediata & sola illos ingreditur: qui deinceps à coarctante se, sub expirando thorace rursus ex pulmonibus compressis cum roridis halitibus exprimitur. Sola itaque aeris fluidi gravitas est causa, quod is, amplificato pectore, in pulmonum vesiculas influat; influens autem ex gravitatis pressurâ aer est causa, quæ pulmones efficienter expandit. Si verò Inspiratio fiat ex Vitro aut alio vase capacissimo, ac non, nisi solo orificio, os inspirantis subeunte, aperto, notandum, ærem tunc non gravitatis, sed Elateris seu spontanei sese extendendi conatus ratione pulmones subire; quod patet ex Canonum supra præmissorum Secundo & Tertio; ubi, circumstante aere è vitro exhausto, inclusa vitro vesica arctè ligata expanditur, ac tandem, exantlatione durante, rumpitur. Sic & pulmones, pectore circumcircà amplificato, ab aere tum in ipsis existente, tum è vitro capaci, ex quo inspiratio instituitur, ipsos Elateris ratione, subintrante, expanduntur explicanturque: Tantus enim est aeris Elater seu extendendi se, remotis corporibus circumstantibus, nisus, ut etiam à terræ superficie è vase evacuando ad recti apicem Antliam evacuantem sequatur, seseque eatenus extendat absque aeris externi protrudentis ope ac gravitante pressurâ.

§. 5. Dictis hucusque perspicuis licet ac probè perpendentibus facillimis, nihilominus contrariantur Autores sequentes. Primò enim Bartholinus de *Pulm. Subst. & Motu sect. 5.* objicit, concessâ licet aeris Spirâ seu ad dilatationem aptitudine, Attractionem tamen esse necessariam, inde liquere, quod, quanquam vel caput emortuum,

Tom. II. Pars 2.

vel aliud vas inanimum & immobile opponatur; dilatatio illa seu Spira aeris non propagetur ex uno in aliud vas, nec si apertum os opponas hominis vivi, immoto Thorace seu cohibita Respiratione, aer in fauces progrediatur. Sed videtur nobilis illa de Aëre Doctrina eandem sortem hætenus apud multos experta, quam Samia ista de Terræ Mobilitate & Solis Stabilitate Philosophia, ab Aristarcho & Pythagora Samiis ejusdem Cultoribus sic dicta, à Nic. Cusano Cardinali verò & Nic. Copernico proximis sæculis in lucem rursus vindicata, à Peripateticis fere omnibus passa est. Nimirum ut prius objectionibus imperatur, quàm ab Adversariis probè & perfectè intellecta fuerit, prout id præprimis ex Galilæi *Dialog. de System. Mundi*, cuicunque patebit. Pariter enim à Lino, Deusingio, Hobbesio, Moro, aliisque Nova de aëre Experimentis fulcita Hypothesis examen subiit, qui tamen in ejusdem penetralia nondum penitus penetrasse videntur. Ex horum censu quoque est Bartholinus in præmemoratis verbis. Quamvis enim aëri Spiram seu dilatandi sese conatum concedat, attamen præconcepto Attractionis figmento captus eandem necessariam nihilominus, præter aëris Spiram, esse putat, quia scilicet Thorace immoto aer in fauces non progreditur. Sed advertas, obsecro, Clariss. Vir, ad propria verba. Si enim aer semper se expandere conatur, sanè nihil amplius, ut ingrediatur, requirit, quàm spatium sive locum corporibus ipsi obnitentibus vacuum, & illico sese explicabit, nullâ Attractione opitulante aut necessariâ. Adeo nec mirum est, aerem pulmones in non inspirante non ingredi, nullum enim eidem paret præbeturve spatium seu locus, in quo se expandat. Dato autem, amplificato thorace, spatio ceu expansionis loco, utique sese expandit. Sed hæc saltem de Inspiratione ex clauso vase factâ. In inspiratione autem ex libero aere institutâ ne quidem Elateris actione opus est, cum solâ molis aeræ gravitate ac confluitate totum negotium absolvi queat. Præterea omnem in Naturâ Tractionem negamus, nisi trahendum corpus sit affixum trahenti, idque hamis & uncinis funiculisve tam tenacibus, quales in consimili mole movendâ aliàs requiri observamus. Nec concedimus Lamzwerdio *Tractionem & Pulsionem non differre naturâ, sed saltem determinatione; quia virtus movens semper est motiva: Tractionem autem esse motum localem, quo res distans transfertur versus principium movens virtute motus impressi: sic & Circulationem sanguinis esse Tractionem, quia sanguis movetur versus principium movens.*

[Aaa aa 2]

*vens.* Licet enim res quædam cum aliâ conveniat in generalibus; attamen specificè differre potest. Pari quoque ratione etiam Tractio & Pulsio in hoc genericè coincidunt, quod ambo sint motus locales; attamen ipsius virtutis moventis naturâ differunt ac specificantur. Omne enim trahens Principium potest etiam pellere, non verò è contrario omne pellens potest trahere. Ut raceam, Tractionem ad sola animantia arbitrio agentia propriè restringi videri. Et nemo sanæ mentis circulationem sanguinis ob id dicet Tractionem, quia sanguis iterum versus cor movetur, hoc enim cordi propellenti est per accidens, quod sanguis à vasis ita reflectatur, ut ad cor redeat. Nec Tractionis à Pulsu differentia specifica in eo consistit, quod Tractum moveatur versus Trahens, hoc enim etiam in Pulsu, aliis corporibus rem pulsam ita determinantibus, accidere potest, uti ex circulatione patet; sed in hoc Motuum horum differentia specifica sita videtur, quod in Tractione illud, quod proximè trahenti affixum hæret, moveatur versus principium trahens, nec eadem, quâ attrahitur, lineâ à trahente simul recedere potest: in Pulsione verò illud, quod proximè antrorsum propellitur, recedat antrorsum à principio pellente, nec eadem, quâ pellitur, lineâ ad pellens simul eodemque temporis momento accedere possit. Hinc apparet, quæstionem de Tractione & Pulsione non esse meram nominis cavillationem, uti Lamzwerdus in Proœmio Expirationis suæ, nimio forsitan erga veteres affectu abreptus, loquitur, sed explicatu dignissimam, cum vocabulo Attractionis tantopere abutantur Scholæ.

§. 6. Proximo loco famosissimi ac speculabundi hujus sæculi Philosophi Cartesii ejusque assæclarum Regii, le Grand, Rohaulti, Hogelandi, Præxi, Cornelii Consentini, Falcoburgii, Schwammerdamii, aliorumque hypothesis expendenda venit, quæ vult, aërem solo propulsu à pectore & abdomine motum impelli in pulmones, eosque sic explicare. Hi Viri veterem illam Platonis in Timæo propositam Periolin orbi literato reddere conantur, licet Platonice illam Periosin, quam explicat Marsilius Ficinus c. 87. Cartesianis non unde quaque consonare annotet Bartholinus *de Pulm. Subst. & Motu* sect. 5. Cum autem hæc hypothesis fidenter supponat, omnia, etiam minutissima, mundi spatia corporibus esse plenissimè infarcta, adeò, ut aër propulsus non nisi in pulmones ferri possit, quod tamen nec probant ejusdem Patroni, nec probaturos confido; idcirco eidem assentire nequeo. Materiam etenim suam ætheream, eam saltem ob causam fin-

xisse præcipuè videtur Cartesius, ne scilicet Vacuum ipsi admittendi imponeretur necessitas. Eam autem actu existere, Vacuumque non esse, nec esse posse, ne unico quidem naturæ phænomeno infallibili, immediatè istius existentia hujusque impossibilitatem demonstrante evincere potest cum omnibus sectatoribus. Hæc itaque ejusdem ponderis esse arbitror, cum suo de Mundi Infinitudine, inconsiderato dicam, an verò in Atheismum prono? placito, quod *Part. 2. Principior. Philosophiæ No. 21.* proponit, *cognoscimus, inquit, hunc mundum seu substantiæ corporeæ universitatem nullos extensionis suæ fines habere.* Insignis sanè est mentis *aporia*, ne dicam insania in homine præsertim Christiano, non posse res naturales, creatasque ab ipsarum infinito immensoque Conditore, DEO, discernere. Sed ne extra oleas vagari videar, cum Mundum finitum ingeniosis rationibus probet Rhodiginus *lib. 2. c. 19.* nec saniorum Philosophorum finitudinem ejus neget ullus, præmemoratam aeris in pulmones sub Inspiratione à thorace & abdomine factam propulsionem unico, eoque firmissimo ac omnium maxime cogente Experimento, destruo. Nimirum posse nos ex vase capacissimo, ac non nisi in os inspirantis pervio, aerem inspirando haurire. Hic enim aer vase inclusus ac aere externo corporis moti beneficio propelli nequit, cum communicatio inter utrumque per vasis densos parietes penitus sit denegata. Recurrit equidem Regius in Responsione Bartholino, idem hoc Experimentum objicienti, datâ, ad Materiam subtilem ætheream, quam à corpore Inspirantis propulsam vas pertransire, ibidemque propulsionis motu aërem expellere ac in os pulmonisque Inspirantis impellere docet, *Medicin. lib. 1. p. 39.* Sed ut plura omittam, potissimum regero 1. Materiæ subtilis existentiam nondum esse probatam: Imò ipse, le Grand sedulus Cartesii Epitomator *Institut. Philos. p. 136.* scribit: *Tria illa Elementa* (ex quorum numero materia ista subtilis primas tenet) *tanquam Principia Mundi supponi, licet eo modo suam originem res naturales non habuerint, neque talia à DEO unquam fuerint creata,* saltem ob commodiorem Phænomenon rerum naturalium explicationem. Nostra verò de aëris reali gravitate & Elatere hypothesis naturæ experimentis firmissimis probatur. Ipse etiam Cartesius sensibilem aëris gravitatem in *Epist. ad Mersennum* experimento confirmat: *vid. vit. Cartesii à Borello edita. p. m. 34.* nec tam ea apud veritatis indagatores Philosophos valet hypothesis, per quam rerum naturalium phænomena ac effectus promptè & expedite solvi queunt.

queunt. Sic enim Peripatetici omnibus pal-  
mam facile præripient, mirâ facilitate, per  
tot fictitiarum Qualitatum myriades, quot  
sunt effectus, difficultatem quancunque elu-  
dentes. Sed illa potius exquirenda est hypo-  
thesis, per quam experimentis rerum pluri-  
mis firmatam appositissimè ac solidè naturæ  
opera explicari possunt, ita ut rerum effectus  
causis suis genuinis immediatè respondeant,  
hæ autem illos pro legitima prole rursus agno-  
scant: 2. Licet Materia subtilis existeret, ta-  
men nullo naturæ phænomeno probari  
potest, omnia Mundi minutissimaque spa-  
tiola ab eadem penitissimè expleri, adeò ut  
nulla corpora præsertim aër, condensari,  
seu in minus spatium absque ullâ materialis  
suiæ substantiæ annihilatione cogi queant, nisi  
Materia subtilis, quam Cartesiani supponunt,  
ex iis exprimatur: 3. Probare nequeunt Ma-  
teriam istam, si qua detur, necessariò den-  
sum vas vitreum metallicumve transire, ac  
exinde aërem in os profugare. Promptius  
enim ipsùm Thoracem respectu vitri & me-  
talli multò porosiorum ac proxime primario-  
que in illam propellendam impingentem  
penetrare, spatiumque illius dilatatione fiens  
immediatè occupare potest, quàm à molliori  
Thoracis Abdominisque substantia per du-  
rum compactumque, ac multò solidius vas  
vitreum aut metallicum prorrudi: Tandem  
4. inane illud ad Materiam subtilem in Respi-  
ratione subterfugium penitus diluitur expu-  
gnaturque per irrefragabile Experimentorum  
38. & 39. à Boyleo *Experiment. Physico-  
Mechan. de Aere* propositorum, robur,  
quibus clarissimè demonstratur, nullam ma-  
teriam talem sub aeris exantlatione vitrum  
pertransire, ibique aërem rarefactionis agi-  
tatione expellere.

§. 7. Postremò alii per famosissimam il-  
lam Vacui Fugam, totius penè Europæ  
Scholas perstreptentem, causam expedire  
conantur, ob quam aër inspirando pulmo-  
num antra subeat. Ex quorum serie omnes  
ferè sunt Peripatus Proceres, nec non suprà  
memorati Medici aliique, numerosa asse-  
clarum cohorte stipati. Enim verò mirum,  
quantam Naturæ præ Vacuo abhorrescenti-  
am à tenuissimis unguiculis ipsi ingenitam af-  
fingant illi omnes adeò, ut etiam, uti pu-  
tant, contra proprias propensiones movea-  
tur eadem, ne Vacuum progignatur, mon-  
strum illud formidabile, & panicus ipsius na-  
turæ terror. De rebus enim naturalibus non  
aliter loquuntur, quàm si mentis rationis-  
que essent participes, ac puerilem in morem  
Vacuum, tanquam spectra, lemures, alia-  
que vetularum terribilia, exhorresce-  
rent, cum tamen nullibi Vacuum illud tan-  
toperè perterrens inveniri velint ipsi, nec ul-

lis Naturæ viribus Vacuum fieri posse acerrimè contendunt. Imò eorundem nonnulli  
eò audaciæ temeritatisque progressi sunt, ut  
& summi Numinis vires excedere voluerint  
Vacui productionem. Unde otiosa ejusmo-  
di ac Philosopho Christiano prorsus indignæ  
ortæ sunt quæstiuncula; an Deus possit face-  
re Vacuum? cujus negativam sustinet Scali-  
ger, subtiliter an temerariè? judicent alii.  
vid. Alstedius *Encyclop. L. 7. p. 666.* Sed  
ne spinosæ isti controversiæ, deturne Va-  
cuum nec ne, impræsentiarum ex instituto  
me implicem, cum tantum absit, ut de-  
monstrent Peripatetici aliique Vacui hostes,  
omnia Mundi exilissima spatiola corporis ex-  
actissimè esse repleta, nullumque dari Vacu-  
um interspersum corporibus Mundum con-  
stituentibus, ut ne contentur quidem argu-  
mentis solidis perspicacisque ingenii & Ex-  
perimentorum modernorum Philosopho-  
rum rigorem ferentibus id ipsùm aggredi,  
quin potius precariis ac nondum probatis  
nec nullatenus firmiter probandis hypothe-  
sibus vel meris, non-causæ pro causâ fallaciis  
nitantur: idcirco imaginariam duntaxat Va-  
cui Fugam potioribus quibusdam argumen-  
tis in contrarium adductis perstringam.

§. 8. Primò itaque, licet cum Scalige-  
ro *Exerc. 6. Platone in Philebo, Pythagora-  
raisque ap. Corn. Agrippam Occult. Phi-  
losophie c. 11. 12. & seqq.* Animam quan-  
dam mundo non denegem, si per cœlesti-  
um corporum substantialem influxum Solis  
primariò, (quem haud incongruè Plinius  
*Lib. 2. c. 6.* Mundi totius Animum ac Men-  
tem, imò principale Naturæ Regimen ac  
Numen vocat) explicetur: Etiam si nec de-  
cantatum illum Mundi Spiritum, in Medi-  
corum præprimis Hermeticorum (uti vocari  
gestiunt) Libris non multis adeò abhinc an-  
nis rursus animatum & resuscitatum (quam-  
vis pessimè ex Adeptorum scriptis hûc detor-  
tum, cum illi prorsus alio sibi que peculiari  
Chao, Aëre, ac Mundi Spiritu loquantur,  
quod mecum norunt atque testabuntur Sci-  
entes, imò satis superque elucescit ex Phila-  
lethæ introitu ad Regis Palatium: præcipuè  
v. ex *p. 8. 9. & 34.*) impugnare velim, si  
modò Quidditas ejus Actionesque ad globi  
Terræque cum Solaribus (à quibus, opitu-  
lantibus forsitan caloribus subterraneis, po-  
tissimùm tolluntur in altum) Radiis, aëris-  
que corpusculis consociata Effluvia, Effe-  
ctusque his consonos restringantur: attamen  
præter individua corpora universalem  
quandam, perque vastissimum Mundi, ne  
dicam totius Creaturarum Systematis, ambi-  
tum, extensam, ac undequaque diffusam  
Creaturam ceu Formam Animamve Mun-  
dum universalissimè informantem, effectum-  
[Aaa aa 3] umque



umque omnium Directricem, Naturæ etymo insigniendam, ac in procurandis rerum naturalium utilitatibus fugandisque earundem hostilitatibus damnisque occupatam, iisque præcipuè, ne Vacuum in exilissimis sui finibus, spatiolisque admittant, sed eadem potius plenissimè & exquisitissimè repleant, adnitendi calcar subdentem, cum nullibi ejusdem existentiam nec adversarii probent, nec rerum necessitas exigat, firmiter nego, confiteorque Mundum hunc non nisi corporum individuorum & densiorum & subtiliorum, majori minorive atomorum effluentium sphaerâ cinctorum, complexum, ac coordinatum systema esse; nec Universalissimum quoddam ratione, judicio ac præmeditatione pollens Numen, præter summum illud Increatum, æternum, Independentem, ac sapientissimè movens omnia, soloque ineffabili nutu dirigens, sibi, ceu supremum ac universalem Rectorem, præfectum agnoscere.

§. 9. Secundo, corpora Mundi individua (si Animalia libere agentia excipias) non habent finium suorum præcognitionem, nec casus sibi imminentes prævidente judicio aut avertere fugereque, si noxii fuerint; aut accelerare accersereque, si conducant, poterunt: Sed agunt duntaxat, quicquid ex Creatoris sibi aut inditis, aut è Corporibus reliquis, propinquiore præsertim, advenientibus Legibus agere jussa sunt, jubenturque. Hinc cum Vacui Metus, si Individua illo agantur, præsupponat in illis facultatem judicandi imò prævidendi ac certo præsciendi, Vacuum, si illud admitterent, fore sibi exitiosissimum; ipsa autem uti dictum, hanc facultate gaudere, nec probatum nec probari queat, quin potius (prout scitè Hippocrates ait) nesciant quid agant: Ergo individua corpora nihil ob Vacui Metum agunt, ac talis effectuum, Vacui Fugæ illos tanquam Causæ efficienti, adscribens interpret fallaciam admittit non causæ pro causâ. Ipsi quippe prius, ut firmissimè probet, sequentia 4. puncta, incumbit; 1. Vacuum inter individua Mundi corpora dispersum (ut de Coacervato taceam) actu non existere; sed omnia exilissima Mundi spatiola exquisitissimè adæquatis corpusculis repleta esse; seu quod æquipollet priori, corpuscula eatenus ac summè subtilitata actu existere, quæ dicta spatiola omnia ac singula, nullo penitus prætermisso plenissimè expleant. Hæcque omnia non precariis Suppositionibus & Postulatis, sed ipsis rerum naturalium phænomenis absque paralogismis & fallaciis candidè sunt demonstranda. Nam bene advertit Cornelius Consentinus p. 374. argumenta, quibus Aristoteles (addo ego Plenistas ferè

omnes) utitur ad confutandum Vacuum, partim esse captiosa, partim inniti fundamentis experientiæ adversantibus, uti videre est apud Galileum, eorundem fallacias præclare detegentem: 2. Vacuum, si admitteretur, rebus naturalibus esse tam nociferum, ut omni conatu merito ab ipsis fugari mereatur: 3. Res inanimatas judicioque carentes pollere facultate prævidendi, judicandi cognoscendique Vacuum, si illud admitterent, fore sibi tantoperè damnosum? 4. Res inanimatas (supponamus licet illas, quod tamen ridiculum, per ratiocinii discursum, Vacui noxam præcognoscere) habere insuper potestatem sese pro lubitu ipsas movendi, idque motu tam manifesto pertinacique, suæque naturæ prorsus contrario, qualem in effectibus ejusmodi cernimus, quos Vacui Fugæ falsò adscribunt Vacui hostes. Nam non sufficit rem sibi tantopere obfuturam prævidere atque cognoscere, nisi etiam in illarum arbitrio viribusque positum sit, sese intrinseco spontaneoque motu ad eandem avertendam illicò accingere posse, eoque tanto, quantus ad instans damnum penitus & perfectè abolendum requiritur. Hæc autem cum nunquam probata sint, imò ut solidè probentur unquam à Vacui Negatoribus, spes planè irrita sit; idcirco interim ad annihilantem Vacui Fugam ulterius pergo.

§. 10. Objicio itaque tertio, Experimentis Nobilissimi de Gueriken certò constare, atque in Antliis similibusque machinis ascensum (quo tanquam palmario pro Vacui Fugæ asserenda utuntur argumento Peripatetici) non ultra 19. vel 20. ulnas Magdeburgenses pertingere. Adeoque si adversarii dicant, aquam ascendere in dictis machinis ad fugandum Vacuum, quod alioquin in tubis, quibus vehitur aqua, oriretur, si non adscenderet; necesse est alterum dicendorum eligant: scilicet aut esse Vacuum in tubi, 20. ulnis Magdeburgensibus altioris, postquam evacuatus est spatium, quod supra aquam, utpote ultra dictam 19. vel 20. ulnarum altitudinem non ascendentem, restat: aut aquam in ejusmodi machinis, non attollere se ad fugandum in tubo Vacuum; sed etiam causam sui ascensus agnoscere. Denique quartò ex supra memoratis aeris affectionibus liquidissimè constat, aeris sub Inspiratione in pulmones ingressum non fieri ob Vacui Fugam (quam quippe ad Non Entia relegamus) sed ob propriæ gravitatis molem, cui pulmo, dum ingens tandem thorax amplificatur, ab illiusque convexâ superficie circumcirca dimoveretur, sustinendæ impar est, ideoque ab aere irruente illicò thoraci dilatato coexpanditur, atque hac ratione inspirare dicitur Animal:

Animal: quod ipsum thoracis, flexiles pulmonum vesiculas rursus constringentis, operâ, aerem, quem modò passivè admiserat, jam denuò activè exprimit, èque pulmonum cavernulosis vesiculis expellit, sicque expirandi munere fungitur.

§. 11. Ex huc usque fufius<sup>o</sup> deductis, proindè non tantum eorum evertitur opinio, qui aerem ob fictam Vacui Fugam, dilatato thorace, pulmones ingredi prætendunt; sed & illorum, qui ob eandem Vacui Fugam pulmones thoraci expanso coexpandi putant. Imò utrosque optimè insuper redarguit Experimentum Schwammerdamii *Tr. de Respir. sect. 2. c. 1.* propositum, quo monstrat *Fœtus pulmonem, dum thoracem aperiret Autor, planè fuisse contractum, aeremque externum, levissimo simul ac vulnere perforabatur intercostale spatium, cum magno impetu & vehementia in thoracis cavitatem penetrasse.* Quid ad hæc, Viri Clarissimi, qui plus quàm Vatiniano odio erga miserum illud Non. Ens (si rerum creaturarum seriem spectes) Vacuum inquam flagrans, ac in hoc ipsam procul dubio naturam antecellitis: Cujus nihilominus larvâ vestram Vacui negandi, ejusque tantum in rebus naturalibus horrorem fingendi pertinaciam palliare optimè nostis. Dico enim: aut Vacuum in pectore Fœtus ante aperturam fuit, aut non fuit. Si prius; ruit vestra admittendi Vacui rebus naturalibus afficta Impossibilitas Metusque. Sin posterius; hoc est, sin concavitas pectoris corporibus adæquatis exactissimè fuit repleta, ita, ut nullum spatium Vacuum fuerit reliquum, exigo à vobis legitimam causam, cur aer tanto impetu per vulnusculum irruat, cum ex vestrà hypothefi solùm ob vacui fugam id contingere velitis, quippe quæ dictitat, corpora naturâ levia, (qualia esse fingitis aerem & ignem) ac non nisi pèrpetuò sursum tendentia, ob Fugam Vacui, contra ingenitam sibi, quam putatis, indolem, deorsum ferri, ne detur Vacuum. Sanè si pectoris cavitas omnino esset expleta aut penitus aliis corporibus infarcta, ita, ut nulli ulterius locus pateret, impossibilis vel lippis atque tonsoribus arbitris erit aeris tanto impetu ad fugandum Vacuum, utpote quod nondum adest, irruptio, prorsusque frustranea; hæc enim necessariò præexistentem Vacuitatem, tanquam capacem illabentis aeris locum non solùm prærequirit, sed & indicat. Cartesius quidem cum toto scætorum satellitio, licet Vacui Fugam mecum neget, attamen contra Vacuum objiciet, fuisse cavitatem thoracis Materiâ subtilià se excogitatâ duntaxat, expletam. Quod & ipse Experimenti Autor Schwammerdamius fidenter admodum asserit. Sed præter

argumenta, quæ in superioribus contra Materiam istam adduxi, idem contra hos, quod contra Peripateticos modò attuli, urgeo. Nimirum, si pectus infantuli ante pertusionem penitus fuisset repletum, non potuisset aerem tanto impetu irruere. Corpora enim cuncta juxta ipsorum confessionem propriam ex unâ eademque Materiâ Catholicâ constant, adeoque sive hoc, sive alio corpore Vacuitates repleantur, perindè erit, modò exactissimè fuerint repletae. Accedit, quod ex eorum hypothefi Materia ista Ætherea omnium aprissima sit ad explenda plenissimè cuncta, etiam minutissima, interstitiola Vacua; quâ itaque si pectoris cavitas penitus esset infarcta, eo minus aer tantâ violentiâ irrumpere poterit, cum sit ad hanc spartam obeundam, Vacuum scilicet explendum, Æthere Cartesiano ineptior.

§. 12. Ultimò auctari loco de Pulmone adhuc unicum duntaxat addidisse liceat, scilicet quod si internis pectoris parietibus, Pleuræ ac fibrarum interventu, adnatus fuerit, tantùm absit, ut spirandi difficultatem inferat, ut potius spirandi promptitudinem facilitatemque augere possit. Cum enim in confesso sit, Respirationis vota magis expleri, quo laxiori ambitu pulmones expanduntur horumque explicationem cum thoracis dilatatione esse penitus Isochronicam, licet in causis proximis differant; idcirco, dum thorax, cui per fibras annexus adhæret pulmo, amplificatur, non potest non pulmo simul ad expansionem abripi, sicque aeri, cum alioquin expandenti, in explicandis illius vesiculis auxilium ferri. Hinc malè Bartholinus, Riolanus, Lidenius, alique, diuturnam Dyspnœam indè oriri dicunt, cum in tertia ferè hominum parte pulmones inveniri annatos Diemerbroccius testatur p. 514. Imò Helmontius, Tulpius, atque Harveus, tam in hominibus quàm avibus, fieri id notant sine Respirationis incommodo: Vid. Mœbius *Fundam. Physiol. p. 293.* Celeberrimus insuper Kerkringius *Spicileg. Anat. Obs. 72.* pulmones sterno & colliis firmiter adherentes reperiit sine Dyspnœæ aut Phthificos Symptomatibus.

## CAPUT VIII.

*Loca ad quæ aer in Respirantibus Hominibus pertingit, diligenter investigat.*

### §. 1.

Explicatis hætenus partium corporis humani ad Respirationis munus concurrentium structurâ, situ, nexu, motuque, expeditoque Principii forinsecus sub respirando advenientis, Aëris puta, peculiari Indole

ac

ac Motu; tandem ut de finaliter causantibus five Usu multiplici Functionis hujus nobilissimæ mentem nostram exponamus, tractandi serie teneremur. Hoc autem cum commodè fieri nequeat, nisi in antecessum intricatam hanc Quæstionem resolvamus, quorsum scilicet Aër inspirando illabens propriè pertingat; Num in pulmonum cavernulis circumscribatur ejus præsentia, iisque solis competat, ut juxta Hippocratem *L. III. de Morbis*, aëris habitaculum ac sedes saluentur? an verò præter illas vasorum corporis succiferrorum cavitatibus contentisque sese insinuet immisceatque? aut forsitan membranam pulmones investientem permeando in thoracis cavitatem penetret? aut denique cerebri penetralia ingrediatur? idcirco in hisce prius nostra occupabitur opera. Aëri proinde ingressum ad sanguinem aliosque ex consequenti corporis liquores concedimus, sequentibus commoti Rationibus atque Experimentis inductivis; Primò quia in Experimento Schwammerdammi à Clariss. Sylvio, (quo præsentè factum est) *Disp. Med. 7. lib. 86.* commemorato, ejusque testimonio stabilito, *aer lente diuque in pulmones vivi adhuc animalis calentes pressus, ex adaptato asperæ arteriæ ventriculo siccatò, adactusque tandem in Arteriam Venamque pulmonales, hinc & utrumque cordis ventriculum transit*, quippe quod vasorum pulmonalium cum pulmonum vesiculis communicationem, saltem aëris ac halituum expiratorum respectu, arguit. Idem hoc Experimentum confirmat insignis ap. Hafnientes Professor Ol. Borrichius in *Epist. Barthol. 76. Cent. 4.* asseritque, *aerem in præfato Experimento vivorum animalium pulmones subire, hinc cor ejusque vasa manifestè distendere*; Cui nec ob stare videtur Experimentum Highmori, utpote in pulmonibus è corpore exemptis factum, in quibus sanguinis calidioris continuus trajectus vasa eorundem dispendens desideratur, ut alia præteream.

§. 2. Secundo, Quia experiente Thrustonio *Diatr. de Respir. p. 47.* liquor ater per arteriam pulmonalem immixtus, partim per Venam pulmonalem, partim verò per tracheam quoque cum spumâ rediit. Tertiò quia Loweri Experientia dicitur *Tr. de Corde c. 3.* sanguinem pulmones ingredi venosum, ac atrum per Arteriam pulmonariam; exire autem rursus per eorundem Venam, arteriosum atque coccineo lucidèque rubicundo ac florido colore tinctum: Obturatâ quoque tracheâ sanguinem ex arteriâ cervicali incisâ profilientem paulò post obturationem æque atrum esse ac venosum: Denique, mortuo jam, mo-

tuque cordis ac sensu destituto, animali, sanguinem Venæ cavæ adhuc fluidum, si per cor & pulmones folle simul inflandos adigitur, æquè rutilum floridumque è pulmonibus prorumpere ac si vixisset. Hic meritò, cum sanguinis Venâ sectâ emissi superficiem aëri obversam pari modo rubescere, ac sanguis animalium ex arteriis fusus, cernamus, ab effectus identitate ad causam eandem formamus consequentiam; præsertim, cum, sanguinis prior superficies si detrahatur, subsequens itidem coccinea & arterioso similis evadat. Imò sanguis in arteriis hospitatus, rarior, multoque ad spumositatem pronior, adeo, ut parum absit, quin ipse spumofus dicatur atque existat; Unde etiam ejus spumositate aëris ad illum accessum haud incongruè concludit Joh. Theod. Schenckius *Epist. Barthol. Cent. 4. Epist. 72. Quartò*, quia monstrante experientiâ Mayowii *p. 149.* sanguis aliquandiu extravasatus in Machinâ Pneumaticâ Aëre per exantlationem deprivatus leniter saltem in superficie aëri contiguâ rutilaque in bullulas assurgit. Sanguis è contrario arteriosus recenter emissus, per eandem Antliam aerem exhauriendo, mirum in modum expanditur, & in bullulas penè infinitas elevatur. Quæ phænomena minorem majoremvè aeris sanguini Respirando admixti quantitatem arguunt.

§. 3. Quintò, quia in quocunque corporis sani calore aucto, præsertim ex validâ motitatione æstivoque fervore exorto, digiti, manus, brachia, omnesque partes carnosæ palpabiliter tumidiores evadunt: cessante autem calore citò rursus subsident. Quod sedulò attendenti palam fiet, aerisque in corporis substantia præsentiam indicabit, utpote quia quocunque tempore, multò magis calore in Elasticâ suâ virtute insigniter augetur, seseque, ac simul partes, quibus continetur, si flexiles fuerint ejusque eruptionem impedian, valdopere expandit. Sextò, quia, aëre ex cucurbitularum jamjam corpori applicandarum cavo maximam partem aut exsucto, aut per lampadis flammam expulso, carnea moles, cui affiguntur, intra illas protuberando extumescit, propter aërem in minutissimis ac capillaribus corporis vasculis, Elateris ratione ob minorem in cucurbitulis resistantiam, se simulque carnem expandentem. Quamvis enim minimè ignorem ab illustribus Viris de Gueriken & Boyleo, nec non à Pecquetto *Diff. Anat. p. 122.* hocce phænomenon acceptum referri Atmosphæræ externæ contrusioni, quod & Celeberrimi Sinclarii Experimento confirmatur, ubi caro æque in maris fundo ab aquarum vastâ ponderosâque mole atque pressurâ in-



rá intra cucurbitulam adigitur intruditurque, aerem in ejus cavo contentum coarctando ac condensando, quam supra aquas ab aëre externo, postquam internus cucurbitulæ aër aut flamma imminutus rarefactusque, aut per foramen cucurbitulæ exsuctus est: attamen salvâ hac sententiâ, cui quippe lubens accedo ipsemet, nil impedit, quò minus aer omnibus corporis succis intime permixtus, renitentiam in cucurbitula applicatâ minorem quàm alibi offendens, ad elevandam, sui expansione Elasticâ, carneam massam, eamque cucurbitulæ insigendam simul atque ut aer externus conferat. Parimodo in Experimento Torricellii pulpæ digiti intra tubi vitrei cavitatem infarctio tenaxque adhæsió, tum aëri externo gravitate suâ contrudenti; tum interno digiti pulpâ Elateris ratione se expandenti imputanda venit. Confirmantur hæc de aeris in sanguine existentia ex Prænobilis Viri de Guericke *L. III. c. 16.* ubi per carum oculus, aerem ex Machina detrahendo, foraminibus suis extorqueri refert: Pariter etiam & Illustriss. Boylei Experimentum. 41. ubi murem in Recipienti, dum aer exhauritur, quasi intumescere notat. Accedit pro collato aeris in carne præsentis Symbolo Experimentum Mayowii *p. 103.* in quo Vesica vasculo cuidam arctissimè superextensa ac circumligata, dum eidem cucurbitula cum flamma affigitur, in tumorem versus cucurbitulæ civitatem elevatur, perinde ac caro. Cum tamen in hoc casu non tam aer externus vesicam, utpote firmiter tensam, contrudere, quàm internus in Vasculo contentus ob minorem in applicatâ cucurbitulâ resistantiam, vi suâ Elasticâ se expandens, illam intra cucurbitulæ cavum attollere atque intrudere potest.

§. 4. Septimò, quia largissima respectu assumptorum, qua quotidie diffuimus, Diapnoe aeris ad massam sanguineam, accessum firmiter pervadere videtur. Quippe Sanctorio *Medicin. Static. Aphor. 4. 5. & 6.* observante, Perspirata per corporis porulos, nec non expirando egesta effluvia quantitate superant excreta visibilia cætera simul sumpta; adeò, ut ex *Lib. 8.* assumptorum unius diei Transpirata insensibilia (uti vulgò vocantur) ad *Lib. 5.* ascendere soleant, variantia tamen pro hominis rerumque non-naturalium varietate; imò solus expiratus halitus unicâ die scilicet circiter constituat; adeoque necessariò porulos in Arteria & Vena pulmonalibus arguit, per quos exeat, dum sanguis per dicta vasa propellitur. Quo tamen halitu aeris corpuscula adhuc multò minutiora subtilioraque esse nemo utrumque considerans negare poterit; præsertim cum halitus tempore brumali exactè conspi-

Tom. II. Pars 2.

cuus evadat, insignissimique Borrichii experientiâ testante salem & sulphur abscondita in se gerat. vid. Bartholinus *Tr. de subst. & motu Pulm. sect. 2.* Secuti etiam Fabr. Bartholetus *de Diffic. Respir. Lib. 5.* prodidit, halitum humanum coagulari ac in crystallos destillari posse, referente eodem Bartholino *l. c.* Copiosæ autem hæc aporrhææ, (optimè notante Magno Helmontio *Tr. Blas Human.* ubi septimam hanc rationem nostram fuisse profert probatque) si solo caloris actu è corpore profugarentur, ingens brevi restitaret Capitis mortui (uti loquuntur Chymici periti) carbonisve tolli quantitas. Nam quæcunque ab animalibus desumpta, tepidissimo licet caloris motu agas, insignem adultæ duræque facis carbonariæ quantitatem destillando post se relinquunt, partibus volatilibus propulsis vel quintuplo sextuplove præponderantem. Quæ, tantum abest, ut cum sanitate hominis stare possit, ut potius vel minimum non quidem adultæ ejusmodi facis, at solum sanguinis extravasati, ingentes dolores, calores, pulsuumque duritiem moveat, priusquam aut carnem cutemque perforando sub puris formâ egrediatur; aut malacticis emplasticisque ad plenariam transpirationem promoveatur; aut denique scalpello partes illud continentes incidendo (quod etiam, si copiosius fuerit extravasatum, & nullæ ex prudentis Medici judicio id vetent circumstantiæ, citius levamen feret) foras educatur. Et tamen non obstante facis posthumæ metu pleniori transpiratione magis avellatur corpus, quàm eadem quodammodo suppressâ. Unde non immeritò laudatus Helmontius *peculiariter Tractatu Retenta* corporis, tanquam valentiores frequentioresque multorum morborum causas doctè pertractat. Præterea suggerit tum *anæsthesia*, tum Illustriss. Boylei in *Orig. Formar.* proposita experientia, ipsam etiam aquam pluvialem limpidissimam, vel centies redistillando, singulis per alembiculum transvectionibus, terrestris quid relinquere fixissimum, ac nulla ignis vehementiâ alterandum ulterius. Quæ cuncta ad proscribendas penitus sine incruentis totisque reliquiis è corpore aporrhæas, præter solam caloris actionem utpote univocam, insuper aliud volatilizans Agens evidenter præsupponunt atque requirunt.

§. 5. Cum autem Experientiâ Helmontii, Tachenii, aliorumque constet, ligna libero aëre putrescentia, vel planè nullum, vel verbo vix dignum in igne salem suppeditare: Cum & herbæ siccae ac per annos asservatæ minorem, quàm recentiores solent, salis quantitatem in cineribus relinquant: Cumque denique sub maximis frigoribus aereque purissi-

[Bbb bb]

purissimo (uti præter Helmontium, id testantem, in memetipso sedulo annotavi) simus edatiores, cum minori sudandi ac sededendi necessitate; navigantes etiam nisi ægrotent, duplo vel triplo plus comedant minusque excrementorum deiciant, quam si in terrâ degerent: hinc merito concludimus: aërem esse volatilisationis sine capite mortuo restitante in corpore animalium causam, adeoque & necessario sanguini reliquisque corporis succis chylosis lymphaticisque ex utraque Cavâ in confluentibus, ac per minima pulmonum vascula exactiori miscelâ conquassatis, connecti intimeque permisceri. Ex lignis enim putridis herbisque annosis perpetuo suo allinctu ac recentatione istiusmodi suffuratur corpuscula aer, quæ in proximâ erant potentiâ aptitudineque saltem in ignis colliquantis torturâ constituendi. In intensiori autem gelu cœlique serenitate, optimè notanda veniunt tum aeris major copia densiorque aggregatio, ob solis recessum diminutumque radiorum aerem alioquin agitando expandentium impetum, compactiorem eidem subsidentiam arctioremque particularum ejus constitutarum inter semet appropinquationem ac coacervationem indulgentem; tum ejusdem exquisitior puritas minorque ab effluviis globi Terræquei aggravatio, ob eandem radiorum solarium, aporrhæas istas cæteroquin suscitantium, actionem tunc in imbecilliores. Hinc, aëre & puriori & copiosiori existente, utique non potest non fieri plenior ejusdem Inspiratio, largior in sanguinem traductio, promptior transpirandorum exportatio tam per os halitum, quam per Diapnoen in corporis peripheriâ potissimum obeundam. In navigantibus denique sanis expeditior fit Transpiratio, tum ab aëre ob frigora marina ventosque gelidiores copiosiore, hinc & majori particularum suarum numero sanguifera vasa subeunte; tum subinde recentato agitatoque transpirata effluvia diligentius à corporum superficie detergente. Aereæ namque particula effluviis minutas atomos promptissime arripiunt, & cum in perpetuo ferè sint agitationis motu, secum abripiunt, succedentibus aliis ejusdem aëris corpusculis; quæ itidem, plaustris (loqui sic liceat) suis, effluviis sarcinâ aggravatis, avolant, successoribus muneris obeundi copiam relinquentes. Quæ cuncta jucundè dilucidantur partim ex sacris, ubi Genes. c. 8. DEus ventum immisit supra terram ad aquarum Diluvii absorptionem perfectamque exsiccationem: partim ex Boylei *Experim.* 29. *Tr. de aeris Elast.* ubi peculiaris quidam in libero aere perpetim copiosos fumos exhalans liquor in Machina Pnevumatica, aëre exantlato, su-

mare desiit: Eodem autem rursus admissò confestim fumi ascendere denuò cœperunt, utpote ab aëre indefessè motitato è Phiala abrepti: partim denique ex domesticis observationibus, ubi lintheamina lora madidaque à vento perflante omnium optimè exsiccantur. Humida enim ac succulenta quælibet ab aëre seu allabente seu pertranseunte liquidis depravantur particulis. Sic & animalium corpora, continuo quasi gurgite inspiratus, rursusque exspiratus, nec non transpiratus, permeat aër, humidaque eorundem corpuscula secum surripit. Appositè enim loquitur Venerandus Senex Hippocrates, animalium corpus esse *ἐσπῆν καὶ ἐκπῆν* sive inspirabile & exspirabile. Adeò, ut verè vita nostra sit continuus quasi fluxus in mortis tandem otiosam, ast piis dulcissimam quietem terminans.

§. 6. Octavò, quia venenosa *μιάσματα* in aëre natantia cum eoque inspirata tam subito occidunt inficiuntque. Refert enim Kircherus Scrutinio *Pest. sect.* 1. c. 3. ex Aristotele & Cardano *Lib. de Venenis*, Dracones illos in quodam Macedonia antro stabulantes tam pestiferum halitum spirasse, ut vel transeuntes in momento interficerent. Ipse Kircherus complura in diversis mundi partibus antea se observasse scribit, adeò vitulentum continuo halitum emittentia, ut & homines & bruta, quotquot inconsultius intrarunt, mox extinguat. Narrat porro ex Georg. Agricola dictus Kircherus, lintheamina pestifera muro inclusa, ac post multos annos extracta, vermibusque referta, cum ingenti Mephyti mox eruentes infecisse, qui dein totam regionem inquinando devastarunt. Hæc sanè si penitus pensitantur, *μιάσματα* horum cum subito polluentium simul cum aëre tanquam vectore ad Massam sanguineam, exitiosamque ibidem alterationem causantium, optimè arguunt. Momentaneus enim eorundem effectus in corpore nullâ probabilitate circumspectis ingeniis satisfaciente alioquin explicari poterit.

§. 7. Nam quod Clariss. Diemerbroccius *Anat.* p. 523. dicat: malignum aërem non misceri sanguini, & pulmonibus saltem malignam qualitatem imprimere, quam sanguis transiens inde recipiat & cordi communicet; eodemque modo ex fragrantium usu Lipothymicos refici; petito simili à calore, vitro antimonii vino infuso, &c. existimans hisce casibus non communicari substantiales materialesque dictarum rerum particulas, sed nudas duntaxat qualitates; illud experimentalis Realique Philosophiâ imbutus, nec tam credere quam intelligere cupiens animus admittere nequit. De Lipothymicis enim ut taceam, cum eosdem, utpote Respiratione plerum-

plerumque ferè destitutos, non tam fragrantium particularum in pulmones traductu inspiratuque, quàm nervorum olfactoriorum membranæque narium cavitatem succingentis nervosæ vellicatione, irritatio- neque refici animamque resumere opiner; considerandum optimè ducō; qualitates nullatenus absque subjecto substantiali materialique, vel ipso Peripatu iudice, subsistere, adeoque nec communicari posse; si enim sanguis transiens ex pulmonibus quicquam recipere cordique communicare debet, necesse est, ut aliquid sit Materiale (nam de immaterialibus hic nulla, ne quidem suspicio) tanquam objectum sanguinis, quod secum ad cor rapiat. Si verò quidditate materiali substantialique fuerit destitutum, quomodo recipi ac cordi communicari possit, fateor me concipere non valere. Si alii forsan tanto concipiendi intelligendique vigore polleant, ut, quomodo ejusmodi qualitates absque subjecto materiali existere sustentarique, nec non recipi & alio deportari possint, clarè percipiant, intensè ab illis flagitabo, velint mihi modum ejusmodi subsistentiæ, recipientiæ, ac transportationis ad vivum depingere, & parallelis naturæ phænomenis collustrare. Interim ego cum modernis, quos naturæ sedula observatio ac Experientiâ creavit, Philosophis dicam: calorem formaliter consistere in velocissimâ corpusculorum minorum agitatione, idque cum respectu ad sensum tactus; subjectivè verò seu materialiter in particulis ejusmodi subtilibus exilibusque. Adeoque uti calor non potest esse absque velocissimâ minimorum motitatione; ita nec velox hæcce agitatio fieri potest absque subtilissimis corpusculis tanquam substantialibus materialibusque motus hincque caloris (soliis sensus respectu sic dicti) subjectis. Ex vitro verò antimonii, quod revera corpuscula vino communicentur, non verò imaginaria saltem qualitas in illum transeat, patebit ingenio Lectori ex Pechlini *Tract. de Purgantib. p. 78.* nec non ex Tractatu permultis Experimentis referto illustri. Philosophi Boylei de corporum Atmosphæris; ubi præterea vel ipsum ignem seu ignificas particulas sensibilibus gravitare, ac lancibus librari posse reperient Peripatetici, tanquam paradoxorum omnium sibi forsan *ἡ ἀδοξάζειν*. His omnibus pro aëris in sanguinem transitu addi possent Viri clarissimi eund. pariter asserentes, nimirum Helmontius, Gassendus, Platerus, Sylvius, Deusingius, Thrustonius, Mayowius, Entius, Backius, Schwammerdammius aliique complures; nisi in faniori Philosophiâ, quæ ipsam rerum veritatem duntaxat pro principalissimo venera-

Tom. II. Pars 2.

tur scopo, non tam Autoritatum quàm talium, quàm Rationum atque Experimentorum vigere momenta optimè nossem.

§. 8. Cum itaque ex deductis hæcenus argumentis sufficienter constare arbitrer, aerem inspirando haustum in massam sanguineam, hinc & reliquos corporis succos partesve transire; paucis modum ingrediendi innuisse congruum erit, utpote qui & ipsi sagacissimo Philosopho Boyleo, nec immerito, explicatu difficilis censetur, *cum tantum absint (uti egregius Vir loquitur) Systole & Diastole cordis & pulmonum ut sint Synchronicæ.* Sed in opinionis nostræ patrocinium notemus sequentia 1. de viis, quibus ad sanguinem aër feratur non esse amplius dubitandum, cum eadem ex modo dictis clarissimè evincantur, licet adeò exiles sint, ut à priori sub sensum non cadant. Quibus epim halitus crassiores exeunt, iisdem ut aër, halitibus multò subtilior, ingredi possit necessario, saltem viarum capacitatem quod spectat, sequitur: 2. Non requiri strictè ad huncce aëris in sanguinem transitum, ut cordis & pulmonum Systole Diastoleque sint synchronicæ, multo minus Isochronicæ. In pulmonibus enim semper aër est præsens, sive inspires, sive expires, sive ab utroque munere cesses, quippe non omnis, imò vix dimidia pars aëris, quem omnium primâ sub partu Inspiratione admisit foetus, subsequentibus expirationibus expellitur; sed eatenus saltem nec ulterius, quatenus & quousque à thorace pulmones constringente exprimi potuit, cum in posterum per vitam integram pulmoneſ thoraci servantur ab aëre contigui atque expansi. Hinc, cum sub qualibet Inspiratione binæ ad minimum observentur cordis systolæ, adeoque & totidem Diastolæ; quod pari etiam ritu sub Expiratione contingit; cumque præter vias, quas dari constat, nil amplius ad aëris ingressum per vasa pulmonis sanguifera in sanguinem requiratur, quàm ut ab altera parte respectu viarum per quas, & Loci, ad quem nullum obstat transeundi & ingrediendi impedimentum; ab alterâ verò parte, respectu termini à quo, adsint Principium promovens illum per dictas vias, vasorum pulmonis sanguifluorum scilicet porulos, quibus oris halitus expirant, ad Locum desideratum, memoratorum scilicet vasorum cavitatem sanguinemque in illâ existentem: Dispiciendum erit, quo tempore nulla adsint impedimenta, principii, aërem moventis, actionem sufflaminare valentia; nec non quo tempore principium illud movens præsto sit agatque. Si enim dari potest temporis punctum, quo principii aërem moventis

[Bbb bb 2]

Actio



Actio simulque impedimentorum dictorum defectus coincident atque concurrant, nil prohibebit, quin concludamus, aerem illo temporis puncto in massam sanguineam transire.

§. 9. Principium aërem ad sanguinem propellere valens vel erit gravitans ejus moles, idque sub Inspiratione; vel thorax pulmonum interventu eundem comprimens, idque sub Expiratione. Adeoque in utroque respirationis actu principium movens agit, unde & semper aëris aliquam particulam in sanguinem propellere posset, nisi, impedimentis infringeretur ejus actio. Quæ proinde aliud nil erunt, quam sanguis à corde in vasa pulmonalia propulsus, atque halitus inde exhalantes. Sanguis impulsus si per intervalla cesset, uti reverà id fit in Diastolis, movens verò aerem principium nihilominus interea actionem suam adhuc continuet; cessante hoc impedimento, id est, in cordis Diastolis aerem in massam sanguineam transire colligimus. Cum itaque sub inspiratione binæ, uti supra dictum, fiant cordis Diastolæ, totidemque sub Expiratione; ergo bis ad sanguinem accedere poterit aër, eique permisceri inspirando, totiesque Expirando. Nec metuendum erit, ne aër inspirando irruens vasa sanguifera pulmonis coarctet, atque sic sibi met ipsi vasorum porulos, quos ingredi deberet, præcludat; quin potius eosdem distendat mediantibus, quas inflat atque expandit, pulmonum vesiculis, quibus quippe vasa arctissimè sunt intertexta, adeò, ut iis quaquaversis non possint non simul distendi, hincque porulos aëri præbere patentiores, quos impulsu sanguinis cessante aut sub Inspiratione propriæ gravitatis mole irruendo trajiciat, sanguinique sese immisceat: aut sub expiratione à thorace comprimente compulsus ingrediat, atque hoc demum modo ad sinistram cordis ventriculum, & consequenter reliquas corporis partes pertingat, in quarum deinde peripheriâ partim ob sanguinis propulsu, partim verò & quidem potissimum ob calorem corporis rarefacientem ejusque vim Elasticam augmentem simul cum transpirandis, quibus obvolvitur, foras proscibitur atque exterminatur; unde & sanguis venosus maximam partem aëre depravatus ac nigricans reperitur. Halitus verò quod attinet ex sanguine egredientes, nec illi obstaculo esse poterunt, quo minus aer illum ingredi queat. Nam sive à cordis impulsu, adeoque saltem sub hujus systole; sive à sanguinis calore, sicque continuo, halitus è sanguine expelli dicantur, (ab aeris siquidem expansione Elasticâ, uti in corporis peripheriâ, fieri id dici nequit, cum sanguis venosus,

qualis pulmones intrat, aëre fere penitus in Diapnoe fuerit orbatus) neutrum tamen officere poterit: Non primum; nam tunc aeris ingressum ad sanguinem fieri, nostram non fert opinio: Nec secundum; quamvis enim halitus continuo caloris fotu exspirarent, attamen cum aeris inspirati temperies sit frigidior, simulque illapsus ejus tam fortis, ut, uti experimentis constat, etiam vesicam, remoto corpore circumstante dirumpat; idcirco languidum hunc halitum facillimè superabit; ac insuper cum tantis hiatibus ac poris præditus sit, ut vel ad sextam septimamve spatii partem comprimi possit, multoque denique subtilior existat; halitus in pulmones admittere ac nihilominus ob substantiæ suæ subtilitatem vasorum porulis se insinuare sanguinemque subire poterit. Exspirando autem, cum non tam promptè sinuosis pulmonum vesiculis abigi queat, quin quodammodo contrahatur; hinc, velintne an nolint halitus, ista thoracis pulmonumque constrictione quoad aliquam sui partem ad sanguinem transmeabit. Quod autem nec adeò leviter quidem, contrahatur aër sub Expirationis actu probatur Experimentis tum propriis, tum ingeniosi Mayowii *p.* 276. in quibus si thorax exspirando vulnere perforetur patulo, pulmones etiam extra vulnus prorumpere nituntur, ab aëre scilicet à thorace exspirante coangustato. Hinc sequitur aerem in sonoris sui expirationibus cunctis, v.g. in loquelâ, cantu, clamore, &c. semper magis in pulmonibus coarctari, adeoque & largius, quàm in liberâ expiratione sanguini intrudi; quia scilicet in omni ejusmodi rimulæ laryngis modificationi aëri exspirando remora injicitur, unde & impetuosius allidens sonum edit. Hæc de aeris in sanguinem Transitu fusè dicta sufficiant.

§. 10. Aliam adhuc inter Autores agitari litem cernimus, an scilicet membrana pulmones investiens aërem in thoracis cavitatem sub respiratione ordinariâ transmittat? Affirmativam tuentur Helmontius, Highmorus, Walæus, Tulpius, Harveus, Lindenius, Schenckius, pluresque. Imò Helmontius Junior Alphabeto Naturæ *p.* 39. patrem secutus, uti & Guarinus Guarini, non tantum in pectoris cavum, sed & abdominis penetrare aerem existimant. Ast pace tantorum vitorum, quamvis poros in pulmonis membrana à Walæo, Alex. Benedicto, Plempio, aliisque observatos negare nolim; quamvis porro purulentam materiam in Pleuriticis pectorisque vulneribus, vel denique liquores in thoracis Empyemate immisos, per pulmones ac os rediisse, uti id experientiâ freti testantur Galenus, Fernelius, Paræus, Tulpius, Lommius, Marcherius, Diem-

Diemmerbroccius, alique, neutiquam inficias ire animus sit: attamen in naturali & ordinariâ sanorum hominum respiratione aërem in thoracis cavitatem permeare nunquam credidero. 1. Quia, stante hâc sententiâ, pulmones debite non explicarentur, à solo quippe aëre, uti supra probatum, explicandi, hinc ob eorundem collapsum sanguinis circulus impediretur, adeoque brevi, violentis convulsionibus prodromis animal in præsentissimum vitæ discrimen adduceretur; quod tamen, DEO sint gratiæ, non experimur. 2. Quia non video, cur in thoracisabdominisque cavo tantopere expetere-tur aëris præsentia, ut hujus in illis locis defectu intra pauca horæ minuta animal exanime succumbat, uti factum testantur Experimenta in Illustris. Boylei Machinâ peracta. 3. Quia Pecqueti experimentum contrarium monstrat citatum à Mœbio *Fundam. Physiol. p. 290. imò ab ipso Autore Diff. Anat. p. 146. descriptum: Si vivæ, inquit, dum dissecas, animantis insinuatâ bronchiis inspires avena, quicquid nitare, nullus admotæ lucernæ flammam, nisi quâ tunicam liberaveris, agitabit aer.* His permotus aëri imperviam esse in naturali sanorum respiratione pulmonis membranam censeo. Transitum autem præmemoratorum liquorum, aut membranæ istius erosioni; peculiari pororum figurationi structuræque, versus bronchia liquores quidem, non verò versus thoracem aëra admittendi aptæ; aut denique insolitis naturæ operationibus ad statum ordinarium naturalemve nullatenus applicandis aut concludentibus, acceptum refero. Nonnunquam enim, ut cum Averrhoe loquar, in Medicina fiunt miracula; refertque insigniss. Helmontius *Tr. de injectis Materialibus*, nec non alii, miranda Excretorum per corporis substantiam absque viis adæquatis exempla, quos vide.

§. 11. Restat tandem, dum aëris vestigia exploramus, paucis disquirendi negotium, an aer inspirando cerebri quoque penetralia pro spirituum animalium materiâ subeat? Cujus quæstionis Affirmativam magni mulrique sustinuerunt Viri docti, Galenus puta, Erasistratus, Vesalius, Sennertus, Laurentius, Columbus, Plempius, Fracassatus, alique complures. Sed huic opinioni quò minus accedere queam, argumenta in promptu sunt sequentia: 1. Quia cerebro nullum aëri comparatur inspirando spatium reciproco quodam peculiaris alicujus respirationis motu, aliis corporibus destitutum, ad quod gravitatis suæ illapsu & confluxibilitatis aptitudine aut Elasticâ Expansione ruere atque pertingere adniti posset; quod tamen ubiq; necessario requiri Nobiliss. Virorum ac-

ris naturam præclare detegentia Experimenta demonstrant, si ad locum aliquem pervenire debeat Atmosphæra aërea: 2. Quia aërem per os cribriforme ad ventriculos cerebri in homine vivente penetrare non posse, tum Clariss. Schneideri *Libris de Osse Cribriformi & de Catarrh.* declaratur, tum *autopsia* omnesque circumstantiæ cuilibet præjudiciis non capto monstrant: 3. quia in ventriculis cerebri spiritus animales elaborari, ruinosa est sententia, ab Anatomicis Neotericis accuratioribus diù explosa: 4. Quia perpetuus pituitæ viscidæ in naribus mador spongiosumque os dictâ pituitâ infarctum aëri transitum ad cerebrum denegant, etiamsi os ipsum quodammodo connivere gratis supponeremus: 5. Quia spirituum animalium necessitas est sine interruptione, cum tamen homines sæpè per duas tresve septimanas Gravedine affecti per narium muco obturatas cavitates aërem admittere nequeant, sed ore patulo spiritum ducere cogantur. Imò novi quendam Hamburgi Fidicinem, cui post narium Ulcus totus earundem meatus penitus erat coalitus atque oclusus, sicque per omnem vitam aëris per nares transitu destituebatur: 6. Quia foetus in utero, præsertim grandior, spiritibus animalibus nec caret, nec carere potest, cum tamen nihilominus, veluti paulò post demonstrabitur, in utero nullatenus respiret. Ut taceam valdoperè adhuc dubitari, an aer tanquam necessaria pro spiritibus animalibus materia in eorum confectioe exigatur, cum ab hujus sententiæ patronis id nullibi probetur.

## CAPUT IX.

*Problema Harveanum Doctis omnibus propositum enodando, Fœtus in utero Respirationem discutit diluitque.*

## §. 1.

**S**uperatis nunc de aëris in corpore humano respirante Viis Locisque, ad quæ pertingat, oblati difficultatibus, absque morâ ad varios humanæ Respirationis Usus properarem, nisi prius paradoxam istam (uti illustri. Boyleo haud immeritò audit) Hippocratis sententiam, scilicet quod fœtus in utero respiret, à Doctis quibusdam denuò resuscitatam ac propugnatam, penitus perquirendam ducerem, cum hac occasione quædam gravioris momenti in Respirationis Usibus accuratè enucleandis futura, eventilandam sese exhibeant. Neminem itaque opinor, Eruditorum sacris vel tantillum initiatum latere poterit, Anglicanum illud decus Harveum, insignissimi Philosophi Democriti, animalium intima rimando, vestigia

[Bbb bb 3]

premens

premens, Doctis omnibus hocce Problema Libr. de Generat. Animal. Exerc. de Partu, proposuisse: qui nempe fiat, ut Fœtus in lucem editus, ac membranis integris opertus, & etiamnum in aquâ suâ manens, per aliquot horas citra suffocationis periculum superstes sit; idem tamen secundinis exutus, si semel aërem intra pulmones attraxerit, postea ne momento quidem temporis absque eo durare possit, sed confestim moriatur. Quantoperè Problema hoc Doctorem ingenia exercuerit, quamque feliciter in illo enodando operam navaverint multi, non est, quod disquirendo afferendoque multus sim. Num ingeniosus Schwammerdammius *Tr. de Respir. sect. 2. c. 1.* jure gloriari possit, negotium hoc planè à se esse confectum; judicent Viri in resolvendis arduis naturæ phænomenis circumspectiores. Ego, ut libere, quid sentiam, fatear, non satisfactum esse ab illo permultis, si non omnibus, arbitror, cum non tam ex rerum naturalium effectibus, quàm ex precariis Clariss. Sylvii & Cartesii hypothésibus, ingenti adhuc difficultate laborantibus, deduxerit rationem, cur Fœtus aëre destitutus confestim moriatur, qui tamen momento vix antea eodem optimè carere poterat; nec tamen eruditorum, quod sciam, ullus difficillimum hoc Harvei Problema solidè enucleavit.

§. 2. Non unas, confiteor ingenuè, horas, imò dies, ne dicam septimanas, anxie me torset Problema illud, ab ipso etiam Harveo Anatomico ac Medico Exercitissimo doctissimoque absque resolutione dimissum: parumq; aberat, quin penitus de ejusdem plenariâ ac cautis ingeniis, Realisque Philosophiæ Cultoribus satisfaciente, elucidatione desperassem. Animum quidem certò ex multorum huc facientium diligenti pensitatione persuaferam, subitanæ ob Respirationis defectum oriundæ mortis, (aut vitæ saltem ad sensum cessationis) causam potissimum & in peculiaribus circa & in fœtus corde extractis Vase ac Anastomosi ovali esse quærendam; meritò ratus, sapientissimum rerum omnium Creatorem in finibus suis errare neutiquam posse, nec frustra mirabilem illam Meatum in fœtus corde unionem ordinasse. Attamen tam intelligibiliter Autores de modo dictæ Unionis in homine nato Abolitione loquuntur, ut, talis istorum Meatum Clausura, qualem proponunt, quamvis forsitan, si Diis placuerit, in adultioribus tolerari posset; nihilominus in Fœtu vix nato ac paucis post partum momentis, quando probabiliter saltem, indicato ab ipsis modo, contingat, doceri intensè aveam; idque in primis de Foramine Ovali, copiosiori quippe sanguini cursuque expeditiori transi-

tum præbente, quam Canaliculus, adeoque ob sui occlusionem majorem etiam, ac denique totalem vitæ noxam inferente, cum & in quadrimulis, quinquennibus, natuque grandioribus pueris meatus in corde adhuc patentes fuerint observati & aperti, referente Cornelio Consentino, *Progn. pag. 309.* Illud proinde, si aliquantulo post partum tempore ita coalescere & exsiccari cum Bartholino *Anat. Reform. p. m. 275.* & Cornelio Consentino *loc. cit.* putetur, ut locus hic nunquam pertusus fuisse videatur; siue ita ut solum saltem vestigium in natu grandioribus aliquod relinquatur, quod Arantius *Tr. de Hum. Fœtu. c. 14.* voluit: nullum tamen horum paucis minutis post partum ita contingere potuerit, ut transitu sanguinis per pulmones, ob respirationis defectum, collapsos, præclusio, fœtus confestim moriatur, uti Problema Harvei loquitur.

§. 3. Insignissimus tandem Kerkringius Anatomix non minus quàm Chymix calen-tissimus Autor ac de Primis tenellorum fœtuum Exortibus omnium meritissimus, Spicilegii sui *Anat. obs. 94.* fulgidissimam hisce tenebris lucem afferre videtur; Dictas enim Autorum opiniones meritò recusans frequentem *avtoψία* adducendo asserit, se cuilibet ostendere posse, Foramen illud Ovale non aliâ materiâ, quam suâ ipsius Valvulâ in Nato & respirante infantulo claudi. Modum autem occlusionis, cum is, quem Clar. Autor indigitavit, mihi non satisfaciât, sic explicô: nimirum fieri Occlusionem, & quidem remotè, quia sanguis viâ magis recta ad pulmones fertur, nec oblique per canaliculum diverti cogatur, hincque minus in dextra auricula remoretur adeoque & Valvulam minori impetu protrudendo aperiat: immèdiatè autem à sanguine ad sinistrum cordis ventriculum copiosius tunc detruso, valvulamque illam ita in transitu suo per venam pulmonalem (in quam Foramen alias patet) ad foraminis marginem comprimente, ut amplius commodè aperiri nequeat; Manere autem, (pergit Autor) Membranulam istam tralucens & tenuem Valvularum omnium more; nec crassescere, nec exarescere, nec solum saltem foraminis vestigium relinquere in natis, sed ita, ut valvula semper permaneat corpore, tenuitate & perspicuitate; imò clare à reliqua Septi substantia differens cuilibet exhiberi possit, ut nullus dubitandi locus relinquatur. Cuncta hæc qui attento animo libraverit insimulque perpenderit: 1. Meatus in corde fœtus esse factos pro sanguinis trajectu, utpote cujus circularis curius pari cum vitâ passu ambulat, quique per pulmones, dum fœtus membranis & utero sepultus aëreque omnino destitutus jacet, col-

lapsos



lapsos pro rei exigentia transire nequit; 2. Sanguinem autem pulmones permeare non posse, quia in foetu nondum nato sunt contracti atque dense coarctati respirantium respectu: 3. Pulmones esse coarctatos in dicto foetu ob principii eos ceteroquin in nato explicantis atque expandentis, aëreæ puta Atmosphaeræ, defectum. 4. Hanc denique deficere ob crassarum dupliciumque, si non triplicium, secundinarum arctissimam, aëremque penitus arccentem texturam, nec non ob oris uteri exactissimam clausuram, quam præter Hippocratem & Galenum ceu oculatus & authenticus testatur testis Celeberrimus Anatomicus Diemerbroccius *Anatom. p. 383.* observationem afferens, se propriâ experientiâ os uteri in pragnante foetum longitudinis manum æquantis gerente glutinoso tenacique humore clausum invenisse; idque tam exquisitè, ut nec stylus, nisi vi per gluten adactus, immitti posset. Hæc, ut plura omittam, qui probe, inquam, attenderit, simulque sedulò consideraverit, quam promptè, laxè, ac fortiter Aër à quocunque tempore, multò magis calore expandatur, sicque majus spatium occupet, (quod ad Pulmones Animalium spiritu cohibito enecatorum fufius applicatum vide *cap. 10. §. 8.*) subitanæ non tantum mortis ob Anhelitum nato infanti præclusum, causam; sed & simul, quâ veri similitudine reanimata hætenus à Doctis quibusdam asserta Foetus in Utero Respiratione gaudeat, haud difficulter reperiet. Harveanum itaque Problema sic solvo; Foetus Aquis suis ac Membranis integris circumdatus, Utero licet exclusus, vitalis persistere potest, quia sanguis illius adhuc, uti & in Utero, per Foramen Ovale & Canaliculum arteriosum, cursum suum circularem, pro vitâ quippe servanda absolutè necessarium, sine remorâ peragere potest, pulmonibus interim nec Aërem illos aliâs insufflantem, ob secundinarum integritatem; nec consequenter sanguinem ob sui, propter Aeris defectum subsidentiam admittentibus, adeoque valvulam Anastomoseos ovalis sanguine mediante occludentibus. Contrâ verò Foetus semel respirans, si illi os nareque ac omnis Aeris via præcluditur, quoniam Aer, vel unicâ factâ Respiratione, in pulmonibus restitans confestim à calore in pectore maximo latissimè fortiterque expanditur (quod uberius & satis clarè explicatum vid. *c. 10. §. 8. &c.*) qui expansus vesiculas Pulmonum iustâ amplius distendit; hæc distensæ, cum aliud spatium, in quo aucta eorum magnitudo recipiatur, non detur, vasa Pulmonalia comprimunt, hisque mediantibus (cavitate eorum aut penitus, aut maximam partem abolitâ) sanguinis Circulationem aut statim tol-

lunt, aut eatenus remorantur, ut brevi congrumescendo stagnare incipiat; quo stagnante, inque cursu suo planè impedito Valvula Foraminis arctè clauditur, sicque sanguini omnis penè via tum per Pulmones, tum per Foramen Ovale obstruitur; quo facto, cum Canaliculus arteriosus Foramine longè angustior universo Foetus sanguini transmittendo incapax prorsus sit, cor perpetuas corporique viventi mortiferas Systolarum suarum cessationes reassumit; unde Vitalia indicia interciunt cuncta, morique dicitur Foetus. Ab hoc etenim cordis ac consequenter Sanguinis Motu Vitæ Animalium Characteres, veluti à Pondere appenso seu Elatere Chalybeo Horologii Effectus, dependere videntur. Sed hæc omnia plenius deducta & explicata vide *§. 7. hujus Capituli, nec non §. 8. & 9. Cap. Decimi.* Sola itaque partium cordis structura atque connexio, monstrans Valvulam Foraminis Ovalis à sanguine in Respirantibus illicò per pulmones propulso, illamque ad foraminis oram arctè premendo affingente, claudi, nec non Aeris à Calore Rarefactio, docens vesiculas pulmonum ab eo in foetu cohibito fortiter expandi, vasaque sanguifera in pulmonibus comprimere, sicque circuli sanguinei remoram moxque mortiferam cessationem inferre, Problema Harveanum optime solvere videtur, adeoque firmiter stabilitur id Illustrissimi Baconi de Verulamio, *solum scilicet Naturam esse arcanorum suorum Interpretem fidissimam.* Quod tamen in hoc casu non sine Celebratissimi Kerkringii solertia contigit, quâ sine si fuisset, ulterius forsitan adhuc, uti hætenus factum, surdis narrasset fabulam.

*§. 4.* Negamus proinde Foetum in Utero existentem ac secundinis integris obvolutum respirare, hoc est, pulmones ejus ab aëris gravitantis mole explicari ac thoraci, (licet hic dilatari Respirantium in morem frustra concederetur) coexpandi. Negativam nostram solidis hisce suffulcimus argumentis: 1. Quoniam pulmones in Foetu aëre nondum fruente, consentientibus omnibus, qui eos cultello anatomico subjecerunt, sunt contracti atque compacti subsident, nec thoracis internæ superficiei contigui & coexpandi. Addere possem colorem pulmonis in dicto Foetu rubicundiorum esse, si non ad partum usque, saltem ad paucos ante partum menses. Quod confirmant Galenus, Bauhinus, Spigelius, Hoffmannus, Harveus, Highmorus, Thrustonius, Schwammerdammius, Diemerbroccius, &c. Postremus quippe hic Charletonem, nullam penitus inter adultorum & Foetus in Utero pulmonum coloris differentiam agnoscentem, *Oecon. Animal. p. 170. multiplici fretus experientia*

*tia refutat Anat. sua p. 512.* sed fallere posse hoc indicium opinor. Quidam Autorum etiam pulmonum foetus in aquâ subsidentiam contra respirationem in utero adducunt. Quod itidem experienti non satis cauto imponere posse existimo. Cum enim ex Hydrostatices legibus constet, corpora omnia, in specie, uti loquuntur, aquâ ipsâ leviora, in eadem supernatare, si sufficienti aquæ quantitati immittantur; pulmones autem uti membranosa & carnosâ omnia specifica gravitate aquis cedant; hinc tam foetus nondum respirantis quàm nati pulmones supernatare possunt, si modò sit magna aquæ quantitas illos circumfluat. Adeoque non sequitur: pulmones, quia supernatant, Ergò, foetus respiravit; nec vice versâ. Nam quod quorundam experientia velit pulmones fundum petiisse, id ipsum justâ minori aquæ quantitati tribuendum, quam facilè immissi pulmones mole sua dispellere & ad lococedendum adigere, sicque subidere potuerunt: 2. Quoniam principium expansionis pulmonum foetui in utero deest. Nam uti ex supra dictis liquet, impossibile est, aërem uteri viscida pituita infertum os interius ac densas Foetus secundinas permeare posse. Præsertim cum Illustriss. Boylei *Experimento Quinto Tr. de Vi aëris Elast.* constet, Velicam agniam (quâ secundinæ foetus quadruplo facilè crassiores) dum ex Vitro, cui post modicam inflationem arctè ligata erat immissa, aër illam ambiens non adeò magnam partem esset exhaustus cum insigni fragore & scissurâ maximè hiulcâ fuisse diffractam ab aëris inclusâ expansione. Quod si poris fuisset aëri pervia, nullatenus evenisset. Unde multò minus aërem Secundinas pertransire posse concludendum, etiamsi, quod tamen æque experientia negat, Uteri os subire posset. Accedit, quod aër sponte nullatenus corporibus aliis destituta spatia irruat, cum tamen Uterus à Secundinis & Foetu satis repleatur.

§. 5. 3. Quoniam Foetus pulmones liquore, cui ore hiante innatat, Nutritio, non sine maximo suffocationis periculo infarcirentur, si intra membranas existeret aer, aut alia quadam tenuis ac halituosa substantia seu pondere seu Elatere pollens tanto, ut exinde pulmonum antra (si forte fortuna thorax amplificaretur) irruere valeret. Cum enim ut suprâ demonstratum est, pulmones efficienti aerem alliciendi causâ careant, hic verò non nisi aut gravitatis mole ac pressurâ, aut Virtutis Elasticæ ratione eos illabi possit, necesse foret, ut simul, si in membranis preesto esset, Liquorem Nutritium in asperam Arteriam impelleret, utpote qui Foetus fauces alluit. Notavit enim Corn. Consenti-

nus, *Progymnasim. p. 260. catellos in utero hiante ore in circumfuso liquore natate, cui consonat Bartholinus, Libr. de Vaf. Thorac. nimirum catellos innatare humori Annii ore aperto, & exsertâ non nihil lingua.* Sicuti & in ore, œsophago, ventriculo & intestinis humorem illum reperiunt Harveus *Exerc. 70.* Bartholinus, *l.c.* Corn. Consentinus, *l.c.* Rudbeckius, *Obs. 9.* Nec dubitandum est amplius de Foetus in utero Nutritione per os; cum tot tantique viri Hippocrates, Democritus, Epicurus, Galenus, Licetus, Harveus, Charleton, Courveus, Everhardus, Barbatius, Aldes, Consentinus, Bartholinus, Nedhamius, Rudbeckius, Diemmerbroccius, alique evidentissimis rationibus atque observationibus Anatomicis eandem extra omnem dubitandi aleam, si cuncta judiciosè conferantur, posuerit. Requirit autem necessitas, ut Liquor Nutritius semper præ faucium patulis foribus præsto sit, cum cochlearia foetui in utero desint ac manuum quoque usu in hunc finem ob corporis curvaturam frui nequeat. Nec ullatenus Nutritio foetus per os, simul Respirationem in utero arguit, cum Deglutitio & Respiratio sint munera plane discrepantia, ac tum causis, tum materiebus, tum instrumentis, tum viis, tum agendi modis, tum finibus, penitus diversa. Quorsum assero experimentum ejusmodi: si quis liquorem v. gr. Cerevisiam ore ac buccis detineat, eamque, auribus prius ob incommoditatem ab intorsum nitente aere oriundam, sedulo obturatis, nec non naribus omninò obstructis, oreque insuper clauso, deglutire conetur, promptissimè id effectum dabit, etiamsi & volens à respiratione abstineat, & aeris per os nareve accessus exactè sit sufflaminatus. Novi quidem Nedhamium & alios forsitan tum ad aerem Liquori Nutritio interspersum, tum ad halitum sive Gas, uti Helmontio vocatur, ex istius fermentatione assurgentem, confugere. Sed rehero 1. Constare quidem experientiâ Machinæ pneumaticæ adminiculo captâ aerem liquoribus ferè omnibus esse immixtum; attamen paucissimum ac non nisi cum insigni Liquoris continentis ebullitione & intumescentiâ ab illo separabilem respirationisq; respectu vix consideratione dignum, nec pulmones expandere valentem: 2. Fermentationem tantam nullâ probabilitatè in Liquore Nutritio supponi posse, quæ, copiosum Gas extrudendo, expansionis pulmonum efficiens principium suppeditare posset: 3. Quamvis & aer in Liquore disseminatus & halitus, quem fermentescendo exsurgere gratis supponit, junctâ operâ aliquot fortassis diebus eò usque tandem copiâ invalescere possent, ut ad unicam

eam pulmonum Expansionem sufficerent; attamen considerent æqui rerum arbitri, quam ridicula hæc foret respiratio, quæ duobus vel tribus denique ne dicam pluribus diebus, unicâ forsân vice celebrari posset. Ut taceam, unde continua aeris recentatio adventare deberet, postquam prior exspiratis effluviis esset onustus. Eâ tamen non nisi sub mortis poenâ carere posse Respirantes, monstrat invicta illustriss. Boylei Experientia p. 441. *Tr. de Vi aeris Elast.* quâ aviculam Recipienti exquisitè clauso inclusam, nullâ factâ exantlatione, ob aeris Transpiratis ab illâ Exspiratisque Aporrhœis aggravati denegatam recentationem intra tres horæ quartas, præviis permultis violentisque vomendi conatibus moribundæ similem collabascere, docemur. Præterea quorsum quæso aer exspiratus abiret tandem? nisi fortassis prægnantes cunctas brevi redderet Tympaniticas: Ultimò 4. hæc opinio Nedhamii iisdem premitur difficultatibus, quas suprà jam adduximus, scilicet, quod, si aer aut vicarium quoddam expansionis pulmonum principium intra Foetus membranas stagnaret, liquorem Nutritium ejusdem pulmonibus impingeret, adeoque suffocationem minaretur tenello infantulo certissimam.

§. 6. Ulterius in genere foetus in Utero respiratio destruitur 5. quia foetus intra Secundinas vivit, iisdem autem exemptus ac respirans, si aëre destituatur, moritur, in easdem etiam Secundinas repositus, teste Harveo *Exerc. de Partu.* Hinc concludo, si antea respirasset in Secundinis, vixissetque, cur in easdem repositus respirare & vivere nequiret? 6. Palmarium erit argumentum Meatum in corde foetus singularissima structura, quos ad tempus saltem peculiari operâ creavit summus rerum omnium Architectus cum in finem, ut sanguis pulmones ob explanationis defectum permeare nequiens illac transeat, sicque ejus circulus cum vitâ foetus perstet. Horum enim Meatum usus vel unicâ respiratione factâ aboletur, quia promptior sanguinis per hiantes pulmones transitus illorum præcipuum, Foramen puta Ovale, Valvulâ suâ exquisitè claudit, eamque foraminis margini quasi agglutinat, Canaliculo interim arterioso pro totâ sanguinis in corpore mole transmittenda, nullatenus sufficiente: 7. Denique, quoniam nullus respirationis in foetu ex Uteri latebris nondum eluctato Usus ac Causa Finalis sese offert, quâ tum temporis commodè caruisse non posset; quæ tamen tanquam causarum prima prærequisita fuisset, antequam causæ constituentes exigenterentur. Principalissimus enim Respirationis in nato Usus est, sanguinis Circulatio absque interruptione servan-

Tom. II. Pars 2.

da, sine quâ nulla, perfectiora ad minimum uti vulgò (quàm rectè hic non disputo) distinguuntur, animalia, notabili temporis spatio vitam agere posse videntur. Hæc autem Circulatio, cum in foetu nondum in lucem edito absque respiratione per peculiare ad id efformatas Vias optimè peragiqueat, ceteri autem brevi post enumerandi Usus pro foetus vitâ absolute non sint necessarii, inconcussa stabit sententia, illum in Utero non respirare. Videntur sanè Auctores, forsitan ex præjudiciis, operosius allaborasse in respirationis actu ipso, quam ejusdem necessitate usibusque in foetu nondum nato adstruendis, cum tamen sapientissimus naturæ Parens nihil faciat frustra & absque certâ Finali causâ. Maternæ autem Respirationis Usus foetui non penitus denego, cum ex suprà probatis constet, aërem ad omnes corporis succos, sanguinem præprimis, transire. Hinc quin cum Liquoribus tenello foetui à matre communicatis aliquantulum aeris simul in illum transeat, nullatenus dubitandum. Ex pauxilli autem hujus aeris defectu foetus neutrquam paucis minutis mori potest, cum in Sectione Cæsarea, observante Harveo post mortuam matrem horis complusculis intra Secundinas aeris nil indigens Vitalis perstet. Nec indiget foetus largiori aëre, cum Transpiratio ejus sit parcissima, partim quia ad solam duntaxat necessitatem alimento utitur voluptuosis gulæ illecebris minimè indulgens; partim quia assumpta fere cuncta ac tota quanta in corporis ipsius substantiam mutata accrescunt, unde & tam prompte corpusculum ejus 9. mensium intervallo tantopere augetur, ut, si largius iste accretionis gradus post partum eodem tenore produceretur, ingiganteam tandem molem excreveret homo. Hinc fortassis haud incongrue colligi posset, Transpirationem per os & cutis spiracula, ab aëre in respirantibus potissimum causatam atque promotam, esse in causa, cur hominis, nec non brutorum, accretio tam insignem post partum, adultioribus præprimis annis, patiat remoram. Postremò Vagitus uterinus invincibile nonnulli existimant argumentum pro Respiratione foetus in utero demonstranda: Sed cum muliercularum, quæ plerumque in hisce casibus invocantur testes, sublesta admodum fides, nec satis circumspecta sit observatio, ut pro basi Problematis hujus resolvendi inservire queat, meritò suspicamur cum Clariss. Diemerbroccio, vagitus, si quis certò observatus fuerit, è sibilo intestinorum flatulentorum à foetu compressorum ortum duxisse, qui sæpè mirus auditur, suspiria gemitusque in quibusdam mentiens. Similia quoque ad pipientium pullorum, intra ovi testam

[Ccc cc]

adhuc



adhuc existentium, sonum, quem editum ferunt aliquando, reponimus: Præprimis cum extenuatus aquæ vapor ad corpora tenuiora allisus non minus sibilum excitare observetur: uti id Experimento probat Illustris Boyleus *Tr. de Aere pag. m. 466.*

§. 7. Tandem & ipsemet hanc excogitavi objectionem contra meam Problematis Harveani solutionem, quod licet foramen ovale à valvula propria, simul ac inspiraverit fœtus, sanguinemque per pulmones admiserit transiturum, illicò occludatur, attamen id non tam tenaci agglutinatione fieri posse videatur, quin vasis pulmonum, ob vesiculas ab aere per calorem rarefacto, distentas, compressis, sanguis à corde propulsus, valvulam rursus à foraminis ostio dimovere, sicque pristinam, quâ in utero gaudebat, viam resumere; adeoque vita fœtus superstes esse possit. Non levis, fateor, hæc difficultas alicui apparere posset, quam tamen mox dilutam atque sublatam dabimus. Considerandum itaque optimè duco, pulmones in Respirationis ob spiritum præclusum defectu non esse in eodem statu, quo usi fuerunt in utero ante omnem inspirationem: simul ac enim vel unicam sui dilatationem passi sunt, confestim sanguinem admittunt, eoque deinceps indefinenter præsentem scatent, à quo & valvula foraminis occluditur. Dum itaque natum, quodque respiratione semel gavisum est, animal suffocatur, hoc est, dum omnis aëri recenti via per nares atque os præcluditur, necessariò pulmonum vesiculæ ab aëre, per calorem pectoris rarefacto, fortiter expanduntur, vasæque sanguiflua rursus comprimunt; Hæc dum comprimuntur, sanguinem intra se remorari faciunt. Remorari notanter dico, non enim penitus sanguinem iterum excludunt, exprimuntque è sua cavitate, uti ante omnem inspirationem in fœtu nondum nato fiebat, quod testantur pulmones suffocatorum animalium, sanguine penitus infarcti. Hinc & adempta Nato respiratione, semper adhuc sanguinis aliquid admittunt, quamdiu cor à pulsû nondum omninò cessat, & sanguis adhuc fluidus est, licet cursu valdè impedito. Hic autem dum in cursu impeditur, cordis motus, aeris in elasticitate sua, per calorem valdè aucta, fortioris facti actionem (qua vesiculæ pulmonum distenduntur, hincque vasæ sanguiflua comprimuntur) superare haud valens, fit languidior, ac sensim cessare incipit. Motus enim cordis à variis causis facillimè modificari potest, leveque saltem in sanguinis cursu obstaculum sentiens, tum fortitudine, tum frequentia imminuitur, quod crebris phenomenon notum. Cordis itaque motus dum successivè remittit, sanguis in dextro ejus ven-

triculo & auriculâ, pulmonumque vasis stagnare, ac brevi concretere incipit, idque imprimis in vena pulmonali, utpote à cordis impulsu, qui adhuc languidus superest, remotiori. Sanguis autem, dum in vasis, ac pulmonali præcipuè vena, stagnando concrevit, necessariò valvulam, quam antea solo transitu clauserat, arctius jam comprimit, sicque nullam sanguini illac transeundi viam (aëre subinde ulterius, latius fortiusque à pectoris calore rarefiente, hinc & magis magisque vasæ pulmonalia sanguiflua, adeoque & venam pulmonalem, vesicularum pulmonis interventu coarctante ac comprimente) permittit; unde tunc circulatio cum vitæ characteribus omnibus cessat. Et hæc erit genuina allata Objectionis solutio. Nam, si pulmones, simul ac Respiratio adimitur, ad pristinam, qualem ante partum habebant, coarctationem coincidentiamque omninò redirent, sanguinemque omnem admissum, ut & aërem inspirando haustum, illicò ante illius congrumationem, hujusque expansionem, exprimere penitus possent, adeò ut nullus de novo intra illorum vasæ admitteretur, tunc sine dubio sanguis à corde propulsus valvulam foraminis ovalis rursus aperiret, circulumque cum vita continuaret. Jam verò cum 1. pulmones non planè ad priorem, quam in nondum Respirante obtinebant, coincidentiam angustiam redeant, ac aër in illis restitans, perque calorem pectoris expansus, neque liberum prorsus sanguini per illos cursum permittat, neque tamen catenùs à pectoris calore rarefiendo expanduntur, ut vesiculis pulmonum mediantibus sanguinem omninò omnem ex vasis rursus exprimat, arceatque; sed hæc (2.) sanguinem quodammodo intra se retineant, subindeque quamdiu cor pulsât, & sanguis nondum coagulatus est, novi quid admittant, neque tamen ob sui compressionem, hincque ortam cavitationis imminutionem, eidem sanguini ritè transmittendo sufficiant, cum & (3.) sub sanguinis remoris cordis motus pulsificus illicò imminuatur; unde sanguis circulari cursu, tum à posteriori, tum consequenter à priori impedito atque cessante, hic (4.) stagnet, moxque congrumescat; sicque in grumum concrevens, (5.) vasæ pulmonum sanguiflua expleat, infarctiatque atque hæc ratione iterandam valvulæ aperturam impediat; quâ impeditâ, cum alia sufficiens via non detur, (6.) circulatio sanguinis sufflaminetur; idcirco animal post partum, respiratione semel factâ destitutum, vitam denique amittit, etiam si ante partum non respiraverit. Quod autem ab Autoribus nonnunquam in quadrimullis, quinquennibus item grandioribus pueris, meatus in corde fuerint observati paten-

patentes atque aperti, uti Cornelius Consentinus *Prog. p.* 309. refert, partim inde oriri potuit, quod Respirationis defectus, licet aliquoties fortassis ingruerit, illud tamen iterum cessavit, antequam sanguis in grumum abiret; partim quod sanguis forsân admodum copiosus in illis fuerit, ac post partum largâ nutritione auctus, ut non tam expeditè per solos pulmones, quàm insimul per dictos meatus transire potuerit, atque hac ratione illos servaverit. In Lutris verò, castoribus, phocis, anatis, aliisque amphibis sub aqua diutulè viventibus commemoratos ductus in corde patentes ob id interdum remanere posse credo; quia (1) sæpiùs aquis immerguntur, rursusque emergunt, idque à primis ferè exortibus; sicque spiritum jam cohibent, jam denuò hauriunt, alternis vicibus frequentissimè id ipsum quotidie repetendo: (2) quia sanguis illorum non tam citò in grumum concrevit, quàm majorum animalium in terra degentium, calidiorumque. Hinc fortassis non adeò probabilis est opinio Cornelii Consentini, infantes nimirum eò perducì posse, si sæpius in die ora naresque illis obturentur sicque sanguinis portio per memoratos ductus transire cogatur, ut adulti deinceps amphibiorum instar vitam perducant, ductibus iisdem patulis remanentibus; uti & hos patulos esse in urinatoribus, multa sæpè minuta sub aqua durantibus, præsumendum; quorum exempla vid. in Illustriss. Boylei *Tr. de vi aeris Elastica, Digress. &c. Respiratione, & At. Philos. Angl. Edit. Lips. pag.* 86. ex Kircheri *Mundo subterraneo; it. l. c. pag.* 724. Optimè itaque distinguendum censeo inter Respirationem pauca momenta inhibitam, rursusque liberatam; & illam, quæ eò usque suspenditur, donec vita, aut illius saltem sensibiles characteres, aboleantur. Hæc enim, quam mox aeris à calore pectoris expansio, hincque vasorum sanguiferorum compressio ac coarctatio, ac denique sanguinis congruementia sequitur, Valvulam denuò à sanguine aperiri non permittit; illa autem ad hanc iterum aperiendam conducere potest. Confirmantur hæc, quod valvula ob sanguinem in vasis, ac præcipuè vena pulmonali, post respirationem denegatam, concrevissent aperiri ex postliminio nequeat, illâ observatione, quâ in suffocatis dexter cordis ventriculus auriculaque, ac vasa imprimis pulmonalia, sanguine congrumato penitus inferta reperiuntur, testante Harveo, & *αυτοψία*. Neque tamen ob id credendum, hominem natum, & qui semel aërem hausit, penitus respiratione rursus carere posse, etiamsi meatus in corde ovalis aut patulus maneat, aut denuò aperiatur, nisi & illico *α*- omni ex

Tom. II. Pars 2.

parte è pulmonibus rursus exeat, quod tamen nullâ, ne quidem extremâ, expiratione effici potest. Hinc enim in vesiculis pulmonalibus ordinariò, semperque auctâ quantumvis licet expiratione, restitans, simul ac ora naresque occluduntur, à calore præcordiali fortiter pro indole sua expansus, vasa sanguifera comprimit & coarctat, sicque tum horum cavitatem minuit, tum & sanguine mediante valvulam foramini ovali apprimat, unde tunc sanguinis peridromo mora è vestigio injicitur, totaque animalis œconomia, canaliculo solo, utut pateat, pro sanguinis trajecta haud quaquam sufficiente, fataliter brevi post subruitur, uti id plenissimè deductum videbis *cap.* 10. §. 7. 8. 9.

§. 8. Ultimò putaret fortasse quispiam, foetum secundinis exutum, dum respiratio coepta ipsi omnis iterum præcluditur, non ob id confestim mori, quod sanguinis circulatio in pulmonibus propter compressionem vasorum pulmonalium sanguiferorum, ab Arcintus cohibito, perque calorem præcordialem fortiter expanso, factam, contentumque sanguinem inde morantem, brevique in gremium coeuntem, retardetur ac sufflaminetur, sed quod foetus corpusculum, demptis secundinis, ab atmosphæra aeris externi undiquaque comprimatur, cum nullus tunc aer intro respiratione hauriatur, quod in sanguinem transiens externi aeris in foetum corruentis pressioni & constipationi reniti queat, hincque motus vitalis per corpusculi contrusionem compressionemvè mox turbetur, ac moras fatales neccat. Ad quæ respondeo argumento haud simplici: Primò enim ex præmissis satis constat, foramen ovale in corde foetus, postquam semel ob factam respirationem pulmones ingressus est sanguis, claudit, utpote cujus valvula in venam pulmonalem patens, à sanguine illicò transeunte non potest non ostiolo suo apprimi, neutiquam autem rursus aperiri, quamdiu aer in pectore cohibetur, ejusque aestu, promore & genio suo, expanditur, ac sanguinis pulmonalem venam transeundo replet, itidemvè hæret. Canaliculus autem arteriosus cum foramine multò angustior, universo sanguini transferendo prorsus incapax existit, sicque cursus humorum materiae circularis inevitabiliter turbatur ac sufflaminatur. Secundò: Hæc itaque cum certò se habeant, hæcque mora & stagnatio, sanguini injecta ad delenda vitæ munera ac motus utique sufficiat, nec aliâ causâ sociâ ad inducendam mortem indigeat, supervacaneum omninò est, alias hujus phænomeni causas excogitare aut conquirere velle. Tertiò: Constipatio talis ac tanta corpusculi foetus ab aère externo magis speciosa, quàm vera videtur:

[Ccc cc 2]

detur:

detur: siquidem foetus humores, cum matris, ex qua utique decidui sunt, humoribus specie eidem existunt, hincque æquè in foetu, ac pridem in matre, compressioni aeris externi reniti, sicque corpusculi ejus constipationem arcere poterunt, cum eodem, quò in matre aère gaudeant. Imò, si in vasis vel habitu foetus spatiola quædam aut aère, aut alio quodam corpore vacua, sicque aeris externi coactioni obnoxia forent, utique aeris hujus gravissima, ac velocissimo fortissimoque impetu irruens moles, qua, quam crebra experimenta docuerunt, non præstolaretur foetus è secundinis exemptionem, sed illicò simul ac is modò utero excluderetur, utut membranis adhuc integris circumdatus, illum unà cum membranis cò, quo pollet, robore contruderet atque comprimeret, cum secundinæ non minus, si non magis, quàm ipse corpusculi habitus, ductiles, plicabiles ac flexiles existant. Nejam commemorem, in ipsum matris foetu adhuc gravidæ ventrem hanc compressionem ac constipationem aeris agere posse, si ipsius locus ac spatium in foetus corpusculo daretur, nec hujus quoque ac matris humores, aère intus commixto, ac satis, imprimis ob calorem intrinsecum, renitente præditi jam essent, cum etiam metallina vasa exhausta, & corpore resistente vacua, is ipse comprimat atque contrudat, experienciâ teste indubia. Ubi simul extanter notandum, altàque mente reponendum est, aeris elatorem à levi, & juxta Boyleum, manu insensibili calore adeò augeri, ut nifus ejus expansivus aeris extris incumbentis ac gravitantis molem è vestigio & manifestè vincat, dispellat, superetque, uti id thermometra, aliaque experimenta Boylei extra omnem dubitationis aleam dudum posuerunt. Quanto magis igitur calor foetus, non levis & vix tactu sensibilis, sed sat validus, & à matre adhuc quasi æstuans humoribus intus commixtum tali tantoque instruet renisu, quo aeris externi pondus, hincque ortam pressionem nullo negotio subjugare ac dimovere, adeoque invitam illam corpusculi foetus constipationem arcere valeat? Et quemadmodum homo in maris fundo nullam noxiam, multò minus exitialem ab aquis incumben- tibus pressionem sentit, cum tamen aqua ad minimum milliès aère gravior sit, ita nec foetus ab aère externo, qui cum interno ejusdem gravitatis specificæ est, comprimi poterit. Et posito, per fictionem rei, respirationem foetui inde tam necessariam esse, ut aër intrò haustus, minimaque sui quantitate sanguini in pulmonibus admixtus, externi aeris compressioni resistere queat, attamen totius atmosphæræ moles & actio tam

valida, tam velox, tamque momentanea est, ut multò citius universum tenelli corpusculum, nisi aër internus cum humoribus à matre acceptus reniteretur, penitus esset compressum ac quasi contrusum, quàm vel unicâ inspiratione foetus sibi consuleret. Præterea invictum contra hanc compressionem argumentum inde ducitur, quod non tantum foetus mustei partus, quique vix è latris maternis eluctatus est, sed & qui dies atque hebdomades vitæ jam numerat, adeoque sanguinem innumeris aeris externi haustibus satis superque ditavit atque instruxit, æque promptè, si omnis respirationi via præstruatur, suffocari queat, ac is, qui nunquam aerem delibavit.

In hoc sanè grandiore infantulo, si suffocetur, aeris inspirando captandi, ac atmosphæræ externæ reniti valentis defectum, externique hinc aeris compressionem ac constipationem, ceu causam sufflaminati humorum motus vitalis, nullo jure allegare quis poterit, in quo tamen valvula foraminis ovalis per coalitionem ostiolo suo neutiquam ita jam unita erit & agglutinata, ut, si modò per aërem intus cohibitum, & pectoris calore fortiter expansum, vasaque, hinc & venam pulmonalem, adeoque & sanguine mediante valvulam comprimentem liceret, denudò aperiri nequiret, cum vel in quinquenibus nondum coalita reperiatur, testibus Consentino, aliisque. Ut plura regerenda præteream. Manet proinde adhuc ratum certumque, foetum, dum omnis ipsi respiratio rursus adimitur, ideò mori, quod semel haustus & intus cohibitus, aque calore pectoris expansus, vasa sanguiflua pulmonum, adeoque & venam pulmonalem comprimat, eorumque cavitatem imminuat, idque propter simul foraminis ovalis, quam sanguis illuc transiens jam clausit, & ostio suo oppressit, clausum servet, & quò minùs postliminiò rursus aperiri queat, mediante dicto sanguine ibidem tum morante, brevique stagnante, impediatur, atque hoc pacto circulationi sanguinis, cum canaliculus arteriosus huic muneri solus neutiquam par sit, moram necet, moxque penitus obicem ponat, unde tunc animal vivere desinit.

## CAPUT X.

*Respirationis Humanae Usus tum minus principales, tum Principalissimus, ad vivere quippe simpliciter necessarium, ac ne aliquot quidem minutis, nisi cum mortis periculo adimendum, plenius prosequitur: simulque concatenato Quæstionum atque Causarum nexu arduum illud atque bimembre Problema sedulò dilu-*



*dilucidat, Cur scilicet Animalia, tam ob  
Aeris Inspirati cohibiti que præsentiam,  
quam in Machina Boyleana propter ejus-  
dem Aeris Exantlationem paucis  
Minutis moribunda  
evadant.*

§. 1.

**N**unc tandem omnibus semotis, quæ  
Ufibus Respirationis penitus expli-  
candis obstaculo esse poterant, difficultatibus,  
ut ultimam Thematî nostro hucusque felici-  
ter perducto manum admoveamus, ordo  
postulat, cunctos variosque operosi & ad-  
mirandi respirationis humanæ negotii Ufûs  
perferutando. Nemo itaque multiplicia re-  
spirationis humanæ commoda attente perlu-  
strans dubitabit, quin eadem conducat, 1.  
Ad Olfactum; quatenus particulæ odorabi-  
les cum aëre dilatato pectore appropinquan-  
te abripiuntur ac nervosis narium tunicis  
quasi impinguntur: 2. Ad Screatum & Spu-  
tationem; quatenus mucus aut ab aëre, am-  
plificato thorace, irruente è narium ducti-  
bus in fauces repellitur, moxque à thorace  
fortiter expirante extunditur; aut cum eo-  
dem aëre inspirato à thoracis validâ constri-  
ctione à Laryngis cavo protruditur expuitur-  
que. Quos proinde, uti & proximè sequen-  
tes ufûs, quomodo Lambzwerdius negare  
potuerit, haud video: 3. Ad Oscitationem,  
Tussim, Sternutationem, Emunctionemque,  
dum nimirum cum aëre inspirando admissio,  
aut halitus aut mucus viscidior tenuiorve aut  
aliud quid pulmonibus, laryngi, faucibus,  
naribusque molestum seu irritans, forti Ex-  
piratione extruditur: 4. Ad Liquidorum for-  
bitionem, suctionemve; quatenus aëris  
Elatere seu spira, in faucibus, amplificando  
thoracem, debilitata, aër externus liquidis  
vel immediatè vel mediantribus mammis  
aliisve partibus flexibilibus Liquores conti-  
nentibus incumbens, minoremque quam ul-  
libi in faucibus renitentiam reperiens, liqui-  
da in os impellit, musculorum deglutitioni  
dicatorum ministerio ulterius in stomachum  
promovenda ac depellenda. In suctione au-  
tem ex mammis, quin præter aërem ex-  
ternum, Lac è mammarum tubulis in os la-  
tentis infantuli exprimentem, symbolum  
quoque conferata aer internus, omnibus cor-  
poris succis, uti supra probatum, penitissimè  
immixtus, intrinsecâ suâ expansione liquo-  
rem in tubulis lactiferis promovendo, nullus  
dubitandi locus est; Et hic sanè Suctionis ufûs,  
si pulmones potius, quàm tales, quam ipsam  
Respirationis Functionem spectes maximè  
primarius, omnibusque vere respirantibus  
animalibus ad alimentorum assumptionem,  
hinc & vitam simpliciter necessarius est, & ob  
quem præ cæteris pulmones fabricari viden-

tur: 5. Ad Loquelam, Cantum, Clamo-  
rem, Risum, Fletum, Flatum similesque,  
quibus aëris inspirati expulsio inservit, Actio-  
nes; quatenus aer inspirando haustus variâ  
varièque modificatâ sui allisione extrusione-  
que à Larynge, faucibus, linguâ, buccis,  
dentibus, naribus, labiisque diversificatâ  
expirando è pulmonibus oreque expellitur:  
6. Ad Fœcum alvi, Urinæ, Fœtus, Molæ-  
ve nec non Secundinarum expulsionem ex-  
clusionemque; quatenus spatium in abdomi-  
ne, per diaphragma, ab inspirante tunc spi-  
ritumque cohibente thorace propriaque con-  
tractione deors- antrorsum protensum, an-  
gustius factum efficit, ut muscoli abdominis  
comprimentes ac coarctantes in dictis casibus  
intestina, vesicam, uterumque aptius ferre  
atque contrudere valeant: 7. Ad promoven-  
da Ventriculi, Intestinorum, Lacteorumque  
vasorum, imò & fortassis, jecoris interventu,  
Folliculi fellis contenta, quod nunquam fe-  
rians Respiratio, abdomen per diaphragma  
indefessè coarctando relaxandoque quodam-  
modo conducat, penitus quidem negari  
non posse videtur; quanquam collatum istud  
auxilium valdè indifferetum ac pro debitâ  
commemoratorum Contentorum promotio-  
ne indeterminatam admodum appareat: 8.  
Ad halitus aqueos Sanguinis è pulmonibus  
aëris ope exportandos; quos uti supra di-  
ctum, quolibet die ad sèlibram circiter  
adscendere notat Sanctorius *Med. Stat.*  
*Aph. 5.9.* Ad Diapnoen; quatenus aërem  
tanquam primariam, ne adustum relinquant  
crassamentum Transpirata in corpore, cau-  
sam suppeditat, uti in superioribus fusè ex-  
plicatum. 10. Ad Exactiorem Chyli lym-  
phæque descendantium nec non sanguinis in  
capillaribus vasorum pulmonalium ramifica-  
tionibus Miscelam, quæ ruditer saltem in  
dextro cordis ventriculo erant confusa, quod  
faciat Respiratio, negari nequit: 11. Ad con-  
ciliandam sanguini pulmonalia vascula per-  
meanti coccineam arteriosamque rubedinem  
nec non tenuitatem fluxibilitatemque; uti  
ex supra deductis satis liquet. Qui sane ufûs  
ad Individui sanitatem quam maximè con-  
ferre videtur: 12. Nec morosè negabimus,  
aërem, dum ejus temperies seu constitutio  
est frigidior, quàm thoracis partes interio-  
res, pulmones & sanguinem illos transcur-  
rentem minus calida aliquatenus reddere, si-  
mulque magis calidum fieri; quanquam non  
concedamus aerem, brumalem licet partes  
illas vere refrigerare, ut ad sensum frigida  
ab ejus Inspiratione, evadant, naturamque  
intendere, ut per aërem inspiratum dictæ  
partes in frigidentur. Ipse enim tam facile  
quemcunque calorem recipit, ut verius in-  
spirando à pulmonibus & sanguine calefieri,

[Ccc cc 3]

quàm

quàm illa refrigerare dici queat. Quod monstrant Thermoscopia, in quibus aer à cujuscunque, etiam nobis judicantibus frigidæ, manus applicatæ tepore manifestè expanditur, atque sensibilem, liquores, quibus innititur, deprimendo, effectum edit, si eodem ambientis aeris temperamento quoad frigus atque calorem, gaudeant vitrum ac manus. Multò minus nomine vix dignum hoc refrigerium aeris Primarius Respirationis Usus nobis existimatur. Ranæ enim licet frigidissimæ Respiratione tamen carere non possunt. Senes itidem naturali calore omninò ferè destituti respiratione nihilominus non nisi cum vitæ periculo carere queunt. Nec autumandum, Deum calorem cordis tam immoderatum fecisse, ut perpetuo anhelitus flabello refrigerari exigeret. Præterea fœtus in utero non respirat, cum tamen duplici calore, proprio scilicet, simulque materno gaudeat. Cur autem aeris frigidioris eò, qui in pulmonis semper restitat, continua recentatio pro sanitatis vitæque commodo requiratur, explicabimus infra. Veterum enim, quem in corde finxerunt, Igniculus ac Flammula sanioribus Medicis ac Philosophis dudum exspirasse visa sunt, si modò unquam arserint. Ideoque, ut ad illa quid regeramus, operæ pretium non est. Haudequidem ignoro, præclaros quosdam Cartesianos, Willisium, Sylvium, ejusque Cultores, levi admissa mutatione, igniculum huncce è cineribus resuscitasse, docendo illum potissimum in dextro cordis ventriculo vigere, sanguinemque in pulmones transitorium rarefacere, cui proinde rursus condensando aerem frigidiorē inspiratum inservire putant. Plausibilis præ cæteris rem proposuit Clar. Sylvius *Disp. Med. sextâ & septimâ*, ut & utraque de Febribus. In quibus scriptis Incendium illud in Corde vitale, uti vocat, ex bilis lixivîâ, cum sanguine ascendente cordique advectæ, nec non lymphæ & chyli subacidorum mutuâ in dextro cordis ventriculo effervescencia, ne speciosè magis quàm verè vereor, deducit. Cui effervescenciæ temperandæ aerem, sale refrigerare alioquin solito fœtum, in pulmonibus admiscet, sicque sanguinem rarefactum rursus condensat, refrigeratque. Sed paucis respondeo, hypothelin illam, præsertim de bilis accensu, vigorem Rationum, Observationum, & Experimentorum Diemerbroccii, personati illius Leonice ni, atque Malpighii haud quaquam ferre, ideoque nec pro adstruendo Igniculo concludere. Præterea alteratio nulla reperitur in sanguine ex cordis dextro ventriculo egrediente, sed ater & venosus pulmones subit, ex iisque demum verò per Venam

pulmonalem arteriosus, floridus, lucidaque rubedine donatus, atque tenuis redit, quod clarissimis Lowerii Experimentis suprà adductis liquidissimè constat: 13. Quod denique aer sanguini singulis Respirationibus aliquantilla sui parte uti suprà ostensum, admixtus paucissimas quasdam in spirituum animalium elaboratione particulas simul contribuat, penitus quidem, accurate rem perpendenti, non impossibile videbitur; Cum tamen quod legitima imò primaria, uti Sebizius, Laurentius, Tackius aliique voluerunt, spirituum sit materia, haud faciliè credam.

§. 2. Quamvis itaque hætenus varios multiplicesque respirationis humanæ tum Actus tum Materiæ Usus neutriquam spernendos adduxerim, omnes tamen vel ad τὸ ἐνὶναι Individui duntaxat, vel saltem non adeò atque simpliciter ad τὸ αἶναι necessarii sunt, ut eorum per aliquot ad minimum minuta horasque, ne dicam septimanas, ingruens defectus cum vita animalis, etiamsi & minus sanâ stare nequeat, quin ipsam aut saltem ejus sensibilia indicia prorsus aboleat. Nec puto candidum atque rerum naturalium experienciâ imbutum dictorum omnium accuratum trutinatorem seipsum aliosque persuadere aut velle aut ingenuè posse, aliquem commemoratorum Usuum, si cesset, posse illicò etiam vitam aut omnes hujus ad minimum characteres sensu observabiles in totum tollere, idque tam cito uti Machina Boyleana nos docet. In qua dum aer exhauriebatur, intra 2. 3. 4. 5. 6. & 7. ad summum horæ minuta aves & mures ultra vitæ à solâ readmissione redintegranda spem omnem redacta fuerunt. Ab aeris defectu miranda ejusmodi extinctionum velocissimarum phænomena profluxisse unicè nullum omnino dubium est. Quicquid enim Cartesiani de Materiâ suâ subtili vitream Machinam promptissimè, dum aer egreditur, permeante, ibidemque irrequietissimam vehementissimamque in animalis pectore agitationem, nec levem, ni Diu avertant, incalescentiam patrans, sicque animalculum occidente, confidenter nobis narrant, veterum duntaxat crambem recoctam ac reformatam sapiunt, nec solum ab ipsis positivè nondum probata, sed & in superioribus, ac omnium validissimè per Illustriß. Boylei Experimentum 38. & 39. *Tr. de aere* expugnata habentur. His siquidem experimentis evidentissimè demonstratur, nullatenus aëri è Vitro Pneumatico exeunti Materiam talem velocissimè motam multò minus caloricam, succedere. Et quid obsecro, candide ac judiciose Lector, qui non tam grandium famosarumque hypothesium turgidam ostentationem, quàm ipsam Rerum Naturalium simplicissimam jucundissimamque

namque veritatem unicè in votis habes, quid inquam, utilitatis exinde in nos redundat, si precariam solummodò doctrinam calcemus, quæ tamen nec animum liberè ac penitissimè cuncta perscrutantem explet, nec ex ipsis rerum naturalium phænomenis liquidò demonstrari potest; Sic enim titillantibus Opinionibus Prurientes veram Creaturarum utilitatem dñcissimamque in illis reconditam Summi Creatoris sapientiam negligendo ingrati tandem atque inutiles DEO & proximo sepelimur, postquam nimirum prægrandem subtilissimis hypothesebus inflatam bulam in hac mundi scenâ repræsentavimus. Malo quidem ego ingenuè fateri, me huic vel illi phænomeno explicando imparem esse, quàm ex meris hypothesebus, rerum naturalium experientia circumspèctissimè hausta, & quàm proxime iis quadrante, nondum firmatis, quidvis effutire, saltem ne quid ignorasse videar. Sed neutiquam metuendum, Naturam sui ingenuos Cultores scientiâ vacuos dimittere, si modò Vacui ad illam accedant. Nam si lêtericis præconceptarum opinionum oculis ejusdem opera investigare conentur, non mirum, quod nudam non spectent Dianam, quin potius sæpissimè pro Junone nubem amplectantur. Regeres: ostendere nihilominus acutas ejusmodi hypotheseß speculandum ac subtile ingenium, posseque ex illis naturæ phænomena promptè ac expedite solvi. Sed respondeo: veræ sapientiæ Cultores ac Philosophos non tam ingenii ostentationem, quàm rerum veritatem quærere debere, naturamque ridere subtilitatum nostrarum gesticulationes, nisi rerum naturalium pondere ac robore suffulciantur. Prætereà non sufficit facile ac expedite naturæ phænomena dissolvissè, nisi & solidè, verè atque appositè id fiat. Promptæ enim ejusmodi difficultatum enodationes sunt admodum suspectæ, & si in hoc verteretur veræ Philosophiæ cardo, Peripaterici omnium optimè rem expedirent, cuilibet, etiam difficillimo, phænomeno peculiarem qualitatem agiliore assignantes. Sed quid quæso fructuum post se relinquunt hujus farinæ Philosophi? hac enim ratione nunquam pervenimus ad nobilissimam fructuosissimamque meditandi non solum, sed & operandi Methodum Syntheticam, quâ causis rerum à priori cognitis mirandos ac innumeros effectus ususque desideratissimos mortalium generi præstare pro lubitu valemus. In hac siquidem ingeniosi Mechanici operationum suarum causas à priori cognoscendo, earumque judiciofa applicatione directioneque stupendos nonnumquam ac utilissimos nec minus artificiosos effectus atque opera perficiendo, vel ipsum Aristotelem, Scotum, Thomam, aliosque

spinosissimos Philosophos toto die superant. Quin imo nunquam credo, Regem illum Japonensium, etiam si subtilissima acerrimaque cujuscunque ingeniosissimi Philosophi hypothesis ipsi fuisset enarrata atque exposita, tantopere illâ commotum atque in tantam animi admirationem abreptum fuissè, quam factum constat, cum illi ab Europæis Horologium dono daretur. Illud siquidem summopere miratus in genua procumbendo veluti Numen adoravit. Maurocordatus *Tr. de Mot. & Us. Pulm. p. 135.* Et hanc Viventibus cunctis maximè proficuum Syntheticam philosophandi ac operandi Methodum unicè in votis quoque habet celebratissima illa Societas Anglorum Regia, ut Analyticè innumerabiles rerum effectus tum sponte tum prudentissimo artis adminiculo experimentaliter sollicitante productus exquirendo ac colligendo ex mutuâ eorundem collatione, sapientiæ ac circumspèctâ pensitatione, tandem ad genuinas ipsorum causas penetrare, hasque cognoscere ac cum ingenti Philosophiæ, totiusque vitæ humanæ commodo, pro arbitrio applicare valeat. Unde & tantoperè sibi à præjudiciis ac precariis hypothesebus caverit illustrissimus ille laudatæ Societatis splendor ac decus Boyleus, uti accuratissima auroque ac gemmis pretiosiora illius scripta abundè testantur. Magnus itidem Fr. Baconus de Verulamio Regiæ istius Societatis in Anglia Fundator nihil magis in scriptis suis inculcat, quam fidelem solummodò Rerum naturalium Effectuumque illarum Historiam, diligentemque Phænomenon naturæ Observationem.

§. 3. Sed è diverticulo, quod æqui consulat cordatus Lector, ad viam. Firmo stabit ralo sententia ab aëris defectu præproperam animalculis vitalium indiciorum cessationem moxque mortem accidisse. Instabit autem ulterius sciendi cupidum ingenium Gravissimum hocce Problema proponendo: Quoniam modo aëris absentia hosce effectû paucis horæ minutis inferat? Ut hinc tandem ipsi pateat Principalissimus, ac non nisi sub mortis brevi ingruentis periculo ferians, Respirationis Usus. An scilicet aliquæ aëris particulae positivè vitæ quidditatem ingrediantur, quibus deficientibus vita necessario deficiat? An verò aëris in pulmones illapsus ob id tam avidè pro vita animantium expetatur, ut ejus mole gravitante pulmones diducantur, ne, si coarctati manerent, sanguinis circularem cursum in vasis suis sanguiferis impediunt, atque mox tollant, sicque vitam ac sensum extinguant? Gravissima hæcce maximeque ardua Quæstio, ut in hac humanæ mentis imbecillitate plenissimè & quidem pro voto meo cum omnibus consectariis inde propululantibus enodari queat, maximopere vereor, nisi



nisi forsitan divinus quidam Oedipus tanquam *Θεὸς ἀπὸ μηχανῆς* accedat. Plus enim in recessu gerit, quàm prima fronte prae se ferre videtur. Ad ipsam quippe abstrusissimam Animæ humanæ atque Brutorum Doctrinam recto tramite perducit, si plenius exquiri debeat. Quâ tamen, proh dolor! in sensuali hoc modo nihil jejunius, nihil Scholis obsoletius rariusque, nisi, quod Paganismum redolet, excipere velis. Sed in magnis voluisse sat erit. Idcirco candidis ac libere accurateque rem pensitantibus arbitris cogitationes nostras admodum probabiles, atque ex ipsis naturæ phænomenis depromptas ingenuè exponemus. In antecessum itaque meritò cum sagacissimo nostri Seculi Philosopho Boyleo in *Orig. Formar.* notabimus vocabula Vitæ, Animæ, Formæ, &c. laxo admodum sensu vulgò gaudere, nec hæcenus ab ipsis Philosophis debite limitata esse. Novi quidem vulgarem ferre sententiam, Vitam consistere in Motu & Sensu, adeo, ut animal vivere dicatur, quamdiu sentit ac motum edit. Ast Motum & Sensum esse Vitæ Characteres duntaxat atque Indicia, non verò quidditative Vitam constituere, nec animal Motu, tum arbitrario, tum involuntario, nec non Sensu destitutum Vitâ insimul penitus carere complures suadent instantiæ experimentis postea enarrandis suffultæ. Nec movere nos debet Galeni Autoritas *Lib. 6. de Loc. Affect. c. 5. Respirantem, inquantis, non vivere, & viventem non respirare, impossibile est. Et lib. 5. de Loc. Affect. c. 1. Sublatâ respiratione tollitur vita.* Neque ob id mente captus videbor ex censura Joh. Matthæi *Quæst. Med. Enod. 4.* Licet hanc Galeni sententiam (nisi fortassis ad manifesta solummodò vitæ indicia sit restringenda) impugnaverim, ac per Experimenta firmissima demonstraverim, Vitam non penitus cessare ac confestim extinguì, simul ac Respiratio cessat.

§. 3. His præsuppositis (ut ad præmemoratum Quæstionem respondere incipiam) dico, improbable prorsus esse, in aëris defectu ideo cuncta cessare vitæ munera, quasi tunc simul cum aëre animalia privarentur portiunculis quibusdam proximè vitalibus, ex illo aliàs ad vitam illorum fartam rectam conservandam in Respiratione accedere solitis. Quamvis enim aëris ad sanguinem accessum aliquot argumentis supra probaverim ipsemet; non tamen exinde sequitur: ergò aëris quædam particulæ pro ipsius vitæ, ut sic loquar, nutrimento illam constitutivè ingrediuntur; cum in Diapnoës potissimum gratiam sanguini illum permisceri dicta ibidem commonstrent. Nec unquam probari potest existe-

re in aëre ejusmodi particulas proximè vitalitatis susceptivas, & ut plura omittam, hoc unicum illis, qui id sentiunt, oppono: nimirum me per experimenta inferius adducenda demonstraturum, vitam in aëris defectu nullatenus abigi, simul ac Motus & Sensus feriantur omnes. Unde sequitur: si vita sine omni aëris haustu perennare potest? Ergo aer non immediatè pro vitâ servanda requiritur, sed saltem pro muneribus vitæ obeundis & quidem præcipuè propulmonum expansione ac consequenter sanguinis circulo perpetuando. Quicquid enim tam magnificis verbis diffusissimaque synonymiâ de Occulto Vitæ Cibo in Aëre, Spiritu Mundi Catholico, Animâ Mundi, Mercurio universali, Spiritu æthereo, Spiritu Panurgo, Spiritu aeris Vitali, Formâ universali, Quintâ vitæ Essentiâ, Auro Aethereo, Solis Filio, Latice Aethereo, Sale mundi, Sale Cœlesti, Sale pontico, Vitâ Universali, Archeo Universali Vitali, Protheo Versipelli, Mercurio omniformi & uniformi, Rore de nocte, Aquâ rarefactâ de die, Spermate mundi, Entelechiâ Chao naturæ, & sexcentis aliis Epithetis speciosè decantant Autores, omnia tandem in Sulphureo-Salina globi Terraquei Effluvia, Radiorum solarium, à quibus in altum vehuntur, atomis subtilissimis immixta, potissimum recidunt. Et quamvis haud mediocrem in alterandis sublunarium subjectis efficaciam illis libenter ac meritò concedam, præsertim si ex Aere, Rore, fœcundisque ac pinguibus Terris in palpabiliorem Salis aut liquoris salini substantiam condensata ac concentrata fuerint; attamen quod præclari Spiritus Mundi Patroni de Quidditate, atque Effectibus ejusdem licentiosâ nimis hyperbole, solidè philosophantibus meritò suspectâ, loquantur, nemo rerum magis quàm verborum æstimator inficias ire poterit, si Clarissim. Virorum Fabri, Nuysement, de Rochas, Tackii, Balduini, Kircheri, Schottii, Borelli, Rattrey, Nittneri, Penoti, Dornæi, Crollii, Papinii, Tilemanni, Augurelli, Beccheri, Corn. Consentini, Hane-manni, Marf. Ficini, Helmontii, Fluddii, Tachenii, Sendivogû, Borrichii, Rothmanni, Beckii, Wirdigii, Staricii, Glauberi, aliorumque scripta attentè ac liberè perlustraverit. Consideratius quidem de Sale quodam Nitro-aereo, ad vitam sustinendam necessariò mentem suam proponit Mayowius de Respir. Licet non minus valdopere adhuc fluctuet. Nam p. 301. Usus particularum Nitro-aerearum, quibus ex parte aerem constare supponit, debitam dicit esse *fermentationem in vasis pulmonalibus & Arteriis omnibus facere.* Quod quidem, si per moderatissimam sanguinis non tam fermentatio-

nem

nem quam consistentiæ ejus in colore duntaxat & tenuitate alterationem explicetur, tolerari potest. Fermentatio enim proprie sumpta, tum ob materiæ ad illam requisitæ defectum, tum ob vasorum angustiam celeremque transitum admitti nequit. Paulò post p. 303. ipse dubitat, an in Respiratione suppressâ salis hujus defectu animalia statim mori possint; mortemque potius inde deducit, quod non tam in sanguine, quàm in musculorum, hinc & præcipuè cordis, motu sal istud æreum deficiat, utpote ad quem illud tantoperè necessarium existimat, supponendo, Musculorum Contractionem fieri per effervescentiam à sale hoc aeris nitroso & sanguinis particulis salino-sulphureis oriundam. Adeoque vult salem in ære existentem, cum eoque inspiratum in ipsam cordis substantiam musculosam penetrare, ibidemque, non verò in cordis cavitatem, cum particulis salino-sulphureis muscularem cordis motum effervescentia producere. Quo cordis motu, ob salis istius, in sufflaminatâ respiratione, defectum, cessante, sanguinis quoque motum ad cerebrum, hincque Spirituum animalium influxum deficere, in quorum tamen distributione Vitam animale consistere putat. Ex quibus omnibus constat, autorem hunc non quidem salem nitro-æreum immediatè ad vitam esse necessarium, sed saltem mediante cordis motu sanguinisque judicasse.

§. 5. Cum autem hæc omnia gratis sint allata, nec rationibus firmis munita; idcirco gratis eadem dimittere possemus, cum assensum nostrum in Philosophiâ naturali non nisi evidentes rationes ipsius Materiæ, de qua agitur, crebris cautissimeque captis, ac circumspectissime applicatis experimentis fulcitæ, nancisci queant. Ast haud inutile forsitan erit, paulò penitius, quid solidi sublit in opinione Mayowii, exquirere, rogando Lectorem, velit libere & accurate secum perpendere, 1. quàm improbable prorsus sit, contractionem muscularem fieri per effervescentiam ejusmodi ab impetuosius ac diversæ naturæ salibus oriundam, cum tamen quolibet momento musculorum actiones mutare, inhibere, augere, minuireque in nostro sit positum arbitrio; quod quomodo intelligibiliter ac verisimiliter ex salium effervescentiâ explicari possit, hæcenus non capio. Dum enim salina discrepantis structuræ corpuscula fluida pro effervescentiæ scopo confundimus, vehemens eorundem agitatio nullo vase clauso, nisi capacissimo, coerceri potest, nec actionem illorum faciliè pro nutu modificare, postquam semel commissâ sunt, valemus, nisi mutuo inter se contractis viribus à priori

Tom. II. Pars 2.

texturâ penitus alterata tandem simul in gratiam redeant, ac novum quasi Ens constituent: 2. Perpendat, constare experienciâ illustriss. Boylei aerem (ubi omnia in eo fluctuantia, sive salina, sive sulphurea, sive alterius indolis, simul intelliguntur) esse ad minimum milles leviores aqua, adeoque & milles capacius spatium occupare. Hinc qui liquorem ex ære piscantur sub spiritus ærei nomine, in quo sal istud nitro-æreum latere debet, ex mille partibus aeris unicam liquoris partem vix accipiant. Sed concedamus facilioris computi gratiâ, ex 906. partibus aeris posse acquiri partem unam liquoris ærei; largiamur ulterius, quamlibet drachmam istius liquoris post sui concentrationem suppeditare Granum unum salis istius nitro-ærei, id est, sexagesimam respectu liquoris pristini, partem; quam tamen vix dabit, cum salina corpuscula latissime parcissimaque manu in illo liquore ex ære capto sint dispersa; quod testari poterunt, qui æque ac ego salem illum collegerunt unquam. Supponamus jam, quolibet moderatâ Inspiratione ab homine planè quieto, v. gr. dormiente, tantum aeris admitti, quantum inflandæ vesiculæ, uncias duas aquæ fluviatilis capienti, par esset. Plus enim aeris liberâ, nec ullatenus sollicitatâ, Inspiratione non illabi experienciâ constabit tentanti. Aerem itaque dicto spatio, duasque uncias capiente, contentum, concedamus esse non-gentesimâ ac sexagesimâ sui parte liquorem; hoc est, aer qualibet inspiratione irruens continet granum unicum liquoris ærei. Hujus grani sexagesima denique pars erit sal illud nitro-æreum. Cum autem sub unaquaque inspiratione expirationeque simul sumtis ad minimum quatuor fiant pulsus seu cordis Systolæ, hinc sexagesima illa grani unius, de sale nitro-æreo, pars, rursus in quatuor partes erit subdividenda, ut quælibet quatuor systolarum de illa participari queat; adeoque in quacunque cordis systolen ducentesima & quadragesima grani unius salis nitro-ærei pars cadere reperietur. Hæc igitur exilissima ac prorsus inconceptibilis salis istius portunculula cum sufficienti quantitate particularum sanguinis salino-sulphurearum in ipsâ densa cordis substantia effervescentia tumultuans erit ex hypothesi Mayowianâ efficiens unius Systoles seu pulsus Causâ. Ducenties itaque & quadragesies cor sese contrahat pulsetve necesse est, priusquam vel unicum granum salis istius nitrosi ex ære lucrari poterit. Et tamen nihilominus quindecim ad minimum sanguinis libræ in quolibet pulsu cordis sunt locomovendæ; ut nihil jam dicam de ipsorum totius corporis vasorum, carneaque ipsis interspersâ circumjectâ mole. Hinc cum Carpus meus, 504. pulsationes mihi sedulo numeranti

[Ddd dd]

meranti

meranti horæ spacio exhibuerit, per integram horam cor sese indefesse motitando non ultra 14. grana 144. ducentefimas quadragessimasque grani unius partes de sale isto nitro-aëreo ab invidis pulmonibus emendicare juxta Autoris hypothefin poterit. Proh immanem crapulam! credat id Judæus Apella, non Ego. Taceo computum meum admodum adhuc connivere, nec rigorose institutum, atque ad solum cor duntaxat esse directum. Jam verò, quid putas ad Ventriculi ac Intestinorum Peristalticum motum, æque ferè ut cordis continuum, licet mansuetiorem, in tantâ salis nitro-aërei egestate redundare posse? At tandem quid reliquis corporis musculis scribendo, loquendo simileque leves actiones, quæ crebriorem respirationem non statim exigunt, obeundo, cordis magnitudinem multoties mole superantibus reliquumerit; Hæc ita fusius deduxi, ut pateat, quam circumspecti simus necesse sit in excogitandis hypothefibus, quas forsitan nunquam excogitasse præstaret. 3. Secum perpendat æquus Lector, quomodo solâ Inspiratione in ipsam cordis compactam substantiam sal istud nitro-aëreum, uti Autoris hypothefis requirit, penetrare possit? Quis illud in fibras cordis admodum solidas tam valide impingat? Quamque confusa ac indiscreta hæc foret principii cor moventis suppeditatio, quam in tam sapienti atque concinno rerum naturalium ordine, seu potius supremo ejusdem Opifice, vix suspicari, ne dicam statuere fas est. Quin imò consideret, quanta sit fibrarum in corde multitudo? Quam diversus situs? & quomodo his omnibus ducentefima ac quadragesima pars unici grani de sale isto aëreo in qualibet cujuslibet fibræ contractione sufficere queat? 4. Pensitet accuratus arbiter, cum sub quavis Inspiratione tantum ad minimum salis istius ex aëre derivandi requiratur, quantum quatuor cordis contractionibus intervire debet, sexagesima videlicet grani unius pars; quisnam ille sit sive in pulmonibus, sive in corde æquus Partitor ac Dispensator, qui sexagesimam illam grani partem in quatuor particulas rursus subdividat, ac cuilibet Systolæ illarum unicam admetiatur? Sed quid dico subdivisione? Probabiliter prius demonstrandum erit, quisnam in pectoris penetralibus tam ingeniosus artifex aut Chymista liquorem illum aëreum, hincque sal istud nitrosum, ex aëre singulis inspirationibus illabente capiat, concentret separet, ut pro effervescentiâ cum particulis sanguinis salino-sulphureis instituenda, hincque cordis contractionibus causandis, sat virium unitarum acquirat? Salia enim tam parcissime vasque diffusa, aut vix aut plane non effervesceere poterunt. Certe tam ridi-

culis confectariis tantisque difficultatibus angitur hæc hypothefis, ut mirer ingeniosum alioquin Mayowium hæc non prævidisse: 5. Obstant ranæ & hirundines, ut alia omittam. Hæc enim animalcula totâ hyeme sub glacie ac in terræ cavernulis acervatim condiuntur, sine anhelitu, attamen non sine pulsû, quod etiam affirmat Helmontius *Tr. Blas human.* §. 33. & memini, me plures, quam quas medimnus caperet, hirundines arête coacervatas intra piscinæ cannas sub glacie prorsus ad sensum exanimes, pulsantes tamen, reperiisse. Si itaque aëris præsentia ob sale creberrime memoratum motui cordis tam necessaria foret, quomodo horum animalium pulsus incessanter sub aëris, hinc & respirationis, defectu peragi posset? 6. Hypothefi huic refragatur foetus pulsatio in utero per 8. novemve menses celebrata sine respiratione, quam in superioribus penitus expugnâvimus. Paucissimum verò illud aëris, quod cum succis maternis illi communicatur, æque ac succi istud continentes, non magis ad cordis, quam alterius tenelli partis substantiam est determinatum.

§. 6. Patet itaque cordis motum pulsificum nullâ probabilitate ab effervescencia per salis nitro-aërei cum sanguinis particulis salino-sulphureis conflictum in ipsâ cordis substantia, suscitâtâ fieri posse, ac consequenter aerem non inspirari tanquam proximi Systoles cordis principii efficientis vehiculum, adeoque nec salis istius defectum esse causam immediatam cessantis mox, post suppressam respirationem, pulsatoriae cordis contractionis, aliorumque vitæ characterum in animalibus Machinâ Boylianâ evacuatâ inclusis. Refugiet quidem Mayowius nec non ingeniosissimus Hooekius ad Experimenta in cane facta, quæ uterque refert; ille *Tr. de Respir. p. 21. hic vero in Act. Societ. Reg. Angl. p. m. 463.* Simile experimentum nuperrime institui ipsemet, ubi mirando sanè spectaculo, sublato sterni, mediante pulmonum inflatione ac subsidentia cordis pulsus pro lubitu & accelerare & retardare, sicque Convulsiones totum corpus concutientes & producere, rursusque tollere poteram. Scopus illorum autem primarius hic est: canis thorace aperto pulmonibusque collapsis confestim belliferas patitur convulsiones, cordis & sanguinis motu adhuc superstitite. Inflat is autem rursus pulmonibus statim quies redit, disparentibus convulsionibus. Imò si pulmones, factis prius in eorum peripheriâ foraminibus pro aëris superflui exitu, perpetuo folli afflatu expansi servantur, vivit animal; Cum tamen alias inspirato licet aëre pulmones expansos sustinent, si alicui os narve obturentur, mori necesse sit. Hinc concludunt



cludunt aërem non ideo in respiratione expecti, ut pulmones expansos, ac consequenter sanguinis circulum irremoratum servet, cum etiam dilatatis licet pulmonibus, nisi aër recentetur, moriamur, imò sanguinis circularis cursus etiam per collapsos pulmones fieri queat: sed quia continua illius recentatio ad vitam est necessaria. Sed respondeo 1. in genere: quamvis Experimenta, si accurate & repetitis aliquoties vicibus capiantur, sint optima atque firmissima Philosophiæ Naturalis Fundamenta, quibus tanquam primis ac infallilibus Principiis Philosophando innitiamur; attamen si non satis cautè & circumspèctissimo, ac vel centies præmeditato progressu, omnibus etiam levissimis obstaculis optimè trutinatis, Deductiones atque Conclusiones ex iis eliciamus, ac inprimis frequentissimas Non-causæ pro causa verâ Fallacias summâ vigilantia arceamus, sed potius, vel ob judicii hebetudinem, vel ob præconceptorum opinionum tantum non expugnabilem labem, vel ob aliis contradicendi illiberalem impetum, iis improvidè ac minus ingenuè utamur, insanabile ferè damnum ac immedicabilis nonnunquam error inde nobis in Philosophia, hujusque legitimâ prole Medicinâ exoriri potest. His probè nullibi non observatis respondeo 2. in specie 1. quamvis pulmonibus collapsis aliquot adhuc pulsus edant animalium corda; attamen non sequitur; sanguinis ideo circulum æque ac antea esse liberum. Nam consideret cordatus arbiter, impossibile esse, sanguinem tam promptè per vasa à pulmonibus subsidentibus compressa, quam per eadem à pulmonibus expansis distenta currere posse. Nititur quidem miserum cor sanguinis Circulum expedire, unde & tam atroces sæpè convulsiones oriuntur at frustra. Quod testatur Experientia. Si enim thorace aperto pulmonibusque collabescantibus illicò Arteriam magnam à sinistro cordis ventriculo abscideris, videbis sanguinem in quantitate confestim imminutum provenire, ac tandem penitus ferè cessare, licet nihilominus cor adhuc aliquoties pulsset. Præterea pulsus non adeò sæpè peragitur collapsis pulmonibus, quin brevi cesset, nisi denuò inflentur: 2. Perpendat quilibet, quomodo tam momentaneus aëris defectus tantas, citoque ingruentes, convulsiones causari posset, nisi ob sanguinis impeditum circulum, (quem verè ac statim collapsis pulmonibus impediri adductum modò Experimentum probat) id fieret? Huc faciunt omnia superius adducta argumenta contra falsi istius nitro-aerei in Respiratione suppositos effectus, nam in illum unicè inclinant hi Auctores; 3. Notandum etiam est in dicto Experimento, eorum sanguinis cursum ideo non

penitus extinctum fuisse, quia pulmones mox rursus inflarunt, sicque vasa distendunt pro libero sanguinis cursu: 4. Si sanguinis Circulus æque per collapsos quàm expansos pulmones fieri posset, frustra essent Meatus in corde peculiare atque patentes, dum foetus in uteri carceribus latet. Horum quippe usus ordinariò cessat in nato, dum pulmones inspirando distenduntur, sanguinique sic transitum per vasa sua aperiunt.

§. 7. Interrogabis itaque; si principalissimus ac non nisi cum mortis succedentis periculo ferians aeris in Respiratione Usus hic est ut pulmones expandat, atque sic sanguini eos pertransituro viam pandat, unde eveniat, quod animalia, pulmonibus licet inspirando distentis, nihilominus brevi moriantur, nisi recentatio aeris continua reciproco inspirandi & expirandi actu accedat? difficillimum hoc Problema ab Auctorum omnium, quos hactenus legisse contigit, nullo, solum reperio, ita ut animam satiaverint. Prævideo quidem Mayowium, Hookium, Thrustonium, aliosque causam mortis in defectum salis nitro-aerei conjecturos; sed fateor, ob supra adducta contra hanc opinionem argumenta, illam omnium videri mihi improbabilissimam, cui quippe non tam legisse, quàm intellexisse ac ex consimilibus naturæ phænomenis rei alicuj<sup>9</sup> possibilitatem ac probabilitatem collegisse expedit. Paulò probabilius quidem cum aliis respondere possem, mori in dicto casu animalia, quia halituum exspiratio ipsis denegatur. Veruntamen cum nec ipsemet mihi hoc responso satisfaciam, aliis ut in illo acquiescant, obtrudere nefas duco. Hi siquidem halitus sunt prorsus penè aquei & omni noxâ carent. Sunt præterea paucissimi, adeò, ut ex unicâ exspiratione vix binas colligeres mado-  
ris guttulas, si condensentur. Supposito itaque, animal v.g. canem, ore ac naribus post inspirationem arctissimè obturatis, vitâ ad sensum penitus destitui, tali temporis spatio, quo vivum sexagies exspirare potuisset; (cum tamen si omnis illi aeris aditus fuerit sufflaminatus, tamdiu vix vivat) consequens erit, illud partim in sanguine, partim in pulmonibus duas liquoris aquei drachmas retinuisse, guttam si grano æquiparem. Has autem aliquot minutis cani tam exitiosas imo fatales fuisse nemo opinor facillè dixerit, considerando, quàm glutinosa asthmatici ac phthistici copiosa que vel unico horæ quadrante extundant è pulmonibus phlegmata, quantaque cerevisiæ vini que copiâ heluones paucis horis sese ingurgitent. Exulet proinde & hoc simul cum sale nitro-aereo responsum.

[Ddd dd 1]

§. 8.

Tom. II. Pars 2.

§. 8. Ut itaque propius ad veram extinctionis istius causam accedamus, optimè perpendendum erit, quidnam aëri cohibito in animalis pulmonibus accidere possit. Nimirum constat innumeris Experimentis, aërem levissimo quocunque tempore sese palpabiliter expandere, adeo ut manus nostræ ad sensum hyemali tempore admodum frigida, si Thermometro in libero aëre collocato applicentur, aërem inclusum eatenus nihilominus expandant, ut aquam, cujus superficiem innititur, ad digiti ferè spatium deprimat. Accedit illustriss. Boylei Experim. 39. In quo commemorat, postquam peculiare ibi descriptum Thermoscopium ita Machinae suæ imposuerat, ut collum ejus in liberam Atmosphæram pateret, aeremque Thermoscopii circumferentiam convexam ambientem aliquot exantlationibus è Machina subtraxerat, ita ut aër Thermometro inclusus integrum sibi, per collum apertum, incumbentem aëris externi Cylindrum mediante aquâ infusâ sustineret; admotæ manus teporeni per machinam vitream, spatium interpositum, vitrumque Thermometrum penetrando, totum istum aëreæ Atmosphære externæ incumbentem Cylindrum sensibilibiter elevasse, aërem scilicet Thermometro inclusum rarefaciendo. Ex quibus omnibus constat, aërem ab externis etiam ad sensum frigidis corporis animalium partibus confestim expandi, idque magis vel minus, prout tepidior vel frigidior fuerit corporis temperies. Hinc sequitur aërem in pectoris penetralibus tot gradibus magis expandi, quot calor circa cor in pulmonibus, (ubi maximus in toto corpore est sanguinis confluxus hincque calor) intensior est, quàm in externâ corporis circumferentiâ. Adeoque si manus solius tepor ad digiti spatium aërem expandendo aquam in Thermometro deprimat, calor in intimo pectoris scrinio, omnium optimè à frigore munito, manus teporem vel sexies ad minimum superans, ad sex digitorum spatium, si applicaretur, expandere posset. Præterea in pectore aer inspiratus immediatè calori ibidem vigenti exponitur; in Thermometro verò prius per compactum vitrum manus tepori penetrandum est. Et nihilominus aer citissimè hanc alterationem per vitri quoque substantiam recipit, quam proinde multò adhuc promptius citiusque in pectoris fervidioris sinu admittet; quod optimè notandum. Porro experientiâ fretus assero, pulmones thorace aperto in majorem adhuc molem insufflatu hominis expandi posse, quam in ordinariâ vivorum Inspiratione thorax undique conclusus permittit. Unde sequitur, licet aer inspirando omnes pulmonum vesiculas subintret, attra-

men illas non in extremam suæ possibilitatis expansionem diducit, sed saltem eatenus, quatenus thoracis inspirando amplificati capacitas dilatationis spatium suppeditat: adeo, ut, si expansionis principium, aer scilicet, in actionis suæ gradu increseat, vesiculæ pulmonum amplius dispendantur. Increcere autem potest aeris explicantis actio duplici modo: vel enim magis ab illo expandentur pulmonum vesiculæ, si majus à thorace præbeatur amplificationis spatium, quo dato, plus aeris in quantitate irrumperet ac consequenter laxius vesiculas distenderet: vel earundem expansio augebitur non tam ab aere quantitativè, quàm qualitativè in actione suâ fortificato; nimirum à calore aerem inspiratum illicò expandente, (uti ex Canone 4. de aeris Indole ac Motu C. 7. suprâ à nobis proposito liquet,) idque eò magis, quò intensior fuerit calor & quo diutius in pulmonum æstuantibus antris moram traxerit aer inspirando illapsus. Cum autem thorax ultra certam metam, vel vix vel planè non dilatariqueat: Ergò vesicularum pulmonalium expansio potissimum augebitur à calore pectoris centrali, aerem in illas inspirando irruentem in Elatere suo confestim augente. Dum itaque aeris ab animalibus inspirati atque cohibiti Elastica expansio à calore in pulmonibus augeatur, necessariò majus spatium occupant vesiculæ exinde tumidiore factæ; quod spatium cum à thorace, jam quantum valet, amplificato dari nequeat; calor autem interea non cesset; aeris quoque Elater tanta vi polleat, ut vitra & vesicas disfringat; corporumque penetratio in naturâ non detur, nec aliud præterea medium supersit pro augendo in pectore spatio vesiculas magis distentas recipiente, quam vasorum pulmonis sanguiferorum arcta, hincque sanguinem ex iis arcens, compressio; ergò sequitur ut naribus oreque animalis post inspirationem exquisitè clausis dicta vasa pulmonum sanguiflua à vesiculis eorum quaquaversum, ab aëre per calorem intrinsecum magis expanso, ulterius diductis, cum aliud spatium non detur, coarctentur, ac ita sanguinis circularis cursus impediatur, moxque corde cum  $\Delta$ -is à calore in pectore valdoperè expansi, vasaque sanguiflua comprimentis ac coarctantibus, nisum elasticum superare haud valeat, à motu cessante, sanguineque sensim grumescente, penitus tollatur; unde tum cuncta vitæ animalium munera, si emoriantur, cessentque quid mirum?

§. 9. Si habes B. L. genuinam ex Mayowii & Hookii Experimentis prognatæ quæstionis Enodationem ex ipsis rerum naturalium phænomenis huc spectantibus depromptam; nimirum; cur animalia, pulmonibus

bus licet inspirato ab aëre distans, si os naresque illis obturentur, omnibus nihilominus vitæ sigillis confestim priventur, ac penitus denique moriantur. Non enim sufficit, ut pulmones aëre sint distenti atque expansi, nisi & vasa sanguifera, eorum vesiculis intertexta, sanguini à corde propulso libere pateant. Cum autem aër pulmones expandens sit ejusmodi naturæ, ut à quocunque calore velociter expandatur, sicque pulmonales vesiculas ulterius extendat, ac consequenter, nisi exspiratio accedat, vasa sanguifera comprimat, sanguinisque Circulum ad vitam summè necessarium inhibeat; idcirco summus ac Sapientissimus rerum conditor Respirationem ex reciproco Inspirationis & Expirationis Actu constare voluit, ut, præter alios usus minus principales, aër incessanter recentetur, ne in pulmonibus permanens idem semel inspiratus à calore distendatur ac vesicularum, quibus potissimum continetur, interventu ac intumescentiâ vasa sanguinea comprimat, Circulationem impediat, ac denique vitam tollat. Atque hinc tandem vera elucescit causa, cur respiratio vitali scopo satisfactura aërem frigidiores eo, qui semper in pulmonibus reliquus est, pro materia exigat. Non quidem ac si ob illius defectum cordis aut pulmonum sanguinisve adustio metuenda foret; sed quia residuus in pulmonalibus vesiculis aër à calore, circa cordis confinia, aliarum partium respectu maximo, nimium expansus vesiculis mediantibus vasa sanguifera comprimat, sanguinisque Circulo remoram atque mox omnimodam cessationem afferat. Nam nisi calor in corporis penetralibus esset intensior quam atmospheræ ambientis, tunc non indigeremus novâ frigidioris aëris Inspiratione, calefactique Expiratione, sed semel admissus aër, pulmones si expansos sufficienter servaret, nec ulterius sese expandere niteretur, sanguinis cursus esset haud impeditus, & vita, saltem ad notabile tempus, secunda, quamvis consequenter alia ingruerent sanitatis incommoda ex cæterorum respirationis Usuum feriis. Confirmatur nostra sententia, quod scilicet Spiritus cohibitus sanguinis Circulationi remoram injiciat per aliquot Experimenta & Observationes. Observavit nimirum Lowerus *Tr. de Corde c. 2.* quod & quilibet in se ipso observare potest: In risu & aliis Respirationis impedimentis faciem rubescere, venasque colli & frontis intumescere. Annotavit porro Schwammerdammius *Tr. de Respir. p. 9.* in Nosocomio Leidensi aëris retenti ope per vulnus in pede magnam sanguinis copiam pro voluntate à puerulo excretam. Nonne hæc omnia sanguinis cursum per pulmones impeditum clarissimè monstrant?

Sunt enim cuncta in nostro arbitrio posita ac pro lubitu produci, rursusque aboleri possunt hæc phænomena. Adeoque licet principium cordis motum efficiens à priori & immediatè intra potestatis nostræ cancellos non coercetur; attamen à posteriori & mediante sanguine, tanquam cordis objecto, ejusque cursu actionem illius remorari, accelerare, imò planè tollere pro voluntatis nutu nobis concessum est. Ulterius aëris cohibiti fortior expansio probatur Experimento tali: Si quis ad extremum dilatationis terminum thoracem amplificando maximam aëris copiam inspiret, eumque laryngis rimulam illico occludendo, quamdiu poterit, constanter cohibeat, sentiet manifestè aërem forti expansionis nisu Laryngis ostiolum mox quasi distringere atque erumpere conari, quod & nonnunquam cum sono contingit. Aliud huc optimè quadrans, dum pulsuum in carpo meo numerum suscitabar, animadverti phænomenon, ab Autorum omnium, quod scio, hætenus editorum nemine observatum ac publicatum, quodque non tantum Tactu sed & Visu vel centies explorando diligentissimè annotavi ipsemet, ac cuilibet hæc me à manu monstrare possum, mirorque à sedulis Pulsuum Calculatoribus Primerosio, Riolano, Walæo, Regio, Harveo, Cardano, Plempio, Slegelio, Bartholino, Lowero, aliisque palpabile, atque (in macilentis præsertim) Visibile utilissimumque phænomenon illud non fuisse annotatum: nimirum, cordis, adeoque & sanguinis, motum tam strictè pulmonum subesse habens, ut vel quâlibet Inspiratione ac Expiratione palpabiliter crebrior ac rarior fiat, sicque singulis ferè minutis aliquoties à pulmonum motu modificatus variet; præsertim si paulò longius Inspirationis Expirationisque filum protrahas. Nam sub quovis Inspirationis actu pulsus in numero fit frequentior; subsequente autem Expiratione confestim rursus numero decrescit, gressuque tardiori incedit. Hoc sane phænomenon, tam immediatè respirationis bipartitum negotium consequens haud sanâ ratione peculiari vitæ ex aëre hausto ferculo, haud ejusdem carentiæ imputari potest. Inspiratio enim & Exspiratio fiunt perfectè, imò plenius. Nec serio dici potest, particulas nitro-aëreas (si quæ cum inspirato aëre cordi accederent) ab illo tam velociter, devorari, ut confestim exinde alacrius fiat, sæpiusque pulset, & tamen nihilominus ne tantum quidem virium cordi relinqui, ut acceleratum modò pulsuum, paulo diutius continuet, quam Inspiratio duraverit; sed potius tam sensibili mox rursus affici languore, ut eodem, quo exspiratio incipit, momento simul statim dimidio pulsuum numero tardius

[Ddd dd 3]

rarius-



rariusque Systolem suam peragat. Allatum itaque hoc Phænomenon, (quod & simul per experimentum meum §. 6. adductum optime confirmatur) sic explico; in Inspiratione pulmones magis ab aere frigidiorē diducuntur, undē vasa sanguifera patentiora, hinc sanguinis cursus, ac consequenter cordis motus, expeditior fiunt. In Expiratione autem propter pulmonum constrictionem vasa sanguinea magis coarctantur, unde sanguinis circularis motus atque hinc cordis pulsus impeditior rariorque.

§. 10. Ultimo pro peculiaribus quibusdam in aere suspicandis particulis, ignotæ quidem, animalium nihilominus vitæ summopere necessariæ qualitatis inservire, alicui posset miranda Cornelii Drebbelii Navigatio submarina pro doctissimo Anglorum quondam Rege Jacobo adornata, quam ex viro- rum satis fide dignorum ore narrat illustriss. Boyleus *Tr. de aeris vi Elast. p. 451.* Notabilia ejusdem hæc sunt: *Navicula peculiari modo excogitata atque extructa sub aquis tulit duodecim remiges, præter transfretandos; homines in illa perduraverunt illæsi; Drebbelius non totum aërem, sed certam illius solummodò partem spirituosam ceu Quint-Essentiam respirationi utilem ac necessariam putavit, quā consumpta reliquum aëris corpus, vitali in corde flammæ fovendæ ineptum esset; In navigio submarino (in quantum illustriss. Boyleus colligere potuit) usus est Liquore Chymico, quo, quotiescunque aëris partem consumunt, vel navigantium expiratis & transpiratis effluviis saturatam, animadvertit, recluso vase Liquorem continente, turbato aëri talem de repente vitalium partium proportionem restituit, qualis navigantium respirationi aliquandiu subserviret. An dissipando, inquit illustriss. Boyleus, vel præcipitando crassas exhalationes, aliove intelligibili modo, jam non vacat in examen proferre; Liquorem Drebbelius nemini uspiam voluit indicare, nec ex qua constaret materia, nisi unico tantum ostendere, qui illustriss. Boyleum de ipsa rei veritate fecit certiore. Sed ad cuncta hæc respondeo 1. Drebbelii putatio non concludit pro ipsâ talium particularum actuali in aere præsentia: 2. Desidero temporis moram navigationis submarinæ. Ea enim si non admodum diu duraverit impossibile non est, homines aliquot in loco clauso ac satis capaci sine noxâ sensibiliore absque Liquoris istiusmodi operâ perstare posse: 3. Quamvis etiam navigatio longius protracta fuerit; attamen naviculæ singularis structura nec non Aquæ marinæ illam undiquaque, supra, infra, ante, post, & ab*

utroque latere ambientis frigus valdè huc conducere poterit. Structuram enim quod attinet, dubio procul in parte superâ ac lateralibus ad lucrandam lucem quam plurimæ insertæ fuerunt fenestræ. Forſan etiam interior naviculæ superficies concava in parte præprimis inferiori tenuibus laminis metallicis fuit obducta, aut alio, cui facilè adhæreant effluvia, idoneo tegumento instructa. Jam verò ex vulgaribus etiam destillationibus notum est, quam promptè vapores, non quidem vix tepidi, quales ab hominibus profluunt, sed & calidissimi, cutemque adurentes sese vitreis metallicisque capitellis affigant, moxque in fluorem resolvatur, etiam si nec aquam frigidam trajiciant canales. Multò magis citiusque halitus navigantium à frigore marino facilè condensandi, ac in defluentem resolvendi respirantibus minus obesse poterunt: 4. Vitalium in aëre particularum existentia nunquam directe probata est; quorsum videantur, quæ *suprà. §. 5.* hujus capitis contra Majowium adduximus: 5. Multò minùs probabili modo explicari poterit Liquorem quendam chymicum sive destillatum sive aliâ quacunque Enchiresi præparatum potuisse vitalium in aëre, si quæ sint, partium vices gessisse, adeoque Liquor Drebbelii pro hac opinione concludere nequit, cum talis conclusio niteretur Postulato nondum probato. Quamvis enim illustriss. Boyleus positivè asserere videatur, fuisse turbato aëri talem vitalium partium proportionem, vasè Liquoris recluso, restitutam, qualis efficere potuerit, ut respirationi aliquamdiu subserviret aër; attamen antea, narrationem de liquore incipiens, præmittit in parenthesis hæc verba: *in quantum colligere potui.* Unde liquet, illum duntaxat ex alterius relatione adducta jam verba recitasse. Quinimò paulò post Epicrisin quasi adjungens dicit: *se non ultra, quam quod prius intimaverit*, Drebbelii opinioni assentire. Nihil autem aliud illum prius intimasse reperio, quam quod de modo, quo aeris illa (ut sic loquar) rectificatio fieri posset, hæc verba subjunxerit: *an dissipando vel præcipitando crassas exhalationes, aliove intelligibili modo, jam non vacat in examen proferre.* Ex quibus apparet illustriss. Virum ac Philosophum circumspectissimum mentem suam de Modo Fiendi penitus aperire noluisse. Probabilius sane est, si modo vere quid contulerit Liquor ille ad reddendum aërem navigantium respirationi rursus aptum, illud potiùs per modum Privationis effluviis ex aëre crassiorum; quam Positivæ Suppeditationis particularum vitalium à nemine huc usque solidè ac satisfactoriè in aëre evictarum, contigisse. Me-

se. Memini etenim dum chymicis operationibus unice incumberem, me reperisse liquorem quendam brevi admodum tempore patrem sibi ferè quantitatem halituum aqueorum ex atmosphærâ insuper imbibentem. Præterea, quid quæso vitales particulæ refocillamenti allaturæ sunt, nisi à navigantium effluviis aër inclusus liberetur? Cum illustriſſ. Boylei Experimento *p. m. 440. l. c.* enarrato constet, aviculam exiguo Recipienti sedulò inclusam, intra tres quartas horæ partes, absque aëris exantlatione, à propriis halitibus atque effluviis moribundæ similem redditam fuisse, præviis violentis multisque vomendi conatibus. Plura hujusmodi, si opus foret, observata adduci possent.

§. 11. Cum itaque ex hætenus fusè deductis liquidò constet, aërem ad vitam animalium respirantium non contribuere peculiare quædam, talisque genii, vitales particulas, quibus deficientibus derepente vita, saltem ad sensum nostrum, deficiat; nec animalia spiritu cohibito pulmonibusque expansis ob id vitalibus sigillis tam subito privari, quasi ob recentati aeris inopiam salis cujusdam nitro-aerei penuriâ perirent; sed potius quia inclusus pectore aer à calore ibidem vehementiori expansus Circulantem sanguinem, compressionis vasorum interventu, remoretur ac denique sistat; Tandem ordo nos vocat de altera superius prolata Problematis parte disquirendi. Nimirum, an animalia in Machina Boyliana post aeris exantlationem ideò paucis horæ minutis ab omni vitali motu penitus cessent, quia aere, tanquam pulmonum Expansionis efficiente causâ, sublato, hi collabescant, vasa sibi intertexta comprimant, sicque sanguinis cursum, ac consequenter cordis motum, impediunt, atque mox tollant? Ita sanè cenſeo, cum id omnes circumstantiæ attento animo librata evincere videantur: Adeoque principalissimus respirationis usus, sine quo vita animalium durare nequit, quàm paucis minutis cesset, est debita liberatio vasorum pulmonis sanguifluorum, ab aggravantibus accumbentibusque, ac dicta vasa, nisi tollantur, comprimere, sicque sanguinem totius corporis, illac in natis transeuntem, impedire, ac consequenter cordis motum sufflaminare valentibus corporibus, quæcunque illa demum fuerint; Seu brevius: maximè præcipuus, quique non nisi cum vitæ cessationis periculo deesse potest, respirationis usus est sanguinis haud interrupta circulatio. Hanc meam sententiam solidis hisce stabilio argumentis: 1. Quia in fœtu nondum nato ideò sagax natura peculiare in corde meatus extruxit, quoniam sanguis pulmo-

nes tum coarctatos permeare non poterat; hi enim compacti vasa sibi interspersa comprimebant, sanguinique sic aditum præcludebant, cujus tamen cursus in omni vita est maximè necessarius, ideoque peculiare extra pulmones vias exigens, quæ deinceps, semel respirante pulmone sanguinemque transmittente, illic à valvulâ Foraminis ovalis potissimum intercipiuntur; uti suprà explicatum: 2. Quia in nato per respirationem pro lubitu cordis motum accelerare & retardare possumus, mediante sc. vasorum pulmonalium liberatione & angustatione sub inspirando expirandoque procreatâ: 3. Quia in suffocatis dextra cordis auricula atque ventriculus, nec non pulmones sanguine reperiuntur inferti, sinister autem ventriculus sanguine vacuus, quoniam scil. ob pulmonum in suffocatis aut concidentiam aut nimiam eorum vasaque comprimantem distensionem sanguis ad sinistram cordis ventriculum pertinere non valens stagnando concreſcit: 4. Quia aère deficiente pulmones, utpote ab hoc solo proximè expandendi concidunt, hincque necessariò sanguinis cursum remorantur, moxque tollunt, atque simul cordis pulsificum motum, cum eoque vitalia munerata cuncta. Adeoque hinc patet genuina causa, cur in Machinâ Boyliana tam subitaneâ morte animalia corripere videamur, quia nimirum pulmones efficienter explicans, sanguinique per illos viam patulam reddens, principium deest; hoc autem dum deficit, concidunt atque collapsi permanent pulmones, hi coarctari, inevitabili necessitate vasa sanguifera comprimendo, sanguini circularem transitum denegant; quò impeditò ille concreſcere incipit, ac consequenter brevi à motu cor cessat, præviis quibusdam extremis, circularem sanguinis cursum expediendi, conatibus; unde & plerumque violentis convulsionibus succumbunt animalia; Sanguinis denique ac cordis motu sublato omnia simul vitalia indicia tolluntur, adeoque nobis judicantibus vivere desinunt animalia.

§. 12. Ultimò cum suspicari videam Illustriſſ. Boyleum repentinum animalium interitum per ambientis aëris exsuctionem considerando, aliquem esse præter illos, quos adduxerat, aëris in respiratione usum nondum probè intellectum ac plenè explicatum, qui faciat, ut vitæ animalium sine intermissione adeò sit necessarius: Ignoscat mihi, si ipsi tanquam ingenuo ac perspicacissimo arbitro bina Notabilia, de animalibus tam subito ob aëris exantlationem mori visis, optimè libranda venerabundo animo suggeram. Primò experimenta quædam superius promissa & brevi post subjungenda, evincere videri, nullatenus animalia sensu ac motu omni obre-

ob respirationis penuriam destituta, imò ne quidem illa, quæ solâ duntaxat aeris in Machinam readmissione ad vitam revocare nequivit Illustrissimus Autor, vitâ insimul, aut saltem reviviscendi spe penitus destitui: seu, ut strictius loquar: Corporum animalium, solo forsitan excepto homine, à summo immutabili rerum conditore sapientissimè creatas Machinas aere ex Recipienti subtracto, neutiquam eatenus tam paucis minutis, imò & longiori forsitan temporis morâ alterari ac destrui, ut diligentiori penitiorique aeris reapplicatione, quam solus ejusdem rursus in Machinam intromissi allapsus esse videtur, in pristinos ac vitales nobis dictos motus redigi nequeant, tum in solo potissimum cordis pulsû sanguinisque circumpulsû consistentes, tum ab iisdem proximè dependentes. Hæc autem ideò huc afferro, non quod nesciam, Illustriss. Autorem animalcula vitalibus indicibus sensibilibus in exhausta Machina destituta, aeris subitanè readmissione ad vitam quasi revocasse; sed quod & illa, quæ ultra spem vitæ redacta narrat, reviviscere potuisse credam, sit aut fortiori aeris in pulmones afflatu, ut aliâ possibili ingeniosâque ratione sanguis in vasis stagnans moxque concretescens rursus promotus, sicque cordi, pristino, cui vix valedixerat, munere fungendi data fuisset copia, liberumque spatium, in quod sanguinem evibrare ejusque circularem cursum redintegrare potuisset: Adeoque per mox adducenda Experimenta admirationem quodammodo imminuere studeam, quâ Illustr. Autorem aliosque detentos video, ob velocem illam vitæ extinctionem; quæ tamen potius saltem vitalium indiciorum sensibilium, quo minùs nobis appareant, inhibitiō atque cessatio esse videtur, quemque potissimum ansam ipsi aliisque suppeditasse autumo, Inexplicatam quandam, aut nondum intellectam (uti loquitur Illustr. Autor) aeris in Respiratione Actionem suspicandi credendique. Quod quidem nunquam miror, Illustrissimo Autori tales de subitâ animalium in Machina exhausta expiratione cogitationes subortas fuisse, cum ex iis Usibus omnibus, quos hætenus Philosophi pariter ac Medici respirationi assignârunt, nec non ex modo, quo illos fieri debere explicuerunt, impossibile sit, probabili ac circumspēctis rerumque experientiâ imbutis, eamque cum cautissimis exinde factis Philosophicis deductionibus unicè æstimantibus ingeniis satisfaciente ratione liquidò demonstrasse, cur ob aeris defectum duobus vel tribus minutis confestim cuncta vitæ animalium sigilla intercitant. Viderunt quidem Autores plerique ærtissimum inter sanguinis Circulationem ac respirationis perplexam functionem esse nexum:

at sanè quonam pacto, fiendique modo, quâque causalitatis effectuumque inter se cohareant serie ordineque hætenus omnium, quos evolvere in hunc usque diem licuit, planè nullus ex ipsis huc spectantibus utriusque Negotii phænomenis explicavit ac dilucidavit. Hoc proinde etiam in prolixitatis hujusce Dissertationis meæ patrocinium cordatis omnibus offero. Id enim unicè operam dedi, ut Respirationis altè reconditum Machinamentum ex genuinis Causis, Instrumentis, Agendi, Fiendique Modis, ac Usibus palàm exponerem atque præprimis Principalissimum, atque tam strictè cum ipsis vitæ sensibilibus characteribus conjunctum Respirationis Usûm, hucusque solidè ac satisfactoriè non explicatum, plenissimè eruerem ac illustrarem simulque legitimam causam redderem, cur animalia tam ob aeris inspirati cohibiti que præsentiam, quam in Illustriss. Boylei Machinâ paucas post aeris exantlationes, duobus, tribus, quatuorve minutis, omnibus vitæ muneribus illicò orbentur.

§. 13. Experimenta itaque, quorum læpius in superioribus mentionem injeci, à quibus inductus credo animalia sensibilibus vitæ indicibus penitus privata, quæque ab aeris solâ in Machinam, quodammodo evacuatam, readmissione duntaxat resuscitari non possunt, non esse ultra omnem vitalia ejusmodi sigilla rursus edendi, sicque vitam, nobis sic vocantibus, resumendi spem redacta, tandem sic accipe. Primum suppeditat Mayowius *Tr. de Respir. p. 28.* in quo motus cordis ob suppressam respirationem cessans ab insufflato in Venam Cavam aere ex postliminiò restituitur. Secundum huic fere simile desumfi ex Malpighii *Epist. ad Borrell.* in quo motus cordis penè extinctus ob collapsos propter apertum thoracem pulmones, iterum restituitur, si pulmones insufflentur, irruente rursus sanguine in sinistrum cordis ventriculum. Tertium consimile Thrustonii *Diatr. de Respir. p. 53.* subministrat: in hoc canis laqueo suspensus, donec cor à motu penitus cessaret, mox aperto abdomine, aereque fortiter in Ductum Pecqueti inflato, reviviscere cœpit. Quartum idem Thrustonii *Tractatus p. 10.* exhibet; adveniente, inquit, frigore sentim elanguescunt omnia in ovo, vesiculaque rariùs pulsât primo, mox, ubi motus omnis cessaverit, ipsâ quoque vita extinguitur. Approximante autem leni calore pulsatio prioris modo redit. Huic consonat Quintum partim ex domesticâ observatione, partim ex Malpighio de Format. Pulli in Ovo, depromptum: nimirum ova quamvis ante aliquot dies, imò septimanas parta, nihilominus solo, eoque indifferenti ex causâ oriundo, (uti



(uti Ægyptiorum Pullities docet) modò debito gradu administretur, calore accedente in viventem pullum mutari atque excludi. In quibus tamen tantum abest, ut ante incubationem pulsationis motus, adeoque & vita, humano iudicio, adfuerit, ut potius Malpighius ingeniosissimus etiam post 38. incubationis horas pullum vix animadvertere potuerit, insigni licet visus adminiculo, Microscopio puta, instructus. Huc non incongruè referri possunt Vegetabilium semina per menses nec non annos asservata, ac omni vitæ vegetabilis, futuræque germinationis spe atque indicio privata, illoque, qui ea terræ fecundæ commissâ germinare nunquam audivit, neque expertus est ipse, iudicante, vitâ vegetabili penitus destituta; quæ tamen nihilominus vel in sola aquâ levissimo accedente tepore promptè excresecunt ac jucundissimis vitæ suæ indiciiis, vario colore, figurâ, atque textura ornantur exsurguntque. Sextum est præmemorati Thruſtonii *l. c. p. 63.* nimirum pullus gallinaceus data opera suffocatus eo usque, ut ne minima vitæ scintilla superesse videretur, insufflato per rimam trachæ aëre ab orco revocatur. Septimum locum occupare possunt Exempla à Magno Helmontio Tr. Demens Idea dicto; allata, quæ monstrant, submersos aliquot, etiamsi per horæ quadrantem, nec non per horam dimidiam, imò & ultra, uti ex circumstantiis attentè pensitatis constat, aquis ingurgitati ac omni vitâ destituti fuerint, nihilominus deinceps revixisse, conferente ad aquarum rejectionem prono corporis situ. Vid. etiam Sebast. Albini *fürger Handgriff zu den Erſoffnen* / ubi exempla eorum, qui aliquot horas aquis suffocati fuerunt, adducuntur. Imprimis miraculo proximum quod dictus Autor ex Alex. Benedicto *Lib. 10. c. 9. de Cur. Morb.* refert; nimirum, in undis submersos post 48. horas recreatos revixisse. Huc quoque facit exemplum Hortulani 16. hor. sub aquis viventis & sentientis tandemque extracti & refocillati, de quo vid. Pechlinus *Tr. de Aeris & Aliment. defect. & Vit. sub. Aquis C. X. Octavum* erit exemplum commiseratione dignum à Matthæo *Quæst. Med. Enod. p. 21.* relatum, ubi nobilis matrona, postquam per triduum in agone decubisset, pro mortuâ ad locum subterraneum sepulturæ destinatum elata, post aliquot menses reperta fuit peperisse adhuc infantem, quem in dextro brachio mortuum detinuit. Huic suffragatur Historia Colonienſis, quam idem Matthæus *l. c. p. 18.* & Lambzwerdus *c. 2.* Expirationis suæ referunt, de foeminâ nobili defunctâ, sepultâ noctuque à sepulchri violatoribus, annu-

Tom. II. Pars 2.

lis ejus atque armillis inhiantibus, illique ob id manus injicientibus, in vitam pristinam non sine magno nefariorum terrore revocata. Ut plura de Ecstasice, Apoplectice, Syncoptice, Utero suffocatis aliisque his similibus omittam, in quibus diuturna *ἀσφυξία* præsens, respiratio verò ac calor vitalis omninò cessant, vitâ nihilominus tandem redeunte. Vid. etiam potest Pechlinus *l. c. 7. Nonum* subministrat ipse illustriss. Boyleus recensendo *Digress. de Respir.* insecta in ejus Machinâ, fatigato quantumvis antliæ Agitatore, nullo modo potuisse enecari, quod tamen avibus & muribus paucis minutis acciderat; quin statim cessante Antlia, vitæ functiones, quibus sub exantlando privata quasi inanima prosternebantur, resumere inciperent. Accedit, quod muscæ aliaque insecta mortis ipsius imaginem brumali tempore quasi referant, quæ tamen vel pro lubitu teporis ope in verum vivendi actum reducuntur.

§. 14. Hæc omnia admodum probare videntur sententiam meam illustriss. viro supra oblata, nimirum esse corporum animalium Machinas, cessantibus licet vitæ indiciiis cunctis, nihilominus adhuc idoneas, quæ sublatiis impedimentis, à Causis istis duabus maximè Universalibus (immediatè dicam, an verò mediante Principio quodam interno sensus exquisitissimos fugiente, ac vitæ Etymo dignando, proximaque vitalium characterum causa censendo?) Si diligentiori operâ ac iudicio penitiùs applicentur, in pristinos vitales motus redigantur, sicque vulgò vivere dicantur, quiete alioquin denique seriò lethali fruituræ. Et parum abest, quin credam, animalium corpora (hominem nec excipiam?) eò usque adhuc ad reviviscendum apta esse, quò usque saltem succi in ipsorum vasis putrefacturâ alteratione non cœperunt destrui, imò & hi putrescentes licet, si solerti propulsu è vasis abigi horumque loco vividiorâ idoneaque liquamina surrogari tententur, forsitan tum Spes reviviscendi, tum Chirurgiæ Infusoriæ & Transfusoriæ laus major fieret. Sed hic amplissimus *παλιγγενεσίας* campus, quatenus naturæ viribus circumscribitur, panderetur, si huius loci foret. Secundo itaque, commemoratis omnibus altâ mente repostis manentibus, illustriss. Boyleum submisso animi cultu rogo, velit eâ, quâ illum pollere pretiosissima ejus scripta testantur, ingenuitate ac attentione considerare, animalium repentinam mortique si, millimam in exhausta aliquatenus Machinâ mutationem, concatenatâ ratiocinatione mox sequentem in modum, optimè ac appositè solidèque, & procul dubio ingenuis omnibus satisfactoriè explicari ac intelligibi-

[Ecc ec]

liter

liter deduci posse, absque eo, ut aliis, ad occultas, inexplicabiles, ac nescio quas vitales in aëre vitæ integræ causales particulas, Cibum, Pabulum, salem nitro-aëreum, Mundi spiritum, similiaque solo verborum splendore cognita, confugere nimis promptè alioquin solitis, ulteriorem speciosis suis imaginationibus indulgendi ansam subministremus. Nimirum: dum aër, tum ponderis, tum Elateris (quo utroque cum polere irrefragabilibus crebrisque Experimentis constat) ratione è Machinâ exantlatur, residuus ille, dum animal fatalibus ejusmodi violentisque mutationibus ceu mortis prodromisprehenditur, in pondere ac Elatere eò usque imminuitur, ut celebratâ licet ab animali thoracis dilatatione, (quam & ipse Vir Illustriss. *p. m. 425. l. c.* annotat) nihilominus Pulmones ad debitam ac pro circulari sanguinis cursû irremorato servando, requisitam expansionem distendere nequeat, adeoque Principium efficienter pulmonum vesiculas subintrando debitè diducens deficiat; quo deficiente pulmones propriæ gravitatis ritu concidere ac magis magisque coarctari incipiunt; quibus concidentibus ab illorum mole necessario intertexta tenuissima (uti ab oculato Malpighio sensu armato observantur) mollissimaque ac promptissimè cedentia vascula sanguifera aggravantur hincque comprimuntur; quibus compressis eadem necessitate cavitas eorum sanguinem à corde propulsum transmittendi cæteroquin capax & adæquata, imminuitur, atque ad id munus incapax redditur; quâ cavitate diminutâ sanguinis transitus inevitabiliter impeditur; quo impedito, paucior sanguis ex cordis dextro ventriculo ad pulmones pervenit; pauciori autem sanguine à corde ad pulmones perveniente, paucior etiam ad cordis sinistrum ventriculum redit; pauciori autem sanguine ad sinistrum ventriculum pertingente, necessariò etiam pauciori copia per aortam ad corporis partes omnes amandatur; Hoc fiens, consequenter quoque paucior ad dextram cordis auriculam ventriculumque redit, sicque circulatio sanguinis interrumpitur, quæ dum interrumpi cœpit, sanguis in dextra præprimis auricula atque ventriculo, nec non pulmonibus, in grumum concrevit, hincque extremis totum corpus convellendi, circumque sanguinis expediendi conatibus animal tentatur, hæc dum fiunt, circularis sanguinis cursus in totum sufflaminatur ac tollitur; quò penitus sublato, omnia confestim vitalia sigilla sensibilia (si calorem excipias, utpote, qui paulò diutius durat) intercidunt, sicque mortuum dicitur animalculum. Et hæc erit totius Tragœdiæ genuina connexio. In qua, utut complures causæ

successivâ serie enumeratæ sint, quæ in repente hoc animalium, quæ aëris defectu extinguuntur, Phænomeno, vix simul concurrere alicui forsân videri possent; attamen cogitandum est, animalium corpora horumque actiones optimè comparari posse cum automato ejusque motu. In hoc enim, quamvis rotulæ sint numero plurimæ, cum tamen ita dentibus suis sibi mutuo infixæ hæreant, ut una sine altera moveri vix queat, quin omnes simul moveantur, & è converso, una illarum in motu sisti nequeat, quin omnes sistantur; sic & pari ratione in animalium inimitabilibus à sapientissimo, maximeque Venerando Naturæ Autore, adornatis corporum machinis causæ ac instrumenta motus ita sibi invicem cohærent, atque à se mutuò dependent, ut unum illorum in motum adigi, sistique nequeat, quin omnia simul aut moveantur aut illicò quiescant.

§. 15. Dictis hisce quamvis forsân obijci posset, cor propellens esse sat validum mediante sanguine vasa pulmonalia; nihilominus eadem distendendi & concidentibus comprimentesque membranosas pulmonum vesiculas dimovendi, ut sanguis illa permeare, sicque circulus continuari, aut saltem non tam subito cessare queat: attamen respondeo: me quidem negare nolle, cor, nisi jam antea sat molis ipsi locomovendum esset, eo robore pollere, cum quindecim, sedecim, pluresque in nonnullis individuis sanguinis libras, præter vasa totius corporis distendenda, partesque illis interjectas, eaque circumvallantes, qualibet systole loco aliquatenus moveat; nego tamen illud de facto à corde fieri, cum experientia, ac attenta consideratio contrarium dictitet. Adeoque aliud est; cor potest vasa à pulmonibus, ob aëris expandentis defectum concidentibus, compressa distendere; aliud autem: cor actu, & rebus sic stantibus, dumque jam tum ipsi satis negotii in sanguine, per patula licet vasa circumpellendo datum est, objectis ejusmodi impedimentis, vasa nihilominus mediante sanguine distendi. Prius quidem acerbè negare nolo, quamvis fortasse, si penitus excuteretur, difficultate non prorsus careret consequentia illa à statu naturali ad præternaturalem, imprimis, si æquâ mente perpendamus, cordis vim locomotivam esse finitam, & determinatam ad certum objectum movendum, & præter illud aut parum aut nihil movere posse, quin, si plus molis ipsi obijciatur, eidem prorsus impar evadat, non secus ac elater horologii chalybeus, qui etiam si in se sat validus ad agitandas rotulas existat sibi adæquatas, nihilominus vel à debilissima levissimaque causa, remorante, rotulis applicata superatur, sicque totus horo-

logii

logii cursus ac motus illicò sistatur. Posterius verò consideratè nego, (1.) quia non fuissent peculiare in foetus corde extructi meatus paruli, si ante partum absque pulmonum vasis propelli ac circulari potuisset æque benè, ac si pulmones essent expansi: 2. Quia in solâ expiratione paulo intensiori illico cordis Systolæ fiunt rariores tardioresque uti id suprà jam adduxi. Quid igitur fiet in pulmonibus adhuc multo magis, ob aeris defectum, concidentibus, vasisque hinc coarctatis, quam thorax in expiratione? Cordis enim motus facillimè à pulmonum Expulsione vel constrictione majori vel minori augetur vel immittitur tum in vigore tum in numero: 3. Quia sanguis in pulmonibus (cum non penitus excludatur, sed quodammodo adhuc per illos moveatur, licet Systolis & rarioribus & languidioribus) facillè sub aeris defectu pulmonumque concidentia aut nimia vasaque comprimente distensione stagnare, moxque concretionem inire in omnibus suffocatis comperitur. *Vid. suprà Cap. 9. Th. 7.* Manet proinde rata sententia animalia in Respirationis defectu mori seu potius vitalia edendi indicia cessare principaliter propter sanguinis Circulationem impeditam, moxque penitus sublatam, sine quâ animal perfectè aut vivere aut vitam ostendere possit hætenus compertum non est, præsertim si ex numero sanguineorum, maximeque si calidum fuerit.

§. 16. Tredecim itaque Respirationis humanæ usibus supra *thes. 1.* huius capituli assertis ac minus principalibus, tandem Decimum Quartum tanquam Principalissimum, utpote non, nisi cum vitæ cessatione, cessantem addimus, prolixius pleniusque deductum atque dilucidatum, quia nullibi eundem per concatenata naturæ phænomena atque Experimenta satisfactorie explicatum reperio; Qui hic est: ut vasa pulmonum sanguifera, ac pro toto vehentia, ab accumulentium & alioquin concidentium vesicularum pulmonalium comprimente & coarctante mole inspirando liberentur, sicque promptum sanguini per ea circulariter à corde propulso transitum præbeant, atque hinc sanguinis pro vitâ continuandâ simpliciter necessaria Circulatio, imperturbata procedat perennetque.

## EPILOGUS

*Ardua quædam Problemata innuendo, nec non ad eorundem Solutionem Notabilia quæpiam suggerendo finit.*

**H**ÆTEN<sup>9</sup> licet universum Respirationis admirandum negotium plene per textum arbitrer, incesit tamen jamdiu animum sciendi, ac in ultimam (nostræ disquisitionis respectu) Primamve (naturæ in agendo causa-

Tom. II. Pars 2.

litatis ordinem si spectes) Causam demum perveniendi penetrandique ardor, meque adegit, ut inquirerem, cur itaque tantopere pro vitâ animalium necessarius sit Cordis Pulvis Motus, hincque Sanguinis Circulatio? An scilicet cordis motus per se & quæ talis immediate pro vitâ perpetuandâ requiratur? An verò Cordis motus ideò à vitalibus muneribus separari nequeat, quod Sanguinem ad omnes partes moveat, adeoque non tam cordis motus quàm sanguinis quæ talis præsentia continuo transitu suppeditata ac recentata vitæ characteres cassetur; An denique non quidem sanguinis quæ talis, sed ejusmodi saltem Liquoris præsentia ad vitæ sigilla edenda exspectatur, qui licet formaliter & actu sanguis non sit, attamen pro vitâ, saltem ne aliquot horis, diebus, aut septimanis mensibusve cesset, servanda sufficiat, dummodo partes sibi pertranscundas noxiis quibusdam particulis non tantum non lædat, naturalemque earum structuram immutet destruatque sed insuper sanguinis vices tum quantitate ac mole, tum & quasdam fortassis particulas è sanguine aliàs promi necessarias suppeditando, gerere possit; Sed de gravissimis hisce Quæstionibus mentem meam exponere à subitrato Argumento paulò liberius longiusque esset digredi, cuius quippe terminos jamdudum debito ampliores fecisse multis videbor. Fortassis si vitam, tempus ac occasionem Deus Ter Opt. Max. largitus fuerit, pleniori aliquando (quantum in his humanæ imbecillitatis tenebris sperandum magis quam optandum est) de maximè reconditâ Animæ, Vitæ, Vitaliumque Characterum in animalibus Doctrinâ, Scripto, coque non ex precaria aliorum hypothese, sed ex ipsorum Naturæ, tum spontaneorum tum experimentante solertiâ prolectorum Phænomenon sedula seriatimque observatione, Collatione ac Pensitatione, prognato, nostra tibi Musâ canere poterit. Cuilibet interim, quem in propositis hisce Problematis animam exercere lubido tenuerit, attentè consideranda propono sequentia observata atque Experimenta partim in superioribus jam adducta 1. canem corde exsecto ambulasse & latrasse; nec non Victimam corde ad aras exsecto clamasse: 2. Viperas in Aëre convenienti, per aliquot dierum spatium Caput & Cordium suorum jacturam supervivere, testante illust. Boyle *Chym. Scept. p. 111.* vid. quoque Corn. Gemma *Cosmocr. L. 1. c. 6.* de pecudum dissectarum subsultu corde & cerebro destitutarum: 3. Hominem, postquam cor ejus esset avulsus & in Carnificis manu, tria aut quatuor precum verba pronunciasse: 4. multos homines aliquot annos sine cibo & potu vixisse; 5. Transfusionem sanguinis

[Ecc ec 2]

ex uno



ex uno animali in aliud diversæ licet speciei, esse innumeris Experimentis jam probatam & extra omne dubium positam, animali, quod sanguinem recipit, non tantum sano permanente; sed & nonnunquam, si morbosum fuerit & sani animalis alterius sanguinem in vasa sua receperit, sano fiente; de quibus potissimum Lowerus & Acta Philosoph. Anglica consuli possunt: 6. Sanguinis Malsâ per venam jugularem apertam ad dimidium ferè detracta, injectaque per vices cerevisia cum paucis vino mixta per venam cruralem, cordis motus in cane, pulsû parum diminuto, sanguinisque hinc Circulatio continuata sunt, rediitque demum cerevisia loco sanguinis immissa per vulnus venæ jugularis Vid. Lowerum c. 2. & 4. 7. juvenem 16. annorum insignem sanguinis copiam nulla arte inhibendam per biduum ferè effundentem jusculis valde avidè assumptis recreatum esse ab adstantibus, donec tota sanguinis ferè Massa effusa, jusculi simillimus effluxit humor, qui per diem unum aut alterum durans tandem cessavit, sano interim fiente ac robusto juvene, cordisque pulsû vix evidenter immutato. Vid. Lowerus l. c. c. 2. 8. Cor exemptum omnique sanguine depletum imo infrustula dissectum nondum à motu cessare. Juniorum quoque animalium corda longo tempore post excisionem leviter acicula irritata statim pulsus suos repetere, eosque diu continuare, imò refert Pecquetus *Exper. Anat. p. 8.* Avulsum penitus à sede cor molli inque mensam projectum 90. ferè systolas æquabili vehementia compressisse totidemque explicuisse diastolas, & supremos tum demum efflavisse aliquanta palpitazione spiritus: 9. Cor abscissis nervis octavi paris in Cervice statim palpitare & inæqualem prorsus motum per diem unum aut alterum edere observari, de quo plura vid. in Lowero. l. c. c. 2. Denique 10. ut plura præcream, huc pensitentur observationes & experimenta superiùs à nobis pro vita in mortuis visis ac suffocatis animalibus superstite evincenda, allata *Cap. 10. Th. 13.* aliaque plura ejusmodi ubicunque occurrant, Phænomena. Nos interim in JESU nostri, quò cœpimus, Nomine finimus, Gratias ipsi animitus agentes, pro opitulante ipsius Gratia nobis clementissimè largita, humillimaque flagitantes mente, velit ulterius studia nostra in SS. Nominis sui gloriam, Sapientiæ ejus Veritatisque creaturis collatæ cognitionem

laudemque, ac proximi denique salutare Emolumentum felicissimè promovere ac moderari. Cordatum autem Lectorem rogamus impensè, ut cuncta hisce Thesisibus nostris exposita sagaci animo pensitet, ingenuè dijudicet, æqui bonique consulat, nobisque favere pergat. TANTUM!

*Epimetron Unicum de Chrysopæia & Agryropæia, vulgò*

### Von Verwandlung der Metallen in Gold und Silber.

**T**Ransmutatio omnium metallorum, quæ actu atque formaliter neque Aurum neque Argentum sunt, in verum, naturale, omnia examina S. R. Imperii ferens & ad summum perfectionis gradum exaltatum, Aurum atque Argentum, qualem veri Adepti Philosophi in Scriptis suis per Lapidem Philosophorum sic dictum præstandam perhibent, est Ars antiquissima, veracissima, Naturæ legibus penitissimè conformis, Inæstimabilis, atque dignissima. Nec vereor ultrò polliceri, me cuilibet prudenti veritatisque unicè amanti, sive docto, sive Literarum ignaro, cui Ars illa impossibilis visâ fuerit, si ingenuo animo ulteriorem harum rerum discursum privatim desideret, solidis è Natura depromtis fundamentis & Rationibus Artis hujus possibilitatem eatenus demonstraturum ac probaturum, ut non solum dictis facilè fidem habeat, & ipsemet spontè fateatur, se pretiosam hanc Artem credere possibilem, eamque in DEI Ter Opt. Max. ac Sapientissimi Operibus naturalibus firmiter ac clarè fundatam cernere. Sedulâ namque rerum naturalium perscrutatione, indefessoque Studio atque labore, in nobilissima Philosophia Physico-Chymica, Lapidis Philosophorum seu Tincturæ Aurificæ Argentificæque, nec non stupendorum ejus Effectuum, in Opere Transmutationis metallorum, possibilitatem ac fundamentum clarè perspexi hætenus, idque cuilibet à Partium studio prorsus alieno veritatisque cupido explicare promitto, ne tantum Naturæ & Artis Mysterium, in quo Summi Creatoris omnipotentia ac sapientia, nec non totius ferè Naturæ jucundissimus Generationis Cursus, ceu in speculo Compendiové cernitur, in posterum impossibile mendaxque, uti hætenus à multis Osoribus imperitè factum, reputetur.

OMNIA IN GLORIAM DEI.

DISPU-

DISPUTATIO XV.  
DE MALO HYPOCHONDRIACO,

QUAM  
PRÆSIDE

Viro Excellentissimo atque Experientissimo  
DN. MICHAELE ETTMULLERO,  
Philos. & Medicinæ Doctore,

Publicæ Eruditorum Ventilationi proposuit

d. 14. April. Anno 1676.

A U T O R

JOH. CHRISTOPHORUS TROPPANNIGER,  
Lefna Polonus.

Ἀνευ προοιμίου.

§. 1.



Ominis declaratio, utut parum vel nihil ad curationem rectè instituendam faciat, cum agri non speculantem, sed curantem, atque non verbis sed herbis divitem, exoptent Medicum; attamen, quoniam juxta Scaligerum *Exerc. I. Sect. I.* vocis explicatio ad cognitionem rei sit quasi quædam præparatio, & nomina sint rerum symbola; merito & nos mori hætenus consueto obtemperaturi, de nomine Dissertationis nostræ primum solum ducimus.

§. 2. Nomen autem sortitur suum à loco affecto, sc. hypochondriis à χῆνδρῶν, quod præter granum etiam cartilaginem significat, teste Scapula sub. voc. & à præpositione ὑπὲρ sub, quasi dicas, sub cartilaginibus. Hypochondria verè secundum autorum mentem, præprimis secundum Anatomiam Bartholini novissimè editam p. 13. sunt regio corporis cartilaginibus inferioribus costarum vicina, extendens se utrinque ad ilia cum musculis & internis visceribus simul; Unde & Barbari vocant morbum mirachialem: quia in genere Arabibus Mirah denotat abdomen, Vid. Sennertus lib. 3. *Pr. Med. Part. V. Sect. I. Cap. I. p. 505.*

§. 3. Acceptio vocabuli est duplex: Generalis & Specialis. Illa quæcunque passionem partium sub hypochondriis & infra hæc sitarum denotat; Quâ ratione etiam in sexu

sequiore passio hysterica hoc nomine donari poterit, teste Barbette in *Praxip.* 138. Hæc verò, de quâ nobis sermo est, eam duntaxat affectionem comprehendit, quæ focum suum agnoscit ventriculum, materiâ acidâ viscidâ obsessum, & quæ contradistinguitur passioni hysterica propriissimè sic dictæ; Mulieribus quasi peculiari, & respirationis insigniori difficultate comitata, qualis rarior apud Mares observatur, utut in radice & fundamento, duo hæc pathemata Hypochondriacum & hystericum mutuò conspirare videantur.

§. 4. Variis autem morbus hic insignitur titulis. Dicitur enim passio hypochondriaca, Affectio hypochondriaca, Tartarus hypochondriacus Chymicis, Affectus flatuosus Diocli & Aetio ob ingentem flatuum copiam, Mater Scorbuti Barbette salutatur c. 1. Morbus resiccativus seu siccatorius Hippocrati audit Lib. 2. de *Morb.* Nonnullis Melancholia Hypochondriaca dicitur, quanquam multis hoc malo laborantibus Melancholia non eveniat; interim tamen plurimi Melancholiâ laborant affectione hypochondriacâ correpti. Germanis vocatur das Milchische Herzkloffen: Die Krankheit unter den kurzen Rippen: Der Gelährten Krankheit / non quòd literati soli huic morbo sint obnoxii, sed quia plurimi hoc malo vexantur, qui intra chartas continuò abdomen comprimunt, ita ut liberiori descensui Diaphragmatis via interceptatur; unde tardior humorum fit circulatio, de qua plura in progressu.

[Ecc ec 3]

§. 5.

§. 5. Hisce paucis præmissis, ad realem Definitionem nos accingentes, dicimus: Affectionem hypochondriacam esse dolorem gravativum & constrictorium primariò ventriculi, diaphragmatis & totius mesenterii, dependentem ex convulsione nervorum dictarum partium, subortâ ob visciditatem humorum acidam, vellicantem primas vias, in specie vero ventriculi partes nervosas.

§. 6. Genus est dolor, ægrorum nemini ignotus, qui revera nihil est aliud, juxta Brunonem in *Dogmat. Medic.* p. 269. nisi symptomata sensus tactus nimium aucti. Hunc dolorem gravativum esse & constrictorium, satis indicant patientium querelæ, molestiam sentientium similem ei, quæ à pondere aliquo premente oriri assolet; cum quâ simul partes nervosæ vicinæ, originem nervorum suorum eandem obtinentes cum nervis insertis in sinistrum ventriculi orificium, versus hunc sese contrahunt, ipsi ventriculi fibræ, simili spasmò unâ affectis.

§. 7. An morbus hic veteribus etiam fuerit cognitus? determinare nolo; cum lis de lanâ caprinâ, parùmque ægro & Medico conducibilis. Arbitror tamen, eundem is occurrissè, licet non sub appellatione hac cognitum, nec adeò atrocibus stipatum symptomatibus. Nam uti crescentibus delictis crescunt pœnæ, sic etiam crescentibus luxuriæ & diætæ erroribus, quid mirum, quod atrociori furore nos infestent morbi, qui veteribus tantâ cum severitate grassantes non obtigerunt. Ob quam causam veterum quoque descriptiones nonnihil mitiores, cum nostris tamen convenientes morbos proponunt.

§. 8. De Partis affectæ denominatione tot venduntur litigia, quot ferè hodiè extiterunt Practici. Sunt enim, qui nulla determinatam in Malo hypochondriaco affici existimant partem, ideò forsitan, quia observarunt, nonnunquam in acerbis passionibus hypochondriacis patientes non habere, de qua abdominis parte specificè conquerantur. Alii, quorum animos lasciva varietatis perpersit aviditas, varias elegerunt partes, ob quas affectionem hanc in varias discerpsere species, prout fecit Matth. Martini de *Morb. Mesenter.* p. 152. distinguendo in Mesentericam, Stomachicam, Epaticam, Splenicam, Hystericam, Hæmorrhoidalem, Melancholicam seu Phantasticam. Præ cæteris Phantasiæ mirè indulgent ii, qui spatium istud inter stomachum & diaphragma pro sede ordinariâ, aut saltem pro nido tot flatulentiarum, existimant: Inter quos fuit Levinus Fischerus, qui edidit peculiarem Tractatum de loco & foco Mali Hypochondriaci, permotus *aph.* 57. *sect.* 7.

Hippocratis: Venæ portæ ramos & arteriæ coeliacæ & mesentericæ ut plurimum acculat Sennertus *Lib. 3. Part. V. Sect. I. cap. 2.* p. 506.

§. 9. Missis hisce, & aliorum plurimorum sententiis, unicam cum Highmoreo p. 73. & Barbette *Prax.* p. 140. Hœchstetero *Decad. V. Observ.* aliisque, agnoscimus partem primariò affectam ventriculum: Siquidem id testatur partim dolor patientum perceptus in scrobiculo cordis, loco naturali orificii ventriculi. Interim plane non negamus, sæpius etiam intra curvaturam intestini coli sigmoideam hæere tam pituitam viscidam, quàm scybala nimium indurata, dolorem tunc per consensum causantia; unde tunc querela instituitur de dolore hypochondrii sinistri, sub costis inferioribus spuriiis, sub quo simul ventriculus à subjacente colo, flatibus expanso, atque sic vehementius dilatato, comprimi solet: Partim testimonium perhibet de rectè assignata parte affecta Medici Curatio, quippe quâ constat, vix meliori viâ ratione posterioris abigi malum, quàm clystere applicato; ratione verò prioris asserti vix citius remittere dolorem, quàm, præmissis præmittendis, exhibito Vomitorio. Quapropter recordor sæpius quorundam Medicorum, de Literatis pro mali hujus tam præservatione, quàm Curatione, largiorem Vini interdum assumptionem vomitu comitatam suadentium, quò materia viscida in primis viis collecta evacuetur, & ansa multorum morborum præripiatur.

§. 10. Porro, dum in definitione asserui, simul compati diaphragma & mesenterium, neutiquam de foco morbi debent hæc intelligi, quasi in hisce partibus materia aliqua colligatur, quod jam antea rejectum, & sequentibus rejicietur; sed quatenus in consensum diætæ partes ob fibras ventriculi convulsas rapiuntur. Simulac enim ventriculus in dolore hypochondriaco convellitur, æque convellitur diaphragma. Structura namque nervorum & membranarum in universo corpore habet se ad instar chordarum tensarum, & inter se connexarum: unde uno loco unâ fortius pulsâ, per consensum altera quoque movetur, & pars à parte afficitur. Vid. Willisius in *Anatome & Pathol. Cerebri*: It. Cartesius. Quamobrem quaecunque ventriculi exorbitantiam expiare teneretur diaphragma, quod quia tendinibus suis costis spuriiis & processibus suis lumborum vertebrae implanta-tur, sequitur, ut & ingentem percipiamus dolorem in costis spuriiis, & vertebrae abdominis; Quoad anteriora ad instar circuli constricti; quoad posteriora ad instar calculi nephritidem inferentis. Cæterum, quia nervus intercostalis etiam diaphragmati propagines suas



suas communicat, fit ut convulso diaphragmate in consensum quoque trahantur musculi respiratori inservientes ceteri, in specie autem quoad partes posticas. Ex quibus nervorum, & hinc musculorum & membranarum spasmodis, multijugæ patientium detestationes doloris tensivi, dorsalis præsertim, nonnunquam ad vertebrae colli usque protensi, quod ipsum præterlapso anno proprio meo (si Medico imbecillitates referre proprias decus est) testari possum exemplo, suboriuntur. Exinde quoque facile licet colligere, quomodo sæpius in hypochondriacis asthma aliquod siccum natales suas nanciscatur? Imò quomodo in hypochondriacis adeò frequenter symptomatum præfatorum societatem appetat Cordis palpitatio? Hinc æquè non ineptè aliquis vocitaverit Passionem hypochondriacam Epilepsiam ventriculi.

§. 11. Causam efficientem proximam, præcedentibus innixus fundamentis, statuo convulsionem nervorum, à materiâ viscidâ acidâ excitatam, quam veteres succum atrabilarium seu melancholicum acidum salutarent. Vid. Sennertus *Lib. 3. Part. 5. sect. 1. cap. 3.* Modus verò generandi, ac natale solum, ut debitè assignaretur huic succo, tot veterum ac recentiorum quorundam sunt ventilatæ sententiæ, quot in pervestigatione partis affectæ colligi potuerunt discrepantiæ. In hoc tamen fermè conveniunt omnes, quòd naturam hujus succi acidi obvelare nequeant, ac propterea materiam viscidam acidam acculent, utut in minerâ determinandâ discrepent, ac Lienem hujus infortunii, cuius tamen insons est, corpori humano ingruentis injutiosè insimulent. Attractricem enim facultatem præ reliquis visceribus an sibi soli vendicet lien? ac totius Massæ sanguineæ quisquiliæ seu partem chyli terrestriorem in sinu suo colligat ac foveat? ventriculo pro exigentia communicet? permittant mihi Auctores, ut dubitem. Omnes enim humores, sicuti in reliqua viscera pulsû moventur, & nullus naturalium corporis partium appetitus pro nutritione earum demonstrari potest, quem tamen recentiores nonnulli asserere non erubescunt; Itane oscula vasorum, intra ventriculum hiantium, esse providentia lienis chylisuga (ut licentiâ omnium ita loquar) ut per vas breve venosum chylus absorptus tradatur; neque peculiare ductus ex liene succum acrem in ventriculum & hepar vehentes concedere possumus; Quod utrumque in Cornelio Consentino, proponente illam sententiam *Prog. VI. de Nutricat. p. 248. & hanc ibid. p. 244.* vehementer miror. Quarum hæc satis refutata est ab Harvæo, & aliis, quia venæ non ad partes vehunt, sed ab iis revehuntur id, quod per arte-

rias cordis impulsu promanavit. Hanc verò prosternere videntur aspleniorum canum testimonia, qualia cum Diemerbroccio mihi quoque sunt cognita, qui æquè voraces sunt ac benè digerunt, quàm qui adhuc splenem in corpore suo possident. Deinceps succum hunc acidum fore lieni magis hostilem quàm proficuum, satis demonstravit Tachenius in *Hipp. Chymico*, eò quòd omne acidum extra ventriculum sit naturæ inimicum, & ansam potius præbeat scirrhi lienis sæpius in hoc morbo obvenienti, qui quando obtingit, potius est productum morbosum, quàm causa morbi. Proinde maxima autorum turba obicem sententiæ meæ non ponet, accusantium lienem primariam sedem Mali hujus, cum dolor maximus non circa lienem, sed costas spurias, percipiatur. Quin imo in ejusmodi patientibus lien, referente Sylvio *Lib. 1. Prax. p. 82.* optimè constitutus fuit repertus; Hinc etiam neque ex liene, neque hepate, neque diaphragmate, per vomitum, quod evacuatur in nostro affectu, cum tanto levamine proximè prodit, sed saltem ex ventriculo. Multò minus spatium inter diaphragma & ventriculum idoneum hujus materiæ colligendæ est repertorium, cum lymphæ aut cruor extravasatus statim putredinem concipiat. Uti nec melaraicæ venæ sunt gazophylacæ hujus inquinamenti, quæ statim in tumorem attollerentur, ac circulationem sanguinis sufflaminando, graviorum morborum existerent mineræ; puta inflammationum.

§. 12. Dico ergò: materiæ istius officinam primariam esse Ventriculum, id quod indicant frequentes ructus, vomitusque acidi. Ructus quod attinet: originem ducunt materialiter & proximè ex materia viscida, inter quam effervescentiæ motu successivè generantur, & in qua turgescente, non aliter atque aer intra bullam includuntur; ita ut quò viscidum in corpore sit copiosius, eò etiam copiosior fiat flatuum proventus. Quod ipsum duorum liquorum Chymica monstrat mistio, quorum si alter substantiâ spissiori abundaverit, largior longè flatuorum halituum produceretur copia. Videntur autem ructus tales seu flatus maximâ sui mole nil aliud esse, quàm aer, latitans intra materiæ viscidioris ex assumtis alimentis genitæ poris, qui ex iisdem, præsertim alcalicarum particularum spatiolis, per irruens acidum, sub mutua horum activitate extrusus, virtute suâ elasticâ se pandit, & subtilioribus materiæ effervescentis halitibus sociatus, erumpens tandem, easdem cum alimentis assumtis quoad saporem & odorem ferè prodit qualitates. Hi verò (vomitum nempe) quod citra omne dubium sint acidi & corrosivi, patet ex den-

dentium, quos allidunt, stupore. Imò *ex Obs.* Highmori constat, vomitum hypochondriacum sæpè labia, linguam, fauces & guttur, exulcerasse. *vid. cit. Aut. p. 105.*

§. 13. Quando simul intestina tali materia flatuosa sunt adimpleta, tunc murmura & crebri adsunt borborygmi: Dum verò visciditate suâ in cellis Intestinorum, inprimis coli, hæret, acorè suo pertinaces dolores & lacerationes, pituitæ veterum vitreæ adscriptas, inferre assolet. Hinc sæpè conqueruntur ægri, se percipere infarctus in abdomine, & monstrando locum, situm coli sub stomacho exactè delineant; unde & ut plurimum Malum Hypochondriacum comitatur passio colica. Hic chylus vitiosus in massam sanguineam delatus, spissam & fermentationi imparent eandem reddit, ex qua radice multifaria morborum monstra progerminant: Nempe per circulationem sanguinis ad reliqua viscera derivatur, in quibus hærendo ab acido suo vitioso magis magisque coagulatur, tumores & infarctus varios inducit, diversis dolorum speciebus comitatos; quatenus acidum, nervosis inimicum partibus, fibras harum convellit, variosque spasmos & convulsiones, hincque dolorosa pathemata, non rarò inducit.

§. 14. Qui malum Hypochondriacum cum Paracelsò à  $\Psi$ o quodam acido, vel etiam veterum Melancholia acida, ortum suum ducere asseret, à vero multum non aberrabit. Siquidem hæ sententiæ omnes eò collimant, ut statuunt acidum viscidum, quod subinde in nimiam fixam degenerat naturam, unde nunc  $\Psi$ eam quendam acidam, nunc  $\Theta$ licam stipticam indolem, æmulatur (qualem observamus in succo inspissato corticum viridum nucis juglandis, quem succum non nemo sub titulo  $\Theta$ li vegetabilis miris modis recommendavit) quatenus scilicet partes quædam terrestriores excrementitiæ, latitantes intra reliquias alimentorum, ab acido nimium exaltato solvuntur, ut sese intimius misceant partibus  $\Theta$ inis acidis, ex quarum textura mutua quasi  $\Theta$ lici aut  $\Theta$ si saporis concretum emergit. Siquidem in hypochondriacis reperire licet partes terrestres, quæ tamen ad instar  $\Theta$ ium ob nimiam fermenti aciditatem intimè sunt solutæ, ut, si experimentum fiat, subtilissima filtra penetrare queant, quæ tamen ab acidi consortio stipticam  $\Theta$ licam vel  $\Theta$ siam naturam exhibent.

§. 15. Causæ remotæ sunt variæ. Ex naturalibus est Temperamentum ventriculi, veterum dictum frigidum seu melancholicum; Neotericorum Dyscrasia acida, maximè frequens in regionibus nostris boreali-

bus, & convenit utrique sexui, ac omni ætati, tam juvenili, quam senili.

§. 16. Ex non naturalibus est aër acris, constans ex  $\Theta$ ibus acribus in ejus poros elevatis, & à copiâ  $\Psi$ osorum effluviorum dilutis, observabilis tempore autumnali & verno, auditque nostris Germanis *Schnuppsicht und flüssicht Wetter*. Hinc ejusmodi aër inquinando salivam, sese in ventriculum insinuat, ibique reliquias in stomacho hærentes vitioso sapore inquinat. Ex alimentis omnes panes non ritè fermentati, pultes compositæ ex aqua & farina non fermentatæ, pisces & carnes fumo induratæ, & non ritè masticatæ; It. Cerevisiæ non benè fermentatæ. Porro quies nimia symbolum addit, quia continuò sedentes comprimunt abdomen, & diaphragmatis motus, uti dictum, inhibetur. Jam verò abolito hujusmotu, & compressis musculis abdominis, alimenta diutius immorantur ventriculi cavo, exindeque nimium fermentando, partes eorum terrestres cum salinis dissolvuntur. In hoc passu hepar quoque continuò comprimitur, quo ipso & succo bilioso in tantum sufflaminatur exitus, quare degenerat ex succo amariicante in lixiviale alcalicum nimium. Hinc facti nimium fixi succi in intestinis excitant largum flatuum acrium proventum. Quapropter sæpè Malum Hypochondriacum comitatur species quædam Colicæ, & bene Scorbutus inde oriundus sub uno titulo tractatur à Barbette.

Porro ex rebus non-naturalibus multa conferunt huc excretiones suppressæ: Hinc virginibus & mulieribus gravidis ob suppressionem mensium sæpè accidit; It. viris totaliter  $\Psi$ ris usum intermittentibus. Suppressis enim excretionibus vasâ nimium replentur, hinc sequitur tardior humorum circuitus, & consequenter incrassatio eorum. Quâ ratione somnus quoque nimius magis nocet quàm recreat, ad tardiores circulationem humorum ansam præbens, imprimis qui statim post cœnam capitur, nisi patientis consuetudo aliud nos doceat juxta aph. Hippocratis  $\S$ o. *Set. II.* Vigiliæ è contranimitæ etiam noxam inferunt musculis, diuturnâ agitatione corporis defatigatis, & hæc ratione tardiores motum humorum procreantibus.

Neque à materia solùm hætenus depicta viscida acida id dependet mali; sed etiam à principio activo s. Archeo, nervos dirigente, p. n. irritato. Sæpius enim ex sola iracundia malum hoc invasisse quosdam, testatur experientia. Quo in casu æque pati videtur anima nostra, atque satis eruditè ab *Exc. Dn. D. Ammanno P. P. Lipsiensi*, in deliriis ac mania pati judicatur. Animam enim

non

non corpus, sentire, certum est, idque fit, quatenus est in cerebro; non quâ membra corporis actuat, vid. Cartesius in *Dioptr. c. IV. p. 67.* Hinc quoties vel Ecstasi vel aliâ contemplatione distracta velut extra corpus ponitur, toties sensus externi stupidi quasi & semianimes observantur.

Ex p. n. sunt omnes species suppressæ excretionum jam enumeratæ; It. febres malè curatæ, imprimis intermittentes: De quibus vid. Paulus Zachias.

§. 17. Differentia mali Hypochondriaci fit in adscitum & hæreditarium. Illud jam hætenus est inculcatum. Hoc à parentibus propagatum.

§. 18. Citra ambages Signa diagnostica recensemus hæc: Dolores gravativi & tensivi in regione lumbari incipientes, & gravissimo contorsionis sensu hinc inde in abdomine oberrantes, anterioraque versus contorquentes, imò ad vertebrae colli protracti, adeste solent. Ubi malum est confirmatum, exacerbationes suscipit sumptis cibis, ubi solent adeste phlogoses ac respirandi difficultas. Interdum vomendi conatus jejuno præprimis stomacho. Flatus & ructus ferme sunt continui, ut & contumacissima alvi obstructio, Vertigines, Cephalalgia, anxietates, ad somnum propensio, terrores & tristitia, citra manifestas causas mentem perturbantes. Interdum viri iis vexantur, quibus mulieres aliàs sunt obnoxia hysterica; Pulsus sunt varii, Inæquales, & omni ferè momento mutabiles in Paroxysmo. Extrà hunc pulsus adest magnitudine moderatus & tardus. Urina ut plurimum est citrina, recenter mixta, & in tantum crassa, utut pellucida; Interdum turbida & pallida, cum copia  $\Theta$ ium: Postquam verò aliquamdiu steterit, præcipitatur in materiam viscidam copiosissimam & sabulum rursus gryscum, unde & Medicastris urpl. accusant renum calculum, quia in lumbis percipitur dolor, quod sabulum tamen in urina tale non extitit. Vid. Helmontii Tartarus insons.

§. 19. Prognosis quod concernit: ea sequens esse poterit. Quod malum hoc in incunabilis adhuc benè edomabile sit? Quod si verò adoleverit, actuosissimam sæpe Medici illudat industriam. Ubi Cephalalgia non adsunt contumaces, neque appetitus prostratus est, & flatuum ac ructuum continuus non est proventus, spes salutis adhuc superest. Si altas radices egerit, progignit non degenerem sobolem Scurbutum. Vid. *Prax. Barbettiana.* Scurbutum autem qui dixerit, lernam malorum dicet. Hinc contumaces palpitationes cordis, Melancholia, agrypnia, Ephialtes, nonnunquam etiam Epilepsia, & quidem talis, ut juraveris ma-

lum dependere à Dæmone, imprimis in mulieribus, supervenire solent. Quod si hoc malum non curetur, ac vomitus niger superveniat, uti sæpius observavit singulari honore amoreque maestandus Dn. D. Petermannus, funestum est signum, & plerumque prælopede sequitur mors. Si à scybalis diu retentis contumacissima adsit alvi obstructio, periculum est, ne ad volvulum aut inflammationem, tandemque sphacelum secuturum disponat. Hæreditarium Malum hypochondriacum nunquam admittit curationem plenariam.

§. 10. Curationem legitimam instituendam secundum certas indicationes subministrat triplex Fons. Ex fonte Chirurgico commendant quidam salvatellæ sectionem, quæ tamen cum præ aliis venis nullam habeat prærogativam, prout ex circulatione sanguinis notum, non aliud à reliquis afferet ægro auxilium. Hæc tamen ratione admitti posset V. S. quòd citiorem cursum humorum promoveat, & ita convulsione partium nervosarum forsan stagnantem sanguinem in motum rursus suscitaret.

Fons Pharmaceuticus dirigitur juxta has Indicationes:

1. Acidum viscidum temperetur.
2. Temperatum evacuetur.
3. Convulsiones per anodyna sedentur.

Hinc ex regno vegetabili offert primò omnia antiscorbutica, quæ quia participiant de  $\Theta$ e volatili, magnam noxam inferente hyochondriacis, cum aliis sunt miscenda. In genere conveniunt aperientia dicta Epatica, Splenetica, & omnia stomachica, ut sunt: Absinth. fumar. Card. Bened. Chamædr. Chamepyt. scolopendr. It. rad. gramin. armorac. acori, polypod. filic. helen. foeniculi, It.  $\Theta$ ia lixivialia,  $\Theta$  absinth. Cichor.  $\Theta$  stomachal. Mynsicht.  $\Theta$  compos. quod ex remanantia ~us  $\Theta$  Ammoniaci destillati elicitur, egregium diureticum, dictum digestivum hypochondriacum. It. cit. herb. Ess. Decocta, infusa. Succu expressi amaricantes vegetabiles. Egregia quoque est myrrha, gummi Ammoniac. Quercet. satis proficua sunt.

Ex minerali regno omnibus palmam præripiunt  $\Theta$ lia. Inest namque vis insignis  $\Theta$ ti Acida absorbendi teste Chymia. Notetur tamen, ut semper admisceantur alia; Si enim  $\Theta$  concurrat in acido fortiori, degenerat in  $\Theta$ lum, quibusdam nauseosum, imò Vomitorium, præsertim si  $\Theta$  impurior fuerit, & tantillo licet  $\Theta$ ris contagio inquinatus, à quo  $\Theta$ lotunc intra corpus emergente pertinaces vomitus superveniunt: aliàs  $\Theta$  cum spiritu volatiliori sulphuris illitus, resolvitur in crocum  $\Theta$ tis saccharinum. Reliquis omnibus

[Fff ff]

præse-



præfero crocum  $\sigma$ ris cum  $\Theta$ libus. Dum enim  $\Theta$ ia lixivialia concurrunt cum limaturâ  $\sigma$ ris, aggrediuntur partes acidas  $\sigma$ ris, quo facto, destruitur structura corporis  $\sigma$ ris, crocusque in corpus adsumptus saltem est alcalicus, quia ab acido ventriculi ita coagulari nequit, ut induat perfectam naturam  $\Theta$ li, destructo prius acido minerali. Deinde laudo hic pulverem  $\sigma$ lem  $\delta$ alem compositum ex p. j.  $\sigma$ t. & 2. p.  $\delta$ ii, fixatumque per  $\Theta$ um, in 3pla proportionem additum, ex quibus fit medicamentum blandius ipsâ limaturâ Martis. Dein adhiberi possunt Tinct. Martiales, Tinct. Mart. Zwelff. Essentia  $\sigma$ t. dulcis, quam non magni tamen æstimo ob crudum  $\sigma$ tem, nisi mox adhibeatur cum subsequen-  
tibus purgantibus, quo modo extr.  $\sigma$ t. cum succo pom. potest assumi inter Pil. purgantes.

Porro incidunt & corrigunt suo modo acidum tartarus  $\Theta$ lat. tart. chalybeat. Tinct.  $\delta$ ii tartarizata, terra tartari fol. Spir. tartari volat. Spiritus Carminativus de tribus, Spiritus  $\Theta$ , Ammoniaci c. liq. ex terra tart. fol. mistus pro secreto ab aliquibus habetur:  $\Theta$  depuratum etiam commendatur hic, præsertim ubi flatus aut phlogosès magis urgeant, cujus usu desperatos hypochondriacos ad extremam feremaciem deductos aliquando feliciter curavit Bartholetus *Tr. de Dyspnæa lib. V. cap. 4.* Elix. Proprietat. Elix. stomach. Dn. D. Michaëlis.

Ex animalibus profunt omnis generis præparata ex ossibus, & ex Marinis, v. g. C. C. Mater perlar. Coral. Oculi Cancr. &c.

§. 21. Acidum viscidum incisum & correctum sensim atque sensim evacuetur, seu per superiora seu per inferiora; alvus verò, quantum possibile servetur continuo aperta. Inter evacuantia hic vomitoria palmam præripiunt: Unicum enim Vomitorium plus præstabit quam decem purgantia; habitò tamen respectu ætatum sexuumque. Propinantur autem præcipuè in infuso. In omnibus enim vomitionibus ventriculum aliquantisper repleti conducere arbitror, quò viscidæ peccantes particule faciliùs egerantur, cum aliàs saltem inanis sequatur vomendi conatus: Vid. *aph. 13. sect. IV.* Hippocratis. Parum autem interest, utrùm ex  $\delta$ io crudo,  $\delta$ io vitæ, succino  $\delta$ ii, Croco metall. simpl. vel absinthiac. Myns. parum quoque interest, utrum ut nuda infusa adhibeantur? an verò inspissentur in tantum cum saccharo in consistentiam Syrupi, vel etiam in formam pulveris mutantur? uti ex  $\delta$ io vitæ & Crystallis tartari per infusionem, filtrationem, & evaporationem fieri potest. Notetur igitur, ut extrahendis addatur Acidum, aliàs nihil extrahitur.

Purgantia verò sunt lenia; fortiora

enim pessima inferunt intestinorum symptomata, ægrosque disponunt ad dysenterias, tormina & diarrhœas. Hinc profunt hic pil. ex Ammoniaco Quercet. suprâ laudatæ, quæ possunt acuari stimulo de Colocynth. quæ sunt egregiæ: Radix Helleb. nigri quoque prodest satis, sive adhibeatur inter infusa, quæ non ultimum in hoc affectu sibi vendicant locum, sive inter pilulas.

Rhabarbarum tanquam aptissimum & promptissimum alterans & evacuans laudatur à Rhodio *Cent. 2. Obs. 2.* tam infusum, quam decoctum. Aloëtica multis etiam hic sunt in usu, quò etiam pilulæ Francofurtenses pertinent. Verùm omnia aloëtica plus nocent quam profunt, propter virtutem adstrictoriam, quam post se relinquunt ordinariò, hinc corrigatur hæc vis.

Tertia Indicatio obtinetur per omnis generis sedativa seu confortativa, v. g. Cinnamon  $\delta$ ii, Dent. equi Mar. præpar. Ebur f.  $\Delta$ c. Unicornu præparat. Ungul. alc. præparat. Ex quibus speciebus præstantissima sunt præparata: quibus admisceri poterunt opiata, v. g. Essentia Op. ad mod. Langelotti, Laud. Opiat. Extr. theriacale. Et in sexu sequiori Castoreum, & exinde parata Ess. Extr.  $\nabla$  hirund. c. Castoreo.

§. 22. Clysteres hic profunt emollientes & abstergentes, si scybala in intestinis malum hoc inferant: Si causa verò in ventriculo hæreat, dubito de ipsorum usu.

§. 23. Formulas hic annectere est replere paginas variis ambagibus, & conspurcare atramento. Committuntur enim cujuslibet prudentis & exercitati Medici judicioso arbitrio, pro ratione circumstantiarum, ætatis ac sexûs curam gerentis. Ideòque ultimo saltem loco ad rectè instituendam dietam observetur in omnibus temperantia, & vitentur ea, quæ supra expositæ causæ mali hujus nutrices esse possunt, v. g. Pisces & carnes salitæ, & fumo induratæ; It. Acida varia, & omnis generis talia, quæ lympham viscidam, acrem, aut acidam, in corpore producere & sustentare valent. Et si qui sunt, qui Medici opem non quærunt, sciant, quòd non meliori damno ipsorum consulatur salutem, quam si studiò protractis moris convalescendi Mors morbo ipsorum imponat FINEM.

#### COROLLARIA.

*Omne Symptoma est symptoma actionis læsæ.*

*Materia purulenta hærens in corpore extra vias urinarias, v. g. in Phthisi & Pleuritide suppurata, nunquam cognoscitur ex urinâ.*

*Mercurius dulcis sæpiùs sublimatus reverà sit diaphoreticus.*

DISPU.

DISPUTATIO XVI.  
DE EPILEPSIA,

QUAM  
PRÆSIDE

*Viro Excellentissimo atque Experientissimo*  
DN. MICHAELE ETTMULLERO,  
Philos. & Medicinæ Doctore,

Publicæ Eruditorum Ventilationi submisit


A U T O R

GODOFREDUS Weinlig / Uratislavia - Silesius,  
d. 16. Junii Anno 1676.

P R O O E M I U M.

*A*FFECTuum humani corporis Machine insidiosam properantium ruinam, nullius  
fermè ferocior ac truculentior animadvertitur Epilepsiâ, etiam in illos iniqua,  
quorum oculis saltim subicitur horrendum ejus spectaculum. Luget enim mens, & cor  
improvise horrore perfunditur, quando fors egros in plateis fulmine quasi quodam  
tactos, & membris sæpè suis lapidosum arietantes solam, nobis cernendos offert. Et  
licet equali ferocia non omnes cernamus agitados; fermè tamen neminem a malo hoc  
multiplici specie aut gradu variante insontem excipere poterimus. Album hic donabit  
mihi calculum, quicumque varias Epilepsiæ discrepantias & causas depictas legerit.  
Thematis autem hujus electionem suavit commiseratio mea erga viros per vitæ dies  
egros, quibus nullo temeritatis pruritu adactis, aut insolenti libidine gloriam ca-  
ptandi stimulatus, opem ferre conor hoc onere pressis (utut intentioni Medici non  
semper eventus respondeat, cum non sit medela iis, qui diuturnas divini numinis vin-  
dictas horrendis suis flagitiis in cervices suas extorquent) sed thesibus præsentibus  
eruditorum invito imprimis scrutinium explorandi, quantum per artem aegris auxi-  
lii & tales Tragædias spectantibus, solatit superfit. Deterreri quidem debuissim hoc  
nodo Gordio, eruditissimis etiam Viris multum negotii facessente: Veruntamen mate-  
riam hanc eruditorum ventilationi exponens, forsitan non iniquus judicabor; si cupi-  
dus discendi tentem, quid valeant humeri, quid ferre recusent? Cui conamini ut San-  
ctum Numen benigno nutu asset, piissimis voveo suspiriis.

*Thesis. I.*



Ine citra diuturniorum præ-  
velitationem thema hoc  
aggressurus, more hacten-  
us consueto primum dabo  
locum Notationi vocis hu-  
jus Epilepsiæ, evolvendo  
ejusdem Etymologiam, hinc Homonymiam  
& Synonymiam.

Græca verò agnoscit incunabula, pro-  
cedens à primitivo composito *ἐπιλαμβάνειν*,  
prehendi, corripere; unde derivatum notat  
deprehensionem seu invasionem, quasi dic-  
cas, affectum hunc esse hostis instar, impro-  
viso à tergo facinore incessantis, & subitâ

Tom. II. Pars 2.

prostratione in victos tyrannidem suam exer-  
centis. Consule Lexicographos.

Ego hic brevitati studens paucis Ho-  
monymiam annecto, credens duplici ratio-  
ne accipi posse hoc vocabulum: I. Laxe ac  
tralatitiè notat quemcunque motum convul-  
sivum, aut convulsionem cujusvis partis,  
v.g. Cordis in palpitatione ejus; Ventriculi  
in Vomitu & singultu; Musculorum thora-  
cis in Incubo, digno Epilepsiæ parvæ nomi-  
ne; Pulmonum in asthma sicco, Helmon-  
tii Caduco pulmonum; Nervorum phreni-  
corum, intercostalium, ac ventriculi in Ma-  
lo Hypochondriaco; Intestinatorum in Coli-  
câ, & Alvi fluxibus; Penis in Priapismo ac  
(Fff ff 2]

Sary-

Satyriasi. Imò illorum, qui coitus dulci labore molestantur, affectus parva Epilepsia nuncupari solet, à qua ad magnam facilis est progressus, quale exemplum non nemo observavit, ac simile videre est in *Obs. opido Rar.* Henr. ab Heer. *Obs.* 18. Refer huc omnis generis dolores, qualis est Ischiaticus, Arthriticus, &c. *II. Strictè* indicat symptoma actionis auctæ principii moventis, & organorum motui corporis animali destinatum, quo in casu imparià fiunt ferendo officio naturali, destinato sensibus ac motibus ordinariis. Et hoc thema meum intendit.

Synonymias verò, & earum omnium denominationum causas, hic enucleare superfluum duco, verens ne crambem multoties coctam apponere dicar avidis. Quarantur ergò in variis autoribus, v. g. Unzeri *tr. de Epilepsia*, & Sennerto *lib. 1. Med. Pract. sub. tit.* Unum hic considerandum; cur à nonnullis divinus seu sacer dicatur hic affectus? an non divini aliquid in recessu habeat? Negat hoc Hippocrates *lib. de Morb. Sacro*; asserit verò Mœbius in *Institut. lib. 2. Part. 1. cap. 4.* Sed hac de re infra. Germanis dicitur: *Die schwehre Noth/ das schwehre Gebrechen/ die fallende Sucht/ die böse Krankheit/ S. Bälten's Krankheit/ das Kinderwehe/ der Jammer.*

*Thes. II.* Misso viliori cortice, nucleum gustandi properans, Definitionem realem præmitto. Epilepsia est Symptoma actionis animalis auctæ, consistentis in totius corporis imperio, coque involuntario atque inordinato motu, cum sensuum & actionum naturalium ad tempus cessatione, dependentis primariò ab anima seu principio vitali, ægrè sentiente seu molestato (quod Helmontius per furorem Archei explicat) indeque perversè organa movente; secundariò à nervoso genere primùm præternaturaliter affecto.

*Thes. III.* Genus in definitione posui Symptoma actionis auctæ Principii moventis, quod ex ipsâ *avroψία* patet, & infra probabitur. Quo ipso refertur secundum Mœbium *loc. cit.* ad morbos occultarum Qualitatum, & secundum Sennertum ad Symptomata facultatis motricis: cum quibus ego certo respectu hac occasione facio. Quoniam autem apud omnes in confesso est, Epilepsiam esse actionem læsam, omnisque actionis in corpore nostro læsio symptoma firmiter creditur, ideò rectè Epilepsiam per symptoma me descripsisse autumo. Quò nomine adhibito, affectum hunc ex morborum archealium, principii nostri vitalis moventis, cujus naturales actiones fundantur in

legitimâ motione ejus, ac naturali dispositione & constitutione organicarum partium, censu non excludo quidem, sed potius includo. Atque deinde Symptoma Curationis objectum proximum non credo; sed potius morbum, qui materiæ cujusdam in substantiâ peccantis status præternaturalis est, quâ actionem naturalem impediende sublata aut correctâ, restituitur actio, & symptoma cessat. In nudâ enim ac simplici actionis læsione consistit, & aliquod substantiale morbosum, organa lædens, matrem agnoscit, quæ à contactu materiali corporali pharmacorum impugnatur, & exturbatione suâ actionem redire facit naturalem.

*Thes. IV.* Pergo nunc rectâ semitâ ad ipsum SUBJECTUM, quod Cerebrum totumque genus nervosum cum fibris quæviscunque in toto corpore assero. Dum enim Epilepsiam considero seu symptoma actionis in motu animali aucto, & plus minus depravato, sequitur nervosarum fibrarum sensui atque motui animali inservientium primarium pathema illud ipsum esse. Istud nempe, quod naturalis motus subiectum est, seu naturali motu movetur, illud ipsum etiam præternaturaliter concitari, ac Epileptico insultu vibrari manifestum est. Cum verò quodlibet symptoma, & speciatim ex actionum læsarum quæ sunt genere, sequatur morbum, seu umbra Corpus, de parte morbosâ hoc symptoma post se trahente, quæstio præsertim urgetur. Hanc autem ipsum principium activum, & motivum corporis partium, animam scilicet esse assero, quæ causarum antecedentium vi, sive immediatè, ut in animi pathematis, sive mediatè, occasione materiæ cujusdam peccantis, præsertim acidioris, commota, impetum suum motivum & partibus corporis solidis communicat, indeque Epilepticas turbas concitat. Esse verò subiectum patiens ipsam animam, confirmat hoc, quod ob crebram Epilepsiæ perpeffionem varix subsequantur ejus imbecillitates, quæ tandem in bliteam rusticitatem aut fatuitatem desinunt. Nempe universum genus nervosum ex naturâ suâ immobile censeo, nisi internus Rector motum eidem conciliet. Quibus ritè omnibus consideratis, duplex subiectum patiens in Epilepsiâ, nempe tam ratione morbi, quam ratione symptomatis, proponi potest: Illud, seu quod ratione morbi affici dicitur, Archeum seu principium vitale movens, seu auram vitalem, seu animam rationalem immortalem, voca ut lubet; quod tamen symptomatis insequentis respectu Efficientis rationem subit: Hoc, nempe ratione symptomatis in motu vitato, genus nervosum, cum fibris quibus-



buscunque in corpore partem affectam primario arbitror.

*Thef. V.* CAUSA EFFICIENS Epilepsiae ex modo dictis, vel sponte patet, cum nempe esse principium vitale movens, seu ipsam animam, in homine nempe rationalem, & ipsam quidem ratione causarum antecedentium male affectam, Epilepticorum tamen motuum effectricem. Hinc in foro Medico exercitui gratia Materialem, adeoque corpori junctam alterabilem, statuere nil impedire videtur, siquidem ex lumine Naturae, quae ubique in Physiologia Medica late patet, nec de immaterialitate, & consequenter nec de immortalitate ejus, apodictice quid colligere licet, Sacrae Scripturae auctoritate, quam humillime veneror, facta rectaque manente. In determinando ergo & describendo hoc ipso morbi nostri Epileptici fundamento, necessitatis esse duxi, ex Physiologicis naturam ejus & modum operandi sciscitari; idque eo magis, quo magis hypothese ad unam collimare metam videri possent, ut parum referre videatur, utrum ex doctrina hodie recepta de Spiritibus exponere hunc affectum, an etiam ex hypothese fundamenti nostri loco de anima ipsa humana, ut sic, supposita, hoc phaenomenon explicare conemur. Brevibus ergo enarrare quorundam Autorum de anima & principio corporis vitali hypotheses consultum esse duxi, ut ex variorum intuitu elucescat eo clarius, quod verisimilius est.

*Thef. VI.* Galenus in determinanda animae quidditate suam fatetur ignorantiam *lib. de Fæt. format. Vol. I. p. m. 1254.* his verbis: *Cum nullam opinionem scientificè demonstratam repererim, dubitare me de animae substantiâ confiteor, quando sanè neque ad credibile aut probabile quicquam pervenire possim.* Hippocrates *Lib. de dietâ p. m. 186. n. 8.* dicit, *irrepere in hominem animam, ignis & aquae temperamentum habentem, partem corporis humani.* Ex quo tractatu patet, Hippocratem credidisse igneum principium nostrum activum, cui hodiernum adstipulantur multi autorum. Confer. Bartholinus *Epist. ad Holst. Item Tract. de Luce hom. & brut. It. Holstius de Flammul. Cordis.*

Cartesius *lib. de Pass. art. VIII. p. m. 4. & 5.* Calorem statuit continuum, quamdiu vivimus, inesse cordibus nostris, qui species sit ignis, quem sanguis venarum nutrit, & hunc ignem esse principium corporale omnium motuum nostrorum membrorum. Verum, quid vetet, quo minus his non subscribam? vid. ap. Needham, de Biolychnio.

Secundum Willisium & alios Spiritus

animae sensitivae hypostasim constituere dicuntur, uti ex Tr. Anat. Cerebi & Patholog. Cerebri, it. Tr. de Animâ Brutorum, luculenter patet, ubi in ultimi *tract. Cap. I.* aliorum quoque opiniones collectas legere licet.

Helmontius Tr. Archeus Faber *num. 4. p. m. 33.* statuit principium vitale in animalibus esse Archeum, qui constet ex connexion vitalis aurae, veluti materiae, cum imagine seminali: quae aura, quia non irrui in oculos nostros, merito invisibilis & intangibilis dicitur in Tr. Prog. ad morb. §. 11. & licet non in guttas secundum Tr. Compl. & Mist. No. 41. tamen apta nata est, ut contineatur in liquore, cumque in varios motus cieat, quam ipsam ideò Harveus *Exercit. Phys. LXX.* in sanguine hospitari asserit.

*Thef. VII.* Hæc aura, quoniam Universalis est, specificatione opus habet, dependente ab ideis seminalibus, quæ neque accidentia dicuntur, modo citato Helmontio (jure an injuriâ? non disputo) sed potestates à creatore Sapientissimo inditæ sunt, ut earum ope aura hæc non solum, tam varia subire munia valeat; vid. Helmontius de Lithias. *cap. I. §. 5.* verum & sese dividere atque multiplicare, imò sobolis suscitandæ fecunditatem concipere potens evadat. Has ideas vocito impressiones aut dotes vel privilegia divina, quales Helmontius sensisse videtur: quæ utrum cum Marci Ideis concordent? quilibet ingeniosus lector scrutetur. Unum mihi placuisse de ideis confiteor, Hieronymum Hirnhaim. Tr. de Typho Generis humani, qui satis perspicue explicavit Idearum doctrinam; nisi quod fermè nihil aliud sensisse videatur, quam qui formas rerum specificas statuerunt: interim tamen sagaciori judicio naturæ phaenomenis applicavit & explanavit.

*Thef. VIII.* Hactenus de animâ sensitivâ loquentium autorum prolata sunt sententia, de rationalis essentia ac quidditate plane tacentium. Hanc cum Helmontio eundem statuo Archeum, utut materialem, etiam tamen rationalem. Nam inter privilegia auræ nostræ vitali, s. animæ nostræ, ex misericordia divinâ concessa, numerandam quoque immortalitatem ejus censeo, ut in morte licet ponatur, ut supra insinuavi, materialis, ac ceteroquin patibilis, ab interitu tamen secus quam brutorum anima, à quibus gradu excellentiori discrepat, respectu habito ad rationem & voluntatem nobiliorem, vindicari possit. In quo passu aliter mihi, quam Helmontius animam humanam imaginor: interim tamen opinionem hanc in foro Medico, ceu purè naturali, facile concedendam arbitror.

[Fff ff 3]

*Thef.*

*Thef.* IX. Anſam, præter locum Hippocratis, *lib. de Morb. Sacro pag. ſecund. Antonium von der Linden* 342. Ubi ab Aere ſapientiam hominis proficiſci aſſerit (quæ revera tantum animæ rationali humanæ tribui poteſt, & hinc animam humanam materiale arguit) ſubminiſtrarunt mihi opinio- nis huius illuſtris Philuræ lumina, Magnus Scherzerus, & Celebris Thomasius: Quo- rum ille in Breviar. Eufach. quæſt. 222. 223. immaterialitatem animæ humanæ ex Natu- ræ apodicticè demonſtrabilem haud eſſe aſſe- rit, quod & de immortalitate ejus affirmat, cum illud à priori demonſtrari poſſe neget, quod à merâ voluntate ac miſericordiâ divi- nâ dependet, eò, quod nulla creatura ex natu- ræ ſuâ indefectibilis ſit: Hic verò eruditò de Origine animæ diſcurſu in *Erotem. Phyſ.* c. 44. ad ulteriorem mihi meditationem cal- car addidit, ut credam, propagationem ejus per traducem nequaquam poſſe evenire, niſi materialitas, eventui huic non contrarians, ſupponatur. Atque eò confidentius hæc de animâ aſſerui humana, cum *cit. loc.* §. 64. legerim hæc verba ſcribentis: *Immortalitas rei per traducem propagatæ adeò divi- næ omnipotentiae non repugnat (neque enim ulla eſt in adjecto contradictio) ut Deus etiam brutis, ſi vellet, immortalitatem donare poſſit.*

Imò addo ego, quod ultra fidem & cap- tum noſtrum etiam ipſum mundum æternæ durationis ac motionis participem reddere poſſet, ſi ſanctæ ejus placeret voluntati.

*Thef.* X. Quâ verò confidentiâ hæc the- mati huic inferuerim, præterquam quod æquali liberrate ac reliqui Philoſophi (vid. Diſput. M. Joh. Schmidii Uratiſl. Pro Loco de Animæ Rationalis Immortalitate ex Prin- cipiis Philoſophicis non demonſtrabili) nos quoque hodierni Medici gaudeamus; facile patebit cuilibet paulò devotiori attentione thema hoc luſtratur. Imprimis verò hoc ideò feci, quod credam, omnes operationes animales non niſi ab intellectu ſ. ratione dependere, idque eò magis, quo magis non eſt conceptibile, quomodo objectum ſenſile ſenſationem citra rationis concurſum, & hinc voluntatem ad actiones, negatâ animæ materialitate, ſuſcitet, cum, qui ratione deſti- tuitur, uti in furioſis atque Ecſtaticis contin- git, ſimul etiam ſenſatione & prudenti ope- ratione privetur. Taceo imaginationis vi- res, præſertim illas non rarò obſervatas, quando fœtus ex utero capite vel brachio am- putato egrediuntur: qui caſus non niſi corpo- ralem animæ concurſum ſubinnuentes ani- mum noſtrum in ſtupendam admirationem rapiunt: *de quib. vid. Fienus in tr. de Virib. Imagin. It. Tr. Autor de motu mufculor.*

§. 26. p. m. 17. de puero, educatione inter beſtias naufragium ſanæ rationis humanæ in Lituaniâ paſſo. Quod ipſum planè non me- tuendum fuiſſet, ſi rationalis animæ immate- rialitas & impatibilitas infallibiliter ſupponi poſſet. Unde tandem etiam ingenium ſapè ac mores ſive boni ſive mali, patre mor- tuo, communicati viderentur ſoboli, niſi id mediatione animæ præſtaretur, non niſi per traducem propagabilis.

*Thef.* XI. Neque materialitas hæc ani- mæ noſtræ ullatenus ejus immortalitati refragatur, modò recordemur eorum, quæ pue- ri ex Catecheticis rudimentis de corporum reſurgendorum immortalitate hauſimus, & planè aliter ſentiremus: Ibi nobis ſubinnui- tur; corpus reſurrecturum, utut glorifica- tum, adhuc tamen materiale. Glorificatio- nem enim in eo conſiſtere, ut materialitate à corpore ſublata illud reddatur immateriale, non auſim tam craſſe ſtatuer. Cur ergò talia demimus animæ, ſi ſit materialis, quæ cor- poris materialitati non repugnant?

*Thef.* XII. Dico igitur breviter: Ani- mam humanam rationalem, primariâ ſui parte hoſpitem in cerebro & circumambu- lantem, ratione coextenſionis ſuæ cum cor- pore, cum ſanguinis circulo eſſe ipſum ſub- jectum & cauſam efficientem functionum ani- malium ac voluntariarum in ſenſatione, in- tellectu & motu locali contingentium, com- municantem partibus organicis virtutem quandam activam ſentiendi & movendi, à DEO ter O. M. ex liberrimâ gratiâ conceſſam, ita, ut ſecundum rationem ac voluntatem ſuam itidem divinitus donatam, tangendo nervorum ſingula principia, per totum ner- vum communicet mufculo partis ad volunta- tis nutum movendæ ſenſum, ut mufculus ſta- tim ſeſe contrahendo verſus partem immobi- liorem, cui tendine eſt annexus, partem mobilem moveat: & ſi retrahenda pars, alii mufculo, antagoniſtæ dicto, æquali pri- vilegio gaudenti reciprocationis jus non vio- let. Modus tangendi radices ſeu principia nervorum quomodo contingat, ut cerebro mediante omnes functiones animales ipſa anima pro arbitrio obeat, mihi ferme videtur imperſcrutabilis. Cerebrum adeſſe ideò cre- do, ut tanquam patiens excipiat objecta per fibrarum ſenſorii motum ſenſationes produ- centia. Fibræ enim nervosæ & nervi ſunt fila- menta quali extenſa, quæ quocunque modo tacta principium ſuum feriunt, prout in chor- dâ extenſa liquet, cujus parte unâ pulſatâ, al- tera quoque ad motum irritari ſolet. Cæte- rum an partes fibrarum tendinoſæ in motu & extra motum priſma, intermediæ carnoſæ verò parallelipedum conſtituant, cum Ste- none ingenioſo indagare ſuperſedeo, eò quod

quod Iudice Viro Excellentissimo atque Experientissimo Paulo Ammano P. P. Lipsi. multi laboris res, nullius autem usus in Praxi existat.

*Thes. XIII.* Fibrae motrices, quomodo motum producant animale? multas inter Autores litigandi dederunt materias. Et licet ad eundem scopum collimare videantur hypotheses, dicam tamen, quid dubiam mihi fecerit doctrinam de spiritibus, quò minus animum meum huic applicuerim? Mordicus autem hypothesin meam non defendam, aut pro fide Catholica propalabo, cum unam quidem credam sanctæ naturæ veritatem, quæ tamen, sub diversò hypothesium simulacro colitur adoraturque, quod variarum testantur sectarum vicissitudines: sed quemlibet suo indulgere sensui permitto, veniã fretus palam proponendi circa spirituum doctrinam meam hesitantiam. Autor de motu musculorum de fluido aliquo intra fibras à se invicem quasi separatas & incurvatas & idè abbreviatis se insinuante, mentionem facit; & alii cum ipso arbitrantur, musculus per arterias communicari sanguinem nitro-sulphureum, per nervos verò spiritus: qui, tumultuoso intra fibrarum spacia concursu excitato, magno nisu fibras impellunt, non aliter ac pulvis pyrius explodi, & disgregatione particularum minimarum dilatari observatur. Et nescio qualis copula spirituum elastica ipsorum animis arrideat, eodem cum Doctrinâ spirituum debili nisi fundamento. Quicquid enim Rolinc. in *Disput. Anatom. lib. 4. cap. 22. & seq.* alique pro confirmandâ hâc doctrinâ Spirituum proferunt, de ipsorum existentia & utilitate, id omne ulteriori adhuc probatione indiget. Taceo modum operandi Spiritibus assignatum, cuius delineationem in Willisii *supr. citr. tr.* intueri licet, pro existendi eorum necessitate planè non militantem. Imò natura eorum flammæ lucida idè saltim excogitata est, ut explosio ipsorum per copulam elasticam affectibus quibusdam è plausibilius accommodari valeat. Tantum ergò abest, ut fidem adhibeam flammæ lucidam iis assignantibus naturam, ut potius opiner, percontationem sensuum internorum phantasie ac memoriæ, quas per refractionem & repercussionem analogâ quâdam cum lucis radiis naturâ gaudentem exponunt, ansam dedisse huic figmento. Miror enim non parumper naturam flammæ hujus lucidæ proprietate suâ maximâ ex parte ferè spoliatam esse. Quam ipsam etiam Viri profundi Iudicii Excellentissimi Bohnius *Disp. XV. de Spirit. Animal. Elabor. thes. 15. & 16.* in dubium vocare animadvertitur, atque insuper *thes. 14.* vix concipi posse, spiritus ab humorum miscelâ omnino liberos,

asserit: quo ipso negandam spirituum naturam flammæ lucidam subinnuit: aliàs nescio, cur non tandem flammæ cum fluctibus maris in gratiam redituræ præaugurari possint, citra omnem igneæ ipsarum substantiæ destructionem. Nec minorem dubitandi occasionem subministrat adscriptus spiritibus his luminosis elaborandi modus, ubi volatiliores Mæ. Sæ. partes per accensionem & secretionem quandam transcolatoriam à reliquarum consortio removeri dicuntur: id quod tamen ipsa cerebri glutinosa vetare videtur substantia, cum, quò quid crassius, èò etiam inhabilius, luci producendæ iudicandum sit. Minorem hic fidem meretur ea assertio, quâ sanguinis volatilificatio per fermentationem in sinistro Cordis ventriculo promoveri statuitur: in quo tamen ultra momentum non commoratur, nec ulteriori volatilificatione, utpote ex salibus merè volatilibus constans, Sanguis indiget: quam nihilominus plurimi ex amœniore ejus rubedine hariolari satagunt. Enim vero, quid si alia causa coccinioris coloris sublit, quæ nullam volatilificationem, sed potius coagulationem demonstraret, quam assertionem commissio chyli candidioris ostendere, & necessitas ejus per Aëris inspirati Sal acidiusculum (à modo laudato Bohnio in *Disp. Phys. 8. thes. XI.* satis probatum) in præcordiis coagulandi, ut nutriendo corpori aptior reddatur, suadere cernitur.

Modum influendi ac circulandi non examinabo, quem ipsum despiciunt principia mechanica, utpote cum rudi etiam plebeculæ constet, corpus vel ipsa levitate levius per compacta nervorum corpora, planè nullâ cavitate gaudentia, nequaquam deorsum versus penetrare, sed semper molliora & rariora transitum non præcludentia pervadere. Ad modum operandi spirituum repetendum revertor quidem per explosionem eorum inturgescentiamque musculorum adumbratum; cum tamen non determinabo. Nam profectò idè saltim excogitatus videtur, ut aliquali mechanicâ hypothesi rem imaginari liceat. Ne tamen ipse solus in spirituum Patronos videar injurius, audiat Steno in *specim. Myolog. p. 83.* ita statuens: Spiritus animales subtiliorem sanguinis partem vaporem ejus & nervorum succum multi nominant: Sed verba hæc sunt nihil experimentia. Confer Backius de *Corde*, Harveus *Exerc. Physiol. & Needham. de format. fœt.*

*Thes. XIV.* Cum ergò Privilegiis securè Philosophandi æternis fruamur, in id enitendum est, ut breviori nobis viâ patulâ omnes evitemus ambages, & libertate iudicii gavisi, ab omni cupiditate aliorum præconceptas opiniones aucupandi, & in verba Magistri



gistrari jurandi alieni, inquiramus, quò sensu naturæ Phænomena suum fieri modum fortiantur. Contemplaturis itaque actiones principii nostri animales in ipso limine, si creationis Adami recordati fuerimus, occurreret nobis auræ vitalis inspiratio, quæ, uti in toto corpore cum humoribus, partes organicas irrorantibus, ubique præsens est, ita in sentiendo & movendo corpus nostrum vivificare & actuare non remittit. Quali modo id fiat, supra jam, in quantum albulare licet, innuisse sufficiat.

*Thes. XV.* Hactenus Subjectum Patiens ratione morbi, itemque Causam efficientem motuum & sensationum naturaliter constitutam depinximus: nunc antequam ad statum ejus p. n. à causis morboſis orientem accedamus, affectus nostri contemplatio flagitat, ut alterum Subjectum ratione Symptomatis morbi pedissequæ non omittamus. Sunt autem hoc organa sensationum ac motionum, supra recensitæ fibræ nervosæ & carnosæ, ratione conformationis mechanicæ ab Anatomicis sciscitandæ, ad principii activi impulsus & voluntatem actionibus animalibus secundum naturam exequendis aptæ, quæ, quando à causis p. n. eos afficientibus læduntur, principio activo ad p. n. functiones impedimento suo anſam porrigunt. Ubi observandum, quod quidem fibrosæ ac membranosæ partes primùm afficiantur, ubi causa mali s. ipse focus hæret, primatior tamen & maximam insultu Epileptico injuriam pati Cerebrum, reliquum totius corporis genus nervosum in compassionem rapiens.

*Thes. XVI.* Rejēctis autem supra citatorum autorum de principio activo variis hypotheseſibus hic nolo prolixiori narratione discursuum Pathologicorum ac Refutatione ipsorum B. Lectori moveri salivam; non enim centonem consuere libuit, sed brevissimo discursu ac stylo simplicissimo, ad doctrinarum explanationem aptissimo, animi mei sensa patefacere decrevi.

*Thes. XVII.* Cum duplicis generis insinua-verim Subjectum Patiens, causæ quoque p. n. affligentes erunt statuendæ duplices. Causa igitur proxima affligens Cerebrum cum nervoso genere est illud ipsum, quod ratione morbi est subjectum patiens, ratione symptomatis verò efficientis rationem subit, anima sc. f. principium vitale: Symptomatis autem ortum, ex causâ efficiente p. n. deformatâ dependentem, indagaturis nobis incumbit causas scrutari remotas, quæ invadunt efficiens proximum, ut irritationis idea affectum ac consternatum redditum, p. naturalem machinæ nostræ corporeæ motum inducat. Agunt hoc ipsæ l. immediatè, l. mediatè. Immediatè quidem animi pathema-

ta, ut sunt: Ira, terror, tristitia, metus, amor, & tædium. Quatuor priora pathemata, præcipuè in subjectis jam ante Epilepsiam perpessis valida occurrunt passim in Practicorum variis observatis, v. g. Schenckii & Sennerti sub tit. Quorum operandi modus in animam nostram, quoties ex me quaritur, toties ultrò ignorantiam meam fateri planè ignominia mihi non cedere polliceor. Etenim principii istius moventis supra depicti mutationes patibiles indagare, res est sublimiorem humano intellectu postulans prudentiam. Credibile tamen est, ut, licet diversis pathematum speciebus conturbetur, eundem tamen Epilepticum effectum ex incandescente quasi & tumultuante commotione pronasci faciat: Quò ipsò potestas illa à Sapientissimò concessâ motui destinata interdum sola, interdum cum hac sororia potestates pati videntur, ita, ut istæ ab ideis peregrinis, ab extra advenientibus, impeditæ & quasi attonitæ, Archeum ad motuum stimulent exorbitantias.

Ex amore pronatas Epilepsias in Helmontio *Tr. de Morb. Archealibus*, Henrico ab Heer *in Obs.* 18. & Kozackium *Tr. d. Hemorrhagia lib. 2. cap. 10. p. m. 641. & seq.* legere licuit. Quæ in re propriam observationem contestor de puellâ paulo lasciviore ardore deperiente juvenem, quæ ad manulem jocum incidebat in Lipothymiam semi-Epilepticam, cum rarâ adstantium admiratione. Ex tædio quoque oriri posse eam, testantur alimenta tædioſa subdolè exhibita.

*Thes. XVIII.* Mediatè sævitiam suam exerit omne id, quod quacunque ratione ac modo partes nervosæ laceſcere, iisque dolorem exquisitiorem, imprimis verò in subjectis delicatulis, sensiliore genere nervoso gaudentibus, infligere validum est. Hinc ea, quæ ipsas vehementius pungunt aut secant, Epilepsiæ suscitant procellam: Sic ego vidi hominem in pollice pedis contrectatum statim huic miseriæ obnoxium. Cæterum etiam plerumque minera morbi latet in parte aliquâ materiæ cujusdam acris vellicantis, injuriam non sine omnium functionum animalium tempestate tolerante: Talem Epilepsiam observavit Deckers in pollice, & Bartholinus *Cent. VI. hist.* 78. in pede. Causa ergo immediatè tangens fibrarum nervosarum filamenta, est acre quodcunque, speciatim acidum viscidum, in lymphâ oberrans, vellicans partes sensiles, cujus molestæ sensationis occasione in unâ parte, non sine reliquarum compassione, ortâ irritatus Archeum in exorbitantem motum erumpit: Sic in infantibus Epilepsia ut plurimum, imò ferè semper, annotante Dno. Præside in Valetud.

Jetud. Infantili, ex ventriculo materiâ acidâ viscidâ obfesso oritur, ob consensum nervorum. Et ex hoc consensu s. compassione multos Helmont. affectus sub titulo Morborum Potestativorum vel sub Actione Regiminis deducit: Simili ratione Colica, Nephritis, Scirrhus mesenterii, Ulcus, & suffocatio uteri, partus dolorosus, &c. per consensum Epilepsiae scaturigines fieri valent, utpote quæ ejusdem matris filiae non degeneres censentur cum Epilepsiâ, cujus interdum thalamus in calvariae cubiculo sustentatur, ubi immidiatè principium nervorum laceffans totius generis nervosi concussiones, in vicissitudinariis ejus contractione & remissione consistentes, exindeque improvisum omnium functionum excitat turbinem.

*Thef. XIX.* Nutritur autem hæc & adolescit ipsa mater iisdem sustentaculis, id est, causis remotis, quæ alia morborum carcinomata suam acquirunt alimoniam. Et quidem ex naturalibus rebus est ætas puerilis, ob teneritudinem nervorum ad hoc malum proclivis. Præterea præstat etiam aliquid senilis, inclinans in humores viscidos acidos, Melancholicos Veteribus dictos. Ex non-naturalibus est Aer squalidus, & frigidior hyemalis & autumnalis, præcipuè circa metallifodinas squalidus, vel atomis etiam malignis & graveolentibus, ex rebus incensis, vel per se fætidis & malignis in ipsum elevatis, refertus; Unde febres malignæ stipatæ semper sunt cum insultibus epilepticis graviter affligentibus & cruciantibus.

*Thef. XX.* Occasione sermonis de Aere quaeritur: utrum & astralis influxus Aeris tempestates variis larvis deformare queat, nec ne? Astronomicorum filii hujus decisionem remittens, profiteor ingenii mei imbecillitatem in hoc eruendo dubio, quod ingeniorum hætenus multorum curiosam delassavit industriam. Dicam tamen (si hariolati liceret) utique probabilem esse astrorum influxum ad morbi hujus vel productionem vel exacerbationem concurrentem, si fidem non derogamus Astronomis, de variâ siderum constellatione ac motu singulari discurrentibus, ac denique credimus, radios illorum lucentes seu luminosos materiales. Quod ipsum suppositum de Solis radiis plurimi defendunt, nec de Lunæ affectibus anxie dubitant. Hinc ut plurimum Paroxysmi accidunt Epileptici tempore plenilunii in plerisque subjectis, uti amicus quidam candidus oretenus mihi retulit, Scientiæ Astronomicae benè gnarus. Et Beatus Sennertus *lib. I. P. 2. cap. XXXI. p. 590. Med. Pract.* inquit, *plerumque in ecclipsi lunari natos malo huic esse obnoxios.* Quod si hæc vera sunt, facile Mæbius *supr. cit. loc.* excusatione di-

Tom. II. Pars 2.

gnus est, quod symptoma hoc referat inter morbos occultarum qualitatatum, & aliquid divini in recessu interdum condentes, utpote cum multorum eruditissimorum testimonio modus influendi astrorum planè sit abstrusus, atque divinus, utur ab Astrologorum observatione concursus, seu constellatio eorum sit notissima.

*Thef. XXI.* Deinde ex non-naturalibus sunt omnis generis alimenta, acidum, viscidum, austerum succum producentia. Imo & ex abstinentiâ eorum longâ, seu inediâ violenter perpeffâ, non solum in pueris, verum etiam profectioris ætatis hominibus, forsan Hypochondriacis, Epilepsiam prognatam esse testantur Autores, optimè per ciborum usurpationem curandam. Porro ad eandem disponunt carnes & Pisces saliti, ac fumo indurati, cum variis cibis, acidis & austeris, singulis mensis variè assumtis, fructus horæ immaturi, &c. Excreta & retenta hîc etiam multa possunt, v. g. suppressio mensium, Urinæ, interdum & alvinarum secum in puerulis, atque pusionibus: quale exemplum mihi relatum est de mespillorum nucleis, in intestino recto hærentibus, & exhibitio clystere exturbatis, cum epilepsiae totali cessatione. Quò petinent suppressiones lochiorum atque seminis. Vid. Kozakium, & alios.

*Thef. XXII.* Ex præternaturalibus multum præstare posse Plethoram autumo, quatenus non rarò motum cordis impediendo, fibras ejus ad tales vibrationes convulsivas irritat. Similiter lumbrici in intestinorum cavo hospitantes morficationibus suis per consensum Epilepsiam suscitare valent. Quid Malum Hypochondriacum & Scobutus præstent in nervorum pathematibus, totò die liquet. Quorsum pertinent omnis generis venena, febresque malignæ, contusiones & vulnerationes capitis, vel violentâ licariorum percussione, vel casu ab alto, non ab simili modo cerebro infensæ, quatenus extravasatus sanguis sui corruptelâ affligit nervorum principia, cum subsequâ omnium membrorum vibratione Epilepticâ.

*Thef. XXIII.* Differentia est varia: Alia Epilepsia est hæreditaria, alia adscititia, eaque vel ab incunte vel à juvenili ætate; Alia cum febre, alia sine febre; Alia frequentior, alia rarior; Alia Periodica, alia Vaga; Alia Sympathetica seu per consensum, v. g. ex Colicâ convulsivâ, Vomitu, Sternutatione, Passione Hystericâ, suffocatione uteri oriunda: alia Idiopathetica seu per essentiam, immidiatè ex cerebro oriunda; Alia mitior, alia gravior, in quâ vel ipsum dæmona subesse putes: quanquam etiam experientia testetur de Epilepsiâ dæmoniacis præstigijs indu-

[Ggg gg]

cta;

eta; Alia totalis, alia partialis, partem unam occupans: quorum etiam pruritus & titillatio spectare videntur. De cetero tres gradus affectus hujus statuere poterimus. Quorum

Primus gradus est, quando omni sensu ac motu animali ægri privati exanimes quasi, sine externarum partium convulsione, stant, sedent, aut in terram prostrati procumbunt, licet, quoad internas partes, spasmodicis crucientur doloribus. Qui gradus improprie dicitur Epilepsia, ac potius Catalepticos nomine venit, aut cum Germanis appellandus *Eine Ohnmacht*.

Secundus gradus est, quando variis motibus agitatoris corpus vexatur citra sensuum ac rationis cessationem, aut cum aliquali eorundem depravatione, aut ridiculâ conurbatione. Quod ipsum sæpe in Melancholiâ Hypochondriacâ obvenire solet, uti ipse in hac vicinia observavi in quodam, qui durante Paroxysmo vestes & indusia exuta lacerabat. Alia exempla vid. in Patholog. Cerebri Willisii, Riverii *Praxi*, Timæi von *Güldenlee / Epist.* Salmuth. *Histor. & alibi*. Quorsum pertinet Epilepsia Cursoria Bootii *Tr. de Affect. omiff. cap. 6.* Item Rotatoria in gyrum, quale exemplum etiam in hac vicinâ Lipsiæ contigit.

Tertium gradum, cumque communissimum, & toto die obvenientem, voco eum, quando in terram collapsi ægri miris modis agitantur, & variis contorsionibus & concussionibus membrorum cruciantur, & cum stridore dentium, arcta clausurâ pollicum, thoracis abdominisque curvaturâ, spumæ protrusione, linguæ aut labiorum morsificatione & cruentatione, sanæque rationis exercitii cessatione, obtingit: quorum omnium ignarus est patiens post Paroxysmum ad se rediens.

*Thes. XXIV.* Signa Diagnostica patent ex *αὐτοψία*, vid. tamen Sylvium *lib. 2. Prax. cap. 20.* Pulsus est inæqualis. Urina semper est valde spumosa, nisi ex subitaneò ingenti dolore excitetur.

Causarum distinctiva petantur ex relatione adstantium.

PROGNOSTICA sunt: Epilepsia febrim superveniens ut plurimum est lethalis. Febris vero ipsam sequens non raro est medela ejus. Vid. Bartholinus *Cent. 2. Hist. 68.* Adultorum Epilepsiæ difficilioris quàm tenellorum curationis sunt. In dentitione infantum raro sunt lethales. Concomitans Ep. morbillos & variolas tempore eruptionis non multum timenda, ut plurimum autem lethalis est tempore suppurationis. Epilepsiæ ortæ à principio virali immediate affecto per animi pathemata, nisi in momento mortem indu-

xerint, remittunt, nec revêrtuntur, nisi alia causa latuerit, cujus occasione efflorescant & adoleverint.

*Thes. XXV.* Quoniam suprà in causarum enucleatione posui Principium nostrum activum impediri in functionibus naturaliter obeundis, & excitari ad varias exorbitantias per injuriam mediantibus nervosis partibus irregulari quâdam commotione & irritatione illatam, harum injurias abigere per certam indicationibus superfundatam methodum medendi conabimur. Ratio officii mei quidem flagitaret etiam manifestare, quali medio ipsum Principium activum ad sanio mentem revocari debeat: Sed cum id partim ratione animi pathematum à Theologis & Ethicis efficiatur, obtemperemus ipsorum consiliis nemini non innoxii: partim verò mihi Universale illud celebratissimum Philosophorum nondum innotuerit, cujus operationem in ipsum principium activum firmiter credo: excusabor forsân, si in doctrina de causis reliquis occasionalibus eliminandis operam navavero. Intentioni ergò nostræ respondebunt Indicationes:

I. Curatoria, in ipso paroxysmo, in quo Fibra Irritata Sedentur. Cui Indicationi satisficient sequentia remedia: Cinnab. Antimon. Cratoni Magnes Epilepsiæ dicta, it. Sulphur Antimon. quæ mineralia misceantur opiatas cum additione præparatorum, quæ præstantiora sunt Magisteriis, saliumque volatiliū. Præparata sunt ex Auro v. g. Aurum fulmin. Tinctura Auri c. Oleo Cinnamonomi, Aurum potabile ritè paratum, Item Cran. hum. ppt. Cornu Alcis, C. C. f. igne, C. C. solare, Ebur f. igne, Dens Equi Marini, Apri, Castoris, & ipsum Castoreum exindeque alia parata, Aqu. hirund. c. Castor. Ess. Castor. parata c. spiritu vol. Tartari. Spina mustelæ Pisc. Mandib. Luc. Pisc. Lap. Percar. Carpion. Tali lepor. Os de corde cervi, Item Marina ppt. perlæ, Mat. perl. Coral. Lap. pretiosi, succin. ppt. quæ omnia absorbendo acidum vellicans nervos in effectu vim habent sedativam nervorum, & consequenter placativam Archei. Salia vol. sunt v. g. salia sicca vol. Sp. & Olea, v. g. Sal. vol. & Sp. Cran. humani, Sangu. hum. Urinæ humanæ, Viperar. Lumbric. C. C. succini (Hinc præsentaneum est remedium Liq. C. C. succinatus) Tartari. It. Sp. fuligin. Elix. Cephal. D. Mich. Ess. ejusd. Cephal. anodyna. Porro olea profunt destillata, Succini, Rutæ, Melissæ, &c. exindeque parati Balsami Apoplectici. Item Sp. Vitrioli Cephal. D. Mich. Hartmannus commendat miris modis Spm. Vitrioli & Urinæ mistos. Verum hi revera nihil aliud, quam Sal Armoniacum construere videntur, cui in incidendâ visciditate laudem



dem suam non derogo in tenellis subiectis ob meconium retentum vel aliam visciditatem, ex vitiato & caseoso lacte materno prognatam, hoc morbi genere afflictis. Hinc ridendi sanè sunt incauti isti Practici, qui sine ulla habità causarum, carcinoma hoc producentium ratione, omnibus infantulis Epilepticis vulgatum illud, instar Deorum manus adoratum, specificum Cephalicum D. D. Michaelis propinare non verentur; quippe cum nihil hoc in passu exhibere anodynus sit imprudentis, quoniam aut invisciditate, ventriculum tenellorum occupante, emoritur ejus virtus sepultraque remanet, aut, si inanes vomendi conatus obtigerint, sistendo nervosarum fibrarum motum, æquè horribile suffocationis valent inducere symptoma. Cautus proinde quilibet Practicus juvenis esto, ut infarcientem ventriculi visciditatem vel prius tollat, vel simul cum Specificis Antepilepticis per incidentia educat. Quâ in re placent mihi formulæ ex Salibus Volatilibus, & ppriis absorbentibus cum anodynis præscriptæ, quæ saburræ istius maleficæ gazophylacia evacuant, & in Praxi ægrum Medicumque juvenem exhilarant. Porro Hepar ranæ manibus laceratæ exsiccatum, pulverisatum, & primo Epilepticorum, infantulorum insultu Curæ & præservationi felici cum eventu exhiberi expertus sum. Similiter secundinæ primiparæ magni æstimantur: quâ vero ratione, omnino me nescire fateor. It. sanguis hirci & leporis ideâ timoris sigillatus, tumultuantis ideam Archei sopiente. Hinc sanguis calidè potatus malefici, ense carnificis trucidati, in ipso Paroxysmo forsan speratorem nancisceretur eventum, quàm extra Paroxysmum, Cordi hominis ejusdem quo jure Hoffmannus in Methodo Medendi potiore virtutem tribuat, omnino ambigere me confiteor.

Ex vegetabilibus profunt omnia refragantia, instar vehiculi cum supra laudatis adhibita, v. g. Aqua Antepileptica Lang. Apoplectica, Aq. vitæ mulier. alba, Sp. Ceras. nigror. It. Ess. Aquæ & Tinct. ex Floribus Cephal. v. g. Tunicæ, anthos, Lavend. Lil. convall. Primulæ Ver. Tiliæ, Citri, Aurant. Pavav. Betonic. Pæon. De cujus Radice debito tempore effossa ego ipse in variæ ætatis hominibus mira expertus sum. Et licet à non nemine mirè autores fabulari dicantur, mirabilis tamen ejus effectus est, mihi planè visus imperscrutabilis, nisi astratis influxus (de quo satis eruditè differentem confer supra citatum Hirnheim) ad ejus exaltationem virium quid conferre supponatur. De Sambuco ex Salice crescente statâ horâ collecto præter Hartmanni Testimonium alius mihi amicus juratò experientiam plusquam centu-

Tom. II. Pars 2.

plam contestatus retulit. Quali modo operentur hæc amuleta addiscere valde aveau: Poterunt etiam fieri Cucuphar.

II. Imminentem paroxysmum interdum præcavere possumus, si ex parte aliquâ originem trahat Epilepsia, ita ut Consensus Nervorum, si possibile, intercipiatur, quod fit per frictiones in partibus spasmo primò tactis, deinceps adhibeantur ligaturæ firmiores istarum partium, ut ligato nervo dolor reliquis membris communicari non valeat ultra ligaturam existentibus, teste D. D. Motho in Barthol. Cent. 6. hist. 78.

III. Præservatoriæ Indicationi occurrimus per variarum rerum p. naturalium, utpote causarum sublationem, quas quilibet eruditus Medicus judicio practico pollens, virtute methodi suæ medendi ipse profligare noverit. Nam si Plethora vel alia causa mali urserit, adhibeatur debita ejus Curatio. Ego hîc paucis enucleabo, quid agendum, si mater hujus detestandæ sobolis dormiverit in materiâ viscidâ acidâ, tam in primis viis quàm ipsâ Mâ Sâ hospitante, cui extra Paroxysmum edomandæ, ne malum denuò resurgat, alacri pectore occurrendum est. In specie Nervos Irritantia Evacuentur. Quibus Scopis obtinendis I. Ex fonte Chirurgico Venæ sectionem, Scarificationem, &c. nihil conducere æstimo, nisi patiens fuerit Plerhoricus. Balnea & Inunctiones rectius hic locum invenient, ex refragantibus parata.

#### II. Ex fonte Pharmaceutico

1. Commendo Vomitoria, inter quæ optima sunt Antimonialia.

2. Clysteres etiam, quæ fiant ex specificis vegetabilibus, & exturbantibus saburræ acidam viscidam in intestinis hærentem, & acuentur per Salia.

3. Purgationes adhibeantur consuetæ dicatæ lymphæ viscidiori cum appropriatis dictis Cephalicis aromaticis mista.

4. Omnia diaphoretica viscidum acidum incidentia & præcipitantia: Qualia sunt omnia Bezoardica vegetabilia amara, v. g. Card. Bened. Fumar. Scord. Scorzon. Absynth. Cent. minus, Galega, Scabiosa, Ulmar. Melissa, &c. Quorsum pertinet Tinctura Bezoardica cum Ess. Cephal. anodyna D. D. Michael. mista, It. Bezoardica Mineralia, v. g. Bez. solare, lunare, Joviale, Martiale, Minerale, Antihectic. Poter. Mercur. Diaphoreticus, Sal Antimon. & omnia Antimonialia, v. g. Antimon. Diaphoret. Tinct. Antimon. Tartarizat. His jungenda sunt supra laudata præparata, & salia volatilia.

5. Diuretica, qualia sunt omnia salia mineralia, volatilia & falsa composita ex  
[Ggg gg 2] acido

acido & alcali, v. g. Sp. Tart. Sp. Carminativus, Sp. Cinamomi, Caryoph. & anisi, oleosus vol. Tinct. Tartari, Tinct. Vitrioli Mart. Zwelff. Tinct. nephrit. Solar. Ammelungii, Arcanum Tartari, &c.

Prostant etiam multifaria. composita Antepileptica in Zwelffero, & Hoffmanni *Thef. Pharmac.* & aliis reperibilia, inter quæ non rudior mihi compilatio videtur, quàm Pulvis Marchionis dictus Antepilepticus. Formulas alias quilibet ingeniosus Artista ac rei Medicæ peritus facilè pro ratione Indicantium & Contraindicantium variare poterit, quâ in re quemlibet suo abundare ingenio, Indicationesve mutare pro captu suo permitto, modò æger à miseriâ suâ liber atque tutus in posterum degere valeat. Cui intentioni denique satisfaciunt bona instituta diætæ, à Medico facile præscribenda, causarum supra citatarum non ignaro, quæ consistit in fugâ nocentium, & moderatâ usurpatione conducibilium.

3. De Curâ transplantatoriâ mali hujus, vel in animantia bruta per Urinam aut sanguinem ægri, vel in arbores certis quibusdam vanis actionibus, vel aliis præstigiatoriis fer-

mè operibus, deponendo tenellos super limina hypocaustorum, capite extra fores, pedibus verò intra conclave porrectis, quicquam referre nolo, cùm de illis tacere, quàm lubricas de Spiritu mundi, vel Sympathiis, & aliis figmentis hypotheses vendere, sit consultius: hæc verò rudis plebeculæ inanem superstitionem (mirò utut interdum successu) sapiant.

IV. Vitali Indicationi respondet cujuslibet propria observatio, qui à malo hoc immunis esse satagit, ut Medici opem non respuat, si qua mutatio sanitatis integræ ac virium qualicunque modo ipsi obtigerit, aut negligentia aut avaritiæ pœnam magno suo malo luet. Quâ in re Medicus sagax prorenatâ officio suo satisfacere noverit, ut curæ suæ commissus patiens vitam sartam rectamque à morbis gravioribus valeat finire.

Hiscæ calami mei cursum figo cum debita Divinæ benignitati gratiarum actione & ulteriori voto adhibito, ut mea in posterum studiorum conamina misericordi nutu secundet, quò non nisi in proximi salutē (cui aliquando cum DEO auctius & limatius hoc thema promitto) & præcipuè in honorem DEI vergant.

*CUI SOLI SIT LAUS ET GLORIA.*



DISPUTATIO XVII.  
*PARVA MAGNORUM MORBORUM INITIA,*

QUÆ  
SUB PRÆSIDIO

*Viri Nobilissimi, Excellentissimi, Experientissimi,*  
DN. MICHAELIS ETTMULLERI,  
Philos. & Medicinæ Doct.

Publicè ventilanda proposuit  
AUTOR - RESPONDENS  
MAXIMILIANUS PREUS, Uratislavienfis.

d. 13. Octobr. Anno 1676.

Ab ipso DN. AUTORE revisa, & multis in locis aucta.

PRÆFATIO.

Quemadmodum ex minimis initiiis oriuntur 1. Plantæ.

*EA est Alma Mater Naturæ Consuetudo atque Lex quasi connata, ut per minima initia gradu successivo magnos moliat atque producat effectus. Ut enim taceam cuncta in Mundo corporatum fieri seu generari, tum nutriri & augmentari, imò & corrumpi pariter, non nisi successive & insensibiliter, adeoque*

que per minimarum saltem particularum, multifariam procul dubio figuratarum, Combinationem, Separationem, & Transpositionem, uti ingeniosè in Prolegom. Instit. ad calamum nobis dictatarum Thef. 20. ratiocinatur Excell. DN. PRÆSES: Luculenter hoc potissimum patescit in specificè jam mistis, seu concretis seminibus, parvis sanè magnarum generationum fundamentis: Quantilla hæc, quæso, corpuscula, si cum modicis ex iisdem succrescente conferantur sat magna? Non tangam hoc loco seminalia Minerarum Principia, & ipsa prorsus impalabilia, minimaque proinde. Intuere, Lector Benevole, Plantarum semina saltem, κατ' ἐξῆς cum accuratioribus sic dicenda, quæ sat profectò sunt exigua, etiam cum externis, quæ communiter iis accensentur, considerata involucris; cùm tamen seminis, quod propriè meretur nomen, & in gemmula solum continetur, quæ albæ instar lenticulæ in summitate ipsorum apparet, longè minimam, & computo plurium vix 2800 capsulæ illius, constituat partem, referente Beckio in Experimentis circa Naturalia Rerum Principia, pag. 264.

§. 2. Hanc enim solam pro vero semine habendam, varia commonstrant. Primò namque, annotante jam Harvæo de Generat. Animal. Exerc. 51. p. 233. læsâ eadem vel deficiente, reliquum quod est Corpusculi illicò sterilefcens, quâcunque ratione tractetur, nullo modo ad germinationem deduci potest: quemadmodum hoc in Pisis experimento domestico ipsemet didici, illis, quæ gemmulâ gaudebant integrâ, vel ex solâ aquâ, manu ductore Helmontio, feliciter propullulantibus, fatiscentibus contrâ, quibus spem illam sobolis vel inclementia Naturæ negaverat, vel manus curiosa violaverat. Accedit hisce alterum, non exigui ponderis argumentum, quod in Gemmulâ illâ sive Medulla sub cortice reliquo contenta, integræ jam Plantæ Conformatio, mirando Naturæ in Minimis artificio! actu delitescat, ostendente hoc Josepho de Aromatariis, tum Epistola de Generat. Plantar. tum oculato Teste, Guiljelmo Harvæo, ceu ipse hîc, in Exerc. XI. p. 92. C. L. de seminis phascoli tali configuratione ab Aromatario Venetiis sibi ostensa, plitrò fatetur.

§. 3. Simile quid à Botanico Amstelodamensi in Tulipæ bulbo sibi ad oculum demonstratum meminit aliquando Excellentiss. Dn. D. Bohn, Anatom. & Chirurg. in hac Alma Professor longè Meritiss. judiciosiss. Præceptor atque Patronus devotiori cultu suspiciendus. Ipsum hoc multiplicata & universali magis Experimentia confirmant, oculo armato potissimum edocti, Borellus in observ. Microscopicis obs. 17. ubi ἐκείνην etiam subnectit; Oculatissimus etiam

Malpighius primùm in Epistola ac ipso nunc edito Opere de Anatom. Plantar. nec subticendus tandem D. Grew in the Anatomy of Vegetables. Quorum imprimis Malpighius stupenda industria ac perspicacitate in omni ferè Vegetabilium genere non solum integram Plantæ in semine configurationem sive Ideam, Radicis, Trunci & Foliorum binorum delineatione ut plurimum conspicuam, detegit atque delineat, sed & secundinas atque colliquamentum, sub cortice eorum contenta, deprehendit, non dispari ratione, ac in Animalium conceptibus videre licet, sicque verus illud Empedoclis & posthac Harvæi dogma, Plantarum semina Ova esse ab iisdem decidua, non omni probabilitate analogica destitui, luculenter confirmavit.

§. 4. Gemmula hæcce in istis Seminibus, quæ ratione molis sensui nudo adhuc proportionatæ sub conspectum omnium faciliè cadunt, si minutæ adeò quantitatis est, quantilla erit in minutissimis illarum Plantarum Seminibus, quæ non paucis propter exilitatem sine prorsus semine oriri videntur? Quibus tamen contrarium evidenter ostendit per ἀντιθέσιν in dorso Plantarum Capillarium Borellus C. L. Observ. 8. & Jungius in Doxoscop. Phys. P. 2. S. 3. Frag. 4. C. 4. qui non solum, nullam Plantam sine semine oriri, sed & semina, quod magis mirandum, quò minora, eò fertiliora esse, egregiè docet.

§. 5. Ad Semina Plantarum & exi. 2. Animalitate principii fecundi, & huic inexistente jam conformatione analogâ, proximè accedunt Ovula fecundata

[Ggg gg 3]

Ani-



Animalium, Oviparorum pariter ac Viviparorum conceptus constituentia, qui demum rectè ab Aristot. *de Gener. Animal. L. I. c. I.* & Harvæo *C. L. Exercitat. 63.* Animalium ac futuri foetus Semina dicuntur, ad differentiam Genituræ utriusque, tam Maris, quàm Fœminæ, separatim adhuc existentis.

§. 6. Ab Ovo, quod dicunt, principium Originis elementale, aut partem minimùm ratione ortus primariam, in conceptu Animalium perquirentes Curiosi, in ipso Ovo ac parva hujus Nubecula sive Cicatricula, Gemmulæ in Semine Plantarum correspondente, Animal integrè jam conformatum ferè secundinis atque colliquamento, nutritio dereliquo circumdatum, cum Malpighio (*in Epist. Form. Pulli in Ovo.*) mirari necesse habuerunt; ita ut in Ovo Gallinæo, nondum etiam incubato, Theodorus Aldes (*in Obs. in Ovis factis.*) Cicatriculam Circulos suos jam ostendentem, & Graßius (*in Defens. Part. Genital.*) omnes Pulli partes jam conspexerit; quod idem etiam Laudatus de Aromatariis L. C. asserit.

§. 7. Dicta partium verò conformatio successivè intuentium oculis, etiam nudis tunc, manifestior evadit in Ovo incubato, (observante hoc jam tum Aristotele, Hieron. Fabricio, Volchero Coiter, & omnium diligentissimè accuratissimeque Immortali Harvæo L. C.) dum scilicet à calore fovente Motor in Ovo Spiritus excitatus, motu suo ac liquoris ulteriore preparatione, ad partes circulatione, appositione, Assimilationeque, stamina Corporis minuta magis evolvit, explicat, adauget, perficit, conspicuasque nonnullas citiùs reddit, prout naturali vel conformatione aut breviori exornatione majores, vel contentis coloratis ac evidentius intra eas commotis pleniores, quemadmodum Le Grand in *Instit. Philos. P. 6. A. 2.* & Velthuisius *de Generat. p. 247.* annotat.

§. 8. Nec recensitam delineationem in Ovis Majorum inter Ovipara, ut ita loquar, Gentium reperire saltem licet, quin &, quod magis miraberis, in minutissimis Insectorum, Araneorum puta, Formicarum, & quæ mutuò ex se invicem generantur: Papilionum atque Bombycum ovulis eadem observat Borellus *Obs. Mi-*

*croscop. 20. & 34.* nec non Malpighius *Tr. de Bombyce p. 65.*

§. 9. A Minoribus ad Majora, vulgo Philosophorum perfectiora, progredior Animalia, Vivipara scilicet. In his simili modo, ac recensitis, rem se habere, ex modernis, Harvæi, Hornii, Græfii, Schwammerdamii, Ruyschii &c. ac quotidianis Anatomicorum observationibus, apparet. Ex Ovulo quippe, sive magis, vesiculâ minutissimâ, liquore seminali plenâ, (quales in Testibus femininis præexistere solent, docente hoc Fallopio, à penetrante eò usque, in coitu foecundo, spiritu Maris genitali foecundatâ & per Tubas Fallopias (Observatore Græfio in Brutis, & Ruyschio in Homine) ad uterum propulsâ, fit conceptus, initio satis minutus & puncto saltem saliente foetus manifestans, reliquis hujus partibus, propter fluxilitatem, exilitatem atque quietem, vix omnibus adhuc conspicuis, quæ & ipsæ tamen brevissimè arctius connexæ & in majorem molem adauctæ, totum Embryonis corpusculum egregiè exhibent, Confer Harvæum *Exercit. 69. p. 444. 445.* & alibi passim, Kerkringium in *Anthropogeniæ Ichnographiâ C. 2. & seq.* nec non Græfium *de Organ. Genital. Mulier. C. 15.*

§. 10. Adducta hætenus exilitatem primordii foetus passivi potissimùm spectarunt: activi moventis formantisque subtilitatem si meditatus fueris, diviniior admiratio mentem subibit. Necessitatem hujus ac materialitatem inferiùs paulò probatam videbis, nunc saltem considera, quantillum ejus ad conceptum excitandum concurrat.

§. 11. Requiritur Germen masculinum ad verum conceptum constituendum, omnes ultrò largiuntur, eò quod sine hoc nullus unquam talis continget, nec proles virilis generari posset, nisi accederet aliquid ideam hujus possidens, quod in Muliere frustra quæsieris. *Vid. Beck. c. l. p. 191.* Semen autem hoc virile nec membranaceum mulieris ovulum, quod foecundum reddere debet, propter viscosam sui crassitiem penetrare, imò ne quidem ad illud usque sub crassiore istâ consistentiâ unquam, aut semper & in omnibus Animalibus ascendere potest, v. g. in Gallinis propter anfractuosum Oviductum, item

in imperforatis; qualem tamen puellam ex solo Halat virilis (ignosces autem quod Naturæ ductu apertius scribam, cum Castis mihi res est) affrictu concepisſe apud Graſium *l.c.* legimus, ubi ſanè præterquam Spiritus, nihil aſſurgere potuit.

§. 12. Sequitur ergò ex hiſce, quod ratione alius cujuſdam principii ſubtiliſſimi & exiliſſimi, ſpiritus ſcilicet activi, facilè penetrantis, *σπίσμα* Viri ſaltem concurrat: quantillum verò huius eſſe poterit in modicâ adeò ſeminis fœcundi quantitate, unico coitu ad plures fœtus nonnunquam ſufficiente, excretâ? Ut taceam, per experientiam nonnullos, ac doctâ cum aliis conjectura Excellentiſſimum Dn. D. Barnerum Inelyti Collegii Medici Auguſtani Adſeſſorem, Præceptorem devenerandum, in Collegio Phyſico, quod ſemeſtri præterito ſub eo habuimus, *ſect. 1. §. 18.* docere, prævias ſaltem ſeminis maſculini guttulas, quas ſub primo eruptionis impetu altius ejaculari dicunt, vim hancce plasticam continere; reliquo, quod ſubſequitur, magmate ſeminali, extremitatem urethræ vix tranſcendente ac ſine uſu iterum diſfluente. Sic ut non ineptè Marcus Marci, in *Philof. Veter. reſtituta P. 3. §. 8. Subſ. 2. §. 10.* dixerit: Tam fœminæ (utpote cujuſ Spiritum genitalem ſuo modo & genere ad fœtum formandum quoque concurrere, non negamus) quàm Maris Genituræ portionem minorem, quam ut ſenſu percipiatur, ad conceptum ſufficere.

§. 13. Ex quibus ipſis, plus nimis longâ forſan ſerie adductis, abundè patet, quàm exigua ſint Magnorum in Naturâ Productorum atque effectuum primordia. Naſcitur ex tantillo ſeminis apice ingens Arbor, annoſa quercus, lata expandens brachia, & producta quævis ex triplici Naturæ Regno altitudine facilè tranſcendens. Oritur ex Cicatricula, Milii ſemine minori, Gallus, Animal magnanimum ac ſuperbum, & ex tantillo ſpiritu genitali huius, unâ vice omnia, vel centena ſi eſſent, Gallinæ ovula fœcundantur, teſte cum Harvæo experientia. Ex puncto prodit homo, magni huius Mundi non minoris momenti Microcoſmus. Ita ut exinde Scaligeri illud, dari inter minima maxima, &, quod Harvæus habet, Creatorem omnipotentem ex mini-

mis initiis maximum apparere voluiſſe, oppidò pateat.

§. 14. Tacitus hæcce, ac parvum imprimis mirandæ hominis Machinæ exortum, mecum agitans, ultro deprehendi, quemadmodum ea à parvis ſuſcitatur primordiis, ita exigua non minus initia deſtructionem ejus moliri, & vel ex tantillo primùm cauſæ morbificæ errato maximoſ ei accreſcere morbos. In quæ ipſa penitus non nihil inquirere, cum haud parvæ videatur utilitatis, ſpeciminis qualicunque gratiâ, pro Ingenii Modulo de iis agere conſtitui.

Ita & à parvis Morborum primordiis deſtructio huius procedit.

## DISSERTATIO IPSA.

### §. 1.



Ub initium verò ſtatim annoto, me per tantillum Magnorum Morborum initium intelligere Cauſas proximas eorum, tum ratione molis, tum ſubtilitatis admodum exiles, idque imprimis reſpectu Producti ac Morbi exinde ſucceſcentis ſat magni; quæ magna voce intuitu improporcionatæ partim coacervationis ac extensionis per plures corporis partes, partim longæ plus juſto durationis, ac partim etiam periculoſitatis majoris, ſi cum tantillâ ſui cauſâ primitivâ conferantur.

§. 2. Remiſſam ſi attentius paulò intueor, omnium tantum non Morborum initia huiusmodi parva deprehendo. Proxima quippe formalis cujuſcunque ferè Morbi cauſa ac ratio in ſpirituum vitiato conſiſtit motu, ita ut horum etiam intuitu ſublimiora ſaltem ac univerſalia vocata medicamenta pleroſque morbos compeſcere, omnes uno ore conſentiant. Cum enim omnes ferè Morbi cum moleſtâ quâdam ſenſatione videantur eſſe conjuncti, ſenſatio autem à ſpiritibus primariò fiat, (manus enim ſpiritu abſente non ſentit) ſpiritus certè Morborum plerorumque, ſi non omnium cauſa immediatè ultima erunt, quæ, ut Morbum percipiamus, efficit.

Morborum (a) Cauſæ exiguæ, ac 1. proxima formalis, ſpiritus noſtri.

§. 3. Idem proinde nobis (ut cum Charletone in *Oecon. Animal. Exerc. I.* loquar) ineſt & Vitæ principium & Mortis; nec à cauſis occasionalibus morbificis ſolummodò excitati ſpiritus noſtri motores, morbos nobis intentant, quin & naturali ſuâ inquietudine ac avolandi conatu quaſi peren-

perenni corpora nostra successive ætatum decursu ita atterunt atque immutant, donec ruinofam tandem ejus Machinam penitus conficiant atque exaniment.

§. 4. Quàm verò subtilia hæc sunt tantarum in corpore turbarum initia? Adeò ut exinde multi hodieque sint, qui eorum existentiam, eò quòd in oculos non incurrant, penitus in dubium vocare, alii autem ob easdem rationes materialitatem eorum negare non dubitant. Quibus proinde contrarium persuadere, dubiumque hoc pro virili declinare, pro meliori dictorum pariter ac dicendorum robore, omninò convenit.

§. 5. Falsa sanè in Naturalibus est Conclusio, quodcunque non videmus immediatè, illud non existit, nec Corporeum est. Ne quidem ab omnium sensuum negatà à priori perceptione ad negationem existentie alicujus rei naturalis valet Consequentia; quemadmodum Laudatus supra Excell. Dn. D. Bohn. in *Epistol. de insuffic. acid. & alcal.* p. 10. & 11. egregiè ostendit, idque exemplo imprimis particularum Mercurii vivi omnes sensus in quodam liquore, cui Mercurius prius fuerat infusus & iterum ablatus, effugientium, effectu tamen suo, quem à Mercurio liquor ille mutuaverat, dum æque ac hic postmodum Vermes necaret, in existentiam suam satis comprobantium. Optima sic & subtilissima quæque, conquerente Scaligero *de subtil. Exerc.* 23. eludunt aut fallunt sensum.

§. 6. Rationem hujus rei reddere conatur Tattinghof in *Clav. Philos. Nat.* Non mirum esse, innuens, quod corpora valde minuta sentire nequeamus, cum ipsi corporis nostri nervi, qui tamen ab objectis pro sensu excitando moveri debent, à talibus verò, quæ iis ipsis minora sunt, moveri non possunt, non sunt minutissimi, sed objectis ejusmodi subtilibus crassiores: unde & qui subtiliore nervorum texturâ, vel naturâ, ut Gynæcea, vel ex accidenti, ut atoniâ aliquali & fibrillarum in minores partes dilaceratione propter prægressam aliquando læsionem affecti, gaudent, levissimum subtilioris objecti contactum, e. g. aeris exiguam mutationem, longè facilius ac citius aliis persentiunt, qualia exempla lectu non in-

digna vide apud Illustrem Boyle *Tr. de Atmosphæ. & Effluv.* p. m. 128. & seq.

§. 7. Hujus verò quicquid sit, apparet sanè ex adductis, solos sensus externos naturalium perceptioni non semper æque sufficere, & vel in ipsis experimentis sensibilibus, dum illud, quod quæritur, non semper in sensum externum incurrit (optime hoc annotante, quanquam aliam in partem applicante *Exc. Leichnero in Exerc. Anti-Harvean. de motu sanguinis*) libero sanoque Rationis judicio, quod cum experimento, cui superstruitur, rectè cohæreat, insuper opus esse, junctaque horum opera multa deprehendi posse, quæ neutri separatim paterent.

§. 8. Omnibus proinde sensibus quod denegatum, multò minus soli visui concessum erit, adeoque nec illud statim in dubium vocandum veniet, quod ab hoc non percipitur. Primo namque multa majores nostri non viderunt, quæ per utilissimum hodie inventum Microscopii ac Telescopii detecta sunt, ac proinde revera exstitisse se, licet ab illis visa non fuerint, testantur; qualia sunt: Nova in cælo sidera, satellites Jovis; in terra corpora, semina plantarum sine semine veteribus oriundarum, conformata jam integra proles in seminibus, plantulæ ex situ & mucidis librorum maculis propullulantes, corporum inflammabilium, silicum, sulphuris, carbonum &c. particulæ minutissimæ inflammabiles sub formâ punctulorum & linearum argentearum egregio spectaculo apparentes, vermiculi in aceto, insectorum minutissimorum partes distinctæ, pili, oculi, squamæ, pedes, teredines, dentes araneorum, musca oculorum pluralitate Argum inter insecta repræsentans, bombycis pulmones, tracheæ &c. Ductus adiposi in piscium pelle, viscerum corporis nostri artificiosa & intimior structura antea incognita, unguium venulæ, & quamplurima alia, de quibus videantur passim Authores, Cartesii Dioptrica, Borellus, in hist. Conspiciliorum, & obss. Microscop. Hookii Micrographia, Rohaulti *Phys. C. de Elim. & alii.*

§. 9. Deinde, quod alterum est, multa adhuc in rerum natura subtilia existunt, quæ sub nostrum conspectum



ctum vel prorsus nunquam, vel saltem statu disgregationis non cadunt. Aërem non videmus, existere tamen eum, inter alia testatur flamma Ellychnii, foribus in conclavi de subito apertis vel clausis, hinc inde commota. Musculos, nervos in teredine, de qua paulo ante memini, etiam per microscopium visu assequi aut distinguere haud possumus, ex motu tamen corporis & pedum ejusdem, supponere hos omnino convenit, siquidem non solum in conspectioribus animalibus, sed & insectis nonnullis Bombyce &c. observante Malpighio in Tr. de eodem, illos adesse & motum partium organicum mediantibus his contingere, manifestò apparet; quidni E. etiam in teredine natura eadem analogia uteretur?

§. 10. Corporum electricorum succini,  $\Delta$ is, effluvia oculis non apparent, testari tamen de eorum satis coagmentata eruptione videntur corpora levissima, paleæ, crines, minuta papyris ægmina, quæ, si frustum v.g. succini, pro excitando copiosiore & fortiore miasmatum egressu affriccione prius nonnihil calefactum, in proportionata distantia sub iis firma manu detineatur aliquamdiu, ex loco, cui incumbunt, ad succinum usque elevantur & huic adhærent, dum priora succini effluvia propter alia, quæ continuo ac presso tamite insequuntur & subjectum corpusculum leve arctius circumcirca cingunt, percussâ quasi iterum ascendere & paleam v.g. in medio cingentis reliquæ atmosphæræ simul secum sustollere, coguntur, quæ deinceps tam diu succino adhæret, quam diu adequatus effluvi-  
viorum hujus effluxus & refluxus durat. Vi magnetis ferri attractivæ similem ferè subesse causam & effluvia striata, hodie perspicaciores naturæ Consulti, Cartesius, Boyle, alique non immerito suspicantur.

§. 11. Porro exhalationes spiritus  $\Theta$ \*ci & aliorum corporum odoratorum sub visum non cadunt, optimè tamen naribus deprehenduntur. Nec est, quod ideo ad qualitates intentionales hic confugiamus, cum hodie constet, nullam etiam ex his contingere absque subjecti (à quo qualitates cunctæ non nisi sola ratione & respectivè ad quintuplicem sensuum nostrorum differentiam differunt) materialium particularum emanatio-

Tom. II. Pars 2.

ne; cum vel ipsi Peripathetici concedant necesse est, accidens, adeoque & qualitatem, extra subjectum non posse subsistere. Alia, quæ probant, effluvia hæc odorata materialia esse, & experimenta statica eorum effluxum propter ponderis, quod inde percipitur, decrementum, confirmantia, vid. juxta Boyleum de Effluviis, inter ea, quæ infra de odoribus atque contagiis adducta sunt.

§. 12. Sub disgregationis statu visum, imo & reliquos sensus effugiunt multa, e.g. Vapores & exhalationes ex globo Terr-aqueo, dum elevantur, quæ tamen, ubi in nubes collectæ, oculos nostros omnino feriunt, & revera prius elevata se fuisse ostendunt. Simili modo effluvia vaporosa, quæ halitu oris emittuntur: dum disgregata v.g. tempore æstivo, non videmus, unita vero postmodum ubi fuerint, vel in speculo, vel extra hoc ab ore saltem dimissa ac frigore hyberno constricta nobis apparent. Sic vice versâ varia corpora, quæ dum unita erant, sub visum cadebant, in invisibilem partium tenuitatem redigi possunt. Sic ignis flamma in minutissimis atomis per aquam & aërem dispergitur, ut conspici amplius non possit, annotante Leichnero *in l.c.* Ac rectè Scaliger, *Exerc. 9. de Subtilit.* dicit, carnem in veru non assari & rangi ab illo igne, quem videmus, sed ab ejus particulis discontinuatis magis, quæ non videntur. Ex quibus omnibus longa serie adductis uno intuitu insimul quoque patet, subtilia & sensum nostrum effugientia non statim pro immaterialibus esse habenda.

§. 13. Dilutis igitur plenius remotivè hisce dubiis, pergo potius ad positivam spirituum demonstrationem. Motus & per motum formari, actuali, vivificari atque produci corpora ac phænomena naturalia, oppido omnibus, vel ex sensu proprio interni in corpore nostro motoris, apparet, rectèque hoc à modernis Philoſophis corpuscularibus multis rationibus atque experimentis adstruitur. Movens E. aliquod, motum hunc producens, necessariò supponendum erit. Primum movens Deum, Creatorem Omnipotentem, reverenter agnoscamus necesse est: sed & secundum s. naturale ac mediatum, à Deo vita, agilitate & potentia, se ipsum aliaque secum, juxta normam & ideam quasi

[ H h h h h ]

adjun-

adjunctam, movendi, vivificandi, & conservandi, instructum, non immerito cum Heimont. *Tr. Blas. Hum.* §. 2. aliisque Philosophis ferè omnibus, supponimus, siquidem necessario in naturalibus tandem ad causam efficientem Physicam aliquam recurrendum est, nisi hodieque omnia, etiam ordinario cursu quæ fiunt, supernaturaliter contingere, & juxta Rohault in *Phys. P. I. C. 10. f.* singulismomentis miracula à DEO elicere velimus.

§. 14. Movens hocce naturale respectu tum corporis, quod actuat, tum sensuum nostrorum, crassum quid esse nequit, partim scil. quia ratione celeritatis summæ in quibusdam actionibus, e. g. voluntariis, quæ à crassiore fixioreque substantia tam subito fieri non possent, requiritur admodum subtile, mobile, volatile & activum, ut docet Excell. Dn. Præses in Colleg. Institution. partim etiam, quia oculis non patet. Nec est, quod sanguinem (cui in vegetabilibus liquor Lessas, in mineralibus succus Burr. Helmontii *Tr. Element.* §. 13. respondere videtur) pro hoc obtrudat Harvæus *C. L. Exerc. 71. p. 469.* Non enim hunc, sed subtilius quiddam in eo latens machinam nostram corpoream, ipsumque etiam sanguinem actuare, vel exinde constat, quod hic in corpore demortuo etiam præsens sit, nihilominus tamen amplius non moveatur; necessario igitur principium motus aliunde habebit, quo absumpto vel deficiente, quiescere emorieturque ipsum cum machina, quam inhabitat, necesse est.

§. 15. Sed ut in viam redeam, movens hoc sensibus nostris subtile quid esse cum certum sit, erit id vel immateriale, vel materiale. Immateriale esse nequit variis ex rationibus, ac primo, quia divisibile, ut benè adducit Willis *de An. Brut. P. 1. C. 2.* Divisibile illud deprehenditur non solum in corpore integro vivente, quia plures ac diversos actus animales simul à diversis corporis membris ac partibus obiri cernimus. e. g. eodem instanti oculus videt, auris audit, nares olfaciunt, lingua gustat, & membra quævis exteriora Tactus sensum & motum exercent, ac interna viscera quæque & præcordia munia sua exequuntur. Necesse igitur, ut aliquæ ejus portiones singulis illis membris ac

partibus simul insint. Quin & in dissectis partibus animalium, quorum succi viscosiores ac spiritus minus dissipabiles, lumbricorum sc. viperarum, anguillarum &c. horum enim partes à toto dissectæ ac segregatæ, à se invicem per aliquod tempus adhuc moventur. Ac miranda vidi præterita hyme penes nobile quoddam par amicorum philiatrurorum, quorum in Musæo, dum cultro anatomico subiceremus canem partui vicinissimam, dissectis, post reliquorum examen, in foetibus quibusdam vasis sanguiferis nerveisque majoribus, læsis vel etiam prorsus extractis visceribus plerisque, ac imprimis corde, truncum nihilominus reliquum, ita evisceratum, longè etiam post horæ, ex quo hæc facta, spatium, motu conductorio adhuc convulsam, similiterque cor, à corpore sejunctum, motu convulsivo, tum spontaneo, tum irritatione cultelli excitato, pluries tentatum, vidimus. Cui si subjungerem, quod Anno 73. Mense Decemb. in musæo proprio, unà cum amicis quibusdam conjunctissimis, in sciuro deprehendi, cor scil. (postquam ultra horas 40. Animal jam esset defunctum) exsectum & intra digitorum pulpam à nobis detentum, aliqualem adhuc motum pulsatorium in profundiori centro edere visum fuisset, fidem forsitan transcendere viderer.

§. 16. Altera ratio contra immaterialitatem moventis est, quod alterationibus ac morbis variis hoc sit obnoxium, imò ipsi morti, ut superius probatum, quæ tandem illud planè destruit & aufert. Hæc verò saltem materiæ, omnium consensu, competunt, minimè autem immateriali cuidam substantiæ, cum non legamus ullibi, quæ immaterialia sunt, e. g. Angelos bonos, vel etiam malos post lapsum proprium, destructioni obnoxia esse. Et sanè, quod tertium est, si illud immateriale, adeoque, ex decreto Altissimi jam sancito & exemplis modo adductis confirmato, indestructibile supponeretur, ipsæ brutorum animæ, quæ in solo eodem principio movente consistunt, etiam essent indestructibiles, sicque immortales, quod absurdum & sacro Textui contrarium.

§. 17. Firmiter proinde concludere licet, movens illud esse materiale.

Quid

Quid verò sit, ardua magis est quaestio: quantum tamen à posteriori per certa fundamenta huriolari licet, etiam de eo videbimus. Ex supra adductis constat, esse illud admodum subtile, mobile, volatile & activum. Hinc factum, ut analogicè à Medicis spiritus fuerit dictum, quo nomine & nos illud imposterum appellabimus. Consideremus jam, qualianam inter res naturales corpuscula ad hanc subtilitatem & activitatem proximè accedant, ut per ea ad penitiorem spirituum horum cognitionem ac definitionem pervenire possimus.

§. 18. Deprehendimus verò particulas volatiliores imprimis, salinas & oleosas, seu sulphureas (non crassas illas, sed in his latentes insipidas Excell. Bohnii & quasi seminales) omnium esse subtilissimas & maximè activas, hinc & ipsæ hæc tum in corporibus, quibus continentur, tum ex iis arte educæ & cum aëris vel proprii corporis simul phlegmate unitæ, vocantur spiritus. Activitatem atque subtilitatem suam probant exinde, quod ipsarum particulae in continuo ferè sint motu, & vase aperto continuo odorem sui, in distans quoque, spargant, citra tamen alius sensus perceptionem, imò brevi maximam partem avolent. Et sane quicquid in quocunque genere mixtorum reperitur subtile activumque, aut sal, aut sulphur ejusmodi insipidum, aut utrumque ut plurimum combinatum est. Ut taceam spiritus  $\Theta$ nos &  $\Phi$ cos, qui ex subjectis trium Regnorum igne ministro evocantur, subtilitate & activitate maxime esse penetrantes, quæ naturaliter etiam & ultro subjecta illa exhibeant spirituosa, saltem adducam.

§. 19. Odores, ex plantarum floribus exhalantes, activas esse partes, quis negaverit? cum & extra suum corpus, quod ante inhabitabant, tantam ostendant subtilitatem, activitatemque, quanta major ullius rei vix concipi potest. Sunt verò iidem nihil aliud, quam particulae subtilissimæ  $\Theta$ no-volatiles oleosæ, ex oleo plantarum seminali fermentatione resolutæ accendentes, & certâ ratione commotæ, nares nostras eo modo afficientes, quem nos odorem vocamus. Oleo namque isto flores si privaveris, nullam amplius spirant fragrantiam. Sunt autem olea nihil

Tom. II, Pars 2.

aliud, quàm  $\Theta$ a volatilia cum pinguedine  $\Phi$ ea ac seminali in orbem concentrata, docente hoc, præter experientiam chymicam, erudite Excell. Barnero in *Prodromo suo Vindic. contr. Bek. p. 20.*

§. 20. Foetores ex animalium excrementis (sit venia verbo & ad obscena transitui) recentibus imprimis exhalantes ad molestiam usque activi, subtile, & pariter naturæ  $\Theta$ no- $\Phi$ ea sunt, quod innotescere potest, si Alembico suscipiantur, quod experimentum à Laudato Excell. Barner. in Collegio Chymico communicatum memini; &  $\Phi$ eum principium vel exinde satis elucescit, quod ardeant flammâ admotâ.

§. 21. Mineralia quod exhalant, Gas. f. Vapor in Metallifodinis subinde conspicuus, satis activum se esse ostendit, dum adeò facile & momentanee homines interficit. Sulphureo-verò  $\Theta$ num pariter & hoc esse, vix eget probatione. Imò levi affricu ex sulphure nativo prodit ejusmodi spiritus acido-sulphureus, odore nares nostras notabiliter satis feriens, teste Boyleo de effluv. & propria experientia.

§. 22. Quæ cum ita se habeant, non video, quo minus liceat nobis suspicari probabiliter, spiritus, corporum inter nos motores, consimilis valde cum dictis esse naturæ, & fere magis subtilesque saltem, sicque tandem juxta manuactionem Coll. Phys. Barner. mutatis & additis paucis definire, quod spiritus hi sint particulae mixti viventis cujuscunque subtilissimæ salino-sulphureo-aëreæ, sub debita & non interrupta contiguitate ac quantitate, potentia motiva, & operativa secundum corporis, quod incolunt, proprietates & organisationem à Deo instructæ.

§. 23. Atque ut in specie hoc jam applicem ad animalia, ac hominem præcipue, utpote in cujus gratiam investigatio hæc spirituum naturæ potissimum vergere debet, quo morbis eorum, quibus ille affligitur, eo melius succurri queat; Notandum est: In semine primoque animalium conceptu eodem momento cum & in seminali materia, tanquam passiva, ex qua machina foetus construitur, adesse spiritus, seu materiam activam & formantem. Passivam nihil aliud esse, conjecturare possumus, quam

[H h h h h 2]

colli-



colliquamentum illud chylosum, omnium partium, quas ante suam in locis genitalibus collectionem, lege circulationis, pertransiit, idea sive signatura, juxta Bekium C. L. alioque notatum; eo quod ex hoc foetus nutrirideamus; ex quo autem nutrimur immediate, ex eo nos constare & ortos primum fuisse, vi illius Hippocratei, admodum probabile fit.

§. 24. Spiritus in colliquamento hoc praesens continuo particulas idea insignitas motu suo, juxta normam, cui in corpore parentum adfectus est, ordine determinato connectit, ita ut, quod superius innui, materiam primigeniam foetus inquirere volentibus, cum hac statim ipse embryo integre jam delineatus appareat. Dumque spiritus hac ratione materiam seminalem oleosam (pingue enim oleosum semini cuicunque, tanquam partem essentialem, inexisterere experimenta varia docent) successive magis magisque resolvit, ac ex particulis ejus  $\Theta$ no-sulphureis magis sic volatilifatis sese multiplicat atque adauget, colliquamenti intra vasa sua inclusi, non aliter ac ex resolutis oleis per  $\Theta$ a volatilia extra corpus contingere solet, emergit color rubicundus, ob quem adeoque illud posthac sanguis in vasis dictis appellari incipit. Novo adducto alimento particulis  $\Theta$ no-oleosis impraegnato, etiam tunc, ubi extra uterum foetus jam editus, & os usque tandem adolevit, ut ex cibis more adultorum Chylum conficiat, continuo simili resolutione & volatilifatione ejusdem, quae ab aere quoque sub inspiratione non parum tunc adjuvatur, novi producuntur spiritus, & sic utique ad vitae terminum eorum proventus perpetuatur.

§. 25. Principium hoc, ex quo spiritus restaurari vel augeri dixi, aliquo modo jam eorum in animalibus naturam  $\Theta$ no-volatilem oleosam probare posset; verum alia quoque in promptu sunt argumenta hoc confirmantia. Ac primo ratione principii  $\Theta$ ni volatilis  $\Xi$ osi, quod notabiliorem eorum partem constituere videtur; praeter ea, quae in genere supra ob ejus summam activitatem suspicati sumus, persuadent porro ejus in spiritibus praesentiam fracedo  $\Xi$ osa, spiritui  $\Theta$ \*ci similis, cerebro, in quo spiritus, pro functioni-

bus animalibus potissimum necessarii, separantur, inhærens, quae satis testatur, annotante Excell. Bohnio in *Disp. physiol.* 15. §. 18. de Natura eorum  $\Theta$ na,  $\Xi$ osa volatili, cerebro ab eorum tranlitu, vel fermento ipsorum naturae correspondenti juxta Willisium affricta. Huic succedit copiosum sal volatile, quod elici potest ex partibus animalium, ac ipso sanguine, quorum hoc procul dubio spiritibus, sub resolutione sanguinis fermentativa intra corpus, materiam restorationis praebet, illud vero ex  $\Theta$ e volatili spirituum sub nutrimenti in partibus assimilatione magis fixato ortum trahit, quae vel per blandum digestionis calorem, vel per ignem fortiozem iterum volatilifata prodire videntur.

§. 26. Nec moramur hic Mischymicos, corpori hæc non inesse, sed ab arte demum produci, somniantes, cum  $\Delta$ is nihil ex corpore aliquo elicere queat, quod hic materialiter non prius inexistit, atque semper una eademque principiata, debito modo adhibitus, nunquam ab his diversa, educat, imo digestionis, & fermentationis, qui vocatur ignis, naturali prorsus modo & excitativè saltem in corpora agat, quorum principium internum postmodum ipsam operationem promovet atque perficit. Formaliter tamen non nihil immutata esse, quae per eum producuntur, non aequè negaverim. Conf. Will. de Ferm. c. 2. f. p. 11.

§. 27. Quod alterum principium, oleosum sc. f.  $\Phi$ eum, concernit, de hoc etiam spiritus nostros participare, varia sunt, quae probant, ac inter ea non ultimum, quod sequitur: In sanguine particulas pingues sulphureas negare non possumus, partim quia calor ex ejus motu proveniens, cum hic sine particulis calorificis, inflammabilibus, quales in sulphure intimius latere solent, fieri non possit, de harum in eo praesentia satis testatur, quod item facit color ejus rubicundus à particularum oleosarum in minima resolutione dependens; partim quia pinguedo, pars sulphurea, ex sanguine ortum habet, partim etiam, quia ejus analysis Chymica tales exhibet, & praeterea ex anhelitu, qui sanguinis ex parte proles, oleum, sc. sulphur flammam concipiens, non difficulter haberi potest, docente hoc ipsum

ipsum Borrichio de Ort. & Progress. Chym. p. 7.

§. 28. Sulphureas vero particulas ac imprimis intimius eorum principium, quod indigito, inflammabile, insipidum, admodum esse volatiles subriles & activas, constat; unde non immerito inter spirituum nostrorum partes numerandæ venient: quam suspicionem non parum adauget, quod, cum illæ in aliis corporis partibus absumantur in pinguedinem, in iis tamen locis, ubi spiritus separari imprimis solent, ut in Cerebro & testibus, nulla unquam reperiatur pinguedo, in spiritus forsan ejus principiis ibidem absumptis, & alteram spirituum partem, Θnam sc. egregie contemperationibus.

§. 29. Ultimò denique notum est, quod spiritus insigni vi polleant corpora nostra condiendi & à putredine præservandi, adeo ut, quamdiu illi in debita quantitate ac vigore corpori ac sanguinis præfunt, ab omni putredine hæc immunia sint, recedentibus verò iis statim corrumpantur. Cum verò similem prorsus corpora condiendi virtutem possideant sulphura oleosa, dum Gas s. Fumus sulphuris Vina & succos vegetabilium præservat à Corruptione, Terebinthina optimum pro conditura cadaverum existit balsamum, ac præterea Olea destillata aromatica mirandam & momentaneam quasi foveant vim spiritus odore suo restaurandi, licitum erit suspicari, an non eadem ac hæc virtute Θno-volatili oleosa hoc illi præstent.

§. 30. Verùm supposita licet hac ratione spirituum Natura Θno-volatili sulphurea, non ideo tamen cum Willisio statim asserendum, eos nimium commotos ac incalescentes in flammam quandam abripi, cum hoc in angustis corporis nostri Machina propter defectum liberioris medii, aeris scilicet, fieri non possit, & cum præsentaneo vitæ interitu conjunctum esset. Quo ipso tamen particulas aëreas, seu vehiculum reliquis eorum partibus intertextas, non omnimodè excludimus, utpote quarum cum iis concursum vel ipse reficiens melioris notæ aër, per respirationem sanguinis ac spiritibus commistus, satis probabilem reddit, præter illa, quæ de ramis asperæ Arteriæ ipsi Medullæ spi-

nali Bombycum &c. infertis adducit Celeberrimus Malpigh. de Anat. Bombyc. & ex eo Bohnius Excellentissimus Exerc. Physiol. 15. §. 5. 6. 7.

§. 31. Prolixior fui in spirituum existentia atque essentia probanda, eo quod fundamento non sufficienter firmato, reliqua minus tuto superstrui soleant. Spiritus vero fundamentum omnium facile Morborum esse, superius declaratum est. Nunc saltem specialius de iis videbimus.

§. 32. Morbi spirituum proprie sic dicti, dum peccare illi dicuntur in quantitate, qualitate vel motu, vix aut difficulter admodum distinguuntur ab aliis, quæ corporum contentis essentialiter inhærere scribuntur, quoniam continua quasi pericyclosis & communicatio inter hæc observatur: ita ut v. g. dubitare posses, num in subtilitate spirituum vitata sanguis potius cacochymia; & in sanguinis fermentatione febrili, spiritus rectius motu excedente, sanguinemque in impetuosum illum motum abripien- te, peccare dicendus sit. Sed mitramus hoc loco vulgatiores illos spirituum morbos, cum ex professo & specialius de talibus agere, nostri non sit instituti, principium eorum minimum, spiritus ipsos insinuasse sufficiat. Prosequamur illos potius, quantum agusta hæc pagina permittit, qui totius substantiæ vulgò vocati, à causis occultis & τὸ Θνο Hippocratis fontibus oriri dicuntur. Quos inter primo se offerunt Ideales, secundum Helmontium & M. Marci, nuncupandi.

§. 33. Cum viderent Naturæ Consulti, ut, quæ ingeniosè habet Excell. DN. PRÆSES in Dissert. de Morfu Viper. C. 1. Punct. 5. §. 3. ex parte mea faciam, Viventium Ortus, Progressus & Interitus ab interno agente, quod spiritum supra vocavimus, perfici, tam multas autem huic incumbere operationes, ut, nisi aliquid sit, quod tanquam regula ordine certo in agendo ipsum ita dirigat, ut operetur hoc, ut operetur illud, confusionem in operando, à qua tamen natura abhorret, fieri necesse esset, dirigens ejusmodi supposuerunt. Idque Ideam vocarunt, quam in ipsis spiritibus alii quæsi- verunt & scientiam dixerunt connatam, quam tamen, cum supponat in iis præviam quandam de subiecto cognitionem &

[Hhh hh 3]

ratio-

rationem, omnibus viventibus, Plantis v. g. adjudicare, durius paulo videretur, quippe quas rectius Hippocrates facere, inquit, quod nesciunt & scire sibi videntur, omnia autem per divinam necessitatem. Quoniam tamen instinctus ejusmodi idealis spontaneus determinatè sese movendi & agendi spiritibus concedendus, erit certè is à posteriori saltem & ex sola consuetudinis lege, quæ altera Natura est, adeptus, ita ut spiritus hoc vel illo modo juxta ductum organisationis illius corporis, cui primum inditus, moveri adfuetus, alii corpori postmodum communicatus eodem planè in hoc motus repetere tentet. Id quod illustrat partis cujusdam voluntario motui destinatae citra voluntatis imperium, ex sola sæpe consuetudine spiritus, certo tempore musculos illos abbreviantis, contingens motus. Sic ex assuetudine quidam sæpius cantillant citra etiam animadvertentiam propriam. Alii tempore somni manus hac ratione hinc inde jactitant, imò varia nonnunquam loquuntur citra prævium voluntatis imperium aut subsequam quoque facti conscientiam.

§. 34. Præter recensitos alii quidam motus hujusmodi determinatum directorium seu ideam in ipsa partium continentium organisatione quarunt. Quos sane per Ideam hanc, quæ merito priori jungenda, nihil aliud intelligere ex M. Marci *Phil. Vet. restit. P. 4. S. 2. Sulf. 2. p. 426.* tandem apparet, quam Typum, aut Signaturam, vel Conformationem, machinis corporeis earumque partibus singulis in prima creatione impressam, juxta cujus limites tramitesque spiritus insiti ipsis sese movere & agere tenentur. Hanc ipsam ideam particulis succi nutritii, qui omnes partes permeat, & tandem in semen colligitur, impressam, cuncta generantia individua, postquam definitam figuræ corporis sui extensionem assecuta, in circulum se redeundo, posteris suis suisque seminis communicant, sicque perpetuò propagant atque conservant, docente Bekio *l. c. p. 182.* ita ut etiam parentes, ac imprimis matres, naves, excrecentias, aliosque varios morbos ratione idearum à singulis partibus seminali materia præterfluente communicatarum, in liberos propagent. Ideas hæc (semina-

les proincum M. Marci *L. C. P. 2. S. 1. præp. &c.* Item *P. 4. Subf. 1. 3. p. 411. 420.* rectè vocandas) in semine jam cluere, exordio hujus dissertationis ostensum. In sanguine verò, quo in semen latet ex eoque in testiculos secernitur, easdem vias fuisse refert Borellus *C. 4. Obs. 62.* quæ tamen fides sit penes Authorem.

§. 35. Naturales hæc, & corpori nostro propriæ Ideæ, quamdiu in statu ipsis à natura assignato imperturbatæ relinquuntur, tam diu spiritus ordinate omnia in corpore exequuntur, simul ac vero eadem aliquantulum transformantur, depravatè ac morbosè juxta eas ut agant spiritus, necesse est. Vitiari eadem solent à variis causis, à quibus conformatio partium lædi solet, quas vide in Institutionum Scriptoris, Sennerto, Mœbio, aliis. Nobis sufficiat, hoc loco annotare illas occasiones vitiatarum in corpore nostro Idearum naturalium, quas supeditant ideæ peregrinæ, vel imaginativæ saltem, vel seminales; de quibus vid. M. Marci *L. C.*

§. 36. Per imaginativas innuuntur istæ, quæ, sine ideæ materialis peregrinæ intra corpus nostrum receptione, per solam imaginationem, occasione objecti externi fortius commotæ, & fabricante spiritu nostro formantur. Hacque ratione spiritus una cum sanguine, per firmiorem & inconsuetam imaginationem fortiori & magis peregrino, determinato tamen motu foetui molliuscule adhuc appulsi, varias figuras eidem intra uterum hospitanti affricant.

§. 37. Legimus in M. Marci, Gravidam à pomo, quod deperibat, prohibitam, enixam esse foetum, è cujus malâ pomum, proprio petiolo adhærens, pendebat. Recenset Bekius exemplum cujusdam uterum gerentis, quæ, cum Æthiopem inopinatò accedentem exhorresceret insigniter, in animi deliquium lapsa: cum E. metueret foetus nigredinem, adstantium unus (qui probè cognitum habebat, ideas hujusmodi, de subito & exterrore conceptas, superveniente alia idea contrariâ, iterum deleri) suavitè, ut statim lavaretur foemina & secuta redderetur, nullum post lotionem nigrorem in foetu amplius observatum iri. Factum hoc, & ecce! tandem peperit foetum candidum, nigrorem tamen reverà sibi impressum.

II. Proximæ occasiones.  
(1) Ideæ peregrinæ.  
(2) Imaginativæ.  
(3) Seminales.



impressum fuisse ostendentem, dum in locis, ad quæ manus lavantis non pertigerat, scilicet in interstitiis digitorum tam in manibus, quàm pedibus, nec non in inguine ac uno quodam dorsi loco, nigredinis vestigia adhuc retinisset. Notum hinc similiter est, mulieres gravidas, de foetu continuo sollicitas, quando aliquid vident de subito, à quo abhorrent, manibus statim involare faciem, hincque omnium frequentissimè Nævus hujusmodi faciei foetus imprimere; quod si vero, statim a hoc ipsis contingit, ad se redeunt, antequam idea talis firmiter & perfectè ibi sigilletur, manu faciem iterum abstergant, hancque alii cuidam loco, oculis non adeo exposito, applicent, ex contraria imaginatione nævum illum huc transferri videbis. Porro per experientiam constat, ex frequentiore & firmiore pulchrarum imaginum aut infantum aspectu, firmitus in phantasia radicato, conceptam pulchritudinem gravidas in foetum derivare: quod idem ex adverso ex turpiter conformatis, labiis leporinis &c. subito conspectis & firmitus animo retentis, iisdem contingit.

§. 38. Nec potis solummodo imago est, spiritu & sanguine mediantibus partes certas p. n. in foetu formare, quin & naturales ipsi partes delere iterum valet, eos in liquorem primigenium colliquamenti resolvendo, uti ingeniosè suspicatur M. Marci *l. c. P. 4. S. 2. subf. 1. p. 413.* cujusmodi possibilitatem experimentum Everardi ulterius confirmat, quo sola va calida embryonem in materiam feminalem iterum diluit. Extra uterum partes ejusmodi amandari, ut Helmontius vult, non probabile, & rectè censet Laudatus Marci, eo quod nunquam extra uterum ejectæ conspiciantur, & hac ratione etiam foetum imaginatione ejici posse sequeretur, ab iis imprimis, verba ejus sunt, in quibus pudor læsus, & infamiae metus phantasmam in perniciem foetus firmavit, quod tamen minime procedit. Ut autem exempla partium ejusmodi intra uterum delectarum afferam, adduco eadem, quæ refert Marci, scilicet mulierum duarum, quarum una manum gladio, altera brachium ictu scloperii militibus quibusdam auferri videntis, hinc horrore perculsa, prior manu, posteri-

or brachio destitutum infantem mox peperit. Imo aliam enixam esse Foetum ἀκίφαλον, postquam decollari quendam viderat, mirando magis exemplo recenset.

§. 39. Consideratis hætenus imaginativis, ad peregrinas seminales nunc descendo ideas, quæ materialiter ipsammet corpus nostrum subingrediuntur, & tum ratione ideæ motus in pristino Corpore consuetæ, quæ spiritus pollet, tum ratione particularum seminalium & determinate figuratarum, juxta quarum ductum spiritus ille operatur, utpote quæ ambo ut plurimum intime conjunguntur, vim suam corpori nostro hostilem exerunt. Exerere autem hanc ipsam videntur, dum confermentatæ cum particulis sanguineis & spirituosis subjecti recipientis, & magis sic evolutæ, extensæ, ac multiplicatæ semper sanguinem cum spiritibus transluentem in loco, ubi istæ hærent, idea sua, vel etiam juxta Helmont. peregrina vitæ mediæ indole, quæ in sapore aut odore vitioso consistit, sigillant ac motu suo ipsis proprio spiritus nostros in consortium quasi trahunt: unde tot in corpore turbæ, tot gestuum & actionum transformationes & conformationes pro natura ideæ peregrinæ receptæ.

§. 40. Ex eadem causa factum, quod puella Uratislaviensis, de qua Beckerus in Microcosmo Medico refert, ex potu sanguinis felini pro epilepsia tollenda hausto, felinos mores & naturam contraxerit, ita ut sub paroxysmo feles voce, saltu, gestu imitaretur, mures in silentio venaretur, latibulisque horum avida adstaret. Pari ratione ac alias notum est, ex eadem causa infantes nutricum mores imitari, quod eo magis confirmatur per exemplum infantis à capra nutriti & exinde caprinos saltus atque mores æmulantis, cujus meminit Excell. Dn. Præses *Dissert. cit. de Mors. Viper.*

§. 41. Morbos sic pariter ac mores ab Animalibus rabidis læsi mutantur. A cane rabido demorsus homo latrat, ringit, omnia liquida, quod morbo canum rabioso proprium, horret, imò eadem nonnunquam cum canibus sagacitate odoris dotatur, ita ut amicos è longinquo accedentes, licet eos non videret, solo odore effluviarum, quæ conti-

nuò

nuò corpora emittunt, cum aëre ipsi adductorum, exacte quidam discerneret & adstantibus hunc vel illum amicum appropinquare prænunciaret, quemadmodum observavit Borrellus *Cent. 3. Obs. 68.*

§. 42. Vidisse se quidam testantur in saliva canum rabidorum, & urinâ ab his demorsorum, semina sive ideas parvos catulos, qui revera se moverent, repræsentantes, quæ sanè admodum confirmarent, per idearum hujuscemodi communicationem tales effectus concitari in demorsis: quoniam tamen hæc nonnullis, v. g. Aromatorio *Dissert. de Rab. Contag.* dubia adhuc & imaginationis saltem illusiones videntur, donec ulteriore experientiâ hæc innotescant, in medio ea relinquo. Id interim annoto, veritatem hujus rei non parum confirmare illam observationem, quam habet Salmuth *C. 2. Observ. 83.* de muliere, cujus simbriam togæ canis rabidus momorderat, nascentibus deinde in loco ambesionis vermiculis, similitudine capitis ad canes proxime accedentibus. Horum vero quidquid sit, id sanè certum est, effectus ejusmodi, Brutis vi idiosyncrasiæ seminalis ac specificæ, saltem proprios, in homine, postquam à brutotali læsus, ordinario sese exhibentes, non nisi ex simili causâ seminali, proprietate specificè juxta naturam bruti istius agendi, instructa & intra corpus humanum recepta, produci posse.

§. 43. Hoc tantum paucis declarandum, quomodo nonnunquam idea hujusmodi peregrinæ ac morbosæ, postquam intra corpus receptæ fuerunt, pariter ac venena & contagia nonnulla, tam diu in hoc latere queant, antequam vestigia sua ostendant. Fieri hoc videtur partim, quando communicatum *μίασμα* est minus agile vel viscidiori nimis inclusum tegmini, ut successivè demum hoc penetret & liberum magis evadat; partim quando subjectum recipiens ad suscipiendum illud est minus dispositum, & visciditatibus copiosis lentoque humorum motu præditum, ita ut ineptitudine hæc ex parte demum ablata, istud in actum & scenam saltem prodire possit: quod in primis ineunte de novo vere facile fieri potest, dum aër activis tunc particulis admodum refertus contenta cor-

poris magis actuari & resolvi facit, vel etiam novo quodam mialimate hostili inspirato vetus illud simul exitat, ita ut sæpius anno demum exacto, imprimis post morsum canis rabidi, hoc in actum deducatur.

§. 44. Pergo nunc ad considera-<sup>(4)</sup> tionem venenorum, de quibus notandum; Veneni nomine quæ veniunt, respectivè solum ad corpus, quod in minutissima ut plurimum sui quantitate insigniter lædunt, ita vocari; nullum verò in se & absolutè tale venenum existere. Sic namque homini quæ sunt venena, cicuta v. g. & Helleborus, Brutis, Cornici illa, hic capræ, existunt alimenta. Scorpii ictus, teste Vito Vidio *in Operib. Medic. de Curat. Morb. T. 4. L. 2. C. 8.* nocent saltem in siccoribus, quos ita vocat, locis, non æquè in humidioribus, utpote quæ venenum valde hebetant, quemadmodum Risis sæpius se observasse, idem testatur. Opium in nimia dosi sumptum saltem est venenum, non æquè, si circumspectè adhibeatur. Porro qui frequenti usu familiaria sibi reddunt venena quædam, ab iis postmodum non alterantur, ut in circumforaneis & iis videmus, qui generosiori cuidam & de subjectis venenatis petito medicamento frequentius utuntur, qui tamen ab eo prorsus non afficiuntur. Tandem animalia quoque, quæ venenata vocantur, minime in statu metus, sed non nisi ad iram concitata, sicque affectu inimico adversus objectum, quod mordent, incensa, lethaleriter illud afficiunt, observante Severino *de Vipera Pythia*. Hinc est, quod viperæ hominem intrepide eas persequentem, ex metu fugiant & minime lædant, uti observat Zwelfferus, & annotat *in Animadvers. ad Pharm. Aug. Append. de Salib. Theriac. p. 276.* Inde etiam Cicadæ à viperis in arca, pro confectioe Theriacæ, detentis, tanquam alimentum ipsarum consuetum, demorsæ non nihil, sanguine per artem facile represso, sine noxa lethali morsum hunc pertulerunt, referente hoc Excell. Barnero, qui huic experimento in Italia interfuit ipse. Sic homo denique ipse ira & furore actus, morsus venenatos & lethales infert, observante Hildano *C. 1. Obs. 84.* Et quæ aliæ sunt circumstantiæ, absolutam venenorum existentiam infringentes.

§. 45.

§. 45. Proin respective solum, & quidem ad corpus humanum in specie, utpote in cuius saltem utrum inquisitio nostra tendit, venena consideraturus, definitio illa, quod sint corpuscula subtilissima salina plus minus volatilia, in propria specie incontaminata, corporis tamen humani respectu ut plurimum acerrima, hinc ubi ab hoc suscepta, in minima etiam quantitate tantas alterationes & turbas in huius succis ac genere nervoso inducentia, ut gravissima hinc symptomata, vel necem ipsam inferant.

§. 46. Subtilissima ea esse corpuscula, oppidò patet. Non enim crassum istud, antimonii v. g. corpus, ut oculis subjicitur, veneni, quod in eo latet, formalitatem constituit, sed longe subtilius quid in eo reconditum. Testantur hoc infusa antimonialia, corpusculis nullo sensu palpabilibus imprægnata, iisque tam paucis ac subtilibus, ut licet centies unum idemque frustum vitri antimonialis novo semper vino infuderis, vix tantillum ponderis, nihilque respectu virium ac molis externæ, ei decessisse animadvertitur. Particulis tamen quibusdam vinum ab eo fuisse imprægnatum, vomitus à singulis infusionis partibus excitati docent. In tantilla particula resinosa amara consistit vis venenosa purgans Colocynthidis: extracta enim hac per lixivium Salis Tartari, pomum pristini fere ponderis remanet, sed omni vi spoliatum, quemadmodum experimentum hocce ab Excell. DN. PRÆSIDE didici. Ex ictu subtilissimi in Scorpione aculei & acutissimi in vipera dentis, vix vestigium læisionis, nedum particulas venenosas mediante ejus liquore aut saliva communicatas videre potes: subesse tamen tales, & non sola acutæ instrumenti lædentis damna inferri subauguravit jam Galenus 3. *de Loc. aff. c. 7.* ubi Scorpii aculeum non agnoscit sufficientem, sed substantiam insuper quandam vel spirituosam, vel humidam subesse suspicatur, quæ ut mole minima, ita facultate quàm maxima sit. Quin & persuadent hoc ponderosæ rationes, quas Excell. DN. PRÆSES *Differt. cit. de Viper. C. 1. §. 1.* habet. Scil. (1.) quod diversæ maculæ varii coloris mox insequantur, non nisi à principio materiali aliquo communicato ac sanguinem dictis in locis corrumpente, oriundæ:

(2) quod extrahentia, in principio statim adhibita, juvent; (3.) quod partibus carnosiss ex morfu tali læsis similia nihilominus symptomata sequantur, hincque appareat, non ob læsam saltem partem nerveam gravia hæc symptomata h. l. contingere. (4.) quod dentes non æque acuti animalium quoque aliis non venenatorum, in statu iracundiæ, lethalem æque tragœdiam excitent.

§. 47. Quoad alterum, Quæ quod sint particulæ venenosæ, imprimis quæ ex minerali & vegetabili Regno depromptæ, acrimonia earum demonstrat, utpote solis  $\Theta$ bus propria. De hac autem in ipsis præsentè varia testantur, ac primo ipsæ venenorum species, quæ acredine manifestæ in sensum incurrunt, ut Mercurius sublimat. purgantia fortiora, helleborus, euphorbium &c. quorum venenositatem in  $\Theta$ e volat. acri consistere, Pechlinus *Tr. de Purgantibus* egregiè ostendit, atque insuper ex eorum sapore caustico patet. Et quamvis arsenicum, aliaque nonnulla, ob intimiorem veneni ejus inclusionem ad gustum videatur dulce, ventriculo tamen immisum rosione acrimoniam, quæ latebat prius, satis manifestat. Secundò quod cuncta vegetabilium & mineralium venena per temperantia corrigantur & mitificentur. Sic Mercurius sublimatus, si addito novo Mercurio vivo, sublimetur, evadit dulcis & innoxie sub debita dosi & circumspèctione adhibetur. Mercurium vitæ per spiritum vini Sylvium ita mitificasse, ut *κατα* saltem operaretur, Venerandus Præceptor, Excell. DN. D. Bohn in Chymico suo Collegio, novissimè habito, retulit. Et universale quasi venenorum ore haustorum temperativum atque correctivum præstat lac, butyrum, oleum amygdal. dulc. omniaque pingua ac diluentia quoque, ut aqua simplex copiosè desuper hausta, dum diluendo hæc acrimoniam simul valde infringunt. Sic exemplum hic loci cognitum habeo cujusdam, qui ex errore aquam fortem bibens, hausta mox desuper copiosâ aqua, ab omni noxa immunis reddebatur. De muribus res nota est, si arsenicum comederint, modò aquam desuper bibant, eos evadere.

§. 48. Acrimonia autem hæc duplex est, acida aut alcalina. In vegetabili-



tabilibus venenosis consistit eadem in  $\Theta$  e volat. acri alcalino, quod aliquo modo patet ex eorum per acida castratione aut correctione, quæ tamen per alcalia fixa quoque procedit, quatenus hæc volatilitatem eorum tollunt, non tamen prorsus omni vi, quemadmodum acida ratione essentialis contrarietatis ut plurimum faciunt, ea spoliant. Mineralium venena in acrimonia acido-alcalina ac volatili consistere videntur; quod vel exemplo antimonii patet, cuius neque substantia acida sulphurea solitarie e. g. Sulphur viridescens ex antimonio per Aq. Reg. soluto separatum, ad  $\mathcal{D}$  j. innoxie juxta Tachenium *H. C. p. 245.* propinatum, neque ejus pars alcalina mercurialis sola, per acida, v. g. in bezoardicis fixata, sed amba saltem combinata, cathartica sunt. Particulam limitativam, ut plurimum acerrima, addidi, eo quod exceptio veniat facienda de animalium venenis, utpote quæ non tam in acrimonia, quam motu spirituum affectu iræ impetuosius intensio, ideisque seminalibus frequenter determinato, uti per exempla superius allata constare poterit, consistere videtur.

§. 49. Volatilitatem particularum venenosarum arguit earum partim effectus ut plurimum maximè subitaneus, partim correctio earum per fixiora subjecta. In propria specie, cum Aromatario de Rab. contag. P. 4. particula X. incontaminatas easdem dixi, h. e. respectu corporis, cui propriè insunt, naturaliter sese habentes & minime corruptas, ad differentiam contagii, de quo paulò post, quod simili ferè principio quidem gaudet, sed in se præternaturaliter jam constituto & quasi putrido.

§. 50. Cætera, quæ definitionem complent, per se certa & res experientia sunt. Species autem venenorum & varios ea suscipiendi ac nos afficiendi modos hic tractare, non est hujus instituti, sed ex Sennerti *Institut. Cap. de Morb.* totius substant. & ex Charletone, qui imprimis de hac materia solidè agit in *Exerc. Pathol.* 5. necnon ex Viti Vidii allegato superius loco, videri & dictis facile applicari possunt.

§. 51. Subnecto hic saltem, multa corpuscula in se innoxia nec pro venenis ab ullo habita, nihilominus in

certis subjectis facilè mobilibus, subtilioribus, aut idiosyncrasia singulari præditis, æque cum venenis gravia producere symptomata. Sic notum est de odoribus nonnullis, e. g. moschi in chirotheca eo infecta, quod vel tantilla eorum particula suscepta fœminas haud paucas, nec non viros quosdam literatos, in subitaneas conjiciat Lipothymias, suffocationes & affectus convulsivos, hystericos &c. De qua tamen odorum efficacia infra pluribus.

§. 52. Progredior nunc potius ad (3.) Contagia & (4.) Fermenta morbosa. principia morborum minuta, venenis valde similia, Contagia sc. quæ in hoc potissimum à venenis differre dixi, quod in corporis, quod naturâ inhabitant, specie à statu naturali jam degeneraverint: De cætero in plurimis, etiam quod sub specie fermenti nonnulla venenorum agant, cum his conveniunt. Et cum Fermenta morbosa intra corpus nostrum genita cum contagiis valde concordent, ipsaque hæc nil nisi fermenta morbosa extra corpus, in quo primum nata, deducta ac in aliud quoddam corpus analogum tacite derivata, morbum plane consimilem in ipso paulatim & fermentando quasi progignentia sint, ideo juncta ambo operâ optimè considerabimus.

§. 53. Fermentorum nomen & doctrinam ex Helmontio potissimum habemus, satis tamen obscure ab eo relictam, quam illustrarunt deinde nonnihil Willisius & Kergerus Tr. de Fermentatione. Re tamen longius penes me revolutâ, nihil aliud tandem ea esse deprehendo, quam particulas aëreo-volatiles spirituosas, materiae cuidam lentæ seminali seu specificæ, salino-oleosæ, tenui tamen, intimius inmixtas, quam ipsam dum in minima resolvunt, ac in similem sibi substantiam convertunt, (quod suis finibus clientem qualitatem coaptare vocat Helmontius *Tr. sextupl. Digest. &c.* §. 14.) in atmosphæram quandam odoratam quasi cum illis diffunduntur, perque hanc in objecta vicina adæquata agentes, parva sui quantitate magnam horum massam in eandem cum ipsis naturam transmutant, parilemque vim immutandi eidem communicant. Crassa horum exempla habemus in flore cerevisiæ vel panis fermento rebus fermentandis addito, quorum exigua portio-

portiuncula in massam ingentem vim dictam exercere solet. Nec tamen crassum illud corpus, quod pro panis v. g. fermento habemus, sed longe quid subtilius in eo latens fermentum proprie constituit.

§. 54. Corporeitatem, liceat mihi technice loqui, fermentis plurimi Authorum, ac ipse imprimis Helmontius Tr. *Causæ & Initia Naturalium* §. 24. & alibi passim, denegant, ac medium quid inter substantiam (per quam corpus innuere videntur) & accidens ea esse fingunt. Quod tamen quàm difficile & vix possibile conceptu in naturalibus sit, videant ipsi ejus Patroni ac Assertores. Rationes negandi eorum pragnantissimæ sequentes sunt: Primò, quod fermenta ejusmodi non possint converti in substantiam palpabilem; sed quoniam cum spiritibus hac in parte coincidunt eadem, facile etiam, salvâ ipsorum corporeitate, pariter ac hi sensuum externorum perceptionem, ex superius probatis, eludere poterunt.

§. 55. Altera, quam objiciunt, difficultas est, quod extensio actionis eorum in alia corpora penè multa, longe superet tantilli, si fermentum materiale statuendum sit, corpusculi quantitatem & potentiam expansivam. Id quod tamen minimè concedendum ius, propter exempla, quæ miram ejusmodi minuti corporis extensionem, antea vix conceptibilem, sensuum judicio submittunt, qualia benè multa adducit Illust. à Boyle in Tr. de Effluviis & Atmosphæris Corporum &c. ac quidem, quod primum est, stupendam auri extensionem, utpote cujus unciam unam ad 7776000. pedes, h. e. ad 155. milliaria & plus quam dimidium, sub deauratione filii argentei, extendi, idem Author certis experimentis deprehendit. Et qui fidem his derogat, adeat Bracteatores & ductores auri, ac mira captumque suum separantia videbit percipietque.

§. 56. Altero loco pono ejusdem Boylei experimentum, quo accipit granum semis pulveris pyrii, hoc imbrici imposuit, & vase vitreo satis capaci cooperuit, quod pro tegendo superiore orificio lamina cupreâ erat instructum. Accenso intra hoc pulvere illo pyrio, fumus ejus totam vitri cavitatem (quæ ultra 29. lb. aquæ

Tom. II. Pars 2.

aliàs capiebat) replevit & operculo ablato postmodum per horæ circiter semiquadrantem continuò per orificium apertum erupit, spatio adeoque ad quod fumus se porrigebat, computo exactè instituto, quinquagies millies excedente illud, quod granum semis pulveris illius nondum accensi capiebat.

§. 57. Sit tertio nobis loco odorum miranda diffusio. Ex unico gummi cujusdam odoriferi, e. g. Styracis, grano prunis injecto totum conclave fumo & odore adimpletur. Annus, & quod excurrit, est, ex quo Excell. Dn. Barnerus in Chymico suo Collegio præsentè inter multos alios & me ipso, sequens tentamen instituit. Accipiebat circiter duas guttas olei destillati anisi, subactis iisdem in mortario cum paucillo vitelli ovorum, aquæ simplici commiscuit, successivè semper plus hujus superaffundendo, sicque, quantum memini, ultra sex vel septem mensuras, quarum una 3. lb. circiter continet, extendit, sic ut aqua omnis odorem ac saporem anisi referret: imò asseveravit, se hoc modo unicam guttulam olei destillati aurantiorum ad 10. Cantharose ejusdem capacitatis extendisse. Biennium fere est, ex quo asseravi in vitro quodam aquam cinamomi spirituosam, consumpta hac, elui sæpius vitrum hocce cum aqua simplici, interjecto nonnunquam aliquot septimanarum spatio, & aqua omnis saporem odoremque cinamomi aliquantulum adhuc exhibuit, vitronihominus adhuc dum odorem cinamomi leviter spirante; ut adeo verum sit illud:

*Quo semel est imbuta recens, servabit odorem*

*Testa diu.*

In Chirothecis odoratis quantillum, quæso, est, quod unum eorum par possidet odoriferi, dum paucis floribus Jasmini, ut ex relatione laudati sæpius Dn. Barneri habeo, stratificatis vel centum eorum paria Venetiis inficiunt: Observavit tamen incomparabilis Boyle *cit. Tr.* in quibusdam Chirothecis ultra 30. annos odorem adhuc perdurasse & hodieque perdurare, cum tamen impossibile sit, quin semper aliquid de iis exhalet. Imo, quod majori admiratione dignum, quo magis extenduntur & subtilisuntur particule odoratæ, eò magis ener-

[111 ii 2]

giam

giam suam commonstrant. Sic ambra non, nisi resoluta saltem, v. g. cum oleo quodam destillato, odorem spargit, & ejus 3i. fermentata cum Musto, ultra 50. hujus mensuras odore suo imbuunt: quod experimentum in Laudato Collegio Physico Lipsiæ hic institutum fuisse, refert Excell. Barnerus; simile exemplum aquæ rosar. destillatæ adducens, quam in Italia, ubi copiose paratur, sub ipso destillationis, adeoque resolutionis actu majorem longè, quàm aliàs, odorem, & talem quidem, qui integras plateas impleat, spargere testatur.

§. 58. Ecquid verò odores aliud, quam corporis, ex quo prodeunt, particulæ minutissimæ, salino-sulphureæ, resolutæ & ad subiectum usque, quod afficiunt, materialiter dispersæ propagatæque? Incorporeæ enim si essent, sensu minimè possent percipi, siquidem proportio inter organum & objectum requiritur, & quæ immaterialia sunt, sub sensum nunquam cadunt. Ut taceam eorum corporeitatem exinde satis constare, quod corporibus peregrinis occurrentibus haud paucis adhærere, diutiusque in his persistant. Ex quo proinde patet, nec fermentis, utpote quæ cum odoribus hac in parte coincidunt, & sub odorum specie agunt, similem extensionem ac corporeitatem esse denegandam.

§. 59. Dari in corpore nostro hujusmodi fermenta, eaque distinctæ naturæ, ut plurimum tamen acidæ vel urinosæ, aut ex utrisque mixtæ, varia ingestorum alimentorum pro partium, ad quas deveniunt, diversitate, resolutio, immutatio ac assimilatio, nec non distincta partium nonnullarum, ventriculi, renum &c. fracedo, ostendit. In ventriculo immutantur alimenta fermentatione in chylum acidum pro odoris, qui in dicto loco deprehenditur; naturæ. In intestino duodeno salius idem fit à bilis fermento admixto, & particulas recrementosas paulatim ex se dimittere incipit. Sanguini ubi infunditur idem, sub successiva circulatione ac fermentatione tandem resolvitur plurimam partem in nectar rubicundum à particulis spirituosissimis fermentativis sanguini inexistentibus. Partibus deinde singulis assimilatur & in earum substantiam convertitur, proculdubio quoque ratione cujusdam fermenti in iis

localis ac seminalis, siquidem à sola appositione particularum, quod Cartesius vult, coagulatio, firmatio & consolidatio ejus in partis specificam substantiam, procedere non potest. Serum ab eodem secernitur, & quidem in renibus, fracedinoso ac urinoso odore hisce connato, imprægnatur, sub coque foras excernitur, quod idem ferè fit sub ejus per cutis glandulas miliares, quæ ut plurimum aliquem odorem, fermenti indicem, solent spirare transcolatione; ut taceam de saliva, quam fermentum aliquod in se fovere patet, eò quod rebus facillè fermentabilibus addita fermentescere hæc faciat, unde non sine causâ mulierculæ, dum saccharatas confectiones parant, vel in aliquo loco asservant, pusillos salivantes ab his arcent.

§. 60. Fermentorum in corpore sapor aut odor, si à quacunque causâ rerum non-naturalium p. n. alteretur, aut manifestus nimis fiat, evadunt ista morborum satis subinde magnorum parva initia, Helmontio (*Tr. Magnum Oportet*. §. 25.) Vitæ mediæ proprietates peregrinæ appellatæ. Hæque sunt potentia Hippocraticæ salinæ, de quibus hicce *Lib. de prisca Medicina* dicit, quamdiu temperatæ eadem sint in corpore nostro, eas hominem non lædere, mox vero ac conspicuæ seu manifestiores evadunt, ita ut acidum fiet acidissimum, amarum amarissimum, dulce dulcissimum, continuò morbos nobis afferre. Ut proinde non immeritò Celeberr. Francisc. de le Boe Sylvius Praxin suam fere ubique fundamentis hisce morborum  $\Theta$ nis superstruat, iisque p. n. vitiatis, contrarii saporis  $\Theta$ ni remedia summo cum Imitantium successu opponat.

§. 61. In specie verò, si alcalinum & volatile in excessu atque acredine peccat, nascuntur exinde ut plurimum morbi breves, imprimis acuti, ardentes maligni; sin verò acidum & fixum, emergunt morbi magis Chronici. Neque enim existimandum, Chronicorum statim esse grande molis initium, quale in progressu apparet productum, quod sanè à causâ primitivâ probè distinguendum. Quinimò primum eorum initium pariter admodum parvum est & in tantilla sæpius causâ occasionali, fermentum ventriculi fixius ac acidius nonni-



nonnihil reddente, consistit, adeò ut insensibiliter proinde tales morbi, eorumque quasi Primates, Malum Hypochondriacum & scorbutus, oriuntur, nec prius ferè conspectui se sistant, nisi postquam profundius jam radicati, adeoque tam tardè difficilesque tunc extirpatu sunt, cum tamen, si sub exordium sui statim innotescerent, tantillo medicamine auferri possent. Rectissime hinc sano sensu dixit Schoenbornerus in *Manual. Pract. pag. 141.* quemadmodum lapis à gutta pluviae excavatur; (s. primum quasi excavationis initium accipit) ita à gutta quasi rerum non-naturalium successivè fieri impressionem, quæ cum morbus manifestus tandem fit, ultimo delicto præpostere imputatur. Illustrat hoc observatio, quam habet Diemerbroccius in *sua Anatom. p. 510.* collecti successivè in Lapidæ famulo pulveris subtilissimi lapidum in vesiculis pulmonum sicque asthma, quo ille tandem obiit, postquam coarctatus admodum esset hicce pulvis, procreantis.

§. 62. Cum Contagius eodem modo se res habet; eadem eorum differentia, ut alia sint alcalina, alia acida &c. idem etiam lædendi modus, ita ut producant ista morbos breves, acutos, febres sc. malignas, pestilentiales &c. hæc verò Chronicos, ut scabiem, luem veneream, aliosque, de quibus videatur. Excell. D. Maur. Hofmannus Tr. de Morbis contag.

§. 63. Quoad originem annoto cum Charletone in *Pathol. Exerc. p. 192.* & Boyleo *l.c.* ex quibuscunque corporibus ferè effluere indefinenter corpuscula quædam sub vaporum forma, quæ in Aëre circumcirca velut nebulam ad extremum diffusionis suæ terminum constituunt, Athmosphæra nomine venientem. Effluvia hæc naturam corporis, ex quo promanant, exactè referunt, easdem ferè cum iis, quæ in corpore adhuc latent, habent vires, ita ut pro majore earum efficaciâ & hæc validiorem ostendant potentiam: quæ ratio videtur, cur effluvia, quæ ab electricis corporibus ejaculantur, paleas saltem aliaque levia versùs se moveant alliciantque, quæ verò à Magnete, ferrum attrahant; Item, quæ à sulphureis aut volatilibus aromaticis oleosis corporibus, Succino, Camphorâ, Moscho &c. diffunduntur, to-

tam viciniam odoribus repleant, quæ ab aliis verò fixioribus & agilibus minus, vel nullum vel non diffusum adeo aut penetrantem odorem spargant.

§. 64. Continuum hunc particularem ex corpore effluxum laudatus modò Boyleus variis experimentis confirmavit, dum exactâ bilance eadem trutinando continuò tantillum aliquod decrementum fieri observavit. Quod idem in Homine ac seipso tentavit cum eodem successu Sanctorius pro Transpiratione hominis insensibili investiganda, qui sellæ, quæ stateræ erat appensâ, insidens, ex corpore leviori successivè reddito deprehendit, unica die per insensilem transpirationem tantum evacuari, quantum per alvum 15. dierum cursu, quemadmodum de hoc videatur ejus Medicina statica §. 1. *aph. 60.* Imò Transpirationem hanc insensibilem ulterius confirmant canes venatici, qui non solum ferarum, sed & Heri proprii, quamvis longius, & quod Boyle *l.c. p. 132.* refert, septem milliaria jam progressi, vestigia solo odoratu exactè insequuntur.

§. 65. Quod si E. contingat, ut in certo Aeris Tractu, vel ex Mineralibus, post diurnam incarcerationem, terræ motum, Solis calorem nimis exaltantem, aut novas quasdam mutationes subterraneas, (à quib. novos epidemicos morbos derivat Boyle in Coimicis suspicionibus *p. 25.*) effluvia venenata & diversimodè corrupta ac combinata exhalent; vel ex cadaveribus inséputis, locis squalidis, palustribus aut Cœno stagnante foetidoque oblitis, miasmata, putrida quasi, exurgant; Aëremque hoc modo inquinent, inspirata cum eo simul intra Corpus Animale p. n. hoc, e.g. Peste, afficiunt, ejusque humores corrumpunt. Cumque ab animalibus, ac ipso homine, sic inquinatis similia semper effluvia morbota, per os etiam, exhalent, facile postmodum ab aliis quoque vicinis simili modo suscipiuntur aut corpori horum affricantur; quod ipsum si in Crasi seminali cum priori Animali, ex quo contagium hoc morbosum manavit, contigret, (unde inter consanguineos & certa genera animalium nonnunquam effectum solummodò sortitur) simili inde morbo afficitur, sicque contagia hæc sen-

sim multiplicantur & in plura se diffundunt iuncta.

§. 66. At sane tantillum sæpe est, quod pro hujus propagatione sufficit. Etenim quàm exiguum haud rarò, nares odore peregrino molestans, totum corpus illicò inquinat? Quantillum ex manu scabiosa susceptum, similem in universo corpore luem producit? Sic tantillum sæpius est, quod corporibus inanimatis, raris imprimis ac porosis, linteis &c. adhærens & per aliquot annos quiete in iis persistens, dum quacunque occasione ea de loco in locum moventur, iterum resuscitatum exspirat, & nova peste, vel morbo contagioso alios homines inficit. Exemplum talia perquam multa in Autoribus leguntur. Boyleo *c. l.* Charletone, Diemerbroeck *de Peste, L. I. C. 10. 1 p. 68. f. alisque.*

(5) Læsi-  
nes exi-  
guæ par-  
tium  
continen-  
tium,  
nervosa-  
rum im-  
primis.

§. 67. Quæ hætenus adductæ morborum causæ occasionales proximæ, spiritus ac humores immediatè fere affecerunt. Paucis adhuc partium continentium ac nervearum imprimis, tantillæ læsiones contemplandæ, ex quibus unà cum partibus contentis totum corporis systema sæpius in consortium trahitur. Summus rerum Conditor sapientissimo consilio corpus nostrum ita construxit, ut se habeat instar Machinæ hydraulico-Pneumaticæ, hujus rotulæ s. fibrillæ cuidam nervæ, ad motum nec essariæ, sit tantillum impedimentum vel læsio inferatur, plures partes, nisi & tota Machina compatitur. Patet hoc per exempla.

§. 68. Ut à levioris momenti causis incipiam, perpendamus tantillum pulvisculum oculis illapsum, vel Ciliū pilum intrò! versus oculi bulbum deflexum aut crescentem, quantas mox crecet molestias, lymphæ effluxum, sanguinis stagnationem, hinc oculi inflammationem, non omni semper periculo carentem, ni causâ comprimens mature auferatur. Vertebrae dorsi levis subluxatio aut contorsio, Germ. *das Wehethun* vocata, dum nervi & vasa sanguifera leviter sic saltem comprimuntur, quanta, quæsi, interdum excitat symptomata per consensum nervorum & spirituum, lipothymias, sudores synopticos, difficilem respirationem, nauseam, vomitus, virium prostratio-

nes, ita ut mors interdum instare videatur, meritoque proinde restitutio (*das Einrücken*) quantocytus instituenda sit.

§. 69. Hæcque saltem ex compressione tantilli nervorum spatii oriuntur: graviora longe symptoma superveniunt, si ipse nervus vel tendo quidem, circa articulum imprimis, aut etiam membrana quædam sensilis pungatur, aut vulneretur, unde universi sæpe corporis oriuntur convulsiones, interdum Gangræna & ipsa nonnunquam mors, quemadmodum Pauli in Parecbasi de Febr. Malign. aliique observant. Similiter Bonetus *de abdit. Morb. Caus. ex cadav. dissect. revelat. L. I. P. I. c. 12.* exemplum refert pertinacis & duodecennalis Cephalalgiae ex parvis diploidis internæ particulis diffraetis & Meninges tantillum pungentibus.

§. 70. Nec à fortuitis hujuscemodi saltem causis partes nervosæ tanto pere læduntur; idem enim & potentius longe præstant nonnunquam causæ internæ. Sic peregrina quædam aciditas intestina aut plexum mesentericum rodens in colica convulsiva, partes dictas haud rarò mirum quantum contorqueri, & universum corpus ex consensu convelli facit, quod præcipue in Infantibus tenellis quotidie ad oculum fere patet, in quibus fons Epilepsiæ ut plurimum circa intestina hæret. Et quæ similes aliæ sunt causæ tantillum systema nervosum irritantes gravesque sic morbos producentes, quas singulas ex professo hic adducere, diffusum nimis foret. Videri prolixius tamen de talibus potest Willisius de morbis convulsivis.

§. 71. Morborum magnorum (6.) *Re-* quemadmodum exigua ut plurimum *media* sunt initia, ita & parvæ sæpius *parva.* quantitatatis, magnæ tamen efficaciæ, eorum existunt medicamina. Ac parum abest, quin omnium serè morborum minima dicam esse remedia, haud dissimili ratione ac primordia in omnibus serè morbois affectibus parva asserui. Licet enim, antequam corpori ingeratur medicamentum, non omne sit minutæ adeò doseos, ad partem tamen affectam non nisi sub formâ minimi ut plurimum pertingit eique medetur. Ut enim ex corde in universum corpus ejusque partes unà cum sanguine, tanquam vehi.

vehiculo, distribuatur, in minima sanè distrahi vel discrepi illud necesse est. Propelli verò hoc ad singulas Machinæ nostræ partes, circulatio sanguinis docet, utpote cujus lege huic vel illi saltem parti adduci nequit, siquidem cor pellens ad quascunque partes indeterminatè se habet, & præterea manifestè videmus sanguinem, qui unâ pulsatione ex corde effunditur, & medicamentum necessario intime confusum sibi continet, tam in ramos Arteriæ magnæ, qui ad superiorem, quam qui ad inferiorem corporis truncum ejusque singulas portiones tendunt, distribui ac urgeri. Cujus proinde intuitu nec adeò scrupulosos semper esse necesse est in Parte affecta latentiore dignoscenda, cum Medicamentum, contra proximam Morbi causam probe directum, mediante Circulo sanguinis ad quascunque Corporis Partes deferatur, eamque sic, ubicunque hæserit, corrigere vel educere possit, juxta Cardiluc. *Præf. in Pr. Chym.* Hartm. Drawitz. *de scorb. p. 199.* & Paracellum *T. 5. p. m. 81.* Si proinde medicamenta, quorum vis ac dosis non adeò concentrata, non nisi sub forma minuta parti affectæ medentur, quanta erit subtilitas particularum, in quas medicamenta, etiam extra corpus minima, diffundi similiter opus est, quemadmodum revera fieri ipsa experientia demonstrat.

§. 72. Dari vero medicamenta, sub minutamole insignem efficaciam soventia ex seqq. patebit. Crasis medicamentosa in exiguo ut plurimum consistit principio, quod si a quisquiliis reliquis, quæ illud in operando valde impediunt ac stomachum saltem onerant, separatur, sub dosi granulari tantum, imo plus præstat, quam integra libra totius simplicis, quemadmodum Le Febure *Chym. P. 2. L. 1. Proæm. in fine.* docet. Apparet hoc in Resinis purgantium extractis, Scammonii, Jalapæ, &c. in quibus omnis vis catartica concentrata est, ita ut ad grana paucissima propinata sufficientissime purgent. Spiritus vitæ aureus Rulandi, qui nil aliud, quàm Extractum Colocynthidis, ad guttas 20. propinatus, dat purgans æque validum ac potiones vel decocta purgantia ad integras libras propinata; quod remanet ab extra-

ctione, omni & amarore & vi spoliatum est, antiqui tamen ponderis fere. Minimum & insensibile prorsus est, quod ex Antimonio extractum vomitus movet, hoc in sapam vomitoriam, Sylvio adeo commendatam, si redigatur, ad gr. i. ij. assumptum sufficientissime operatur. Pro scopo diaphoretico oleum destillatum Guajaci guttis 8. 10. integris aliorum haustibus vix cedit efficacia, nec aliquot grana *Θis* volat. viperarum, C. C. integris pulverum aliorum acervis. Quod idem affirmandum de *Sp. Θis ammoniaci*, qui simul acidumviscidumque egregie tollit. Contrario saporis alcalino nidoroso vel dulci aliquot guttæ *sp. cujusdam aciduli*, e. g. sulphuris per camp. medentur. Porro olea destillata essentialia, absinthii, cochleariæ sub concentrata unius guttæ dosi essentia ipsorum integram unciam effectum superant. Ac olei destillati Cinamomi unica guttula quantum in momento reficiat, narabunt illi, qui Lipothymia prostrati, tantilla ejus in apicem linguæ illinitione iterum exsuscitati & ex orco revocati sunt. Opii granum quantillum est, quod tam divinam sæpe præstat opem, si circumspicte adhibeatur. Et hoc ipsum ut specialius hæc applicem, merito generale quasi morborum remedium esse dixeris, cum spirituum exorbitantias, in omnibus fere morbis accusandas, tam mire compescendo, naturæ ita succurrit, ut interim causâ morbosâ occasionalis eo melius exturbari possit: in quo ipso cuncta tantopere expetita, remedia generosiora universalialia, sulphura metallica fixa, cum eo fere conspirant, nisi quod ratione causæ morbi simul vini debeant possidere, quodeunque acre temperandi accorrigendi.

§. 73. Hoc sane affirmare omnino licebit, Initia Magnorum Morborum dum adhuc parva, utpote cum quibus saltem negotium hic nobis est, pharmacis etiam exiguæ molis facile extirpari posse. Specialius ac prolixius tamen omnium, de quibus egi, parvorum Morbi initiorum curam ut annectam vix expectabis, Lector Benevole, cum quasi generaliter de ipsis iisdem Morbis in antecedentibus saltem dixerim, prætereaque limites hujus Exercitii nimis excreverent. At brevif.



brevissimis nihilominus annoto sequentia.

§. 74. Ideæ imaginativæ, si curabiles adhuc, vix aliter, quàm contrariæ imaginationis firma persuasione mutantur in melius; seminalium cura vix omnium promittenda est, quæ tamen morsu rabidorum communicatæ, quo & Venena ab Animalibus illata pertinent, primo sui initio tolli iterum possunt, si (1.) illæ ex loco læso mox evocentur, antequam altius in corpus progrediantur, quod sit partim ligaturis, partim scarificatione ejusdem, ac extrahentium applicatione: (2.) Per sudorifera alexipharmaca, sicubi quid massam sanguinis jam subintravit, statim eliminetur. Venena per os hausta omnium optime per vomitorium statim educuntur, ac per alexipharmaca temperantiaque, de quibus suprâ, corriguntur, acidæ quæ sunt naturæ, iis alcalia, alcalinæ indolis acidæ, & volatilioris consistentiæ figentia opponendo. Contagiis idem ferè medendi modus competit; nisi quod in morbis epidemicis, Peste &c. accedere insuper debeat Aëris per particulas odoratas antidotales, at quantæ subtilitatis corpuscula! correctio, quo in puncto fumus sulphuris imprimis excellit. Fermentorum naturam cum contagiis coincidere ferè dixi, proinde nec cura horum adeò discrepabit, imprimis attendendum erit, ut sapor odorque morbosus in his per contrariæ ac specificæ, si fieri potest, naturæ medicamina tollatur. Quoad læsiones externas partium nervosarum, curantur hæ, si spinam, h. e. causam lædentem, genitumque inde a corem hostilem abstuleris, spirituum exorbitantias per opiata & nervina aromatica nonnihil compescueris, & læsionem factam debite iterum consolidaveris.

§. 75. Minimum proinde cum peccet in recensitis morborum generibus initium, indicatio in tantillâ saltem hujus ablatione consistit: quæ cum per remedia minimæ & minus adversæ molis obtineri possit, quid opus erit, ut tam frequenter & citra necessitatem ut plurimum, in jucunditatis, quæ in medendo semper spectari debet, legem peccemus, ac bicubitalibus compositionibus, decoctis ac haustibus horrendæ quantitatibus, aliisque medicamentis ad nauseam diffusis, agros oneremus ac moremur? Ægri verò ex hisce discant mature, quando tantillum erratum commiserunt vel persentiscunt, remedia vel Medicum in usum vocare, si sumptuum & curæ longinquitatem evitare volunt. Adeò namque vetus illud verum est,


*Principiis obsta, sero medicina paratur,*

*Cum Mala per longas invadere moras.*

§. 76. Minima, fateor, de minimis, quæ proposueram, attuli. Sufficienter siquidem ac specialius de singulis acturo, non aliter ac maximi ex iis effectus, ita & maxima Speciminis hujus, limites tantilli Exercitii longè excedens, & in integrum Tractatum diffusa, excresceret moles. Condonabis igitur, Lector Benevole, sin minus ab omni parte curiositati Tuæ, vel etiam stylo limatiori, satisfeci, & Temporis angustia, quo hæc scribere cogor, ejusque Legi, quæ aliò me vocat, & brevius, quam proposueram, abrumpere jubet, ex parte hoc adscribes. De cætero admiraberis mecum Divinum Numen in minimis tam Naturæ, quam Morbi ejusdemque Medelæ, maximum ac admirandum,

cui sit soli

G L O R I A !



DISSER-

DISPUTATIO XIIX.  
INAUGURALIS.

DE TEMULENTIA.

QUAM  
PRÆSIDE

MICHAELE ET TMULLERO,  
Philosoph. & Medic. Doctore & Facultatis Assessore.

PRO

LICENTIA

*Impetrandi Honores in Medicina Doctorales publico  
Eruditorum examini subjecit*

AUTOR

M. JOH. FRIED. ITTIG, Lips. Med. Bacc.

d. 3. Octobr. Anno 1678.

A & Ω.

**P**Lato in *Timæo* ad decimum octavum vino abstinuisse penitus juvenes, ad quadragessimum dilutum bibisse, ab hoc vero largius & meracius, non tamen ad ebrietatem, hausisse refert. Carthaginensium quoque legibus sancitum erat, ne Princeps eo anno, quo imperaret, vinum liberet. Persæ utebantur tantum vino pro incitamento ingenii & virtutis, & eo tantum die, quo Soli sacra faciebant, ad ebrietatem bibere Rex concedebat, *Athen. l. X.* Penes Romanos sub mortis pœna interdictam fuisse Temulentiam *M. Menacii Uxor proprio corpore experta est, a Viro virgis ad mortem caesa, quod è dolio vinum bibisset, Valerianus Maximus.* Sed ceciderunt Majorum instituta, quæ sobrietati patrocinabantur, & primum in scelera humanum genus proprio æstu non pauca invenit venena, quibus vino minime contentum spontaneam inferre posset insaniam. Verum enimvero, ebrietatem pœna Comes premit, & phalanx morborum ipsam insequitur; Caput fœdis exhalationibus dirumpitur, cerebrum vertigine tentatur, oculi torquentur, aures undoso spiritu crepant, lingua vacillat, sermo inutilis, oris halitus rater, stomachus subvertitur, cordis palpitatio, manuum inepta & insana gesticulatio, pedum incertus lubricusque gressus, inquietas nocturna, turpes ronchi, suriales somni, alvi & vesicæ spurcissima solutio, ut in hac eluvie (quemadmodum in cœno lutulentæ suæ) per sæpe volutantur. *Vid. Jason. Pratenf. Tr. de curandis Cerebri morbis cap. 20.* Miror interim paucos inveniri prædicos, qui prolixè satis alios morbos enarrantes aliquid de ebrietate immiscuerint, fortè quod Medici raro ad eandem curandam vocentur, uti putat *Forestius l. 9. Obs. 28. schol.* frequentius vero ad morbos, qui hanc sequuntur. Cum itaque ebrietas in specie ex vino frequens causa morborum existat, ita ut *Rondeletius M. M. cap. 13. scribat, in Britannia Medicos divitias sibi colligere ex solis affectibus à Temulentia ortis, à paucissimis verò Medicorum attendatur, placuit indulgente Gratiō. Facultate Medica de hac ipsa materia disputando in ejus tam causam, quam medelam inquirere, annuat DEUS!*

## §. 1.



Emulencia, cum à prisca voce Temerum, quod vinum est, derivetur, vi nominis eam tantum Ebrietatem designat, quæ à copiosa vini ingestione ortum traxit. Inde à tractatione nostra omnes Ebrietatis species ratione Etymologiæ excluduntur, quæ ex aliis, quam vino, spontaneam hanc insaniam inducendi vi præditis, contrahuntur.

§. 2. Excluditur ita ebrietas 1.) ex aqua, qualem ex potu amnis Lyncestii contrahebant, *Hunc quicumque parum moderato gutture traxit,*

*Haud aliter titubat quam si mera vina bibisset.*

Ovid. *l. 15. Metamorph.* Lyncestii aqua acidula vini modo Temulentos facit Plin. *hystor. natural. lib. 2. cap. 103.* Seneca *quæst. natural. l. 3. cap. 20.* Sic pisces ex Ponto Euxino, si in aquam dulcem projiciantur, inebriari tradit Baco de Verulam. *Hyst. naturæ & artis.*

§. 3. Excluditur 2.) Ebrietas ex Cerevisia, quod *εἰνὸς ἐκκεῖβης* vinum ex hordeo vocat Theophrastus *de Plantis l. 6. c. 15.* *εἰνὸς ἐκκεῖβης* vid. Dioscorid. quo refero omnia ferre potuum genera ex fructibus per fermentat. parata. Virg. Georg.

- - - - - *Pocula Leti*  
*Fermento atque acidis imitantur vitia*  
*forbis.*

Hinc Plin. *hyst. natural. l. 14. c. 22.* Est occidentis populis sua Ebrietas fruge madidâ. Mira vitiorum solertia inventum est, quemadmodum aqua inebriaret, conf. Placot. Schoock, Meibomium &c. *de Cerevisia.*

§. 4. Ebrietas 3. ex Lacte Tartaris & Scythis non infrequens. Paratur autem, ut inebriandi vim acquirat, duplici modo, vel *a)* per fermentationem, quod Chymum & Pozam nominant, (hunc potum Prosp. Alpinus *de Medicin. Ægypt.* ex farina loliacea, feminibus cannabis & aqua componi asserit) quem modum ex Joh. Lucæ relatione de Tartaria gallice conscripta citat Dn. D. Ettmüllerus *Disp. de Med. Hipp. Chym. c. 3. §. 7.* vel *β)* per destillationem. *Et probabile hoc videtur* (inquit Sennertus *Pr. l. 4. part. 2. de Inf. morb. cap. 7. de Siriasi*) *cum lact butyrum multum, quod pingue & oleosum est, in se contineat. Dixi verò alibi* (sunt verba Sennerti) *pinguia & oleosa omnia, spiritus chymicis dictos, suppeditare & olea à spiritibus vix aliter, quam substantiæ modo, differre.*

§. 5. Ebrietas 4.) ex Opio Turcis ita familiaris, ut in proverbio dicant: Opium comedisti: Bellon. *Obs. l. 3. cap. 15.* quod an

idem sit cum Maslach Turcarum, uti Sennertus *Pr. T. I. Part. 1. cap. 6.* contra Turnhauserum disputat, an verò compositum sit, uni credit P. Andr. Matthiolus *l. 3. Epist. pag. 180.* in medio relinquo.

§. 6. 5.) Ex rebus narcoticis. Horum enim vis antequam eo progressa est, ut stuporem excitet, prius Temulentiam & delirii quoddam genus producit v. g. *fol. cannab.* ex quibus bolos parant Ægyptii, quibus utuntur sub nomine Assis, Lolii semen, hujusfarinam cum *fol. cannab.* miscent & plus quam assis præstare dicunt, Prosp. Alp. *de Med. Ægypt. l. 4. c. 2.* Huc pertinent nuces insanæ, de quibus Clusius *Exot. l. 2. c. 26.* Nux myristica vid. Lobelius *Obs. stirp.* Cortices Mandragoræ vid. Schroed. *Pharmacop.* Rad. Tuberis Theophrast. *l. 9. hyst. Plantar.* Nicotianæ fumus &c. & plures aliæ herbæ, semina, radices, quorum catalogum hic scribere esset extra limites vagari.

§. 7. Intelligimus ergo per Temulentiam Ebrietatem ex solo mero contractam alio nomine *νεγυττά* Græcis dictam, Latinis Crapulam. Vox hæc licet variè à variis accipiat, uti Foësius docet *Not. ad Hipp. l. 2. de morb. vulg. a)* pro quavis ingurgitatione hesternâ *β)* pro aepsia ex vino; magis tamen audiendus Galenus, qui ad *Aph. 5. sect. 5.* Capitis offensionem ex vinolentia *νεγυττά* vocat, conf. Goræus *Def. Med.*

§. 8. Temulentia itaque hoc sensu exit Productum morbosum lædens spirituum animalium actiones à  $\frac{1}{4}$  vini copiosius hausti ortum trahens.

§. 9. Tria esse, quæ valetudini nostræ negotium facessunt, morbum scil. causam morbi, & symptoma, Galenus putat *l. de Const. Art. c. 15.* quam opinionem per traditionem ad nostra secula propagatam ex plurium libris legimus. Verum, quia ipsimet symptoma cum morbo confuderunt, ternarium hunc rerum p. n. numerum ad binarium redegerunt moderni; Causam nimirum morificam & productum ejus, vid. D. Ammanni *Paræn. ad Studios.* Sufficit enim Medico Practico causas, ad quas solas attendere debet, à productis seu effectis distinguere, quorsum etiam in præsentiarum respexi, dum Temulentiam rem homini p. n. per Productum morbosum, loco generis definivi.

§. 10. Differentia sumitur 1.) à forma læsa sc. actione; quam communem habet productum hoc cum reliquis. Cum enim vita sana consistat in actione partium corporis secundum leges à natura præscriptas vi contrariorum hujus labefactatio morbus erit seu productum morbosum, ejusdem abolitio Mors.

§. 11. Sumitur 2.) differentia à parte affecta



affecta seu Spiritu, ab usu animali dicto: Spiritus enim nostri corporis, licet diversas actiones edat, diversisque organis gaudeat, non nisi unus est, si substantiam aspicias; Aristoteles *l. de animal. motu*, Hoffman. *l. 2. Instit. Argenter. lib. de Somno & Vigil.* Deussing. *libr. de Spiritibus.* Helm. *Tr. Blas human. §. 58. Tr. Spir. Vitæ §. 29.* ratione vero usus ab arte dispescitur in vitalem & animale, quorum ille actionum vitalium, hic animalium, sensuum scil. & hos consequentium motuum animalium Autor existit. Itaque Temulentia ratione partis affectæ distinguitur non modo à morbis sanguineis & partium solidarum, verum etiam à morbis spirituum vitalium.

§. 12. Spiritus quidem hos partem corporis & consequenter morborum seu subiectum esse negant veteres. Negandi rationes collegerunt *Conimbr. Comment. ad Aristotelem l. 1. de gen. & corrupt. cap. 4. qu. 24.* Sed ipsi definitione partium viventium recepta, quam ex Galeno petiit Fernelius, refutari possunt, quæ talis est: Pars est corpus toti coherens communique vita junctum ad usum comparatum.

§. 13. Paradoxon videri posset, spiritibus hanc partium applicare definitionem, dum per corpora definiuntur; sed homonymia est in vocabulo spiritus, quod hic non proprie sumitur, quatenus substantiæ corporeæ contradistinguitur, sed improprie & comparatè. Perinde ut Chymici liquores volatiles ob mobilitatem & substantiæ raritatem Spiritus dicunt: ita quoque subtilior hæc corporis nostri pars ob subtilitatem & generationis modum, quem cum spiritibus Chymicorum eundem fere obtrinet, fermentationem sc. & circulationem, spiritus dicitur, h. e. corpus subtilissimum, quod 1.) toti coheret, cum sit de essentia corporis viventis & sine interitu ejus seu abolitione actionum, quam mors sequitur, separari non potest: 2.) communi vita fruitur, quia proximum animæ instrumentum, quod vitam, h. e. vivendi actum largitur, per quod verò unum quodque tale est, illud magis est tale: 3.) ad usum comparatum, qui est actuatio partium organicarum. Ipsi enim aut immutatis, aut abolitis, aut depravatis, aboletur aut imminuitur, aut depravatur motus animalis, salva licet organicarum partium structura. Inde Hippocrates quoque corpus nostrum instar machinæ hydraulico pneumaticæ divisit in partes continentes, contentas & impetum facientes seu moventes h. e. spiritus.

§. 14. His itaque notatis concludimus spiritibus corporis nostri non modo definitionem partis competere, sed ex usu quoque, quem præstant, ipsos (non excluso sanguine)

Tom. II. Pars 2.

esse partem primariam active moventem, adeoque primariam uti vitæ & sanitatis, sic quoque morborum subiectum. Uti enim vita & sanitas & actiones exercendi vis effectivè & radicaliter à spiritibus his unice dependet, ita his ipsis laetis spiritus laborare credimus & quidem in Temulentis (qui nostræ jam sunt considerationis) animales, quia motus spontanei & sensus imminuuntur ac depravantur, uti testantur ebriorum exempla tantum non quotidiana.

§. 15. Scilicet spiritus hi, qui sub seminis tegmine in uterum excernuntur & postmodum sese ex sanguine in corde multiplicant, in cerebro perficiuntur aut separantur, cum materiales sint, ut supra §. 13. dixi, materiales quoque habent conditiones, ratione quarum in statu naturali appropriati sunt systemati fibrarum organico. Præcipuæ sunt sal sedo & volatilitas.

§. 16. Salfedo probatur à vi balsamicâ. Balsamici sunt (inquit Helm. *Tr. Sp. Vitæ*) & custodes à corruptione. Unde & his enervatis aciditatum morbisficarum in corpore observatur dominium, quarum acrimoniam illi antea temperabant. D. Bohn *Disp. Phys.* 15. §. 18. Hanc salfedinem per fermentationem acquirunt, quæ ex duobus  $\Theta$ ibus sibi invicem contrariantibus in liquido solutis oritur, ex quorum connubio nascitur tertium enixum seu salfum, volatile vel fixum, prout pugnantia  $\Theta$ ia nunc sunt volatilia vel fixa, utraque autem alterum alteri prædominetur.

§. 17. Generantur enim spiritus ex sanguine per fermentationem, sive ea fiat ad modum Sylvii propter bilem per Epar (vid. Sylv. *diff. VI. it. de Febr. disp. 2. §. 21.*) lixiviosam volatilem (Tackius *Chrysog. animal. & mineral. pag. 37.*) ascendentem & acidulam lympham per venam axillarem (conf. Schuyl. *Tr. pro Vet. Med.* Barthol. *in Ep. Diemmerbroeck anat. l. 1. c. 16.* Swalwe *libr. de Pancreate p. 67.*) itidem volatilem descendente, sive beneficio fermenti proprii eadem accidat, sive alio modo fiat.

§. 18. Utraque suas patitur difficultates, Sylviana duplici modo impugnatur. Primo ab illis, qui bilem per porum biliarium versus Epar scandere, secundo ab iis, qui lympham acidam esse negant. Illis satisfacere videntur Experimenta (violenta tamen) 1.) Fractati, quod atramentum Vesiculæ injectum epar denigrare demonstrat, 2.) Sylvii *Diff. 6.* qui flatum in fellis vesiculam immisum versus epar transiisse affirmat. Quod vero ligat<sup>9</sup> hic ductus versus epar non intumescat, inde est, quod sub ligatione compressa vesicula copiose non modo versus epar (unde etiam est, quod post factam ligaturam abscissa

[Kkk kk 2]

vesicula

vesicula aliquid refluat, quod contra Malpighium noto) sed etiam versus intestina patente ductu communibilem effundat, unde copiosæ agonizantium dejectiones. His præter auctoritates §. 16. allegatas oppono, quod saliva humor lymphaticus, non modo cum saccharatis effervescat, sed etiam lac coagulet, & saliva præcipitet, inde si vel tantillum salivæ liquori Oari admiscetur, statim turbatur. Altera de fermento cordis proprio ab iis negatur, qui cor muscolum esse & cavitatem accidentaliter saltem formare credunt. Sed rectè Helmont. omnibus partibus & sic musculis quoque peculiare fermentum assignat, quod tamen de munere digestionis & coctionis privatæ potius quam publicæ interpretandum venit.

§. 19. Volatilitas inde constat, quod porosam minus cavam nervorum substantiam penetrare & citissime ad partes fluere ac refluere possunt. Hanc agnoscens Willisius *l. 1. de Anima brutor.* maluit eisdem cum lucis radiis quam subtilissimo liquore chymico comparare, quod hic de vase in vas effundi & destillari queat, spiritus vero animales illico evanescentes nullum sui vestigium relinquant. Hinc Graff. *l. de Succo Pancreat. cap. 2.* discisso nervo notabili ad crura tendente, ipsi phialam applicans angustioris colli nec guttulam decidenter vidit, nec spiritus vitri lateribus per condensationem adhærere notavit.

§. 20. Obtenent hanc 1.) ab aëre ad generationem ipsorum concurrente, cujus in volatilisando sanguine efficaciam probat Helm. *Tr. Blas human. §. 45.* confirmant Experimenta Loweri & Hooekii, quæ refert D. Bohn *Disp. Physiolog. de Pulmon. 2.* à generationis modo, qui est per fermentationem & circulationem, quæ res in naturam spirituosam elevat, conferatur Ep. Beckii *de volatilisat.* §. 30. quod vel solus odor sub fermentatione & destillatione nares feriens testatur.

§. 21. His spirituum conditionibus rite & naturaliter sese habentibus, vegeta succedit corporis actuatio. Sicut iisdem spiritibus fixioribus ac aquosioribus redditis, eadem frangitur ac debilitatur. Huic debilitati uti medentur indistinctè ferè omnia medicamenta, quæ ratione  $\Theta$  volatilis spiritus volatilisare & in debita  $\Theta$  sedine conservare potis sunt, ita eandem ex contrario producant, quæ spiritus figunt, ut pingua, resinosa,  $\Phi$ rea, particulis ramosis  $\Theta$ ino volatiles maximè activas remorantia. Talis vis an vino quoque insit, cum in Temulentis similes videamus effectus, dubitari equidem non potest, quidquid dicat Augenius *Tr. 3. Ep. 2. ed. 5. cap. 4.* Quamvis vero pars, cum vi-

num unâ pluribus constet, ista vi polleat, sequentibus patebit, ubi de causâ proxima. Non enim secundum totam substantiam inebriare probat Schoock *de Cerevis. cap. 17. pag. 142.*

§. 22. Differentia sumitur 3.) à causâ efficiente, quam sulphur nominavi. Qua in parte non contradico veteribus, qui passim videri possunt, nec Helmontio *Tr. Spir. Vitæ*, qui vinum, cum nihil aliud sit, quam liquor uvarum expressus, & fermentatus, ratione partis spirituosæ ex fermentatione natæ (experientia edocti paratos per fermentationem spiritus inebriare) Temulentiam causare credunt, modo hanc virtutem non secundum totam substantiam spiritibus tribuant proxime: Duplici namque partium genere constant hi spiritus, sulphureis scil. &  $\Theta$ inis. Beccherus *Phys. subterr. l. 1. sect. V. cap. 2.* Helm. *Tr. Spir. Vitæ*, quæ enim hætenus de  $\Phi$  vini fabulati sunt, ea de partibus  $\Theta$ inis intelligenda esse suadet Beccherus *l. c.*

§. 23. Partem sulphuream esse in Spir. Vini h. e. corpus insipidum seu dulce (Dn. D. Bohn *Ep. de insufficient. princip. acid. & alcal.*) substantiæ ratione resinolum, quod Barnerus (*Ep. de Sp. Vin. sine acido*) ex Magneno Ceram pinugeniæ nominat, probat (1) genesis, dum fiunt hi spiritus ex succo uvarum, subiecto scil. sulphureo mediante fermentatione, quæ causâ est, ut unâ cum partibus  $\Theta$ inis in phlegmate solutum sulphur spiritus ardentis naturam induat, adeo ut spiritus hi nil aliud sint, quam oleum seu sulphur per fermentationem in suo phlegmate solutum, hinc etiam perinde ut ipsum flammam concipiunt, & ardentium nomen obtinent (2) analysis dum ex iisdem oleum seu sulphur vel nuda aquæ infusione separatur, quod ulterius beneficio liquoris prorsus  $\Theta$ ini in resinam abire docet Barnerus *l. c.* saporis & odoris expertem, ardentem tamen & æquiponderantem ferè corpori suo.

§. 24. Liquor hic oleum vitrioli est, & succedit experimentum in pluribus oleis destillatis, nunc facilius, nunc difficilius, unde cum oleo destillato anisi felicissime procedit, difficilius cum oleo Terebinth. uti prolixè hæc deducit Dn. D. Ettmullerus in literis nuperrime ad me datis, ad alia vero olea destillata, quæ liquor hic non præcipitat forsân alius  $\Theta$ ino-acidus adhiberi potest, unde modo memoratus Dn. D. Ettmullerus ex oleo destillato pinguedinis humanæ cum spir.  $\Theta$  similem resinam paravit, perinde ut idem cum eodem spiritu ex oleo olivarum comuni produxit concretum, pinguedinem animalium exacte repræsentans, ad imitationem sc. experimentorum à Grew. *Tr. of. Mixture:*

ture: pag. 28. 110. & Symson. Zymolog. p. 145. relatorum.

§. 25.  $\Theta$ inam partem quod attinet, probat 1.) genclis, cum  $\alpha$ ) ex musto copioso  $\Theta$ e abundante, uti monstrat  $\beta$ ) per fermentationem resultet, quæ absque  $\Theta$ ibus arti & naturæ impossibilis &  $\gamma$ ) substantiam pinguem seu aëream intime admixtam habeant, vid. §. 22. 23. quæ non miscetur nisi per  $\Theta$ ia, quæ ob id Barnerus l.c. ex Helmontio pingua vocat. 2.) analysis, dum  $\alpha$ ) humiditate abstracta in Chrystallos abeunt, vid. Libav. l. 2. Chym. Tr. 2. c. 38. &  $\beta$ ) olea, quæ ex ipsis separantur, nunquam sunt absque  $\Theta$ e, unde & in  $\Theta$ ia resolvi possunt. Sic Helmont. oleo cinamomi addito alcali proprio absque omni  $\nabla$ trium mensium artificiosa occultaque circulatione in  $\Theta$ em volatilem commutavit Tr. Chym. Princ. §. 83. quin  $\gamma$ ) ipsum phlegma putredinis expers  $\Theta$ ium innuit præsentiam.

§. 26. Cum itaque spiritus in duabus partibus consistet, quænam illarum proxime sensus & motum liget, investigandum est. Atque hic dicimus esse sulphur vini & quidem cum addito copiosius, quia semper certa proportio inter agens & patiens requiritur, haustum seu ore assumptum, nam quod ex Clystere injecto Ebrietatem observaverit Borellus c. 1. obs. 56. & Rhod. obs. c. 22. Febr. de absinth. id rarissimum est. Nostrium erit itaque; hanc opinionem de sulphuris vinosi inebriativa virtute ulterius tum rationibus tum experienciis à juvantibus & nocentibus desumptis probare.

§. 27. Ratio, qua sulphur vini spiritus ligare & ita Temulentiam causare posse confirmatur, à substantia ejus desumpta est, quam §. 21. resinosa & viscidam appellavimus, adeoque capacem, quæ spiritus  $\Theta$ inovolatiles ratione viscositatis in actionibus remorari possit. Inde omnia sulphura narcotica possident & omnia narcotica sunt sulphurea, quamvis sulphura mineralia & metallica fixa, quæ etiam figendi spiritus potentiâ pollent, in quo tertio cum vegetabilium sulphure conveniunt. (Non intelligo autem per sulphurea mineralia calcinata illa metallica corpora) alio paululum modo agere videantur ob exiguam, qua sumuntur, dosin, unde & Helmontio Tr. in Herb. Verb. & Lag. magn. est virtus irradiantia vocantur, sicut etiam materialiter ultra primas vias vix pergere videntur.

§. 28. Hanc rationem confirmat experientia à juvantibus & nocentibus seu Ebrietatem inducentibus & præcaventibus desumpta; I. inducunt Ebrietatem citiù vina quæ copioso sulphure gaudent, ut sunt  $\alpha$ ) Vina suppressa, ver-  
baltene Weine/ quia egressus sulphuris in

omni fermentatione alias exhalantis (monstrat hoc Langelott. Ep. ad Curios. de fermentat. Opii, & probat exhalans sub fermentatione Gas adstantes inebrians) impeditur.  $\beta$ ) Vina sulphurata Spanu-Weine/ & c.  $\gamma$ ) Hispanica, quæ plus spiritus sulphurei, quam acidi continent conf. Henric. ab Heer. obs. pag. 225. segg. Vina ambrata huc numerari possunt citam Ebrietatem accelerantia. Matthiolus ad Diosc. l. 1. c. 20. II. Præcavent omnia, quæ  $\Theta$ e volatili acri spiritus acuunt, quominus resinosis & vinculis vinciri aut vinci possint, in specie spir. sal-armoniaci, quem Beckius den Sauff-Spiritum nominat. III. Curant  $\alpha$ ) acida. Nimirum in omni narcosi æque ac Temulentia felici successu adhibentur, quatenus scil. hæc solutum à Ventriculi fermento sulphur ex primis viis præcipitant  $\beta$ ) aquosa qt. dilatando poros menstrui solventis sulphur, hoc ipsum separant, perinde ut Sp. Vini lactescere & oleum suum ex poris dimittere animadvertimus affusione  $\nabla$ .

§. 29. Sed Respondendum jam quoque erit Tachenio, Beckio aliisque, tantum non omnes morbos & sic quoque Temulentiam à  $\Theta$ e acido deducentibus. Hi in eo feliciores sunt cæteris Medicis, quod faciliorem viam consequendi medicamentum quoddam universale invenerint, cujus vicem penes ipsos imprimis sustinet spir. sal. armoniaci, acidum, universalem fere secundum ipsos morborum causam potentissime infringens. Negari equidem non potest, acidum corpori extra ventriculum inimicum esse, ut loquitur Helmont. & plurimum ita morborum causam existere. An tamen idem acidum, quod & sulphur à similitudine vocat Tachenius Clav. Hipp. Chym. p. 8. (Hinc Barnerus sulphur inter  $\Theta$ ia acida ponit Chym. præcept. à Beckio editis) in vino verè exuberans, licet à sulphure distinctissimum (confer Major Tr. de  $\Theta$  cap. 4. de liq. acid. ortu) sensum & motum in ebriis liget, inquirendum est, quod ut commodius fiat, prius ad singulorum argumenta respondebimus, tum quæ porro obistere videntur, subiciemus.

§. 30. Tachenium quod attinet, ipse Hipp. Chym. c. 19. p. m. 154. à juvantibus seu potius præcaventibus herbis scil. alcali occulto gaudentibus, ut sunt herbe vulnerariæ & olera omnia in specie brassica concludit, in acido vini inebriativam vim consistere. Aberrare tamen in eo videtur, quod ipsas has dictas herbas non operari credat, nisi temperando & absorbendo acidum spiritus alias figens, cum Temulentia medeantur, non tam acidum infringendo, quam vi  $\Theta$ ia stimulando Urinam & sic Vinum totum eliminan-



minando. Hinc eadem quoque conducunt in Ebrietate ex Spiritu Vini  $\varphi$ iato contracta, quem tamen haud acidum esse omnes norunt.

§. 31. Quod Tachenius obiter unico argumento, id Beckius *in exper. circa natural. rer. princip.* prolixè per aliquot paginas variis ratiociniis, tum ab actionibus ebriorum, tum ab experimentis particularibus desumptis, probat. I. ab Actionibus Ebriorum, hilaritate sc. & hanc insequente sopore, quas non commodius explicari posse scribit, quam per effervescentiam acidi ex Ventriculo ad Cerebrum emissi, cum spiritibus animalium alcalicis, quos tandem ex largissimo potu copiosius accedens acidum somnum & torporem causet. Exemplo suo hoc testari non modo Poëtas, sed Magnates quoque, quos consiliis dandis aptiores credit, cum plusculum bibissent,

§. 32. Verum enim vero si experientiam consulimus 1.) non præcisè has actiones ab effervescencia spirituum alcalicorum cum acido derivandas esse videmus, cum natura pariter ac arte constet, non modo acida cum alcalibus, sed & alcalia cum alcalibus, sulphurea cum alcalibus, &c. effervescere, &c. Clarum hoc est in Spiritu Vini cum  $\Theta$  e  $\varphi$  per deliquium soluto aut bile oleosa cum lacte; Magis clarum hoc est in corpore humano, ubi sulphurea in specie Opiata, omni acido destituta, (quod summus amaror, juratus acidi hostis, testatur) sulphurea abundantia (hinc inflammabilia) antequam somnum inducant, mentem hilariorè reddunt. conf. Senn. *Pr. Tr. I. part. 2. c. 6.*

§. 33. 2.) Licet acida volatilia ut plurimum hanc vim possideant, non tamen vice versa omnia, quæ hunc effectum præstant, sunt acida volatilia, adeoque ab alio principio dependere crederem, & quidem sulphureo, cum hoc non modo in Vino copiosius contineatur, sed etiam, quia omnia sulphurea hanc virtutem possident & vice versa omnia, quæ vi ac potentiâ hac polent, sint sulphurea.

§. 34. Nec obstat hic, quod Vigenarius *Tr. de  $\Delta$  &  $\Theta$*  (vid. *Theat. Chym. Th.*) c. LX. spiritum vini, quem minus acidum esse §. 29. diximus, minus inebriare scribat, quam vinum ipsum,  $\Theta$  e acido adhuc perfusum tali quantitate assumptum, quantum illud ante Aq. Vitæ extractionem constituabat, seu 3j. Sp. vini minus inebriare, quam ea vini quantitas, ex qua 3j. est parata. Nam ex ipso Autore respondeo 1.) procedere hoc experimentum in illis locis, ubi sp. vini in usu frequens est, Germaniæ sc. oppidis & locis frigidioribus, & procul dubio etiam in iis subjectis, qui raro meracius bibunt; sc.

in his valet illud Hipp. assueta licet deteriora minus alterare corpus, quam inassueta licet meliora. Hinc Turcæ Opio, quod nos sine vitæ periculo vix ad gr. ij. &c. exhibemus, ad 3℔. utuntur (conf. Bellon. *obs. 2.*) sulphur subtilius & volatilius penetrans sub forma Gas in destillatione exhalare, testante hoc odore, à quo destillatores sæpe magis inebriantur, quam à spiritu destillato, nec dubitarem, 3.) quin in residuo aliquid sulphuris remaneat.

§. 35. Alterum argumentum Beckii desumptum est à juvantibus 1.) alcalicis a.) in genere tam volatilibus quam fixis, quorum vim in labefactandis spiritibus acidis consistere, quatenus cum his coagulantur, ex Chymicis notum esse dicit. e. g. dum sp. sal. armoniac. cum spir. Vini non modo ratione acidi  $\Theta$  is in spiritu Vini latentis coagulatur, sed &  $\Theta$   $\varphi$  fixum ex spiritu Vini rectificatissimo acidas partes [quod ex aucto  $\Theta$   $\varphi$  pondere concludit] attrahit.  $\beta$ .) in specie brassica, quam specificè in Temulentis exhiberi unanimiter scribunt.

§. 36. Sed Resp. alcalium vim non purè consistere in oppressione acidi, ut potius præcipuè in corporibus nostris ob cognationem, quam habent cum spiritibus, in eorundem confortatione, unde labascentes in agonizantibus vires non semel his ipsis restituntur. Coagulationem vero sp. sal. armoniaci cum spiritu vini ab ejusdem acido dependere, aut  $\Theta$   $\varphi$  ejusdem acidum imbibere, atque adeo suo pondere crescere, eademque ratione acidum imbibendo ebrietatem præcavere, dubium videtur.  $\Theta$  enim tart. à quo Spir. Vini abstrahitur quantitate non augeri, sed minui docet Dn. D. Bohn. *Ep. c. ut* & Barnerus *c. l.* Spiritum vini vero non ratione acidi coagulari, inde constat a.) quia de aciditate adhuc dubitatur, vid. Barnerus *l. c.  $\beta$ .*) quia non modo alcalia cum acidis, sed & alcalia cum alcalibus coagulantur, unde & spir. vini tartarificatus eodem modo cum sp. salis armon. coagulatur, vid. Dn. D. Bohn, *c. l. p. 27.* Barnerus, *p. 16.* Perinde ut hic ipse cum  $\Theta$  e tart. per deliq. soluto in offam coit. Nec spiritus vini inebriare ratione acidi nec alcalia absorbendo acidum ebrietatem præcavere, ex eo constat, quod Spiritus Vini Tartarificatus vim inebriativam æque obtineat ac si ficto illo acido adhuc gauderet. Tandem brassicam quod attinget sal. alcali ratione (quod ipse ex sapore & effectû, quem in vulneribus præstat inesse credo) ebriis conducere negare nolo, an autem absorbendo acidum operatur, inde dubito, quod uti §. 30. dixi conferat etiam in Ebrietate à Spir. vini Tartarificato contracta.

§. 37. II.

§. 37. II. Juvantibus oleosis, amygdalis scilicet. amaris & emulsionibus ex feminibus frigidis, quas operari credit ratione olei, quatenus scilicet pinguedine sua acidum obtundant, atque sic Ebrietatem præcaveant. Oleosa autem acidum obtundere probat per Spir. Vini, qui licet ipse acido volatili gaudeat (ex ejus supposito) olei tamen ratione Aquæ fortis aciditatem temperet. Miror sanè hic Spir. Vini oleositate sua externum & peregrinum acidum satisque potens infringere & proprium (si quod est) minus potens negligere.

§. 38. Verum licet adductorum oleosorum effectum non plane negem, an tamen obtundendo acidum ebrietatem tollant inde dubito, quia 1.) solummodo amygdalis amaris hanc vim tribuit, non dulcibus, cum tamen hæc æque oleosa sint ac amara. 2.) Emulsionibus ex feminibus frigidis paucis oleo gaudeant, cum copiosiori substantia aquea consentiant & semina quoque aquosiora sint. 3.) quia non omnia oleosa, quæ acidum obtundunt, etiam ebrietatem præcavent, ut oleum hyoscyami, papaveris, ambra, &c.

§. 39. Utrique Tachenius & Beck. ex juvantibus concludunt, Ebrietatem à Vini parte acida oriri, ita refutatis ipsorum argumentis ex eodem fundamento contrarium inferri posse sequenti probant. 1.) quia non omnia, quæ acidum tollunt, Ebrietatem etiam præcavent, hinc amara salia acidum potentissime infringentia, Lupulus, Crocus &c. minime Temulentiam curant. De Absynthio quidem ex Arculano refert Senn. c. 1. Ebrietatem ex Vino curare, sed experientia id refellit, quæ Vinum absynthites maxime ad somnolentiam & Temulentiam disponere quotidie monstrat. Sic de Croco scribit Dioscorid. l. 1. cap. 25. ex passio sumptum crapulam arcere; sed falsum esse, experientia eorum monstrat, qui etiam ex croco leviter odorato capitis repletionem & somnolentiam patiuntur, unde rectè Nic. Piso l. 1. de cognosc. & cur. morb. in specie crocum ebriis vetat. 2.) quia etiam ea, quæ acida non sunt, inebriant. v. g. Spir. vini Tartarizatus, amara plura in specie amarulentissimum Opium, quod similem effectum producere Turcæ sciunt, vid. §. 5. 3.) quia vina austera, ut sunt rubella, minus inebriant, cum tamen austeritas ex acido in subiecto Terræ gignatur (unde concretum Oleosum maxime austerum ex Terra Sigill. cum spir. sulphur. artificialiter confici posse tradit Dn. D. Ettmüllerus Coll. Chym. 4.) quia acida Ebrietatem tollunt, unde potatoribus Senn. T. I. Prax. part. 2. cap. 6. commendat acida, acetum simplex vel aqua dilutum

conf. §. penult. poma acida, pruna, cydonia, Lac acidum, acidulas, &c.

§. 40. Signa diagnostica, per quæ præsentem ebrietatem cognoscere queamus, recenset Dominus Leonilucensis M. M. l. 1. sect. 1. cap. 20. sed ignorata causa occasionali certi aliquid pronuntiare non possumus, alii enim ut apoplectici cadunt, adeo ut quendam per 4. dies male pro apoplectico curatum Heinr. ab Heer. obs. 19. annotavit. Alii delirantium instar varia sibi imaginantur, sic refert Platerus Obs. l. 1. pag. 37. quendam in platea lunæ splendorem in Terra influentem existimasse, se videre fluvium profundum, & quo natare posset, vestimenta deposuisse; sic alii pro phreneticis habiti, unde observavit Borellus c. 1. Obs. 56. mulierem abstemiam clystere ex vino injecto inebriatam, quod ignoranter proximi adstantes errorem quendam à Pharmacopola & Medico commissum opinabantur.

§. 41. Qui autem fiat, quod ex Ebrietate nondum consummata alii irascantur, alii tristentur, alii loquaces sint, alii somnolenti, an scilicet quod humores affectibus convenientes in corpore nostro moveantur, uti putat Platerus Prax. l. 1. cap. de Temulentia p. 97. an alio modo accidat, nondum liquet. Conjicerem animum sensus alias mediantibus spiritibus dirigentem ipsis spiritibus per fumosas sulphuris vinosi partes obscuratis quiescere à muniis propter ineptitudinem instrumentorum; unde hi liberiores (primo antequam planè à sulphure supprimuntur) pro diversitate conceptarum idearum potissimum exequantur suas actiones. Inde forte, quod Senguerdus de Tarantismo scribit, animalcula hæc easdem imaginativæ impressiones imprimere fortius, quibus intentos, quos mordent, inveniunt, hic quoque applicari certo modo posset, dicendo: Temulentos secundum ideas agere, quas archæus animæ superioris dominio jamjam liber paulo ante ebrietatem conceperat.

§. 42. Non negandum interim, temperamenta (non primarum qualitatum elementarium) particularum sanguinis aliquid conferre, inde sanguinei, quorum sanguis ex debita particularum mistura constat, læti sunt, quia in his spiritus celerius & agilius paulo moventur; Cholericus, h. e. in quibus particulæ urinosæ prædominantur, mobiles sunt & inconstantes, quia spiritus volatiliores & facile disperguntur, unde superficialia saltem fit idearum impressio & propter hanc actionum facilis immutatio: Melancholici quorum sanguis particulis sal. acidis scatet, propter spiritus ex sanguine hoc generatos paulo fixiores, impressiones tardius quidem, fortius tamen recipiunt, unde constanter vel

rident

rident vel tristantur, &c. Phlegmatici tandem, & quibus lymphæ obtinet sanguinis falia fermentativa, paucos gignunt spir. unde citissime succumbentes somniantur, conf. D. Ettmül. *Coll. Inſtit. c. 16.* & Gordon. *lib. Med. c. 21.*

§. 43. Cum itaque non ex fale acido vini, sed sulphure, quod ab effectu narcoticum appellamus, Temulentia oriatur, eadem quoque extimescenda sunt mala, quæ narcoticorum usum insequuntur, licet vini sulphur ipsis paulo mitius sit, sensuum nimirum stupor, (Heinr. ab Heer *Obs. 17. hist. I. p. 215. & p. 225.*) & motus debilitatio, ut & ex fixatione aut oppressione spirituum, omnium digestionum labefactatio Heinr. ab Heer *c. I. p. 222.* si sc. vis frequentior sit. Alias cito discutitur per somnum, cum sc. vis illa narcotica à natura jamjam est subacta, spiritusque à vinculis, quibus ligabantur sese expedierunt, pro vini tamen conditione, ægri peculiaris natura, loco & tempore solvitur Ebrietas quibusdam 2. l. 3. die vel serius, prout crasso vel tenui vino incaluerunt, Gal. *in Hipp. l. 2. de Morb.* Conf. *Obs. 19.* Henr. ab Heer.

§. 44. Optimum igitur & sanitati maxime proficuum est Ebrietatem, quantum in nobis est vitare, quod sit vel abstinendo penitus à vini potu (unde Abstemii dicuntur) suadet hoc prolixè Deodat. *Panth. hygiast. l. 1. cap. de Ebrietate;* vel corpus certis remediis disponendo, quo vel per alvum aut urinam evacuetur assumptum vinum, antequam vires suas expandat; vel confortando spiritus, quo se ipsos à vinculis, quibus detinentur, liberent. Distinguitur tamen semper Ebrietas ipsa, h. e. sensuum & motus cessatio à sulphure vini orta, ab aliis morbis Ebrietatem vel concomitantibus, vel consequentibus, cum hi plerumque ab acido vini, hæc ab ejusdem sulphure dependeat.

§. 45. Tutissima præservatio est per abſtinentiam, quam certis remediis procurari posse (si alias obtinere non possumus) nonnulli Medicorum credunt. Collegit hæc ex aliis Sachsius *in Ampelograph. Sect. VI. Membr. II. cap. 2. de Vini abusu p. 214.* sunt; Rana viridis, anguilla in vino suffocata, lacryma vitis, ova noctuæ, Aqua fontis Clitorii, uva marina, rad. arb. amabil. &c. quibus ex Francisco Scacchio *de Salubr. potu, cap. 20. p. 215.* addo mullum in vino necatum. Albertus *M. l. 12.* de animal. laudat stercoſ leonis in vino. Confert etiam Lacerta viva, vel testudo lacustris vel semina caulium patiente incio in vinum immiſſa, si de ipſo hauriat. Capiuacc. *l. 3. de aff. Ventric. c. 8. de Siti.* Omnia frequentioribus experimentis confirmanda,

§. 46. Quod si vero medicamenta dicta horreat ager, vinoque liberalius uti cogatur, de quo aulici ut plurimum conquerruntur, non inutile est, corpus ita disponere, uti citissime per alvum aut urinam reddat, quod per os involuntarie ingestum est vinum. Per alvum in primis evacuat oleum olivarum qt. lentore suo vias reddit lubricas, non tamen cum Nicol. Piſone *lib. I. de cur. morb. c. 6.* statuamus, integrum vini dolium hoc præmiſſo posse sine Ebrietatis periculo hauriri, Dominicus Leonilucensis commendat olivas fale conditas *Seſt. I. l. 1. cap. 20.* Brassica cocta (alii crudam eligunt ad nutum Catonis, Conf. Jason Pratens. *Med. l. c.*) principio mensæ apposita, quam vim etiam Raphano tribuunt, qui brassicam Græce *καμῆν* & raphanum dici, nostram vero radiculam *παφάδα* nominari ignorant, Lang. *Ep. 30.* Notetur hic interim vitem etiam vivam brassicæ odorem fugere Forestus *Obs. 28. l. 9. Schol.* De Meliloto vid. Heurn. *l. 2. M. M. de intemp. cerebr. calida.* Huc pertinet etiam lac, & omnia, quæ primas vias lubricantes reddunt, it. Pil. Glaslii, quas frequenti in usu fuisse biboni compertum habeo, unde etiam *die Sauff-Pillen* ipse nominabat: similem refert Rickeman. *diſſ. de Ebrietate Ien.* edita.

§. 47. Per urinam movent vel quæ fale falso stimulant, aut sal. vol. amaro abundant, amygd. amaræ, lupulus, rura, &c. qt. hæc cum fale vini acido in fals. diureticum abeunt, sulphurque vini narcoticum una secum educunt. Eadem hæc medicamenta si paulo fortiora sint qt. spiritus volatiles falsos in corpore acuunt, quo viscositati sulphuris vincientis commodius resistere possunt, confortando eosdem ab Ebrietate præſervant. Plateri Consilium qui *Obs. l. 1. pag. 38.* se in conviviis Ebrietatis præcavendæ causâ per bihorium abstinuisse vino prodidit, usque dum ad satietatem comederit, hisce temporibus vix imitandum, ubi ab ovo pocula hauriuntur.

§. 48. Sin autem Sulphur Vini Spiritus jamjam vinctos in triumpho ducat, necesse est, ut vinum, si adhuc in stomacho hæret, per vomitum rejiciatur, qui vel irritatione faucium mediante digito vel etiam medicamentis, si opus, excitetur. Aceſcens enim in Ventriculo vinum ob suppressos aut exhalatos Spiritus Sulphureos per alvum ducere ob metum colicæ passionis, &c. nimis periculosum est, Medicamenta Vomitoria sint: v. g. Merc. cum melle miſtus, faucibus cum penna applicatus, vel Oleum nucum cum penna, Conf. Henric. ab Heer *Obs. pag. m. 227.* vel ſapa vomitoria Sylvii, aliaque ex Antimonio parata



rata vomitoria. Monstrat hanc viam ipsa natura sponte sæpius vomitum excitans, unde Langius *Ep. XXX. lib. 1.* suadet, ne dormiat æger, priusquam evomuerit.

§. 49. Tum adhibeantur, quæ vel sulphur narcoticum mitigent, ut sunt acida, quorum vis infringenda narcosin, uti ex præparatione Opii nata est, ita vineam proprietatem, qua inebriat & stupidos attonitosque reddit, retundit. Unde Ebriosos hac arte sibi prospiciendo ad multos annos perseverare posse, notavit Platerus *Obs. l. 1. pag. 39. conf. Frambes. Conf. Med. 9. Gabelhof. C. 3. Obs. 72.* vel quæ illud à spiritibus dilatando eorundem poros, separant, ut sunt aquea, vel quod melius acida his juncta. Non incommode E. adhibetur aqua succo citri aut Aceto diluta, quam Platerus *Prax. lib. 1. pag. 126.* antidotum Ebrietatis vocat, si quantitate majori sumatur, eoque insignem potatorem, jam longo tempore indies ebrium, se, ne inde labem contrahat, præmunisse scribit, *l. c.* vel Acetum ipsum abunde potum *ibid.* aut lac acidum ebutyratum, Forestus *l. c.* Unde decocta alterantia spiritibus mineralium acidulata, & varii generis julapia ex citro, cydon. granat. &c. parata non sine fructu adhibentur.


§. 50. Illa verò, quæ confortando Spiritus conducere diximus, cum ex genere volatilium sint, adeoque cum acido vini simul ingesta nimium effervescendo febres excitare possunt, commodius Temulentis externe pro discutienda somnolentia naribus saltem applicantur, aut linguae. Hipp. *l. 2. de Morbis*, Aqua copiosa calida spongia imbuta caput lavat & naribus cepam purgatam admovet: huc pertinet quoque castoreum & castorina cum Spir. Salis armoniaci juncta, quod licet pingue & Oleosum videatur, qt. tamen externe saltem applicatur cum Spir. Salis armoniaci præpollet sal volatile cum Sale armoniaco exhalans Spiritusque no-

stros confortans, internè verò ratione Sulphuris caput teplet, unde hysterica sæpius hoc conqueruntur, quod ipse in Persona Illustri non semel observavi: vel etiam excussio sopore morbis Temulentiam concomitantibus interne adhibentur, v. g. Spir. Sal. armoniaci, Spir. C.C. fulig. plura remedia, qui desiderat, evolvat Schacchium de salubri potu, Snebergum de Amethystis, Forest. *obs. in Ampelograph.*

§. 51. Ad Spiritus excitandos non parum quoque conferunt frictiones extremorum, & partium maxime sensibilium, quales in viris testes, & mamillæ in foeminis vid. Gord. *lib. Med. pag. 881.* Rosa *Ang. p. 726. p. 1164. cap. de Regim. iter per diversas regiones facientium.* Huc quoque pertinet *obs.* Heinebr. ab Heer, qui Ebrium per quatuor dies pro apoplectico curatum, & jamjam trepano tractandum vellicando mystiacis pilos *er hat ihm an den Bart gegriffen/* ab ebrietate excitavit, vid. *observat. 19.*

§. 52. Annectenda jam ultimò venit diæta, ubi conveniunt ex potu & cibo acida, v. g. cydonia, Citrus, ova acida, serum lactis acidul. acidulæ naturales & artificiales, Tinctur. Mart. Sol. ut & aquosæ Emulsiones. Somnus convenit, modo rite ponatur, ne supinus jaceat, conf. Forestus *l. 9. obs. 27. schol.* Si tamen nondum consummata Ebrietas, Spiritus moderato motu excitentur, v. g. per saltationem, pilæ lusu. Inde etiam affectus animi laxi, quatenus spir. in motum cient, sensim Temulentiam tollunt. Quoad excreta attendatur, si vomitus imminet, aut Urinæ excretio, ne impediatur, ut enim illud cardialgias excitat, ita subito putrescens urina renibus ac Vesicæ nocet.

S. D. G.



DISPUTATIO XIX.  
 DISPUTATIO MEDICA  
 DE CORPULENTIA NIMIA,  
 QUAM  
 SUB PRÆSIDIO  
 MICHAELIS ETTMULLERI,  
 Philosoph. & Medic. Doctoris  
 Publicæ placidæque Philiatricorum Disquisitioni submisit  
 AUTOR & RESPONDENS  
 GEORGIUS MELCHIOR Wiedemann/  
 die 19. Aug. Anno 1681.

PRÆFATIO.

**D**um non vivere, sed valere, vita esse rectè dicitur, quibusvis valetudinis prosperæ cultoribus, illud Hippocratis 6. Epid. s. 4. §. 20. Sanitatis studium est, non satiari cibis, & impigrum esse ad labores, oraculi instar meritò inservire debet. Quantum enim pro conservanda vita, cuius omnis mora in perpetuo fluxu consistit, nutrimenti valet assumptio, tantum ejusdem diuturnitati ac integritati detrahit nimia illius ingestio. Vigor pariter totius corporis, quem motus benè ordinatus conservat florentem, enervatur insigniter, & languescit sub otii quietisvè torpore. Alimento sanè refarciuntur quilibet, naturæ ex lege, quos patitur machina corporea defectus, & attritu quasi mutuo, quicquid deperit ejus partibus, illius ope redintegratur, modo prius, quod æquius illis associabile existit, per prævias alterationes digestionum beneficio, quibus utile quod est, ab inutili secernitur, appropriatum redditum fuerit. Ast ubi infarciuntur nimia satietate digestionum officinæ, & obruitur vis fermentorum alterativa, haud benè subacta assumpta, aliena sub textura hinc inde distributa, vitiant structuram naturalem organorum corporis, & ceu ædificium, ex lignis & lapidibus non benè coherentibus constructum, necessario minatur ruinam. In quem finem finge automaton, cuius rotulam quandam vel pulvisculus casu illapsus in motu tantillum remoratur, vel cuius spiram aut alligatum funiculum &c. quedam guttule forsan irrorando, illam in elatere, hunc intensione alterant, vel cuius remoram altero sui extremo aliquantulum rubiginis sordidæ infecerit, quicquid horum contigerit, necesse est, deficere artificiosum adeo opus à regulari suo motu, & tandem penitus quasi exanimari. Nullum artificiosius fingi potest automaton præ nostro corpore, cuius tot partium sunt particule, omnes ut sapientissimè fabricatæ, ita mille vitiis obnoxie, ut mirum videatur, vel per horæ momentum integram illam ex toto, citra morbosum defectum subsistere posse. Nil tamen æque lædit easdem, ac quod pro conservatione illarum subministratur nutrimentum, vitiatum si fuerit: cuius primarius error est deficiens sub digestionibus coctio, maximam partem ab illius copia natus. Adeo plures necat gula quàm ensis: & cum totius Diætes cardo sit sobrietas, cum non tam qualitas, quàm quantitas alimentorum noceat, nihilominus in nullo crebrius peccatur contra illius dictata, quam hoc in puncto. Ut ut verò nullus hic committatur à sanitatis studioso excessus, quin tritum illud Germanorum benè observet, wenn es am besten schmeckt / daß Er aufhöret: nihilominus tamen quibuslibet in assumentis, ut supra insinuat, præter homogeneum istud, nostris constitutivis assimilabile, & heterogenei haud parum deprehenditur, cuius sequestrationi maturæ incumbendum, cum non minus noxium retentum, quam ingestum vitiosum, Oeconomiam nostram turbet. Huic negotio apprimè confert motus partium corporis organicus, cuius auxilio, dum agitantur vehementius contenta corporis fluida per universum corpus, eo ipso fortiori impetu

impetu & nisi subeunt, tam intimiores recessus partium nutriendarum, quam etiam cribra percolationi recrementorum heterogeneorum dicata, per quorum poros illo ipso conatu penetrant copiosius secernenda, & ita facilius ac uberius separantur. Praesertim cum iste motus contentorum progressivus intendat simul motum intestinum molecularum minimarum, quo ipso ut assimilatio & exactior subactio particularum homogenearum seu miscibilium ac nutritivarum promovetur in iisdem, ita feculentiae illae heterogeneae, ad instar istarum in musto vel cerevisia fermentantibus, ex aliarum consortio extruduntur, ut precipitatae quasi secedant. Paucis me ut expediam, ut alimentum partium fluidarum immediatè restorationi obiectivè, ita motus corporis huius assimilationi & purificationi instrumentaliter, inservit: Adeo ut motus vicarius revera sit, cuiusvis V. Snis., purgationis, alteriusque sanguinis correctionis, quod rusticorum & mechanicorum vegeta & robusta cohors palam testatur. Cum verò raro soleat observari conveniens dieta, quin sepiussumè assumtorum excessu, & excernendorum defectu peccetur, ea est Oeconomiae nostrae elegans directio, ut quod superfluum est, modo haud nocivum sit, subinde largius solidis adhærescat, & carnis aut pinguedinis forma uberius corpus augeat. Cum verò à naturali Norma hoc ipso deflectatur, vix citra periculum id fieri potest, uti in corpulentiori habitu omnibus obvium est. De quo affectu cum quaedam pertractare sit animus, vires subministrante in primis fidei DOMINI PRÆSIDIS, quâ olim cum aliis usus fui, informatione, cuius pariter consilio & auxilio, sub ipso hoc conatu non parum sublevatum me fautor, faxit DEUS T. O. M. ut cedat feliciter.

## CAPUT I. Pathologicum.

### ARTICULUS I.

*Naturam & Subiectum Corpulentiae  
nimiae declarat.*

#### §. I.



Orpus humanum ex ovo enatum, ut primitus mole est admodum parvum, ita successivè alimenti beneficio & sustentatur seu nutritur & augmentatur, actione eadem, in nutrimenti saltem quantitate, majore vel minore differente: in solidis sanè ejus partibus, de quibus speciatim nobis agendum erit, manifestum est, quod nutritio & auctio non nisi majoris & minoris ratione discriminentur; nutritio enim est talium inchoata auctio, & auctio perfecta nutritio. Ne autem ambigua nutritionis acceptione decipiamur, in primis monendum videtur, nutritionis rationem nunc à fine ejus à quibusdam, nunc ab aliis à forma, desumi: Ratione finis quidem nutritio erit absumentarum partium redintegratio seu restitutio: Sed angusta nimis hæc ipsa videtur. Solidarum enim partium, qua talium, cum nullasit absumentio, utut arescant subinde humoris torridi nutritivi defectu, nulla quoque foret earum nutritio, quod minùs convenienter dici videtur. Ob id concinnius à forma ejusdem essentialis ratio desumitur, quâ sub acceptione Nutritio erit nutrimenti in substantiam partis nutriendæ conversio. Jam verò corpus nutritur per totam vitam, ut conservetur tale, quale est, augmentatur verò saltem per ætatem accrescentem, ut pat-

Tom. II. Pars 2.

tes organicæ, machinam ejus componentes, debitam magnitudinem acquirant, quâ aptiores fiunt ad actiones debitas, quarum sunt instrumenta, perficiendas: *Vid. Charleton. in Oeconom. animal. Exercit. de Nutritione §. 3. p. 4.*

§. 2. Magnitudo partium debita, ex tribus dimensionibus quantitativis, longitudine, latitudine & profunditate dimerienda, dependet à fundamentalibus partium staminibus, quæ nil aliud quàm fibræ esse videntur. Harum adeoque longitudo, & major minorve extensilitas, quarumvis partium longitudinis normam præscribit. Ipsa ossa, quæ & universi Trunci & hinc artuum longitudinem principaliter determinant, cum pro eorum conformatione corpus plus minus procerum, artusque longiores aut breviores existant, & ipsa primæ sui compagis rudimenta à fibris habere, probabiliter videntur. Uti itaque textura fibrarum secundum extensilitatem in longum, longitudinis partium basis existit, ita earundem major vel minor numerus, ferè latitudinis ac profunditatis fundamentum constituit, quum pro earum copia majori vel minori, simul necessario vel amplioribus circumscribatur pars terminis, vel angustioribus coarctetur limitibus. Hiic seu fundamentalibus ac formalibus dimensionis partium cuiusvis causis, secundariò accedit, ceu materiale principium, ipsum partium nutrimentum, sui appositione & assimilatione quantitatem fibrarum, in specie ratione latitudinis & profunditatis, (quæ dimensiones diversimodè mutabiles observantur, longitudine parum ac raro variante) vel augmentans sui copiosiore distributione & retentione, vel imminuens sui defectu. Cum vero

[LII II 2]

nece-



neceſſe ſit, ut hoc ipſum intra poros & interſtitia fibrarum & recipiatur & retineatur debito tempore, pro ſui nutritivo complemento, præſupponit hoc ipſo talem fibrarum illarum ſtructuram, quæ ratione porulorum & promptè recipere, debiteque retinere queat hoc ipſum, adeoque necdurior ſit illa, nec mollior, cum hæc nimii inſarctus, illa denegatæ receptionis, occaſionem ſubminiſtrent.

§. 3. Jam verò, ſicut in ſtatu naturali magna corporum, tam in longitudine, quam craſſitie, eſt varietas, ex ſpiritu genitali ſeu ſeminali, & inde dependente craſi ſanguinis, & partium ſolidarum radicali, originaliter; ex vario vero rerum nonnaturalium uſu conſequenter, oriunda, ita etiam præter naturam, tam pars una aut altera, & hoc frequentius, quam totum corpus, utut rarius, in quanto nunc excedit, nunc deficit: prius docet lien raræ magnitudinis, de quo Horſtius *Inſtit. Med. Diſp. 3. Coronid. 1. p. 131*. Veſalius *l. 5. de Corporis Hum. Fabr. cap. 9*. Bartholinus *Cent. 1. Epist. 62*. ſicut deficientis ejus molis exemplum ſuppeditat Vidus Vi- dius *L. 10. de Curationibus morb. cap. 10*. in ſpecie Salmuth *Cent. 1. Obſ. 21*. qui in ſœmina lienem adeò parvum, ut pollicem majorem vix æquaret, hepar verò tam ingens obſervavit, ut non tantum hypochondrium dextrum occuparet, ſed & omnem ventriculi regionem, ſicque ipſum ſerè totum hypochondrium ſiniſtrum, quæ tamen optima fruebatur ſanitate, & in partu extincta fuerat. Conferatur pariter, quoad magnum Hepar, Hildanus *Cent. 2. Obſ. 45*. Cor magnum obſervarunt Marchettus *Anat. cap. 10*. it. Kerckering. *Spicileg. Anat. Obſ. 16*. parvum vero idem *Obſ. 17*. ut reliqua viſcera ſilentio præteream: poſterius in gigantibus, it. pumilionibus ſeu nanis, obvium deprehenditur.

§. 4. Pertinet huc ſuo modo iſtud vitium totius in quanto, quod Corpulentia nimia ſeu Nutritio aucta vocatur, in quo corpus non quidem in longitudine, ſed ſaltem latitudine & profunditate, ſeu uno nomine, craſſitie excedit: & tales obesi, it. corpulenti pingues, Germanicè *ſeiſte Wänſte / dicke ſeiſte Menſchen* / Græc. *μεγαλοκρίλοι*, dicuntur. Talium corpulentorum ac obeforum exempla inveniuntur hinc inde in libris Præctis. Speciatim Sennertus *Prax. l. 5. P. 1. cap. 4. p. 21*. refert mulierem triginta ſex annos natam, libras 480. it. Virum 600. lb. pendentes; & præterea *p. 23*. nobilem poſt febrim malignam adeò obefum redditum, ut vix loco ſe movere potuerit. Videatur præterea Platerus *lib. 3. Obſerv. p. 584*. Tulpius *lib. 3. Obſerv. c. 55*. Timæus von Guldentlee *Lib. 6. Caſ. 1. 2. 3. pag. 261. ſeqq.*

Marcellus Donatus *lib. 5. cap. 2. Hiſt. Med.* Schenckius *lib. 2. Obſerv. pag. 218*. Bartholinus *C. 3. Hiſt. 88. & C. 2. Epist. 81*. Panarollus *Pentec. 4. Obſ. 81*. Acerra *Philolog. Cent. 2. Hiſt. 92*.

§. 5. Ex his exemplis facilè patet, aliam eſſe corpulentiam nimiam à corpore quadrato, aut ab habitu *ἰσαπέω*, qui definiente Gorrao in *Definit. Med. p. 122*. talis eſt, quem nec gracilem dicere nec craſſum poſſis. Tale namque corpus optimè diſpoſitum, & cujus maſſa ſanguinea in optima craſi conſtituta, omnes partes blando ſucco irrigat, & ita corpus ſucci-plenum ac carnoſum conſtituit, tantum abeſt, ut craſſities functionibus impedimento ſit, ut potius eas optimè ſingularique cum robore & vigore perficere valeat.

§. 6. Ea E. corpulentia nimia hic à nobis conſideratur, cum corporis totius i. e. primariò Trunci, ſecundariò pariter artuum peripheria, in tantum à laudabili nutrimento eſt aucta, ut actiones, inprimis quæ ad motum pertinent, aut impediat, aut tollat, aut vitiet, aliisve nocumentis corpus mulctet. A tali namque ſuffocatos nonnullos recenset Schenckius *Obſ. c. l. it. Timæus von Guldentlee c. l.* nocumenta nimiae craſſitiei verò alia Marcellus Donatus *c. l.* Sennertus *de Corpul. nim. pag. 21*. alique quamplurimi paſſim. Inprimis obefos nimis & corpulentos difficilius moveri, res notiſſima eſt. Cum namque ad motum fibrarum, mſculorum ſyſtema componentium, requiratur contractio & abbreviatio, ut venter mſculorum ex rhomboidea figura fiat ſerè quadratus, quam inſequitur oſſis alligati circa articulum motio ad certum angulum, ac quoad ſitum ejusdem immutatio, non poteſt ſane talis fieri contractio, ſi omnia iſta ſpaciola nutritiva materia ſint repleta & inſarcta, oſſiumque articulationes copioſâ pinguedine ita circumſeptæ, ut ejus obſtaculo eadem ſecti ac torqueri convenienter nequeant: ut ipſum taceam artuum nimia pinguedine obefſorum pondus, motui reſiſtens. Non poſſunt non quoque vaſa tam ſanguifera, quam lymphatica, ob arctiorem ſui compreſſionem, per partes extimas undique repletas & inſarctas, anguſtari plus minus, & ita naturalis fluidorum horum circulus minus turbari, & periculose nonnunquam ſiſti, adeoque ægri tales ſubinde ſuffocari. Hinc quo graciliora ſunt corpora, eo eadem (cæteris tamen paribus) agiliora; unde ſunambulo & agyrta, ſeu præſugiator, raro eſt corpulentus & obefus: ita ut rareſſimum ſit convenientis agilitatis in corpore tam inſigniter obefo exemplum à Platero cit. loc.

loc. adductum, & Catticro *Observ.* 13. ex Strada allatum.

§. 7. Augmentum hocce in corpulentia nimia, à legitima nutrimenti convenientis appositione fieri, modo dictum: ut discriminetur ita ab intumescencia corporis cachectica, & huius intensiori gradu, Leucophlegmatia & Anasarca: in qua ex vitiata alimentorum in chylum fermentatione, sanguinis vitiata crasis, (nam cacochylia est mater cacochymia) loco debiti nutrimenti, liquamen crudum & viscidum partium poris suppeditat, qui eodem infarcti, instar pastæ non ritè fermentatæ, inflatæ & tumefactæ apparent, ita ut impedito sic debito lymphæ motu à circumferentia ad centrum, cachexiam & leucophlegmatiam pressio pede Anasarca insequatur.

§. 8. Dum E. nutrimenti nimis copiosi appositione fieri corpulentiam nimiam diximus, quæ non nisi successivè & pederentim fieri solet, exclusam volumus subitanam corporis intumescenciam & inflationem, quale mirandum exemplum recenset Bartholinus *lib. 5. Hist.* 12. it. eam, quæ vel morsum Venenatorum animalium, v. g. Aspidum, viperarum, lacertarum, serpentum River. 4. *Obs.* 96. vel ictum & puncturam quorundam, v. g. scorpionum, apum, vesparum, l. contactum saltem mediante saliva, ☐a, aut halitu, aut busonum aliorumque quam plurium animalium, interdum insequitur. Quorum Venenum fermentativâ virulentia & Massam sanguineam & in specie nutritium succum seu rorem partes solidas humectantem turgescere & quasi spumescere facit. Nec mireris, tam insignem effectum ex tantillo veneni, nam & modicum fermenti integram massam fermentat; & spumæ ex cerevisia fermentante ebullientis modicum, magnam recentis cerevisiæ copiam fermentare facit: sic halitus fermentativus in Ae circumvolans vina fermentativo motu in cellis turbat, dum vitis floret: ast potentiora longè sunt animalium fermenta singulariter transmutativa, quorum vim vel fermentum æum aut scabiosum, in statu p. n. aut istud salivæ in statu naturali confirmat, de quo vid. Deusingius *Exercit. de Nutriment. in Corpor. Elaborat.* pag. 8. & *Append.* pag. 303. Quæ ipsa nobis in mentem revocant litem istam nondum decisam, in quo præcisè venenum animalium consistat. Egregio conatu, & indefesso pariter ac accurato scrutinio, speciatim hic defudarunt Fr. Redi *Medicus Florent. Italus, in Observationibus de Viperis*, script. in Lit. ad Dominum Magalottum: quarum versio latina *Misc. Acad. Natur. Curios. Anno I.* annexa est, & M. Charas *Pharmac. Parisiensis*, Gallus tr. Nou-

velles Experiences sur la Vipere, quorum ille materiale hoc ipsum esse, & in liquore flavescence intra gingivarum vesiculas coarervato consistere; hic verò merè ideale illud, & ex iracundia & vindictæ cupiditate in bestia exsurgere asserit: Presse terens hoc ipso vestigia Helmontii, idem ante ipsum jam asserentis, cui & Zwelferus in *Animadvers. ad Pharmac. August.* pag. 212. assentitur. Utrique experimentis & Phœnomenis hypothesin suam tueri satagunt, prout ex literis eorum mutuas & oppositiones & responsiones continentibus patescit, quarum Epitomen videre licet in Transactionibus Philosoph. Anglicis numero 66. 83. & 87. Componere equidem litem hanc annisus fuit Famosus Bourdelotius *Tr. Recherches & Observations sur les Viperes* &c. differentias animalium venenosorum & speciatim viperarum, venenisque earundem, pro regionum varietate urgendo, & quod liquor iste flavescens in regionibus calidioribus possit esse venenosus, qui in temperatis magis, aut frigidioribus, haud citra biliosos halitus effertatæ per iram Viperae nocivus esse soleat: Vid. ejus *Epitom. in Transact. Anglic. Anno 77.* neutra tamen dissentientium pars hac ipsa conciliatione contenta esse videtur. Nobis interim priorem istam hypothesin, in materiali scilicet principio fundatam esse venenosorum animalium venenum ceu probabiliorem complectere hac vice placuit.

§. 9. Hisce ceu spuris corporis intumescenciis, à corpulentia vera rejectis, legitimæ subiectum, seu id, cuius partis augmento corpus ita increfcit, considerandum. Determinatum fuit superius, crassios esse eos, qui secundum latitudinem & profunditatem augmentantur, ita ut hic excludantur ossa, quorum extensione & augmento, longitudo tantum corpori accedit, donec sub accretione adolescentiæ, sensim indurata, omne augmentum ulterius excludant, adeo ut & reliquæ his annexæ aut circumscriptæ partes, nec longiores evadere possint, unde tam brevioris, quam procerioris staturæ homines corpulenti sunt. Molles E. quod attinet, & primo quidem internas, viscerum excrefcencia nimia, in obesitate non, nec nisi per accidens observatur, & si unum alterumque viscus nonnunquam auctum fuit enormiter, hoc tamen peculiari tumore se prodens corpulentum neminem reddit: sicuti nec mulieres gravidæ, quarum uterina cucurbita extensa simul abdomen attollit insigniter, corpulentæ dici nequeunt. Externas E. quod attinet partes, se offerunt musculorum carnes, cum superstrata pinguedine, & membranosis velamentis. Tegumenta communia, ceu reticularis texturæ corpora, ad investitarum partium se

[LII II 3]

accom-

accommodant structuram, & ita caro musculorum & pinguedo remanent istæ partes, quarum respectu inprimis corpus crassum, macre itidem, ac macilentum appellatur. Idque ferè triplici sub differentia: nunc enim plus adeps, ut in obes; nunc magis caro, ut in torosis aut lacertosis; nunc utrumque æqualiter, in corpulentis in specie sic dictis, augetur. Aliàs duplex saltem corporis crassities statuitur: una quidem carnosa, ut in sanguineis; alia saginosa, ut in Phlegmaticis vid. Forestus *lib. 31. Obs. I. Schol.*

§. 10. Pinguedinem quod attinet, hæc est pars ea, cujus nimium incrementum pingues & obesos reddit, etiam quibusvis partibus cæteris optimè & laudabiliter constitutis ac conformatis. Singulare autem quid præ cæteris partibus hæc ipsa obtinet, cum ambigere inter partes solidas ac fluidas seu humiditas, & mediæ quasi has inter naturæ esse videatur. Nam eo ipso, quo citra omnem fluiditatem propriis suis terminis subsistit, & invicem solidam formam coheret, adeo ut cultro quoque scindi queat, vasis quoque sanguiferis suis instructa sit, non potest non solidis partibus meritò annumerari. Dum vero fluidorum instar, pro vario corporis statu, nunc copiosius coacervari, nunc absumi penitus, & liquefieri quasi sub febrium, præsertim acutarum, ardoribus, aut in gelatinam solvi, de quo *Miscell. Nat. Curios. anno 8. Obs. 3. p. 54.* observatur, adeo ut corpus tunc perquam macilentum reddatur, brevi tamen iterum pinguescendum, quin etiam naturaliter quibusdam animalibus loco nutrimenti, defectu ejusdem ordinarii inserviat, ut sunt ursus, murmentum, glires, &c. quæ per integram hyemem intra latebras suas, dormientibus plus minus similes delitescunt, quorum copiosior æstivis mensibus coacervata pinguedo sustentat tunc temporis eadem: notabile hoc inprimis est in Murmento, quod triplex, item interdum quadruplex, Omentum obtinet, unum instratum alteri, ex quibus quædam venas habent, ordinario tramite ad portam venam recurrentes, quædam v. carundem ad venam cavam abeuntes, quocordis sub penuria ista in hybernaculis immediate transmittant materiam nutritivam, quam sacculi adiposi abundantiorē reservarunt, & quam ab arteriis receperunt, cum corpus totum succi plenius, in æstate vel potius autumnō abundaret nutritio tali succo, ut eleganter hoc observavit Perrault *Essays Physiq. T. 3. c. 6. p. 293.* Præterea fluidorum instar debitæ suis canalibus & ductibus, ceu vasis, coercetur, in specie ductus adiposi dictis, prout constat ex accurata eorum anatomica recensione, Anonymi *Exercit. de Omento, pinguedine & adiposis ductibus,*

*Tetradi Epistolar. Anatomicar.* Malpighii & Fracastor. annexa. Hinc etiam nullæ propriè dictæ functioni inservit, cum nullam specialem habeat conformationem organicam seu mechanicam, in qua tamen potentia operandi partium solidarum consistit, quin vel ornatui, vel defensionis ac fotui aliarum partium tantum inserviat, minus commodè solidarum partium catalogo inseri posse videtur. Adeo ut dicendum videatur pinguedinem per accidens ex abundantia succi nutritii & chylosi, sub & post augmentationis annos generari, membranosis locis adherere, & intra sua membranosa conceptacula pedetentim dilatata inclusam, successivè coagulari. Uno nomine esse quasi oleum uberius, aut potius butyrum densius, firmitus paulo inspissatum & coagulatum. Illustrant hæc experimenta oleorum, ab acidis in adiposum concretum coagulatorum, oleum scilicet olivarum Spirit. Diassulsum, facili digestionē congelatur tandem in albam pinguedinem seu candidum butyrum, saltem ab Ac liquabile. Id quod pariter cum oleo amygdalarum dulcium & Aq. Fort. eodem modo succedere solet. Non secus ac serum quod sanguini V. S. emisso supernatat, à Spir. Si promtè in crassamentum viscosum, quasi caseosum coagulabile existit, gelatinam scilicet chylosam contentam intra inspissatam & per texturæ mutationem condensata. Adeoque non adeo ineptè Grew *Discours. of Mixture pag. 90.* suspicatur, pinguedinem animalium esse saltem coagulum oleosarum sanguinis partium, factum vel à propriis ipsius acidis particulis, l. à Oso aëris Spir. cum ipso permixto. Hinc probabile esse asserit *pag. 91.* quod animalia quædam, ut cuniculi, item colluriones pinguescant magis frigido sub tempore: quatenus oleosæ sanguinis (vel ex nostra mente, oleosæ chyli h. e. butyrosæ) partes tunc extraordinarie coagulentur ob majorem abundantiam particularum Osoarum, ab aëre intra eorum corpus receptarum. Ob eandem rationem quoque esse, quod pinguedo animalium terrestrium durior sit, cum illa piscium sit mollior, & magnam partem in oleosam formam diffluat: scilicet quia aqua, quam incolunt, & quæ respirationis usui inservit, paucas in se habet Osoas particulas, respectu earum, quæ aër obtinet. Hinc etiam Fr. Baco *de Verulamio Hist. Vit. & Mort. §. 49.* asserit, animalia quæ potant ex Oso, manifestè pinguescunt, quod signum est frigidi in Oro. Plura de Pingu. V. Sebizi *lib. de alim. Facult. lib. 5. Quest. 12. 13. pag. 1217.* & Casp. Bartholinus Senior *Controv. Anatom. de infim. Ventr. Quest. 1. 2. 3. 4. p. 269.* Speciatim Cecili Folii Itali, Discursio Anatomica circa generationem & usum della pinguedine &c.



§. 11. Præter pinguedinem & musculo-  
sa caro est, quæ corpulentia nimia sub-  
jectum constituit, quando & ipsa turgescit  
p. n. & ita insigniter interdum crassescit, ut  
notabiliter artuum ac corporis molem au-  
geat. Talis olim Athletica habitudo, carno-  
sa scilicet plena & robusta dicta fuit, qualis  
Athletarum erat, quem non Naturâ sed arte  
comparabant sibi, ut multâ solidaque carne,  
& sanguinis tenaci & optimi copia abunda-  
rent. Neque enim vires tantum, sed etiam  
molem pondusque corpori adicere conaban-  
tur, ut hac etiam ratione adversarium pro-  
sternerent. Hinc factum est postea, ut eô  
quoque nomine omnis corpulenta & firma  
habitudo vocaretur, etiam in iis, qui athle-  
ticam non exercebant, & quam Hippocrates  
censet non esse secundum Naturam, sed neu-  
tram potius: Vid. Gorreus *Definit. Medic.*  
p. 7. De carnea vero hac mole, par fere atque  
modo de pinguedine ferendum iudicium. Est  
scilicet nil aliud, quam sanguinis copiosioris  
firmius & uberius circa fibras nerveas motri-  
ces coagulum, harum robori pariter ac tu-  
telæ aliâs naturali in statu inserviens. Sunt  
præterea, qui carneas partes, non nisi quas-  
dam particulas rubicundas sanguinis grume-  
factas, & inclusas membranæ subtili, tan-  
quam tenui vasculo, unde diuturnâ etiam  
coctione elici possunt, adeoque mentiri tan-  
tum carnosam substantiam, afferant, quod  
tamen tanquam adhuc paradoxum, vel obi-  
ter saltem attigisse sufficiat. Hæc duo E.  
adeo uberius, & caro copiosior, nunc soli-  
tariæ, nunc sociatæ, Corpulentia nimia sub-  
jectum proximum statuenda esse, ex dictis  
concludendum videtur.

## ARTIC. II.

Causam Corpulentia nimiae proxi-  
mam scrutatur.

## §. 1.

Nutritius succus perenni motu corpus  
alluens, ut nutrit singulas partes, eas-  
que auget, ita abundantior nonnihil, & to-  
tum corpus succulentum reddit, & in specie  
circa membranas nonnullas laxiores coacer-  
vatus, sensim in pinguedinem incrassatur,  
circa fibras vero congestus, in carnem cogi-  
tur. Quod si his ipsis sociemus ea, quæ  
*suprà Artic. 1. §. 2.* præliminariter quasi  
monita fuerunt, vel sponte, citra ulterius  
scrutinium devolvimur ad corpulentia nimia  
causam. Hanc enim proximam bipartitam  
facimus, eamque tam materialem succi nu-  
tritii insignem abundantiam, quam occasio-  
nalem, quarundam membranarum in spe-  
cie, sic dicti panniculi carnosi, & exterioris  
cutis laxitatem, & quasi nimiam mollitiem,  
ut & fibrarum nervearum plurium extensi-

lem tenacitatem, & quasi porosam imbiben-  
di aptitudinem constituimus, his enim præ-  
sentibus causis, succus nutritius omnes par-  
tes ubertim humectat & irrigat, & præterea  
circa dictas partes sensim coacervatus & coa-  
gulatus corpulentiam producit nimiam. De  
Formali seu efficiente causa, quæ forsitan as-  
socianda tertio loco fuisset, inferius pauca,  
quæ monenda occurrent, attingenda erunt.

§. 2. Hæc ut fiant nonnihil clariora, suc-  
ci nutritii natura primo indaganda venit.  
Sanguinem nutrimentum esse corporis uni-  
versale, & ita etiam scaturiginem pinguedi-  
nis, & carnositatis nimia, Veterum unani-  
mis, multorumque adhuc recentiorum est  
sententia. Vid. Senn. *l. 5. Prax. Part. 1. c. 4. p. 22.* & Ferdinandus *Consil. 82.* sed  
hanc opinionem non leviter concusserunt  
Angli, vid. Charleton *Oeconom. Animal. Exerc. 5. de sangu. Usu.* Glyss. *Anat. Hepat. c. 45. p. 406.* Ent. *Apol. Circulat. sangui. Contra Parisan. Digress. 3. p. 69.* ut  
nihil dicam de Willisio, qui passim in suis  
scriptis quoad hoc punctum, consulendus  
venit. Quibus tamen se opposuit Deusing.  
*Exerc. de sangu. Usu,* item Steno *in obs. de Gland. & novissimè Piens de Febr. p. 1. p. 153. 163.* ubi Glissonii & Entii argumenta in  
specie ventilat, alique plures, quibus per-  
tinacius Veterum vestigiis in hoc puncto in-  
sistere placuit.

§. 3. Illi ipsi E. duplex statuunt corporis  
nutrimentum, sanguinem unum, pro parti-  
bus sanguineis, & liquorem roscidum per  
nervos in partes derivatum, pro partibus  
spermaticis s. nervosis, & ita etiam pro pin-  
guedine, ita ut causa obesitatis nimia futu-  
ra sit abundantia talis succi per nervos influ-  
entis, Vid. Charleton & c. *suprà cit. it. Wil-  
lis Anat. Cerebri.* Quibus acriter se opponit  
Deusing. *Exerc. de Comment.* succi nutritii  
per nervos influentis, it. Bartholinus *in Spi-  
cileg. de vas. Lymph.* & sanè hæc ipsa opinio  
adeo paucis arrisit, ut nullos nisi ipsos An-  
glos & paucos quosdam Italos agnoscat de-  
fensores, & vix probabiliter persuaderi pote-  
rit cuidam, qui nervorum structuram sub-  
stantiamque rectius paulò considerat. Quin  
modo materiam nutritionis, ab hujus cau-  
sa efficiente sive universali, in quo puncto  
Spiritus animales influi omnino primariam  
mereri considerationem videntur, sive par-  
ticulari, ritè discernamus, haud adeo diffi-  
cilis ad argumenta illorum videtur respon-  
sio.

§. 4. Dubius jam erat, quoad nutritio-  
nem, sanguinis usus, non minus etiam suc-  
cus nervorum nutritius, en E. novum Bilssii  
commentum à Zasio explicatum, & hypo-  
thesi Helmontianæ, quoad sextuplicem di-  
gestio-

gestionem, & quoad naturam & usum laticis applicatum, & quantum possibile à Deusingio, aurito tantum, minimè vero oculato teste, defensum. Vid. Deusing. *Append. ad Exerc. de Nutrim. elab.* Bilsius E. ejusque sectatores loco illius nervorum succi nutritii rorem substituit, hunc nempe liquorem, quem omnes reliqui anatomici Lympham appellant: hunc rorem ex primis viis, seu centro per vasa rorifera, (ab aliis lymphatica) in totum corpus seu circumferentiam dispergi asserunt, ut veri partium spermaticarum alimenti vices obtineat, prætereaque partes sanguineas ita præparet, ut sanguinis nutritionem facilius suscipiant. Causa E. corpulentiae nimiae, juxta hanc opinionem, erit roris istius nutritii uberius copia, & laudabilior constitutio, quo ut uberius nutriantur partes spermaticae, & copiosius succrescat pinguedo, ita etiam sanguinea majus capiant incrementum, ob majorem aptitudinem, per hunc rorem inductam. Sanè elegans admodum hæc est opinio, & per quam multorum phenomenon difficillimorum, tam in theoria medica, quàm ejus praxi, facilis & perspicua possit reddi ratio, modo vera esset; Sed ea sufficenter rejecta est ab omnibus fere Anatomicis, in specie Bartholino, Sylvio, Hornio, & in primis Pauli, in Anat. Bilsiana & quorquot unquam accuratius & curiosius vasa lymphatica, seu Bilsii rorifera lustrati fuerunt, dum clarè demonstrant, motum in his vasis contenti liquoris, contrarium esse Bilsio, & à circumferentia ad centrum, tandemque ad cor procedere, præterea valvulae horum vasorum, à Ruyschio ipsi Bilsio demonstratae, hunc tantum non obstruere fecerunt. Mortuo E. jam Bilsio, & sepultis cum eodem secretis ejus anatomicis, ac enchirisiis, metuendus omninò simul & horum assertorum interitus.

§. 5. An E. sanguis solus corpulentos & succulentos nos reddit? Nequaquam, quin potius lac, ut nutrit infantes tenellos, ita etiam cum sanguine sustentat & corpulentos reddit robustos adultos. Chylus scilicet, ut genuina & legitima est lactis materia, ita idem sanguini in axillari sinistra permixtus & aliquoties circulatus, non statim abit in sanguinem, sed sub lactis suavissimi forma aut sanguini confusus, aut sub gelatinæ albicantis larvæ à sero, seu nutrimenti vehiculo solutus, mediantibus vasis sanguifluis, in totum corpus distribuitur, omnesque ejus latebras perreptat, partes nervosas seu spermaticas nutrit, & abundantior paulò à membranis receptus, per eas transsudans, & superficie earum inhærens, in pinguedinem succrescit, dum interea sanguis reliquus

temperatus, sanguinea parenchymata nutrit, & præ cæteris muscutorum fibras copiosiori carne incrustat. Cui sententiæ præter alios adstipulantem vid. Bartholinum *Cent. 2. Ep. 65. p. 612.* it. *Cent. 3. Ep. 38. p. 141.* Schneiderum *de Catarrhis l. 2. p. 85.* it. *lib. 3. p. 95.* Fr. Bayle *Dissert. 3. de usu lactis.* Quo spectat etiam gelatina ista feri lactea Barbari, in elegenti tract. de Sanguine & ejus sero, quæ nihil aliud est, quàm chyli portio, sub feri tegmine occultata, tam pro nutrimento partium nervearum & his cognatarum, quàm pro aliis usibus per universum corpus distributa. Imo, quicquid contra sanguinis asperitatem pro succi nervei benignitate in puncto nutritionis Angli tantoperè urgent, quamdiu intra materiæ nutritivæ limites subsistunt, optimè chylo, sanguini nondum assimilato, diuturno tamen cum eodem circulo certo modo alterato, applicari potest. Quæ ipsa non parum illustrat experimentum, quo anserum probè saginatorum, mactatorum, sanguinem, ubi refrixit, albissimolacte supernatante cooperiri constat! secus ac in iisdem non æque saginatis fieri observatur: vid. Borrichii *Herm. Ægypt. Sap. p. 262.*

§. 6. Sane butyrosa lactis seu chyli (levis namque hæc intercedit differentia) substantia, similis quodammodo est (densiori saltem) corporis pinguedini, unde eadem ferè obtinent proprietates. Cum è contra sanguinea massa, asperior paulò ac thinoacrior minus commoda videtur, ut pinguedo ex ea generetur, & unde proprietates utriusque in specie color (in sanguine adeo pertinax, ut quosvis alios potius, quàm candidum ipsi conciliari queas, nisi totalem ejus corruptionem in pure, quod tamen solum ex sanguine constare, minus verisimile videtur, urgere velis, minus tamen huc quadrantem) in multis discrepant, hinc & sanguineis partibus immediate nuspiam adhæret pinguedo, quin membranis tantum nervosis adnascitur. Unde & ea animalia, in quibus acrior sanguis, concitatori motu intestino, citius chylum in sanguinem transmutat, parciores habent pinguedinem, v.g. canis, equus, lepus, at ea, quorum sanguis temperatus, blandius & parcus, chylum transmutat, copiosa abundant pinguedine, suntque corpulenta, ut porci, ursi: id quod similiter in genere humano obtinet. Hinc & aliquando observatum, quod talibus obesitas per umbilicum serosus quidam humor, i. e. vehiculum cum contenta gelatina lactea nutritia evacuat fuerit, vid. Sennertus *c. l. p. 22.* Sed hæc ulterius confirmabunt res naturales, & non-naturales ad corpulentiam nimiam disponentes: de quibus infra.

§. 7. Massa E. sanguinea copiosior eaque minus

minus  $\Theta$ ina, acris & aspera, sed suaviter temperata existens & simul blando & dulci chylo, eoque copioso turgida, homines reddit corpulentos, ibiquidem carnem musculosam, hic substantiam pinguedinis notabiliter augmentando. Ut v. talis fiat, præter radicalem & feminalem sanguinis crasin, secundum quam & chyli assimilatio, & solidarum nutritio, aliique ejus usus variant, multum momenti situm est in stomachi digestionem, qualem scilicet chylum hic ex alimentis fermentando producat, cum fontalis stomachi digestio rectè gubernatrix cæterarum, velut sibi subalternatarum, dicatur ab Helmont. *Tr. Jus Duumviratus* §. 59. sæpè namque occurrit Capucinus, longo jejunio gravatus, potuque paucò & parvæ cerevisiæ saturatus, crasso tamen corporis habitu dotatus. Ex adverso cernuntur edaces largoque mangonio educati, insigniter macilenti: ut idem cit. l. loquitur. Variat enim non tantum in singulis animalium speciebus digestionis ratio, unde panis idem tot varia dat stercorea, quot animalia pane vescuntur, ex diversitate nempe digestionis, sed unumquodque etiam individuum humanum suâ hic gaudens specificâ differentiâ, determinatè modoque ac ratione ab aliis individuis distinctâ, eadem licet assumpta digerit, unde & eorundem major vel minor ad nutriendum aptitudo. Quotidie scilicet id observare licet, eadem alimenta, pro chylicationis naturali modo procedentis, vel p. n. lætæ ratione, illum nutrire & sustentare, hunc verò lædere, secundum Hippocratis istud verissimum Effatum, corpora impura, quo magis nutriveris, eò magis læteris, uti & iisdem, hunc insigniter augmentari, illum verò parum vel nihil mole corporis accrescere. Ratio proximè in M. S. remotè verò & fundamentaliter in chylo, hujusque præparatione ac constitutione investiganda, qualis enim hic, talis sanguis, tales Spiritus (cætera omnia in œconomia animali si ritè procedant) & tale per consequens nutrimentum corporis.

§. 8. Haud latet nos eundem, multum aliàs hic tribui Hepati, cujus temperata constitutio, in specie calida & humida, ut sanguini simili, eoque propterea nutritivo insigniter, generando, ita consequenter tam carnis, quam adipis abundantia, primariò inserviat, cum dogma tale præter veteres Scriptores quosvis, in specie ex Sennerto cit. *scæpius loc. p. 22.* hauriri pluribus queat. Sed quo minus huic assentiamur impedimento, sunt binæ falsæ, quibus sententia hæc innitur, hypothesès, primò scilicet illa, de hepatis in sanguificatione principatu, deinde ista, de calido nativo quarumvis actionum

Tom. II. Pars 2.

similariū primario autore & artifice. Nam quoad priorem illam notum est: jamdudum hepatis publicas à Th. Bartholino ductas esse exequias, adeò ut ejusdem defuncti, & exauctorati jam desperata videatur causa (vid. Th. Barthol. *sub hoc Tit.*) utut D. Schwammerdammius, Anatomicus Excell. Amstelodamensis, secundum experimenta Hornii, Lugdunensium olim Anatomici dexterrimi, hepatis resuscitationi aliquam opem ferre promiserit, in lib. *de Uteri muliebr. fabric.* quod tamen, morte immaturâ præventus, præstare haud potuit; Contra quam tamen jam C. Bartholinus Junior calami aciem in hoc negotio strinxit, *de diaphragm. structur. p. 64.* Posteriores vero quod attinet, temperies illa partium calido nativo adscripta, ut consequens est vitæ, & effectus quidam potestatum vitalium, ita minimè ipsi tanti ponderis functio, nonnisi potentioribus agentibus conveniens tribuenda venit, cum à sanguinis & spirituum influorum crasi, temperies ista potius dependeat, tantum abest, ut ab hoc sanguis suam crasin & perfectionem recipere debeat. Concedendum est de cætero, prout bilificationi, (si loqui ita licet) præest hepar, hujus respectu non adeò negligendam esse in nostro negotio, ejus considerationem. Multum enim omnino in recessu habet bilis debitè constituta, pro chyli debita perfectione, quâ vitiatâ, & vitiatas distribuitur chylus, & cacochymus generatur necessario sanguis, ipse jam à debita crasi plus minus deficiens, prout istud hepatis circa bilem ex sanguine eliciendo officium, plus minus læsum fuerit. Uti itaque plurium viscerum, pro chyli & sanguinis perfectione absolutâ, mutua & concinna est conspiratio, ita hæc inter hepar ferè primatum obtinere videtur; adeò, ut quo magis temperata & oleosa dulcis bilis ab eodem conficiatur, eo magis corpulentia augenda, quò acrior v. &  $\Theta$ sior, eò magis eidem imminuenda conferre probabile sit. Quæ tamen latius deducere, præsens nostrum minimè fert institutum.

§. 9. Lactea hæc sanguinis massa apta est, ut corpulentos nos reddat, modo aptitudo partium respondeat, quas copioso succo nutritio irrigare, & circa quas in pinguedinem ac carnem concreescere assolet. Hæc E. est altera causa corpulentia proxima, nempe pororum & spatiorum amplitudo, inter fibras partium molliores paulo, ac speciatim circa membranas, partiumque harum mollities, & obliquens tenacitas; circa priores enim illas carnem, circa has posteriores verò concreescere pinguedinem, notum est; idque tam quoad fibras & membranas partium internarum, in specie abdominis & thoracis, quàm primario circa membranas ex-

[M m m m m]

ternas,



ternas, intra panniculum carnosum & cutim, fibrasque musculorum trunci & abdominis. Quantum enim receptivitas nutrimenti uberioris harum partium, in qualitatibus istis fundata, momenti ad corpulentiores habitum seu copiosiores nutritionem conferat, vel ex ossibus addiscere licet, quæ semel duritiem ac robur debitum ubi acquisiverint, ulteriori incremento aut quamvis in dimensionem extensioni inepta evadunt: Fracta v. ob pororum p. n. ampliores capacitatem, & interstitia fibras inter induratas in loco fracturæ spatiosiores, uberius nutrimentum mox recipere & retinere observantur, quod in callum sic dictum, subinde insignis magnitudinis, tandem abit. In Corpulentiori itaque habitu, dum lacteus sanguis ad partes modo dictas alluit, earum porulis sese insinuat, & dum musculorum & panniculi carnosissimi fibræ sanguine augescunt, ipsæ membranæ musculorum lacteo nutrimento implentur, cujus abundantia externè cutim versus transudat, quia internè fibris musculorum sanguine vestitis adeò commodè adherere nequit; ipsa vero cutis, ex extremitatibus capillaribus arteriarum, venarum & nervorum reticulatim contexta, dum per glandularum minutarum ipsi intertextarum excretoria vasa, ut &, si qui sint præterea, poros in specie sic dictos, insensibilis transpirationis materiam vaporum forma transire permittit, crassiusculum lacteum nutrimentum cum sanguine allatum externorum pororum angustia cohibet, quod ita introrsum versus coercitum successivè in corporis peristroma adiposum densatur.

§. 10. Passivæ fuerunt, ut sic dicam, causæ corpulentiae nimiae, quas hactenus pertractavimus, cum objectum materiale, uberius nempe nutrimentum, & subjectum recipiens, laxior scilicet fibrarum & membranarum textura, saltem considerata fuerunt. De formali v. seu efficiente, quod nutrimentum copiosius dictis locis assimilatur & agglutinat, altum hucusque silentium. Sed cum efficiens corpulentiae nimiae, seu nutritionis p. n. aucta, idem omnino existat cum eo, naturaliter quod nutrimentum assimilatur, hoc ipsum simpliciter ex physiologicis præsupponendum fuit, cum nihil peculiare in pathologica consideratione de eo monendum occurrat, siue animam, siue spiritum influum, siue insitum, siue fermentum, siue ideam, siue acidum, siue calidum innatum, majori subinde verborum, quam rerum differentiâ, illud asserere velimus. Hoc saltem vel obiter monuisse sufficiat, 1. Cerebri & cerebelli, horumque, ut sic dicam, influentiae, non parvam in nutritionis & augmentationis negotio efficaciam esse for-

malem, ut vel distorti, gibbosi, luxati, paralytici, &c. persuadent. 2. Præter tamen efficiens nutritivum totius corporis, & quasi universale, particulare præterea in quavis parte singulari necessario requiri quasi insitum, ratione cujus universale illud principium determinetur ita, ut idem nutrimentum in hujus partis substantiam præcisè convertatur, quod in aliâ, in aliam quoque, & quidem specialem illi parti naturam, abeat. 3. Modum illum, quo nutrimentum ex fluido in solidum abeat, sub assimilationis actu in nutritione, vix clarius concipi, & evidentius explicari posse, quam per coagulationis rationem, cujus primaria instrumenta quasi mechanica, ut aliarum plurium in corporibus mixtis mutationem, sint duo illa acidum & alcali (seu terr. vol.) animalibus tamen, specifica.

## A R T. III.

*Causas remotas indagat.*

## §. 1.

Fuerunt hæ causæ proximæ, remotas quod attinet ad corpulentiam nimiam disponentes, ex omnes in hoc conspirant, 1. quod aut massam sanguineam temperatam & lactescentem, aut fibras tam carnosas, quam membranaceas nonnihil molliores, & quasi laxiores reddant, unde pororum faciliior dilatatio, adeoque recipiendi ac retinendi copiosum nutrimentum prompta aptitudo: 2. quod multum nutritivi addant corpori, parum verò eidem detrahant. Constitutio Spirituum & massæ sanguineæ radicalis seu seminalis, taliter temperata, quæ blando motu intestino, quasi fermentativo, moderatè corpus incalefcere facit, succumque nutritivum minus citò attenuat, aut quasi colliquefacit, sed potius chylum tardius sibi assimilatur, ad corpulentiam inprimis facit, & hoc est, quod temperamento calido & humido vulgò attribunt. Naturâ scilicet quidam præ aliis dispositi sunt, ut corpulentiores evadant, adeò ut reperiantur familiæ, quæ plures corpulentos, sicut aliæ, quæ proceros, aliæ, quæ minores progenerare solent: Scilicet sicuti vegetabilia inter, sub eadem specie v. g. arborum quædam lege naturæ proceriores, aliæ humiliores, aut fructuum quidam crassiores & grandiores, alii minores, & depressiores esse solent per traducem seminalem, quæ proprietas ulterius eodem modo multiplicatur, ita vegetatio animalium simili ratione prima fundamenta ex seminalibus primordiis omnino haurit. 2. Ætas ascendens & consistens. In talibus enim nutrimentum, quod sub accretionis annis in augmentum corporis, in specie quoad longitudinem non omne impenditur, coacervatum successivè corpu-

corpulentos ferè reddit. Non secus ac infantes ut plurimum corpulentiores, ob nutrimenti lactei ubertatem, & ob fibrarum extensilitatem, pororumque amplitudinem observari solent. Ex quibus facilè ac sponte ferè patet, quare 3. fœminæ præ maribus magis corpulentæ sæpius fieri soleant. Id quod effectivè per temperamentum frigidius vulgo explicare solent. Quo ipso nihil aliud insinuat, quàm contentorum corporis crasis magis temperata, ex qua minor caloris effectus procedit, quàm in maribus, in quibus illa volatilia & acriora ferè esse solent.

§. 2. Inter res nonnaturales primum occupat locum Aër temperatus, aut saltem minus æstuans, hinc tempus hyemale & vernum; his enim anni tempestatibus succi nutritii major abundantia: nam sub frigore hyemali sumus ordinariò edaciores, contenta quælibet spissiora & respectivè magis condensata existunt, & tamen ob ambientis conditionem, ex pororum majori conniventia, corpus minus exhalat: vernò verò sub tempore sanguis turgescens, instar vini recentis, copiosum nutrimentum chylosum generat & suppeditat. Regio temperata, inprimis non nihil borealior; qualis enim aër, talis ut plurimum massa sanguinea: hinc Germani corpulentiores Gallis & Italis. Aër frigidus item crassius magis ad corpulentiam disponit, quàm subtilis, id quod & antiquitus observatum; sic enim Boëtii sunt pingues, id quod innuit Nepos in *Alcib.* & Horatius *L. 2. Epist. 1. ait*:

*Boëtium in crasso jurares aere natum.*

Subtilis enim volatilem nimis massam sanguineam & nutrimentum corporis nimis volatile & subtile reddit, unde facilius postmodum ac copiosius insensibiliter dissipatur.

§. 3. Quamvis Loffio, Societatis Jesu Theologo, in libro suo diæterico, cibi & potus mensuram, quâ unicuique suam portionem singulis diebus admetiri conatur, relinquamus: cum universalis mensura determinari nequeat, partim ob idiosyncrasiam, partim ob vitæ generis varietatem, alias ut taceam circumstantias, nihilominus tamen certum est, quod Cibus & Potus copiosior, aut magis temperatus, & ob id uberior nutritivus multum hic valeat: modo stomachi digestio una conspiret, ut supra monitum. Hinc enim ex omnis gravioribus exercitiis, sequente otio & lautâ victus ratione, molem corporis cujusdam immodicè auctam, refert Trincavellus *l. 3. consil. 101.* Panis præsertim multum confert, qui non tantum per se admodum nutrit, sed etiam liquefcens in cremorem, propter acidum fermentativum in panificio susceptum, & beneficio salivæ in masticatione resuscitatum, instar apposti

fermenti, aliorum alimentorum digestionem, ut magis evadant nutritiva, adjuvat. Hinc etiam panis, rectè Theriaca Alimentorum audit. Vid. Helmont. *Tr. Victus ratio.* Confirmatur exemplis à Cattiero *Obs. XII. & XIII. p. 45. & 46.* (Borelli *Observ.* annexis) allatis, ibi quidem quantum panis dosis aucta, ad laudabiliorem corporis habitum, hic vero quantum eadem imminuta, ad gracilitatem disponat. Passulæ Corinthiæ dictæ, pinguefacere dicuntur Joël in *Praxi* it. Riverio *Obs. 43. Cent. 4.* sunt enim revera succi perquam temperati, (cujus respectu vulgo calidæ & humidæ dicuntur, quin & Veteribus hepar corroborare: Hinc quibusdam decoctum passularum cum Rad. Cichorii in Marasmo seu contabescencia corporis, est perquam conveniens) qui asperitatem & acrimoniam Sinam massæ sanguineæ emendat, indeque ipsi talem crasin largitur, quâ aptior redditur uberiori nutritioni.

Post Passulas semina oleosa temperata, ut amygd. dulc. pineæ, pistaciæ, it. mucilaginosa & reliqua farinacea, milium, hordeum, triticum, similiter nutriunt: unde & Cereviliæ, primario triticiæ hinc & hordeæ sunt nutritivæ.

Lactis & butyri uberior usus, ut atrophie scorbuticæ medetur, acrimoniam sanguinis acidulam vitiosam temperando, & emaciatos quosvis ac tabidos denuò pingues reddit: ita omnibus hominibus sanis, qui reddi corpulentiores amant, insigniter convenit: en quam pingues & succulentos facit infantes? inprimis lac muliebre, quod & semen genitale augmentat, & in æm armat, vid. Forestus. Unde lac equinum, cum pauco saccharo ad atrophiam ex philtro commendatur ab Hartmanno. Accensenda his sunt ova recentia mollia, carnes pullorum gallinaceorum, aliorumque juniorum animalium partes, earumque gelatinæ, & sexcenta alia, quæ quò temperata magis, & mucilaginosiora, eò potentius nutritiva, & corpulentia augmentativa.

§. 4. Somnus & quies insigniter impinguant, existunt enim tunc fibræ laxæ, ceu in figura media constitutæ, porique ac interstitia sic erunt quoque ampliora; præsertim cum tunc demum assimilationis actus & motus sit in vigore, cum omnis localis motus cessat, qui cum obturbet: ut rectè hoc deducit Fr. Baco de Verulamio: *Hist. Vit. & Mort. §. 3. p. 155.* Nam vigiliis, & in specie crebriori motu, agitata & circulata massa sanguinea celerius, fermentatione ejus intensiori reddita, incalescit insigniter, & ita colliquefacit succum nutritium, cumque ita tam insensibiliter, quam sudore tenus dispergit. Videmus hoc in ursis, hystricibus, muribus

[Mmm mm 2]

mon-

montanis, similibusque animalibus, quantum quies & somnus valeant, qui tempore hyberno in latebris quiescentes somno sepulti, in speciem crassiores & pingiores evadunt: partim quod intra omentum, aliaque viscera interna, collecta pinguedo, de quo supra, successive attenuata, sub nutritionis partium nervosarum munere, indeque & alia quoque in loca distribuatur, & ibidem sub torpore illo agglutinata, aliqualem copiosioris pinguedinis speciem repræsentet: partim quod sanguis eorum, ex voracitate prægressæ æstatis, chylo crudiore abundans, hunc quantum ejus possibile sibi assimilatum, in nutrimentum partium sanguinearum impendat, crudiori & quasi pituitosior ejus parte, partes solidas obsidente, & sub habitu plus minus Leucophlegmatico, corporis peripheriam occupante, ac speciem corpulentioris habitus repræsentante. Id quod facile fieri contingit, dum sub ista quiete, & rara conspiratione, tardior est motus sanguinis localis, remissior intestinus, unde tardissima sanguificatio, paucissima transpiratio, parcissima nutrimenti absumptio; Confer. quæ habet Pechlinus *de Aeris & alim. Defect. p. 67. & 68.*

§. 5. Quoad excreta, si eadem, inprimis per ☐ & sudores sint pauciora, corpus pinguius reddunt; cum enim serum vehiculum sit alimenti, eo copiosius excreto, nutritius succus simul uberius evacuator. Præter cætera omnia, excreta 2ea imminuta, corpus crassescere faciunt: animalia hoc testantur, quæ eo tempore, quò cessant à 2e, pingua evadunt: aut urgente seminis orgasmo, statotempore, quando 2i inhiant, emaciantur: ratio est, partim quia blandior chylosus & nutritivus succus M. Sæ detrahitur, & in supplementum seminis impenditur, partim quia à Spiritibus genitalibus, aut singulari testium fermento, sanguini permisto, hujus massa insigniter quasi effervesceat, unde acrior, volatilior & calidior ea facta, minus nutrit, dum promptè nimis, quicquid chyli (tunc temporis ob simul alteratum & acrius redditum ventriculi fermentum) minus nutritivi ipsi distribuitur, assimilatur: His scilicet ex causis, noviter maritatis, Tabes dorsalis est frequens, & Veterinarii è contra, castrando bruta, eadem esui aptiora reddunt, quia pinguiora & succulentiora evadunt. Pertinent huc alia consuetæ, præsertim sanguinis, evacuationes suppressæ: Quâ ratione mulieres post cessantem menstruam uteri hæmorrhagiam aut deficiente conceptione, aliàs solita, habitiores fieri, & notabiliter subinde excrecere solent. Ut taceam Spirituum influorum sub 2eis actionibus dispendia, quorum defectu qualibet actiones torpent, unde

& coctio partium privata quoque ab iisdem minus commodè perficitur.

§. 6. His tandem conjungendi sunt Animi affectus, qui moderati, aut nulli, adjuvant corpulentiam, quibus minus agitata M. Sæ blando motu circulatur: gaudium moderatum conducit. Ira nimia, curæ nimia, non minus quàm motus aut vigilæ, macilentos reddunt. Ratio ex hæcenus dictis collectu facilis est.

§. 7. Ex Rebus Præternaturalibus nil est, quod pingues reddere valeat, nisi per accedens nonnunquam febribus corpulentia succedat: quale Exemplum habet Sennertus *Lib. 5. Prax. p. 23.* quatenus per febrilem effervescentiam, principiis suis activis Өis admodum depauperata Ma Sæ, quicquid recipit chyli, sub remissiore, tam progressivo, quam intestino motu, tardius assimilatur, minusque de eodem insensibiliter dimittit; unde temperata eadem facta & quasi semilactea, arefactas fibras & membranas uberius humectat, & rore nutritivo mitiore, & respectivè uberiore perfundit, unde corpulentior habitus extimi facies.

§. 8. Signa hic addenda essent diagnostica, sed ea per se sunt patula, non secus ac distinctiva ista, quibus ab aliis affectibus discernitur, quæ ex Cachexiæ & Anasarcæ ac Leucophlegmatiæ historiis innotescunt, adeo ut recensendis iisdem commodè supersedere queamus.

## CAPUT II. *Therapeuticum.*

### A R T. I.

#### *Signa Prognostica exhibet.*

##### §. 1.

QUam periculosissima secum afferat incommoda nimia corporis humani corpulentia, verbis Avicennæ septima quarti tract. 4. c. 5. delineare placet Sennerto *Lib. 5. Prax. c. 4. P. 23. it. Galeno Lib. 3. de Differ. Morb. cap. 9.* quibus adde quæ habet Marcellus Donatus *Hist. Med. Mirab. l. 5. c. 2. pag. 537.* Hippocr. *aph. 3.* vocat Gymnasticorum evexiam, si ad summum plenitudinis gradum sit perducta, periculosam. Hinc ejusmodi homines, magnus ille Græciæ Dux Philopœmenes, teste Plutarcho in vita ejus, derisioni habuit, cum ignominia & probris, quod quantò plus corpori accedat, tanto plus quoque periculi accedat, & securitati decedat, & quod vasta corporis gauderent mole, quæ ad res gerendas & ad sanitatem tuendam est incommoda. Quam non solum motus & operationis impedimentum, sed & respirationis, alias inter causas,

vel



vel saltem ob viarum interceptionem, difficultas comitatur. Nec ad longinquos perveniunt annos, aut brevioris ut plurimum sunt vitæ, teste Hipp. *aph. 2. 44.* Qui natura valdè sunt crassi, celerius moriuntur, quàm graciles. Expositi quippe sæpius sunt, alia ut taceam mala plurima, paralyti, aut subito suffocantur, vel apoplexia tandem extinguuntur. Id quod vel bina ista à Timæo *von Guldensee Lib. VI. Cap. 2. p. 262.* observata exempla sufficienter confirmant. Quicquid enim ad summum pervenit, inquit Seneca (*de Republ. 2. l. 2.*) ad exitum properat. Ignis quo clarius fulsit, eò citius extinguitur. Hinc dicebat Cornelius Celsus, si plenior quis & speciosior, & coloratior se ipso factus videatur, suspecta habere sua bona debet; it. Livius, prævalida corpora ab externis causis tuta videntur; attamen suis ipsa viribus onerantur. Quare rectè Quintilianus, Prætor omni fame sagina *In Protreptio λόγος fol. 2. & præcedentibus cap. 7. C.*

§. 2. Quamvis etiam nonnulla prostant exempla, obesitatem interdum minimè obesse proliferationi, uti hoc urget Timæus *von Guldensee c. 4.* nihilominus obesos nimis & admodum pingues, raro & prolificos, ob rationes *præced. Art.* allegatas, cum Avicenna *supra citato loco*, Hæfero *in Herc. Med. p. 300.* Andr. Laur. *in Anat. f. 218.* aliisque statuendum videtur.

## A R T. II.

*Methodum Medendi præscribit.*

## §. I.

UT removeatur E. impedimentum functionum partim, partim periculum vitæ ac sanitatis, quod ex corpulentia nimia imminet, hæc sanè ne fiat præcavenda, aut jam præsens maturè curanda. Utrumque obtinemus, si impedimus, ne adeò copiosum generetur nutrimentum, aut si id genitum sit, ut promptè removeatur, antequam partibus nutriendis sui assimilatione sese affigere valeat: aut si iis jam assimilatum plus minus fuerit, ut denuò resolutum & colliquatum seroque abluenti involutum foras amandetur. Sic enim fiet, ut ipsæ fibræ, tam carneæ, quàm in specie membranas contextentes, defectu succi copiosioris, quo antea deliniebantur, & blande humectabantur, indeque laxiores & extensiliores fiebant, nonnihil arescant, & quodammodo exsiccantur, ut ita contractiores reddita, ob poros interceptos angustatos, uberius nutrimentum excludant. Præsupponendo ubique efficientis ratione, omnia ista media, quibus spirituum vis utcunque infringi, & à tertiæ digestionis negotio alienari potest.

§. 2. Alimenti copiam impedimus, 1. minuendo assumendorum quantitatem, 2. corrigendo eorum qualitatem, ne adeò sint temperata, nec copiosum nutrimentum supeditent. 3. Alterando, stomachi sub digestionem, chylum, ne adeò insigniter nutritivus, sed potius abstersivus aut diureticus generetur. 4. Immutando Massæ crassæ, quo ex temperata dulcescente, acris, aspera, Sinaque nonnihil evadat, quò chylus partim promptius subigatur, partim ad celerioris sui exclusionem tam sensilem, quàm insensilem disponatur.

§. 3. Genitus v. jam succus nutritivus, si assimilatus, sive assimilandus adhuc, evacuandus ex corpore, sive immediatè, quo faciunt omnia ea, quæ sanguineam massam exhauriunt; sive mediatè, dum prius attenuatus, resolutus & liquefactus, sub specie sive excrementorum alvinorum, sive Urinæ, sive sudoris, sive salivæ, sive insensibilis transpirationis copiosioris, aliisve modis excludatur. Naturaliter equidem tales excrementis tantum œconomia Microcosmi hostilibus destinata sunt, sicuti autem p. n. coacta natura, non rarò per eas & utiles succos, alteratos tamen nonnihil evacuari permittit in excretionibus Symptomaticis ac liquativis: ita & Medicus non raro iisdem simili pro scopo abutitur.

§. 4. Dubitare equidem aliquis posset, an corpulentia jam facta tolli, & id quod de nutritio succo jam in substantiam carnosam & adiposam mutatum est, denuò evacuari possit, nisi crebrior experientia id jam dudum confirmasset. Sub febribus, pingues & carnosissimi, insigniter emaciantur. Scorbutus atrophiam in corpulentis comitem ducit, non minus quàm viscerum internorum ulcerationes tabidos reddunt antea corpulentos. Notum similiter, qui ex vita sedentaria laboriosam subito incunt successivè emaciari. Præ cæteris per Urinas quosdam omnem suam corpulentiam exuisse, crebra experientia confirmat. V. Helm. *tr. Jus divinum viratus §. 59. it. Latex. §. 44.* Schenckius *l. 3. Obs. p. 456.* Et confirmant hoc speciatim Diabete correpti, qui mirum quantum breviter emaciari solent. Post diuresin largior inprimis est diaphoresis quæ sudoris sub facie corpulentos emaciat. Quam cito enim febricitantes, crebrius qui sudant, habitum crassiores exuunt. Qui diætâ lignorum sudoriferâ utuntur, notabiliter quoque aquaticulum deponunt. Hinc sub vehementioribus exercitiis corporis, qui copiosius sudant, magisque extenuari solent. Salivationem denique quod attinet, non tantum in cura luis &cæ, per inunctionem gii crebrâ salivatione corpora insigniter emaci-

[Mmm mm 3 antur,

antur, sed in specie pro detrahenda obestitate nimia, per  $\text{gm}$  dulcem pyralismus felici eventu institutus & pro eadem intentione aliquoties eodem semper cum successu reiteratus fuit, teste Borichio in *A. M. H. Vol. 1. Observ. 74*. Pertinere huc quoque videtur, quod refert Borellus *Cent. 11. Observ. 11*. nimiam corporis crassitiem & pinguedinem, masticatione continuâ folior. Tabaci, curatam. Id quod vix alia ratione, quàm per crebriorem pyralismum contigisse videtur, quo & ipse Borell. inclinât, *c. l.* affirmans, folia lauri linguæ imposita mult. aquas educere.

§. 5. Præsupposito itaque corpulentiam jam factam tolli posse, superest modum scrutemur, quò id fiat. In hoc v. negotio duo inprimis sunt consideranda: 1. quo modo succus nutritius adeò consistentiam mutet, ut assimilandus spissior evadat tenuior, assimilatus v. ex solido reddatur fluidus. 2. quo modo alteratus ita, per modo dicta, quævis loca, etiam ex remotissimis inde regionibus, evacuari queat. Prius quod attinet, mutatio ista texturæ & consistentiæ, formaliter non nisi per motum intestinum acceleratum fieri potest, quo à se invicem separantur particulae, arctius nonnihil implicatae, & in minutias exiles dividantur, antea firmitus coagulatae, & motu isto continuato fluida in consistentia persistent, quo undique facilius motu progressivo distribui queant. Duobus hoc fieri modis, fere observatur: 1. per simpliciter liquationem eo modo, quo pingua, mucilaginosa, gelatinosa, à quovis calore fluidiora fieri observantur. 2. per solutionem:  $\alpha$ ) eam, quæ fit totius in minimas moleculas homogeneas, adeoque partes totius integrales; eo modo, quo per menstrua quædam, sive respectu organorum nostrorum sensualium sint corrosiva, sive insipida, concreta duriora & solidiora findi quasi observantur, ut  $\odot$  per Aq. Reg. Cran. hum. per spiritum  $\ominus$ , Corallia per  $\dagger$ .  $\beta$ ) est ista, quæ fit in particulas totius minimas, sibi in misto heterogeneas, adeoque, ut vocant, elementales (sc. immediatas) estque propriè dicta resolutio, opposita formalis s. seminali concreti coagulationi, fitque per principii coagulantis enervationem, unde concretum fatiscit denuò, quâ ratione per putredinem resolvi vegetabilia, & fatiscere in principia sua, l. immediate l. mediata talia, dicuntur. Re-elementatio haud inepto vocabulo vocatur à Strausio in *Epist. ad Digbeum de Pulvere sympathet. in Theatro sympathet. p. 135*. & in *Respons. ad exam. pulv. sympathet. Deusingii ad p. 425*. dum colliquationem istam, quæ in diabeticis fit, considerat. Prior modus simpli-

citer quieti particularum & aliquali corpusculorum implicationi; secundus, fortiori unioni & arctiori cohesioni; tertius v. seminali mitioni opponitur: & hic tertius inprimis intelligi videtur, per colliquationem humorum, in medico foro adeò usitatam: ut ut sublatori sensu, omnes istos modos unâ comprehendat, utpote qui omnes, nunc seorsim, nunc idque sæpius conjunctim, sub colliquatione & emaciatione corpulentorum locum invenient. Certè, dum frigidioris qui sunt temperamenti, corpulentos magis comoda sub interpretatione (si nempe humiditas accedat) reddi, super insinuavimus, ita ex opposito à calore excedente, præsertim febrili, liquefcere contenta quælibet, & tenuari magis,  $\odot$ sa plus minus cum sint texturæ, non secus ac ipsa pinguedo, nemo facile negabit. Dum porro acriora quælibet assumpta medicamentosa, ut aromatica, diuretica, diaphoretica positiva, purgantia fortiora vegetabilia, attenuantia, incidentia, & omnia, quæ ad acredinem plus minus  $\ominus$  sam contenta corporis disponunt, emacient quoque corpulentos, suspicari licet, acriores  $\ominus$  inas v. g. diureticorum particulas solvere, menstrui instar nutritivam gelatinam, & spissiore sanguinis consistentiam, quin & acrimoniâ particularum suarum, cuneorum instar, findere, & affricatu suo, atterere pinguedinis, & carnis musculosæ texturam molliorem, nec adeò tenacem, adeoque hoc modo resolvere denuò easdem. Ex hoc enim Urinæ diabeticorum mira dulcedo derivanda videtur, ex pinguedinis scilicet aut roris chylosi liquefacti, cum  $\ominus$ ibus Urinariis misti mutuâ temperaturâ, & in dulcedinem vergente textura? De quo videatur pluribus agens Willisius *Pharm. Rat. Vol. 1. p. 164*. & 172. Dum denique à Mercurii usu, colliquescit corpus, videtur probabile, præter summam ejus per quosvis poros meatusque penetrantiam, acerrimum ejus  $\triangle$  externum, destruere penitus & superare  $\triangle$  animale coagulativum nutrimenti, seu ab ejusdem acrimoniâ, adeò mutari concretum coagulati alimenti mollioris, pinguedinis & carnis, ut efficiente vitali seu specifico coagulatore destructo, concretum resolvatur in liquaminis aquosi & viscosi consistentiam, hinc per convenientia cribra transcolandum & excernendum. Sicuti aliàs Merc. præcipitatus, septicus est, & partis solidæ mollioris, in simile liquamen, externo usu, resolutivus. Nam foetor cadaverosus, qui in liquamine per salivationem excreto percipitur, putredinis inchoatæ, & corruptionis, vitali & balsamicæ conservationi oppositæ, indicium est.

§. 6. Alterum istud, quod ulterius hic confi-

considerandum monuimus, est evacuatio-  
nis modus materiæ colliquatæ & resolutæ.  
Fit hæc mediante sero, seu latice, communi  
isto nutrimenti & excrementi vehiculo. Hoc  
uti consuetâ Naturæ lege imprægnatum est,  
Θibus M. S. superfluis, & inutilibus, quæ  
ceu recrementa digestionis secundæ, per Uri-  
nam eliminat, & quorum medio, instar li-  
quoris saponarii, abstergit & abluit partes so-  
lidas, ne quid sordium à nutritione pri-  
vata remaneat, quas sub formâ nunc sen-  
sibilis transudationis, nunc insensibilis tran-  
spirationis, foras excludit: Ita parili ratione  
ejus beneficio, colliquata quævis materia, &  
ita vitalibus nostris heterogenea, & catenus  
recrementitia reddita, & sive ex nutrimento  
adhuc assimilando, intravata, sive ex eodem  
jam assimilato, extra vasa genita fuerit, ac  
ubicunque locorum substituerit, imbibitur,  
probeque abstergitur, (idque eò potentius,  
quò acrius & Θius, adeoque aculeatis plu-  
ribus particulis turgentius fuerit dictum se-  
rum) & communi humorum circulo, per  
universum corpus rapta, per loca conveni-  
entia, filtrationis modo, tandem transco-  
latur, ac seroso isto vehiculo involuta, foras  
emittitur. In quo negotio duo serè con-  
currere solent: 1. Proportio conformatio-  
nis mechanicæ, quoad figuram & texturam  
particularum filtrandarum, cum ista poro-  
rum organi filtrationis. 2. Irritatio quæ-  
dam, plus minus sensibilis, in loco filtratio-  
nis, à materiâ filtrandâ, cujus occasione  
stringuntur fibræ nonnihil, & refluxus inte-  
græ humorum massæ aliquantisper retardatur,  
unde lentiori sub motu, transcolandæ par-  
tes, fibrarum istâ stricturâ, copiosius trajici-  
untur & quasi exprimuntur, donec qua data  
porta excludantur.

## A R T I C. III.

*Fontem Diæticum aperit.*

## §. 1.

UT jam specialius consideremus auxilia,  
istis scopis plus minus convenientia, ea-  
dem ex tribus fontibus Medicis haurienda ve-  
niunt. Pro quorum selectu observanda in pri-  
mis differentia imminuendæ immediatè, vel  
carnosæ vel adiposæ substantiæ, præsertim  
adhuc assimilandæ. Nam carnosæ illius partis  
respectu, ea quæ sanguinem strictè sic dictum  
magis afficiunt, respectu verò pinguedinis,  
quæ chylum magis tangunt, adhibenda. Sic  
enim sanguinis detractio, carnosiori habitui  
imminuendo, Lactis uberior emissio, pin-  
guedini detrahendæ accommodatum magis  
auxilium. Auxilia hinc Pharmaceutica, ma-  
gis adiposis, illa vero Chirurgica carnosis,  
diætica pro selectus ratione utrisque æqua-  
liter conveniunt: sic enim carnosus Lacticinia  
& oſa, contra obesiscarnosa potius conce-

denda: istis cerevisia triticea, his hordeata  
propinanda. Eodem sub respectu, acriora &  
effectivè calidiora, sive alterantia, sive eva-  
cuantia obesioribus aptius respondent. Hinc  
Θata carnosis, tartarea obesipotius condu-  
cunt; & sic porro in aliis.

§. 2. Primus fons largiter media Diæte-  
tica subministrat, quorum legitimum regi-  
men, vel ex supra dictis *cap. 1. art. 3.* sponte  
patet. Aërem quod attinet: uti chylum in sa-  
liva deglutitus & sanguinem per inspiratio-  
nem admixtus, pro constitutione sui notabi-  
liter alterat, ita, ut uterque magis vel minus  
temperatus magis vel minus fixus aut volati-  
lis, adeoque facilius aut difficilius dissipabilis  
evadat, Ita pro corpulentia medela, subtilior,  
calidior, & siccior, isque crebrius re-  
centatus (si ita loqui liceat) inprimis seli-  
gendus. Hujus enim medio, ut attenuari in  
nobis & resolvi, & quasi magis liquari solent  
contenta nostra quælibet, ita & motus intesti-  
nus intenditur notabiliter, unde acriora red-  
dita eadem minus nutriunt, quin attenuata  
insigniter promptissimè tam sensibiliter, quàm  
insensibiliter evacuari apta nata existant. Non  
minoris efficaciam, propter easdem rationes,  
sunt Regionis calidiores, inprimis quæ Tro-  
pici propinquiores: nec non solum areno-  
sum, calidius & siccior. Quo etiam referre  
licebit Aërem arte calefactum, ut balneum  
siccum, hypocaustum, &c.

§. 3. Quemadmodum autem tam liqui-  
darum & fluidarum, quam (suo modo.)  
solidiorum quoque partium consumptio per-  
petua necessitatem nobis imponit, assu-  
mendorum indies alimentorum, quibus  
deficientibus in fame qualicunque contab-  
escit confestim corpus, ut loquitur Sylvius  
*Prax. l. 4. Tr. 5. §. 405.* ita ut iterum marce-  
scant corpulenti nimis, Cibus & Potus  
quoad quantitatem sit parcus & paucus, de  
quo conf. Panarolus *Pent. 4. Obs. 18. it. 32.*  
*qui pinguibus & obesiscum remedium optimum*  
*& infallibile asserit abstinentiam à super-*  
*fluo cibo & præsertim potu: Nulla enim*  
*res minuit majori celeritate & securitate*  
*pinguedinem, quam subtractio humi-*  
*di.* Quoad qualitatem non sit temperatus aut  
nutritivus, quin potius frequenti condimen-  
torum, in specie Θinorum acriorum & aci-  
dorum additione ita constitutus, & redditus  
medicamentosus, ut incidentem, attenuan-  
tem & resolventem, quin & diureticam quo-  
dammodo naturam acquirat, adeoque aut ci-  
trò transeat, aut sanguini infusus, hunc simi-  
liter acriorem ac asperiores reddat. Talia  
sunt, prout recensentur à Sylvio *l. 1. Prax.*  
*c. 38. §. 6. †, succus citri, Spiritus Θis,*  
*& c. piper, caryophylli, cinamomum, ma-*  
*cis, zinziber, nasturtium, eruca, sinapi,*  
*rapha-*



*raphanus querevis, & imprimis rusticanus.* Platerus *Tr. 3. Prax. pag. 51.* piperis frequentem usum maciem inducere, docet.

§. 4. Omnibus autem hoc in casu præpollet vinum degener seu acetum, de quo sane notabile est, quod ex Strada refert Cattieri *Obs. 13. p. 44.* ejus usu, Virum militarem, obesitate prætumidum, ✚ continuato, 87. pondo, detumescente abdomine decreville. Volatile enim ejus acidum, utut stimulum quodammodo addat appetitui, tamen fortius cibos colliquescere cogit, ut in serosiorum & viscosiorum, ac asperiorum, minusque nutritivum abeant chylum: præterea tam sub digestionem in stomacho, quam extra eum in fine duodeni, attacku fermenti fellei, transmutatur plus minus in Θsum volatile acre, ac fit insigne abstersivum, incisivum, tam sordium nocivarum, quam etiam nutrimenti laudabilioris, & diureticum, unde crebriore & diuturniore ejus usu, sanguinea massa in specie latex aquosus, Θsus volatilis, acrior, abstersivus & diureticus redditus, extenuando & resolvendo nutrimentum, succellivè corpulentiorum habitum imminuet. Quod si ✚ vulgare, volatili scyllæ Θe imprægnetur, & fiat ✚ scylliticum (de quo ✚o scyllitico Durastantes integrum conscripsit tractatum, utpote quod in maximo apud Veteres fuit pretio, adeò ut tantum non pro panacea habuerint, cum ex usu ejus primus illius inventor per omne vitæ tempus bene & salubriter vixisse dicatur) quo & diuretica ejus virtus omnibus cepaceis & alliatis singulariter propria, intendatur, & acrimonia penetrantior evadat, efficacius futurum est. Hinc Sephanus, Med. Venetus, in *Operibus Medic. lib. Cosmet. p. 462.* nil peræque prodesse dicit ad obesitatem tollendam, atque ✚ scylliticum, jejunè quotidie assumptum; ex eodem fonte ab aliis oxymel scylliticum commendatur, sicut aliis ✚ scylliticum in quo absynthium maceratum, aliis ✚ rutaceum laudasse placuit. Quidam loco ordinariipotus ∇ chalybeatam, ✚o temperatam propinant corpulentis. Quod si ✚ à ⊕ cohobetur, & ita fortificetur, eò convenientius huic usui futurum esset, quod ipsum obtineret pariter, si Θ❖ci modicum in Nitro solvatur.

§. 5. Somnus parvus, labor verò corporis assiduus, cum vigiliis insigniter convenit, sic enim alteratur sanguineæ massæ crassæ, eaque ex aucta fermentatione fortiorique hinc calore succenso, temperatis nutritivis partibus sudore diffatis, retorrída eadem & acrior redditur, ut nihil apponat nutrimenti, multum è contra absumat. Quantum enim crebriora pariter, ac vehementiora corporis exercitia, pro corpore attenuando

faciant, vel rusticorum ac mechanicorum testatur turba: quos inter raros carnosos, (benè autem ut sic dicam fibrosos ac nervosos) rarissimos obesos, cernere licet, quamdiu consueta scilicet Vitæ obeunt munia. Adeo sudore tenus diffluit, quicquid sub parca somni quiete solitis partibus, pro irratione earum, ad facilitationem motus, aspergitur, ut citra uberiores assimilationem, per habitum porosum corporis denuo excernatur: id quod confirmat *supràc. 1. art. 3. §. 2.*

§. 6. Propterea quoque sedulo opera danda, ut viæ istæ, per quas quarumvis digestionum excrementa emittuntur, nequaquam sint obstructæ, sed potius quotidie patulæ, imò solitò laxiores & apertæ, quo de succo nutritivo, sub excrementi tegmine, portio quædam unà eliminetur. In quem finem transpirationis loco, crebrior sudatio in specie conducit, ut modo insinuat, sic enim immediate magis habitus corporis exhauritur, & quod carni vel pinguedini impendendum foret, ita glutinosioris sub sudoris larvâ excernitur. Quis quoque exercitium crebrius repetatur, quo enim major nutritivi portio, pro reparando seminis dispendio ad testes abripitur, eo partes alias magis defraudari eodem palam est: quin & Spirit. animalibus speciatim sic copiosius exhaustis, totius corporis functiones tam motivas, quam in specie nutritivas vacillare necesse est. Referendæ huc & aliæ excretiones extraordinariæ, mensium, hæmorrhoidum, aliarumque per loca alia hæmorrhagarum, quæ tantum abest, ut cohibendæ sint, ut potius omni ope promovendæ, in quem finem, interno usu, vix croci ac myrrhæ auxilia quicquam superare arbitramur: adeò hæc quasvis hæmorrhagias provocare apta nata sunt: sanè mulierem novimus delicatioris texturæ, cui croco, cum mole parvâ attereretur, odor diuturnior, ex fonticulo cruris sanguinem copiosum effluere fecit. Pertinet huc, & lactis uberior in mulieribus excretio: cum quantum ejus usu pinguescant infantes, tantum ipsis detrahi omnino necessarium est.

§. 7. Tandem huc pertinent animi affectus, & motus, qui mediantibus Spir. uti insigniter contenta corporis alterant, ita ad corpulentiam imminuendam plus minus conferent. Præcæteris autem id efficit gaudium, accessum: & hinc imprimis incandescentia concitator: utrumque pathema autem & crebrius & intensius sit, si scopum præfixum attingere debeat. Gaudia magna quidem & effusa, Spiritus attenuant & diffundunt, & acuendo per acceleratum intestinum motum, contenta corporis, aciora & asperiora adeoque quasi Salliora eadem reddit,

reddit, unde minor nutritio, sed potius nutrimenti colliquatio. Excandescencia verò uti cruditatibus pituitosis corrigendis apprimè confert in statu p.n. quas quasi coquit ac maturat, seu attenuat & resolvit, & partim nutritioni, partim excretioni, aptiores reddit, unde & chronicis in malis subinde remedii loco est, & in specie mensibus vel parcius vel penitus non fluentibus confert, ita in corpulentioribus, liquando contenta nutritiva, & attenuando, eadem ac ad successivam excretionem disponendo & exasperando seu aciora reddendo cætera fluida, multum ad habitum crassiores deponendum facere solet.

## A R T. IV.

*Remedia è fonte Pharmaceutico haurit.*

## §. 1.

**F**onte dietetico jam relicto, rectà tendimus in Pharmaceuticum, qui varia nobis suggerit remedia evacuantia. Ex hisce autem eligenda ea potissimum, quæ simul etiam Menses alterant, eamque attenuant ac resolvunt, & speciatim laticem ferosum (eiusque contentam gelatinam chylotam) in eo vel fundunt, vel acriorem efficiunt, indeque absterisivum & glutinosi cuiusvis plus minus attenuativum, ac colliquativum & hinc vasorum excretoriorum, simul stimulativum reddunt. Hæc inter evacuantia primum locum obtinent Purgantia, quorum fortiora, mediante acrimoniâ maligna, & colliquefactiva, cum promiscuè tam vitiosa excrementa, quam utiles nutritivos succos, sive assimilandos, sive jam assimilatos, adeoque ipsam tandem, certâ ratione, solidam substantiam resolvant, & sub putrilaginis foetidae formâ educant, ut pluribus docuit Helmont. *in suis scriptis, in specie de Febr. c. 5.* & Cnæselius *Method. Med. Febr. epidem. exerc. 3.* potentissimè corpus emaciabunt. Sed quoniam non omnibus æquè conveniunt, quin interdum quibusdam gravia mala inducant, cum helleborum insequi convulsiones jam olim Hipp. *in Aphor.* notaverit, scamnoneatum pharmacum vero hypercatharsin periculosam apud Helmontium *cit. l. §. 13.* induxerit, febres periculosas in aliis fortiora purgantia accendant, Gabelchov. *Cent. 6. Cur. 26. & 27.* alios ad hydropem & leucophlegmatiam disponant, teste Porerio *Cent. 2. Cur. 29.* adeoque non semper sine periculo propinentur, metu gravioris mali, potius ab iis abstinendum. Blandiora tamen nonnulla purgantia, in specie aloëtica, non lora, (lotione enim eorum virtus castratur) commendantur, sive sola, sive aliis amaricantibus, in specie myrrhâ, mista:

Tom. II. Pars 2.

quæ ipsa uti alia amara, v. g. absinthium, gentiana, Centaurium minus, ut balsamica quidem virtute corpus Massamque Sanguineam condiunt, ita simul potenter exsiccare dicuntur, quatenus deterisivâ amaritie valide succos nutritivos attenuant & dissolvunt, potenterque abstergunt, simulque bilem acuant, forsân & augment, eamque acriorem & amariorem, adeoque respectu chyli & sanguinis, simili modo alterativam, hoc est attenuativam, reddunt, eo ipso sane corpus ad emaciationem multum disponent. Quo major enim bilis acrimonia, eo magis nutritio impeditur, minor vero eandem promovet. Quam etiam ob causam in foetum partes celerius crescunt, bilis sæpius insipida plane observatur. *Vid. Colleg. Therapeut. Excellentiss. Dn. D. Bohnii, Patroni ac Præceptoris mei summè colendi. Part. 3. Art. 2. §. 3.* Ad nostrum hinc scopum pilulæ quæcunque aloëticae, in specie de Tribus, item ex hieris confectæ, usurpantur, quarum loco & elixyr proprietatis vulgare, multum differens ab eo, quod Paracelsus beneficio liquoris alkahest paravit, aut quod Helmont. tanquam succedaneum hujus, artificiosâ digestionem concinnat, substitui potest. Unde etiam Fernelius, Vir experientissimus & magni judicii atque ingenii, prout audit Conringio *Introd. in art. Med. p. 146. Consil. 15.* ad obesitatem nimiam, pilulas ex Rhabarbaro, aloë & agarico confectas, curandam proponit. Pertinent huc quoque pulv. Hypæstici, ex fenna & aromaticis acrioribus compositi, ad obesitatem nimiam non inconcinne descripti à Vellichio *in Hecatost. 2. Obs. 61. p. 34.* item pulv. purgans expertus Foresti *l. 31. obs. x.* Platerus *multiscius Prax. Tr. 3. p. 51.* pilulas ex amaris paratas, ʒss. pondere, singulis matutinis sumendas, tales præscribit:

ʒj. Rad. aristol.

gentiam. ana ʒj.

rubia,

summit. cent. min. ana ʒß.

alum. ʒj.

Cum succo polypod. vel caryophyllatæ f. Massâ. Faciunt huc Electuaria ista bina, ex aromaticis acrioribus parata, Corpulentiam nimiam, Antipiotis ob id dicta, & descripta à Ferdinando, *Hist. Medic. 82. p. 274.*

§. 2. Diuretica porro sunt primario, quæ obesitas conveniunt, eaque speciatim ʒina, quæque blande & leniter eos emaciant, ut superius dictum. Primum in hoc puncto obtinet acetum siccum, ut vocatur Billichio, seu potius concentratum, nempe ʒ, seu ʒ istud enixum ex acido vini & facibus ejus alcalinis ʒssis solutis enatum, quem

[Nnn nn]

inpri-

inprimis Epiph. Ferdinandus *c. l.* specificè commendat, quod potenter absumat pinguedinem, corpus laxet & primario  $\square$ as promoveat. Eadem scilicet de hoc coagulo  $\ominus$ ino dicenda veniunt, quæ supra de eodem  $\varphi$ o liquido, hoc est,  $\star$ o, asseriebantur, dum pari modo resolutum in stomacho, & successivè mutatum in  $\ominus$ um volatile, insigniter abstersivum & deterisivum,  $\square$ aque provocativum evadat. Sufficit autem crudus & superficialiter saltem depuratus, crebra solutione & crystallisatione clarificato præferendus, his enim præparationibus non parum de volatili sua aciditate amittit. Sunt, qui arcani instar, contra obesitatem nimiam commendant pulverem ex  $\varphi$ i depurati & cymarum aut julorum coryli verno tempore excrecentium æqualibus partibus paratum, mane & vesperi, sub introitum lecti, quantum cultelli cuspis capit,  $\star$ prius irroratum, assumendum. Platero decoctum julorum coryli in vino factum commendatur *Prax. Tr. 3. p. 51.* Forestus Alcmarianus, vir multæ lectionis, & Practicus felicissimus, autore Conring. *c. l. p. 148. l. 31. Obs. x.* de quodam aurifabro narrat, eum tanta crassitie laborasse, ut ferè expiraret, curatum verò fuisse hoc Pulv.

*℞.  $\varphi$ i  $\bar{z}$ ij.  
cinam.  $\bar{z}$ ijj.  
zingib.  $\bar{z}$ i.  
sacch.  $\bar{z}$ iv.  
Misc.*

$\S. 3.$  Post Tartar. est  $\ominus$ , non infirmi subscellii remedium, & ipsum elegans sanguinis alterativum, & nutrimenti abundantis resolutivum, & per Urinas educitivum. Hinc  $\ominus$  optimè depuratum, seu flores *Mynsichti p. 26.* in usu commodo erunt. Tartarus item Nitratus Bartoleti *Tr. de Respirat. l. 5. c. 1.* qui ceu singulare febrifugum ab eodem commendatur, & singulare diureticum, revera autem nil aliud est, quàm Nitr. ex proprio Spiritu in alcali tartari regeneratum. Ratione Nitri, & diaspoliticon Galei, dictus officinalis pulvis, à quibusdam pro arcanissimo habetur contra obesitatem: quo ipso aliàs pulvere, in totâ officinâ pharmaceutica, nobilius vix reperiri remedium, contra affectum hypochondriacum, & nam exinde melancholiam hypochondriacam, non tantum à Bartoletto *c. l. l. 5. c. 4. p. 431.* Sed etiam ab Archiatro quodam, Regio Danico, D. J. ceu frequenti experientia confirmato his ipsis in malis, assertum fuit. Nitrum ipsum crudum, non reformidandum, modo per Sal ammoniacum depuretur legitimè ab excrementis  $\triangle$  ipsi frequenter adhærente. Relationi amici debemus, quod catellis, maturè ab uberibus

matris semotis, si Nitr. in lacte vaccina, ceu alimento dissolutum crebrius propinetur, eorum incrementa corporis multum impediri, eosque ita parvulos, ludis jocisque aptiores, continuo permanere. Pertinet huc Nitr.  $\ominus$ latum, h. e. arcanum istud duplicatum *Mynsichti*, seu ut aliàs appellatur, Panacea Holstatica, vid. Schroederus *Pharm. Med. chym. l. 3. c. 23. pag. 466. 474.* & *Mynsicht. Armament. p. 10.* remedium profectò laudatissimum; præter uium enim ejus contra corpulentiam nimiam, in malo hypochondriaco, febribus intermittentibus, ipsaque etiam scandalosâ quartana, & mulierum affectibus, it. in scorbuto, calculo &c. remedium reverà polychrestum existit. Somnum nonnihil conciliare simul deprehenditur, id quod non immeritò aliquali participationi de  $\triangle$   $\ominus$ li anodyno ascribendum videtur. Sugillat quidem nobile hoc remedium *Zwelferus Mantiff. Spagy. p. m. 407.* sed ipse insigniter hallucinatur, ob neglectum legitimæ præparationis, si enim ejus vestigiis insistere velis, non desideratum Sal duplicatum, sed  $\ominus$ licum vomitivum accipies. Sal enim istud duplicatum, ex  $\varphi$   $\varphi$  elixivatum,  $\ominus$ lici sanè primitus & nauseosi saporis, per repetitas in crucibulo fusiones, solutiones in  $\nabla$ , filtrationes & coagulationes, eo usque depurandum, donec Sal candidum, ex insipido amarescens, acquiras: quarum inadvertentia asperas istas *Zwelfero* extorsit censuras.

$\S. 4.$   $\ominus$ li injecta mentio & hujus usum contra nimiam obesitatem in mentem vocat, in specie si ejus Spiritus seu stigma acidum copiosius usurpetur, aut cum eodem paratus Tartar.  $\ominus$ latus: Artificiosa tamen ejus in crystallos Salin. coagulatio, reliquis in hoc casu præparationibus præfertur. Singularis experimenti rationem habere dicitur  $\circ$   $\ominus$ li, super  $\triangle$   $\bar{z}$ ii affusum, indeque per Retortam destillatum, cujus destillati gutt. 8. l. 9. in  $\nabla$  rosarum assumtæ & sæpius reiteratæ, cujusdam obesitatem, qui 4. ulnarum circumferentiam habuit, in tantum diminuit, ut 5. ulnæ quadrantum macrior redditus fuerit, de quo experientia confirmatio attendenda. De  $\ominus$ lo verò dum loquimur, acidularum se offert potus, cum  $\ominus$ lum  $\circ$ tis sit, quod animam earum constituit: hæ ipsæ enim crebrius & diutius haustæ, pariter crassiores extenuare solent, id quod alias præter causas, vel copiosior Urinæ fluxus pariter præstat. Timæi *von Gûldenlee* est observatio *Lib. VI. Cas. III. p. 263.*  $\nabla$ rum talium  $\circ$ c,  $\ominus$ o &  $\circ$ e (ut ipse quidem enumerat) turgidarum potu quendam obesiorem corporis habirum manifestè imminui & decrescere sensisse: idque toties, quoties, id quod annuatim fiebat, his



his ipsis uteretur: Egranas vero acidulas, ex ternè adhibitas, corpulentiam nimiam imminuere Macasius *c. 9.* autor est. Nec immeritò Thermae exsiccantes, & potæ, & pro balneo adhibita, ceu utiles laudantur à Sennerto *p. 25.* modò appetitui, qui potu eorum, non secus ac acidularum, mirè intenditur, minus satsiat, sic enim duplicatâ ope, detrahendo, nec restituendo, talibus succurritur. Ut taceam harum extrinsecus adinotarum ope, stringi & corrugari plus solito fibras, arctarique ita & angustari partium poros, quo ipso copiosioris nutrimenti receptio necessariò impeditur.

§. 5. Ex regno vegetabili, præ cæteris simplicibus semen fraxini, seu ut ratione figuræ aliàs appellari solet, lingua avis, insigniter commendatur: adeò ut Ferdinandus *c. 1. p. 274.* istud ceu ultimum contra obesitatem nimiam deprædicet remedium, quod etiam hydropem curet, dosi ʒi. propinatum in vino. Nec est, quod mireris talia præconia, magnanamque in herbis virtus, potensque in iis energia: inprimis quæ in semine earum concentrata delitescit. Hoc ipsum verò præ cæteris diureticis & lithontripticis caput extollit adeò, ut istud contra calculum sufficienter laudare vix queat Glaubertus *Pharmacop. Spagy. p. 1. p. 23.* Eodem ex fundamento celebratus adeo ab Helmont. betulae succus diureticus, obesis futurus esset proficiuus, quod aliquando tentandum foret. Italis quibusdam, singularis remedii loco, ad curandos infantes nimis obesos, ita ut vix respirare possint, est hæc mixtura:

℞. *sem. utricæ* ʒi.

Pulverisat. subtiliter misce cum mellis ʒiv. Hujus mixturæ cochlear 1. vel 2. si paulo sit grandior, propinant infanti, felici cum successu. Ratio eadem hic subest, nam urticae semen legitimo modo & tempore collectum, mirabile est diureticum, singulareque lithontripticon.

Terebinthina silentio pretereunda non est, cujstanta cum Urina intercedit familiaritas, ut violacea suavitate Urinam imbuat: de hac refert Forestus *lib. 31. Obs. x.* quendam valdè crassum & articulari morbo obnoxium extenuatum & curatum fuisse per pilulas de Terebinthinâ cum saccharo, harum 5. vel 7. duabus horis ante prandium quotidie recipiendo. Agmentandem vegetabile claudat Sandaracha Arabum, seu gummi juniperinum, nam Sandaracha Græcorum, arsenicali virulentia infestum est, & ob id hic exulet. Gummi hocce, ceu vitale balsamici juniperini fruticis nectar, originem suam olet, & ita non tantum balsamicâ juni-

peri virtute corpus tingit, sed in specie latitem vofum M. Seam acuendo, quicquid sordium invenit, per ☐ evacuat & etiam alimenti superfluitates unâ exhaurit. Laudem hinc merentur Pilulae Mynsichti de Sandaracha dictæ, quæ totæ insigniter diureticiæ & deterfivæ, contra obesitatem singulariter commendantur, & ceu expertæ laudantur cum oxymelite ʒß. sandarachæ, sæpius danda à Platero proponitur *Prax. Tr. 3. p. 51.* Plura de diureticis his proficiuis ex regno animali, in specie de lumbricis, asellis, scarabæis, cantharidibus, &c. dicere possem, nisi talia ceu in Vulgus cognita, præsupponerem.

§. 6. Diuretica excipiunt sudorifera, quæ inter lignorum usitata decocta vulgo referuntur: quæ aromaticâ suâ acrimonia, attenuando M. Seam, ejus circulationem rapidiorem reddunt, unde superfluum alimentum sensim liquefactum, seroque denuo imbibitum, sensim per poros corporis excernitur. Id ab omnibus observatur in Cura gallicæ Luis per diætam sudoriferam, in qua ægi non parum emaciantur. Rationem Methodicam, quâ per lignorum decocta, præmissis sanguinis debitis detractionibus, curandi sint obesi, delineat *Casus 1. Lib. 6. à Timæo von Guldenslee* consignatus. Hinc super sassaaparillæ radicem extractus est Pulv. compositus Ferdinandi contra obesitatem, quem aliis præfert, & quo se felicissimè usum & Salib. theriacal. æquipollere asserit:

℞. *Pulv. Sassaapar. ʒi.*

*coriandri.*

*anisi,*

*cinam.*

*caryophyll. à ʒij.*

*cal. arom. ʒj.*

ʒi ʒß.

*Sacch. albi q. s.*

M. f. *Pulvis.*

In cujus locum forsân substitui poterit iste à Sennerto laudatus *c. 1. p. 25.* Decoctis talibus aut Pulv. essentiæ lignorum cum Spir. sambuci paratæ, pariter succenturiantur. Si theriacalia commendari solent à quibusdam, de quibus videatur iudicium Zwelferi, & quæ contra hunc acute disserit Tachenius in *Hippoc. Chym.* quorum tamen loco potius Pulv. viperinos, tam simplices, quàm pro scopi varietate diversimode compositos, cum experto Vellichio *c. 1. Heratost. 2. Obs. 61. p. 36.* commendamus. Si alias fixa quæcunque ut & volatilia, tam quæ cervinæ calvaria fructus, quam quæ viperæ supeditant, valde hic conveniunt: non minus quàm ☉ vol. succini, elegans sudoriferum, & potens diureticum: qualia Salia acria hoc in casu convenientiora sunt sudoriferis

[Nnn nn 2]

fixis,

Tom. II. Pars 2.

fixis, ex minerali regno in specie ðiali familia paratis: cum illa positivè magis operativa existant.

## A R T. V.

## Fontem Chirurgicum libat.

## §. 1.

**I**Nstrumentis jam Pharmaceuticis M. Seam colliquefaciendi, chylumque laudabilem, & inde corpulentiam nimiam minuendi non sufficientibus: Videndum an Chirurgia quoque aliqua nobis queat suppeditare hunc in finem utilia. Quanquam vero Venæsectio nequaquam unicum fermè ac optimum remedium in quibusvis affectibus curandis, juxta Parisientes Medios plerosque, Sylv. *App. Tr.* 9. §. 242. p. 809. Nihilominus tamen in nutritione aucta iterum imminuenda, idque speciatim carnosiori in habitu, eandem multum præstare, quin utramque complere paginam, testatur, confirmatque pariter experientia. Quippe primarium Venæsectionis similiumque sanguinis detractio- num indicans est sanguinis laudabilis copia uberior. Et quemadmodum per Venæsectionem, sive simul ac semel fiat, sive, quod melius, pro unius cujusque constitutione peculiari & viribus, per iteratas vices instituitur, sanguinem immediate detrahimus, ita cum eodem emissio nutritium chylosum succum pariter cito tutoque utut secundario immi- nui atque exhauriri posse, nemo, credo, est, qui neget.

§. 2. Vicarias phlebotomiæ vices sub- eunt Cucurbitulæ scarificatæ, ac hirudines, variis in locis applicandæ, quæ eò crebrius reiterari, & eò plures adhiberi possunt, quo minori, saltem non adeò subitaneo virium cum dispendio in usum vocari possunt, sive solitariæ adhibeantur, sive accedente lo- corum vulneratorum frictione cum Sal. & Acet. ad imitationem nempe Zacuti Lusitani, qui quantum hujusmodi hæmagoga auxilia corpulentioribus conducant, pluribus ostendit *l. 3. Prax. Admir. obs.* 112.

§. 3. Suum pariter inveniunt locum & certum usum habent Cauteria, tam actualia, quam potentialia, & cum his paratæ fontanellæ, ceu ulcera artificialia, quo ampliora & copiosiora, eò pro præsentis scopo, utilio- ra: hæc enim promiscuè quicquid inveniunt humoris alluentis, colliquefcere faciunt, & ita etiam successivè nutritium succum in for- ma liquaminis purulenti exhauriunt. Id quod pluribus ostendit Helmontius *Tr. Cau- terium*: utut in cacochymicis cum paucio nutritivo plus excrementitii eliminando, à posteriori quasi, alios plures usus obtine- ant.

§. 4. Ad efficacem hanc Medicinæ par-

tem referenda videtur etiam adipis detractio- cujus Plinius, & ipse solus *l. 11. c. 37.* men- tionem facit, dum inquit: *L. Apronii Con- sularis viri filio, detractos adipēs, leva- tumque corpus immobile onere.* Juxta hunc, quem alii, qui rei hujus mentionem faciunt, unicum allegare solent, videre licet in scripto Germanico *Anonymi, Chur- und Fürstl. Selden-Saal. p. 221.* relatio non abludens à præsentis negotio. Verba sunt hæc: *Dedo VII. der Feiste/ x. x. als er mit Kaiser Heinrich VI. nach Italien zu des- sen Hochzeit reisete/ und ihme unterwegs das Schmeer/ so ihn beschweret/ schnei- den ließe/ ist er bald darauff/ An. Chris- sti 1190. gestorben.* Scil. hoc ipsum est, quod refert Elias Reisnerus *Geneal. Basil. p. 275.* de Dedone V. Comite Rochlicio, propter nimiam obesitatem crasso cognomi- nato, quod antequam cum Heinricho VI. Imp. militatum iret in Apuliam, arvinam corpo- ris Medico secandam præbuerit. Res nem- pe, nostrum quod attinet negotium, eadem, circumstantiæ utut varient. De Sanctio, post Obitum Fratris Ordonii III. in Regem Hisp. electo, cum ob nimiam pinguedinem ad regni officia ineptus esset, excisionem etiam pati decrevisse, sunt qui referunt. De quo posteriori tamen apud Rerum Hispani- carum scriptores altum est silentium, qui po- tius referunt, nominatim Rodericus Xime- nez, *Archiepiscopus Toletanus de Rebus Hispan. l. V. c. x.* & Joh. Marianus *de Rebus Hispaniæ l. 8. c. 7.* Sanctium ad Abderhha- manum, Maurorum Regem, Cordubam se contulisse, ibique ab illius Medicis cujusdam herbæ virtute, extenuata arvinâ, corpus ejus ad competentem habitum & agilitatem debitam perductum fuisse: Quod utut per ve- neni propinati virulentiam factum quidam suspicentur, confundunt tamen medica- mentosam hanc Obesi Sanctii extenuatio- nem, cum veneno lethifero, ipsi à Fernan- do Gundisalvi Castellæ Comite, in pomo medicato exhibito, cujus vi tertiâ die Rex, qui jam ab aliquot annis extenuatus regno præfuisset, extinctus est. Constat itaque per adipis talem detractio- nem quid Plinius intellexerit. Abdominis videlicet incisionem pro imminuendâ & tollendâ pinguedine il- lum innuere, autor est Epiphan. Ferdinan- dus in *Histor. Medic.* 82. p. 273. quo etiam inclinare videtur Sennertus *l. 5. Prax. p. 24.* qui remedium hoc sævum, nec quemquam facile admitturum, ille vero curationem pe- riculosissimam & timore maximo plenam asserunt. Certè, cum nullibi apud Medicorum Patriarchas, Hippocrat. Galenum, Cel- sum, Paulum, Avicennam ejusdem fiat men- tio; nec modernorum Chirurgorum ullus, quic-

quicquam de eadem consignarit, incertum quoque sit, quomodo, si de manuali operatione interpretanda sit, instituta & cujus partis an pinguedinis subcutaneæ saltem, an

vero omenti nimis adiposi excisione peracta fuerit? propterea nec nos de re vel deperditâ vel vix imitanda plura verba facturi, hic facimus FINEM.



MICHAELIS ETTMULLERI,  
Philosoph. & Medic. Doctoris  
OBSERVATIONES BINÆ,  
DE  
CRINONIBUS  
ET  
SIRONIBUS,  
Ex  
*Actorum Eruditorum Lipsiens.*  
Mense Septembri, Anno 1682. pag. 316. seq.

---

OBSERVATIO MEDICA I.  
De  
*CRINONIBUS seu COMEDONIBUS  
INFANTUM.*

**I**ncognitus & indictus Antiquioribus fuit morbus, cuius passim superiori ac hodierno seculo à Medicis non minus, quàm medicastro mulierculis fit mentio, & ab istis quidem Morbus Pilaris Infantum communiter appellatur, speciatim autem Crinonum, item Comedonum nomine venit, Germanis *Mit- Esser* audit. Contabescunt infantes paulatim, insomnes redduntur, & inquieti, & insignem simul pruritum corporis pati videntur: quòd si in balneo ritè tractentur, corpuscula pilorum crassiorum instar densa & spissa (unde similitudinis ratione, Crinonum nomen) è poris corporis prominent, quæ pro animalculis intercutanea loca inhabitantibus (unde Comedonum nomen, quasi vermium alimentum infantum depascentium) ab aliis habita fuerunt, quibus unâ alterâve vice ablatis, melius habere infantes observantur. Utrum itaque censui excrementorum spissorum tertriæ

coctionis, an verò animantium generi adscribendum sit istud extra cutim prominens, diutius controversum fuit, prout scilicèt fieri in naturalibus amat, ubi solis rationibus, citra experientiæ armaturam pugna instituitur. Hæc tandem rerum magistra litem diremit, ostendendo microscopiorum ope manifestè, esse reverà animalcula viva, quicquid spissorum istorum capillorum facie subinde compareat. Coloris observantur subcinericei & plus minus nigricantis, cornubus seu potius antennis binis longè prominentibus instructi, oculis rotundis grandiusculis cum cauda oblonga in fine villosa, paucis, aspectu satis horridi, prout ex Tab. ad pag. 543. videre est, in qua Fig. A. magnitudinem nativam, prout nudo oculo se exhibet, repræsentat: Fig. B. verò Crinonem integrum, accuratè observatum, resupinato situ collocatum: Fig. CC. eosdem crinones, prono corpore delineatos, sed sub separatione à cute, caudâ truncatos. Nam non tantùm propter morositatem puerorum difficulter separari possunt, sed ob exilitatem,

[Nnn nn 3] etiam




etiam ac teneritudinem, vix integri obtineri, quin facillimo attritu vitientur: id quod in fig. D. contigit. Pueri sunt & infantes, in quibus frequentius nasci solent, quorum crura, brachia, & imprimis dorsum, sive totum, sive interscapilium tantum, maxime tamen ipsam scapularum regionem solent occupare. Sed quæ huc spectant alia, Curioso Lectore digna, prolixius, pro usu imprimis Medico, exposuit Erud. Georg. Hieron. Velschius, in *Exercitatione de Vermiculis Capillaribus Infantum*, in qua omne id, quicquid pro usu tam Theoretico quam Practico desiderari potest, ex quibusvis Scriptoribus in unum fasciculum concinnè collectum exhibetur, adeò ut unus hic Autor quorumvis aliorum Vices commodè supplere queat. Annexa est dicta Exercitatio isti de Vena Medinensi laboriosè & accuratè, & Ann. 1674. August. Vindel in quarto primitus, sub auspiciis Claudie Felicis Imperatoris, luci publicæ expositæ.


OBSERVATIO MEDICA II.  
*DE SIRONIBUS.*

**A** Li longè à Crinonibus sunt Sirones seu Cirones, vermiculi scilicet minuti,

quasi pediculares, in pustulis serosis prurientibus, sub cuticula manuum imprimis & pedum, subsistentes. Germanis *Seuren*/item *Reitliesen* vocari solent. Minus de his disceptatum fuit, animalculorum classi an associandi? siquidem hoc jam olim subtili Scaligero *Exerc. 194. de Subtil. Num. 7.* extra dubitationis aleam positum fuit: qui tamen ipsis formam nullam expressam esse asserit, quæ Microscopiorum ope distinctè satis & accuratè conspici potest, secundum eam faciem, quam Tabul. ad pag. 543. Fig. EEE. repræsentat. Colore sunt albicante, & pedibus exceptis, qui propius intuenti nigricare videntur: pedibus 6. instructi sunt, binis utrinque mox juxta caput positis, quibus talparum ritu cuniculos sub cuticula agere, & oblongos non rarò quasi sulcos trahere, simulque molestissimum pruritum excitare videntur. Num dorsum sit squamosum, seu squamis coopertum, prout quidem affirmat Dn. Rohaultus *Tract. Physic. Part. 1. cap. 21.* definire nolumus, illo præstantiore dubio procul microscopio instructo. Mirum de cætero est, quantas molestias tam pusillum animal homini excitare queat, quas stupenda historiâ pluribus explicat Mouffetus in *Theatr. Insector. libr. 2. cap. 24. &c.*



PRO-




# PROGRAMMATA BINA ACADEMICA

Ab  
*Excellentissimo*  
DN. D. ETTMULLERO  
Elaborata.

I.

DECANUS,  
*SENIOR, COETERIQUE DOCTORES*  
*ET ASSESSORES*  
Facultatis Medicæ  
IN ACADEMIA LIPSIENSI  
*Lectoribus Benevolis*  
S. P. D.



Quod Gloriosissimi & semper Augusti Romano-  
rum Imperatoris, CAROLI V. Symbolum, verè Regium,  
fuisse dicitur, *Plus Ultra*, idem & cuius indutrio, ac rerum sua-  
rum satagenti Medico, Tessera loco inservire meritò debet.  
Tantum enim abest, ut omnibus numeris absolutam, perfectamque habeamus  
Medicinam, ut etiamnum intricatissima dubia in Theoria evolvenda supersint,  
ac defectus inopinati in Praxi refarciendi subinde ac emendandi veniant: adeò

*Nulla nostri est tam Regula firma Galeni,  
Quam non interdum curva refellat anus.*

Nimium quantum ergo suæ blandiuntur ignorantia isti, qui ad illum perfe-  
ctionis apicem adscendisse Medicinam vanè sibi persuadent, cui præterea nihil  
addendum sit. Prudentius longè Socrates, se hoc tantum scire, affirmabat,  
quod nihil sciret, & nostram quamvis cognitionem, potius vocandam esse  
doctam ignorantiam, quàm perfectam scientiam. Ex hoc tamen haud sta-  
tim simplicem meretur assensum asperrimus iste Scholarum Medicarum Cen-  
sor, J. B. van Helmont, in oppposito nimis exorbitans, audacter asserendo  
*Præfat. de Febr. inaudit. quod à diebus Hippocratis*  
*Medicina steterit, si non retroiverit, saltem non profe-*  
*cerit,*

*cerit, quia per novas indies centurias ivit in circulum.* Equidem ut in deregendis Scholarum erroribus tantum non fuit Lynceus, ita in statuminandis firmioribus, aut evidentioribus saltem principiis ac fundamentis, haud rarò cespitasse, imo subinde graviter lapsum fuisse illum ipsum, omnino in propatulo est. Per ignem se vocat Philosophum, ast dum fatetur ipse *Tr. Tria Prima Chymicor. &c. §. 46. non genuinum concretorum analystam esse ignem, cum multa per transmutationem ab igne factam generentur in mistis, tanquam nova entia, fiantque, quod non erant antè;* hoc ipso instrumento fallaci in eruendis Naturæ Arcanis, & reformanda Medicina, se usum esse, omninò concedat, necesse est. Torporem equidem Scholis excutit, veteranam exprobrando ubivis indagandi ulterius ignaviam; Ast si Petro Severino Dano, suam Theoriam vindicemus in Idea Medic. Philosophicæ, superiori seculo explicatam, & Theophrasto Paracello auxilia sua Practica sublimiora, quorum respectu Monarcha Arcanorum audire ambitiosius maluit, ceu genuino Professori restituamus, profecto pudibunda ista nuditas, quam toties Scholis ignominiosè objicit, in ipso quoque Helmontio passim omnium oculis exposita erit. Superiora interim si retrospiciamus in secula, & qualem tunc representavit faciem Medicina, paulo accuratius contemplemur, eamque cum hodierna illa, quæ tot Eruditorum Medicorum fatigat operas, conferamus, omnino (veritati si litare velimus) confitendum videtur, tantum præsentem hoc, quod decurrimus, seculo, splendoris ac nitoris accessisse eidem, quantum pluribus istis antea actis haud æquè præstitum, dum singulari fervore illius Consecranei, *Plus Ultra*, laudabili omninò conatu tendere nituntur. Obnubilabat enim prisca istis temporibus ingenia, nimia ac penitus religiosa Veterum Scriptorum Veneratio, quæ in scientia quidem naturali, (cujus complementum quasi est Medicina) & speciatim dogmatica ejus parte, sine Aristotele aliquid allere; in historica vero ultra Plinium sapere velle, piaculum erat: adeò ruinosis ac lubricis Sragyritæ fundamentis atque falsis Veronensis relationibus universa Physica superstructa erat. Innitebatur pariter his, quanta quanta Medicina, per Galeni & Avicennæ dictatoriam quasi Majestatem firmata, ita, ut in horum, ceu Oraculorum, effatis, omnis Macrocosmicæ ac Microcosmicæ cognitionis cardo verteretur. Hi Polierant isti, quos in Vasto Naturalis scientiæ aut Medicinæ Oceano navigantes, unice respiciebant: hi anchoræ erant, quibus fluctuans Theoria naturalis, & nutans Praxis Medica firmabatur: Unde pariter tunc temporis, præter versiones ac explicationes Græcorum & Arabum, & repetitas in eosdem Commentationes, vix aliud quid actum, de ulteriori progressu ne per somnum cogitatum fuit. Quicquid Chymicorum interdum moliebantur quidam, angustis fornacum suorum parietibus ferè includebatur, & vel in mysterii magni Philosophorum ardua præparatione, vel elaboratione remedium quorundam simplici, terminabatur, *Plus ultra* vix ullo eorum meditante. Equidem Paracelsus Helvetico sarcasmo ignaviam istam irridere, & magno conatu scholas Medicas reformare aggrediebatur, sed negotio tali impar, ceu in Theoria confusus & dubius, Tartarorum commento minus sufficiente, in Praxi verò, in qua reverà singulariter excelluit, Empiricus, præmaturâ quoque morte extinctus, magnis excidit ausibus. Excitabantur quidem subinde subiecta, quibus de meliore luto fixerat præcordia Titan, & quæ



quæ ad altiora improbo labore assurgere nitebantur, tot tamen aliorum invidiæ calumniæque exposita telis, de facili opprimebantur. Plures scilicet, juxta Maffariæ, Medici Patavini, effatum, cum Galeno errare, quàm cum aliis verum dicere amabant. Illustre hujus specimen, vel hoc seculo curioso, Academia Parisiensis subministravit; vid. Joh. de Launoy de varia Aristotelis Fortuna in Acad. Paris. cap. XVI. pag. 79. Evulgatæ fuerunt Anno 1624. Theses quædam, fundamenta Philosophiæ Naturalis Universæ complectentes, publicè, tam disputando ventilandæ, quàm arte Chymica per experimenta comprobandæ, cæque contra recepta quidem Peripateticorum principia, sed quæ (ut inspicienti patet, hodiernis, per experimenta & rationes stabilitis assertis, propius omnino accedunt; Harum vero Autori, Senatus Consultum Parisiense, infra 24. horas Lutetiâ exire, nec in ulla ditioni suæ obnoxias urbes se recipere, aut inibi Philosophiam docere, edictum fuit. Quid? quod idem Senatus decreverit, ne quis contra Veteres & probatos Autores ulla dogmata teneret, aut traderet, sub pœna capitis. Quibus omnibus tamen non obstantibus, non per Gallias solùm, sed universam ferè Europam, heroico ausu, *Plus Ultra* tendere, experientiâ duce, comite ratione, præsentis hoc, quo vivimus, seculo, diviniора instituerunt ingenia, & quod Naturali adhuc Scientiæ, quod Medicinæ deerat, pro virili supplere. Est quidem dictitante Hippocrate, experientia fallax, non tamen penitus falsa; est ratio difficilis, haud tamen semper inanis: ibi ergò, ut eò accuratiori circumspèctione quælibet examinanda, ita subtiliori acumine hic perscrutanda. Surrexerunt sub his conatibus tot Nobiles Societates, ad promovendas Naturalem scientiam pariter ac Medicinam congregatæ, *Plus Ultra*, ceu ultimum scopum præfixum intuentes. Palmam meretur Societas Regia Anglica, Nullius in Verba, renore Symboli, jurans, & Fr. Baconis, Bar. de Verulamio &c laudatissimis vestigiis insistens, eminente præ aliis Boyleo, Viro in Experimentalis Philosophia, sine dubio, incomparabili. Floret sub umbra Maximi Regis Academia Regia Scientiarum Gallica, non secus ac Academia del Cimento Florentina, sub Protectione Magni Hetruriæ Principis ac Cardinalis LEO-POLDI. Idem saxum strenuè volvit in Germania nunquam otiosa Naturæ Curiosorum Academia. Danos ut taceam ac Suecos, gelido etiam sub Borea, sciendi *Plus Ultra* desiderio calentes. Quas non machinas invenit curiositas humana, quibus vel sensu uni, per quos, ceu internuncios, confabulatur nobiscum Natura, acumen augeat, vel invitam etiam & reluctantem quasi Naturam in sui obsequium quodammodo cogat. Quæ oculis vix visibilia erant antiquitus, Microscopiorum beneficio tantùm non palpabilia redduntur: locorum intercapedine remotis longius, propius Telescopiorum adjumento appropinquamus, adeò ut post lustratas terrestri itinere Orientales pariter ac Occidentales Indias, siderea in regione, ipsos Selenitas, si qui sint, visitaturi simus. Auditum Otica & Acustica acuunt instrumenta, Tubæque stenterophonicæ. Tactus per Thermometra, barometra, hydrometra, & similia, à facili errore vindicatur. Maris fundum scrutari licet per campanas Urinatorias. Aërem machinis incarceramus. eumque pro lubitu nunc complicamus nunc explicamus. Ignem ponderamus: Ferreum magnetem, ad nutum nostrum, hunc vel istum Polum venerari cogimus. Metallorum Principem per molem Philosophicam subjugamus. De Pyrotechnia, neglecta olim penitus, tacere præstat, & quantum fideli ejusdem ministerio perficere liceat. Spatiosum enim hunc nimis campum ingredi, haud attinet, ad Medicinam potius, ejusque hodierna incrementa, *Plus Ultra*, sur-

gentia, cum respiciendum sit. Anatomes ante omnia suspicimus auxiliares copias, quibus adjuti stupendæ corporis machinæ superbam structuram, & partium ejus particulas quasvis accuratè perlustrare possumus, idque in summum Artis Medicæ incrementum. Galaxia haud ampliùs incerta est adeò, quin oculis etiam pateat, sive qua per lacteos tubulos intra mesenterium movetur chylum nectar, sive qua per thoracicum adscendit canalem. In Orbem sanguinis elegantissimus motus, & artificiosissima organorum ipsi inservientium hydraulicas ad leges mechanica, quantum lucis fœneratus fuerit universæ Medicinæ, in aprico positum, ut taceam experimenta infusoria. Lymphæ crystallinus latex hodiè demum innotuit, & glandulosi ejusdem fontes, unà cum salivæ, lachrymarum, & sudoris scaturiginibus. Cordi musculos inter principatus assignatus fuit, ex quo accuratiùs fabrica ejus innotuit: de quo saltem subolfecit quædam Autor Tract. de Corde, (quis enim sit? adhuc dubitatur:) qui inter Hippocratis scripta legitur. Hinc diaphragmatis adeò controversa olim duplicata structura perquam artificiosa, linguæ pariter, cum gustatoriis suis papillis, textura, per hodierni seculi felicitatem innotuit. Patet jam hepatis glandulosa moles, lienis ex cellulis membranaceis cum contentis glandularum acinis complicatio, fibrosa renum compages, vesiculosa pulmonum, cum elegantissimis asperæ arteriæ annexis lobulis, textura, glandularum corticem cerebri (jam olim Hippocrati quidem glandula magna qui audivit) compingentium congeries, cum filamentis ejusdem medullaribus. Transeat testium in maribus ex minutissimis vasculis conglomeratio, ceu nodus quidam gordius, haud absque acie cultelli Anatomici enodanda: saltem ut omnia ex Ovo, atque adeò ipsum macrocosmum, primam sui originem traxisse, antiquitus putatum fuit, ita microcosmum speciatim ex ovo, in ovario muliebri contento, ab aura spiritali maris fœcundato, primitus propullulare, Anatomica Schola clarè demonstravit. Quæ ipsa, ut formalem seu mechanicam partium corporis humani fabricam evidenter edocet, ita Chymia materialem illarum molem diffringit minutissimè, ejusque subtilissimas moleculas, ceu elementaria rudimenta, evolvit, sensumque examini sistit. Extricantur hujus ope salinæ particulae, acidi & urinosi nomine notæ, quæ uti aliàs Naturæ catholica magis, quarumvis in concretis alterationem, mechanica sunt instrumenta, sub Rectoris seminalis dominio, ita & partium corporis materialem crasin principaliter determinant, & per motus intestinos multifarios vitæ, tam sanæ quàm ægræ, opifices haud postremi existunt. Quanta lux hinc morborum tam faciliore cognitioni, quàm Curationi feliciore, affullit! dum per fermentationes, effervescentias, & putrefactiones, indeque natos sapores, odores & fœtores, occasionum morbosarum activitas, ac nocendi artes sensibiliùs innotuerunt, ac *ἡ μυσία* s. sexcenta ista, quibus prisca Medicina superstructa dicitur, scripti de eadem Autori (quis enim fuerit, adhuc sub iudice lis est) inter Hippocratis Opera quod exstat, oblivioni tradita, post excultam Chymiam denuò resuscitata fuerunt. Operosa Pharmacia, per hanc ipsam reformata penitus, elegantior longe induit faciem: Nucleum Medicinalem, ceu quintam rei essentiam, sub alienarum feculentiarum corticibus altè reconditum, elicit, eumque nitidè delibratum exhibet: Venenis exuit virulentiam, quo summarum potestatum fiant medicamenta, sicque devicto quasi pervigili Dracone, aurea Hesperidum poma larga manu distribuit: soporifera papavera suavissima sensuum sunt delinimenta: Atrox hellebori albi furor mitescit, quo furiosorum impetum refrœnare valeat: Lupus sub antimonii regmine delitescens

scens ferociam quamvis deponere cogitur, & diffractis quasi dentibus, quibus tam miserè interanea arrodere, & tantum non dilaniare solebat, rabiem suam in venena saltem exercere cogitur, & vi alexipharmacà ab illorum insultu Oeconomiam animalem custodire. Quæ omnia, ac plura alia, primario laudatissimo *Plus Ultra* studio debemus. Hujus sanè ope Medentes Quartanæ scandalum vanum sæpiùs reddiderunt, ex quo Peruanicortice legitimum usum per vestigarunt. Nec metuunt adeò ampliùs facilem ingenii virium lapsus, dum Tchiaf. Thee, ceu ingeniorum laudatam panaceam, ex ultima etiam Siua petunt. Vitrioli Veneri sympathetico actinobolismo tantum non miraculosè vulneratis ulceratisque succurrere satagunt, ex cujus prosapia oriundus liquor stypticus, modernorum inventum, sanguinis undecunque impetuosiùs exilientis impetum cohibet. Tam necessarius cuivis Medico est improbus quidem ast summè proficiuus *Plus Ultra* Labor, ut quilibet sibi dictum, putare debeat, illud Senecæ Epist. 64. *Veneror inventa sapientiæ, inventoresque adire tanquam multorum hæreditatem juvat. Mibi ista acquisita, mibi laborata sunt. Sed agamus bonum Patrem familias: faciamus ampliora, quæ accepimus, major ista hæreditas à me in posterum transeat. Multum adhuc restat operis, multumque restabit; nec ulli nato post mille secula præcludetur occasio, adhuc aliquid adjiciendi.* Atque in his *Plus Ultra* conatibus, rationi solidæ & multifariæ experientiæ superfundamenta, occupatissimos se exhibuerunt hætenus Viri Medici Clarissimi & Excellentes,

L. CHRISTIANUS CRUSIUS, Zittâ-Lusatus.

(Cui jam Anno 1670. prægnantes obrationes, & speciatiim ex Competitorum defectu, Privilegia Doctoralia concessa fuerunt.)

L. THEODORICUS Olitzsch / Hamburgensis.

L. JACOBUS Wolff / Numburgensis.

L. CHRISTIANUS-JOHANNES Lange / Pegaviens.

L. JOHANNES-DANIEL Schmoller / Salzungen-Thur.


L. JOHANNES-WILHELMUS PAULI, Lipsiens.

L. BENEDICTUS Gankland / Dresdensis.

Quibus, ut præmia digna anteaكتورum Laborum reportent, supremos nempe in Arte Medica Honores ac Privilegia Doctoralia, diem proximum Jovis destinavimus. Quem Promotionis Doctoralis Actum, in Ædibus Paulinis celebrandum, ut splendidiorem pariter ac solenniorem honorificà suà Præsentia reddant, *Magnificum Academicum Rectorem*, utriusque Reipubl. Patres conscriptos, nec non cæteros Doctores, Licentiatos, Magistros, Excellentissimos ac Præclarissimos, ut & omnes bonarum Artium Studiosos, eà quâ par est observantiâ ac humanitate rogamus ac invitamus; Quam benevolentiam omni Observantiæ Officiorumque genere demereri prompti paratique studebimus.

P. P. Dominicâ XXV. post Fest. Trinitatis die 20. Nov. Anno 1681.





LECTOREM BENEVOLUM

Officiolissimè salutat,

Et ad

ORATIONEM

Professionis

*Botanices Ordinariæ*

ANATOMIÆ EXTRAORDINARIÆ

INAUGURALEM

Humanissimè invitat

MICHAEL ETTMULLER,

Phil. & Medic. Doctor, & Facult. Med. Assessor.



T gloriosum apprimè est Medico, generosioribus instructum esse remediis, & sublimioribus medendi arcanis, ceu tot fortissimis telis, contra ferociore vite humanæ hostes armatum incedere, ita necessarium vel maximè, ut scitè in hos torquere eadem & evibrare, seu legitimâ methodo administrare calleat. De cætero enim metuendum omninò foret, siquidem Galeno teste, nil magnificè profit, quod non multum quoque nocere queat, ne quæ Deorum auxiliatrices manus salutiferâ ope, prudenter adhibita, repræsentare dicuntur medicamina, perverso ac temerario abusu sit gladius in manu furentis. Posterius hoc imminet ab Empiricis, qui audaciùs quàm prudentiùs (utut subinde audaces fortuna adjuvet) eadem remedia hoc saltem ex fundamento, quod aliquoties prosperum eorum experti sint successum, promiscuè haud rarò pluribus propinare satagunt, quid de cætero ab iisdem expectandum veniat agro, minus solliciti. Felices sanè in eo, quod nesciant, quantum nesciant, & quantum interdum agro juvaminis sub specie imponant. Prius illud verò ad Dogmaticos attinet Medicos, qui prudentiùs quàm audaciùs vix moliantur quicquam prius, quàm omnibus exactè trutinatis, tam in agro quàm remedio, circumstantiis, debitam occasionem, (quæ medicationis cujuscvis anima meritò audit, & subinde cursu perquàm præcipiti tantum non evanescere solet) nacti fuerint, quâ Naturæ, morborum medicatrici, auspiciatò succurrere, ipsique auxiliares suas copias dextrè sociare queant. Ad quod ipsum, potissimum Artis Medicæ opus, requiritur ante omnia exacta, quàm fieri potest, remedium, speciatim sic dictorum Simplicium, seu, ut vocari aliàs solet, Materiæ Medicæ cognitio, sine qua nec præparare dextrè, aut artificiosè aliis jungere, nec nisi tremulâ manu portigere, eadem possumus. Præparatio enim, & quæ huc pertinet, compositio simplicium, cò principaliter collimare debet, ut vel nucleus medicamentosus à corticum involucris exactè deliberetur, vel si quæ insit noxia aut virulenta vis, maturè corrigatur, deficiens autem proprietas ipsi arte concilietur. Tutius enim ex illo, ex hoc efficacius, obtinebitur medicamen. Sed quomodo impetrari hoc commodè poterunt, nisi constiterit prius, ubi nucleus iste medicamentosus reconditus fuerit, sub quantis ac qualibus claustris

claustris obferatus delitefeat, qui solvi debitis mediis repagula, & duriores nodi cuneis æquè duris diffringi queant? Quomodo virulenta vis, cujus larvâ summæ haud rarò potestates obvelantur, enervari debite ac cicurari, alienæ verò proprietates induci, mutari verò artificiosè nativa poterit, nisi in quo deleteria virulentia consistat, aut quousque sufficiant deficientque naturales dotes, expiscatum fuerit? Quis proportionem potentia medicamentosa ad debellandum morborum hostis robur, quam dosin communiter vocant, determinabit, nisi ipsas potestates probè trutinatas habeat? Quis ordinare debite copias, & quæ in prima acie stare, quæ post principia debeant, medicamina, exponet, nisi qui eorum vires perspectas, & cum hostium turmis antè quasi collatas habuerit? Alia ut transeant. Luce meridianâ ergò clarius est exactæ Simplicium cognitioni (cui, ceu basi, tam artificiosa eorundem præparatio & compositio, quàm methodica administratio, unicè innititur) rationalem morborum curationem, post Theoreticum horum scrutinium, principaliter superstruendam esse. Rectissimè Matthiolus *Comment. in lib. 1. Dioscoridis: Non posse quenquam sine certa simplicium medicamentorum cognitione, nec morbis ratione mederi, neque artem rectâ methodo exercere, nec nisi fortunâ quadam, vel Naturæ ipsius robore ægros sanare.* Equidem plura, eaque longo usu experta, hinc inde prostant remedia, ratio quorum haud æque certa: plurima pariter Idiotas inter oberrant experimenta, quorum tamen causas nesciunt. Paracellus quoque, & si Duelech sanaverit perfectè, (ut cavet ejus *Epitaphium*) non tamen cognitionem Theoricam æquè, ac arcani præpollentem usum nactus fuit: Helmontius *Lithias. cap. 2. §. 15.* Rejicienda verò talia haud statim ex Medicina, cæteroquin metuumdum foret, ne post tam insignem simplicium ac compositorum Pharmacorum ubertatem, ne dicam luxuriam, sterilitas ingens ac inopia nobis tandem superesset. Gratâ ergo mente experientia audiamus dictamina, sed rationis trutinâ probè probeque examinata, cum faciliè alioquin circumspèctiores quoque ab illa falli contingat. Sub his verò Simplicium perscrutandi naturas conatibus haud unam viam ingredi observantur Naturæ Consulti, Medici: Offert enim se primo loco cognitio ista Simplicium superficialis, & quasi nominalis saltem, quæ configurationis externæ integumenta tantum intuetur, & juxta illius speciem in imponendis aptis nominibus, & certas in classes redigendis iisdem, occupatissima est, ut vel solo Vegetabili in regno, reliqua ut sicco præteream pede, laboriosus Botanicorum ausus ostendit. Ast omnis hæc notitia Musæis Curiosorum potius exornandis, quàm animo sciendi avido exactè saturando infervit. Cornu copiae Naturæ omnium oculis sic exponitur, & speciosus Gazophylacii ejusdem apparatus sic lustratur, sed pro ægrorum levamine alia adhuc à Medico requiritur istorum cognitio. Realis nempe illa, magisque solida, & quæ ultra externi habitus limites interiora versus penetrare, ac visitare ipsa illorum viscera satagit, & quæ secreta virtus unumquodque illorum nobilitet, quæ miracula sinu suo claudat, imprimis quâ ratione humanis miseriis sub Morbonæ insultu succurrere valeat, ulterius pervestigare. Cognitio talis, ad quam ulterius tendit Medicus, vel Effectiva est, vel Formalis: Illa sensuum quorumvis apparatus ceu tot adhibet maximas, deque admirandis istorum operationibus, quas in corpore humano exerunt, inprimis sollicita, quantum incolumitati eius prosint, quantum noceant, exactè exploratur. Hæc curiositati humanæ laxat fræna, & secreta Naturæ consilia rimari conatur, ac quibus modis actiones suas in occulto dirigat, ac moderetur operationes adeo mirabiles, expiscari audet. Blanditur in hunc finem quovis modo clavigeræ ejus, sed custodi secretorum illius hætenus fidelissimæ, Pyrotechniæ, sicuti pro priori isto scopo amores ambit pedissequæ illius alacris formosæ, sed animi subinde levioris, non rarò in horas mutabilis, Experientiæ. Quicquid hæc seriò monet, & constanter affirmat, hoc unicè quoad priorem istum cognoscendi modum amplectitur; quod verò illa clam interdum quasi in aurem insusurrando, aut certis quibusdam indiciis insinuando, aperit, quoad posteriorem sciendi rationem avidè arripit. Sola enim est Experientia Magistra illa, quæ de quarumvis rerum naturalium, & speciatim simplicium in corpus humanum operationibus, & inde dependentibus effectibus nos certiores reddit, sine qua etiam loqui aut asserere aliquid, religio sit Medico. Signatura, cujus vestigia quidam sequuntur, mendax est ac fraudulenta, & quasi fucata, adeoque colori ejus non nimis fidendum, nisi quem ab Experientia sibi appinxit. Obscura in plerisque illius sunt indicia, & ex quibus vix certi quid colligere liceat; & paucissimarum facultatum notas subinde exhibendo, nobiliores ferè occultat: extendit se secundum imaginantis conceptum ad artis non secus opera, ac ad Naturæ effectus: & si

[O o o o o 3]

prelius

Pressius illi inhxere velis , æquè facile venenum sub pharmaci specie propinares : Ut taceam , ipsas pro Solis ac soli mutatione simplicium vires eodem sub schemate haud leviter mutabiles existere. Nec sufficit , si oculorum arbitrio , linguæ namque testimonio superaddere velis , & saporibus ac odoribus efficaciam Simplicium dijudicare. Nam quicquid his mediantibus colligi potest , non nisi experientiâ præmonstratum primitus fuit. Præterea est generalis admodum notitia , quæ istis modis obtinetur ; speciales enim dotes , sub specificis saporibus & odoribus reconditæ , non nisi Experientiæ in schola addiscere licet : sub eodem enim intenso amarore absinthium & colocynthis , opium pariter ac Lunæ Vitriolum , diversissimas exerunt potentias : non secus ac suaveolens moschus , & cinamomi lignivè Rhodii oleorum gratia , dispari penitus modo sequiorem sexum afficiunt. Sola itaque Experientia primitus Simplicium operationes & facultates edocet , dum inquieta Ratio formalem in operando modum curiosè inquit , & effectuum istorum causas anxie perquam scrutatur. Vix autem planior easdem investigandi datur via , aut quæ saltem perspicuæ magis explicationi ansam subministrat , adeoque intellectui melius satisfacit , quàm si textura simplicium , prout eadem ex minutis moleculis artificiosissimè coaluit , quantum fieri potest , ritè enodetur , & qualem mutationem mechanicis ex legibus in corporis humani partibus variis inducere valeat , probè consideretur. Quo in negotio fidelissimas operas præstat Pyrothechnia Chymica , simul in consilium vocata , sobriè modò circumspèctæque ejusdem interpretari discamus effata. Simili enim ratione atque modò insinuata concretorum textura , fundamentum est quarumvis impressionum in exteriores corporis partes , & natarum inde mutationum , quas sensitivas aliàs appellamus ; ita illa ipsa est prima radix , ex qua in interioribus corporis recessibus tot varii effectus ( sive per simplicem , modificatum tamen pro texturæ illius varietate , contactum solidæ partes afficiantur , sive per intimiorem penetrantiam atque exactiorem miscelam fluidæ immutentur ) successivâ serie propullulant. Naturæ simia Ars quotidie hoc edocet : cujus ope ut mutari variis sub tentaminibus contingit nativa illorum textura & compositio , ita immutari pariter operandi facultates quotidie experimur , adeò , ut vel venena cicurari queant in tantum , salubria ut fiant Pharmaca ; hoc enim ex principio sal tartari quorumvis venenorum in amplissimo Vegetabili Regno , sive de solutivorum , sive de narcoticorum fuerint classe , universalis audit Corrector ; dum in textura resinosa proximè deleteria vis radicitur , cujus firmior compages , ab acido dependens , reluctatur admodum digestionibus nostris , atque difficulter , vel planè non superatur , tardèque extra vitalem agrum semel intro suscepta eliminatur. Salis tartari ob id imploratur adjumentum , quod enervando nonnihil acidi vim , in tantum texturæ compagem & formam quasi invertit , ut alias præter adscititias proprietates saltem resolubilius longè fiat concretum , adeò , ut minori pertinaciâ solidarum parietibus se agglutinet , & simul promptiori sui cum fluidis nostris associatione vel superari facilius , adeoque eisdem citra insigniorem alterationem assimilari vel exterminari citius queat Corrosivum sublimati venenum per hydrargyri copulam ex texturæ mutatione , ob separata à se invicem acidi spicula , quæ unita prius sensiliori robore penetrabant nostra interanea , effectum adeò salubri emendatur , ut vel draco mitigatus inde audiat , multi usus in Oeconomia nostra Vitali facta testæque conservanda. Antimonii Vitriolum , quod Mercurii vitæ nomine vulgò venit , utut ferociori ex impetu Mercurius Mortis interdum evaserit , loco vix conim. si cum oleo Tartari p.d. præcipitetur , vel pro obtinenda Rosa Minerali , adeò quibusdam decantata , cum Urina humana , ex alcalium horum cum acido , in magisterio præcipitato ætiori connubio , nullâ ablutione perfectè separabili , mitioris longè ingenii subministrat pulverem , texturâ istâ Vitriolicâ in Θsam mutatâ , concreto volatiliori magis fixato , & ita pluribus modis alterato. Qui ex Reguli Antimonii scoris per acida quævis cadit ⚊ , Δis Ⓞati nomine aliàs notus , potenter ventriculum subvertere solet , non absque maligna violentia : sin verò sub debitarum encheirisiū observatione , ab acido & urinoso volatilibus , sociatâ vi præcipitetur , ex texturæ mutatione subministrat subtilius Δ , potens somniferum , antiepilepticum egregium , ac singulare Quartanæ sedativum. Evidentiora talia exempla haud difficulter persuadent , formalem facultatum simplicium & inde oriundarum operationum cognitionem , proximè ex textura illorum prout sub sui genesi à seminali constructa est principio , hauriendam esse. In qua texturæ evolutione ad 2. respiciendum venit principaliter : tam ad ipsam materiæ molem , prout ex minutissimis moleculis seu corpusculis immediatè coaluit , quàm ad corpusculorum istorum determinatam conformationem.



tionem, quantitativis seu mechanicis ex fundamentis definiendam, cujus ratione speciali modo connectuntur invicem, & in concretum singularis texturæ coeunt mutuò, quorum illud materiale scholæ vocare amant, hoc verò formale. Hæc inter posterius perpendendum est specialius, sub operandi simplicium scrutinio, cum mechanicæ istæ in concretis proprietates proximæ sint causæ, quas per motum vel quietem tot ac tantæ mutationes in corporis machina insequuntur. Sed deploranda est ista sensuum nostrorum hebetudo, ac minima talia cognoscendi immediatè ineptitudo, etiamsi variis mediis aciem eorundem acuamus, ut in determinanda speciali texturæ corpusculorum modificatione tantum non cœcutire videamur, adeò à priori, ut vocant, penitus imperscrutabilis illa ipsa existit. Nil aliud restat itaque, quam ipsa istas particulas, prout sub vario  $\Theta$ is,  $\Phi$ is,  $\Psi$ ii,  $\sim$ ,  $\varphi$ x, olei, phlegmatis, resinæ, & simili alio schemate sensibus nostris se ingerunt, attentius paulò considerare, & per Anatomiam Chemicam artificiosâ analysi earundem compositionem ac materialem texturam expiscari, hinc quas, tam absolutas quam respectivas, sive ad partes corporis nostri, sive alia quævis objecta, obrineant proprietates, probè examinare, ut collatis omnibus istis phænomenis, ceu tot præmissis, conclusio tandem, si non semper apodictica, saltem hypothetica, quantum possibile tamen perspicua, & quæ explicandis clarè & distinctè istis operationibus inserviat, eliciatur. Sed quantus labor & hic incumbit industrio cordatoque Medico? siquidem 3. ista vastissima Naturæ Regna peragrandia ipsi sunt sedulò, attenteque perlustranda; ut nihil dicam de meteoris, rore præsertim, ejusque mirabilibus. Quot requiruntur artificia, indefessique labores, ad superanda mineralium claustra? quanta sedulitas ad vegetabilium explicandam crasin? quanta industria ad animalium evolvendam structuram? Taceo, quantum simplicium facultates sub præparatione ac compositione alterentur, sæpissimèque immutentur, prout mediantibus istis plus minus à nativa textura deficiunt, asciscunt, vé alienam. Quorum omnium notitiæ à Tyrone Medico faciliùs hauriendæ, Simplicium seu Materiæ Medicæ Professio Publica inservit, Botanices Titulo insignita, idque vel hanc ob rationem, quod ab herbis Medicina Practica primordia sua cepit, cum Seneca teste, *Medicina quondam paucarum fuit scientia herbarum, quibus sifteretur fluens sanguis, vulnera coirent paulatim: deinde iu hanc pervenit tam multitudinum varietatem.* Crescentibus enim delictis creverunt pœnæ, & sub tot enormibus gulæ erratis atrocior morborum in nos surrexit exercitus, pluribus & generosioribus debellandus medicamentis, haud iis solum, quæ nostra tellus peperit, sed apud Garamantas etiam Indosque natis; quæ tamen sæpissimè haud absque superstitioso, interdum quoque noxio abusu administrari solent. Cum itaque ista Botanices Professio post Gratiosissimam Vocationem *Serenissimorum Principum ac Dominorum,*


DOMINI

DOMINI  
JOHANNIS ADOLPHI,  
*Nec non*  
CHRISTIANI ac MAURITII,  
Saxoniae, Juliae, Cliviae, ac Montium Ducum, per  
Clementissimam Confirmationem  
*Celsissimi ac Potentissimi Principis ac Domini,*  
DOMINI  
JOHANNIS  
GEORGII III.


Saxoniae, Juliae, Cliviae ac Mont. Ducis, Sacri Romani Imperii Archimareschalli & Electoris, &c. &c. &c. Domini mei Clementissimi, mihi demandata fuerit, animus est, suspectum Exoticorum, respectu ad Indigenas habito, Usus, solenni Oratione inaugurali proximo die Veneris, qui erit 17. hujus Mensis, finitis sacris matutinis, exponere. Quem Actum, ut Magnus Academiae Rector, Proceres omnium Ordinum Amplissimi, ut & Phoebi & Aesculapii Alumni solertissimi, splendidâ suâ praelentiâ illustriorem reddere velint, obnixè ac peramanter rogitō: simulque parilem ad obsequia & officia quaelibet sanctè polliceor promptitudinem. P.P. Dominicâ Septuages.

A. O. R. M. DC. LXXXII.

F I N I S.



INDEX.



# INDEX UNIVERSALIS MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

NB. Numerus absolutè positus, Operis Tomum Primum, cum † Tomi Secundi Partem primam; cum \* verò ejusdem Secundi Tomi Partem secundam indignant.

## A.

- A** *Abdominis* apertio in pertinaci alvi obstructio-  
ne † 103. a.  
*Abdominis* apertio in hydropè † 436. b.  
*Abdominis* consensus cum pedibus \* 171. a.  
De *abdominis* dolore casus & obs. \* 339. a.  
*Abdominis* dolores colici † 159. b. † 171. b.  
De *Abdominis* dolore convulsivo casus &  
obs. \* 338. a.  
De *Abdominis* motu convulsivo casus & obs.  
\* 341. b.  
De *abdominis* dolore scorbutico casus & obs.  
\* 429. a.  
Clyster in scorbuticis *abdominis* malis  
\* 659. a.  
*Abdominis* durities in epilepsia &c. unde  
\* 185. b.  
De *abdominis* duritie & inflatione infantis  
casus & obs. \* 353. b.  
*Abdominis* hydrops † 691. b.  
*Abdominis* incisio in obestitate \* 836. b.  
*Abdominis* inflatio, v. flatus stomachi.  
De *abdominis* murmurib. casus & observ.  
354. a.  
*Abdominis* murmura in hepatis inflamma-  
tione \* 282. a.  
*Abdominis* musculi inflammati † 576. a.  
*Abdominis* obstructio unde \* 140. a.  
*Abdominis* rinx & fissuræ, v. fissuræ.  
*Abdominis* torminum in peste cura † 377. b.  
*Abdominis* tormina varia, eorumque ortus  
† 157. a.  
*Abdominis* torminum in persecuta † 377. b.  
De *abdominis* tumore casus & obs. \* 340. b.  
\* 360. a.  
*Abdominis* tumor in hydropè † 425. a.  
*Abdominis* tumor in hydropè quomodo cu-  
randus † 441. a.  
*Abdomen* tumidum post partum \* 328. b.  
De *abdominis* infantis tumore casus & obs.  
\* 413. a. & b.  
*Abdominis* tentiones † 804. a.  
*Abdominis* viscerum consensus cum cerebro  
† 701. a.  
*Abdominis* & viscerum vitia in morb. chron.  
† 90. b.  
*Abdominis* vitia in cruditate acida &c.  
\* 205. a. v. alvus, venter &c.  
*Abel Mosch.* ejus usus. 373. a.  
*Abhorrentia* v. nausea.  
*Abies*, ejus differ. præparata & usus. 373. a. b. seq.  
*Ablactationis* tempus † 1069. b.  
*Ablactatorum* purgatio † 1074. a.
- Abnehm*en † 394. a.  
*Abortus* sive partus immaturus, cum ejus causis  
† 1010. a. Diagnos. † 1012. a. Prognosis  
† 1012. b. Prodrum & varii † 1012. a. cu-  
ra præservatoria, & post eum in abortien-  
te instituenda † 1013. a. Symptomata quo-  
modo præcavenda † 1015. a.  
*Abortus* quomodo contingat \* 321. a.  
*Abortum* provocantia † 994. a.  
*Abortus* prodromus, dolor lumborum, in  
diarrhœa \* 143. a.  
*Abortus* ex diarrhœa † 107. a.  
De *Abortus* metu, casus & obs. \* 438. a.  
*Abortus* foetus periculosior quàm legiti-  
mus partus \* 320. b.  
*Abortus* in peste prognos. † 363. a.  
*Abrotanum* ejus differ. præparata & usus. 374. b.  
*Abrotanoides* \* 448. a.  
*Abcessus* quid? † 532. a. \* 5. b.  
*Abcessus* unde \* 3. b. † 182. a.  
*Abcessum* Criticorum ortus & cura \* 16. a.  
*Abcessum* febres lentæ † 310. a.  
*Abcessus* febrium lentam concilians \* 237. b.  
*Abcessus* in fractura ostium \* 71. b.  
*Abcessus* in hepatide † 576. b.  
*Abcessibus* ex inflammatione ortis nil con-  
fert transfusio sangu. \* 108. a.  
*Abcessus* intestin. ex colica † 161. b.  
*Abcessus* lactantium † 1054. a.  
*Abcessus* mesenterii &c. &c. v. mesenterii  
abcessus &c. &c.  
*Abcessus* in pleuritide cura † 573. a.  
*Abcessus* ventriculi v. ventriculi abcessus.  
*Abcessus* circa collum velicæ Prognosis  
† 583. a.  
*Abcessum* fœtor, symptomata \* 239. b.  
*Abcessus* recidivantes unde \* 3. b.  
Cataplasma in abcessibus \* 657. b.  
*Abfinthiacum* vinum medicatum \* 649. a.  
*Abfinthium* ejus differ. præparata, vires & usus.  
375. b. \* 79. a.  
*Absorbentium* virtus † 151. b.  
eorum compositiones. 1012. a.  
*Absorbens* pulvis acidus \* 632. b.  
*Absorbentia* acidi, præcipitantia \* 589. b.  
† legitima methodo usurpanda, tam in-  
ternè quàm externè † 594. a. b. Perver-  
so abusu multum nocent \* 595. b. Spe-  
ciatim recidivas prioris, aut generatio-  
nem novi morbi inferunt \* 597. a. Quod  
confirmant exempla ex regno vegetabili  
\* 598. a. ex regno animali & minerali \*



# INDEX UNIVERSALIS

601. a. b. ritè sint præparata \* 603. a. non saturata ab acidis \* 603. b. Quædam enim sic alienas vires acquirunt \* 604. b. Non tamen quævis per acida præparatio rejicienda \* 605. a. sed saltem nimia saturatio \* 605. b. moderata dosi exhibenda \* 607. a. debitus selectus instituendus respectu remedii \* 607. b. Selectus respectu ægri \* 609. b. ordo debitus observandus \* 611. a. Conveniente tempore usurpanda \* 612. b. præmissis primas vias mundificantibus \* 612. b. idque ut plurimum, sed non semper \* 613. a. In acutorum incremento & statu \* 613. b. In intermittentibus ante paroxysmum \* 614. a. Ventriculo vacuo \* 614. b. subjungantur purgantia \* 614. b. fluidis concitator motus conciliandus \* 615. a. b. quot & quibus modis \* 616. a. aliis remediis socianda \* 616. b. purgantibus ibid. Sudoriferis \* 617. b. sed ritè correctis \* 619. b. & appropriatis \* 620. a.

*Abstemia* † 39. b.

*Abstergentes* & alterantes pilulæ \* 638. b.

*Acacia*, ejus differentia, præparata & usus. 377. b. seq.

*Accipiter* cujus usus in Medicina 684. b.

*Acetosa*, ejus differentia, præparata & usus 378. a.

*Acetofella*, ejus differentia, præparata & usus 379. a.

*Acetum* quomodo fiat 569. a.

Ejus generatio, præparata & usus. 317. a. b. 571. a.

quibus prodest vel nocet 570. a.

aceti situs unde \* 84. b.

usus in scorbuto & mal. hypoch. † 492. a.

usus præservatorius in peste † 365. b. † 366. b.

usus in malignis morbis epidemicis \* 249. a.

abusus ad phthisin disponens † 397. b.

Aceta medicata, ea parandi modus 829. b.

Acetum Alexipharm. vid. Alexipharm.

Acetum diaphor. vid. diaphor.

Acetum Philosophorum acerrimum † 453. a.

Aceti scyllitici usus \* 832. a.

Aceti ex vino usus contra obesitatem \* 832. a.

Acetum vomitorium, vid. vomitoria.

Aceti vitriolati benedicti compositio † 715. a.

*Achores* infantum, cum causa, prognosi, cura † 1097. b. seqq. † 346. a. \* 550. b.

symptomata † 245. a.

sub dentitionis dolore disparentes, post rursus efflorescentes \* 570. a.

*Acidula* quid, quibus pro sint, vel noceant. 715. a.

extra locum natalem an easdem possideant vires, ac ad scaturiginem. 716. b.

Acidularum efficacia unde \* 79. a.

urendi modus. 716. a.

vix ascendunt supra diaphragma † 648. b.

usus in Ictero † 450. a.

usus in scorbuto & mal. hypoch. † 496. b.

ad phthisin disponentes † 397. b.

Ægranarum usus contra obesitatem \* 835. a.

*Acidula naturales*. 268. b.

earum vis. 268. b.

earum vices subeunt Martialia \* 184. a.

*Acidula artificiales*. 717. a.

earum præparatio. 268. b. seqq.

*Acidum* sub pingui latet. 12. b.

Acidum corrigentia † 4. a. † 5. a. † 6. b. seq. † 8. b.

Acidum augentia † 7. a.

Acidum stomacho inimicum \* 813. b.

Acida quæ & quat. nervis & stomacho minus hostilia \* 126. b.

Acidum p. n. corrigit præcipitatio \* 588. b.

Acidum protopepticum \* 215. a.

Acidum metallorum, vid. Metalla.

Acida quo sensu dicantur præcipitare acalia. 265. a.

acidum pingue, vitæ radix \* 79. b.

acidum & pingue qua ratione efficiant calorem & lucem. 93. b.

Acida, quat. talia, non attenuant aut resolvunt \* 39. b. Saturni attractu transmutantur in dulcedinem aluminosam adstringentem \* 39. b. nihil magis & potentius & à priori quali destruit acidum, quàm alcali \* 41. a.

Acidum & alcali † 3. a. in macro- & microcosmo primariam meretur considerationem † 4. a.

Acidum & Alcali non sunt principia formalia, sed tantum instrumentalia. 12. a. \* 621. b. & principia 11. b.

Acidum & Alcali non sunt principia concretorum materialia, sed tantum principia \* 622. a. Interdum sunt invicem transmutabilia \* 11. b. seq. 622. a.

Acidi & alcali concursus quid efficiat. 252. a.

acidum & alcali quid agunt sub fermentatione & effervescencia. 18. b.

in fermentatione primatum obtinet acidum, in putredine alcali. 357. a. b. v. Alcali.

acidum in regno animali rarò manifestum. 12. b.

Formicæ multum possident acidum, ejusque effectus. 12. b. seq.

Acidorum cum oleis destillatis examen. 351. b.

Acidus succus veterum, in stomacho † 40. a.

acida visciditas in stomacho † 83. a.

Acidi vis in stomacho † 40. a.

blandè acida stomacho maxime amica \* 129. a.

Acidorum abusus & noxa \* 238. b.

Acidorum usus in graviditate † 994. b.

Acidi morbofi origo \* 591. b.

Acidum adeò vitiosum in infantibus unde \* 535. b.

Acidi scorbutici generatio \* 180. b.

acida in febribus &c. nocent † 244. a.

Remedia acida febribus curandis quid conferant. 233. a.

Acidum volatile plus minus oleosum sanguinis corrigens potio \* 640. b.

Acidorum usus in peste † 364. a. seqq. † 368. b.

Acida in nobis peccantia sunt varia \* 180. a.

Acidum in primis viis peccans variorum morborum causa † 182. b.

Acidum peccans appetitum intendit \* 298. a.

Acidi corrosivi in ulceribus origo \* 54. b.

Acida quat. nocuant in Col. convulsiva. \* 180. b.

acidum nervis & intestinis inimicum † 124. a.

acida temperantia † 315. b. † 323. a.

*Aculey*. 390. b.

*Acornu*

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Acorus*, ejus differentia, præparata & usus 379. a. b.
- Aeres succi* sycopen inducentes † 389. a.
- Aeria medicamenta* † 4. a.
- Acrimonia sanguinis* colliquativa unde † 648. a.
- Acrimonia temperantia* † 4. b. † 5. a. † 8. b. \* 4. a.
- Acrochordones* quid, quomodo curentur \* 30. b.
- Actiones animales* unde \* 90. a.
- Actiones corporis voluntariæ & contra, nobis inficiis vel concitiis naturales, animales. \* 722. a.
- Actionum humanarum principia \* 783. a. seqq.
- Actiones determinantes ideæ \* 470. b.
- Actionem turbans furor archæi \* 486. b.
- Actio ignota Helmontii quid? \* 179. a.
- Acupunctura* in digitis, cas. observ. \* 354. a.
- Acustici nervi* vitia † 734. b. & † 740. a.
- Acutus dolor* † 345. a. 750. a.
- Acutus morbus* nullus est hæreditarius \* 111. b.
- Remedia in acutis morbis, à Medicis caute propinanda, quæ \* 238. b.
- Acuti morbi puerperarum, cum diagnosi, prognosi, cura † 1045. a. b.
- Adamas* cujus usus in Medicina. 724. b.
- Adeps*. Ejus detractio in obesitate \* 836. b.
- v. pinguedo.
- Adiantum*, ejus differentia, præparata & usus 379. b.
- Adjuvans medicamentorum compositorum* \* 627. a.
- Adstringentia* † 4. a.
- Adstringentia decocta 447. a. \* 650. a.
- Adversæ*, licet deteriora, insuetis, licet bonis, minus nocent \* 125. b.
- Adultiores virgines* cur minus sæcundæ † 985. b.
- cur difficilius pariunt † 1019. b.
- Ager status* unde 70. b.
- ægrî status cum sano conspiratio \* 95. b.
- Ægrî status fundamentum fermentatio \* 484. b. v. morbus.
- ægrorum solamen, vid. opium.
- Ægropili* 441. b.
- Æquivocum* inter & univocum non est terminus intermedius, qui vocetur analogus \* 446. a.
- Aeris consideratio* \* 737. a. spiræ ejus, vis elastica & expansiva † 66. b. \* 738. a. \* 739. a. b. ejus ingressus ad sanguinem & alios corporis liquores \* 744. a.
- Sanguini commistus quid conferat. 66. b.
- Volatilisationis causa est \* 746. a. Venenosa miasmata in aere natantia subito inficiunt & enecant \* 746. b. malignus an misceatur sanguini \* 746. b. Penetrabilitas ejus \* 748. b.
- Aer respirationis materia \* 737. a.
- an aer inspirando cerebri quoque penetralia pro spirituum animalium materia subeat \* 749. a. fœtus in utero respiratio, urinatorum item, amphibiorum, an fiat per aerem \* 749. b. \* 755. a. Cur animalia, tam ob æris inspirati cohibiti que præsentiam, quam in Machina Boyliana, propter ejusdem aeris exantlationem paucis minutis moriantur \* 757. a. b. aer millies levi orâ quâ \* 761. b. ejus expansio \* 764. a. cur animalia, pulmonibus licet inspirato ab aere dispanis, si os naresque illis obtu-
- rentur, omnibus nihilominus vitæ sigillis conf. illi priventur, ac penitus denique moriantur \* 764. seq. Vitales particulæ in aëre an dentur \* 766. a. b.
- Aer quantum conferat ad auditum. 96. b.
- Aeris concursus in sono auribus ingerendo † 739. b.
- Aeris effectus ad ignem. 94. a.
- Aer ignem dirigit & moderatur. 7. b. seqv.
- Aeris concursus ad nutritionis negotium \* 827. a.
- quid conferat massæ sanguinæ & succo nutritio. 46. a.
- ⊖ Aeris universale. 868. b.
- Aer plenus sale Hermetico \* 521. a. b.
- Aeris austeri, præsertim autumnalis &c. injuriæ naribus, labiis, laryngi &c. illatæ † 687. b.
- Aeris inclementia ad ophthalmiam disponens † 595. b.
- Aer hieme inclementior \* 127. a.
- Aeris tempestas, \* 785. a. v. tempestas.
- Aeris ad vitam & sanitatem necessitas & effectus. 120. a. b.
- Aeris in fermentatione necessitas. 253. a.
- Aer infectus & contagiosus † 325. a.
- Aer pestilentialis † 359. b.
- Aeris medicatio in peste † 364. b.
- Aeris ratio in gravidis habenda † 994. a.
- Æstivatio* post mensium emansionem \* 165. b.
- Æstivationes post partum \* 120. a.
- Æstus* in cholera \* 150. b.
- Æstus febrilis consideratio \* 203. a. \* 234. a. † 244. a. † 245. b. † 285. a. † 304. a.
- Æstus febrilem compescencia † 299. b. † 300. b.
- Epithema* in febrium æstu contra capitis dolorem \* 641. b.
- Julepus in nimio æstu tertianæ, \* 643. b.
- Epithema in æstu corporis nimio \* 641. b.
- De æstu casus & obs. \* 339. a. \* 352. b.
- Æstus in flatibus † 68. b.
- De æstu infantis casus & observ. \* 346. b. \* 353. b. \* 363. b.
- De æstu nocturno febrili casus & observat. \* 346. a.
- Æstus in peste cura † 375. a.
- Pro infringendo æstu pilula febriles in chronici. † 639. a.
- ardor, causus, calor, phlogosis.
- Ætas* quid; triplex \* 92. b.
- Ætatis concursus ad nutritionis negotium. \* 826. b.
- Comparatio inter ætates hominis annique \* 681. a.
- Ætites* cujus usus in Medicina. 730. a.
- Ætata pars* morbo † 1. b.
- Ætationes* sive attributa corporum quid sint. 25. a.
- Ætactus* animi cur impetus suos exerant in stomacho \* 137. a.
- Ætactuum pronitas & diversitas \* 117. b. seq.
- Ætactus non oriuntur, nisi in animalibus \* 95. b. præsupponunt prægressam notitiam \* 95. b.
- Ætactus animi tabem inferentes † 395. b.
- Ætactuum exorbitantia in nutricibus infantes graviter lædit † 1068. a.

# INDEX UNIVERSALIS

## *Affectus corporis* (v. morbus)

*Affectuum* combinatio \* 117. a. Complicatio praxin reddit difficilem \* 118. b.  
*Affectus* distinguendus ab adjuncto ipsi seu superveniente † 864. a.  
*Affectus* cur sæpe incurabiles habeantur † 1. b. \* 78. a.  
*Affectuum* communicatio per consensum partium \* 281. b. sq.  
 Quomodo in cognitionem affectus commodè deveniendum \* 119. a.  
*Affectus* p. n. quid \* 668. a.  
*Agallochum* ejus differentia, præparata & usus 380. a.  
*Agarum* ejus differentia, præparata & usus. 615. b.  
*Ageratum* ejus differentia, præparata & usus 380. b.  
*Agglutinantia* remedia quid \* 38. a.  
*Agnus*, quæ ejus partes, quæ habeant usum & qualem in medicina. 645. a.  
 Agni perterrefacti sanguis † 33. a.  
*Agnus castus*, ejus præparata & usus. 381. a.  
*Agrimonia*, ejus præparata & usus. 381. a.  
*Agrippa*, quales factus † 1015. b.  
*Agrypnia* s. vigilæ nimie, earumque causæ † 702. a. Diagnofis † 703. b. Prognofis † 704. a. Cura † 704. a. feqq.  
 De Agrypnia, casus & obf. \* 344. a.  
*Agrypnia* in delirio melancholico unde \* 107. b.  
*Agrypnia* in febr. acut. cura † 301. a.  
*Agrypnia* in febr. malign. † 318. b. † 326. b.  
*Agrypnia* in melancholico delirio arcenda † 873. b.  
*Agrypnia* in pleuritide † 564. b.  
 Emulſio epithematis modo ad agrypniam \* 644. b.  
 Epithema contra agrypniam in cephalalgia febrili \* 641. b. v. Vigilæ.  
*Agyræ* qui \* 668. a.  
*Alabaſtrites* cujus usus in Medicina. 730. a.  
*Alaud.* 460. a.  
*Alauda* cujus usus in Medicina. 685. a.  
*Albuginis* oculi curam &c. † 721. a. † 722. b. infantum † 724. b.  
*Alcabeſticus* menſtrui viſ ſolutiva unde \* 517. b.  
*Alcali* † 3. a. in macro- & microcoſmo primariam meretur conſiderationem † 4. a. unde dicatur 13. a. 249. a. quoruplex. 13. a. cur dicatur ⊖ lixivioſum. 13. a.  
 Alkali & acidum non ſunt principia formalia, ſed tantumſtrumentalia \* 621. b. v. acida.  
 Alcalia non præexiſtunt in concretis formaliter, ſed tantum materialiter \* 622. b. loco alcali potens terreum acido opponendum \* 623. b.  
 Alcalia potius paſſivè ſe habent quam activè &c. † 322. b.  
 Alcalipurum non datur niſi in ~ ⊖ \* c. c. Ψ parato. 15. a.  
 Alcalium mira viſ in corrigendis venenis &c. \* 130. b.  
 Alcalium herbarum virtutes \* 814. b.  
 Alcalinæ herbæ inſtingentes ebrietatem \* 813. b.  
 Alcalia oleoſa vel ſulphurea ab acido præcipitantur in album \* 5. a.  
 Alcalinum quomodo in corpore peccat \* 804. b.

Alkali vitiatum temperantia † 8. b. v. Acidum.  
*Alcea*, ejus præparata & ulus. 381. b.  
*Alces*, cujus ulus in Medicina. 646. a.  
*Alchermes* 391. b.  
*Alchymia* finis & effectus. 30. b.  
*Alchymilla*, ejus præparata & ulus 382. a.  
*Alcool* quid? \* 633. a.  
*Alexipharmaca* † 5. a. quomodo venena corrigant \* 248. b.  
 Alexipharmacorum ulus in febr. mal. † 329. a.  
 Alexipharmaca viſ animalium beſtiis venenatis veſcentium \* 464. a.  
 Alexipharmacorum ulus in peſte † 369. b.  
*Alexipyreton* univerſale Bartholetti † 169. b.  
*Algens* dolor † 746. b. † 750. a.  
*Alimenta* quo ſenſu mendicamentofa dicenda. 149. a. quæ ſana dicenda. 120. b.  
 Alimentorum theriaca panis \* 827. b.  
 Alimentorum neceſſitas 46. b.  
 Alimentorum tranſmutatio. 47. a.  
 Alimentorum facultates unde determinet Hippocrates \* 519. b.  
 Alimentorum in Chylum reſolutio. 121. a.  
 Alimentorum deſectus in ſanis ſcrupuloſus nimis revera eſt fruſtraneus † 1067. b.  
 Alimentorum copia variè nocet \* 174. b.  
 Alimenta an diſponant ad morbos præciſè &c. † 634. b. non generant ſtatus, in quibusdam ſaltem magis minusque ſunt aptata ad eos elaborandos † 66. a. pro diſteſtionis ratione variè nutrientia, pro animalium diverſorum chyliſicationis modo \* 825. a.  
 Alimentum idem cur hunc obefum, illum macilentum reddat 110. b.  
 Alimentum minus alteratum & inde nata mala \* 4. a.  
 Alimentorum maſticatio & deglutitio læſa † 47. a.  
 Alimenti vehiculum, ſerum \* 828. a.  
 Alimenta difficilis concoctionis quâ ratione in concoctione adjuvantur. 54. b. v. nutrimentum, cibus.  
*Alkekengi*, ejus præparata & ulus. 382. a. b.  
*Alliaria*, ejus præparata & ulus. 382. b.  
*Allium*, ejus præparata & ulus. 303. a. b.  
*Allium ſylveſtre*, ejus præparata & ulus. 384. a.  
*Aloe*, ejus differentia, præparata & ulus. 635. a. Aloës ulus in pilulis \* 638. b. Aloës ulus hæmorrhoides irritans † 145. a. Aloës ulus purgatorius † 19. a.  
*Alloes-Holſ.* 380. a.  
*Aloëricorum* ulus in gravidis † 995. b.  
*Alopecia* cura † 531. b.  
*Alptruſen* v. Incubus.  
*Alſine*, ejus præparata & ulus. 384. a.  
*Alterantia* quoruplicia. 157. b. ſeq. Sunt vel generalia vel ſpecialia † 4. a. Alterantium ulus & abuſus. 158. a. b. Alterantia binis modis proſunt † 3. b. Alterantia univerſaliora reſp. acidi, ſunt præcipitantia \* 590. a. Alterantia decocta \* 650. a. Alterans decoctum, inſtar julepi etiam uſurpandum † 650. b. Alterantia electuaria \* 635. a. Pilulæ alterantes, earum compoſitio. 861. b. Alter-



# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Alterantes & abstergentes pilulæ \* 638. b.  
\* 639. a.
- Alteratio* unde 19. a.
- Alteratio corporis præternaturalis subitanea in peste. † 361. a.
- Humorum in corpore secund. res non naturales † 325. b.
- Alterativ-Transf.* \* 652. a.
- Rühlander *Alterativ-Transf.* \* 650. b.
- Althea*, ejus differentia, præparata & usus. 384. a.
- Alumen* quid, ejus præparata & usus. 274. b. seq. 800. a. seqq.
- Alvus.*
- Ejus contentorum expulsio læsa † 90. a.
- Alvi retentio, obstructio quid, ejus causæ † 90. a. † 97.
- Diagnosis & prognos. † 91. b. cura † 92. a.
- Alvo contenta inepta ad motum tribus ex occasionibus † 90. b.
- Alvinorum contentorum expulsio aucta & fluxus. † 103. a.
- contentorum expulsio depravata † 123. a.
- Alvi exoneratio cum deliquio animi &c. † 144. a.
- Alvi egerendi conatus frustraneus & tormina † 112. a.
- alvi dejectio laboriosa post mensium naturalem emanationem \* 165. b.
- Alvi fluxus unde fiat \* 142. a.
- Alvi fluxus in febr. mal. † 327. b. † 337. b.
- in febr. symptomat. lenta, tandem hæctica, ex abscessu mesenterii cura \* 242. a.
- in peste † 360. b.
- Fluxus gravidarum in peste prognos. † 363. a.
- Alvi fluxus colliquativi in febr. &c. &c. \* 143. b.
- fluxus in Petechiis † 341. a. seqq.
- in variolis † 348. b. seqq.
- Alvi proritatio largior ex medicamentis in dosi non excedentibus \* 160. a.
- Alvum adstringentes tractus & alia † 90. b.
- Alvi clausura unde \* 190. a.
- Alvi obstructio. Casus & observatio \* 388. a.
- De alvi retentione casus & obs. \* 425. a.
- Alvi pertinax obstructio ut curanda † 101. a.
- Clyster in alvi occlusionem pertinaciori \* 660. a.
- alvi in obstructione globulorum, follis &c. usus 173. a.
- Pilulæ in desperata alvi obstructione \* 638. a.
- Alvi obstructio curata pomis Borsdorff. \* 188. a.
- Alvi obstructionis in calculo renum cura † 638. b.
- Alvi obstructio in colica † 161. b.
- Julepus alvum apertam servans in febr. maligna \* 644. a.
- Alvi adstrictio in hepatis inflam. \* 182. a.
- Alvi obstructio & imminens ileos cum hæmorrhoidibus apertis \* 139. b.
- Hypochondriacorum & melancholicorum alvus obstructa \* 153. a.
- Infusum pro alvo sicciori in malo hypoch. \* 648. b.
- Alvi obstructio in lue Venerea † 464. b.
- Alvi obstructionis in scorbutu cura † 495. b. † 507. b.
- Alvi retentio ex conculcatione &c. \* 368. b.
- Alvi suppressio in peste † 362. b.
- Alvus gravidarum sit laxa & aperta † 995. b.
- Alvi feces, v. Intestina, feces, excrementa &c.
- Alvi obstructio infantum cum causa, diagn. prognos. cura † 1080. a. b.
- Alvum infantum referantia † 1074. a.
- Alvi dejectiones crebræ in infantibus † 1077. a.
- Alvi fluxus infantum † 1092. a.
- Alvi infantum tormina † 1075. a. causa † 1076. a. Prognos. cura † 1076. a. seqq.
- Alvi infantum tormina unde \* 178. b.
- Alvi excreta & tormina varia infantum unde \* 536. a. cura \* 548. a.
- tormina infantum ex acido lactis † 245. a.
- In torminibus alvi puerorum pulvis \* 633. a.
- v. Venter, diarrhœa, dysenteria, fluxus.
- Alysson*, ejus præparata & usus. 384. b.
- Amara*, hepatis anima \* 283. a.
- Amara stomachus maximè abhorret \* 129. a.
- Amara cur ægri abhorreant \* 156. a.
- Amara in Colic. convulsiva conducentia \* 180. b.
- Amaror* in ore ebriantium \* 134. a.
- Amaror oris in febre quid significet \* 119. a.
- De Amaro ore casus & observatio \* 353. a.
- Amarus sapor in ore in hepatis inflammatione &c. \* 281. b.
- Amatorius pulsus* an detur † 392. a.
- Amaurosis* considerata † 729. b.
- Ambra* laus † 391. b.
- Ambra vis inebriativa a. † 384. b.
- Ambra usus in confortanda memoria † 853. b. seq.
- Ambra grysea quid, ejus præparata & usus. \* 11. b. seq.
- Liquida ambra cujus usus. 526. a.
- Ambulosa* febris † 282. a.
- Ambustio* quid, ejus triplex gradus, differentia \* 64. b.
- prognos. cura chirurgica \* 65. a. b.
- Epithemia in ambustis \* 642. a.
- Amianthus* cujus usus in Medicina 730. a.
- Ammon- Kraut.* 385. a.
- Amni.* ejus differentia, præparata & usus. 385. a.
- Ammoniacum Sal* quid, ejus præparata & usus. 794. b. 796.
- Veterum & nostrum, ejus præparationes & usus 249. b. seq.
- ⊖ ammoniaci color albus quomodo in ⊙ r. possit transmutari 250. b.
- Amnion* quid † 990. a.
- Amomum*, ejus usus. 385. a.
- Amor insanus*, ejus Diagnos. cura. † 892. a.
- De amore ex philtro, casus & obs. \* 418. a.
- Amor Epilepsiam concilians \* 784. b.
- Amoris poculum, v. philtum.
- Ampffer / Buch-Ampffer.* 379. a.
- Amphibiorum* cordis meatus parentes \* 755. a.
- Amputatio* membri gangrena vel sphacelo corrupti, in quo loco, qua in parte instituenda \* 77. a. b. quomodo fiat, quibus instrumentis ibid. b. hæmorrhagia quomodo tunc sistenda \* 77. b. nostrates loco amputationis separant mortuum à sano beneficio butyri antimonii \* 77. b.
- Amuletorum* influentia & efficacia \* 489. b.
- Amuleta antepileptica † 817. a.

Amu-

# INDEX UNIVERSALIS

- Amuleta in peste † 363. b. † 367. a.  
*Amygdala*, eorum differentia, præparata & usus  
 388. a. b.  
*Amygdalarum* vis nutritiva \* 827. b.  
*Anacardium*, ejus præparata & usus. 386. a.  
*Anagallis*, ejus differentia, præparata & usus. 386.  
 a. b.  
*Anagyris*, non foetida cujus usus. 616. b.  
*Anais* qualis affectus † 841. b.  
*Anais* totius corporis in aphonia, omni-  
 busaliis functionibus, tam vitalibus, quam  
 animalibus salvis † 727. b. v. Itupor.  
*Anais* subitanea † 219. b.  
*Analepsis* senum \* 635. b.  
*Analeptica* † 391. b.  
*Analeptica* emulsio \* 644. b.  
*Analeptica* portio sub & post sudorem in febr.  
 \* 640. b.  
*Analogia* non est identitas \* 227. a.  
*Analogia* macro & microcosmi \* 227. a.  
*Analogus* terminus an detur inter æquivoc.  
 & univ. \* 446. a.  
*Anaphria* † 118. b.  
 qualis affectus † 786. b.  
*Anaptyxis*, *ἀναπνοή* \* 721. a.  
*Anas*, cujus usus in Medicina. † 685. a.  
*Anasarca* & leucophlegmatia quomodo diffe-  
 rant † 417. b. ejus Diagn. Progn. cura  
 † 422. a.  
*Anasarca* unde \* 21. a.  
*Anasarca* & Ascites quomodo differant. 227. a.  
*Anasarca* laborantium urina qualis, vid.  
 urina.  
 De anasarca casus & obs. \* 431. b.  
*Anastomosis* seu osculorum vasorum sanguif. aper-  
 tio quomodo fiat † 608. a. quadruplex  
 ibid. b.  
*Anastomosis* viscerum sanguif. † 652. a.  
*Anatomia* hodie studiosius excolitur, & cur † 1. a. \* 78.  
 a. \* 842. a.  
*Anatomia* & chymia bini oculi medicinæ.  
 33. a.  
*Anatomix* insignis Excultor Hierophilus  
 Chalcedonius. 29. a.  
*Andorn/ weisser Andorn*. 478. b.  
*Anethum*, ejus præparata & usus. 387. a. b.  
*Aneurisma* qualis tumor, unde, diagnosi  
 † 32. b.  
 Prognosis & cura \* 33. a.  
*Angelica*, ejus differentia, præparata & usus. 387.  
 b. seq.  
*Angina* qualis affectus, cum causis, † 538. b. seqq.  
 pars affecta, & quatuor species.  
 † 538. a.  
 v. Faucium inflammatio.  
*Anginæ* febres † 244. a.  
*Anginæ* febrium malignarum symptomati-  
 cæ cura † 543. a.  
*Angina* pestilentialis † 358. b.  
*Anguilla* cujus usus in Medicina 691. a.  
*Anguilla* febrem abhorrenti concilians  
 † 257. b.  
*Anguillæ* usus hecticus † 317. b.  
*Angustia* & anxietas Præcordiorum † 81. a.  
*Angustix* præcordior. in febr. lymphat.  
 \* 234. a.  
*Angustix* melancholicorum † 864. a. b.  
 v. Anxietates, præcordia &c.  
*Anhelatio* qualis affectus † 193. b.  
*Anhelitus* asthmaticus, qualis affectus † 139. b.  
*Anhelitus* foetor in peste † 363. a.  
*Anima* mundi \* 741. b.  
*Animæ* actiones in somniis, ecstasi &c.  
 \* 722. a.  
 Sedes animæ juxta Helmont. † 82. a.  
*Anima rationalis* est soli homini propria. 42. b.  
*Animæ* rationalis quidditatem nescimus  
 \* 309. a.  
*Anima* rationalis an immaterialis, imparibilis.  
 \* 782. a. b.  
*Anima* rationalis functionum animalium ac  
 voluntariarum &c. Subjectum & causa  
 efficiens \* 781. b.  
*Anima sensitiva* ejusque constitutio † 701. a.  
*Animalia* sunt duplicis differentix, vel calida vel  
 frigida. 40. a. b.  
*Animalia* pro usu medico quæ eligenda.  
 643. a.  
*Animalium* resolutio Chymica quomodo præ-  
 cedit. 643. a.  
*Animalia* mas quid præstat in chymica resolu-  
 tione præternat. 645. a.  
 Ex animalibus præparata & eorum usus.  
 323. b. seq.  
*Animalia* qualem habeant aciditatem  
 247. b.  
 Θia Volatilia animalium, eorum composi-  
 tio & usus. 860. a.  
*Animalia* abundant Θ volatili, & unde est.  
 247. b. seq.  
 Θia fixa animalium cujus usus. 860. b.  
 Ex animalibus parata alia volatilia quomo-  
 do differant. 645. a.  
 ex animalibus spiritus chymicè prolekti qua-  
 les. 643. b.  
*Animalium* partes duræ qualia dent medica-  
 menta chymicè resolutæ. 643. b.  
*Animalium* partes duræ quo sensu conveniunt  
 in Medicina. 643. a.  
*Animalium* partium durarum calcinatarum  
 abusus & noxa \* 238. b.  
*Animalium* partes liquidæ chymicè resolu-  
 tæ an eadem suppedient remedia ac du-  
 ræ. 644. b.  
*Animalium* partes pingues cui usui in chymi-  
 ca. 645. b.  
 Carnes animalium recentes cur in stoma-  
 cho nosi abeant in putredinem, quod  
 tamen statim accidit extrâ applicatis.  
 365. b.  
 Lac animalium cur faciliè fermentat.  
 359. b.  
*Animalium* stercorea quæ præbent medica-  
 menta. 645. b.  
*Animalium* marinorum partes ossæ nobi-  
 liores dant præcipitantia præ terrestribus  
 \* 131. b.  
*Animalia* sylvestria quid præstant sub ignis  
 examine præ domesticis. 645. a.  
*Animalium* venenatorum morfu inflicta  
 vulnera, cum prognosi, diagnosi, cura.  
 \* 48. a. b.  
*Animalis* facultas considerata. † 5. a.  
 † 25. a.

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Animalis facultatis affectus in genere † 701. a.  
in specie, ibid. b.
- Animales operationes homini propriæ &  
eorum fundamentum † 82. a.
- Animales operationes quomodo peragantur.  
17. b.
- Animi pathemata* quantum valeant \* 297. b.
- Animi affectus & pathemata quo sensu sani-  
tatis vel morbi causa. 122. a. b. seq.
- Animi pathemata graviora gravidis nocent  
† 995. b.
- Animi affectus enormes abortus causa  
† 1011. a.
- Animi deliquium in febre † 309. a. v. Lipo-  
thymia.
- Animi perturbatio † 864. a.
- Anisum*, ejus præparata & usus. 388. a. b.
- Annuli* antiepileptici ex dente hippopotami  
† 815. b.
- Annus*. Intervallum inter annos mundi & Chri-  
sti \* 443. a.
- Anodyna* † 3. b. † 4. a. † 5. a.
- Clyster* anodynus \* 660. a.
- Pulvis anodynus: 997. b.
- Anodyna vis spermatis ceri \* 703. a.
- Anodynus liquor, v. opium.
- Anorexia* quid, ejus subjectum, causa † 28.  
a. b.
- Diagnosis, prognosis † 30. a. cura ibid. b.
- Consultatio de Anorexia \* 121. a.
- De Anorexia feminæ casus & observat.  
\* 368. a.
- Anorexia infantum, ejus causa \* 537. a. † 1078.  
a. b. Diagnosis, prognosis, cura † 1079. a.  
seqq.
- De anorexia infantis casus & observatio.  
\* 363. b.
- Anorexia in inflamm. hepatis. † 575. b.
- Anorexia post curam picæ superveniens  
\* 127. b.
- Anser* ejus usus in Medicina. 685. a.
- Anserina*, ejus præparata & usus. 389. a. b.
- Ursprung der Kinder*. † 1097. b.  
v. Achores, savi.
- Antares* \* 442. a.
- Anthora*, ejus præparata, & usus. 384. b.
- Anthracis* pestilenciales † 360. b. seqq.
- Anthracum vesicæ, oculorum &c. in peste  
prognosis † 363. a.
- Anthracum in peste cura † 374. a. &c.
- Antimonium* à Basilio magni æstimatum \* 79. b.
- Ejus genesis, præparata & usus 279. b. seqq.  
777. b. seqq. \* 79. b.
- Antimon. crudum an conveniat epilepticis  
\* 299. b. ejus usus in brutis variis effectus  
ibid.
- Ex ♂ quomodo purgans perpetuum per in-  
feriora parandum. 889. a. \* 315.  
a.
- ♂ vis emetica. 884. b.
- ♂ diaphoret. ejus usus. 915. a.
- ♂ diaphoret. quomodo Vomitus fit causa.  
915. b.
- ♂ diaphor. ♂iale, ejus compositio.  
917. a.
- Antimonialium usus in peste † 371. a.
- Antimonialium abusus & noxa \* 238. b.
- ♂ Algarethi, vid. ♂ vitæ.
- ♂ Butyrum, ejus usus. 920. b.
- ♂ flores, eorum præparatio 885. b.
- Antimonialia infusa in vino eliminanda  
jussit facultas Medica Parisiensis.  
884. b.
- Antimonium quid valeat cum ☉ fufum.  
742. b.
- ⊖ ♂ ii non datur 919. b.
- ⊕ ♂ ii, ejus compositio. 917. b.
- Tinctura ♂ iales. 918. a. 889. a.
- Antimoni vitri vis vomitoria † 11. b.
- Antimoni vitrioli virtutes &c. \* 846. a.
- Antipraxia* viscerum veterum, asylum ignorantie  
† 181. a.
- Antiquarium* febrifugum Riverii † 280. a.
- Antirrhinum*, ejus præparata & usus. 389. b.
- Annus vetula* cur interdum melius curret quam me-  
dicus † 1. b. \* 78. a.
- Annus clausus* ex colica, & interiora versus retractus  
† 159. b.
- Ani dolor & excoriatio ab acrimonia dysen-  
terica † 112. a.
- Excoriatio, exulceratio &c. ani in tenesmo  
† 149. a.
- Annus imperforatus, † 91. a.
- Ani inflammatio ejusque causæ, diagnosis,  
prognosis, cura † 555. a. b.
- Ani procidentia, ejus pars affecta, causæ,  
diagnosis, prognosis & cura  
† 178. a.
- Ani procidentia infantum, ejus causa, pro-  
gnosis † 1082. b. cura † 1083. a.
- Ani pruritus & dolor quomodo curandus.  
† 152. b.
- v. podex.
- Anxietates* omnes ex stomacho \* 133. b.
- Anxietates in cholera \* 150. a.
- Anxietati in cholera quomodo succurratur  
\* 155. b.
- Anxietas in febr. unde \* 202. a. cura  
\* 206. a.
- Anxietates in febr. mal. † 319. a.
- Anxietates cordis magis sunt periculosa ci-  
tra insignem febrem, quam insignis fe-  
bris citra anxietates cordis. † 362. b.
- Anxietates cordis in peste † 360. b.
- Anxietas melancholicorum † 864. a. b.
- Anxietatis præcordiorum cura in morbill.  
& variol. † 353. a.
- v. Angustia, præcordia.
- Anxiosa febris* † 288 b.
- Apepsia*; consultatio de ea \* 119. b.
- Aperientia*, earum compositiones. 978. b.
- aperitiva simplicia an rectè dicantur.  
† 3. b.
- Aperientium usus in ictero † 450. a.
- Aperientia putativè talia † 3. b.
- R aperitiva Mœbii genuina. 950. a.
- Aper*, ejus usus in Medicina. 646. b. 698. a.
- Apis icu inducta ophthalmia † 596. a.
- Aphonia* differta loquela amissa † 786. b. fiendi mo-  
dus & causæ ibid. seq. † 218. a. b. Pro-  
gnosis & cura † 318. b. † 787. b.
- Aphonia cura in var. iol. & morbill. † 258. b.  
† 354. a.
- v. vox, loquela, &c.



# INDEX UNIVERSALIS

*Aphrodisiaca* priapismum inducentia † 922. b.  
*Aphthæ*, earum causæ, diagnosi † 1085. b. \* 541.  
 a. † 549. b. Prognosis, cura. † 550. a.  
 † 1086. a. \* 552. a.  
*Apium*, ejus differentia, præparata & usus. 390. a.  
*Apophlegmatismi* quid \* 632. a.  
 Eorum compositio † 715. b.  
*Apophlegmatizantes* pilulæ \* 639. b.  
*Apoplexia* qualis affectus † 824. a. ejus divisio † 824.  
 b. causæ † 825. a. solaris eclipsis dicta  
 826. a. veterum sententia de ea † 826. b.  
 an excitetur etiam à causâ interna † 828.  
 b. seqq. vitium hæreditarium † 829. b. Per-  
 mutatio ejus tribus modis contingit † 830.  
 b. Diagnosi & prognosi † 831. a. b.  
 promodo solvitur † 832. b. cura † 833. a.  
 præservatoria curatio † 836. b.  
 De apoplexia casus & observ. \* 338. a. \* 339.  
 a. \* 348. a. \* 349. a.  
*Apoplexia* cum catarrho suffocativo non con-  
 fundenda † 238. b. sq. † 240. a.  
*Apoplecticorum* suffocatio † 192. b.  
*Apoplexiæ* gradus levissimus; insultus apo-  
 plecticus habitualis; consultatio \* 302. a.  
*Ant-apoplectica* † 5. a.  
*Clyster* stimulans in apoplexia \* 659. b.  
*Electuar.* pro senibus in metu apoplexiæ  
 \* 635. b.  
*Apoplecticæ aquæ* † 837. a.  
*Apoplecticæ aquæ* in peste † 364. a.  
*Apostema* semper junctam habet febrem lentam  
 † 310. a.  
*Apostema cordis*, lipothymiam inferens  
 † 388. a.  
*Apostema* Kraut. 537. a.  
*Apozemata* præscribendi modus & formulæ \* 645. b.  
*Appetentia* canina † 39. b. ejus subjectum, causæ  
 † 40. a. an à vermibus † 40. b. cur hoc af-  
 fectu laborantes emacientur potius, quam  
 pinguescant † 40. b. ejus signa & prognosi  
 † 41. a. cura † 41. a. seqq.  
*Appetitus* definitio 49. a.  
 unde † 36. a.  
*Appetitus* verus & falsus † 41. a.  
 bonum signum in diarrhœa. \* 142. b.  
*Appetitus* depravatus † 34. b.  
*Appetitus* prostratus † 28. a. v. anorexia.  
 prostratus post diarrhœam \* 144. b.  
 Prostratus in febre \* 102. b.  
 Prostratus in tertiana mal. \* 107. a.  
*Appetitus* nimius † 39. b.  
 Nimius in morbo quid signet \* 298. a.  
 post febrem intensior \* 142. a.  
*Appetitus* stimulant acida † 40. a.  
 v. Cibus, Pica.  
*Appropriata* † 3. a. † 4. a. quæ \* 669. a.  
*Appropriatorum* remedium utilitas \* 78. b.  
*Aque* definitio 6. b.  
*Aqua* an sit principium omnium rerum  
 \* 446. a.  
*Aquæ* ascensus in Antlia \* 742. b.  
*Aquæ* potus noxius † 44. b.  
*Aqua* intercus, v. hydrops.  
*Humoris aquei* in oculis vitia † 725. b.  
*Aquæ* ex utero effluxus legitimus † 1009. a.  
*Aquarum* ex utero effluxus immaturus in gra-  
 vidis † 1006. a.  
 Immersio in aquam frigidam vel calidam ma-  
 niacorum † 884. a. b.

Immersio in aquam hominis rabiosi vel hy-  
 drophobia infecti † 889. b. seqq.  
*Aqua* asthmatica Imp. Rudolphi † 205. b.  
*Aquæ* decoctæ, v. decocta.  
*Aquæ* destillatæ, earum parandarum modus  
 815. b. 819.  
*Aqua* fortis. 260. a.  
*Aqua* inebrians \* 810. a.  
*Aqua* pluvialis, nivea & ros in quo conveni-  
 ant & differant. 713. a.  
*Aqua* pluvialis Martia quid valet. 713. a.  
*Aquæ* Martiæ præparata & usus. 261. b.  
*Aqua* ex pomis putridis, vid. Poma putri-  
 da.  
*Aqua* Regis. 260. a.  
*Aqua* terræ Sanctæ Rulando in usus  
 \* 79. b.  
*Aqua* tonitrualis quantum valeat 713.  
 a.  
*Aquæ* vitæ † 5. a.  
*Aquæ* vitæ usus in peste † 364. a.  
*Aqua* vomitoria, vid. vomitoria.  
*Aquea* s. phlegmatica quæ. 16. a.  
*Aqua* & aquea menstrua 261. a.  
*Aquilegia*, ejus differentia, præparata & usus.  
 390. b.  
*Araneus* cujus usus in Medicina. 700. b.  
 Araneorum puncturæ, & earum cura  
 \* 48. a. seqq.  
*Arbor* Philosophorum, Vid. Philosophus.  
 Arbores lapidiformes coralliorum &c. \* 449.  
 a. seqq.  
*Arcana* quid? \* 667. a. v. singularia.  
*Archeus* quid? \* 781. b. \* 101. b.  
 Morbi archeales quid & unde 132. b.  
 Archei furibundus motus unde \* 499. b.  
 Archei furor actiones turbat \* 486. b.  
 Ejus sub febribus dominium \* 201. b.  
 Archei intestinalis indignatio in dysenteria  
 † 125. b.  
*Ardens* dolor † 746. a. † 750. b.  
 Ardor febrilis consideratus \* 203. a.  
 Ardor in flatibus † 68. b.  
 Ardor stomachi in cardialgia, & ejus cura  
 † 86. b.  
 v. stomachi ardor.  
 Ardor ventriculi; ejus pars affecta, causæ  
 † 88. b. Diagnosi, prognosi, cura † 89. a.  
 b.  
 Ardor in peste † 360. a.  
 v. æstus. calor. Soda.  
*Arenula* in urina calculosorum † 636. a.  
 vid. Urina.  
*Argentum* v. luna.  
 Catharticum argenteum. 892. a.  
*Argyropæia* considerata \* 772. b.  
*Aridura* † 396. b.  
 Aridura partium cum causis † 409. b. Diagno-  
 sis, prognosi, cura † 410. b.  
*Aristolochia*, ejus differ. præparata & usus 397. a.  
*Aristotelis* dogmata multum impedimenti adserunt  
 Medicis Studiis, tum theoriæ, tum praxi.  
 \* 555. a.  
*Arma*. Armis venenatis inflicta vulnus, ejus dia-  
 gnosis, prognosi, cura \* 48. a. b.  
*Argentill.* 554. b.  
*Armenus Lapis* cujus usus in medicina 730. b.  
*Armoracia*, ejus præparata & usus. 391. a. b.

Varia

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Varia ex ea experimenta 331. a. b.  
 Visui inimica † 731. b.  
*Apoſtema* quid? † 532. a.  
*Aromatica* 177. a. † 4. b.  
 Eorum virtutes † 390. a.  
*Aromaticorum ſpir. & Olium præparatio.*  
 \* 633. a.  
*Aromaticorum pulverum præparatio* \* 633. a.  
*Aromaticorum uſus in morbis infantum*  
 \* 546. b.  
 uſus in gravidatione † 994. b.  
 uſus abortum concilians † 1010. b.  
 abuſus febrim colliquativam inducit  
 † 287. b.  
*Arquatus morbus* † 442. a. v. Icterus.  
*Ars naturæ ſimilis* \* 846. a.  
 Natura & Ars quomodo convenient aut dif-  
 ferant. 15. ſequ.  
 Artis & naturæ opera hodiè in meth. curandi  
 conjunguntur. † 251. b.  
*Arſchſtammern* † 90. b.  
*Arſchſtigel* qualis affectus &c. † 138. b.  
*Aſenicum* quid, ejus præparata & uſus. 809. b.  
 811.  
 Ejus uſus in peſte † 367. a.  
*Artemiſia* ejus differentia, præparata & uſus.  
 392. a.  
*Artemiſiæ rubræ carbo ſ. radix annofa antie-  
 pileptica* † 814. b.  
*Arteriarum motus unde* † 248. b.  
*Arteriarum ſectio cui uſui* † 6. a.  
*Arteriam aſperam naturaliter nihil ingredi-  
 tur* \* 189. a.  
*Arteria cſtica.* 76. a.  
*Arteriæ magnæ truncus prope corrodens*  
 † 380. b.  
*Arteriarum læſiones* † 379. a. ſqq.  
*Arteriarum obſtructio* † 181. b.  
*Arteriola vaſa an poſſint obſtrui* † 826. a.  
*Arteria aneurifmate exefa* \* 32. b. \* 33. b.  
*Arteriarum palpitatio ejusque cauſæ* † 385. a.  
 cura † 386. a.  
*Arteriarum vulnera, eorum prognofis & cura*  
 \* 49.  
*Arteriæ, aſperæ bronchiarum vulnus, ejus-  
 que lethalitas* \* 36. a. ſanguinem ſiſtentia  
 in arteriarum punctura \* 49. b.  
*Arteriotomia.* 157. a. v. Vena.  
*Arteriotomiæ uſus in cephalalg.* † 767. b.  
*Arteriotomia maniacorum* † 881. b.  
*Arteriotomia in phrenitide* † 861. b.  
*Arthetici qui?* \* 292. b.  
*Arthridis, (Podagra &c.) qualis affectus* † 773. a.  
 ſymptomata ejus † 774. a. Pars affecta  
 † 774. b. Cauſæ † 775. a. cur viros po-  
 tius, quam ſceminas afficiat † 775. b.  
 Prognofis † 776. b. ſolvitur ſerè quatu-  
 or modis † 777. a. Cura † 777. b. Dia-  
 æta & cura lactea † 783. b.  
*Arthritidis ſenſibilia phænomena non con-  
 fundenda cum cauſa & fiendi modo*  
 \* 111. a.  
 ea eſt vel vaga vel fixa &c. ibid.  
 De Arthritide caſus & obſ. \* 337. a. \* 354. b.  
 Arthriticis nil conducit ſangv. transfuſio  
 \* 111. a.  
 In Arthritide infuſio eſt fruſtranea \* 509. a.  
 Arthriticæ febres † 244. b.  
 Arthritis recens, inveterata \* 293. b.  
 De arthritide vaga caſus & obſ. \* 343. a.  
 \* 355. a.  
 De arthritide vaga cum febre caſus & obſ.  
 \* 429. a.  
 Arthritis vaga ſcorbutica † 484. a. ejus cura.  
 † 509. b.  
 De arthritide vaga ſcorbutica caſus & obſ.  
 \* 340. a.  
 Conſultatio de arthritide vaga ſcorbutica.  
 \* 304. b.  
*Articularium morborum ſymptomata* \* 305. b.  
*Articulorum dolores* † 773. b.  
 Articulos firmans pediluvium \* 656. b.  
 Articulorum in variol. & morbill. tumores,  
 ulcera † 357. b.  
 Articulorum vulnera quomodo tractanda.  
 \* 50. b. immobilitas ex ſinoviz coagulo  
 \* 67. a.  
*Artuum dolores conſiderati* † 747. a. eorum cauſæ  
 † 750. b. cura † 751. a.  
 Artuum dolores in febr. \* 203. a.  
 De artuum dolore ſcorbutico \* 359. b.  
 De artuum dolore ſcorbutico caſus & obſerv.  
 \* 428. b.  
 Artuum convulſiones ex dolore ſcorbur. &c.  
 † 159. b.  
 Balneum in artuum dolore \* 657. a.  
 Infuſum ad dolores artuum ſcorbuticos.  
 \* 654. a.  
 Artuum tremuli & convulſivi motus in peſte  
 † 362. b.  
 Artuum laſtitudo in febr. malign. \* 243. a.  
*Arum, ejus differentia, præparata & uſus.* 392. b.  
*Aſa ſetida, ejus collectio, præparata & uſus.*  
 573. b.  
*Aſarum, ejus præparata & uſus.* 616. b.  
 Aſari vis vomitoria, ejus pulvis, infuſum, dec-  
 octum † 10. a. b.  
*Aſcarides infantum* † 1093. a.  
 v. vermes.  
*Aſcenſus vaporum ad cor in Colic. convulſ. terrore*  
 ſubito &c. \* 181. a.  
*Aſites unde* † 180. b.  
 Cum pudoris difficultate & habitu ſiccò con-  
 junctus eſſe ſolet, & quare. 226. b.  
 De aſcite caſus & obſerv. \* 396. a.  
 Aſcites particularis † 691. b. ejus cauſæ  
 † 692. a. Diagnofis † 692. b. duobus mo-  
 dis inchoat † 691. b. ſigna, ne confun-  
 datur cum graviditate † 693. a. Prognofis  
 † 693. b. cura † 694. a.  
*Aſelli cujus uſus in Medicina.* 701. a.  
 Aſellorum uſus in aſthmate † 207. b.  
*Aſinus, cujus uſus in Medicina.* 647. a.  
 Eſt animal longævum † 316. b.  
 Aſinini ſanguinis uſus in mania. † 882. b.  
*Aſparagus, eſus præparata & uſus.* 393. b.  
 Aſparagi eſus ad nephritidem disponens  
 † 634. b.  
*Aſpectus roſæ ſyncopen concilians* † 388. b.  
 Stellarum \* 439. a. v. Aſtra &c.  
 corvus &c. in malignitate quid ſignet  
 \* 246. a.  
*Aſphaltum quid & cujus uſus.* 814. a.  
*Aſphyxia* ejusque differentia &c. † 386. a. b.  
 v. Syncope.  
*Aſſodes febris* † 288. b.

# INDEX UNIVERSALIS

- Assumptorum* in stomacho retentio laesa † 70. a.  
v. cibus, alimenta, potus.
- Assumptorum* transpiratio insensibilis  
\* 745. a.
- Assumptorum* infantil. vitia † 1064. a.
- Asthma*, ejus pars affecta, causæ † 193. b. divisio  
† 194. a. modus fiendi † 194. b. sympto-  
mata † 196. b. Diagnofis est prognofis  
† 200. a. b. cura † 201. a.
- De Asthmate casus & observ. \* 341. \* 349.  
b. \* 376. a. \* 378. b. \* 404. a.
- Asthmati succurrit sperma ceri \* 706. a.
- De Asthmate convulsivo, consultatio \* 195. b.  
seqq.
- De Asthmate convulsivo casus & obs. \* 372. a.  
\* 402. b. \* 430. a.
- Asthmatis convulsivi ex vitio hypoch. &  
diaphr. cura \* 198. a.
- De Asthmate convulsivo fœminæ casus &  
observ. \* 364. a.
- Asthmati convulsivo succurrit infusio  
\* 502. b.
- Asthma hypochondriacorum † 480. a.
- Asthma humidum stomachale cum incubo  
consultatio \* 192. a. seqq.
- De Asthmate humido casus & obs. \* 374. b.
- Asthmatis scorbutici cura † 515. a.
- Asthmate stomachale cum incubo \* 192. b.
- Asthma junctum inflationi stomachi  
\* 132. b.
- Asthma uteri † 963. a.
- Asthmatica febris unde sic dicta † 250. a.
- Asthma infantum † 1096. a. unde \* 537. b.  
cura \* 549. b.
- Spiritus asthmaticus D. D. Langelotti & Mi-  
chaelis, ejus compositio. 970. a.
- Astra* duobus modis profunt \* 445. b.
- Astralis influxus an aëris tempestates variis  
larvis deformare queat & morbor inferre  
\* 785. a.
- v. Stellæ.
- Astrologorum* prædictiones non sunt contemnendæ  
\* 445. b.
- Atheroma* quid, ejus causa, prognofis, cura  
\* 29. a. sq.
- Athletica* habitudo \* 823. a.
- Atmosfera* \* 725. b.
- Atomis* sive particulæ minutissimæ, earumque tex-  
tura, seminalis crasis \* 3. a.
- Non videntur, verè tamen existunt \* 793. b.
- Atriplex* ejus differentia, præparata & usus  
393. b.
- Atrophia* quomodo contingat \* 110. b.
- Ejus causæ &c. 177. b. † 394. a.
- Diagnofis † 397. b. prognofis 400. b. cura  
† 401. a.
- Atrophix differentia à phthisi \* 259. a.
- Atrophia laborantes cur emacientur potius,  
quam pinguescant † 40. b.
- Atrophia correptis nil confert sangv. trans-  
fusio \* 110. a.
- De atrophia, casus & observat. \* 389. a.  
\* 404. b.
- Atrophix cura à lue venerea † 477. a.
- Atrophix ex philtro remedium \* 827. b.
- Atrophix scorbuticæ cura † 516. a.
- Atrophix scorbuticæ medetur lac & buty-  
rum \* 827. b.
- Atrophia infantum † 1102. b.
- Unde \* 538. a. cura \* 550. a.
- Attemperantia*, præcipitantia \* 589. a.
- Attenuantia* † 4. b.
- Attributa* in corporibus respectiva ex pluralitate  
& diversitate occurrentium objectorum  
externorum oriuntur. \* 555. a.
- Attributorum* respectivorum in corporibus  
originem & tot distinctas entitates qua-  
litarum malè referimus. \* 555. a.
- Auditus* quomodo fiat naturaliter † 739. a. b.
- Auditus imminutus & abolitus † 733. b.
- Avena*, ejus præparata & usus. 394. a.
- Aversatio* ciborum, v. fastidium, nausea.
- Aversio* sanguinis cui usui † 6. a.
- Avicenna* 445. a.
- Avicenna* 654. a.
- Augmentatio* corporis unde \* 819. a.
- Augmentum* unde \* 519. a.
- Avicula* Hermetis. 868. b. \* 453. a. v. Hermes.
- Avis* definitio. 7. a.
- Nutritio pullorum avium † 1066. a.
- Avium excrementa quid præsent. 684. a.
- Aura* apparenter ascendens & quasi sursum repens  
convulsiones comites habens † 806. a.
- Auræ ascensus ad cor in Col. &c.  
\* 181. a.
- Aura genitalis \* 324. b.
- Aurantia* Malus, ejus præparata & usus.  
394. b.
- Auricula* membranâ interiore Stilo vexata, cur tus-  
siamus † 223. b.
- Auricula* muris ejus differentia, præparata & usus.  
395. b.
- Auris* & auditorii meatus vitia † 733. b.  
† 740. a.
- Aurium affectus vagi & fomitem in cerebro  
habentes quomodo curandi † 738. a.
- affectus chronici ibid. b.
- Aurium dolor, ejus causæ, diagnofis, pro-  
gnofis, cura † 758. a. b.
- Aurium inflammatio & ulcus † 597. b. ejus  
causæ, diagnofis, prognofis † 597. b.  
† 599. a. cura † 598. a. † 599. a.
- Aurium sonitus & tinnitus, ejusque causæ  
† 739. a. Diagnofis † 740. b. Prognof-  
is & cura † 741. a. v. Tinnitus.
- Aurium desentio in variol. &c. † 356. b.
- Injectiones in aurium vermibus, ulceribus &c.  
\* 661. a.
- De remediis auribus applicandis observanda  
in genere † 738. a.
- Aurin.* Wild. Aurin 617. a.
- Aurum* est metallum perfectum. vid. metal-  
lum.
- Aurum quibus particulis constituatur. 745. a.
- Auri ductilitas & mira extensio \* 803. a.
- ⊙ an ex aliis metallis parabile. 751. b.
- Ejus præparata & usus. 309. a. b. seqq.
- Ex Auro parata remedia quid præsent,  
745. a.
- ⊙ Calcinatio amalgamatoria & cæmenta-  
toria. 749. b.
- ⊙ Depuratio quibus modis fiat 745. b.
- ⊙ Fulminans quid & ejus usus. 748. b.
- Auri fulminantis usus insignis in nephritide  
\* 291. a.
- ⊙ ☿ificatio. 751. b.



# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

☉ potabile quid. 750. a.  
 ☉ potabilis conficiendi modus. 751. b.  
 752. a.  
 ☉ Salificatio. 752. b.  
 ☉ Solutio quomodo reducatur. 927. a.  
 ☉ Soluti extractio. 750. a.  
 ☉ Solutionis præcipitatio quibus modis fiat.  
 748. a.  
 ☉ Tincturæ anguinæ. 750. b.  
 ☉ Tincturæ quid operentur. 750. b.  
 ☉ Volatilificatio. 750. a.  
 ☉ Volatilificandi modus. 925. b.  
 Auri diaphoretici Poterii præstantia \* 79.  
 b.  
 Aurum Horizontale Helmontii \* 79. b.  
 Antum horizontale cui usus † 5. b. v. Sol.  
 Axillarum fœtorem tollens lotio \* 656.  
 Axillarum puncturæ in peste † 361. a.

## B.

**B**ahar, sive Baharas Josephi quid. 396. a.  
 Bachbungeni. 386. b.  
 Bad/ Bader/ unde dicantur \* 709. a.  
 Bähung / & ejus præscribendi ratio \* 655. a.  
 \* 718.  
 Bärenklaum. 403. a.  
 Bärwur. 403. a. 424. b.  
 Balanarum semen an sit sperma ceti \* 698. a.  
 Balani Myrepsia, ejus præparata & usus  
 396. a.  
 Balanistium 457. a.  
 Balbi prognosis † 787. b. v. vox.  
 Balneatoria varia \* 710. a. b. \* 711. a.  
 Balneum. vocis consideratio \* 708. a. Definitio &  
 differentia \* 656. a. \* 709. a. balnea sicca  
 \* 709. b. spiritus, asca, fumida, cum lapidi-  
 bus & ferro, cum lampadibus vel candela,  
 cum oleis spiritibus, cum brodio deco-  
 ctorum, lecti \* 710. a. sq. definitio sicca  
 &c. \* 711. a. ejus arcula ibid. b. fornax &  
 tubulus ibid. Baculi & lintea in balneo  
 cum oleis spirit. \* 711. b. folliculi in  
 balneo cum brodio. \* 712. a. Balneum  
 ex forma ejusque mantellum \* 712. b.  
 sicca balnea particularia s. suffitus  
 \* 712. b.  
 Balnea non sicca, s. lotiones \* 712. b. cum  
 herbis \* 713. a. in vanno \* 713. a. cum  
 nitro s. thermæ artificiales \* 713. a. par-  
 ticularis certæ corporis partis lotio  
 \* 713. b. Utendi modus \* 713. b. obser-  
 vanda ante balneum \* 713. b. aeris con-  
 stitutio \* 714. a. Ventus sit salubris  
 \* 714. a. Dieta in cibo & potu \* 714. a.  
 Somnus & vigilæ balneo utentium  
 \* 714. b. motus & quies ibid. Excremen-  
 torum ratio \* 714. b. Perturbationes ani-  
 mi abluunt \* 715. a. Purgantium usus an-  
 te balnei ingressum \* 715. a. sudorem  
 promoventia \* 715. b. notanda circa su-  
 dorem hunc \* 715. b. sqq. Dieta post bal-  
 neum \* 716. b.  
 Balneorum utilitas \* 717. a. b.  
 Balnea præscribendi ratio \* 656. a.  
 Balneum ex suffitu decocti cubilis fornicarum  
 † 657. a.  
 Balneum infantum recens editorum † 1061. a.

Balnea Laconica v. Laconica balnea.  
 Balneorum usus in lepra † 524. a.  
 Balneorum usus in mensibus suppressis  
 † 932. b.  
 Balneorum usus in obesitate \* 831. b.  
 Balneum Athenis lusus Scholasticorum  
 \* 709. a.  
 Balneorum usus in spasmodicis abdominis  
 \* 291. b.  
 Balsamum, ejus præparata. 396. a.  
 Balsami, eorum differentia, compositio,  
 usus 396. a. 574. a. 848. a.  
 Balsama quæ sufficiunt, & eorum fundamen-  
 tum. 929. a.  
 Balsamica remedia quid \* 38. a.  
 Balsamorum utendi modus \* 662. a.  
 Balsami Peruviani insignis usus in vulneribus  
 \* 41. b.  
 Balsamus Peruvianus acrior & præstantior  
 redditur vitello ovi solutus \* 159. b.  
 Balsamus sulphuris nobilissimus ad vulnera  
 ex semine hyperici &c. \* 45. a. vid. Sul-  
 phur.  
 Bund = Balsam oder Bund = Kraut.  
 446. a.  
 Balsami naturalis corruptio per vulnera quo-  
 modo curandus \* 38. b.  
 Balsamica vis spirituum \* 211. b.  
 Balsamina lutea, ejus usus. 396. a.  
 Barba ex mensium suppressione † 930. b.  
 Barbae pili defluentes in morbo Gall. † 456. a.  
 Barbae rasura cœcitatem inducens † 730. a.  
 Barbarakraut. 443. a.  
 Barbae cujus usus in Medicina. 691. a.  
 Bardana, ejus differentia, præparata & usus. 396. b.  
 Bartholini scripta † 28. a.  
 Bargisch. 403. a.  
 Basilicum, ejus differentia, præparata & usus. 397. b.  
 Basilien-Kraut. 397. b.  
 Basis medicamentorum \* 627. a.  
 Bathenien/ Wasser- Bathenien. 538. a.  
 Bauer- Senff. 553. a.  
 Baumböhen. 616. b.  
 Bdellium ejus præparata & usus. 576. a.  
 Been grana. 396. a.  
 Behen album & rubrum. 398. a.  
 Behungen qualia balnea \* 655. a. \* 718. b.  
 Bella ab astris præsignificata \* 445. b.  
 Bellis, ejus differentia, præparata & usus. 398.  
 a. b.  
 Benediktenkraut und Wurzel. 408. a.  
 411. b.  
 Benzoe balsamus pectoris † 235. a.  
 Benzoin ejus præparata & usus. 576. b.  
 Berberis, ejus præparata & usus. 398. b.  
 Bergmünke. 405. a.  
 Beruffkraut. 430. b.  
 Beschreibung der Kinder. † 1105. a. b.  
 Beta, ejus differentia, præparata & usus.  
 399. a.  
 Betonica unde sic dicta, ejus differentia, præparata  
 & usus. 399. a. b.  
 Weiße Betonien. 513. b.  
 Bettlers-Lauf. 397. a.  
 Betula ejus præparata & usus. 400. a. b.  
 Liquor betulæ. 353. a.  
 Beule/ so häufig \* 19. a.  
 Beul-Zähne der Kinder. † 1092. a.

# INDEX UNIVERSALIS

- Beysuf/rother Beysuf.* 392. a.  
*Bezoar lapidis virtutes* † 335. a.  
*Bezoar nostras qualis.* 907. b.  
*Bezoar Lapis mineralis, ejus usus* 712. b.  
*Bezoar pro scopo sudorifero nihil valet*  
 † 24. b.  
*Bezoardicorum virtus contra venena*  
 \* 154. b.  
*Bezoardicorum usus in peste* † 371. b. & c.  
*Bibendi sobrietas olim* \* 809. a.  
*Bibitoria rotula* \* 636. b. v. Potus. Siculo-  
 sus.  
*Biesenflugel/usus suppositorius* \* 632. a.  
*Biliosi qui* \* 309. b.  
*Bilis examen.* 351. a.  
*Bilis consideratio ad hypotheses veterum*  
 \* 590. b.  
*Bilis unde generatur* \* 106. a.  
*Bilis in folliculo felleo generatio & collectio.*  
 78. b.  
*Bilis origo est ex sanguine.* 77. b. seq.  
*Bilis frenum sanguis* \* 106. a.  
*Bilis non est excrementum hepatis.* 79. a.  
*Bilis continet*  $\Theta$  cum  $\phi$  77. b.  
*Bilis motus per sua vasa.* 78. a. b.  
*Bilis quid confert chylo purificando.* 58.  
 a. b.  
*Bilis errores variorum morborum causa*  
 † 182. b.  
*Bilis per porum biliarium versus epar ascen-  
 sio.* \* 811. b.  
*in bilis acrimonia potio* \* 640. b.  
*Bilis acrimonia obesitatem & nutritionem*  
 impedit. \* 833. b.  
*Bilis vitia in ictero* † 443. b. † 446. a.  
*Bilis quomodo iners redditur* † 446. a.  
*Bilis inertiam corrigentia* † 122. a. b.  
*Inertia non corrigitur sanguinis transfusio-  
 ne* \* 106. a.  
*Bilis in intestinis defectus* \* 121. a.  
*Bilis vomitus in inflamm. hepatis* † 575. b.  
*Bili conducentia* † 4. b. † 8. a.  
*Bilem acuantia* \* 833. b.  
*Bilem resingerans S. temperans decoctum*  
 \* 650. a.  
*Bilis atuginosa porracea* † 83. a. De ea Veterum  
 & modernorum sent. † 48. a. \* 150. a. sq.  
 \* 517. a.  
*Bilis atra quid* † 879. b. \* 153. a.  
*Bilis atræ ejectio per vomitum lethalis*  
 † 79. a.  
*Bilis cystica & hepatica differt.* 76. b.  
 v. fel.  
*Bilsenbraut.* 463. a.  
*Birke.* 400. a.  
*Bismuthum quid, ejus usus.* 790. b.  
*Bistorta, ejus differentia, præparata & usus.* 401. a. b.  
*Bitterwein.* \* 649. a.  
*Blasen auf der Kinder Zungen.* † 1085. b.  
*Blattern/hiige* † 525. b.  
*Blut rubrum, ejus differentia, præparata & usus.*  
 401. b.  
*Blutgarbe.* 510. b.  
*Bluttraut Paracelsi, Persicaria* \* 46. a.  
*Blutschwähren.* \* 19. a.  
*Blutstillungen.* \* 661. b.  
*Bluttröpflein.* 532. a.  
*Bocken v. Variolz.*  
*Boeckbart.* 555. a.  
*Boeckhorn.* 449. b.  
*Böse Krankheit.* \* 780. a.  
*Böser Grund der Kinder.* † 1097. b.  
*Bogen. Die Geburt steht auf dem Bogen.* † 1008.  
 b. † 1018. a.  
*Bohnen/schwarze und weisse.* 445. a.  
*Saubohnen.* 463. a.  
*Boletus Cervinus* \* 449. a.  
*Bolus, ejus usus.* 712. a.  
*Bolus quid, cum præscribendi modo*  
 \* 634. a.  
*Boli ineptæ deglutiti, cum cura* † 189. b. sqq.  
*Bombardarum coruscatio & impetus cæcitatem*  
 inducens † 730. b.  
*Bombax, ejus usus.* 402. b.  
*Bombyx cujus usus in Medicina.* 702. a.  
*Bonus vir & bonus civis non differunt* \* 446. b.  
*Borborygmi unde* † 155. a.  
*Borelli scripta* † 28. a.  
*Borrago (Borretsch) different. præparata & usus*  
 402. a.  
*Bos cujus usus in Medicina.* 647. b.  
*Botanices primus excultor Theophrastus Eresius.*  
 28. b. seq.  
*Botanices Studium commendatum* \* 847.  
 a.  
*Botanices scriptores celebriores.* 368. a.  
*Botrys, ejus differentia, præparata & usus.*  
 402. b.  
*Boza Tartarorum* \* 521. a.  
*Bubones quid, unde, eorum varietas & cura*  
 \* 16. a.  
*Bubones in febr. mal.* † 319. b. † 327. b.  
*Bubones in lue Venerea* † 455. a.  
*Bobonum à lue Gallica cura,* † 471. a.  
*De bubone Venereo casus & observatio*  
 \* 410. b.  
*Bubones pestilenciales* † 359. b. sqq.  
*Bubonum in loco punctiones in peste*  
 † 361. a.  
*Bubonum pestilentialium cura* † 372. a.  
*Cataplasma ad Bubones pestilenciales*  
 \* 658. a.  
*Bubonocèle* † 173. a.  
*Bubonocèle cum passione Hyster.* \* 185. a.  
 v. Hernia inguinalis.  
*Bubulus cujus usus in Medicina.* 651. b.  
*Busa cujus usus in Medicina.* 651. b. \* 489. b.  
*Bufo nis usus in hæmorrhag.* † 615. b.  
*Usus in peste* † 367. a. † 370. b.  
*Buglossa, ejus differentia, præparata & usus.*  
 404. a.  
*Brachiorum fortis extensio abortus causa.*  
 † 1011. a.  
*De brachii dolore post febrem* \* 409. b.  
*Brachium obrigescens & contractum*  
 † 802. b.  
*Contra brachii tumorem ex V. S. Catapla-  
 sma.* \* 658. a.  
*Brackenhaupt.* 390. a.  
*Bräune/qualis affectus* † 286. a. † 338. b.  
*Cura ejus* † 301. b.  
*Branca ursina, ejus differentia, præparata & usus.*  
 403. a.  
*Brand/heiße Kälter* \* 75. a.  
*Brandfäulen.* \* 65. b.  
*Brassica, ejus differentia, præparata & usus.*  
 403. a.  
 abric-

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

Ebrietatem infringit \* 813. b. \* 814. b.  
**Braun und Blau** † 532. a.  
**Braunwurk** 539. a.  
**Braunellenkraut.** 513. b.  
**Breunkraut.** 557. a.  
**Breun- Wurgel.** 448. b.  
**Brey zum ausschlagen und pflastern.**  
 \* 657. b.  
**Brombeer.** 525. b.  
*Bronchi lesio cum tussi* † 236. a.  
*Bronchie asperæ arteriæ, v. arteria aspera.*  
*Bronchus catarrhi species* † 679. b.  
**Bruch v. Hernia.**  
**Bruchbänder.** † 175. b.  
**Bruchpflaster.** † 73. a.  
**Bruchkraut.** 502. a.  
**Brustbeerlein/ schwarze Brustbeerlein.** 540. b.  
 Rothe Brustbeer. 468. b.  
**Brust-Stremmung.** † 81. a.  
**Brusttrancf.** \* 651. b.  
 Lösender Brusttrancf. \* 651. b.  
**Brustwurk.** 387. b.  
*Bruta rebellant post hominis lapsum, & insurrexerunt contra eum* \* 460. a.  
 An in medicina valeat argumentum à brutis ad hominem \* 109. b.  
 Brutorum mores & morbi communicati homini \* 799. b.  
**Bryonia,** ejus præparata & usus. 617. b.  
 874. b.  
**Buckelhorn.** 548. b.  
*Besoni odium in hominem* \* 466. b.  
*Bulbi oculi læsiones* † 730. a.  
*Bulimus & ejus differentia* † 39. b. ejus subjectum, causæ † 41. a. ejus signa & prognosis † 41. a. Cura † 42. b.  
**Bursa Pastoris,** præparata & usus. 404. a.  
**Wurgelkraut.** 512. b.  
*Butyri vis nutritiva* \* 827. b.  
 Butyri esus an gravidis conducat † 994. b.  
 Butyrum ♂. vid. ♀.

## C.

**Cacatoria** febris † 286. b.  
**Cachexia** in genere † 416. a.  
 Cachexiæ primum peccans \* 105. b.  
 Cachexiæ signa infallibilia \* 273. a.  
 Cachecticorum sanguis emissus cur cum crusta tenaci, &c. \* 105. b.  
 Cachexia confunditur cum chlorosi sæpe † 998. a.  
 Consultatio de cachexia cum imminente hydropo \* 272. b.  
 De cachexia casus & observ. \* 361. a.  
 Cachexia infantum † 1102. b.  
 Cachexia muliebris 960. b. ejus causæ, diagnosis, prognosis, cura 961. a. b. Symptomatica cura † 962. b.  
 Cachexia scabiosa ad hydropem inclinans \* 266. b.  
 Cachexia virginea † 309. b.  
 Anti-Cachectica cerevisia \* 649. a.  
 Cachexiæ medetur infusio \* 503. b.  
 Cachecticis non confert chirurgia transfusoria. \* 105. a.  
**Cacochylia** muliebris † 660. b.  
**Cacochymia** quid. 122. b.  
 unde † 6. b.

acidæ alteratio † 6. b.  
 alcalinæ alteratio † 8. a. & biliosæ ibid.  
 urinosa oleosa, ibid.  
 pituitosa & serosa † 9. a.  
**Cacochymia veterum triplex** 126. a. b. seqq.  
 Modernorum serosa. 128. a.  
**Cacochymia sanguinis vel superficialis, vel profundius radicata** \* 99. b. unde oriatur, ibid.  
**Cacochymia proles Cachexia** † 416. a.  
 Quomodo emendatus per evacuantia. 157. a. b.  
**Cacochymicorum succorum evacuantia universalis** † 9. b. particularia † 10. a.  
**Cadrina** ejusque usus. 791. b.  
**Cacitas omnimoda** † 729. b.  
 Ex colica † 161. b.  
 Ex epiphora † 590. a.  
 Luc Gallica infectorum † 486. a.  
 In variol. & morbill. † 356. a.  
 v. oculi, visus.  
**Calaminaris Lapis** cujus usus in Medicina. 731. a.  
**Calamintha,** ejus differentia, præparata & usus. 405. a.  
**Calamus aromaticus Indus,** ejus præparata & usus. 405. a.  
**Calcarius Lapis,** cujus usus in Medicina. 731. a.  
**Calcatrippa,** differentia, præparata & usus. 405. b.  
**Calcinatio** quid? 266. a. b.  
 quomodo fiat 266. a. b.  
 Calcinatio & incineratio quomodo differant. 266. a.  
 Calcinatio cæmentatoria. 313. b.  
 Calcinata, eorum præparatio & usus. 840. b. 843.  
**Calculus humanus,** vid. Homo.  
 Calculorum generatio. 129. b.  
 Calculorum progenies in toto corpore † 631. a. fiendi modus, color & diversitas. ibid. a. b.  
 Calculorum dolor qualis \* 289. a.  
 Calculus in dissolubilis fit † 741. b.  
 Calculorum renascentia † 635. a. an ex alimentis generentur † 634. b.  
 Calculi in corde † 382. a.  
 Calculi pulmonum in asthma. \* 196. a.  
 Calculus renum, v. Renum calculus.  
 Calculus vesicæ v. Vesicæ calculus.  
**Calidum,** humidum, frigidum & siccum, quod in corpore, \* 512. a.  
 Calida & calefacientia simplicia & medicamenta quæ 43. a.  
 Calidorum vegetabilium substantia & vis † 245. b.  
 Calida nervis amica \* 172. b.  
 Calidum nativum an pinguedinis causa \* 825. a. b.  
**Caligo** oculorum in vertigine † 794. a.  
 Caliginis oculorum cura † 721. a.  
**Calix Rulandi vomitorius** † 12. a.  
**Callus** (vid. occallescentia) in ulceribus sinuosis \* 60. b. ejus cura \* 61. b.  
 Callorum ortus, & cura chirurgica \* 28. a. v. fractura ossium.  
**Calor** quid. 5. a. 8. a. \* 84. a. \* 747. a.  
 unde 26. b.

d

Caloris



# INDEX UNIVERSALIS

- Caloris in igne natura & operandi modus \* 555. a.  
 Calor intenditur toties, quoties dolor nos urget \* 157. b.  
 Caloris intensio obesitatem minuens. \* 831. b.  
 Calor quid conferat ad fermentationem & putredinem promovendam. 356. b.  
 Caloris in corpore existentis causa efficiens. 230. a. b.  
 Caloris in corpore gradus. 142. b.  
 Calor quid conferat in corpore. 38. b.  
 Calorem partes habet non ex se, sed ex sangv. \* 513. b.  
 Calor febrilis † 244. a. v. æstus.  
 Calor affligens in febr. lymphat. \* 234. a.  
 Calor in febr. malign. † 318. b.  
 Calor naturalis & febrilis quomodo differant. 229. a. b.  
 Calor in inflammatione † 535. b.  
 Calor mordax in inflammatione hepatis. † 575. b.  
 De calore nocturno casus & observatio \* 352. b.  
 Calore nativo destitutos reficiens † 392. b.  
 Calor pulmonum &c. an respiratione moderetur \* 757. b.  
 Calor partes carnosas tumidiore facit \* 744. b.  
 Calor vitalis an de natura ☉ari 229. a.  
 Calor vitalis qt. necessarius \* 95. a.  
 Calor vitalis an tempore hiberno remissior sit, quam æstivo? \* 226. b.  
 Calor, v. æstus, ardor.  
*Caltha* ejus differentia, præparata & usus. 406. a.  
*Calvities* ejusque cura † 531. a.  
 Calvities in lue Gall. † 456. a.  
 Calvian fiant evnuchi † 775. a.  
*Calx lora*, ejus usus in Medicina. 733. a.  
 Calx viva. 354. a.  
 De calce viva pilulæ \* 639. b.  
 Calcem præparantes plerumque phthisici † 397. b.  
 Aqua Ψ composita polychresta. 733. a.  
 ∇ Ψ x ∇ e saturata ejus compositio. 930. a.  
*Camphora*, ejus differentia, præparata & usus. 577. a.  
 Camphora an vi polleat antiveneræa. \* 326. a.  
 Camphoræ insignes vires † 334. b.  
 Camphora ad abortum disponens † 1011. a.  
 Camphoratorum usus in febr. mal. † 331. a.  
 Camphoræ usus in peste † 364. a. sqq. † 370. a.  
*Cancer*, animal, cujus usus in Medicina 691. a.  
 Cancris fluviatilis. 354. b.  
 Cancris fluviales cur faciliè putrescunt. 358. a.  
 Cancrorum usus in Hæctica † 317. a.  
 Lapides cancerorum. 354. a.  
*Cancer, morbus*, quid, locus affectus, causæ, \* 25. a. b.  
 ejus prognosis, differentia, cura oculi \* 26. a. cura exulcerati, & signa tumorum serosorum in cancerum degenerantium \* 27. a.  
 Cancer ex fungo \* 32. a.  
 Cancerosa ulcera, eorumque cura \* 63. b. sq.  
 Cancerosa caro testium † 907. b.  
 Cancer mammarum † 1058. a. b.  
 De cancro mammæ casus & obs. \* 352. a.  
 Cancrum mammarum sequens colliquatio † 287. b.  
*Candelarum* fœtor abortus causa. † 1011. b.  
*Canis* cujus usus in Medicina. 653. a.  
 Canes cur facilius ossa digerant † 40. a.  
 Cur canes, equi, lepores minus pingues \* 824. b.  
 Canum incrementum impediens \* 834. a. b.  
 Canum sagacitas \* 805. b.  
 Canes venatorii cur sub constitutione aëris aquiloniæ minus sagaces † 789. b.  
 Canos ad venerem alliciens genituræ odor \* 325. a.  
 Canis rabidi urina, saliva &c. \* 800. a.  
 Morfus canum & ejus cura † 384. b. v. morfus.  
*Canitiem* tollentia † 431. b.  
*Cannabis*, ejus præparata & usus. 406. b.  
*Cantharides*, præparata & usus. 702. a. † 341. a.  
 Cantharidum correctio \* 315. a.  
 Cantharidum usus in febr. mal. & applicandi ratio. † 332. b.  
 Cantharides in peste & al. morbis, amplam vesicam excitantes, quid signent † 362. a.  
 v. vesicatoria.  
*Canilensis* delectatus melancholicus \* 107. a.  
*Caper*, Capra cujus usus in Medicina. 654. a.  
*Capillorum* vitia † 531. a.  
 Capillorum defluvium cum cura † 531. b.  
 Capillorum in casu lotio \* 657. a.  
 Capillorum incrementum promovens lotio. \* 657. a.  
*Capitis* structura † 760. b.  
 Capitis consensus cum testibus \* 179. a.  
 Capitis morbi considerati † 701. b.  
 Capitis affectibus catarrhalibus conducentia. † 686. a.  
 Capitis confusio epilepsiam inducens † 100. b.  
 Capitis affectiones convulsivæ † 802. b.  
 † 804. a.  
 Decocta in capitis defluxionibus \* 653. a.  
 Destillatio à capite ad pectus & ventriculum in epilepsia † 809. b.  
 Capitis dolor gravativus in coryza † 687. a.  
 Sacculus contra dolorem capitis, in specie & frigore \* 655. b.  
 Unguentum in dolore capitis febrili \* 664. a.  
 Frontale contra capitis dolorem in febrium æstu \* 641. b. v. cephalalgia.  
 Capitis hydrops † 694. a.  
 Capitis illisio in lapidem \* 368. b.  
 Capitis tetanum, v. tetanum.  
 Capitis tumores & ulcera infantum † 1100. b.  
 Capitis tumori ex odontalgia an conveniat venæsectio † 683. b.  
 Decoctum in affect. capitis chronicis \* 651. a.  
 Capitis vulnere & concussionum differentia & cura \* 51. a. b.  
 Capitis apertio in empyemate † 603. a.  
 Capitis lotiones \* 656. a.  
*Caparis*, ejus præparata & usus. 407. a.  
*Capra Alpina* l. Rupicapra, cujus usus in Medicina. 654. b.  
*Caprea*, *Capreolus*, cujus usus in Medicina. 656. b.  
*Capricornia* orientalis ejusque usus medicus. 655. a.

Ca-

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Capricerva occidentalis*, cujus usus in Medicina, 656. b.
- Caprifolium*, ejus differentia, præparata & usus. 407. b.
- Caranna*, ejus usus. 580. b.
- Carbo petra l. fossilis* quid & cujus usus. 814. b.
- Carbonum gas pulmones lædens \* 197. b.
- Carbonum fumus abortus causa † 1011. a.
- Carbunculorum* ortus, qualitas \* 17. b. prognos. \* 18. a. cura, ibid.
- Carbunculi pestilenciales † 359. b. seqq. † 361. b. seqq.
- Carbunculorum pestilentialium cura † 372. a. † 374. a.
- Cardamomum*, ejus differentia, præparata & usus. 407. b.
- Cardia* quid \* 137. a.
- Cardiaca* ejus præparata & usus. 408. a.
- Cardiaca Syncope* † 238. b.
- Cardiaca affectio infantum † 1077. b.
- Cardialgia* † 81. a. \* 424. b.
- Pars ejus affecta, causæ † 82. a. b. differentia ibid. Diagnos. † 84. a. Prognosis, cura † 84. b. seqq. differentia à dolore colico † 84. a. An hic venæsectio conveniat † 86. a.
- Consulatio de cardialgia \* 147. a.
- De cardialgia casus & obs. \* 376. a.
- Emplastrum in cardialgia \* 664. b.
- Cardialgia in febr. mal. † 338. a.
- Cardialgia juncta inflationi stomachi \* 132. b.
- Cardialgie in peste cura † 377. a.
- Cardiognus* v. *Cardialgia*.
- Cardiognome* † 81. a.
- Carduus benedictus*, ejus præparata & usus. 408. a.
- Carduus Mariæ*, ejus præparata & usus. 409. a.
- Caries* quid, ejusque causæ, &c. \* 54. a. seqq.
- Caries ossium in ulceribus quid \* 59. b. diagnos. ejus, prognos. cura chirurgica, \* 60. a.
- Caries ossium in lue Gallica † 475. a. \* 115. b.
- Carlina*, ejus differentia, præparata & usus. 409. a.
- Carminativa* † 3. a. † 4. b.
- Litus carminativus \* 663. a.
- Carminativæ rotulæ \* 636. b.
- Carminativus de tribus, ejus Compositio. 935. a.
- Caro copiosior* \* 823. a. v. *Corpulentia*.
- Caro luxurians in vulnere, ejusque cura \* 53. a. in ulcere, quomodo tractanda \* 59. b.
- Carnis averfatio febricitantium † 39. a.
- Carnosarum partium obstructio † 181. b.
- Carnosi tumores testium † 906. b.
- Carnes juniorum animalium bene nutriunt \* 827.
- Carotides* an possint obstrui † 826. a.
- Carotidum strictura sanguinis motum ad cerebrum impediens † 825. b.
- Carotidis arteriæ pulsus vehementis in phrenitide † 86. b.
- Carpo* vel *Carpio*, cujus usus in Medicina. 693. b.
- Cartesiana* dogmata & eorum fundamentum \* 512. a. b.
- Carthamus*, ejus præparata & usus. 618. b.
- Caruncula lacrymalis* quid † 589. b.
- Caruncula meatus urinarii s. penis † 468. a.
- Carum*, ejus præparata & usus. 409. b.
- Carus* quid, ejus causæ &c. † 708. a. b. seqq.
- Ejus differentia ab epilepsia † 809. a.
- Cari & apoplexiæ differentia, † 831. b.
- Carus ex phrenitide † 861. a.
- Caryca* cur nux juglans dicta † 708. b.
- Caryophyllata*, ejus differentia, præparata & usus. 411. b.
- Caryophyllis* ejus differentia, præparata & usus. 410. a. b.
- Casus* febrim averfanti concilians † 257. b.
- Cassia*, ejus differentia, præparata & usus. 619. a.
- Castanea*, ejus præparata & usus. 411. a.
- Castor* cujus usus in Medicina. 657. a.
- Castorei* virtutes \* 135. b.
- Castorei usus in clysmat, ad col. convulsionem. \* 182. b.
- Castorei essentia, ejus compositio. 991. b.
- Castrati* etiam sæcundi † 899. a.
- quâ ratione coire possint 108. a.
- Castratio* mulierum, virorumque considerata † 953. a.
- Castratio in hydrocele † 905. b. in sarcocèle † 907. b.
- Castratio mamiam curans † 882. b.
- Castratio pinguedinem concilians \* 828. a.
- Castrensis febris*, v. *febris castrensis*.
- Casus*, v. *morbis*, cura.
- In omni casu resolvendo quinque capita consideranda \* 119. a.
- Casui unicuique ira occurrendum, ne noceamus ægro \* 118. b.
- Casus & observationes \* 337. a. seqq.
- De casu gravi à traha, casus & observat. \* 353. a.
- Casus ab alto abortus causa † 1011. a.
- Casus ab alto empyema concilians. † 600. b.
- Catalepsis* ejusque causæ † 717. a. Prognosis & cura † 718. a. b.
- primus gradus epilepsiæ \* 785. a.
- Cataphora* considerata † 708. b. seqq.
- Cataplasma* quid & ejus usus. 834. a.
- Cataplasmatum præscriptio \* 632. a. \* 655. b.
- Cataplasmatum pultiformium præscribendi ratio \* 657. b.
- Cataplasmata ex pulveribus præscribendi ratio \* 658. a.
- Notanda circa cataplasmata ex fermento \* 659. a.
- Cataplasmata ex ingredientibus propriis nudè sub consistentia aut mixtione mutua. \* 658. b.
- Cataplasmata non conveniunt locis herniosis \* 186. b.
- v. *emplastrum*.
- Catapota*, v. *pilulæ*.
- Cataputia* minor, ejus præparata & usus. 619. b.
- Cataracta connata* † 727. b.

# INDEX UNIVERSALIS

- Cataractæ oculorum consideratio † 725. b.  
*Cathartica* portio \* 640. b. v. Purgantia.  
*Catharticum* D. vid. Argentum.  
*Catarrhi*, *catarrhales affectus* considerati † 675. a. veterum hypothesis ibid. eorum materia &c. † 675. b. Causæ † 676. a. sqq. differentiarum † 678. a. tempora paroxysmi catarrhalis probe distinguenda † 678. b. Symptomata † 679. a. variaz appellationes pro partium affectarum varietate † 679. b. Diagnofis † 680. a. Prognofis, cura † 681. a. b.  
*Catarrhis* an proclivior detur occasio hieme. 227. a.  
*Catarrhorum* in prognofi personæ, ætatis &c. habenda ratio \* 229.  
*Catarrhalium affectuum* exacerbatio vesperti ad mediam usque noctem \* 228. b.  
*De catarrho* casus & observat. \* 349. a. \* 352. b. \* 423. b.  
*Catarrhorum calidorum* cura † 683. a.  
*Catarrhorum chronicorum* cura † 682. b.  
*Catarrhorum contumaciorum* cura † 682. b.  
*Decoctum* in affectibus catarrhalibus pectoris \* 651. a.  
*Decocta* in catarrhalibus defluxionibus \* 653. a.  
*Catarrhalis febris*, v. febris catarrhalis.  
*Catarrhalis phthisis* quænam vulgo dicatur † 399. a. b.  
*Catarrhorum infantum* cura \* 549. b.  
*Catarrhalibus affectibus capitis* conducentia. † 686. a.  
*Catarrhus narium*, v. Coryza.  
*Catarrhorum nathorum* cura † 686. b.  
*Catarrhi scorbutici* cura † 684. b.  
*Catarrhus suffocativus*, ejus causæ veræ & putativæ, differ. † 236. a. b. Cura † 237. b. sqq.  
*Catarrhi suffocativi* differentia ab Apoplexia † 831. b.  
*Consultatio* de catarrho suffocativo \* 188. a. \* 190. b. sqq.  
*De catarrho suffocativo* casus & obs. \* 404. a. v. sanguinis coactis.  
*Catarrhum suffocativum* curat sperma ceti \* 705. a.  
*Infantum* † 236. b. 240. b.  
*Catarrhales sternutationes* † 217. a.  
*Catoche* considerata † 717. a.  
*Catus domesticus*, sylvestris & zibethinus cujus usus in Medicina. 658. b.  
*Causa morbi* sublata, tollitur affectus & symptomata † 2. a.  
*Causarum* consideratio in omni casu necessaria \* 119. a.  
*Causus* facile in febr. maligni. degenerat, & cur † 323. a.  
*Causus* an detur sine malignitate † 286. a.  
*Causus febrilis* † 285. a. ejus cura † 302. b.  
*Julepus* in causo \* 643. b.  
v. æstus, ardor &c.  
*Cauteria* quid, eorum differentia & applicandi modus. 949. b.  
*Cauteriorum* usus in epilepsi. † 812. a.  
*Cauteria* in hydrope † 437. b.  
*Cauteriorum* usus in mania † 881. b.  
*Usus* in morfu ab animali venenato † 891. b.  
*usus* in obesitate \* 836. a.  
*Cauterii* in peste signa prognostica † 362. a.  
*Cellerie*. 390. a.  
*Centaurium minus*, ejus differentia, præparata & usus. 412. a.  
*Cepa*, ejus præparata & usus. 413. b.  
*Cephalæa*, v. Cephalalgia.  
*Cephalalgia* consideratio † 760. a. b.  
Ejus divisio † 761. a. Causæ ibid. Diagnofis, † 765. a. prognofis, cura † 766. a. b.  
*De cephalalgia* casus & obs. \* 344. a. \* 395. b.  
*Cephalalgia ex cachexia muliebri* cura † 962. b.  
*Cephalalgia ex colica* † 161. b.  
*Cephalalgia in dolore ventriculi* † 83. b.  
*Cephalalgia in febr. cura* \* 206. a.  
*Cephalalgia in febr. acutis* cura † 300. b.  
*Cephalalgia in febr. mal.* † 319. b. cura † 338. a.  
*Cephalalgia in febr. contin. lenta* \* 233. b.  
*Cephalalgia in tertiana mal.* \* 206. b.  
*Cephalalgia in febre symptom.* & hepatitis inflamm. \* 281. b.  
*Cephalalgia gravidarum* † 1040. b.  
*Cephalalgia hypochondriacorum* † 480. a.  
*Cephalalgia à lue Gall.* cura † 477. b.  
*Cephalalgia in pleuritide* † 564. b.  
*Cephalalg. in peste* † 360. b. sq. cura † 375. a.  
*De cephalalgia puerperæ* casus & observ. \* 350. a.  
*Cephalalgia scorbutica* cura † 513. a.  
*Casus & observ. de cephalalgia scorbutica* \* 391. b.  
*Cephalalgia ex affecto stomacho* \* 133. b.  
*Cephalalgia per consensum stomachi* \* 202. b.  
*Epithema contra cephalalg.* cum agrypnia in febribus \* 641. b.  
*Decoctum discutiens & resolvens ad cephalalg. accidentales* \* 654. a.  
*Emulsiō epithematis modo ad cephalalg.* \* 644. b.  
*Epithema in cephalalgia ex causa frigida &c.* \* 641. b.  
*Cephalica* † 4. a. b.  
*Cephalico-Cordiacum Rudolphi II.* † 391. b.  
*Cerasa*, eorum differentia, præparata & usus. 414. b.  
*Ceratorium* præscribendi ratio \* 662. b.  
*Cerebelli* consideratio † 701. a.  
*Cerebelli influentiæ* efficacia in nutritionis & augmentationis negotio \* 826. a.  
*Cerebello inflicto* vulnus an lethale \* 37. b.  
*Cerebri* consideratio † 701. a.  
*Cerebri systema* † 25. a.  
*Cerebri substantia duplex.* 87. a.  
*Cerebri cortex.* 87. a.  
*Cerebri consensus cum visceribus abdominis, ventriculo* † 701. a.  
*Cerebri consensus cum luna* † 701. a.  
*Cerebri concursus ad sensationem* \* 782. b.  
*an in statu naturali aliquid ex cerebro vel ejus sinibus defluat.* \* 227. b.  
*Cerebrum an subeat aer inspirando pro spiritu animalium materia* \* 749. a.  
*Cerebri influentiæ* efficacia in nutritionis & augmentationis negotio \* 826. a.  
*Cerebri vitium in agrypnia* † 702. a.  
*Cerebri confusio in convulsionibus* † 806. b.  
*Cerebri diarrhœa* † 103. b.  
*Cerebri affectiones in hydrocephalo* † 695. a.  
*Cerebri inflammatio, sphacelus, sideratio* † 586. a.  
Cerebri



## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Cerebri** membranæ inflammatae † 586. a.  
**Cerebri** ventriculi repleti & obstructi † 826. b.  
**Cerebri** vulnera & compressiones quatenus lethalia \* 35. b. \* 37. b. quomodo tractanda \* 51. b.  
**De cerebri** vulnere casus & obl. \* 417. b.  
**Cerebro** dicata † 4. b.  
**Cerefolium**, ejus differentia, præparata & usus 415. a. b.  
**Cerevisia** vini vicarius \* 520. a.  
**Cerevisiæ** fermentatio \* 23. a. seqq.  
**Cerevisiæ** vis nutritiva \* 827. b.  
**Cerevisia** inebrians \* 810. a. Ejus gas inebrians & suffocans † 192. a.  
**Cerevisiæ** medicatae præscribendi ratio \* 649. a.  
**Cerevisiæ** usus in febr. † 254. b.  
**Cerevisiæ** averlatio † 39. a. \* 355. b.  
**Cerevisiæ** fastidium in tertiana malum \* 207. a.  
**Cerevisiæ** nausæ in febr. substitutus potus \* 206. a.  
**Cerinthæ**, **Cerinthi**, **Kraut** ejus diffra & usus 415. b.  
**Cerota** eorumque compositio 849. a. -- 852.  
**Cervus** cujus ulus in Medicina 659. b. totus alexipharmacus † 334. b. † 370. b.  
**Cervinus** Boletus \* 449. a.  
**Tubera** Cervina cujus usus 609. b.  
**Cetus** & **Manati** cujus ulus in medic. 693. b.  
**Cetorum** species variae \* 699. b.  
**Chalcitis** ejusque usus in medicina 790. b.  
**Chamadrys**, ejus different. præparata & usus 416. a.  
**Chamapitys**, ejus differ. præparata & usus 416. a. b.  
**Chamomilla**, ejus differentia, præparata & usus 417. a. b.  
**Chamomilla Romana** virtutes \* 135. b.  
**Chamæteris** materia sub prima creatione corporum impressi, à posteriori tantum à nobis cognoscuntur \* 555. a.  
**Chelidonium**, ejus diffra, præparata & usus 418. a. b. seq.  
**Chelidonii** majoris succus 333. b.  
**Chenopodium** ejus usus 420. a.  
**Chermes**, differentia, præparata & usus 420. a.  
**Cheyri**, **Keyri**, **Leucojum**, ejus præparata & usus 421. b.  
**Chimia**, v. **Chymia**.  
**Chymus** † 559. b.  
**Chimus** Tartarorum \* 521. a.  
**China**, ejus præparata & usus 421. b.  
**China china**, ejus præparata & usus 422. a.  
**Chiragra** qualis affectus † 773. a.  
**Chironia** ulcera, unde sic dicta eorumque cura \* 63. a.  
**Chirurgia** subjecti affectus quinario numero comprehensi \* 1. a.  
**Partes** affectæ, & observanda circa eas \* 1. a.  
**Observanda** in curatione chirurgica \* 2. a.  
**Auxilia** petita ex tribus fontibus \* 2. a.  
**est duplex**; vel medica, vel manualis \* 2. b.  
**Autores**, qui egregie de chirurgia scripserunt \* 2. b.  
**Olim præstantissima ars** hodie ab imperitis barbitonsoribus & balneatoribus exercetur \* 57. b.  
**Chirurgia** Transfusoria, v. **Transfusoria** chirurgica.  
**Chirurgus** quis, remissive \* 1. a.  
**ejus manus** artificiosa debet activa \* 2. a.  
**Operationes** ejus primariæ quæ \* 2. b.  
**Chlorosis** † 309. b.  
**qualis affectus** † 958. a. ejus causæ † 958. b.  
**Symptomata** *ibid.* Cur tales feminas felicissime restituar congressus cum viro † 958. b. **Diagnosis** † 959. a. **Prognosis** † 960. a. **Cura** *ibid.*  
**De Chlorosi** casus & observat. \* 403. a.  
**Chlorosis** incipiens cum vomitu inveterato matutino & terano capitis \* 523. b.  
**Choledochi** pori obstructio † 121. a.  
**Choledochum** ductum obstructum referantia † 122. b.  
**Choledochi** ductus vulnera per se lethalia \* 36. b.  
**Cholera** † 105. b. qualis affectus & ejus symptomata † 112. b. divisio † 113. a. Pars affecta & causæ ejus † 113. a. seq. **Diagnosis**, **prognosis** † 114. a.  
**Cura** † 115. a.  
**Cholera** fiendi modus \* 149. b.  
**De Cholera** casus & obl. \* 424. b. 435. a.  
**Consultatio** de Cholericis quodam affectu \* 148. b.  
**Cholera** sicca quæ † 65. b.  
**Cholera** ex esu fungorum \* 138. a.  
**De Cholera** sanguinea casus & obl. \* 352. a.  
**Epithema** in cholera pro ventriculo \* 641. b.  
**Cholericis** qui \* 309. b.  
**Chonagra** \* 773. a.  
**Chordapsus** & ejus cura † 96. b.  
**Chorion** † 990. a.  
**Chronici morbi** v. **morbi Chronici**.  
**Chrysanthemum** Indicum, ejusque usus 423. a.  
**Chrysopaia** considerata \* 772. b.  
**Chylificatio** quid 53. a. Ejus causa efficiens est fermentum acido-Sinum volatile 54. a.  
**Chylificatio** contingit de die citius, de nocte autem perfectius 57. b. promovetur à calore, imminuitur à frigore 53. a. b.  
**Chylosis** imminuta, abolita & depravata † 59. a. ejus causæ *ibid.* **Diagnosis** † 61. a. **Prognosis**. **Cura** † 62. a. b.  
**Consultatio** de chylisi læsa ex cruditate nidorosa cum Soda \* 128. a.  
**Chylosus** succus quomodo in urina distingv. à pure, &c. \* 237. b.  
**Chylisi** succi nutritivi dyscrasia ad cutem & partes nerveas delati in quo consistat \* 285. e.  
**Chylus** quid sit 57. b.  
**Chyli** rinctura, digestio &c. 444. b.  
**Cur** albus \* 152. a.  
**Ad chyli** laudabilem constitutionem multum facit digestio \* 825. a.  
**Quomodo** in sanguinem mutetur \* 62. b. seq. quantam ad sui in sanguinem transmutationem requirat moram 65. b. seq. 69. a.  
**Est conservans** sanguinis primum 65. b.  
**Chyli** in sanguinem transmutatio læsa † 241. a.  
**Quem** motum servet 60. b. seq.  
**Chyli** motus & distributio læsa † 180. a. ejus transcolatio † 180. b.  
**Chylus** nutritionis materia \* 824. a.  
**Quale** nutrimentum \* 110. a.  
**Nerveas** partes nutriendas † 25. a.  
**Chyli** concursus ad obesitatem \* 825. b.  
**Quam** alterationem in intestinis subeat 58. a.  
**Chyli** alteratio vitiosa † 90. b.  
**Chyli** separatio à fecibus alvinis † 90. a.  
**Purior** separatur ab impuriore mediante bile & succo pancreatico 59. a.

# INDEX UNIVERSALIS

- Chyli** ob nullam distributionem excretio †  
121. b.  
**Chylus** artificialis §4. a.  
**Chylus** artificialis ex alimentis productus †  
§14. b.  
**Chymia**, medicinz oculus §3. a.  
**Chymica** fundamenta in medicina observan-  
da †2. b.  
Non pertinet ad medicum ut medicum \*  
675. a.  
**Chymica** medicina Hippocratis \* §10. a.  
seqq.  
**Chymia** non potest concordare cum Medici-  
cina *Galenica* §3. a.  
**Chymiz** facies antiqua §0. b.  
**Chymia** hodie studiosè excolitur & cur †1. a.  
\*78. a. 842. a.  
**Chymiz** prostitutio \*674. a.  
**Chymiz** principia 246. a. b. 738. b.  
**Principia** Chymicorum activa & passiva sunt  
insufficiencia 8. b.  
**Chymiz** finis est crudorum correctio non ca-  
stractio 254. a.  
**Chymiz** usus 246. a.  
**Sal** Chymicum quid 299. a.  
**Chymica** non-entia §28. a. b.  
**Chymici** celebriores §0. b.  
**Chymiatr**i sublimiores †1. b.  
**Chymicum** se quilibet impostor jactat \*  
680. a.  
**Cibi** & potus ratio in nutritionis negotio \*  
827. a.  
unaquæq; species fertur in cibum certum †36. a.  
**Cibi** peculiaris fastidium unde §0. a.  
**Ciborum** fermentatio quomodo probatur  
§4. b.  
corruptio in stomacho unde \*142. a.  
copiosa ingestio post morbos \*142. a.  
indeliberatus usus & nimius maximè nocet \*  
818. a. præsertim corporibus morboſis †  
255. a.  
v. **Assumta**, alimenta, potus, nutrimentum  
dicta.  
**Cicatrisantia** quæ \* §7. b.  
**Cicatrices** variolarum \*251. a.  
**Cicatricum** cura in variol. & morbill. †  
354. a.  
**Cicatricis** oculi cura &c. †721. a. †722. b.  
infantum †724. b.  
**Cicatricum** ratio post consolidationem vulne-  
rum \*44. a.  
**Cicatricula** ovi 113. a.  
**Cicer** ejus differentia, præparata & usus 423. a.  
**Cichorium** ejus differentia, præparata & usus 423.  
a. b.  
**Ciconia**, cujus usus in Medicina 683. b.  
tota alexipharm. †370. b.  
podagrica †775. a.  
**Cicuta**, ejus præparata & usus 424. b.  
**Cicutaria**, ejus usus 425. a.  
**Cimax**, cujus usus in Medicina 703. b.  
**Cinamomum** ejus præparata & usus 421. a.  
Cinamomi averſatio †39. a.  
**Cinnabaris**, ejus differentia, præparata & usus  
777. a. b.  
‡ **Nativa** antudò intra corpus possit assumi  
299. a.  
**Cinnabaris** nativa, magnes epilepticus \*  
299. a.  
**Cinnabaris** Antimonii plurimi æstimata \*  
79. b.  
‡ **Cærulea** 298. b.  
‡ **ungarica** optima 298. b.  
**Circulatio** sanguinis vide Sanguinis motus, Sanguinis  
circulatio.  
**Circuli** circa tumores pestilenciales †362. a.  
**Circumforaneus** quilibet jactat chymiam & singula-  
ria \*674. a.  
**Circumgyratio** vertiginosorum &c. †794. a.  
**Circumſtantiæ** in morbo pòbè pensitandæ †28. b.  
modificant causam morbificam proximam \*  
118.  
**Cirones** v. **Sirones**.  
**Cirfocele** †908. a.  
Cirfocele cum epiplocele \*185. a.  
**Citrullus**, ejus præparata & usus 428. a.  
**Citrus**, ejus præparata & usus 421. b.  
Citri vires †334. b.  
**Civis** bonus & vir bonus non differunt \*445. b.  
**Clamor** infantum nimius, eos facile herinosos red-  
dit †173. b.  
**Clareta** præscribendi ratio & formulæ \*648. b.  
**Claudicatio** ex luxatione ossis femoris \*67. b. ex  
ejus fractura \*72. b.  
**Clavicularum** consideratio \*721. b.  
**Clavus**, qualis tumor, ejusque cura chirurg. \*30.  
b. \*31. a.  
in pede quomodo generetur \*4. a.  
**Clinopodium**, ejus differentia & usus 428. a.  
**Clonica** convulsio †802. a.  
**Clyſma** quid & unde sic dictum 173. a. b.  
præparandi modus 833. b.  
In clysmate duo consideranda \*659. a. De-  
lectus ingredientium superſtitioſus ibid.  
applicandi modus per triplicia instrumenta \*  
659. a.  
Observandus intestinorum status in clysmatum  
usu †95. b.  
**Clyſma** altero demum die redditum \*159. b.  
**Clysmatica** nova, vetus \*479. a.  
**Clysmatum** s. clysterum præscribendi ratio \*  
659. a.  
**Clysmatibus** an electuar. purgant. addenda \*  
659. b.  
**Clysmatum** usus in colic. convuls. \*182. a.  
usus in diarrhoea &c. \*144. a.  
effectus, in dysent. præsertim †120. b.  
usus in febribus \*205. †253. b.  
usus in febr. mal. †332. a.  
usus in hydropè †439. b.  
**Clysmata** pro lactentibus †1073. a.  
eorum usus in Petechiis †341. a. v. **Clyster**.  
**Clyſſus** ¶ acidus ejus compositio 944. a.  
¶ osus quid 886. b.  
**Clysteres** eorum compositio & usus 881. b.  
sequent.  
**Clysterum** variæ formulæ \*659. b. seq.  
usus in apoplexia †832. a.  
usus in calculo renum †638. b.  
**Clyster** carminativus in Colica flatulenta \*  
659. b.  
**Clysterum** usus in gravidis †995. b.  
usus in scorbuto †895. b.  
v. **Clyſma**.  
**Coagulatio** quid 19. a.  
quomodo fiat 251.  
**Coagulum** gypseum & sinoviz in luxatione re-  
solventia \*69. b.  
**Cobaltum**

## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Cobaltum* quid & ejus usus 790. a.  
*Cocculi Orientales*, eorum usus. 428. a.  
*Coccygus* os luxatum \* 70. b.  
*Cochlea* ejus usus in Medicina. 663. a.  
*Cochlearum* usus antihecticus † 317. a.  
*Cochlea auris* vitiosa constitutio † 735. a.  
*Cochlearia*, ejus præparata & usus. 428. a. b.  
 ex ea Experimenta chymica. 333. b.  
*Coctio* & separatio in quo consistant. 140. a. \* 215. a. \* 246. b.  
 quid? cocta materia quæ? \* 277. b.  
 Coctionis ratio & fundamentum † 247. b.  
 in corpore nostro datur triplex. 53. a.  
 Coctionis signa præcedunt crisin \* 247. a.  
 Coctione nondum peracta nulla crisis salutaria speranda † 292. a.  
 Coctionis signa in febribus attendenda † 251. b. † 252. a.  
*Cocitas* v. cæcitas,  
*Cocum* intestinum malè dicitur habere fermentum stercorem. 59. p.  
*Coliaca* affectio, fiendi modus duplex † 121. a. causæ † 121. b. Diagnos. Prognosis, Cura † 122. a.  
*Cœliaca* urinalis † 647. b.  
*Cana* largior noctem insequentem cur reddat inquietam † 21. b.  
*Casse* ejus usus. 429. b.  
 usus antiscorbuticus † 500. a.  
 cur agrypniam inferat † 703. b.  
*Cogitatio* rei ingrata syncopen inferens † 389. a.  
*Cognitio* nostra omnis dependet a spiritibus animalibus. 103. a.  
*Coitus* inappetentia † 953. a.  
 Coitum nimium coercentia † 921. a.  
 Coitum imparum innoxium reddentia præservativa † 469. a.  
 Coitus sternutationem promovens † 117. a.  
 Coitus suffocationem inducens; est parva epilepsia † 193. a.  
 In coitu instar canum juncti remanentes \* 922.  
 Coitus unus Galli qua ratione ad aliquot menses secundam reddit Gallinam. 108. b.  
 Coitus in piscibus quomodo fit. 108. b.  
 v. Impotentia, Venus &c.  
*Colcothar* Vitrioli vulnerum corruptionem tollens \* 44. b. & insigne vulnerarium \* 46. a.  
*Colica* qualis affectus † 155. b. (v. Intestinorum dolores colici) ejus differentia & varietas † 155. a. b. † 156. b. seq. † 158. b. Bilis perfectam inducere nequit † 158. b. Pars affecta & causæ † 158. a. Diagnos. † 161. a. Prognosis ibid. b. Distinctio à dolore nephritico † 161. a. Cura duplex in & extra paroxysm. † 162. a. quatenus purgantia hic convenient † 164. vomitoriorum usus hic cautus esto † 165. b. opiatorum usus † 165. b. Frigus fugiendum † 166. a. Quid si cum ardore aut caloris vel æstuationis sensu tormina affligant † 167. b. Si metus sit pareseos † 170. b. si dolor affligat cum frigore † 171. a.  
 Colici dolores, unde \* 270. a.  
 Distinctio inter colicam humorosam & convulsivam \* 171. b. \* 173. a.  
 Colici doloris differentia à Cardialgia † 64. a.  
 Colica distinguenda à splenico dolore \* 169. b.  
 Colica differt ab inflamm. hepatis † 576. a.  
 De colica casus & obs. \* 344. a. \* 396. b.  
 Colica virorum an differat ab Hysterica mulierum passione \* 179. b.  
 De colica juvenis casus & observatio \* 366. b.  
 Rotulæ contra colicam \* 636. a.  
 Anti-Colica virtus spermatis ceti \* 703. b.  
 Colica biliola paralyticus affectus \* 843. b.  
 Colica cæcitatem inducens † 730. b.  
 De colica convulsiva casus & obs. \* 386. a. \* 400. b. \* 413. b.  
 De colica convulsiva in Quartana duplicata \* 212. b.  
 Consultatio de colica convulsiva habituali cum epilepsia \* 177. b.  
 Colica hypochondriaca humorosa cum dolore iliaco \* 169. a.  
 Colica nephriticorum † 636. b.  
 Colica pestilens † 358. b.  
 Colicæ scorbuticæ cura † 507. b.  
*Colliquativa* acrimonia unde † 643. a.  
 Colliquativæ febres † 286. a. earum cura † 303. a.  
*Collum* ejus contorsio & convulsio † 802. b.  
 Colli musculorum inflammatio † 538. b.  
 Colli infantum tumores & ulcera † 1100. b.  
 De coctum in colli tumores \* 651. a.  
*Collyria* quid \* 632. a.  
 quomodo præscribenda \* 641. a.  
 Collyria varia † 595. a. b. † 721. a. \* 642. b. \* 654. a. v. oculus.  
*Colocynthis* ejus præparata & usus 620. a.  
 ejus purgatorius † 21. b.  
 ejus amarities & correctio 337. a. † 21. b. \* 138. a. utendi modus ibid.  
*Colon* & ejus situs † 155. b.  
 ob alvi feces retentas patiens † 91. a.  
 in passione iliaca affectum † 97. a.  
 coli dolor differt à dolore splenis \* 297. a.  
*Colophonia* ejus differentia & usus 581. a.  
*Color* quid 94. b.  
 Colores quomodo cæcus valeat discernere 95. a.  
 Colorum varia apparentia in corporibus unde \* 451. a.  
 Colorum varietas unde \* 152. b. v. Tinctura.  
 Colorum mutatio quomodo fiat 95. b.  
 Color nigerrimus quomodo explicandus 94. b.  
 Color ater imperspicuis unde 165. a.  
 Color usu tantum varians unde \* 157. a.  
 Colorum apparitiones in epilepsia † 807. a.  
 Colores aliter appatentes in febr. mal. † 327. a.  
 Color aliter appatens in glaucomate † 726. b. seq.  
 Colores varii in peste & morbis malignis aliis ob oculos versantes † 361. a.  
 Colores apparentes oculis in vertigine † 794. a.  
 Color pallidus virginum † 958. a.



# INDEX UNIVERSALIS

- Colestrum* an infantibus præbendum † 1061. b. sq.
- Colubrinum Lignum* ejus usus 430. a.
- Colum*, vid. *Colon*.
- Columba*, cujus usus in Medicina, 686. a.
- Colushea* vesicaria, cujus usus. 621. b.
- Collyria* quid \* 632. a.
- Coma somnolentum* & vigil consideratum. \* 708. b. sqq.
- Combinatio* affectuum \* 117. a.
- Combustionis* ab ignitis ardor unde † 145. b. v. ambustio.
- Comedonum* infantum origo s. causa \* 1003. a. b. \* 543. a.
- Cura \* 1104. a.
- De *Comedonibus* infantum observatio \* 837. a. v. *Crinones*.
- Cometarum* significatio \* 441. b.
- Comitialis* morbus v. *Epilepsia*.
- Compositio* officinalium pluralitas \* 626. a.
- Compositorum* dispensatio \* 624. a.
- Conceptio* quomodo fit. 112. a.
- Conceptio fieri potest etiam citra voluptatem veneream † 953. a. † 987. a.
- Conceptio vera quomodo dignoscenda ab hydrope uteri † 983. b.
- ad verum conceptum requiritur germen masculinum \* 790. b.
- Conceptio cur in lactantibus & pinguibus raro contingat † 985. a.
- Conceptio falsa † 980. a. differentia a vera † 981. a.
- Conceptionem impediens † 985. b.
- Conceptio læsa quoduplex † 980. a.
- Conceptio aucta, gemellorum, trimellorum &c. † 988. a.
- Conceptio imminuta & abolita † 984. v. *Sterilitas*.
- Concha* cujus usus in Medicina. 603. b.
- Concharum* præparatio. 911. b.
- Conchylia* adnata rupi corallinis confixa \* 448. a.
- Conchylia* in India stuporem paralyticum inferentia † 844. a.
- Conclavium* purgatio in peste † 365. a.
- Concoctio* læsa \* 119. b.
- Concretorum* texturam specialium ignis destruit \* 113. a.
- Conculcatio* hypochondrii sinistri cum pede \* 368. b.
- Concussio*, convulsionis species † 802. a.
- Concussionibus* conveniens emplastrum \* 73. a.
- Condiendi* vis spirituum † 797. a.
- Conditum* quid? & ejus præscrib. modus \* 634. b. quibus officinæ indigent. 835. b.
- Condita* parum curat medicus \* 631. b. exulent ex Praxi. 863. a.
- Sale* condita quomodo a putredine præservantur. 358. b.
- Conductio* convulsionis species † 802. a. Symptomata ejus † 801. a.
- Condylomata* luis Gallicæ reliquæ cum cura † 456. a. † 472. b.
- in pudendis \* 31. a.
- Confectiones* medicas præscribendi modus \* 636. a.
- Confectio* Alchermes † 391. b.
- Confectio* solida \* 636. b.
- Confermentatio* in consanguineis † 359. b.
- Configuratio* externa herbarum simplicium, non sufficit ad cognitionem medicam \* 845. a.
- Confortantia*. 980. b. † 5. a. 980. b. eorum compositiones. 955. a.
- Electuarium* Confortans. 984. b.
- Confortantes* Julepi \* 643. b.
- Confortans* potio \* 650. a.
- pulvis confortans. 984. a.
- Confortantes* rotulæ \* 636. b.
- Congelatio* quid. 251. b.
- Conjectura* in Medicina quid. 33. a.
- Conjunctiones* stellarum \* 439. a. sqq. Planetarum ibid. Magnæ, ob tres causas \* 440. a. cur effectus ear. ad multos annos duret \* 440. a. vetustas hujus doctrinæ \* 440. a. Tres ejus species ibid. periodicæ \* 440. b. Maxima quæ ibid. causæ tripliciter & intervalla \* 440. b. differentia \* 441. a. utrum veræ an vero medicæ conjunctiones attendendæ \* 442. b. earum numerus & tempus \* 443. a. exempla effectuum \* 443. b.
- an effectus tales verè ab illis dependant \* 444. b. An in rebus liberis & homine? \* 445. a. Significant bella, rerum publ. mutationes &c. \* 445. b.
- Consanguinei* eod. morbo, eodem tempore, licet diffusi, afflicti † 359. b.
- Consensus* quid? \* 586. a. morborum ibid.
- in quo consistat; sit tripliciter modo † 26. b. partium corporis † 701. a.
- partium propriè & impropiè sic dictus \* 179. a. sit tripliciter ibid.
- partium unde deducendus † 26. a.
- partium communicativus affectuum \* 281. b.
- Conservarum* usus in bolis \* 634. a.
- Conservatio* naturæ v. *Natura*.
- Consolidatio*, ejus differentia & usus. 430. a. b.
- Consolidativum* decoctum \* 653. b.
- Conspiratio* mumialis in consanguineis † 359. b.
- Consternatio* melancholiam inferens \* 107. a.
- Constituens* medicamenti compositi \* 627. a.
- Constitutio* firmior, tenerior, sensilior quæ? \* 215. b.
- Consultudo* quantum valeat. 123. b.
- Consultationes* medico-Practicæ \* 117. a.
- Consumptio* febrilis † 310. b.
- Contabescencia* febrilis † 304. a.
- v. *Tabes*.
- Contagium* quid; contagiosæ febres \* 102. b. † 249. a.
- Morbi* Contagiosi. 136. b.
- Contagium* minimum effectus est maximi \* 563. a.
- Contagiorum* origo ab effluviis \* 805. a.
- Contagiorum* afficiendi modi † 320. b. \* 805. b.
- Contagii* operatio 180. a.
- Contagiorum* vis unde dependeat † 93. a.
- Contagii* Communicatio. 366. b.
- Contagionum* venen. communicatio per salivam.

## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- livam, vestes, morsum &c. † 885. a. b.  
 Contagiorum differentia à venenis \* 802. b.  
 De contagio signa diagnostica \* 245. a.  
 Contagiorum natura unde dignoscenda † 249. a.  
 Contagia recepta in corpore cur tamdiu latere possint \* 800. a.  
 Contagiorum alia alcalina, alia acida \* 805. a.  
 Contagiorum curandi ratio. \* 180. a. \* 808. a.  
 Contagia maligna ejicientia † 5. a.  
 Contagium pestilentielle † 359. a.  
 Contagia massam sanguineam inquinantia † 242. a. † 251. a.  
 Contenta in intestinis v. feces, excrementa, alvus &c.  
 Continua febris v. febres continuæ.  
 Contractura cognata convulsioni species † 82. a.  
 Contractura convulsiva partium doloris est comes \* 289. b.  
 Contractura ex colica † 161. b.  
 Contractura nervorum, fibrarum &c. † 819. a.  
 Contrassura cranii \* 52. a.  
 Contrayerva, ejus usus. 430. a.  
 Contusio quid † 532. a.  
 De contusione casus & observ. \* 355. b.  
 Contusio empyema concilians \* 600. b.  
 Contusiones ex stagnatione humoris morbo-  
 sa \* 3. a.  
 Contusionum causæ & cura \* 11. b. 12. a.  
 b. seq.  
 Contusio capitis ut tractanda \* 51. b.  
 Contusio cum vulnere † an in ea suppuratio  
 expectanda, aut pars scarificanda &c. \*  
 46. b. distinctio contusionum \* 46. b. cu-  
 ra ibid seq.  
 Convolutus & ejus cura † 69. b.  
 Convulsio. Spasmus est duplex † 802. a.  
 Convulsio faciei canina differt à paraly-  
 si faciei † 845. a.  
 Convulsio clonica † 802. a. b. v. Epilepsia.  
 Convulsio tonica † 802. a.  
 Subjectum & cura † 819. b. ejus causæ †  
 818.  
 Convulsiva partium contractura doloris est  
 comes \* 289. b.  
 Convulsivi motus interni \* 181. b.  
 Convulsivi motus manifesti & externi \*  
 181. b.  
 Convulsivi motus cum syncope † 389. a.  
 Convulsiones infantum unde † 245. a.  
 Motus Convulsivi intestinorum in infantibus  
 † 1075. a.  
 Convulsiones in peste † 375. b.  
 Convulsio in emissionem Seminis venerea †  
 802. b.  
 Convulsionum scorbuticarum cura † 514. b.  
 Convulsionum cura in variol. & morbilis †  
 353. b.  
 Convulsio partium vulneratarum, ejus pro-  
 gnosis & cura \* 53. b. ex luxatione \* 67.  
 b. \* 68. a.  
 Convulsivis in affectibus non omnibus fortiter  
 olentia conveniunt † 384. a.  
 v. Spasmus.  
 Conyza, ejus usus. 430. b.  
 Cor est musculus sanguinis ex venis in arterias  
 transfusionem efficiens. 62. b.  
 an sol microcosmi \* 227. a.  
 an nunquam doleat \* 133. b.  
 Cordis meatus patentes in infantibus, am-  
 phibiis \* 755. a.  
 Cordis effecti motus \* 774. b.  
 Cordis igniculus ac flammula veterum extin-  
 ctus \* 758. a.  
 Cor ex se, nullo sensu nullaque molestia  
 corpori molestum est † 81. a. v. Cardial-  
 gia &c. &c.  
 Cordis anxietates v. anxietates.  
 Cor non afficitur in colica &c. \* 181. a.  
 Cordis convulsiones † 380. a. † 804. a.  
 Cordis dolores v. Cardialgia.  
 Cordis excrecentiæ, tubercula &c. † 380. b.  
 Cordis læsiones † 379. a. seq.  
 Cordis modus pulsificus \* 762. b.  
 pulsificus motus cur adeo necessarius pro vita a-  
 nimalium \* 771. b.  
 Cordis motus in respiratione \* 735. a.  
 Cordis palpitatio v. Palpitatio.  
 Cordis tremor v. tremor.  
 Cordis ventriculorum vulnera cur lethalia \*  
 35. b.  
 Cordis vulnera quatenus lethalia \* 36. a. cor ca-  
 nis citra lethalitatem vulneratum ibid.  
 Cordis læritia croci essentia † 876. b.  
 Cordiaco. Cephalicum Rudolphi II. † 391. b.  
 Corallen Mos. 430. b.  
 Corallina, S. Muscus Marinus ejus usus. 430. b.  
 Corallinum quale nomen \* 447. a. origo \* 448.  
 a. seq.  
 Cui regno accensendum. 725. b. \* 1447. a.  
 Rupes marina, tota coralliis obsita Kircheri \*  
 448. a. sunt triplicis differentia \* 451. a.  
 An sub aquis molles existant \* 450. b. 725.  
 Cur ex aquis extracta lapideam osscamque as-  
 sumant duritiem \* 451. a.  
 alia masculina, alia foemina \* 451. a.  
 Unde color eorum varius \* 451. a. optimâ  
 eorum species \* 451. b. à viris gestata diu-  
 tius splendorem retinent, quam à mulieri-  
 bus \* 451. b. eorum sympathia cum san-  
 guine humano. ibid. \* 458. b. eorum appen-  
 sorum effectus. 452. a.  
 Eorum insignes vires \* 458. b.  
 inter Coralia rubra & alia qualis differentia.  
 726. a.  
 Coralliorum rubrorum usus medicus. 726. a.  
 Coralliorum abusus & noxa \* 238. b.  
 Coralliorum syrupi quid valeant. 729. a.  
 Coralliorum pulvis & Tinctura. 726. b.  
 Tincturæ per acida mineralia paratæ sunt  
 solummodo subtiles solutiones. 728. a.  
 tinctura vera quæ \* 452. a. b. an detur \*  
 452. b. extractio per menstrua, calcinatio  
 \* 453. a. b. Quid si calcinentur cum pumice  
 \* 454. a. aut cum sulphure, nitro \* 454. b.  
 alia falsæ eorum tincturæ \* 455. a. tincturæ  
 coralliorum corrosiones \* 455. b. destilla-  
 tiones \* 456. a. selectiores præparationes  
 \* 457.  
 Usus Tincturæ et vires coralliorum medicæ  
 \* 458. b.  
 Coriandrum, ejus præparata & usus 351. a.  
 430. b.  
 Cornu cervi usus & cum eo præparata. 906. b.  
 Cornu cervi usus in dysent. † 132. b.  
 Cum C. C. præparatio, sive C. C. Oase.  
 750. a.

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM,

- Liquor C.C. succinatus. 344. a.  
 Cornu cervi oleum - -  
*Cornu* qualis tumor, eorumque cura chirurgica \* 36. b. \* 31. a.  
*Cornu* ejus differentia præparata & usus. 431. a.  
*Corona* viperina, vid. vipera.  
*Correctio* veneni in salutar. medicinam \* 248. b.  
 Corrector vegetabilium universalis sal tartari \* 846. a.  
*Corpulentia* nimia ejus natura & subjectum † 412. a. \* 819. a. effectus varii \* 820. b. exempla \* 820. a. causæ, differentia † 412. b. \* 81. b. \* 820. a. causa proxima \* 823. a. causæ remotæ \* 826. b. diagnostica & prognostica signa † 413. b. \* 828. b. Methodus medendi † 414. a. \* 829. a. remedia ex dietetico fonte \* 831. a. Remedia è fonte pharmaceutico \* 833. a. è fonte chirurgico petita \* 836. a.  
*Corpus* Chemicis  $\ominus$  dicitur. 738. b.  
 Corpora naturalia tripliciter considerata, 3. b.  
 Principia corporum naturalium materialia † 4.  
 Principia corporum naturalia imperferutabilia. 10. a.  
 Terra ultimum corporum principium. 16. b.  
 Corpora generandi varius modus unde. 10. a.  
 Fermenti & Ideæ affectus in generatione corporum. 22. b.  
 Generationis & destructionis corporum modi syncrasis, diacrisis, metastasis. 10. b. seqq.  
 Corporis esse speciale unde. 24. a.  
 Constituens corporum Causa quæ & quotuplex. 13. b.  
 Corpora quomodo dividantur. 23. b.  
 Forma quid tam in simplicibus, quam compositis corporibus. 23. b.  
 Corporis forma unde. 24. a.  
 Motus localis quatenus concurrat ad corporum formationem. 17. a.  
 Materia corporum naturalium quid. 1. a.  
 Materia corpora constituens est duplex 3.  
 Aqua corporum naturalium prima materia. 10. b.  
 Textura corporum varia unde. 2. b.  
 qualitates corporum sunt saltem effectus texture eorum. a. 3.  
 In corporibus tales qualitates deprehendere non licet, quales ipsis ordinario affingimus. \* 555. a.  
 Corporum Specifica variatio unde. 25. a. b.  
 Corporis Calor in quo consistat. 128. b.  
 Semina corporum latent in  $\Delta$  e. 22. b.  
 Augmentatio corporis cessat vel naturaliter vel nonnunquam præter naturaliter. 48. a. b.  
 Corpora valde minuta non sentimus \* 792. a.  
 Corporis evulcerati motus adhuc durans \* 794. b.  
 Corpus chemic. Sal. 738. b.  
 Corpora Geometrica sunt accidentia \* 446. b.  
 Corpus humanum definitur. 34. a. b.  
 An corpus humanum compositum ex quatuor elementorum mixture \* 511. a.  
 Pars corporis quo sensu calida, frigida, humida, sicca dicenda. 176. a.  
 Partium corporis humani generatio. 35. a.  
 Partes corporis humani tripliciter differunt. 35. a.  
 Partes corporis humani quomodo fiant solidæ, 35. b.  
 Corpus nostrum est machina hydraulico-pneumatica † 2. b. ejus æconomia quomodo à modernis explicatur † 2. b. sq.  
 Corpus nostrum automato simile \* 818. a.  
 Corpus nostrum gubernantes & conservantes facultates duæ † 5. b.  
 Corporis nostri Conservatio à quo dependet. 26. b.  
 Corporis mutationes sensiles, v. g. calor, pallores &c. unde † 242. a.  
 Functiones primariæ in corpore † 28. a.  
 Corporis motus quantum nutritionem adjuvet. 121. b. sq.  
 Duplex regio in corpore, superior & inferior † 6. a.  
 Corporis functiones sunt triplices vitales, animales & genitales. 44. b.  
 Anima, 1. principium corporis nostri vitale 36. a.  
 Corporum rugæ unde. 366. a.  
 Corporum consideratio in febr. mal. † 332. a. † 327. b.  
 Corpus mathematicum & physicum in quod differant. 2. a.  
 Corruptionem impediunt spiritus \* 811. b. atque Myrrha \* 44. b.  
 Cortex Winterianus, ejus usus. 426. b.  
 Corusationes oculis inimicæ † 730. b.  
 Coruscationes in visu læso † 718. a.  
 Corym cuius usus in Medicina. 686. b.  
 Corylus & Avellana, ejus præparata & usus. 431. a. b.  
 Coryza derivanda ex lymphæ acri \* 227. b. qualis affectus ejus causæ † 687. a. b. subjectum patiens † 687. b. non semper est salubris † 688. a. ejus Diagnos. prognos. † 688. a. Cura ibid. b.  
 An omnis coryza à causa externa? \* 228. a.  
 Coryzam præcedentes sternutationes † 217. a.  
 Coryza catarrhi species † 679. b.  
 vespertino tempore sic acerbior \* 228. b.  
 An coryza sana? \* 228. a.  
 Calus & observatio de Coryza \* 373. a.  
 Coryzæ epidemicæ sub temporum mutationibus venientes non à sola lymphæ præternaturali acrimonia oriuntur, sed à causa externa, aëre \* 226. a.  
 Cosmetica emulsiō \* 645. b. Epithema contra phlogosin ex cosmetico \* 42. a.  
 Costarum structura † 724. b. motus \* 729. b.  
 Costarum motus in orbem tendens \* 725. a.  
 Costarum notharum versus sternum dolores † 81. a.  
 Costarum spuriarum circa finem sterni dolor in diaphragmatis inflammatione † 565. a.  
 Costarum notharum dolor in pleuritide vera \* 276. a. \* 277. b.  
 Sectio infra quintam vel sextam costam in empyemate † 603. a.  
 Costas inferiores penetrantium vulnerum curatio \* 51. a.  
 Costi Kraut. 461. b.  
 Costus, ejus differentia, præparata & usus. 432. b.  
 Cotonei pomi usus in diarrhœa \* 143. a.  
 Coturnix cuius usus in Medicina 686. b.  
 Coturnicum ejus ad epilepsiam disponens † 808. b.  
 Coxendicum Dolor in gravidis, cum cura † 1002. a.  
 Crambæ v. Spasmus.  
 Craniis humani usus \* 132. b. † 815. a.

Crani



# INDEX UNIVERSALIS

*Cranii apertio in epileps.* † 812. a.  
*Cranii infantum lætio* † 1101.  
*De cranii vulnere casus & observ.* \* 417. b.  
*Cranii subsidencia, cerebrum comprimens an lethalis* \* 37. b. tracturæ & fissuræ quatenus lethales ibid. vulnera quomodo tractanda \* 51. a.  
*Crapula consideratio* \* 810. b.  
*Crapulam discutientia* † 717. a.  
*Crasis* quid sit 65. a.  
*Crasis sanguinis variat vel essentialiter vel accidentaliter; sc. ratione principii seminalis, aut sex rerum non naturalium & digestionis primæ* \* 79. b.  
*Crasis qui dicantur* \* 821. b.  
*Crepitus crebri infantum* † 1075. a.  
*Crescere solemus per assumpta nutrimenta* \* 819. a.  
*Creta ejus usus* 712. a.  
*Cretæ comestio in pica* \* 125. b.  
*Creutz-Braun* 542. b.  
*Crinones infantum, cum causis* † 1103. a. b.  
*Cura* † 1104. a.  
*De Crinonibus infantum observatio* \* 837. a.  
*Crisis* quid, tria se invicem in ea sequentium \* 246. b. fundamentum ejus ibid.  
*Crisis quomodo variat* 142. b.  
*Crisin præcedunt coctionis signa in urina conspicua* \* 247. a.  
*Crisis in morborum cura necessaria* † 252. a.  
*Crisis coctionis, & cruditatis cognit. unde* † 247. b. † 249. a.  
*Crisin an medicus expectare debeat* † 292. b.  
*Crisis in febr. versatur in terminis cruditatis & coctionis* † 2. 2. a.  
*Crisis ex pulsibus in febr.* † 249. a.  
*Crisis minus impedit opium* \* 568. a. \* 571. a.  
*Cristæ pudendorum in lue Gall.* † 456. a.  
*Critica evacuationes* † 252. a.  
*Critici motus in morbis observandi & expectandi* \* 246. b.  
*Crocus ejus differentia, præparata & usus* 433. a.  
*Croci laus* † 241. b.  
*Croci essentia, cordis lætitia summa* † 876. b.  
*Crocus metallorum ejus præparatio* 886. b.  
*Crocus* 339. a.  
*Cruditas in quo consistat* 140. a.  
*Cruditatis ratio unde dependeat* † 247. b.  
*Cruditas acida, nidorosa, quid* † 59. a. earum ortus † 61. a.  
*Casus & observ. de cruditate acida* \* 373. a.  
*Cruditates acidæ in morbis chronicis* \* 105. a. b.  
*Cruditates acidas tollentia* † 4. b.  
*Cruditas nidorosa chylosin inferens cum Soda* \* 128. a.  
*Cruditates viscidas resolventia* † 4. b.  
*Cruditates in stomacho* † 81. a. seqq.  
*Cruditas in stomacho unde, duplex* \* 128. a.  
*Cruenta dejectiones Hypochondr.* † 484. b.  
*Cruentus vomitus, v. vomitus.*  
*Cruralis rami illinci vulnus cur lethale* \* 35. b.  
*Crurum convulsionem & spasmus* † 219.  
*De crurum dolore convulsivo casus & obs.* \* 338. a.  
*Crurum dolores scorbutici quomodo curandi* \* 506. b.

*Crurum in dolore scorbutico præsertim nocturno intessus* \* 656. b.  
*Crurum dolori podagr. vel scorbutico conveniens balneum* \* 657. b.  
*De crurum paralyti casus & obs.* \* 406. b.  
*Cruris stupor in calculo* † 636. b.  
*Cruris stupor in renum inflammatione* † 580. a.  
*Crurum tumor in hydrope* † 425. a. † 426. a.  
*Crurum tumor & inflatio in gravidis* † 1007. a.  
*Crurum vesiculæ, scarificatio in hydrope* † 437. b.  
*Crurum ulcera sponte enascentia* \* 284. b.  
*Crusta à variol.* † 252. b. \* 356. a.  
*Crusta lactea infantum, cum causa, prognosi, cura* † 1097. b. seqq. \* 59. a. \* 550. b.  
*Crystallisatio* quid 251. b.  
*Crystallus ejus præparatio & usus* 734. a. \* 155. a.  
*Cubeba, ejus præparata & usus* 434. b.  
*Cucumis, ejus præparata & usus* 435. a.  
*Cucumerum noxa* \* 128. b.  
*Cucupha* quid \* 632. a.  
*Cucuphas præscribendi ratio* \* 655. b.  
*Cucurbita ejus præparata & usus* 435. a.  
*Cucurbitarum noxa* \* 128. b.  
*Cucurbitinus lumbricus* † 1093. a.  
*Cucurbitularum impositio cui usui* † 6. a.  
*Cucurbitularum vis attractiva* \* 745. a.  
*Cucurbitularum usus in Apoplexia* † 834. a.  
*Cucurbitularum usus in arthritide* † 778. b.  
*Cucurbitularum usus in Cephalalg.* † 768. b.  
*Cucurbitularum usus in mensibus suppressis* † 933. a.  
*Cucurbitularum usus in mensium fluxu nimio* † 939. b.  
*Cucurbitularum usus in obesitate* \* 836. a.  
*Cucurbitularum usus in palpit. cordis* † 384. a. v. Scarificatio.  
*Cuminum, ejus præparata & usus* 435. a.  
*Cupressus, ejus differentia, præparata & usus* 435. b.  
*Cuprum, ejus præparata & usus* 304. b. seq. 760. seqq.  
*♀ Colorum varietas unde* 760. b.  
*♀♀ quale & cujus usus* 760. b.  
*Curatio* † 1. b. cur multi affectus incurabiles habeantur, in se minus tales \* 78. a. Cura sæpe à posteriori, rarius à priori instituitur † 1. b. \* 78. b. ea est varia \* 79. a. seqq. anus & empirici cura promptior sæpe quam eruditi medici † 1. b.  
*In cura indicatio à naturæ motu sumenda* \* 144. b.  
*In curatione morborum causarum maximè habenda est ratio* \* 787. a.  
*Crisis morborum in cura necessaria* † 252. a. seq.  
*Curationis media quæ & unde haurienda* 144. a. b.  
*Curationis, auxilia petuntur ex triplici fonte* 145. b. \* 119. a.  
*Artis & naturæ opera simul hodie, in cura attenditur* † 251. b. quid si natura vitiosè agat † 252. a.

# INDEX UNIVERSALIS

**Cura** variat pro variis subjectis & circumstantiis \*118. b.  
**Homogenea** f. **Heterogenea** cura quæ dicatur 16. a. b.  
**Cura** mali hypoch. autores † 482. a.  
**Cura** infantum quomodo instituenda \* 548. a.  
 v. **Praxis**, **morbis**, **casus**.  
**Cursus** cur q̄s. Asthmaticos efficiat † 195. a.  
**Cursus** abortus causa † 1011. a.  
**Cucuma**, ejus differentia, præparata & usus 435. b.  
**Curcuma**, f. **Caluta**, **Epithymum**, ejus præparata & usus 436. a.  
**Cutis** descriptio 84. b.  
**Cutis** curiosa & artificiosa structura \* 560. a.  
**Cutis** pori, corrugatio, sensilitas &c. \* 561. a.  
**Cutis** consensus cum aliis partibus \* 572. b.  
**Cuti** si applicata gummata ferre nequit convenientia † 657. a.  
**Cutanei** affectus considerati † 518. a.  
**Cutis** aserina in corpore humano † 246. a.  
**Cutis** aserina unde \* 124. b.  
**In** cutaneis excretionibus quæ remedia caute aut plane non adhibenda \* 125. a.  
**Cutaneæ** excretiones retropulsæ, quomodo revocentur & expellantur \* 126. b.  
**Non** omnes cutis efflorescentiæ sunt **Petechiæ** † 340. b.  
**Cutis** efflorescentiæ cura in infantibus † 1099. b.  
**Curaneæ** ejectiones in febr. mal. † 327. v. **Pori**.  
**Cutis** nigredo. v. **nigredo cutis**.  
**Cyanos**, ejus præparata & usus 436. b.  
**Cyclamen**, ejus præparata & usus 437. a.  
**Cydonia** Malus, ejus præparata & usus 439. a.  
**Cynanche** † 538. b.  
**Cynoglossum** ejus differentia, præparata & usus 438. a.  
**Cynobatos**, ejus præparata & usus 438. a.  
**Cyper** o **Winkel** 439. a.

## D.

**Dæmoniaco**rum & **manicaor.** diff. † 878. a † 880. b.  
**Darr** - **Steber** † 304. a.  
**Datteln** 409. a.  
**Datura** Indorum, ejus usus 440. a.  
**Daucus** Creticus, ejus differentia & usus 440. b.  
**Daura** **Paracelsi** † 17. b.  
**Debilis** est ex spirituum defectu \* 245. b.  
 post morbos acutos cur tamdiu duret \* 238 a. b.  
**Decocta** præscribendi modus & formulæ \* 645. b.  
 \* 649. b. seqq.  
**Decoctorum** pro usu externo præscribendi ratio \* 653. b.  
**Decocta** parandi modus 831. a. - 833.  
**Communissimus** usus decoctorum \* 649. b. seqq. \* 659. a.  
**Decocta** frequentius hodie usurpata quæ \* 652. a.  
**Decocta** quæ sufficiunt 865. b.  
**Decoctorum** ratio in calculo renum † 638. b.  
**Decocta** in defluxionibus capitis \* 653. a.  
**Decoctorum** usus in epilepsia \* 812. a.  
**Decocta** lignorum nimis confertim hausta disponunt ad febrim lymphaticam \* 233. a.  
**Decoctorum** lignorum usus in obesitate \* 835. b.  
**Decocta** volatiliu quomodo fiant \* 651. a.

**Defatigatio** lipothymiam inducens 389. a.  
**Defluxiones** scorbutica † 509. b.  
**Deglutita** ineptie † 189. b.  
**Deglutitio** quid dicatur 52. b.  
**Deglutitio** læsa Prognosis, cura † 47. a. † 56. a. b. † 57. a.  
 læditur varie 52. b. seqq.  
**Deglutitio** impedita ex coica † 161. b.  
**Deglutitio** impedita in faucium inflammatione † 540. b.  
**Deglutitio** læsa in nausea † 70. b.  
**Deglutitio** difficilis in peste † 362. b.  
**Deliquium** animi in febre † 309. a.  
 v. **Lypothymia**.  
**Deliria** in genere considerata, eorumque causæ † 255. b.  
**Deliriorum** fundamentum \* 309. a.  
**Deliria** à causis internis † 857. a. b.  
 v. **Phrenitis**.  
**Deliria** à causa externa † 884. b.  
**Delirii** critici signa † 800. b.  
**Delirium** epilepticum † 809.  
**Deliræ** febres † 288. a † 301. a. unde sic dicæ † 250. a.  
**Delirii** in febr. cura \* 206. a.  
**Delirium** in febr. mal. † 326. b. † 336. b. † 338. a.  
**Deliria** melancholica, diversa horum exempla † 864. a. † 865. a. b. Causæ † 865. a. b. Differentia † 866. b. Divisio † 868. a. an ex plene † 868. b. Symptomata † 868. b. Diagnofis † 870. a. Prognosis † 871. b.  
**Cura** † 865. a. 870. a. † 872. a. Medici cautela † 872. b. Recidiva † 873. a.  
**Consultatio** de delirio melancholico hypochondriaco \* 308. b.  
**Circa** differentias deliriorum melancholicorum notanda \* 107. a.  
**Deliria** gravidarum † 586. a † 1040. b.  
**Delirium** in inflammatione diaphragmatis † 563. a.  
**Delirium** Musicum † 891. b.  
**Delirii** in peste prognofis &c. † 362. b. cura † 375. a.  
**Delirium** in pleuritide † 565. a.  
**Deliria** somnolentorum † 711. a.  
**Delirii** cura in variol. & morbill. † 353. b. v. **Mania**.  
**Dementia** artificialis † 856. a. v. **Stoliditas** &c.  
**Densa** constitutio quæ \* 215. b.  
**Dendritis** \* 447. a.  
**Dentalis** lapis & tartarus, scorbutus † 51. a seq. ejus causæ, Diagnofis, prognofis, cura † 52. a. b.  
**Dentium** nutritio unde † 49. b.  
**Dentium** vitia varia eorumque causa, † 49. a. seqq.  
**Dentium** algor † 55. b. cura † 56. b.  
**Dentium** defectus ejusque causæ † 49. a. Diagnofis, prognofis, cura † 50. a. renascencia ibid. artificiosi ibid.  
**Dentium** caries, fætor, vermes, eorum causæ, prognofis † 50. a. b. seqq.  
**Dentis** cavi aut carioli cura † 50. a. seqq. † 755. b.  
**Dentium** fætozem tollentes ablutiones \* 643. a.  
**Dentium** dolor scorbuticus † 505. a. v. **odontalgia**.  
**Dentium** evulsio † 51. a. † 755. b.

Den-

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

*Dentis evulsi excreſcentia*, curata \* 28. b.  
*Dentium hæmorrhagia*, ſuperincarnatio,  
† 53. b.  
*Contra dentium mobilitatem*, pulvis \* 634. a.  
*Dentium nigredo* † 51. b.  
*Dentium ſcorbuti cura* † 503. a.  
*Dentium ſtridor* † 48. b. ejus cauſæ, prognoſis, cura † 49. a.  
*Dentium ſtridor in & extra epileſiam* † 808. b.  
*Dentium ſtridor in phrenitide* † 587. b.  
*Dentium ſtupor*, ejus ſubjectum, cauſæ &c.  
cura † 55. b.  
*Dentium vacillatio*, ejus cauſæ, diagnoſis, prognofis, cura † 53. a. b.  
*Dentium vermiculi unde*, cum cura † 752. a. ſq.  
† 756. a.  
Miſtura præſervativa pro *dentium* variis affectibus \* 643. a.  
*Dentifricium* quid † 632. a.  
*Dentifricia præſcribendi ratio* \* 641. a.  
*Dentifricia varia* † 53. a. † \* 634. a.  
*Dentitio infantum difficilis* † 1090. a. \* 542. a.  
Ejus diagnoſis, prognofis, cura † 1091. a. b.  
\* 552. b.  
De *dentitione difficili* caſus & obſ. \* 406. b.  
*Dentitio notha infantum* † 1092. a.  
*Derivatio ſanguinis cui uſui* † 6. a. quid † 6. b.  
*Deſtillatio decoſtorum volatilium* \* 651. a.  
*Deſtillationum catarrhalium* prognofis † 681. b.  
*Deſtillatum inſtaurans eſt non - ens* \* 631. b.  
*Deſerſiva ulcerum* quæ \* 56. b. eorum gradus & proprietates. ibid.  
*Diabetes* qualis affectus † 646. b. nominis etymon † 647. a. Symptomata ibid. differentia & gradus ibid. Cauſæ † 647. b. unde tanta urinæ quantitas † 647. b. cur hæc materia in ſpecie per vias urinarias amandetur † 648. b. Diagnoſis, prognofis, cura † 649. a. b.  
*Διάβρωσις*, quid † 608. a. † 609. b.  
*Diacreta morſuli* \* 637. a.  
*Diacriſis* 10. b. ſq.  
*Diareſis* quid † 608. a. † 609. b.  
*Diata cardo ſobrietatis* \* 818. a.  
*Diata in variis morbis* \* 105. b. ſqq. vid. lactea diata.  
*Diata laſa* omnium maximè poſt morbos acutos ad chronicos diſponit \* 238. a. v. voracitas.  
*Diata febricitantium* † 254. a. ſqq.  
*Diata gravidarum* † 994. a.  
v. cibus, potus.  
*Diagnoſis morborum* † 2. b.  
unde petenda \* 78. a.  
in omni caſu reſolvendo neceſſaria \* 119. a.  
*Diaphoreſis & diareſis in multis conſpirant* \* 293. a.  
*Diaphoreſis requiſita*. 169. a. b.  
*Diaphoreſis uſus*. 168. a. b. ſqq.  
*Diaphoreſis largior quàm ratione corpora emaciat*. 70. a.  
Per *Diaphoreſin* tantum uno die maſſæ corporis decedit, quantum per alvum 15. diebus. 168. a.  
*Diaphoretica*, eorum compoſitiones. 912. b.  
quæ ſufficiunt. 892. a.  
*Diaphoreticorum uſus* † 251. b.  
uſus in hydrope † 435. b.  
uſus in pleuritide † 568. b.  
*Aceta Diaphoretica & Alexipharmica* 900. b.

*Diaphoretica virtus opii*. \* 554. a.  
*Pulveres diaphoretici*, eorum compoſitio. 903. a. b.  
*Diaphoreticum*. 896. b.  
*Diaphragma* mentis ſedes juxta veteres; ejus inflammatio † 586. a.  
*Diaphragmatis* abſentia in vivo homine \* 730. b.  
*Diaphragmatis* in reſpiratione motus, ejusque cauſæ \* 727. b. ſtructura, ſitus, nexus \* 725. b. \* 728. a.  
*Diaphragmatis* conſenſus cum cute \* 572. b.  
De *Diaphragmatis epileſia* caſus & obſ. \* 395. a.  
*Diaphragmatis* inflammatio † 561. a. ſqq. & palpitatio † 565. a.  
*Diaphragma* patiens in hepatis inflamm. \* 281. b. † 575. b.  
*Diaphragmatis* motus; imitatio in cardialgia \* 137. b.  
*Diaphragmatis* vulnus quat. lethale \* 35. b. \* 36. a. obſervatio notatu digna \* 36. a.  
*Διαφύλαξις* quid † 608. a.  
*Diarrhœa*, qualis affectus † 103. a. diverſitas & differ. † 103. a. b. contagioſa, morboſa; critica, ſymptomatica, colliquativa &c. † 104. a. periodica, bilioſa &c. † 104. b. Pars affecta † 104. b. cauſæ ejus † 105. a. Differentiarum fundamentum † 106. a. Signa Diagnostica & Prognofis † 106. b. Cura † 107. a. ſqq. axiomata circa hanc curam obſervanda † 108. a. an vini uſus prohibendus † 108. b. ex veneno ab amalia propinato curata 110. a. cura epidemice malignæ † 111. a. quid ſi à veneno hauſto † 110. a. † 111. a. artificialis, v. hypercathariſis cum catarrhoſi, ex metaſtaſi nimia &c. † 12. b. obſervanda in cura *diarrhœa* \* 144. a.  
De *diarrhœa* caſus & obſ. \* 340. b. \* 342. a. \* 346. a. \* 382. a. \* 384. a. \* 406. b. \* 435. b.  
*Diarrhœa* Criticæ & Symptomaticæ ſigna \* 247. a.  
*Diarrhœa colliquæſtiva* † 286. b.  
*Diarrhœa colliquativa* in febr. petech. mal. \* 246. a.  
*Diarrhœa* cruenta v. dysenteria.  
*Diarrhœa gravidarum*, cum prognofis & cura † 1001. a. b.  
*Diarrhœa infantum* cum cauſis, prognofis & cura † 1092. a. b.  
De *Diarrhœa infantis* caſus & obſ. \* 353. b. \* 370. a.  
*Diarrhœa* in inflamm. hepatis † 575. b.  
*Diarrhœa* in paralyſi bonum ſignum † 845. b.  
*Diarrhœa* in peſte cura † 377. b.  
*Diarrhœa ex philtro* † 110. a. v. venenum.  
*Diarrhœa puerperarum*, cum cura † 1042. b.  
De *Diarrhœa in purpura* caſus & obſ. \* 423. a.  
*Diarrhœa ſcorbutica* mendosa † 145. a.  
*Diarrhœa ſcorbutica* cura † 515. b.  
*Diarrhœa ſeroſa* cerebialis, nocturna ab errore externo \* 141. b.  
Conſultatio de *Diarrhœa bilioſa ſeroſa* \* 146. b.  
De *Diarrhœa torminoſa* cum metu dysentericæ † 340. b.  
De *Diarrhœa torminoſa*, caſus & obſ. \* 413. b.  
*Diarrhœa* cura in variol. & morbill. † 353. b. \* 257. b.



# INDEX UNIVERSALIS

- Diarrhoea spumosa* in variolis \* 253. b. \* 254. b  
v. alvi fluxus, dysenteria.
- Diastole* quid. 67. b. v. Systolæ.
- Diellamnus* Creticus, ejus differ. & usus. 440. b
- Dies decretorius* in febr. † 252. a
- Difficilia* in tyronum gratiam dilucidanda † 2. b
- Digestio* à quo fiat \* 128. a
- Digestionis ratio* variat in singulis animalium speciebus \* 825. a
- Digestio* multum facit ad chyli laudabilem constitutionem \* 825. a.
- Digestio* facilitata per acidum fermentum stom. † 40. a
- Digestio ventriculi* præst omnibus aliis digestionibus \* 110. b
- Digestio prima* est basis reliquarum † 648. a
- Digestio prima* varians crasin sanguinis \* 79. b  
est fundamentum totius œconomix vitalis \* 79. b
- Digestionis primæ* vel secundæ vitia † 7. a.  
† 90. b. † 121. b
- Digestio prima* vitiat contenta corporis, & vitatur ab iis \* 180. b
- Digestionis primæ* vitia non corriguntur in secunda \* 105. a
- Digestionis* errores quales committuntur. 124. a
- Senes edentuli difficiliter digerunt, quia non masticant. 51. b.
- Digestio mala* unde \* 142. a
- Digestio laza* \* 119. b
- Digestio erronea* tabis causa † 396. a
- Digestionis* vitia in febr. † 250. b
- Digestiva*, cor. compositio & usus. 165. b. sq. 876. a
- Digestiva* potio ante purgationem \* 640. b
- Digestiva* ulcerum quæ \* 56. b. \* 57. b.  
\* 58. a.
- Dille.** 387. a
- Διϋ* quid † 794. a.
- Dipsacus*, ejus usus. 441. a
- Dirigens* medicamenti compositi \* 627. a
- Discontentia* tumores olea, gummatave \* 24. b  
Unguenta discontentia cur ægrè ferantur à nostris. 866. b
- Distel** 441. a
- Unser Frauen, oder Marien, Distel.*  
409. a
- Distendens dolor* † 746. a. † 750. b.
- Distorsio.*  
Totus in membri distorsione \* 655. b
- Diuresis* & diaphoresis in multis conspirant \* 293. a.
- diuresis* & diuretica remedia quæ & cujus usus. 166. b. seq.
- Diuretica* † 3. a. † 5. a. † 629. a sqq.  
quæ? quotuplicia † 22. a.  
eorum Compositio. 950. b
- Diureticorum* virtutes \* 293. a  
eorum usus in calculo † 641. b. † 646. a  
usus in delirio melanchol. † 873. b  
usus in hydropse † 431. b. † 435. b.  
usus in obesitate \* 833. b  
usus in rabie & hydrophobia † 890. a  
usus in Scorbuto & malo hypoch. † 489. b
- Oxymel diureticum* laxativum \* 651. a
- Potio diuretica* \* 640. b.
- Doflis* foriter olentia non semper conveniunt † 384. a
- Dolor* qualis affectus, † 743. a. ejus causa † 744. a.  
Differentiæ † 744. b. recidiva † 744. b. an sit causa tumoris, vel vice versa † 745. a. Diagnostis, prognostis, cura † 746. b
- Doloris* subjectum quod \* 289. a
- Doloris* varietas † 156. b
- Dolor* quoties urget, toties intenditur calor \* 157. b.
- Doloris* comes convulsiva partium contractura \* 289. b.
- De doloribus vagis casus & observ. \* 355. a
- Dolores insigniores & diuturniores partium plerumque comitem habent febrem Symptom. † 310. b.
- Contra dolores emplastrum \* 658. b
- Dolores febriles unde † 249. b
- Doloris* tensivi gravidarum cura † 1005. b
- Dolor* inflammationum † 535. b.
- Dolores intestinorum, &c. v. intestinorum &c. dolores.
- Dolores varii in lue Gallica † 455. b.
- Dolorum à lue venerea cura † 475. b
- De dolore & tumore Mammæ casus & observatio \* 347. a
- Dolores parturientium, v. parturientes, partus.
- Dolores veri ad partum attendendi in aquæ ex utero effluxu † 1006. b
- Doloris* in & post partum differentia \* 328. a
- Dolor* in pleuritiæ vera \* 276. a. sqq.
- Dolores Scorbuticorum † 483. b
- Dolores Scorbutici artuum \* 359. b
- Dolores vulnerum curandi ratio \* 53. a
- Domus* purgatio in peste † 365. a
- Dormire*, quid † 702. a
- Doronicum*, ejus differ. præparata & usus 441. a
- Dorsi* structura \* 335. a
- Dorso* incumbendum non est in somno \* 199. b
- Dorsi* dolores ex cardialgia † 82. b
- Dorsi* dolor scorbuticus † 159. b
- Dorsi* vertebræ v. vertebræ dorsi.
- Dosis* medicamentorum \* 625. b. \* 627. b
- Dosis* decoctorum purgantium \* 649. b
- Dosten.** 498. b
- Docter. Blume.** 406. a
- Draco mitigatus* \* 846. a
- Drebelliani* remedii virtutes \* 79. a
- Droprax* quid &c. \* 662. b
- Ducati* qui optimi. 926. b
- Ductus* epatici, cholodochi &c. v. hepatic. s. cholodoch. &c. ductus.
- Ductus* thoracicus v. thoracicus ductus.
- Dualech* Paracelli quid † 632. a
- Dürrewurg.** 430. b.
- Dulcedo* in sensu Hippocratico considerata \* 518. a
- Dulcium* in stomacho alteratio \* 130. b
- Dulcia* acidum augent † 7. a
- Dulcia* bilem gignentia \* 152. b
- Dulcia* aquat. noceant in Col. convuls. \* 180. b.
- Dulcium* usus an gravidis conducatur † 995. a
- Dulcia* passionem hystericam conciliantia † 964. b
- Dulcium* usus in phthisi † 401. b
- Dura matris* constitutio † 760. b
- Durchwachs** 502. a.
- Duritia* v. vocalescentia.
- Durities* abdominis v. abdomen.
- Dumviracini* Helmontii † 82. a

*Dysen.*

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

**Dysenteria** † 108. b. ejus tres gradus, juxta veteres  
† 123. a. Pars affecta & Causæ 123. b. divisio  
† 124. a. seq. brutis & hominibus communis est  
† 125. a. exempla epidemica † 125. a. Progres-  
sus ejus † 125. b. differentia † 125. a. b. Unde  
muci tanta copia † 125. b. tormina & dolor un-  
de † 123. b. sqq. † 126. b. tres gradus in hac ob-  
servandi † 126. a. pulvis abrasio triplex † 126. a.  
An tunc exulceratio adsit † 126. b. Diagnofis  
† 126. b. Symptomata ibid. sq. caularum signa  
† 127. a. An maligna & pestilens sit, unde pa-  
tescat † 127. a. an tenuia, an crassa intestina  
afficiat, signa † 127. a. Prognofis † 127. a. Cu-  
ra & methodus medendi † 128. a. Signum ma-  
li remittentis † 129. a. frigus & frigida vitan-  
da † 131. a. Quieti sint ægri † 131. a. Quid si  
mitigatum fuerit malum † 136. b. cura sympa-  
thetica † 138. a.  
**Dysenteriam periculis facientia symptoma-  
ta** duo \* 157. a.  
**De Dysenteria casus & observ.** \* 384. a. b.  
\* 395. a. \* 406. b. \* 410. a. \* 425. b. sqq.  
**De dysenteria metu in diarrhoea torminosa ca-  
sus & obs.** \* 340. b.  
**Consultatio de dysenteria benigna** \* 156. b.  
**Dysenteria maligna cum vomitu s. febris, peri-  
culosa** \* 157. a  
**Consultatio de dysenteria maligna** \* 160. b.  
**Dysenteria gravidarum** † 1001. b  
**Dysenteria scorbutica cura** † 515. b  
**Dysenteria variolis superveniens, funesta**  
\* 158. a  
**Dysenteria in variol. & morbill. cura** † 157. a  
**Clyfina anodynum anti-dysentericum** \* 660. a  
**Decoctum ad dysenteriam** \* 650. a  
**Electuar. contra dysenteriam** \* 635. b  
**Potio anti-dysenterica** \* 640. a  
**Sacculus contra dysenteriam** \* 655. b  
v. alvi fluxus.  
**Dysenterica ulcera quæ, & eorum cura.** \* 63. b  
Epithema ad ulcera dysenterica \* 642. a  
**Dyspnœa qualis affectus &c.** \* 193. b  
**De Dyspnœa casus & obs.** \* 346. b  
**Dyspnœa Scorbutic. cura** † 515. a  
**Dysuria qualis affectus, ejus differ. à stranguria**  
† 671. a. Causæ † 671. a. b. Diagnofis,  
Prognofis, cura † 672. a. b.  
**De dysuria casus & observ.** \* 354. b  
**De Dysuria ex vino, casus & obs.** \* 435. a  
**De Dysuria scorbutica casus & observat.**  
\* 390. b

## E.

**Ebenus**, cujus usus. 441. b  
**Eberwurzel.** 409. a  
**Ebischbeer.** 547. a  
**Ebullitioni humorum non præcipitatio opponenda,**  
sed nuda attemperatio \* 585. a  
**Ebulus** ejus præparata & usus 621. b  
Ebuli usus vomitorius † 11. a  
Ebuli Cortex & ejus ulus 874. b  
**Ebrietas** considerata \* 809. a. sqq.  
Ebrioforum actiones, hilaritas, somnus, tor-  
por loquacitas &c. \* 814. a. † 869. b  
Ebrioforum circumgyratio † 794. a  
Ebriorum mania naturalis † 878. b  
Ebrietatem inducentia \* 813. a

Ebrietatem & inde obvenientia mala præca-  
ventia \* 293. a  
Ebrietatem discutientia † 717. a  
Ebrietatem contra Epithema. 137. b. v. Te-  
mulentia.  
**Ecchymoma**, ejusque causa \* 11. b. cura \* 12. a.  
sqq.  
Ecchymomata à sanguine constituta † 600. a  
**Eclegmata**, eorum compositio & usus 835. b  
Eclegmata ferè sunt inusitata \* 631. b.  
**Eclipsis effectus** 440. a. \* 444. a  
Eclipsis lunaris concursus in epilepsia  
\* 785. a  
**Eclasis ex delirio** † 856. a  
Ecstaticorum actiones \* 722. a  
Ecstatis catalepticorum † 717. a  
**Edaciora** cur simus sub frigoribus & aere purio-  
ri & in freto navigantes &c. \* 746. a.  
\* 827. a  
**Effervescencia** quid. 18. b. unde 15. b. 18. a.  
\* 180. a  
**Effervescencia** affinitas cum fermentatione  
\* 81. b. \* 83. a. differentia 252. a  
**Effervescencia** cum fermentatione non confun-  
denda \* 485. a  
**Effervescencia** non fit in corpore nostro in statu  
naturali \* 129. b  
**Effervescencia humorum non præcipitatio,**  
sed nuda attemperatio opponenda \* 585. a  
**Effluvia** non videntur, sensibus tamen aliis perci-  
piuntur & verè existunt \* 793. b  
**Effluviarum copia** è corporibus eorumque  
contagioni \* 805. a  
**Effluvia contagiosa sunt naturæ alcalicæ vola-  
tilis causæ.** 367. a. b v. Contagium.  
**Ehrenpreis.** 559. a  
**Eibischkraut.** 384. a.  
**Einbeerkraut** 501. a  
**Einprägungen.** \* 661. a. b  
**Einstreupulver.** \* 633. b  
**Eisenbüchsen.** 489. b  
**Eisenkraut.** 558. a  
**Εισπνοή** \* 721. a  
**Εκπνευστις** \* 721. a  
**Εκπνοή** \* 721. a  
**Εκπολή** quid? † 1010. a  
**Εκστρομα** quid? † 1010. a  
**Elastica copula Willisii** † 27. a  
Elastica vis effervescencia spir. \* 180. a  
**Elaterium** 334. b  
quid, ejus præparata & usus 637. b. 873. b  
**Electrum** minerale immaturum quid. 869. a  
**Electuaria**, eorum differentia, compositio & usus.  
845. b. -- 849.  
Electuarium quid, ejus præscribendi modus  
\* 634. b. \* 650. a  
Electuaria parum curat medicus \* 631. b  
quæ sufficiunt. 862. b  
Electuaria solida \* 636. b  
**Elementa** quid sint, 5. b.  
Elementa juxta Peripateticos. 4. a. seqq. 6. a. b.  
seqq.  
Elementorum quatuor commentum \* 511. a  
Elementorum quatuor qualitates rejectæ † 3. a  
Elementalium qualitatum correctio Hippo-  
cratica \* 511. a  
Elementaria tanquam principia mundi suppo-  
sita \* 740. b

# INDEX UNIVERSALIS

- Elemi*, ejus præparata & usus 581. a  
*Eleofaccharum*, ejus compositio. 843. b  
*Eleofaccharorum* usus \* 636. b  
*Elephantiasis Arabum* † 522. a. ejus cura † 524. b  
*Græcorum*, v. lepra.  
*Elephas* cujus usus in Medicina a. 664. a.  
**Elephanten-Laus**. 386. a  
*Elixiria*, ea parandi modus. 828. b  
*Elixir arboris vitæ* † 5. a.  
*Elixir proprietatis* 326. b. sq.  
*Elixir proprietatis* quat. omnes corporis putredines arcet \* 44. b  
*Elixir proprietatis Paracelsi & Helmontii* ejusque adhibitio \* 131. b  
*Elleborus albus*, ejus præparata & usus. 625. b  
*niger*, ejus differ. præparata & usus 622. a  
*Elodes febris* unde dicatur † 250. a. † 288. a  
*Emaciatio* † 286. a. † 287. b. † 304. a.  
*Emaciantia* remedia † 414. b.  
*Embryonis* formatio † 990. a.  
*Emetica* potiora † 10. a  
*Emetico-catharticum* extemporaneum. 891. b.  
*Emeticus bolus* \* 634. a. v. vomitorium.  
*Emeticum* infusum \* 648. a.  
*Oxyfaccharum emeticum*. 888. a.  
*Potio emetica* \* 640. a.  
*Vinum emeticum*. 888. b  
v. vomitus.  
*Emollientia* † 4. a  
*Emollientia* tumores olea & gummata \* 24. b  
*Empirica secta* Medicinæ antiquissima 32. a. ejus affectus, ibid.  
*Empirica secta* avaritia & invidia \* 677. b  
*Empiricus* quis \* 668. a  
*Empiricus* cur interdum melius curet Medico. † 1. a. \* 78. a.  
*Emplastra*, eorumque compositio 849. a. 851. b  
*Emplastra* ex volatiliore materia constare debent. \* 665. b.  
*Emplastrorum* præscribendi ratio \* 662. b. \* 664. a  
*Emplastra* cur quidam ferre non possunt \* 124. b.  
*Emplastra* ulcerum sunt solummodò instar operculi \* 57. b  
*Emplastrum Saturninum* pro usu externo vario \* 664. b. v. cataplasma.  
*Εμπροσθεν* \* 721. a  
*Empyothotonos* quid † 802. a. b  
*Empyema* qualis affectus † 599. b. ejus causæ & diagnosi † 600. a. b. origo & differ. ab apoplemate s. vomica † 600. a. thoracis † 601. b. Prognosis & cura † 602. a. b. sqq.  
*De Empyemate* casus & observ. \* 363. a.  
*Empyematici* ut plurimum sunt asthinatici † 195. a  
*Empyreuma*, v. ambustio.  
*Emulsionum* præscribendarum ratio & formulæ \* 644. b.  
*Emulsionum* ex hordeo præscriptio \* 652. a  
*Observanda* circa *emulsionum* usum \* 645. a  
*Emulsionibus* cognatæ misturæ quæd. \* 645. a  
*Emulsiones* improprie sic dictæ \* 644. b.  
*Emulsionum* usus in febr. † 301. b  
*Emungentium* usus in scorbuto † 493. b  
*Endivia*, ejus præparata & usus. 442. a  
*Enemata*, v. injectiones.  
*Enematica nova*, \* 479. a  
**Engbrüstigkeit** † 81. a  
*Engelsüß* 630. b  
*Engelwurz*. 387. b  
*Ens* in potentia, non est ens reale \* 446. b.  
*Enterocoele* † 172. b. sq. v. Hernia.  
*Entitates* qualitarum, vid. attributum.  
**Enzian**. 454. a  
**Engündungen**. † 335. b  
*Epar* v. hepar.  
*Epatica* nobilis ejus præparata & usus. 442. b.  
*Epatica stellata*, ejus præparata & usus. 442. b.  
*Ephedra*, earum pars affecta, causæ, prognosis, cura † 528. b  
*Εφαλδω* quid † 584. a  
*Ephemera febris*, v. Febris ephemera.  
*Ephialtes*, v. Incubus.  
**Epheu**. 459. b  
*Epiata febris*, v. Febris Epiala.  
*Epicuri* dogmata & fundamenta \* 512. a.  
*Epidemici* & contagiosi quomodo morbi fiant † 320. b.  
*Epidemica* infectionis signa diagnost. \* 245. a  
*Epidemica* pestis quomodo fiat † 359. a  
*Epidymidum* tumor † 907. a  
*Epiolotidis* suffocatio ex mica panis, guttula &c. † 237. a.  
*Epilepsia* etymologia & homonymia \* 779. a. b  
*Synonymia* \* 780. a  
*Definitio* \* 780. a  
*Subjectum* s. pars affecta \* 780. b.  
*Causa* \* 113. b. \* 781. a. sqq. \* 785. a  
*Symptomatum* consideratio \* 784. a  
*Epilepsia* in pollice, pede \* 784. b  
*Habet aliquid* divini in recessu, & pertinet inter morbos occultarum qualitarum \* 785. b  
*Nati* in celsi lunari huic morbo obnoxii \* 785. a  
*Differentia* & divisio \* 113. b. varia \* 785. b  
*Dæmoniis* præstigiis inducta \* 785. b  
*Ejus* tres gradus \* 786. a  
*Signa* diagnostica & Prognostica \* 786. a.  
*Cura* ejus \* 786. b. sqq.  
*Præservatoria* curatio \* 787. a  
*Transplantatio* \* 788. a  
*Epilepsia & Convulsio clonica* qualis affectus † 802. b. ejus gradus † 803. a. differentia † 803. b. 809. a. divisio † 804. a. Causa † 804. b. partes, quarum consensu oriuntur † 807. a. Symptomata † 808. b. Diagnosi † 809. a. Prognosis † 840. b. Cura † 811. a.  
*Epilepsia* quomodo diff. ab apoplexia † 838. a  
*De Epilepsia* casus & obs. \* 343. b. \* 344. a. \* 352. b. \* 360. b. \* 370. b. \* 375. a. \* 406. b. \* 417. a.  
*Antiepileptica* † 4. b  
*Infusionis* usus in *epilepsia* \* 499. a.  
*Epilepsia* conveniens sulphur ex scoriis Antimonii, \* 80. a.  
*Specificum* antiepilepticum 910. b  
*Epilepticis* parum conducit sangu. Transfusio \* 112. b. Sanguinis humani haustus an eos curet, ibid. Remedia ex sanguine humano decollati antiepileptica \* 112. b.  
*Epilepticis* sternutatoria non conveniunt, sed errhina † 217. b  
*Epilepsia* ex cachexia muliebri cura † 962. b  
*Consul.*



## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Consultatio de *epilepsia* à capitis contusione \* 300. b  
*Epilepsia* ex colica † 161. b  
*Epilepsia* juncta colicæ convulsivæ habituali \* 177. b  
De *Epilepsia* diaphragmatis casus & observ. \* 195. a  
*Epilepsia* cursiva † 803. a  
Consultatio de *Epilepsia* habituali \* 296. a. b  
*Epilepsia* infantum cum causa † 1088. a. b. \* 544. a. Diagnos. Prognosis, cura † 1089. a. b. \* 552. a.  
De *Epilepsia* infantis casus & observ. \* 353. b. \* 358. b. \* 363. b  
Contra *Epilepsiam* infantum ex consensu abdominis pulvis \* 632. b  
De *epilepsia* ex percussione \* 356. b  
De *Epilepsia* pueri casus & observ. \* 360. b  
*Epileptici* insultus in partu laboriosiore † 1016.  
*Epileptici* insultus puerperarum, cum cura † 1040. a. b  
*Epilepsia* rotatoria † 803. b  
De *Epilepsia* scorbutica casus & obs. \* 427. a  
*Epileptici* insultus ex splenis vitio \* 317. b  
*Epilepsiam* comitans syncope † 389. a  
De *epilepsia* ex terrore casus & obs. \* 356. b  
*Epilepsia* frequens in variolis & morbillis † 348. a. sq. \* 254. a. cura \* 257. b. † 353. b  
*Epilepsia* in actu venereo † 802. b v. convulsio.  
*Epinyctides* † 526. a  
*Epiphora* ejusque causæ † 588. a. † 589. b. Diagnos. Prognosis, cura † 593. a. † 596. a  
*Epiphora* catarrhi species † 679. b  
De *Epiphora*, casus & obs. \* 437. a.  
*Epiplocele* *Epiplo-enterocele* † 172. b. sq. v. *Hernia*.  
*Epiplocele* cum *Cirfocele* \* 185. a  
*Epiplocele* inguinalis & scrotalis \* 185. a  
*Epithemata* quid. \* 632. a.  
eorum compositio & usus. 834. b. \* 639. b. \* 642. a  
*Epithematum* formulæ quomodo præscribenda \* 639. b \* 641. a. \* 642. a  
*Epithemata*, decocta præscribendi ratio \* 654. a  
*Epithemata* ex fermento, & notanda circa ea \* 659. a  
*Epithymum*, ejus usus. 626. a  
*Ëppich; Wasser; Ëppich.* 190. a  
*Epulotica* vulnerum quæ \* 44. a. ulcerum \* 57. b  
*Equini simi* usus in forma cataplasm. \* 658. b  
*Equisetum*, ejus præparata & usus. 443. a.  
*Equitando* agitatio abortus causa † 1011. a  
*Equus* cujus usus in medicina 664. b  
Equorum remedium antimon. crudum \* 299. b  
Equus Marinus cujus usus in Medicina 665. b  
*Ërd-Äpfel.* 437. a  
*Ërdbeertraut.* 450. a.  
*Ërdtraut.* 452. b  
*Ërdpinee.* 416. a  
*Erimaceni* cujus usus in medicina. 666. a  
Errare malamus, quam cum aliis verum dicere \* 841. a  
*Errhina* quid \* 632. a  
*Errhina* præscribendi ratio \* 641. a  
*Errhinorum* usus in affectib. oculor. † 721. b  
*Eryna*, planta \* 449. a.  
Ejus præparata & usus. 443. b  
*Eruclatio*, & ejus cura † 65. b  
*Eryngium*, ejus præparata & usus. 444. a  
*Erysimon*, ejus præparata & usus 444. a.  
*Erysipelata* ex stagnatione humoris morbosa † 3. a.  
*Erysipelatis* causæ, Diagnos. \* 13. b. diversa denominatio \* 13. b. Prognosis, \* 14. a. cura ibid. sqq. quid si male curatum exulceretur \* 15. b. quomodo præcaveatur \* 15. b. quid si intensus adest ardor & dolor. 15. a  
Decoctum ad *Erysipelata* &c. \* 654. b  
*Erysipelatodes* pulvis 999. b. \* 633. b  
*Erysipelatis* capitis & faciei cura, \* 15. b  
*Erysipelaceæ* febres † 244. b  
*Erysipelas* Mammarum † 1056. a  
De *Erysipellate* Mammarum caput & observatio \* 352. a  
*Erysipelas* scorbutic. cum cura † 517. a  
De *Erysipellate* scorbutic. casus & obs. \* 373. b  
*Erysipelas* vulnerum \* 52. b. in fractura ossium \* 71. a  
*Eschara* in ambustionibus separatio \* 66. a. b.  
*Eschara* clavorum quomodo tractanda \* 31. b  
*Escharæ* cura in hydrope † 437. b  
*Escharæ* prognos. in peste † 362. a  
*Escharæ* pestilentialis cura † 374. b  
*Escharonica* v. cauteria gangræna.  
*Ëschbaum.* 450. a  
*Ëssentia quinta*, ejus Compositio 865. b.  
*Ëssentiarum* extractio ex lignis resinosa \* 562. a  
*Ësseres* † 526. a.  
*Ësserodes* febris unde dicatur † 250. a  
*Esula*, ejus præparata & usus. 626. b. 874. a  
*Esus* post iram atrophiam inducens † 395. b.  
*Evacuantiæ* † 5. a. † 10. a.  
*Evacuantiæ* usus in scorbuto † 494. a  
usus in febr. † 253. a. v. *Purgantiæ*.  
*Evacuatio* in corpore contingit varia. 45. a. 46. a.  
*Evacuationes* Symptomaticæ &c. † 252. a.  
*Evaporationes* differ. a flatibus † 46. a  
*Eventus* per astra præsignificati \* 545. b.  
*Eunuchi* infœcundi, salaces tamen adhuc † 953. b  
*Eupatorium*, unde dictum, ejus præparata & usus. 444. b  
*Euphorbium*, ejus præparata & usus. 638. a. 873. a.  
*Euphrasia*, *Euphrasia*, ejus præparata & usus. 445. a  
*Exanthemata* in peste † 360. b. † 362. a.  
*Excitatio* spirituum in apoplexia aliter, aliter in epilepsia tentanda † 818. a  
*Excoriatio* manuum & pedum in lue Gallica, † 456. a  
Pulvis ad varias externas excoriationes \* 633. b  
*Excrementorum* consideratio \* 239. a  
*Excrementa* qua ratione sanitatis vel morbi causa. 122. a.  
*Excrementorum* fieri & nocendi modus. 128. a. b. seqq.  
*Excrementorum* odor, sapor, color varians, \* 151. b  
*Excrementorum* Purgatione excretorum varietas. vid. *Purgatio*.  
De *Excrementorum* fœtore cur tam solliciti medici \* 153. b  
*Excrementa* quædam benigna, quædam inutilia \* 714. a  
*Excrementorum* Prognosis in Diarrhœa † 107. a  
*Excrementa* in stomacho stabulantia † 83. a  
h  
Excre-

# INDEX UNIVERSALIS

Excrementa proliciens opium \* 565. a  
 Excrementorum examen in cholera † 115. a.  
 v. stercus.  
 Fœtida alvi excrementa rejecta in febribus  
 malignis cur malum signum. 364. a  
 Excrementorum fœtus retentio † 1064. a  
 Excrementa fœtus ante ejus exclusionem pro-  
 deuntes ex utero quid signent † 1063. b  
 Excrementa viridia infantum &c. † 1075. b.  
 Excrementorum regurgitatio in obstruct. alvi  
 \* 140. a  
 Excrementorum consideratio in variolis \* 253.  
 b. sq. v. alvus, intestina, feces &c.  
*Excrementarum* genesis † 28. a. variaz appellation-  
 nes, causa, prognosis, cura chirurg. \* 29. a.  
 sqq.  
 Excrementas tollens † 387. a. \* 5. b  
 Excrementia ex loco dentis evulli curata  
 \* 28. b  
 Excrementiz verrucales cordis &c. † 380. b  
 Excrementiz carnosæ testium † 906. b  
*Excreta* hypochondriacorum † 481. b  
 Excreta infantum naturalia \* 528. a  
 Excreta alvi varia unde in infantibus \* 536. a.  
 cura \* 548. a  
 Excretorum sive per os sive per alvum triplex  
 differ. \* 153. a  
*Excretiones* cutaneæ in febr. mal. † 327. b. sqq.  
 v. sudor &c.  
 Excretiones Symptomaticæ, &c. & medici offi-  
 cium hic † 252. a  
 Excretiones nondum perfectè digestorum &  
 alteratorum † 648. b  
 v. feces, alvi Expulsiō.  
*Excretoria* vasa in corpore \* 560. a  
*Exempla* constituunt experientiam † 28. b  
*Exercitium corporis* ad maciem disponit \* 832. a  
 Exercitatio nimia corporis abortus causa  
 † 1011. a.  
 Exercitia nimia sanguinem attenuantia † 239. b  
 Exercitiis nimis dediti, hæmorrhagiis obno-  
 xii † 608. b  
*Exhalationes* activæ quid sunt \* 795. b  
 Exhalationes pestilenciales † 359. b  
 v. gas.  
*Exostosis* ubi; casus & obs. \* 400. b  
*Exotica* remedia. vid. Remedia.  
*Expectorantia* † 4. a  
 Expectorantium usus in plenitudo † 569. a  
*Expectoratio* pituitæ † 203. b  
 Expectoratio in tussi † 226. b  
*Experientiam* constituunt exempla † 28. b  
 Experientia fallax, non penitus falsa \* 841. a  
 Experientia è medicina non statim rejicienda  
 etsi ratio desit \* 845. a. rerum magistra  
 naturalium ibid.  
*Experimenta* idiota quilibet jactat \* 679. a. b.  
 \* 845. a  
 Experimentorum defectus in medicina pra-  
 ctica vulgari † 1. a. \* 78. a  
 Eorum observatio in praxi necessaria † 2. b  
 Experimentorum inventor an præcisè medicus  
 \* 672. b  
*Explosio tormentorum* in peste † 364. a  
*Expressa* s. succi, eorum parandi modus 823. a. b  
*Expulsiō* excretionum retro pulsarum \* 126. b  
 Exsecratio in tussi † 226. a  
 Exsiccatum decoctum \* 653. a

Exsiccantia in obesitate \* 833. a  
*Exspiratio* quid? \* 722. b. Principia \* 723. a  
 Quomodo fiat. 70. b  
 Expirationis læzæ vitia † 216. a  
 Expiratio impedita putredinem promoret.  
 366. b  
 Expirationis libertas in Vegetabilibus putre-  
 dinem arcet 366. b  
*Extensio* & expansio mira minimorum corpuscu-  
 lorum \* 803. a  
*Extractio* & solutio Chymica quomodo differunt.  
 260. b  
*Extracta* liquida, ea parandi modus. 824. a.  
 828. a  
 Extracta quæ sufficiunt. 863. b  
*Extravasatio* liquoris ex vasis ruptis † 181. b  
*Exulcerationis* fundamentum \* 108. b  
 Exulcerationibus partium nil confert Chirur-  
 gia transfusoria \* 108. a. v. Ulcus.  
 Decoctum ad exulcerationes humiditas in me-  
 tu gangrenæ \* 654. b

## F.

*Fabe*, earum præparata & usus. 445. b  
*Fabaria* ejus præparata & usus. 446. a  
*Facies decoloratio* ob impeditum motum sangu. &c.  
 \* 189. a  
 Facies Hippocratica † 287. b  
 Facies Hypocratica in Hæctica febr. † 314. a  
 Faciei nigredo † 530. a  
 Faciei pallor & tumor in cachexia \* 273. a  
 Faciei paralytis, convulsio canina s. spasmus  
 cynicus † 845. a  
 Faciei spasmus † 47. b  
 Facies variolis morbillisve obsessa † 354. b  
*Färber, Baum.* 520. b  
*Färber, Gerst.* 453. b  
*Färber, Pfriem.* 453. b  
*Färber, Röthe.* 525. a  
*Facultas animalis* v. Animalis facultas.  
 Facultatum Hippocraticarum ad Hygienam  
 & therapie applicationem † 518. b  
 Facultates ministræ quomodo explicandæ.  
 48. b  
*Fallende Suche* / \* 780. a  
 vid. Schwere Noth / Epilepsia.  
*Fames* unde oriatur. 49. a. b  
 Fames læta † 28. a  
 Fames febricitantium unde \* 142. a  
 Fames ex frigore hyberno \* 175. a  
 Fames pellem inducens † 359. b  
 v. inedia.  
*Familie* aliæ corpulentos, aliæ proceros, aliæ mino-  
 res progengerantes, quare \* 826. b  
*Farina* fermentatio \* 84. b  
 Farinacea egregiè nutriunt \* 817. b  
*Farren, Braut.* 448. a  
*Fascia* ulus in colica convuls. \* 181. b  
 Fasciarum s. ligaturarum usus in vulneribus  
 itemque varietas \* 43. a. fasciationum ratio  
 in luxatione ossium \* 68. a  
*Fascinatio* infantum cum cura † 1105. a. b  
 Fascini imaginatio melancholicæ † 870. b  
 Fascinatio noviter nuptorum &c. † 917. a. † 919. b  
 v. veneficium, incantatio.  
*Fasidium* ciborum est vel nativum vel adveni-  
 tium &c. † 34. b

Con-

## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Consultatio de fastidio cibi \* 121. a  
Fastidium ciborum tollens † 32. a. v. Nausea.  
*Fatiscens* acetum unde \* 84. b  
*Fatuitas* unde † 850. b. † 852. a  
Fatuitas epilepticorum † 810. a  
Fatuitas ex epilepsia habituali \* 298. b  
*Fatuorum* restitutio † 875. b  
Fatuorum salus, anagallis † 882. b  
*Fauces* aridæ in febr. mal. \* 245. b. † 338. a  
Fauces aridæ in tertiana mal. \* 206. b  
Fauces siccae & aridæ in febr. acut. † 302. a.  
In faucium asperitate gargar. \* 661. a  
Rotulæ contra faucium alperitatem, phlogosin. &c. \* 636. a  
Faucibus dolentibus an gargarism. utendum \* 200. b  
Faucium excoariatio in febr. catarrh. † 306. a  
Faucium excoariatio, inflamm. &c. in tussi; cura † 235. b  
Faucium glutinositas in febr. lymphat. \* 233. b  
Faucium inflammatio, † 538. a. ejus causæ, † 539. a. Diagnos. Prognosis † 540. a. Symptomata ibid. Prognosis † 540. b. Cura † 542. a  
In faucium inflamm. gargarism. \* 660. a. b.  
Faucium suppurationis cura † 547. b  
Faucium tumores discutienda † 547. a  
Decoctum in faucium tumoribus &c. \* 651. a  
Faucium defensio in variol. &c. † 356. b  
Faucium ulcra scorbutica † 505. b  
v. Palatum.  
*Favi infantum* cum causa, prognosi, cura † 346. a. † 1097. b. sqq.  
*Febris ingenerare vocis* etymon, definitio † 243. a. omnibus ferè morbis se sociat ibid. intricata ejus theoria ibid. Symptomata, pulsus mutatio † 243. a. æstus † 244. a. caloris differ. † 246. a. an calor ille à bile † 246. a. frigus, horror & rigor † 246. a  
Symptomata in febribus unde \* 202. a  
Febrium horrores & rigores unde \* 572. b  
Essentia & ratio formalis febrium † 248. a. putredo in iis veterum † 248. b. Subiectum primarium † 248. b. 249. a. dolor unde † 249. b. divisio & differentia earum † 244. a. b. † 250. a. differ. foci & fomitis febrilis & receptaculi producti morborum † 249. b. sq. accidentales differ. unde † 250. a.  
Febrium triplex differ. & duplex subiectum \* 101. a. causæ † 249. a. † 250. a  
Archei sub febribus dominium \* 201. b  
Febrium Varietas unde 333. b. Urinæ qualitates † 245. a. † 247. a. crisis coctionis & eruditatis, malsæ sangu. fermentatio † 247. a. b. Signa diagnostica & prognostica † 249. a. † 251. a  
Febris insignis citra anxietatem cordis minus est periculosa, quam cordis anxietates citra insignem febrem † 362. b. cura † 251. b. sqq. quid si natura peccet, medico agendum † 252. a. decretorius dies in febribus † 251.  
Victus febricitantium & Potus † 254. b. sqq. recidiva ex mala dieta † 248. quot paroxysmi intermittentes, tot febres qs. particulares sunt † 247. b. fermenti febrilis natale solum, conditio † 249. b. 250. b.  
Febris mutatio in aliam & complicatio † 250. b.  
In febrium cura nullus sanguinis transustionis locus \* 101. b. legitima earum cura in quo consistat \* 101. b.  
Febrium curandarum methodus. 138. b.  
Febrium cura tam à natura quam Medico ritè instituenda. 232.  
Febrilis fermenti correctio \* 249. a  
Febrifuga † 4. a.  
Remedia febrifuga quæ & eorum operandi modus. 232. sq.  
Febrifuga catholica † 279. b.  
Febrifuga Mixtura. 859. b.  
Bolus diaphoreticus anti-febrilis \* 634. a  
In febribus decoctum \* 650. b  
Febris nulla soluta tuta est, nisi sudor universalis supervenerit \* 240. a  
In febrib. acida & vinum nocent † 244. a. † 245. a  
Febris pipere curata casus & obs. \* 435. a  
Anti-Febriles pulveres, eorum compositio. 904. b  
Febrilis pulvis laxativus \* 632. b.  
Subordinatio specificorum in febr. \* 205. b. usus ibid.  
De febr. male curata casus & observ. \* 386. b  
Febris die natali quotannis affligens † 255. b  
Febres anniversariæ † 255. b.  
Febres acutæ earum diagnosi † 290. a. Prognosis 291. a. crisis † 291. b. Cura † 292. b. earum recidivæ, & mutatio in chronicas ex largiore victu † 296. b. Cura symptomatum † 297. b. † 300. b.  
Febrium acutarum differ. \* 213. a.  
De febr. acuta, casus & observatio \* 386. b  
Febres acutæ primariæ † 282. b  
Febres acutæ symptomaticæ, s. secundariæ † 303. b  
Febr. acutæ superveniens icterus \* 106. a.  
Febribus acutis cum inflammationibus utilis infusio \* 507. b  
Potio analeptica sub & post sudorem in febr. acutis \* 640. b  
Febres acutæ v. acuti morbi  
*Febris alba* virginum † 958. a.  
*Febris anxiosa* † 288. b  
*Febres ardentes* earumque causæ † 282. b. † 285. a  
Venenum in febr. ardenti cujus naturæ \* 130. b  
De febr. ardente casus & observatio. \* 375. a \* 404. b  
De febre ardente infantis casus & observatio \* 347. b. \* 370. a  
De febre ardente pueri cas. & obs. \* 354. a. \* 360. a  
De febr. ardente aucta, casus & obs. \* 360. b  
De febr. continua ardente Periodica consultatio \* 218. a. Prognosis & cura \* 220. a. b  
Febrim ardentem repellentia † 8. a  
*Febris in arthritide vaga* \* 429. a  
*Febris affodes*, † 288. b  
*Febris cacatoria* † 286. b  
*Febrim castrensem* juvat raninarum sectio † 301. a  
*Febris catarrhalis* quæ † 679. b. † 304. b. ejus causæ, Diagnos. Prognosis, cura, † 244. b. † 685. b. † 305. a. b.  
De febr. catarrhali casus & observ. \* 350. a \* 352. b. \* 373. a. \* 398. b. \* 423. b.  
De febre catarrhali consultatio \* 221. b.  
Febres & morbi catarrhales epidemici; consultatio \* 224. b.  
De febre catarrhali pueri casus & obs. \* 363. b  
*Febris cum cephal.* ex affectu stomacho \* 133. b.



# INDEX UNIVERSALIS

- Febris chronica* † 262. a. † 266. b  
 Pilulæ febriles in chronicis contra æstum  
 \* 639. a  
*Febres colliquativa* † 286. a. earum pars affecta  
 † 286. b. Causæ † 286. b. cura † 303. a  
*Febres contagiosa malignæ* \* 102. b.  
*Febres continua* † 281. b. continuæ acutæ † 282.  
 Februm continuarum differentia \* 232. b.  
 Febr. continuarum divisio † 250. a  
 Febres continuæ composita † 283. a  
 Consultatio de febre continua ardente ex ira-  
 cundia \* 213. b  
 Febres continuæ cum Prunella † 286. a. ea-  
 rum cura † 301. b  
 De febre continua ardente casus & observatio.  
 \* 394. b  
 De febre continua lenta consultatio \* 232. b  
 Febres continuæ benignæ, & malignæ, earum  
 cura. 904. a  
 Mistura alterans in incremento & statu fe-  
 brum continuarum plus minus maligna-  
 rum \* 640. a  
 Transfusionis negotium in febre continua;  
 quæ sunt vel sanguineæ vel Lymphaticæ  
 \* 103. b  
*Febris deliræ* † 288. a. † 301. a  
*Febris elodes* † 288. a  
*Febres Ephemeræ*, s. Diariz † 281. b  
 Febris ephemeræ subjectum † 249. b  
*Febris epiala* † 308. b. sq.  
 Ejus prognos & cura † 308. b. sq.  
*Febris erratica & vaga* † 256. b  
*Febris in fractura ossium* \* 71. a.  
*Febres Hæctica*, v. Hæctica febres.  
*Febris in inflammatione Hepatis* † 375. b  
*Febris Horrificæ* † 288. b  
*Febribus humorosis* nil prodest Transfusio \* 103. b  
*Febris Hungarica* † 285. a. † 286. a. † 301. a  
 Febris Hungar. præservativum † 365. b  
*Febris Hydrodes*, sudorifica † 288. a  
*Febres infantum variæ* \* 542. b  
 Febres infantum, lentæ, ardentes &c. cum  
 causa, diagnosi, prognosi, cura † 1106. a. sqq.  
 \* 538. a. † 551. a.  
*Febres intermittentes* † 255. b. focus \* 249. b. sim-  
 plices compositæ † 256. a. Paroxysmorum  
 duratio † 256. a. earum origo & alia divisio  
 & periodus † 250. a. † 256. a. † 304. a. tria  
 primaria Symptomata, & paroxysmum ante-  
 cedentia, concomitantia † 256. a. interdum  
 degenerant & in se invicem transmutantur  
 † 257. a. † 258. a. an dentur intermittentes  
 malignæ † 257. b. causæ † 258. a. ex usu rei  
 appetitæ, alias noxiæ, curatæ † 258. a. b. unde  
 vomitus, cephalalgia, agrypnia, deliria, sitis  
 † 259. b. nothæ, legitimæ † 260. a. intensior  
 nunc, vel remissior † 260. a. per amuleta ridu-  
 cula sæpè curata † 260. b. in nostra regione sem-  
 per mali hypoch. & scorbuti ratio habenda  
 † 260. b. Maculæ cutis & arenulæ urinae † 261. a.  
 tempus statum, quo affligunt, & ejus anticipatio  
 † 261. a. multiplicationis & exasperationis cau-  
 sæ † 244. b. † 261. a. Recidivæ aut degeneratio-  
 nes unde † 261. b. Prognosis † 262. a. Urinæ  
 consideratio † 262. a. b. modus eventus & Cura  
 † 263. b. borborygmorem, statum, ardoris ab-  
 dominis &c. cura † 267. a. Quid si sudor eman-  
 ferit, & cephalalgia adlit † 271. a. Hydrops co-  
 lica, pedum tumor &c. post talem febrem quo-  
 modo præcavenda &c. † 271. b. † 279. † 281. a.  
 Dixta † 271. b. sq. febrifuga externa † 280. a.  
 Febris intermittens periodica † 283. b  
 De febre intermittente quotidiana casus & ob-  
 servatio \* 358. b  
 Pilulæ emetico-catharticæ ante paroxysmum  
 febris intermitt. \* 637. b.  
 Potio febrifuga intermitt. \* 640. a  
 Quid transfusio sang. valeat in febr. intermitt.  
 \* 104. a.  
*Febris lactea puerperarum* † 1044. a  
 De febre lactea casus & obs. \* 364. b. \* 438. a  
*Febres lentæ* † 282. b. † 304. a. earum causæ &c.  
 † 305. a. Interititibus junctæ † 302. b  
 Febres lentæ omnes ferè sunt periodicæ † 306. b  
 De febre lenta casus & obs. \* 399. b  
 Febres lentæ primariæ † 306. b. earum causæ  
 † 307. a. Prognosis † 307. b. Cura † 308. a  
 Febres lentæ secundariæ & symptomaticæ  
 † 309. b  
 De febre lenta Symptomatica consultatio  
 \* 237. a. \* 420. a. \* 421. b. \* 422. a  
 De febre lenta continua casus & obs. \* 409. a  
 Febris lenta & quasi hæctica † 245. a.  
 De febre lenta scorbutica casus & obs. \* 394. b  
*Febris lypyria* † 285. b. ejus Cura † 303. a  
*Febris lymphatica* † 304. b  
 Febres lymphaticæ triplici modo affligun. \* 233. a  
 Febres lymphaticæ glandularum conglomerata-  
 rum † 306. b  
 De febre continua lymphatica consultat. † 235. a  
*Febris Lymphodes* † 288. b  
*Febres malignæ* † 317. b. divisio & differentia ibid.  
 † 319. b. sqq. Symptomata † 318. a. pulsus &c.  
 † 318. a. causæ 138. b. † 321. b. Pars affecta  
 † 323. a. Diagnos & Prognosis † 317. b. sq.  
 † 323. b. sqq. † 326. a. b. sq. Tempus & modus  
 eventus ibid. b. Cura duplex, præservatoria  
 & curatoria † 327. b. sqq. Dixta † 333. a. Quid  
 si delirium adlit † 336. b  
 Febr. mal. præservativum † 365. b  
 Epithema in febr. malignæ, & pestilential. vo-  
 mitu \* 641. b.  
 Febribus malignis obviantia: Cinnabaris An-  
 timon. \* 80. a  
 Julepus in febre maligna \* 643. b  
 In febribus malignis conducit infusio \* 507. a  
 Morsuli præservativi in febrib. malign. \* 637. a  
 Febrib. Malign. transfusio non conducit \* 102. b  
 De Febre maligna casus & obs. \* 344. a. \* 366. b  
 Consultatio de Febre maligna \* 242. b  
 De febre maligna ex tertiana simplici casus &  
 observ. \* 411. a  
 Febres malignæ puerperarum † 1045. a  
*Febres menstruæ* † 255. b  
*Febris miliaris*, puerperarum † 1047. b.  
*Febris Pemphygodes*, ampullola. † 288. a.  
*Febris periodica* † 261. a. † 282. b  
 Febris continuæ periodicæ † 282. b. cura † 302. b.  
 febr. pestilential. in vomitu Epithema 641. b.  
 v. Pestis.  
*Febris Petechialis* † 338. b. Symptomata ejus, cau-  
 sæ, prognos † 339. a. b. Tempus & modus  
 eventus † 340. a. retrocessio macularum & pu-  
 sularum † 340. a. Cura ibid.  
 Febris malignæ petechialis ex contagio natæ  
 cura \* 251. a.

Febris

## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- De Febri petechiali casus & obl. \* 350. b. † 371. a. \* 410. b. \* 422. b.  
 Consultatio de Febri Petechiali maligna \* 244. b.  
*Febris Phricodes* † 288. b.  
*Febris in phthisi cura* † 408. b.  
*Febris in pleuritide* † 565. b.  
 Febris in pleuritide vera \* 276. a.  
*Febres puerperarum* † 1044. a. \* 434. b.  
 v. Puerperæ febris.  
*Febris purpurea puerperarum* † 1047. b.  
 Febris purpuræ causæ, Prognosis, Cura † 343. a.  
*Febris putrida* † 248. b.  
*Febris quartana* † 255. b. Prognosis † 263. b. seq.  
 Febris quartanæ focus † 249. b.  
 De febri quartana casus & obl. \* 397. b. \* 381. b. \* 407. a. \* 408. a. \* 410. a. 414. a. \* 415. b.  
 Consultatio de febre quartana splenetica \* 211. b.  
 Consultatio de febre quartana duplicata cum colica convulsiva \* 212. b.  
 Consultatio de Febre quartana duplicata scorbutica \* 208. a.  
 Febrim quartanam arcentia † 4. a.  
 Infusum contra febrim quartanam \* 647. a.  
*Febris quintana, octana, nonana* † 255. b. seqq.  
*Febris quotidiana* † 255. b. an detur † 256. a. prognos. † 262. b. cura † 265. b. seqq.  
*Febris Scarlatina*, qualis affectus † 257. b. ejus causæ & cura † 358. a.  
*Febres scorbuticae* consideratæ, cum cura † 516. b. † 267. b. † 274. b.  
*Febris Scorbutica*, casus & obl. \* 401. a. \* 429. b.  
 Febres Scorbuticæ periodicæ † 283. b.  
 Julepus in febre scorbutica, alvum simul aper- tam servans \* 644. a.  
 Mistura in febre scorbutica \* 641. a.  
*Febris Semitertiana* s. hemitritus † 288. b. † 302. b.  
*Febris singultuosa* † 288. b.  
*Febres Symptomatica acutæ* † 282. b.  
 Febris Symptomatica in hepatis inflammatione \* 281. a.  
 In febre Symptomatica ex lymphæ salsa acri E- mulsio \* 645. a.  
 An in febribus ex solidatum partium vitio seu Symptomaticis transfusioni locus \* 104. b.  
*Febres Syncopales* † 309. a.  
*Febres tabifica* † 310. a.  
*Febris tertiana*, † 255. b. seqq. cautela † 268. a.  
 Febrim tertianam curantia † 4. a.  
 De febri tertiana casus & obl. \* 346. b. \* 416. b.  
 De Febri tertiana absque calore, casus & obl. \* 436. b.  
 De Febri tertiana & continua casus & observa- tio \* 405. b.  
 De febre tertiana pueri casus & observatio \* 363. b.  
 De febri tertiana Duplici casus & observatio \* 388. a. \* 406. a. \* 417. a.  
 De febri tertiana duplicata scorbutica \* 408. b.  
 febrim tertianarum interm. variatio \* 204. b. casus & observ. de tertiana intermittente \* \* 385. b. \* 393. b. \* 402. b. \* 419. a. \* 424. a.  
 Consultatio de Febre tertiana intermittente scorbutica \* 201. a. seqq.  
 De febre tertiana intermittente scorbutica cum oculorum dolore \* 382. a.  
 De Febre tertiana scorbutica casus & observa- tio \* 359. a.  
 Post febr. tert. interm. hypochondriaca propi- ganda \* 206. a.  
 Consultatio de Febre tertiana maligna \* 206. a.  
*Febrilia tormina colica* † 159. b.  
*Febris Typhodes* † 288. a.  
*Febris virginea* † 309. b.  
*Febres vulnerariae*, cum diagn. prognosi & cura † 303. b. † 310. a. \* 53. b. \* 54. a.  
 Fecum separatio à musto &c. \* 126. b.  
 secretio fecum per fermentationem † 247. a.  
 Feces alvinæ, à Chylo ut separentur † 90. a.  
 Fecum alvinarum secretio quomodo fiat † 444. b.  
 fœces excernendæ stimulantæ intestinum re- ctum † 155. a.  
 Fecum alvi induratio \* 140. a.  
 Fecum induratio an intestinorum inflamma- tionem inducat, an vice versa † 98. a.  
 Clyster sub fecum induratione \* 660. a.  
 Fecum alvi rejectio per os † 74. b.  
 v. alvus, excrementa, &c.  
 Seigenbaum. 446. b.  
 Seigwarzen-Kraut. 419. b. 539. a.  
 Fel v. bilis.  
 Fellis folliculi obstructio in ictero unde † 446. b.  
 Folliculus fellis & in eo reperti lapilli; potest excindi sine vitæ aut sanitatis incommodo † 444. a.  
 De fellis folliculo petrefacto casus & obl. \* 431. a.  
 Felleus succus v. succus.  
 Felleæ vesiculæ vulnus lethale per se \* 36. b. 1  
 Felis nausea unde \* 117. a.  
 Felina rabies ejusque causa † 856. a.  
 Fell überm Auge † 719. b.  
 Fell-Ries. 381. b. 551. b.  
 Fenchel 448. b.  
 Fermentatio quid 18. b. \* 82. a. ejus subjectum, causæ, motus &c. ibid. a. b. requisita ad e- am \* 83. b. effectus \* 84. a. musti, vini, cerevisiæ \* 83. a. seqq. occulta, manifesta \* 84. b. corporis humani \* 84. b. vis al- terativa fermenti \* 84. b. fermenta sui multi- plicativa \* 85. a.  
 Fermentationi non præcipitatio opponenda sed nuda attemperatio \* 585. a.  
 Fermentatio & putredo competunt solum cor- poribus compositis. 356. a.  
 Fermentatio & putredo in quo convenient vel differant. 18. a. 355. a. b. seqq. 357. \* 128. b.  
 Fermentatio & putredo non habent locum in corporibus aridioribus. 356. b.  
 in fermentatione & putredine motus minimo- rum observabilis; unde. 356. a. b.  
 Fermentatio cum effervescencia non confun- denda \* 485. a.  
 quomodo differt ab effervescencia, 18. a.  
 Fermentationis effectus est duplex. 19. a.  
 effectus

# INDEX UNIVERSALIS

- effectus separatio feculentiarum † 247. a.  
 Fermentationis usus. 255. a.  
 Fermentatio Sangvinis † 241. a. v. Sangvinis fermentatio.  
 Fermentatio sangvinis fundamentum est status salubris & ægri \* 484. b.  
 Fermentatio in stomacho. 254. a.  
 Fermentatio in stomacho, non est novum inventum \* 514. b.  
 Fermentatione intercedente, infusa præscribendi ratio \* 649. a.  
**Fermentum** quid? \* 586. b.  
 in pathologia quid significet. 124. b.  
 Fermentorum natura & efficacia \* 325. a.  
 Fermenta à priori sunt inexplicabilia. 124. b.  
 Fermentum digestivum variè alterat remedia \* 118. a.  
 Fermenta morbosa \* 238. a. \* 802. b.  
 Fermentorum morbosorum curatio \* 408. a.  
 Fermentorum internorum crasis non adeò perpecta \* 180. a.  
 Fermentum febrile consideratum \* 203. b.  
 Fermenti febrilis conditio † 250. b.  
 Fermenti febrilis natale solum † 247. b.  
 Fermentum malignum quomodo in corpore fiat † 325. b.  
 Fermentum massam sanguineam coinquinans & choleram inducens † 113. a. sqq.  
 Fermenti stomachalis origo. 56. b.  
 Omnia animalia in suo genere determinatum stomachi fermentum digestivum habent † 36. a.  
 Fermenti stomachalis vitium † 29. a.  
 Fermenti defectus & inde nata in stomacho &c. mala \* 142. a.  
 Fermentum stomachi acre volatile alcalinum occultè acidum † 105. b. digestivum ibid.  
 Fermenti acidi in stomacho vires † 40. a.  
 Fermenti usus sub forma emplastri \* 658. b.  
**Ferrum.** 339. b.  
 Ferrum & Chalibis quomodo conveniunt vel differunt. 756. a.  
 Ferrum non calefit, nisi a suis particulis igneis motum \* 555. a.  
 Ferruminandi ossa fracta modus \* 71. b.  
 Festuca, ossium fractorum \* 70. b. \* 71. a.  
 Festucæ ante oculos versantes † 718. b.  
**Sette Denne.** 446. a.  
**Fibra** quid \* 110. a.  
 Fibrarum consideratio † 701. a.  
 Fibre plus minus subtiles pro subjecti natura \* 179. b.  
 Fibrarum motus. 106. a.  
 Fibrarum spasmus in pleuritide \* 277. b.  
 Fibre cutaneæ \* 561. a.  
 Fibrarum curaneæ laxitas in hydrope quomodo curanda † 439. a.  
 Fibre motrices quomodo motum producant animalem \* 783. a.  
 Fibrarum nervearum genuina restrictio s. restauratio in luxatione \* 69. a.  
 vid. Nervus.  
**Fibrilla** † 25. a. illarum tonus, tensio, textura, motus &c. † 25. a.  
 Fibrillarum ramificatio varia † 26. a.  
**Ficus**, ejus præparata & usus. 446. b.  
 Ficus in lue venerea † 456. a.  
**Gieber-Kraut.** 552. a.  
**Figentia** acidum præcipitantia \* 590. a.  
 Filamenta ante oculos versantia † 718. b. † 726. a.  
**Filipendula**, ejus præparata & usus. 447. b.  
**Filix** ejus differentia, præparata & usus. 448. a.  
**Silix-Kraut.** 436. a.  
**Firmior** constitutio quæ \* 215. b.  
**Fissura** in abdomine gravidarum † 1005. b.  
 Fissura cranii \* 51. b. ejus Signa & Symptomata \* 52. a.  
 Fissura ossis fracti \* 70. b. \* 71. a. ejus prognosis \* 71. a. seq. cura \* 72. b. seq. \* 74. a.  
 Tumoris & ulceris ac abcessus in fissuris cura \* 74. a.  
 Fissuræ labiorum pudendi in parturientibus † 1041. a.  
 Fissuræ manuum & pedum in lue. Gall. † 456. a.  
 Fissuræ papillarum † 1059. b. † 474. b.  
**Fistularum** s. ulcerum fistulorum origo & causa \* 55. b. earum occalle scientia & angustia unde \* 55. b.  
 Diagnos. prognos. cura chirurgica \* 56. b. \* 60. b. sqq.  
 Fistularum febres lentæ † 310. a.  
 Fistulæ mammarum † 1055. a.  
 Injectionum in fistulas ratio \* 661. a.  
 Fistula lacrymalis ex ophthalmia † 571. b.  
 Fistulæ lachrymalis experimentalis cura \* 62. a.  
**Fixa** insipida ultra primas vias non pergunt \* 592. b. Duobus tamen modis etiam remotiores partes male habentes curant \* 593. a.  
 Fixorum abusus & noxa 238. b.  
 Fixorum usus in morbis infantum \* 547. a.  
**Fixitas**, visciditatis comes \* 174. b.  
**Glachs/wilder Glachs** 475. a.  
**Glachs-Seide.** 436. a.  
**Flagra** venerem stimulantia † 909. b. † 917. a.  
**Flamma** quid 7. b.  
**Flammula** ejus differentia, præparata & usus. 488. b.  
**Flatulentos** affectus omnes discutens castoreum † 68. a. alia remedia † 69. a.  
 Flatulentia in asthma cura † 207. b.  
 Clyster carminativus in flatulenta colica \* 659. b.  
**Flatuum** generatio. 130. a.  
 De Flatibus casus & obs. \* 337. b.  
 Flatus an dentur in vasimajoribus sanguifluis, & arteriis † 382. a.  
 Flatus abdominis v. abdomen.  
 Flatus colici unde † 158. b. cura † 166. a.  
 Flatus in hernia inguin. \* 185. a.  
 Flatus infantum † 1075. a.  
 Flatus herniosi infantum † 1085. b.  
 Flatus stomachales \* 133. a.  
 Flatus stomachi & intestinorum quid & quomodo hi differant, eorum Pars affecta & causæ † 65. b. sqq. non insunt assumptis † 66. a.  
 Diagnos. ibid. Prognos. & cura † 67. a. b. quid si ardor s. æstus & vanæ phlogoses ei conjungantur † 68. b.  
 Flatus in tumoribus, venæsectione &c. † 65. b. sq.  
 Flatus resolventia † 4. b.  
**Gleichen/** cum cura † 524. b.

Gleichen



# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

**Glecten-Kraut** 415. b.  
**Glect = Fieber** † 338. b.  
**Floccorum collectio** in epilepsia † 209. a.  
**Floccorum collectiones** in febr. mal. † 327. b.  
**Flocculi ante oculos versantes** † 718. b.  
**Gloß-Blume** 466. a.  
**Gloß-Kraut** 503. a.  
**Florum triplex differentia** 322. a. b.  
**Flores quoad producta chymica quomodo differant** 370. b.  
**Fluor albus** qualis affectus † 947. b. ejus differentia † 948. b. causæ † 949. a. symptomata varia † 949. b. Diagnofis, prognofis, cura † 950. a. feqq.  
**De Fluore albo casus & obferv.** \* 435. a.  
**Electuarium ad fluorem album** \* 635. a.  
**Injeftio contra fluorem album** \* 661. b.  
**Fluor muliebris Gallicus** † 470. b. feqq.  
**Fluß/ Falter Fluß** † 679.  
**Fluß-Sieber** † 304. b.  
**Fluxum alvi corrigentia** † 8. a.  
**Secretum in alvi fluxu** † 76. b.  
**Fluxus hepaticus.** v. Hepaticus fluxus.  
**Facula cujus ufus** 856. b.  
**Fecundatio à vitali principio dependet** \* 89. b.  
**Fecunditati obest obesitas** \* 829. a.  
v. Sterilitas.  
**Femina** cur præ maribus magis corpulentæ \* 827. a.  
**Femoris os fractum curatu difficile** \* 72. b.  
**Femoris ossis luxatio v. luxatio.**  
**Feniculum ejus præparata & ufus** 448. b.  
**Fenum græcum, ejus differentia, præparata & ufus** 449.  
**Fetida fpiritus** sunt nocentiffima † 99. b.  
**Fætor quid & unde** 360. b.  
**Fætoris genesis chymica** 361. a. b.  
**Fætores activi quid sunt** \* 795. b.  
**Fætor anhelitus, cibi & potus, in peste** † 363. a.  
**Fætorum axillarum, pedum &c. tollens lotio** \* 656. b.  
**Fætor excrementorum in corpore confideratus** \* 239. a.  
**Fætor in corpore, excrementorum &c. unde** \* 153. a. b.  
**Fætor excrementorum humanorum an à putredine** 362. a. b.  
**Fætor excrementorum in diarrhœa, mali omnis** \* 247. a.  
**Fætor gravis quare putredini femper junctus** 362. a.  
**Fætor halitus pestilentialis** † 361. a.  
**Fætores hircorum &c. in peste commendati** † 365. a.  
**Fætor paludorum &c. quomodo inficiat** † 325. a.  
**Fætor puris, animalium carnis &c.** \* 239. a.  
**Fætu generatio an ex femine utriusque** † 989. b.  
**Fætu mas an citius vel tardius fœmello fiat** 114. b.  
**Fætu numero plures una vice quomodo generantur** 109. b.  
**Fætu formatio læfa** † 938. a. b.  
**Fætu in utero vita qualis** 116. a.  
**Fætu in utero respiratio qualis** 73. a. b.  
**Fætu respiratio in utero difcuſſa** \* 749. b. Cur fætu ultimis geſtationis temporibus in utero imò extra uterum membranis adhuc coopertus & adhuc in aqua ſua manans per aliquot horas

citra ſuffocationis periculum ſuperſtes ſit; ſecundinis poſt exutus, aere intra pulmones recepto, abſque eo ne momentum quidem durare poſſit? † 1062. b. Cur ex tam ſubitanea & apparenter periculofa mutatione, non ſtatim graviter & ſerè lethaliſter ægroter † 1062. b. Cur fœtus recens editus artus valide moveat ſtatim & vibret, digitos variè inflectat, urinam mittat, vomat, alvi recrementa varia protrudat, ſternutet † 1063. b. In fœtu qualis ſanguinis circulatio 117. a.  
**Fœtus motus quomodo incipiat & ſucceſſivè auſceſcat** † 971. a.  
**Fœtus in utero motus ſenſibilis quo tempore primum contingat** 114. a.  
**Fœtus communicatio cum matre** \* 96. b.  
**Fœtum cingentes tunicæ** 114. b.  
**Fœtus inter duplicem membranam ſituatio** † 990. a.  
**Fœtus ſimilitudo ad parentes unde deducenda** 114. b.  
**Fœtui impreſſa ſigna à matre** \* 798. b.  
**Fœtus in Utero Nutritio** 115. a.  
**Fœtus nutritio intra amnion contenti per placentam uterinam** † 1006. b.  
**Fœtus in utero latens ex parte ventriculi maxime afficitur à nutrimento** \* 137. a.  
**Fœtus in utero an Urinam excernat.** v. Urina.  
**Fœtus in minus convenienti ſitu conſtitutus quas noxas det** \* 321. a.  
**Fœtus ſeptimeſtris ſemper habet veſtigium imperfectionis** \* 321. a.  
**Fœtum pellentia** † 1010. b. præventia † 1011. a.  
**Fœtum pellens Sabina** † 934. a.  
**Fœtus verus cum mola** † 989. b.  
**Fœtus debilitatus (v. g. ex terrore matris) uterum irritans** \* 327. b.  
**Fœtus debilis quomodo roborandus** † 996. b. † 1014. b.  
**Fœtus quomodo ſalvandus puerpera mortua** † 1023. b.  
**Fœtus mortuus** † 1023. a. ejus cauſæ & diagnofis † 1012. b. † 1024. a. Prognofis † 1025. a. Cura † 1025. b.  
**Fœtus mortui diſtinctio ab abortu** † 1010. a.  
**Fœtus in partu mortui ſignum** † 1063. b.  
**Fœtus mortuus uterum irritans** \* 327. b.  
**Fœtum mortuum comitans febris lenta** † 310. a.  
**Fœtus in utero mortui pulmones aquæ injecti cur fundum petunt, poſt excluſionem autem mortui ſupernatant** 117. a.  
**Fœtus ad promovendum fœtum mortuum** \* 655. a.  
**Fœtus muſtei partus ejusque ſuffocatio** \* 756. b. v. partus.  
**Folliculi fructuum, v. horæi fructus.**  
**Follis veterum in paſſione illiaca &c. adhibitus** † 102. b.  
**Ano applicatus in pertinaci alvi obſtructione** \* 173. a.  
**Fontanella uſus** 156. b.  
**Fontanellas excitandi ſingulariſſimum cautelum** \* 5. b. v. Fonticuli.  
**Fontes ligna in lapides convertentes** \* 447. b.  
**Fonticuli, tanquam ulcuſcula artificialia, qd. excitandi vel non** \* 285. b. locus eorum dupliciter conſideratus \* 286. a. v. Fontanellæ.  
**Fonticulorum punſiones in peſte** † 361. a.

# INDEX UNIVERSALIS

- Fenticulorum* ulus in apopl. \* 304. b. † 834. a.  
† 838. a.  
ulus in cephalalg. † 768. b.  
ulus in epileps. † 812. a.  
ulus in hæmorrhoidibus cæcis &c. \* 168. b.  
ulus in ophthalm. † 592. b. † 721. a.  
ulus in peste † 364. a.  
ulus in affect. scorb. catharrh. † 683. b.  
ulus in vertig. † 799. a.  
ulus in tophis gallicis † 477. a.  
*Forestsus* commendatus † 27. a.  
*Forma* quatuorplex 24. b.  
Formæ organicæ morbi quales \* 101. a.  
*Formica*, ejus genesis, præparata & usus 338. a.  
704. a.  
Decocti cubilis formicarum balneum † 657. a.  
*Formicationis* sensus † 806. a.  
Formicatio scorbutica † 513.  
*Formularum* præscriptio \* 621. a. \* 631. b.  
*Fotus* præscribendi ratio \* 654. b. modus adhibendi triplex ibid.  
Fotus in affectibus stomachi ratio \* 139. a.  
*Fovea* in variolis \* 252. a. † 354. a.  
*Fractura cranii* quomodo curanda \* 51. b.  
*Fractura membri* Fotus in ea \* 655. b.  
*Fractura ossis* quæ, ejus causæ, differentia \* 70. b.  
ex nimis convolutionibus \* 70. b. diagnosi  
ibid. & seq. huic cur senes facile sint obnoxii  
\* 71. a. ejus diagnosi & prognosis \* 71. b.  
Cura \* 72. b. hæc in quibus aliis tardior  
aliis promptior \* 72. a. b. Modus consolidandi  
& ferruminandi ossa fracta \* 72. b.  
Chirurgi officium circa fracturas ibid. b.  
ferularum & ligationum s. fasciationum usus  
\* 73. a. b. Quæ emplastra convenient, vel  
minus \* 73. b. interna remedia ibid. fra-  
cturæ sunt vel simplices vel cum vulnere  
complicatæ \* 74. a. Quid, si ossis fracti  
particulæ insignes extra vulnus promineant  
\* 74. b. Quid, si ossicula talia separata se  
manifestent, vel minus ibid. callus nimis  
magnus quomodo corrigendus & imminu-  
endus \* 74. b.  
Fractura ossium cum luxatione \* 70. a.  
*Fragaria*, ejus præparata & usus 450. a.  
*Frangitivus* dolor † 745. b. \* 750. b.  
*Frangula* ejus usus 627. a.  
*Franksen* • *Holtz* 458. a.  
*Franksen* Krankheit. v. lues Venerea.  
*Fratt* seyn der Kinder. v. Intertrigo.  
*Frauen* • *Haar* 379. b.  
*Fraxinella*, ejus usus 451. b.  
*Fraxinus* ejus præparata & usus 450. a.  
*Gref* • *Wurzel* 392. b.  
*Griessel* • *rother und weisser* † 343. a. † 1047. b.  
*Frigida* ac frigefacientia, simplicia & medicamenta  
quæ † 3. b.  
Frigidorum vegetabilium vis unde † 245. b.  
Frigidos reficiens † 292. b.  
Frigidus dolor † 746. b.  
v. calidum.  
Frigidus potus post defatigationes haustus  
asthma inducens † 195. b.  
Frigidæ potus febrem colliquativam inducens  
† 287. b.  
Frigidæ potus post incalescentiam phthisin con-  
cilians † 397. b.  
Frigida nervis inimica \* 171. b.  
Frigida nocent pleuriticis † 569. a.  
Frigidus aer, potus, pleuritidem concilians †  
561. b.  
Frigidæ potus sanguinem coagulans † 239. b.  
Frigidæ haustus syncopen inducens † 388. a.  
Frigidorum ingurgitatio post sudorem & calo-  
rem noxia † 97. b.  
*Frigus* varia mala in corpore excitans \* 175. a.  
Frigus liquida in corpore inspissat &c. \*  
171. a.  
Frigus & frigida cutis poros obstruunt \*  
124. b.  
Frigus diarrhæam inducens \* 147. b.  
Frigus in febre † 246. a.  
Frigus quantum noceat scemini \* 321. b.  
Frigus adversatur maximè herniosis \* 186. a.  
Frigoris sensus in occurso rei horridæ \* 561.  
a.  
Frigoris tolerantia maniacorum † 877. b.  
Frigus nervis & intestinis inimicum † 124. a.  
Frigus quam noxium puerperis \* 328. a.  
Cataplasma in puerperæ suppressione urinæ ob  
admissum incautus frigus à partu \* 658. a.  
*Fræni* vitia † 923. b.  
*Frons* caperata, circa nasum, in mal. morb. †  
246. a.  
Frontis incalescentia in peste † 375. b.  
*Frontale* quid \* 632. a.  
Frontalia præscribendi ratio † 641. a.  
*Fructus* quoad producta chymica quomodo disse-  
rant. 371. a.  
Fructus horæi v. horæi fructus.  
*Frutex lapidi* formis coralliorum &c. \* 449. a. seq.  
*Günff* • *Singer* • *Kraut* 517. b.  
*Fuligo* ejus præparata & usus 581. b. \* 562. a.  
Fuliginis spiritus & volatile 865. a. 900. b.  
*Fumaria*, ejus differentia, & usus 451. b.  
*Fumosa* non omnes ferre possunt † 390. b.  
*Fumus* quid 7. b.  
Fumi ascensus, dissipatio \* 746. a. b.  
Fumi sylvestres animalia jugulantes † 191. b.  
*Funambulum* remedium 441. b.  
*Functiones* primariæ in corpore † 28. a.  
Functionum animalium, voluntariarum &c.  
subjectum & causa efficiens \* 782. b.  
Functionum tarditas & languor, v. virium  
prostratio.  
*Fungi*, eorum virulentia, & in quam partem ea  
consistat \* 138. a.  
Fungi choleram excitantes \* 138. a.  
à Fungis ortus spasmus orificii superioris van-  
triculi \* 137. a.  
Fungi suffocationem inducentes † 193. a.  
Fungorum syncope † 389. a.  
*Fungi* articulorum \* 32. a. qualis tumor \* 31. b.  
eorum causæ, & cura \* 32. a. Fungi ex  
luxatione \* 67. b.  
*Fungus* Lupinus, vid. Lupus.  
*Fungus Phalloides* \* 449. a.  
*Furfurati* capiti resistens lotio \* 957. a.  
*Furiosi* morsus qt. venenatus \* 800. b.  
*Furor* maniacorum † 877. b.  
*Furor melancholicus* \* 107. a. vid. mania me-  
lancholia.  
*Furor venereus* † 920. a.  
*Furor* uerinus quale delirium † 857. a. Ejus cau-  
sæ † 956. a. b. Diagnôsis, Prognosis, cura †  
957. a.

FURUNCULI

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

*Furunculi* quid \* 18. b. etymologia vocis & cura eorum \* 19. b.

De furunculis puerperæ casus & observat. \* 364. b.

*Furunculi* infantum unde \* 538. a. cura \* 550. b.

*Fusio* quid & ejus usus 859. a.

## G.

*Gaisbarr* 388. a.

*Gaisse* = *Juss* 394. a.

*Gaisse* = *Ziegen-Rauce* 453. a.

*Gänse-Blümgen* 398. a.

*Gänserich* 389. a.

*Gagates* quid & ejus usus 814. b.

*Galanga*, ejus præparata & usus 452. b.

*Galbanum* ejus præparata & usus 583. a.

*Galega*, ejus præparata & usus 453. a.

*Galenica* medicina superstructa Peripateticorum Physicæ \* 512. a.

*Galgand*. *Wilder Galgand* 439. a.

*Gallica* lues. v. *Lues venerea*.

*Gallinaceorum pullorum* usus hæcticus † 317. a.

*Gallus Gallina*, ejus usus in Medicina 687. a.

*Galli* decoctum, rarissimi usus \* 631. b.

*Gamanderlein* 416. a.

*Ganglia* quid, eorum causæ & cura chirurgica \* 28. a.

*Ganglion* ex alimento minus alterato \* 4.

*Gangrena* quid? ejus causæ, \* 75. a. diagnosi, Prognosis \* 75. b. Cura \* 76. a. differt à sphacelo \* 75. a. partis affectæ fœtor & putredo unde \* 75. b. præcautiones in metu gangrænæ \* 75. a. amputatio membrorum gangræna corruptorum, \* 77. a.

*Gangræna* ex aneurismate \* 33. a. v. *eschara*.

*Gangræna* gingivarum † 50. b. † 53. b. seqq.

*Gangræna* in hydrope cura † 437. b.

*Gangræna* pestilentialis cura † 374. b.

*Gangræna* in bubonibus pestilent. † 362. a.

*Gangræna* in scorbuto oris † 505. a.

*Gangræna* testium † 907. b.

*Gangræna* in variolis &c. † 357. b.

*Gangræna* uteri à partu † 1042. a.

Decoctum in metu gangrænæ exulcerationum humidarum \* 654. b.

*Epithema* contra imminens plus minus gangrænam \* 642. a.

Secretum contra gangrænam \* 658. b.

*Gargarisma* quid 834.

*Gargarismata* præscribendi modus & formulæ \* 660. a.

*Gargarismata* in angina, & observanda circa ea † 544. b.

*Gas* vegetabilia & mineralia cur subito jugulent & faces extinguant † 191. a.

*Gas* Helmontii seu spiritus incoëreibilis in stomacho † 65. b. \* 133. a.

*Gas* pestilentialia † 359. a.

*Gauch-Blumen* 386. b.

*Gauchheil* 386. b.

*Gaudii* vis \* 95. b.

*Gaudium* magnum emaciat \* 832. b.

*Gaudium* nimium abortus causa † 1011. a.

*Gaudium* syncopen inducens † 388. b.

*Geäder/ des Kleinen Verstopfung* † 478. a.

*Geißern der Kinder* \* 189. b. \* 542. b.

*Geißer-Wurzel* 516. a.

*Geiß/ v. Gais.*

*Geitz-Wurm* † 1095. b.

*Getroßädern Verstopfung* † 181. a.

*Gelatina* nutritiva \* 827. b.

*Gelehrten Krankheit* \* 773. b.

*Gemellorum* conceptio † 988. a. † 990. b.

*Gemma*, eorum præparata & usus 314. a. b. seqq. 856. a.

*Gemmarum* usus externus qualis 724. b.

*Gemmarum* tincturæ & colores unde oriuntur 721. b.

*Gemmarum* tincturæ extractio an genuina 723. a.

*Gemsen-Rugeln* 441. b.

*Gemsen-Wurzel* 441. a.

*Genarum* spasmus † 47. b.

*Generalia* remedia † 5. a.

In *Generatione* sanguis inter partes liquidas & cor inter solidas sunt primigeniæ 113. b.

*Generationis* causæ efficientes 26. b. 114. a.

*Generationis* modus 43. a. b.

*Generationis* necessitas 107. b.

*Generatio* aberrans, sive malefacta unde 23. b.

*Generatio* prolis debilis, robustæ, unde dependeat \* 90. a.

*Generandi* libido corruptionem citiorem comitem habet \* 89. b.

*Generosa* remedia eorumque utilitas \* 79. a. defectus † 1.

*Genista* ejus differentia, præparata & usus 453. b.

*Genitalia* (vid. *Penis*, *uterus* &c.)

*Genitalium mulieb.* pruritus, cum causa, prognosi, cura † 954. a. b. pustulæ & scabies † 955. a.

*Genitalis* aura \* 324. b.

*Genitalis* facultas † 5. b.

*Genitalis* spiritus consideratus \* 90. b.

*Genitura* odor alliciens ad venerem \* 325. a.

*Genituræ* corruptio \* 324. b.

*Genituræ* defectus unde † 898. a.

*Genituræ* virilis retentio & excretio læsa † 908. b.

*Genitura* aquosa effluens subinde † 910. a.

Remedia in *genituræ* copia convenientia † 911. a.

*Genituræ* nimis cita ejaculatio, ejusque cura † 914. b. † 918. b.

*Genituræ* excretio nimis tarda, ejusque cura † 915. a. aut plane nulla in coitu ibid.

*Genituræ* citra coitum excretio † 909. a.

*Genituræ* titillatio ubi contingat \* 324. b.

*Genitura* quomodo in urina distinguenda à pure &c. \* 237. b.

*Genitura*, v. *venus*, *semen*.

*Genstraut* 453. b.

*Gentiana*, ejus differentia, præparata & usus 454. a.

*Genus* contracta & rigida † 802. b.

*Geometrica* corpora sunt accidentia \* 446. b.

*Geometrizaris* semper & ubique natura † 2. b.

*Geranium* ejus differentia, præparata & usus 455. a.

*Germani* cur corpulentiores Gallis, Italis \* 817. a.

*Gewächs/mola* † 989. b.

*Gewächse* vid. *Excrecentiæ*.

*Gialappa* v. *Jalappa*.

*Gibbosi* plerumque asthmatici † 197. a.

*Gicht* affectus scorbuticus † 509. b.

warne oder hiege / false \* 268. b. \* 305. b.



# INDEX UNIVERSALIS

Die reißende † 484. a.  
grieglender Scharbock oder Ulcer † 484. a.  
Eiche-Wurz. 617. b.  
Eiste-Heil. 389. b.  
*Gingivarum* vitia ex dentibus † 50. b. gangræna, scorbutus s. excrementia † 53. b.  
*Gingivarum* hæmorrhagia v. hæmorrhagia *gingivarum*  
Contra *gingivarum* putredinem cruentationem-ve pulvis \* 634. a.  
*Gingivarum* scorbuti prognos † 488. b.  
*Gingivarum* Scorbuti cura † 503. a.  
*Gingivarum* tumor in odontalgia † 753. a. † 755. b.  
Mistura præservativa pro *gingivarum* variis affectibus \* 643. a.  
*Gladiolus*, ejus usus. 455. b.  
*Glandularum* usus. 82. b.  
*Glandularum* liquor est latex aquosus. 83. b.  
a *Glandulis* maximam partem oriuntur vasa lymphatica. 82. a.  
*Glandulæ* conglobatæ. 82. a.  
*Glandulæ* conglomeratæ quæ & earum usus. 82. a.  
*Glandularum* conglomeratarum febris Lymphatica † 306. b.  
*Glandulosum* fibrarum tegmen cerebri † 25. a.  
*Glandularum* mesenterii obstructio in infantibus † 1104. b.  
*Glandulæ* subeuntæ \* 561. a.  
*Glandularum* lymphæ separatio & motus læsus † 674. a.  
*Glandularum* obstructio † 181. b.  
Obstructio *glandularum* atrophiam inducens † 394. b.  
Decoctum in *glandularum* tumoribus \* 651. a.  
*Glandularum* in capite & collo infantum cura † 1100. b.  
*Glaus*, ejus inflammatio crystallina, tumor &c. † 925. a. b.  
*Glauberi* instrumentum ad suppressionem mensium tollendam † 937. a.  
*Glaucumati* consideratio † 725. b. † 726. b.  
Glieder-Kraut. 543. b.  
Glieder-Schwamm/ quid, ejus causæ, cura \* 32. a.  
Glieder-Schwindung † 394. a. † 409. a.  
Gliedertranch \* 651. a. b.  
*Gliris* pingvedo \* 822. a.  
*Globuli* in alvi obstructione podici intrudendi † 101. a. \* 173. a.  
Suppositorii loco applicantur ex Moscho \* 632. a.  
*Globuli* sclopetorum qt. partibus vulneratis non eximendi \* 42. a. vulneris globulo venenato inflicti diagnosi, prognos, cura \* 48. a. b. v. Sclopetum.  
*Glutinentia* vulnerum \* 43. a. \* 44. a. ulcerum \* 57. b.  
*Glutinosæ* visciditas in stomacho † 83. a.  
*Glycyrrhiza*, ejus differentia, præparata & usus. 455. b.  
*Glycyrrhiza* succus plerumque adulteratus, Hispanicus optimus † 233. b.  
*Gnaphalium*, ejus differentia, præparata & usus. 456. a.  
Goldwurz. 418. a.  
*Gonorrhæa* divisio † 909. a.  
*Gonorrhæa* vera, ejus pars affecta, causæ † 909. a.  
Diagnos, prognos † 910. b. Cura † 910. b.  
De *gonorrhæa* vera casus & obl. \* 437. b.

*Gonorrhæa* mulierum unde 110. a. v. Fluor albus.  
*Gonorrhæa* Gallica, ejus causa, diagnosi, prognos, pars affecta, cura † 468. a. b. † 469. a.  
*Gonorrhæa* mulierum Gallica † 470. b. seqq.  
*Gonorrhæa* notha, ejus pars affecta, causa, Diagnos, Prognos, † 913. a. b. catarrhalis v. cata † 913. a. Cura † 914. a.  
De *Gonorrhæa* virulenta casus & obl. \* 356. a. \* 374. a.  
Consultatio de *gonorrhæa* virulenta cum tumore testis œdematolo \* 312. a.  
Injectio in penem in *Gonorrhæa* maligna \* 661. a.  
Pilulæ contra *gonorrhæam* inveteratam malignam \* 648. a.  
Emulsio ad *gonorrhæam* benignam \* 645. a.  
*Gramen* ejus differentia, præparata & usus 456. b.  
*Grana* Been vid. Been.  
*Grana* Paradisi 407. b.  
*Granata*, ejus præparata & usus 457. a.  
*Granatus* cujus usus in Medica 724. b.  
*Granatorum* præparandi modus 724. a.  
*Gratiola* ejus præparata & usus 627. a.  
*Gravatum* dolor † 745. a. cura ejus † 750. a.  
*Gravedo*. Linimentum contra eam \* 663. a. vid. Coryza.  
*Gravida* quæ dicatur † 994. a.  
*Gravidæ* primo gestationis tempore minus voraces \* 142. b.  
*Gravidæ* quomodo ab hydropicis & asciticis discernendæ † 425. b. † 693. a.  
*Gravidarum* regimen † 994. a.  
Regimen in morbis † 997. a.  
Symptomata † 998. b.  
*Gravida* cruditate nidorosa laborans \* 132. a.  
*Gravidarum* diarrhææ Prognos \* 143. b.  
Peste correptarum prognos † 363. a.  
*Gravidæ* stranguria & affectus nephriticus \* 434. a.  
In *gravidis* periculosa est infusio \* 509. b.  
*Gravidis* noxiæ odor gravis † 388. b.  
Pro *gravida* fœmicupium \* 656. a.  
*Gravidarum* venæsectio, purgatio \* 145. b.  
*Graviditatis* signa † 1000. a.  
Veræ signa distinctiva à mola † 991. a. v. in-gravidatio.  
Grichholz 491. b.  
Grindtram 537. a.  
Grindwurz 470. b. 471. a.  
Gründheil 386. b. 559. a.  
*Grylli* domestici, lithonriptici † 645. b.  
*Gryllus* aurem ingressus † 739. b.  
*Guajacum*, ejus præparata & usus 457. b.  
Guldene Uder † 142. b.  
Gulden Gensertch 382. a.  
Gulden Günsel 430. a. 546. b. 565. b.  
Gulden Wundkraut 565. b.  
Güsse geben Güsse † 678. a.  
*Gula* errata v. Intemperantia &c.  
*Gulæ* inflammatio † 538. b.  
*Gumma* Gallicum qualis tumor \* 27. b.  
*Gummata* quomodo curanda † 476. a.  
*Gummi* potentissime resolvunt tumores \* 24. b.  
*Gummi* applicationem si cutis ferre nequeat, quid faciendum † 687. a.  
*Gummi* Amomiaceum, ejus collectio, præparatio & usus 572. a.  
*Gummi* Arabicum, ejus usus 573. a.

Gummi

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

*Gummi Gottæ*, ejus præparatio & usus 639. a.  
*Gummi juniperini* usus in obesitate \* 835. a.  
*Gummi f. Resina anitæ*, ejus præparata & usus 573. a.  
*Gundermann* 459. a.  
*Gurgelwasser* \* 660. a. b.  
*Gustus* definitio 100. a.  
*Gustus & odoratus* differentia 100. a.  
*Gustus organon* primarium 100. b.  
*Gustus gratus & ingratus* 101. a.  
*Gustus non sufficit ad dijudicandam simplicium efficaciam* \* 846. a.  
*Fallit in dijudicando sapore &c.* † 642. b.  
*Gustus læsiones dupliciter obtingentes* † 785. a.  
*Gustus imminutus & depravatus ejusque causæ*, 100. b. seqq. † 785. b. *diagnosis, prognosis, cura* 786. a.  
*Gutta gambodia* ejus usus 873. a.  
*Gutta Jemou*, f. *Gummi Gottæ*, ejus præparata & usus 639. a.  
*Gutta Rosacea*, ejus causæ, prognosis, cura † † 29. b.  
*Pilulæ contra guttam rosaceam contumacem* \* 638. a.  
*Gutta serena* † 725. b. † 129. b. ejus causæ, diagnosis † 730. a. b. *Prognosis, cura* † 731. a.  
*Gutturis inflammatio & dolor* † 538. b. \* 540. b.  
*Gutturis in peste dolor sine tumore &c.* † 362. b.  
*Gypsum præparantes plerumque phthifici* † 397. b.  
*Gyrus in ebriosis, vertiginosis &c.* † 794. a.

## H.

*Haar-Straug* 504. b.  
*Hæmatites* ejus usus in medicina 734. b.  
*Hæmatitis artificialis præparatio* \* 241. b.  
*Hæmoptoe* De ea casus & observ. † 357. b.  
*De Hæmoptoe in gravida casus & observat.* \* 437. a.  
*Hæmoptoicis vomitorium noxium* \* 19. a.  
*Hæmoptyses* consideratio consultatoria \* 283. b.  
*Hæmoptyses in tussi cura* † 236. a.  
*opii usus in hæmoptysi* \* 570. b.  
*v. sanguinis sputum.*  
*Hæmorrhagia* quid † 521. a.  
*Hæmorrhagiæ qui maximè obnoxii* † 608. b.  
*Hæmorrhagia in genere* † 607. b. *vocis derivatio* † 607. b. *eius causæ* † 140. b. sq. † 608. a.  
*Diagnosis, prognosis* † 610. a. b. *differentiæ* ibid. b. *Cura* 611. a.  
*De Hæmorrhagia habituali casus & observ.* \* 399. b.  
*Hæmorrhagias sistentia* \* 49. a. b.  
*v. sanguinem sistentia.*  
*Hæmorrhagiæ nimis conducit sanguin. transfusio* \* 109. a.  
*Terror hæmorrhagias compescens* † 928. a.  
*Hæmorrhagiæ post abortum cura* † 1015. a.  
*Hæmorrhagia gingivarum*, ejusque cura 620. a.  
*Hæmorrhagia gravidarum cum cura* † 1003. b.  
*Hæmorrhagia hypochondr.* † 484. a. b.  
*Hæmorrhagia intestinorum* † 140. b.  
*Hæmorrhagia narium*, ejus causæ, diagnosis, prognosis † 140. b. sq. † 616. a. b. *cura* † 617. a. seqq.  
*Hæmorrhagiæ narium, mensium, an salutes* \* 109. a.  
*Casus & observ. de Hæmorrhagia narium* \* 371a

*Hæmorrhagiæ narium chronice unde* † 144. b.  
*Cataplasma ad hæmorrhagiam narium* \* 658. b.  
*Epithema in hæmorrhag. narium* \* 641. b.  
*In hæmorrhagia narium injectio* \* 661. b.  
*Hæmorrhagia narium in febr. acuta* † 291. b.  
*Hæmorrhagia narium in febr. mal.* † 327. a. † 332. b. † 337. b.  
*Hæmorrhagia narium febri petechiali superveniens* \* 251. a. † 342. a.  
*Hæmorrhagia narium in hepatis inflamm.* \* 282. a.  
*Electuar. in hæmorrhag. narium juniorum habituali, ex hypochondriis &c.* \* 636. a.  
*Hæmorrhagiæ narium prognosis in lienis aut hepatis suppuratione* † 577. a.  
*Hæmorrhagia pestilenciales* † 363. a.  
*eius in peste cura* † 376. b.  
*Hæmorrhagia scorbuticorum* † 609. b.  
*Hæmorrhagiæ scorbuticæ cura* † 516. a.  
*Hæmorrhag in variolis* † 348. a. \* 254. a.  
*Cura hæmorrh. in variol. & morbill.* † 353. b.  
*Hæmorrhagia uteri ex laxitate vasorum conducens decoctum* \* 650. a.  
*Consultatio de Hæmorrhagia uteri* \* 319. b.  
*De hæmorrhagia uteri calus & obl.* \* 432. b.  
*Epithema in hæmorrhag. uteri* \* 641. b.  
*Injectio contra hæmorrhagiam uteri* \* 661. b.  
*Sacculus pro hæmorrhagia uteri* \* 655. b.  
*Hæmorrhoidalia vasa, arteria* † 142. b.  
*Hæmorrhoidaliū vasorum ortus & situs* \* 165. a.  
*Hæmorrhoides magnam habent cognationem cum affectu Hypochondriaco* \* 140. b.  
*Hæmorrhoidum qualis affectus* † 142. b. *mulieribus cum viris fluxus communis* † 142. b. *differentiæ & divisio etiam in pueris sæpe observatur* † 143. b. *cæcus cum suppuratione* † 144. b. *Symptomata ibid. varizæ appellationes* † 144. a. *Tumor ibid. Recidiva ibid. b. Pars affecta & causæ* † 144. b. *naturaliter nemini contingunt, & quibus* † 144. b. † 146. b. *Diagnosis, Prognosis* † 145. a. b. *Differ. à diarrhæa scorbuticorum cruenta* † 145. a. *Signorum differentia à condylomatibus, cristis, verrucis ani &c.* † 145. b. *Cura* † 146. a. *una harum aperta servanda ibid. tumores & dolores sistentia* † 149. a. seqq. *Inflammationem ibid. cancerosis hæmorrhoidibus cæcis ve convenientia* † 149. a. *Quid si chronici facti* † 152. a. *excrecentes ibid. puerperarum cæcæ* † 152. a. *Quid si exulceratæ* † 152. b.  
*De Hæmorrhoidibus casus & obl.* \* 435. b.  
*Hæmorrhoidum inflammationes tollens* † 387. a.  
*Hæmorrhoides quomodo aperiuntur* † 167. b.  
*Hæmorrhoides apertæ in obstructione alvi cum imminente ileo* \* 139. b.  
*De hæmorrhoidibus cæcis casus & observ.* \* 426. b. \* 435. b.  
*Consultatio de Hæmorrhoidibus cæcis dolentibus ex mensium naturali emanatione* \* 164. a.  
*Hæmorrhoides cæcæ à partu* † 1042. b.  
*Hæmorrhoidum tumor in gravidis* † 1008. b.  
*Hæmorrhoides febris* † 288. b. † 302. b.  
*Hæreditarius, v. hereditarius.*  
*Hage-Han-Butten* 438. a.  
*Hahnemann* 518. a.

# INDEX UNIVERSALIS

- Halec* cuius usus in Medicina, 694. a.  
*Halec* febrem curans † 257. b.  
*Halitus* natura \* 745. a. \* 748. a.  
*Halitus* ad caput non ascendunt, nec inde descendunt ad stomachum \* 181. b. v. vapor.  
*Halitus* morboſi † 66. a.  
*Halitus* ſœtidus in peste † 361. a.  
*Halitus* phthiſicorum infeſtorius † 398. a.  
*Halofanthos* veterum \* 699. a.  
*Halſi*-Geſchwür † 538. b.  
*Halſi* umdrehen † 802. b.  
*Halſi* / ſo angelauſſen † 539. b.  
*Halſſ*. 406. b.  
*Harn*-Kraut 475. a.  
*Harn*-treibender Brand \* 651. a.  
*Häſſel*-Wurzel 616. b.  
*Häut*-Brand oder Schwächheit † 188. a. † 301. a. † 338. a.  
*Häuſ*-Laub 542. a.  
*Hedera* arborea, ejus præparata & uſus 459. b.  
Ejus uſus in peste † 310. a.  
*Hedera* terreſtris, ejus differentia, præparata & uſus 459. a.  
*Hectica* febris † 245. a. † 310. b. tria primaria ſymptomata ejus, & tres gradus † 311. a. duplex modus generationis † 311. a. Pars affecta & cauſa † 311. b.  
Diagnos. † 313. a. urinæ & ſecum examen † 313. b. Prognos. † 314. a. Cura † 314. a. ſeqq. ſymptomatum cura ibid. b.  
De *Hectica* caſus & obſerv. \* 414. a.  
*Opii* uſus in *hectica* \* 570. b.  
*Anti*-*hecticum* *Poterii*, ejus genuina præparatio 923. b.  
*Hectica* febris cum phthiſi, conſultatio \* 263. a.  
*Hectica* febris ex lenta ſymptomata, conſultatio \* 237. a. ſeqq.  
*Hecticas* febres hodie exceperunt febres ſcorbuticæ † 516. b.  
*Hectica* poſt tertianam cura \* 206. a.  
*Hectica* diſpoſitio infantum † 1102. b.  
*Hectica* novorum maritorum † 395. b.  
De *Hectica* pueri caſus & obſ. \* 363. b.  
*Heſſen* der Wunden \* 43. a.  
*Heidelbeer* 489. a.  
*Heilender* Brand auſſerliche mahl \* 650. b.  
*Heil*-Kraut 386. b.  
*Heilſame* Haut haben / quid? \* 38. a.  
*Heil*-Wurzel 554. b.  
*Heiſſer* Brand \* 75. a.  
*Helenium* ejus præparata & uſus 460. a.  
*Heliotropium* ejus uſus 461. a.  
*Hellebori albi* noxæ, \* 435. a.  
*Hellebori albi* viſ vomitoria rejecta † 11. a.  
*Hellebori nigri* uſus medicus † 17. b. operandi modus † 18. a.  
*Helleboriſmus* melancholicorum † 881. b.  
*Helleboriſmus* veterum † 11. a.  
*Helmſtius* & ejus ſcripta † 27. a.  
*Helmſtius* ceſpirans ſæpe \* 840. a.  
*Helmſtiſtarum* medicina quibus fundamentis nitatur \* 512. b.  
*Hemicrania* cura † 773. a.  
De *Hemicrania* caſus & obſerv. \* 359. a.  
*Epiſthema* in *hemicrania* \* 641. b.  
*Hemicrania* ex calculo renum \* 178. b.  
*Lini*mentum contra *hemicraniam* in odontalgia \* 663. b.  
De *hemicrania* ſcorbutica caſus & obſerv. \* 341. a.  
*Hemiplegia*, *Hemiplegia* quid † 824. b.  
*Hemiplegiæ* tres gradus † 838. b.  
De *hemiplegia*, caſus & obſerv. \* 348. a.  
*Hemiplegia* male ad paralyſin relata † 841. a.  
*Hepatis* ſtructura uſusque 76. a. b.  
*Hepar* aut eſt corpus glanduloſum, aut glandulis analogum 76. b.  
*Hepar* an concurrat ad nutritionem, ſanguificationem &c. \* 825. a.  
*Hepar* non ſanguificat † 140. b.  
*Hepar* vilcus ſumme ſanguineum \* 94. b.  
*Hepati* dicata † 4. b.  
*Hepatica* † 315. b.  
*Hepaticus* pulvis polychreſtus 1005. b.  
Pulvis *hepaticus* rubens *Dreſdenſis* 931. b.  
*Hepatis* diarrhœa † 103. b.  
*Hepaticus* fluxus; veterum opinio de ejus ortu exploſa † 140. b. Diagnos. ejus, Prognos. & cura † 141. b.  
*Hepatis* vitia in Ictero † 444. a.  
*Hepatis* inflammatio, ejus cauſæ, diagnos. † 575. a. ſymptomata ibid. differentia à pleuritide † 565. b. † 575. b. Prognos. † 576. b. differ. à colica † 576. a. Cura † 577. a.  
Conſultatio de *hepatis* inflammatione cum febre ſymptomata \* 281. a.  
*Hepatis* intemperies calida \* 513. b.  
*Hepatis* intemperies frigida Veterum eſt Vitium Bilis 79. a.  
*Hepatica* maculæ earumque cura † 528. b. ſeqq.  
*Hepaticas* maculas curans lotio \* 656. b.  
*Hepatis* obſtructio † 181. a. unde † 90. b.  
*Hepatis* vulnera lethalia \* 35. b. \* 36. b.  
*Hepatici* ductus rami lethaliter vulnerati \* 36. b. v. jecur.  
*Hepata* ſerpentum, viperarum, ranarum † 133. b.  
*Hepatica* v. *Epatica*.  
*Herba* quoad modum creſcendi & uſum quomodo differant 371. b. ſeqq. quoad contemplationem phyſicam quomodo differant 372. b. ſeqq. quoad producta chymica quomodo differant 370. a.  
*Herbarum* ſignatura mendax \* 845. a.  
*Herbis* medicina practica originem debet \* 847. a.  
*Herbæ* alcalinæ inſingentes ebrietatem \* 813. b.  
*Herba* ſiccæ diu aſſervatæ minorem quam recentiores ſalis quantitatem ſuggerunt \* 745. b. v. ſimplicia.  
*Herba Paris*, vid. *Paris*.  
*Herbſt*-*Rosen* 478. a.  
*Hæreditarii* morbi vid. morbi hæreditarii.  
*Hermes* avicula quid? 246. b.  
*Hermodactylus* ejus præparata & uſus 627. b.  
*Hernia* 1016. a quomodo fiat; ejus pars affecta, diviſio, definitio † 172. a. b. duæ primariæ ſpecies ibid. Cauſa & Diagnos. † 173. a. b. Prognos. † 174. a. *Herniæ* ingruens colica & morbus iliacus, aliaque ſymptomata ibid. a. Cura † 1016. a. † 174. b. quomodo inteſtina manu reponenda ibid. b. & induratio eorum tollenda † 175. a. ſubligacula applicanda † 175. b. Cura magnifica † 178. a.  
*Herniarum* curæ fundamentum \* 186. a.

Dolor



# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Dolor circa locum herniosum unde \* 185. b.  
De Hernia casus & observ. \* 425. a.  
Hernia flatulenta, cum cura † 903. b.  
Hernia infantum cum diagnosi † 1084. b. Pro-  
gnosis, cura † 1085. a.  
Hernia inguinalis, v. bubonocoele.  
Hernia inguinalis cum passione hysterica \*  
184. b.  
Fotus in Hernia scroti \* 655. b.  
Hernia testium † 903. b. † 904. a.  
Hernia varicosa medicè considerata † 908. a.  
Hernia varicosa cum scrotali \* 185. a.  
Hernia umbilicalis juncta dolori Hypochondria-  
co \* 177. b.  
Herniaria, ejus præparata & usus 461. a.  
Herpetes. Casus & Observatio de iisd. \* 435. a.  
Epithema contra herpes exedentes \* 642. a.  
Hertzene Angst † 81. b.  
Hertz Gebilte † 1034. b.  
Hertzgespann cum cura † 1077. a. seqq.  
Hertzgespann Kraus 408. a.  
Hertz Wurm † 380. b.  
Heterogenea unde sic dicta. 3. b.  
Heydnisch Wund Kraus 430. b.  
Heyl Wund Holtz 451. a.  
Heiter Tessel 566. a.  
Hyems an infensior corpori quàm ætas \* 227. a.  
v. Hyems.  
Hieracium ejus differentia & usus 461. a.  
Hilaritas melancholicor. † 846. b.  
Hindbeer 325. b.  
Hindläuffee 423. b.  
Hippocratis Scripta à diversis gentibus diversè expli-  
cata 30. a.  
Hippocratis Medicina Chymica \* 510. a. seqq.  
Hircinus sanguis, ejus præparatio & usus 912. a.  
Hirn tobende Sucht † 338. a.  
Hirn Wurm † 763. b.  
Hirsch Brunst 609. b.  
Hirsch Zunge 538. a.  
Hirse Meer-Hirse 485. a.  
Hirsutia ex mensium emansione † 930. b.  
Hirudo ejus usus in Medicina 705. b.  
Hirudines applicandi modus \* 167. b.  
Hirudinum impositio cui usui † 6. a.  
Usus in Cephalalg. † 768. b.  
Usus in delirio melanch. † 873. b.  
Usus in obesitate \* 836. a.  
 Applicatio in hæmorrhoidum fluxu † 174. b.  
Usus in Ischiadico dolore † 782. b.  
Usus in palpitatione cordis † 383. b.  
Hirundo, ejus usus in Medicina 689. a.  
Hispidula, ejus præparata & usus 461. b.  
Hitz / schmoche Hitz / febrilis † 304. a.  
Hohl Geschwür / qualis tumor \* 5. b.  
Hollunder 529. b.  
Hollwurz 391. a.  
Falsche Hollwurz 452. b.  
Homo quatenus dicatur microcosmus \* 227. a.  
Hominis Descriptio Democritea \* 721. b.  
Homo quoad interiora viscera sui, quoad exte-  
riora simi comparatur \* 227. a.  
Post lapsum brutorum rebellionem obnoxius \*  
460. a.  
Hominis sani vivendi ratio ex mente C. Celsi  
142. a.  
quæ ex humani corporis partibus possunt parari  
Medicamenta, & cuius inserviunt 666. a.  
675. b. v. Humanus.
- Homogenea unde sic dicta 3. b.  
Hoppe 476. b.  
Horæ fructuum, & inde paratorum abusus  
† 248. b.  
nocumenta diversa \* 120. b. \* 143. a.  
Fructus horæ quo sensu Diarthe & Cholera  
causa dicendi 365. a. b.  
gravidis non conducunt † 994. b.  
Pelliculæ eorum sunt difficilis digestionis \* 142. b.  
Hordeum ejus præparata & usus 461. b.  
Virtus nutritiva \* 857. b.  
Hordeata quomodo præscribenda \* 632. b.  
Hordeata cur hodie rarius quàm olim adhiben-  
tur \* 652. a.  
Hornium ejus differentia, præparata & usus  
462. b.  
Horrida febris † 288. b.  
Horrores unde \* 573. a.  
Horror febrilis † 246. a. \* 234. a.  
in febricitantibus quid &c. \* 202. a. cura \*  
206. b.  
Horror matris partui ominosus \* 117. b.  
Horror in occurso rei horridæ \* 561. a.  
Horror syncopen inducens † 388. b.  
Horror in peste † 360. a.  
Hüner Biß 384. a.  
Hüner Darm 384. a.  
Hustlactich 556. b.  
Halo animal Succia, insomnia voracitatis concia-  
lians † 836. b.  
Humani calculus ejus usus in Medicina 733. b.  
v. homo.  
Humeri membranz inflammata † 561. a.  
Humida simplicia & medicamenta quæ † 3. b.  
Humidum radicale \* 79. b.  
Humidus fetus quid \* 654. b. v. calidum.  
Humorum in corpore nostro generationis modus  
26. b.  
Humorum in corpore crasis non adeo perspecta  
\* 180. a.  
Humores quibus modis morbidi sunt 135. a. b.  
seqq.  
Humorum alteratio in corpore secundum res  
non naturales † 325. b.  
Humorum coctio quid significet 165. b.  
Humorum cruditas quid 164. b.  
Humorum motus & intestinus & progressivus  
junctim organum humorum constituunt  
\* 577. b.  
Humorum motus est raptus ad caput † 740. b.  
Humorum motus omnes potenter compefcit  
opium † 109. a. eos attemperans 116. b.  
Humorum orgasmus quid \* 576. a. 79. causa  
\* 577. a.  
Humorum secretio dependet à partium pe-  
culiari structura 48. b.  
Humorum stagnatio quomodo contingat \* 3. b.  
via angustæ qd. dicantur \* 4. a.  
crassities quomodo accidat \* 4. a.  
particulæ malè figuratæ per poros transire  
nequeunt \* 4. a.  
Humoribus stagnantibus quomodo motus resti-  
tuitur \* 4. a.  
Turgescencia humorum in quibus affectibus con-  
tingat \* 318. a.  
Turgescencie humorum remedia præcipitanda  
opponuntur \* 578. a.  
Humorum vitia in febr. \* 250. b.  
Hunde Hauptlein † 900. b.

# INDEX UNIVERSALIS

**Hunds-Kopff.** 390. a.

**Hunds-Mücken** 632. b.

**Hunds-Riehe** 508. a.

**Hunds-Zung** 438. a.

**Hungarus morbus** & ejus cura † 338. a.

Casus & obs. de Hungarico morbo \* 380. a.

**Huso & Ichthyocolla** cujus Usus in Medicina 694. b.

**Hydatides** viscerum † 691. a.

**Hydrargyri** inunctio febrem inducens † 251. a.

**Hydroceles**, ejus causæ, diagnosi, cura † 904.

a. b.

Discussa Hydropem pectoris generans † 497. b.

**Hydrocele** infantum † 1084. b. † 1085. b.

**Hydrocephalus**, ejusque tres species exempla † 694. b.

Causæ & diagnosi † 695. b. Prognosis & cura † 696. a.

**Hydrocephali** infantis cura per ligaturam † 438. a.

**Hydrodes** febris † 288. a.

**Hydrops in genere**, & in specie consideratus † 690. b. universalis cum causis † 423. a. b.

quomodo gravidæ ab hydropicis discernantur † 425. b. aquarum hydropicarum considera-

tio † 426. a. Phænomena † 426. a. Diagnosi, prognosi, † 429. a. Cura † 430.

Tam universalis, quam particularis unde \* 3. a.

De Hydropis metu casus & Obs. \* 337. a.

De Hydrope casus & Observ. \* 431. a. b.

Hydropi quâ ratione & alia conducunt, 227. a.

Pilulæ hydropicæ \* 638. a.

Cataplasma contra hydropes particulares \* 658. b.

De Hydrope ascite casus & obs. \* 396. a.

Hydrops imminens in cachexia \* 272. b.

Hydrops imminens ex cachexia scabiola \* 266. b.

Hydrops colliquativus † 428. b.

Hydrops pectoris, ejus causæ & diagnosi † 697. b.

Prognosis & cura † 698. a. b.

Hydrops pericardii † 380. b.

Hydrops pudendorum v. pudendorum hydrops.

Hydropis pulmonum prognosi † 698. a.

Hydrops scorbuticus cum cura † 517. a.

Hydrops siccus Hippocratis quid? 692. b. † 694. b.

Hydropicus tumor uteri \* 432. a.

Hydrops uteri vesicalis † 982. b.

**Hydromelita**, unde ita dicta, & quibus proficua \* 651. b.

Hydromelita præscribendi ratio \* 651. b.

**Hydrophobia**, † 856. a.

qualis affectus † 884. b. ejus origo † 885. cura † 888. b. seqq.

**Hydrotica**, quatuor famosiora \* 652. a.

**Hyeme** cur corpulentiores simus \* 827. a. v. Hiems.

**Hygienes** finis. 143. a.

**Hymen** quid † 928. a.

**Hyoscyamus** 339. b.

ejus differentia, præparata & usus 463. a.

**Hypercatharsis** duobus modis à purgantibus infer-  
tur † 105. a.

De hypercatharsi casus & observ. \* 345. b.

Hypercatharsin excitans vitrum animi. † 12. b.

Hypercatharsicos cura † 107. b. † 108. b. † 112. a. † 117. b.

Hypercatharsis cruenta † 124. a.

cruenta x medicamentorum usu \* 160. b.

**Hypericum** ejus præparata & usus 464. b.

**Hypnotica** † 704. b.

Hypnoticus bolus analepticus \* 634. b.

Hypnotica emulsiō \* 644. b. v. Somnus.

**Hypochondria** eorum consensus cum cute \* 572. b.

Hypochondriorum tactus sensibilior \* 239. a.

Hypochondriorum ligatura non semper lau-  
danda \* 300. a.

Hypochondriorum constrictio in inflammatio-  
ne diaphragm. † 565. a.

Hypochondriorum calcitratio epilepsiæ causa  
\* 301. a.

De hypochondriorum dolore convulsivo casus  
& obs. \* 338. a.

Hypochondria tensa & dolentia in stomachi in-  
flat. \* 134. a.

De Hypochondrii puerp. dolore casus & observ.  
\* 350. a.

In hypochondriorum astu bolus alterans  
\* 634. b.

Consultatio de suffocatione hypochondriaco-  
splenetica \* 317. a.

Hypochondrii dextri dolor in hepatis inflam-  
m. cum febr. symptom. \* 281. b.

Hypochondrii dextri linea ex rubro nigricans  
cum vesiculis elatis in inflam. hepatis †  
576. a.

Hypochondrii dextri dolor punctorius in hepa-  
tis inflammatione † 575. b.

Hypochondrium sinistrum ex concussione cum  
pede malè læsum \* 358. b.

Hypochondriorum infantum inflatio & tensio  
\* 1077. b. causa, diagnosi, cura † 1078. a.  
\* 537. a. \* 549. a.

**Hypochondriaca** tensiones † 804. a.

**Hypochondriaca** melancholia casus & observ. \*  
378. a. \* 415. a.

**Hypochondriaci** cur inquietas noctes ducant \*  
204. b.

Hypochondriacis hæmorrhoides facile fluunt  
\* 140. a.

Hypochondriacorum consuetudinem deliria me-  
lancholica \* 106. b.

Hypochondriacorum palpitatio cordis & seqq.  
† 381. b.

**Hypochondriacus** dolor s. malum. Vocis etymon \*  
773. a. † 155. b. † 156. a. b. † 159. b. \* 682. a.

Synonymia ibid. b.

Definitio \* 774. a.

An etiam veteribus hic morbus cognitus † 478.  
a. \* 774. a.

Pars affecta † 478. a. b. \* 681. a. \* 774. a.

Causæ † 481. a. \* 686. a. \* 775. a.

Symptomata † 479. a.

Differentiæ, signa diagnostica, Prognosis †  
487. a. b. \* 689. b. \* 777. a. Signum cer-  
tissimum † 196. b. Dolores hi quomodo exa-  
ctè discernendæ \* 297. b.

Curatio † 489. a. seqq. \* 690. b. seqq. \* 777. b.  
\* 890. b. sequ.

De malo Hypochondriaco casus & observ.  
\* 345. b. \* 361. a. \* 370. b. \* 386. a. \* 427. b.

Hypochondriacus dolor colicus fixus per acci-  
dens convulsivus &c. \* 160. a.

Hypochondriacus dolor cum Hernia umbilicali,  
consultatio \* 173. b.

Antihypochondriaca † 3. a. † 7. b.

Hypochondriacis conducentia in anxietatibus ex  
stomacho \* 205. a.

Anti-Hypochondriaca cerevisia \* 649. b.

Digestiva potio ante purgationem in affectu hy-  
pochondr. \* 640. b.

Anti-hypochondr. electuarium \* 635. a.

Hypo-

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

Hypochondriacæ affectioni convenit infusio  
 \* 501. a.  
 Infusum passulatum laxativum pro hypochon-  
 driacis \* 642. b.  
 Mixtura anti-hypochondriaca 934. a.  
 Nodulus anti-hypochondriacus \* 647. b.  
 Pilula anti-hypochondriacæ \* 638. a. \* 639. a.  
 Hypochondriacis hauriendus potus medicatus  
 \* 649. a.  
 Anti-hypochondriacus laxans pulvis \* 632. b.  
 Hypochondriacis fortiter olentia non conveni-  
 unt † 384. a.  
 Hypochondriacis non confert chirurgia transfu-  
 soria \* 105. a.  
 Hypocistis cuius usus 584. b.  
 Hypogastrica regionistenio † 804. a.  
 Hypogastricæ regionis puerperæ dolor: casus &  
 observatio \* 365. b.  
 Hypopium, ejus diagnosi & cura † 725. a.  
 Hyssopus ejus præparata & usus. 465. b.  
 Hysterica passio † 962. b. Historia hujus affectus  
 † 963. a. causæ † 964. a. Symptomata & tres  
 gradus † 964. a. modus fiendi † 967. a. ordo  
 fiendi & symptomata † 967. a. Diagnosi †  
 968. b. Signa quibus hysterica mulieres à ve-  
 re mortuis discernantur † 969. a.  
 Differentia à syncope, apoplexia &c. † 831. b.  
 † 969. a.  
 Quomodo differat à colica virorum \* 179. b.  
 Prognosis † 969. a.  
 Cura † 969. b. recidiva quomodo præcaveatur.  
 † 973. b.  
 Hysterici dolores unde † 156. a. † 159. b. \* 290. a.  
 De Hysterica passione casus & obs. \* 343. a.  
 \* 345. b. \* 364. b. \* 423. a. \* 433. a. b.  
 \* 434. a.  
 Hysterica passio cum bubonocoele \* 185. a.  
 Hysteri corum paroxysmorum ex esu dulcium cu-  
 ra \* 185. b.  
 Hystericæ passioni superveniens icterus \* 106. a.  
 Hysterica passio ex medicamentorum usu \* 160.  
 b.  
 Hysterica passio nephritica † 636. b.  
 Hysterica suffocatio. Consultatio de ea † 192. b.  
 \* 317. a.  
 Anti-hysterica † 7. b.  
 Clyster stimulans in hysterica passione \* 659. b.  
 Emplastrum ad passionem hyst. \* 664. b.  
 Hystericæ affectioni conducit infusio \* 501. a.  
 Hystericis fortiter olentia non conveniunt † 384. a.  
 Potio in hysteris doloribus \* 306. b.  
 Anti-hysterica vis spermatis ceti \* 703. b.  
 Remedium contra hystericos paroxysmos \*  
 867. b. V. passio Hysterica.

1.

**Jacea**, ejus usus 466. a.  
**Jalappa** ejus præparata & usus 628. a. † 15. a.  
 modus operandi & utendi † 15. b. usus in  
 crudis. nidor. \* 130. a.  
**Jammer** oder fallende Sucht \* 780. a.  
**Jasminum** ejus præparata & usus 466. b.  
**Jechthocolla** ejusque usus Medicus. 694. b.  
**Jlericia alba** mulierum † 958. a.  
**Jlerno flavus**, niger & albus, ejusque historia †  
 442. a.  
 Ictericorum sanguis qualis 227. b.  
 Ictericorum Urinae undecumque varia 227. a. b.

tres occasiones ad icterum disponentes † 445. a.  
 Symptomata ibid. b. Pars affecta † 447. b.  
 Quotuplex & quomodo differat. 227. a. † 442. b.  
 Primarius, secundarius \* 106. a. circa primum  
 observanda ibid. plumbeus, viridis † 442. a.  
 Causa efficiens est acidum vel solum, vel cum  
 bile junctum. 228. a.  
 Diagnosi & prognosi † 448. a. b. Cura † 449.  
 a. seqq. nigri in specie cura † 455. a.  
 De Ictero casus & observ. \* 357. b. \* 375. b.  
 \* 431. b. \* 432. a.  
 De Ictero flavo casus & observ. \* 342. a.  
 Icterus cum febre † 252. b.  
 Icterus cum obstructione pori choledochi † 121. a.  
 Anti-icterica † 3. a.  
 Balneum in Ictero \* 656. a.  
 Ictericis non confert Chirurgia transfusoria \*  
 105. a.  
**Illu** animalium venenatorum lethales 473. a.  
**Idearum** natura considerata \* 797. b.  
 Idealis proprietas \* 117. b.  
 Idearum præsentia & directrix vis \* 470. b.  
 Idea Helmontii quid dicatur & ejus explicatio  
 22. a. b.  
 Remedia Idealia Helmontii 153. a.  
 Quomodo ideæ peregrinæ ac morbosæ intra  
 corpus receptæ tamdiu in eo latere queant \*  
 800. a.  
 Idealis imaginatio an delirii causa † 856. b.  
 Idearum imaginativarum cura \* 808. a.  
 Ideæ melancholicorum † 865. a. b. 867. a.  
**Idiosyncrasia** unde proveniunt. 125. b.  
 Idiosyncrasia praxin reddit difficilem \* 118. b.  
 Idiosyncrasia individuorum in quo consistat &c.  
 \* 117. a. v. proprietas. ejus fundamentum  
 \* 118. a.  
**Idiota** experimentis contenti \* 845. a.  
 non admittendi in laboratoria \* 673. a.  
**Jelänger je leber** 407. b.  
**Jeligationes** infantum † 1075. a.  
 Jecigationum in variolis & morbillis cura \* 257.  
 a. † 353. a.  
**Jecur** (v. Hepar) ejus cavum consentit cum cute  
 \* 572. b.  
**Jesuni** facilius afficiuntur à morbis malignis †  
 363. b.  
**Jesuni** ita prolapsus † 172. b.  
**Jgnis** quid 7. a. 8. a. 859. a.  
 est destructor texturæ concretorum specificæ ac  
 virtutum rerum seminalium \* 123. a.  
 non est calidus in corporibus nostris, nisi à suis  
 particulis mistus \* 555. a.  
 Igni non inest acidum, & quid sit \* 65. a.  
**Jgnis sacer** v. Erysipelas.  
**Jgni Venæris** multum tribuitur \* 79. b.  
**Jgnora** actionis Regimen Helmontii quid? \* 179. a.  
**Jleus** imminens in obstructione alvi, cum hæmoe-  
 rhoidibus apertis \* 139. b.  
 Ileus ex omphalocoele curatus † 101. a.  
**Jlia** suspensa in stomachi inflat. \* 134. a.  
**Jliaci** dolores unde \* 290. a.  
 quales † 155. b. Cura † 171. a.  
 De Jliaci passione casus & obs. \* 396. b.  
 Jliacum malum ex colica † 161. b.  
 Jliacus dolor junctus colicæ hypochondriacæ hu-  
 morosæ \* 169. a.  
 Jliacus dolor cum epilepsia \* 178. a.  
 Jliaca passio in scorbuto † 507. b.  
 v. passio iliaca.

L. 2

Jliacus



# INDEX UNIVERSALIS

- Iliacus ramus cruralis* v. *cruralis ramus iliacus*.  
*Imago* quid † 794. a.  
*Imaginationis vires* \* 782. a.  
*Imaginationis vis* ad cutim se extendens \* 561. a.  
*Imaginatio* ægri quomodo à Medico fallenda in præscriptione formul. \* 629. a.  
*Imaginatio idealis* an delirii causa † 856. b.  
*Imaginatio multum* valet ad conciliandam febrem † 249. b.  
*Imaginationis maternæ vis* † 856. b. † 988. a.  
*Imaginatio matris partui* ominosa \* 117. b.  
*Imaginationes melancholicorum* † 864. b. v. *Phantasia*.  
*Imaginationis vis* in peste † 359. a.  
*Imaginationis vis* in impotentia virili † 916. b.  
*Imaginationis vis* in generandis pravis affectibus † 701. b.  
*Imaginatio rei horrendæ Syncopen* inferens † 389. a.  
*Imaginativarum idearum natura* \* 798. b. cura \* 808. a.  
*Imbecillitas* v. *virium prostratio*.  
*Immersio* v. *aqua*.  
*Imperatoria*, ejus præparata & usus 466. b.  
*Impetigo*, cum cura † 525. a.  
*Impossorum fortuna* præ rationalibus medicis \* 680. a.  
*Impotentia virilis* ejusque causæ † 899. a. † 916. a. Diagn. progn. cura † 917. a. seqq.  
*Inappetentia* † 28. a. v. *Anorexia*.  
*Incandescencia* emaciat \* 832. b. v. *ira*.  
*Incantationis cura* † 894. b. v. *veneficium*, *fascinum*.  
*Incendia Hæclæ, Vesuvii, Ætnæ* \* 445. a.  
*Incidentia* † 4. a.  
*Incidens hydromel pectorale* \* 651. b.  
*Incineratio & Calcinatio* quomodo differ. 266. a.  
*Incrassantia* † 4. a.  
*Incubatio ovorum* considerata \* 769. a.  
*Incubus* quid? † 709. b. † 212. a. Causæ ejus & fiendi modus † 212. b. divisio in habituales & accidentales † 213. a. etiam vigilantibus obveniens observatus † 213. b. seqq. Pars affecta † 213. b. symptomata ibid. unde imaginatio compressionis † 214. a. Maculæ unde † 214. b. epidemicus † 214. b. affectus medius inter incubum & epilepsiam † 214. b. Incubi diagn. progn. cura. † 215. a. seqq.  
*Incubus* in asthma humido stomachali, consultatio \* 192. b. seqq.  
*De in cubo casus & observ. duplex* \* 419. a.  
*Incurabilis* v. *curatio*.  
*Indianisch Blat.* 477. b.  
*Indicans* quid 145. a.  
*Indicatio* quid. 144. b.  
*Indicationes morborum* à Medico observandæ, \* 669. a.  
*Indicatum* quotuplex 145. a.  
*Quomodo ex indicante cognoscendum.* 145. a.  
*Individua* curat medicus, quorum cuilibet sua singularis proprietas \* 117. a.  
*Individua mundi corpora* non habent finium suorum præcognitionem, nec casus sibi imminentes prævident \* 742. a.  
*Inedia* agripiam inducens † 703. a.  
*Inedia* superveniens hæctica † 312. b. v. *fames*.  
*Infantes* cur corpulentiores \* 827. a.  
*Infantum morbi* v. *morbi infantum*.  
*Infantum peculiaris idiosyncrasia* à parentibus transplantata, à nutricibus neglecta, graviter tenellos lædit † 1067. b.  
*In infantibus recens natis difficilis & inutilis est infusio* \* 509. b.  
*Infans post partum non sufficienter purgatus* \* 361. b. plane non purgatus \* 365. b.  
*Infantes vermibus laborantes.* vid. *vermes*.  
*Pro infante vomitorium.* vid. *Vomitória*.  
*Infantile valetudinarium* \* 524. a. v. *nutritio*, *morbus* &c.  
*Casus & obs. de morbis infantilibus* \* 393. a.  
*Infantum regimen* † 1061. a.  
*Infectiones contagiosæ* quomodo fiant † 320. b.  
*Infectionis contagiosæ signa* \* 245. a.  
*Infectio pestilentialis* † 359. b.  
*Inflammationum theoria* proposita \* 276. b.  
*Inflammationum ortus, fiendi modus* \* 108. a.  
*Inflammatiō in genere ejus causæ* † 532. b. Dolor in ea triplex † 532. b. sq. Divisio † 535. a. symptomata † 535. a. Diagn. ibid. Progn. ibid. b. Cura † 536. a. seqq.  
*An sanguis sero destitutus inflammationem in motu suo cessans concipere queat* \* 277. a.  
*Inflammationum Symptomata* magis intenduntur à sanguine arterioso, quàm venoso † 515. b.  
*Ardor inflammationum* unde † 535. a.  
*Inflammationes febriles* † 244. a.  
*Inflammationes febriles mitigantia* † 303. b.  
*Inflammationibus febrilibus conducit infusio* \* 509. a.  
*Inflammatiō intestinorum, ani, &c. &c.* v. *Intestinorum, ani &c. &c. inflammatiō*.  
*Inflammatiō in peste* † 362. a.  
*Inflammationes ex stagnatione humoris morbo- sa* \* 3. a.  
*Partium externarum, earum causæ, Prognosis, cura* \* 10. a. b.  
*Inflammatiō ex sanguinis stagnatione* † 6. a.  
*Inflammatiō stuporem & tumorem partis inducens* \* 281. b.  
*Inflammatiō vulnerum* \* 52. b. ex luxatione \* 67. b. \* 68. a. ex fractura ossium \* 71. a.  
*Inflammationum febrilium, in vulneribus, ulceribus &c. origo* † 244. a.  
*Cataplasma in Inflammationibus* \* 657. b.  
*Decoctum ad Inflammationes &c.* \* 654. b.  
*Emplastrum contra inflammationes* \* 658. b.  
*Inflammationibus nil confert Transfusio sanguis.* \* 108. a.  
*Inflatio abdominis* v. *abdomen*.  
*Inflatio crurum* v. *crurum tumor*.  
*Inflatio præcordiorum & hypochondr. infan- rum* unde \* 537. a. cura \* 549. b.  
*Inflatio stomachi* \* 132. b. v. *status stomachi*.  
*Rotulæ contra inflationem ventriculi* \* 636. a.  
*Influxus signorum cælestium* \* 440. a. \* 442. a. v. *Astralis influxus*.  
*Infecundus* v. *sterilitas*.  
*Infusa* præscribendi modus & formulæ \* 645. b. \* 649. a. \* 650. b. parandi modus 831. a. 833. b.  
*Infusa fermentata parandi ratio* \* 649. b.  
*Communissimus usus infusorum* \* 659. a.  
*Infusorum pro usu externo præscribendi ratio* \* 654. a.  
*Infusionis sanguinis inventio* \* 85. b.  
*Infusoria Chirurgiæ historia* \* 478. a. Definitio ibid.

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- ibid. est inventum novum \* 479. a. Auto-  
res, qui primi eam exercuerunt ibid. Tenta-  
mina in canibus aqua simplici, vino, pur-  
gante &c. \* 480. a. Tentamina in Catello,  
homine \* 482. a. Modus operationis \* 482.  
b. operationis facilitas \* 483. b. finis hujus  
artis \* 483. b. præsupponendorum confide-  
ratio \* 484. b. seqq. Ejus usus \* 491. a. lqq.  
necessitas ibid. b. applicandi tempus, status  
morbi \* 492. a. liquores infundendi vel non  
\* 493. b. opiata in principio sunt infunden-  
da \* 497. a. in affectibus subitaneis est opti-  
ma, & in quibus? \* 497. a. an conducat  
gravidis & recens natis infantibus \* 509. b.  
Infusoria chirurgiæ Majoris fundam. † 321. b.  
Infusionis usus in apoplexia \* 498. a.  
Usus in Ictero \* 506. b.  
Usus in Phthisi \* 507. a.  
**Ingenium** quodvis constituit Imaginatio judicium  
& Memoria 103. a.  
Ingeniorum varietas quomodo dependeat à Spi-  
ritibus 103. b.  
vid. Spiritus animales.  
**Ingesta** v. Assumpta.  
**Ingluvies** quam noxia \* 818. a.  
**Ingravitationis** signa † 929. a. b.  
**Ingredientia** medicamentorum compositorum \*  
627. a.  
**Inprimis** 560. a.  
**Ingruunt** † 172. b. Inguinalis hernia ibid. & seq.  
v. Hernia inguinalis.  
Inguinum puncturæ in peste † 361. a.  
**Ingwer.** Teutscher Ingwer 392. b.  
**Injectionum** S. enematum usus & præscribendi ra-  
tio \* 659. a.  
Injectiones in vulnera, ulcera &c. \* 661. a.  
**Inquieta** nox ex cæna largiori † 81. b.  
**Inquietudo** in febr. mal. perech \* 245. b.  
Inquietudines ex affectu stomacho \* 133. b.  
Inquietudo infantum † 1075. a.  
**Insania** † 877. b.  
**Insecta** eorum præparata & usus 324. b.  
Multum præstant in Medicina propter **Volat-**  
tile 698. a.  
Insectorum multitudo an signum imminuentis  
pestis † 360. b.  
Insectorum vita media † 386. b.  
**Insectus** præscribendi ratio \* 656. a.  
Insectuum usus in mensibus suppressis † 932. b.  
usus in spasmodis abdominis \* 291. b.  
**Insipidum** quid Hippocrati \* 518. a.  
Insipida menstrua \* 516. b.  
**Insomnia** mira expelle animalis, hulo dicti † 836.  
v. Somnia.  
**Inspiratio** quid? \* 722. b. Principia \* 723. a.  
quomodo fiat 70. a.  
Inspiratum aerem temperans narium meatus \*  
199. a.  
**Intemperantia** morborum genitrix 847. a.  
v. ingluviens.  
**Intemperiei** inæqualis vera causa & radix in sto-  
machi cavo \* 513. b.  
Intemperiei morbi quales 134. b. seq. \* 100. b.  
Intemperies calida quid 176. a.  
Intemperiei calidæ causa an semper sit sanguinis  
tumor 176. b.  
Intemperies frigida unde 177. a.  
Intemperies humida unde 177. a. b.  
Intemperies sicca unde 177. b.  
Intemperiei sicca cura 178. a.  
Intemperies partium explosa † 242. b.  
Intemperies viscerum inæqualis; quid habен-  
dum de ea \* 513. b. (b.  
**Intentionalis** sive idealis entitas an delirii causa † 856.  
Intentionales Species veterum \* 470. b.  
**Intermittens febris.** v. Febris interm.  
**Intertrigo infantum**, cum cura † 1081. a. b. \* 544.  
\* 554. a.  
De Intertrigine Casus & Obs. \* 337. a.  
Pulvis ad intertriginem \* 633. b.  
**Intestinorum** divisio in tenuia & crassa \* 161. a.  
Intestinorum motus peristalticus quid sit. 60. a.  
\* 157. a.  
Intestinorum motus peristalticus inversus †  
96. b.  
Intestinorum situs mutatus † 172. a. situs natu-  
ralis quis ibid. v. Hernia.  
Intestinorum caruncula quid † 126. a.  
Intestinorum mucus quid sit & ejus usus 60. a.  
Intestinorum mucum & visciditatem abster-  
gentia † 121. b.  
Intestinorum contenta præternaturalia † 153. a.  
Intestina a quo stimulentur ad expulsionem fœ-  
cum alvinarum 59. b.  
Intestinorum coactio, erosio, cicatrix † 98. a.  
† 121. b.  
Intestinorum coalescentia quomodo præpedia-  
tur in dysenteria \* 158. b.  
Intestina an convolvantur † 97. b. descensus uni-  
us in alterum, 97. b.  
Intestinorum convulsio in infantibus † 1075. a.  
Intestinorum descensus in hernia \* 185. a.  
Intestinorum descensus in scrotum † 904. a.  
Fotus pro intestinis in scrotum delapsis \* 655. b.  
Intestinorum dolores varii convulsiones ac spasmi  
† 155. a. eorum causæ, differentia † 155. a.  
† 160. a. b. in statu naturali indolens & in-  
sensibilis est intestinorum actio † 155. a. tormi-  
na & dolores humorosi, convulsivi; fixus  
perterebans, pungens, distendens, rodens,  
contundens, gravans, pulsans † 156. b. Sym-  
ptomata † 157. b. (v. Colica.)  
Intestinales dolores quomodo sistendi \* 171. b.  
Intestinorum status v. status intestinorum.  
Intestinorum hæmorrhagia † 140. b.  
Intestinorum inflammatio ejusque causæ, Dia-  
gnosis † 553. b. Prognosis & cura † 554. a.  
Intestinorum inflammatio an à fœtu cum indu-  
ratione vel contra † 98. a.  
Intestinorum inflammatio non confundenda  
cum inflammatione mesenterii † 558. a.  
Intestinorum inflammatorum tumor † 553. b.  
Lumbrici intestinorum an alicujus usus 707. b.  
Intestinorum prolapsus, vid. Hernia \* 174. a.  
Intestina prolapsa infantum † 1085. b.  
Intestinorum spasmi in colica \* 178. a. b.  
Intestinorum vulnere lethalitas \* 36. b.  
Intestinis inimicissima sunt frigus & acidum  
† 124. a. v. viscera, alvus &c.  
**Intestini recti** stimulus in excernendis fecibus † 155. a.  
prominentia & extrusio † 178. a.  
vulneratio quatenus minus lethalis \* 36. b.  
**Intestinis tenuibus** affectis dolores magis exasper-  
rantur quam affectis crassis \* 140. a.  
**Inventa** posteritati non communicare, invidi ho-  
minis est \* 677. a. b. seq.  
**Invertentia** † 3. b. \* 589. a. vid. Absorbentia.  
**Invidia** empiricorum &c. \* 677. a. seqq.

M

Imm-

# INDEX UNIVERSALIS

- Inunctionum** præscribendi modus \* 661. a. basis & ingredientia ibid.  
 observanda circa inunctiones \* 665. b.  
 Inunctionum usus \* 665. a. v. Unguentum.  
 Inunctiones mercuriales † 463. a.  
**Johannes Brod** 543. b.  
**Johannes Kraut** 464. b.  
**Joviales** fumi ad epilepsiam disponentes † 808. b.  
**Ira** vis & venenum \* 472. a.  
 Iracundia movet contenta corporis \* 216. a.  
 Iracundorum robur † 879. a.  
 Casus & Observ. de Ira \* 372. b.  
 Observ. de Symptomatibus ex Ira variis \* 391. a.  
 Iracundia abortus causa † 1011. a.  
 Ira atrophiam concilians † 395. b.  
 Iracundia choleram inducens \* 149. a.  
 Ira ad Colic. convuls. disponens \* 180. b.  
 Iracundia febrem continuam ardentem inducens \* 213. b. seqq.  
 Ira maciem inducit \* 832. b.  
 Ira melancholicorum † 864. b.  
 Ira à gravidis fugienda † 995. b.  
 Ira Syncopen inducens † 388. b.  
 Ira ortam alterationem mitigans † 393. a.  
**Iris**, ejus differentia, Præparata & usus 466. b.  
 Iris nostras, ejus usus. 874. b.  
**Irritari** quid \* 137. b.  
**Ischiadicum malum** Casus & Observ. \* 360. a.  
 Ischiadici doloris symptomata † 774. a. ejus cura † 782. a.  
 Dropax contra Ischiadicum dolorem \* 665. a.  
**Ischuria** qualis affectus, quoruplex † 625. b.  
 De Ischuria casus & Observatio \* 352. b. \* 361. b. \* 435. a.  
 Balnei & lotionum usus in Ischuria \* 718. b.  
 v. Urinæ suppressio.  
 Ischuria infantum. v. Urinæ suppressio.  
 Ischuriæ renalis causæ † 626. a. Diagnos. † 627. b. Symptomata † 628. a. Prognosis † 628. a. Cura † 629. a.  
 Ischuria vesicalis ejusque causæ † 656. a. Diagnos. prognos. cura † 658. a. b.  
**Isop** 465. b.  
**Judaicus Lapis**, ejusque usus in Medicina 735. b.  
**Juden** Kirschen 381. a.  
**Judicii** amissio † 852. b.  
**Joven** Kraut 416. b.  
**Juglans** ejus præparata & usus 467. b.  
**Jugularium venarum** ligatura, sanguinis motum ad cerebrum impediens † 825. b.  
**Juguli** inflammatio † 561. a.  
 Jugulum petens dolor in inflammatione hepatis † 575. b.  
**Jujube** earum præparata & usus 468. a.  
**Juleporum** præscribendi ratio & formulæ, inventio eorum &c. \* 643. a. b.  
 Juleporum parandi modus 831. a. 833. b.  
 Notanda circa liquores adhibendos in Juleporum præparatione \* 644. a.  
 Julepi instar usurpandum decoctum \* 650. b.  
 Julepia per modum infusi magistralis præscripta \* 644. a.  
 Julepia hordeata præscribendi ratio \* 652. a.  
 Julepus ex conservis \* 644. a.  
**Juniperus**, ejus præparata & usus 469. a.  
 Juniperi usus antipestifentialis † 370. a.  
**Juscula** medicata ac restaurantia parum curat medicina \* 631. b.  
**Juvenes** vires debilitatæ non commodè possunt restitui \* 99. a.
- Juveniles vires** senibus restituens transfusio \* 57. a.
- ## K.
- Kahn** unde \* 84. b.  
**Kalbs Nasen** 390. a.  
**Kalter Brand** \* 75. a.  
**Kannen Kraut** 443. a.  
**Kædia** quid † 82. a. \* 133. b.  
**Kägen-Münze** 491. b.  
**Kägen Zahl** 443. a.  
**Kehl** / in die unrechte Kehl kommen \* 189. a.  
**Kerbel** 415. a.  
**Keusch Baum** 381. a.  
**Keusch-Lamm** 381. a.  
**Keyri** v. Cheyri.  
**Kieffern** 505. a.  
**Kienholz** 305. b.  
**Kéla** v. Hernia.  
**Kinder-Wehe** \* 780. a.  
**Kispeukéla** † 908. a.  
**Klaesch Rosen** 500. a.  
**Kleckbruch** in vulnere sclopetorum \* 47. b. in fractura ossium \* 70. b.  
**Klee** / Sommer-Klee 379. a.  
**Kleinen Gedders Verstopfung** † 478. a.  
**Kletten** / grosse Kletten 396. b. 397. a.  
**Klingen** der Ohren † 739. a.  
**Klóis** quid † 802. a.  
**Knaben-Kraut** † 900. b.  
**Knoblauch** 383. a.  
 Wasser-Lachen-Knoblauch 338. a.  
 Knoblauch-Kraut 382. b.  
**Königs-Hertz-Blume** 557. a.  
**Kopfs Auschlagen** vid. Tinea.  
**Korn-Blume** 436. b.  
**Kost-Kraut** 983. a.  
**Krampf** qualis affectus † 802. b. † 819. b.  
**Kräuter-Bier** / **Kräuter-Wein** \* 649. a.  
**Krebs-Butter** † 317. a.  
**Kröpfe** / eorumque cura chirurgica \* 22. b.  
**Küchlein** / præparandi modus \* 636. a.  
**Kugellack** 584. b.  
**Kühlender Alterativ-Trancé** \* 650. b.  
**Kühl-Julep** / \* 643. b.  
**Kümmel** / **Möhren-Kümmel** 440. b.  
**Königwids-Kraut** 444. b.
- ## L.
- Labia**, Eorum diductio in epilepsia unde \* 301. a.  
 Labiorum spasmus † 47. b.  
**Labia pudendorum** in gravidis inflata & aquis plena † 1006. b.  
 Labiorum pudendi fissuræ in parturientibus † 1041. a.  
**Labor** nimius abortus causa † 1011. a.  
 v. exercitium.  
**Lac animalium**. Vid. Animalia.  
 Lac cur album \* 151. b. cæruleum \* 152. b.  
 Lac unde generetur. 62. a.  
 Lactis materia chylus \* 824. a.  
 Lac egregiè nutrit \* 827. b.  
 Lactis usus 1003. a.  
 usus in calculo renum † 638. b. † 646. a.  
 Lac ad atrophiam an conducatur \* 127. b.  
 Lactis usus in dysenteria, correctio in metu coagulationis, præstantius cum decoctis in ea appropriatis † 134. b.
- usus



# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- usus in phthisi pulmonali \* 161. a.  
 usus in icorbuto † 492. a. † 502. b.  
*Lacinebrians* \* 810. a.  
*Lac* dissolvens sperma ceti \* 704. b.  
*Lactis* asinini, caprilli, bubuli, usus \* 142. b.  
*Lac* coagulatum syncopen concilians † 389. a.  
*Lactis* equini usus in atrophia ex phlegma \* 827. b.  
*Lac* equinum Tartarorum potus, & ejus præparatio, vires \* 520. b.  
*Lac mammarum* quid † 1065. b.  
*Lactis* muliebris examen † 1062. a.  
*Lactandus* infans à matre porius quam nutrice † 1062. a.  
*Lac* matris quare non omnes infantes æquè perferre possint \* 527. b.  
*Lac* infantum nutrimentum \* 526. a.  
 Cur cacochymicæ & scorbuticæ, quos in utero feliciter gestarunt, optimè lacteo nutrimento aluerunt fœtus editos citra periculum lactare nequeant † 1063. a.  
*Lactis* vitia alieni \* 529. b. an loco lactis aliud nutrimentum conveniat \* 530. b. † 1066. a.  
*Lactis* morbofi vitia \* 531. a.  
*Lactis* vitia nimis nutritivi \* 531. b. † 1066. b.  
*Lactis* superflue ingesti vitia \* 532. a.  
*Lactis* per malam dietam depravatio \* 532. a. quoad assumpta ibid. quoad animi pathemata \* 533. a. quoad excreta ibid. b.  
*Lactis* muliebris vitia † 1048. a. † 1065. b.  
*Diversitas* † 1065. b.  
 morbosum † 1066. b.  
 nimis nutritivum † 1066. b.  
 superflua & inordinata lactatio † 1067. a.  
*Dietæ* perversa depravatum † 1067. a.  
 Cura † 1069. a. seqq.  
 De lactis alteratione post terrorem casus & observ. \* 350. a.  
*Lac* muliebre egregiè nutrit &c. armat in Venereum \* 827. b.  
*Lactis* vitiosæ alterationes corrigentia \* 545. b.  
*Lactis* muliebris abundantia, ejus causæ, Diagnofis, prognofis, cura † 1050. a. b.  
 De lactis abundantia casus & obs. \* 341. a.  
*Lactis* muliebris coagulatio, ejus causæ, diagnofis † 1052. a. Prognofis, cura † 1053. a.  
*Lac* in mammis induratum &c. in non lactantibus &c. \* 331. b.  
*Lactis* muliebris defectus, ejusque causæ † 1048. a. Diagnofis, Prognofis, Cura † 1049. a. b.  
 Anxietas ob lactis effusionem in mammis rapidiorem \* 134. a.  
*Lac* in mammis concreverit tumoris causa \* 3. a.  
*Lacca* ejus præparata & usus 584. b.  
*Lacca* florentina quid, ejus præparatio 264. b.  
*Lacertus* cujus usus in Medicina. 706. a.  
*Lacrymalis caruncula* quid † 589. b.  
*Lacrymantium* in morbis acutis prognofis † 591. b.  
*Lacrymarum* in ophthalmia differ. † 590. a.  
*Lactantium* vitia † 1048. a.  
*Lactantium* abcessus † 1054. a.  
*Lactantes* cur rarò concipiant † 985. a.  
*Lactatio* laxa † 1059. a.  
*Lactea* dieta in variis morbis \* 105. b. seqq. \* 110. b. \* 111. b. \* 652. a.  
*Dietæ* lactea, sudorifera \* 652. a.  
*Lactea* febris puerperarum † 1044. a. v. febris lactea.  
*Lactentis* peste infecti prognofis † 363. a.  
*Lactinia* bilem gignentia \* 152. b.

- Lacticiniorum* usus, & observanda circa eum † 316. b.  
 usus in arthritide † 775. b.  
 usus in ophthalm. † 593. b.  
 usus in phthisi † 402. a.  
*Lacerans* dolor † 746. a. † 750. b.  
*Laceratio* ab urso \* 359. b.  
*Laconica balnea* præscribendi ratio \* 657. a.  
*Lactuca* ejus præparata & usus 470. b.  
*Lactumina* infantum † 1097. b. seqq.  
*Ladanum* ejus præparata & usus. 585. b.  
*Lähmung* qualis affectus † 841. a.  
*Lasiones* exiguae partium continentium \* 806. a.  
*Lasionum* in externis partibus curandi ratio \* 808. a.  
*Latitia* cur se exerat in stomacho \* 137. a.  
*Lagopus* an sit usus Medici. 470. b.  
*Lancinans* dolor † 746. a. † 750. b.  
 Lancinatio in febr. catarrh. † 304. b.  
*Langor* universalis in cholera \* 150. b. v. virium prostratio.  
*Lapathum* ejus differentia, præparata & usus 470. b.  
*Lapides* 69.  
 Lapidum origo est ex fluido 722. b.  
 Lapidum an omnes ex aqua generentur. 722. b.  
 Lapidum differentia quatuorplex 721. a.  
 Lapidum perspicuorum & gemmarum fundamentum est crystallus. 721. b.  
 Lapidum & Gemmarum usus Medicus qualis. 723. a.  
 Lapidum quinque pretiosorum fragmenta in officina quid præstent. 723. a.  
 Lapis Armenus cujus usus in Medicina 730. b. v. armenus lapis.  
 Lapis Calaminaris, vid. Calaminaris lapis.  
 Lapis Calcarius, vid. Calcarius lapis.  
 Lapidis infernalis genuina Præparatio. 755. b.  
 Lapis Judaicus, vid. Judaicus lapis.  
 Lapis Lazuli, ejusque usus 730. b. v. Lazuli lapis.  
 Lapis Lynceus, vid. Lynx.  
 Lapis microcosmicus antipestilentialis † 371. a.  
 Lapis Nephriticus, vid. Nephriticus lapis.  
 Lapis Philosophorum, vid. Philosophorum lapis.  
 Lapis serpentinus unde, ejus usus \* 48. b.  
 Lapis spongiæ, vid. spongia.  
*Lapidiformes* arbores, frutices, Corall. &c. \* 449. a. seqq.  
*Lapilli cancerorum* chirurgorum debent esse arcuum \* 6. a.  
 Lapilli in corde † 382. a.  
*Larix*, cujus usus 471. a.  
*Laryngis* inflammatio † 538. b.  
 Laryngis convulsio ex guttula, mica panis &c. † 237. a.  
 Laryngis musculi quomodo irritentur \* 189. a.  
 De Laryngis tumore casus & observat. \* 364. b.  
*Lassitudo* artuum in tertiana mal. \* 207. a.  
 Lassitudo in febr. catarrh. † 304. a.  
 Lassitudo in febr. contin. lenta \* 233. b.  
 Lassitudo in febr. mal. † 317. b. seqq.  
 Lassitudinis in morbo maligno causa \* 243. a.  
 Lassitudo in lue venerea † 455. b.  
 Lassitudo ulceroſa in cholera \* 150. b. v. virium prostratio.  
*Laterum colicorum* usus in soda \* 637. a.  
*Latus affectum* & difficilis decubitus in eo in inflammatione hepatis † 575. b. \* 282. a.

# INDEX UNIVERSALIS.

*Laterum dolor in pleuritide &c.* † 565. a.  
*Lateris sinistri totius æstus & dextrifrigus in febre continua* † 250. a.  
*Latwerge/* \* 634. b.  
*Lavacrum* quid \* 708. b.  
*Lavamentorum* f. Clysterum præscribendi ratio \* 659. a.  
*Lavatio* quid \* 708. b.  
*Laudani* opiatî virtutes ad compescendum venenum \* 154. b. \* 155. b.  
*Laurus* ejus præparata & usus. 471. a.  
*Laxans* decoctum, instar Julepi etiam usurpandum \* 650. b.  
*Laxans* potio \* 640. b.  
*Laxans* egregiè pulvis \* 632. b.  
*Laxantia* pro lactentibus † 1073. b.  
*Laxantibus* stimulum addentia \* 135. b.  
*Laxantium* usus in abdominis doloribus \* 172. n.  
     usus in febribus † 253. b.  
     usus in peste † 364. a.  
     usus in Petechiis † 341. b.  
*Laxatio* gravidarum † 997. b.  
*Laxativa* in alvo obstructa † 92. b.  
     Nodus alterativus & laxativus in morbo chron. \* 647. b.  
     Claretum laxativum pro sene \* 648. b.  
     Laxativæ emulsiones \* 645. a.  
     Pilulæ laxativæ quæ sufficiunt. 862. a.  
     Stärkend Laxier claret \* 649. a.  
*Leber-Balsam.* 3180. b.  
*Leber-Kraut / Edel Leber-Kraut / Stern-Leber-Kraut.* 442. b. 456. b.  
*Leelimingi,* eorumque curatio † 665. a. 666. b.  
*Leili* sudor f. balneum \* 712. a.  
*Legumina* v. horæi fructus.  
*Λεγιδυρδεν* \* 447. a.  
*Lemas* quid † 590. b.  
*Leimkraut.* 475. a.  
*Lemnia* terra, ejusque usus 711. b.  
*Lenis,* ejus differentia & usus. 472. a.  
     Lentium decoctum in variolis & morbillis non convenit † 351. a.  
*Lentigines,* earum pars affecta, causæ, Prognosis & cura † 527. b. seq.  
*Lentiscus,* cujus usus. 472. a.  
*Leontiasis,* qualis affectus &c. † 522. a.  
*Lepra,* ejus causæ, diagnosi † 522. a. b. Medici cautela in ejus cognitione † 522. b. Prognosis † 523. b. cura † 523. b.  
     Leprosi nil confert sangv. transfusio \* 114. b.  
*Lepus* cujus usus in Medicina. 675. b.  
*Leichen-Baum.* 471. a.  
*Lethalitas* vulnerum considerata \* 35. b.  
*Lethargi* consideratio † 709. b. seqq.  
     De Lethargo casus & obs. \* 437. a.  
     Lethargus nephriticorum † 637. b.  
     Lethargus ex phrenitide † 860. a. † 861. a.  
*Leucomatis* consideratio † 722. b.  
*Leucomorie* populi, vitam viventes mediam † 386. b.  
*Leucophlegmatie* primum peccans \* 105. b.  
     Leucophlegmatix & anasarcae differ. † 417. b. ejus Diagnosi. Prognosis, Cura † 422. a.

De Leucophlegmatia casus & observat. \* 357. a.  
*Leviathan* Penis quid & ejus usus. 912.  
*Levisticum,* ejus præparata & usus. 472. a.  
*Libido* venerea v. salacitas.  
*Lichen,* cujus usus. 472. b.  
*Lichenes* à lue gallica quomodo curentur † 477. b.  
*liebe-Stöckel.* 472. a.  
*Lienis* structura. 73. b. \* 685. a. 49.  
     morbi an negandi \* 685. b.  
     Lien est corous nerveum non parenchyma. 73. b.  
     Lien & ejus parenchyma per se fere insensibile est † 155. b. v. splen.  
     Lienis usus 74. a. b. sequ.  
     Lienis consensus cum cute \* 572. b.  
     Lienis consensus cum stomacho † 82. a.  
     Lien an cursoribus eximendum \* 169. b.  
     Lienis diarrhœa † 103. b.  
     Lienis vitia in iëtero † 443. b.  
     Lienis inflammatio, ejus causæ, diagnosi, Prognosis, cura † 579. a.  
     Lienis obstructio † 181. a.  
     Lienis obstructions unde † 90. b.  
     Lienis suppurati prognosi † 577. a.  
     Lienis regio dolorosa venæ sectione curata † 86. a.  
     Lienis tumor in quartana † 249. b.  
     Lienis tumor & scirrhus, Decoctum. 448. a.  
     Lienis ejusque vasorum vulnus lethale \* 37. a.  
*Lienteria,* ejus pars affecta, causæ † 118. a. Diagnosi, Prognosis † 119. a. Cura † 119. a.  
     Secretum in lienteria † 76. b.  
*Ligamentorum* systematis nervosi consideratio † 701. a.  
     Ligamenti vulnerati cura \* 50. b.  
     Ligamentorum in fracturis dislocatorum aut contortorum cura chirurg. \* 74. a.  
*Ligatura* viri per fascinum † 917. a. † 919. b.  
*Ligatura* in moribus convuls. \* 181. b.  
     Ligatura strictior inducens convulsiones † 806. a.  
     Ligaturarum usus in epileps. † 812. a.  
     Ligaturæ expulsiæ chirurg. in hydrope † 438. a.  
     Ligatura vulnere v. fasciæ.  
*Ligna* eorum præparata & usus. 322. b.  
*Ligna* libero aëre putrescentia ferme nullum in igne salem suppeditant \* 745. b.  
     Lignorum in lapides conversio virtute fontium & aquarum quarundam \* 447. b.  
     Lignorum nostratium combinatio cum exoticis tanquam suspectis in decoctis \* 652. a.  
     Lignorum decocta, essentiz, in obesitate conducunt \* 835. b.  
     Lignum Colubrinum. vid. Colubrinum.  
     Lignum Nephriticum. vid. Nephrit.  
*Lignstrum* ejus præparata & usus. 473. a.  
*Lilium* ejus differentia, præparata & usus. 473. a.  
*Blauë Eischen.* 466. b.  
     Lili tinctura Paracelsi \* 79. b.  
     Liliorum convallium usus in epileps. † 813. a.  
*Limonia* Mala eorum præparatio & usus. 475. a.  
*Linaria,* ejus præparata & usus. 475. a.  
*Linum,*

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

*Linctus*, eorum compositio & usus. 835. b.

*Linde*. 554. a.

*Linca* in hypochondr. dextr. ex rubro nigricans in inflamm. hepatis † 576. a.

*Lingua* fallit in dijudicando sapore &c. † 642. b.

*Lingua* vitia † 218. b.

*Lingua* ariditas in febr. acut. † 302. a.

*Lingua* sicca in febr. mal. \* 245. b.

*Lingua* ariditas in inflammation. hepatis † 575. b.

*Lingua* arida & sicca in peste † 360. a. † 362. b.

*Lingua* aspera & nigricans in tertiana mal. \* 206. b.

*Lingua* affectus in febr. ardentibus † 291. b.

*Lingua* tremuli & convulsi motus in peste † 362. b.

*Lingua* squalorem in febr. maligna tollentia \* 244. a.

*Lingua* fauciarum in epilepsia cura † 818. b.

*Lingua* defensio in variol. & morbill. † 356. b.

*Lingua* verruca curata \* 28. b.

*Lingua* inspectio in febr. mal. † 331. b.

Trochisci sublinguales in peste. 861. b. v. loquela, aphonia &c.

*Linimenta* & eorum compositio 849. a. - - 852.

*Linimenta* præscribendi modus \* 662. b.

*Linimentum* contra phlogosin erysipellaceam in odontalg. \* 663. b.

*Linimentum* contra lumbricos \* 663. b.

*Linimentum* seu balsamum stomachale \* 662. b.

*Linsen / Meer-Linsen*. 472. a.

*Welsche Linsen*. 621. b.

*Linum*, ejus præparata & usus. 475. b.

*Lipopsychia*, v. Liporhymia.

*Liporhymia*, quale symptoma &c. \* 181. b. Ejus differ. † 386. a. b. causæ † 387. a. Prognosis † 389. b. Cura † 390. a. Resuscitatio tali affectu correptorum † 389. b.

*Liporhymia* differ. ab epilepsia † 809. a.

*Liporhymia* abortus causa † 1011. b.

*Liporhymia* in febr. † 309. a.

*Liporhymia* puerperarum cum causa & Diagnost. † 1039. b. cura † 1040. a.

*Liporhymia* ex affecto orificio sinistro ventriculi. \* 151. a.

*Liporhymia* ob vomitum nimium \* 135. a.

*Lippitudo*, Celso quid? † 588. a. ejus causæ † 589. b. diagnosis, prognosis † 591. a.

*Lippitudo* catarrhi species † 679. b.

*Lipuria* † 285. b. ejus Cura † 303. a.

*Liquida* quibus usibus inserviant. 50. b.

*Liquor* rosçidus per nervos influens an corpulentia causa \* 823. b.

*Liquores* officinales. vid. officin.

*Liquor* CC. succinatus. vid. C. C.

*Liquor* stypticus. vid. styptica, succus.

*Literati* cum macilenti plerumque † 394. b.

*Lithiasis*, v. Renum calculus.

*Lithodontos*, v. dentalis lapis.

*Lithonriptica* † 637. b. seqq.

*Lithonripticon* D. D. Michaelis. 939. b.

*Lithonriptica* an verè & propriè dicta existant † 641. b.

*Litus*, v. linimentum.

*Lochia*. 117. b.

quamdiu fluant. 117. b.

*Lochiorum* vitia † 1033. a.

*Lochiorum* fluxus nimius, ejusque causæ † 1033. b.

Diagnosis, Prognosis, cura † 1034. a. b.

*Lochia* reterta, eorumque causæ, prognosis, cura. † 1031. a. b.

De Lochiis suppressis casus & obs. \* 371. b. \* 383. a.

*Lochia* supprimi solita sub turgescente in mammillis lacte, post liberè iterum fluentia. \* 569. b.

*Lochiorum* retentio cum urinæ suppressione & doloribus post partum \* 327. a.

*Lochiorum* per aliena loca excretio, cum cura † 1038. a. b.

Fotus ad promovenda lochia \* 655. a.

*Lochiorum* fluxum adjuvans opium \* 568. a.

*Lochia* circa uterum contenta, tumoris causa. \* 3. a.

*Loob*, ejus compositio & usus. 835. b.

Quale sufficit. 862. b.

*Löwen-Fuß*. 382. a.

*Löwen-Maul*. 370. a.

*Longavitas* unde 79. b. v. vita.

*Longavus* asinus † 316. b.

*Longitudo* corporis quæ \* 821. b.

*Loquela* amissa differt ab aphonia † 786. b. ejus cura. † 788. a.

*Loquela* post variolas amissa † 357. b.

gargarismus in loquela amissa post apoplexiam \* 660. b.

*Loquela* tardior † 786. b.

*Loquentes* diutius cur sitim percipiant † 43. a. v. aphonia, lingua, vox.

*Lorbeer-Baum*. 471. a.

*Lorus*, ejus differentia, præparata & usus. 476. a.

*Lotionum* divisio \* 712. b.

*Lotiones* capitis, manuum, pedum præscribendi ratio \* 656. a.

*Lotium*, v. Urina.

*Lucini* cujus usus in Medicina. 694. b.

Lucii ossa cujus usus. 911. b.

*Lucubrations* ad hypochondr. malum disponentes. \* 209. a.

*Luis Venerea* consideratio \* 115. a. b.

historia ejus † 454. b. an veteribus hic morbus cognitus † 454. b. Symptomata varia † 455. a. Causæ † 456. b. hæreditaria ibid. modi quibus contagium hoc se propagat † 456. b. sæpe diu latet † 457. a. loca quæ afficit † 457. a. Diagnostis † 457. b. Prognosis † 458. b. Cura † 459. b. Dieta † 464. a.

*Lue venerea* laborantium diæta sudorifera. \*

*Lues venerea* cur contagiosa. \* 54. b.

sub noctem dolorosior fit. \* 228. b. in peste salutaris \* 361. b.

*Lue venerea* laborantes cur febribus lymphaticis obnoxii \* 233. a.

De *Lue venerea* casus & observ. \* 358. a.

Pilulæ ad luen veneream \* 638. a.

*Luis venerea* ex gonorrh. cura \* 315. b.

*Lue venerea* affectis nil conducit sangv. transfusio \* 114. b.

*Lumbago* † 395. b.

*Lumbaris* receptaculi vulnus an lethale \* 36. b.

*Lumborum* s. lumbaris dolor † 156. a. † 159. b. † 170. b.

Dolor circa lumbos quadruplex \* 170. b.

*Lumborum* dolor ex cardialgia † 82. b.

n De



# INDEX UNIVERSALIS

De lumborum dolore convulsivo casus & obs.  
\* 338. a.  
Dolor circa lumborum regionem in diarrhœa;  
instante partu \* 143. a.  
Lumborum dolor in gravidis ejusque cura  
† 1002. a.  
Lumbaris intestinorum dolor † 5. a. cura  
† 167. b.  
Lumborum dolor post mensium emanationem  
naturalem \* 165. a.  
Lumborum dolor in pleuritide † 565. a.  
Lumbaris dolor in renum calculo † 636. a.  
*Lumborum phlogosi* ac æstui proficiuus potus medi-  
catus \* 649. a.  
*Lumbrici* atrophiam conciliantes † 396. a.  
Lumbrici infantum, eorumq; causa † 1093. a. b.  
\* 538. a. Cura † 1094. a. † 1103. a. \* 550. a.  
De Lumbricis pueri casus & observ. \* 360. b.  
v. Vermes.  
*Lumbrici* terreni, eorum præparata & usus. 706. a.  
*Lumen* f. Radius luminosus est corpus materiale.  
94. a.  
Quomodo oculum afficiat. 94. a. b. v. Lux.  
*Luna*, nervorum & cerebri consensus † 701. a.  
Lunæ inspectio tunicam retinam oculi lædens  
† 730. b.  
*Luna* f. *argentum* quomodo inflammabilis reddi  
possit. 754. b.  
Lunæ adjuncta metalla. 753. a.  
Luna ejus præparata & usus. 312. b. seqq. 753.  
a. b.  
Lunæ calcinatio cæmentatoria 754. b.  
Luna cornea, ejus præparata. 754. a.  
Lunæ depuratio. 753. a.  
Lunæ Essentia Lazuria. 927. b.  
Luna fixa quid & ejus usus. 751. a.  
Lunæ f. argenti pilosi artificialis conficiendi  
modus. 753. a.  
Luna in  $\Delta$  & Cinnabar. reductio. 755. a.  
Lunæ sublimatio. 755. a.  
Lunæ Tinctura genuina an detur. 754. b.  
Lunæ R $\mathfrak{x}$  quid. 743. a.  
vid. Argentum.  
*Lunatici*, qui † 709. b.  
*Lungensucht* † 396. b.  
*Lupia*, v. testudo.  
*Lupina rabies* † 856. b.  
*Lupinus* fungus, ejus usus. 609. b.  
*Lupulus*, ejus præparata & usus. 476. b.  
Quid possit cerevisiæ additus. 121. a. b.  
*Lupus* ejus usus in medicina. 676. b.  
*Lux* unde. 7. b. v. Lumen.  
*Luxatio* ossium quid, ejus causæ & varietas  
\* 66. b. \* 67. b. huic malo imprimis ob-  
noxii qui? \* 67. a. Diagnos. istius, pro-  
gnosis & cura \* 67. a. b. fasciationum in  
ea ratio \* 68. a. Quid si os simul fractu-  
ra læsum \* 70. a.  
Luxatio ossis femoris curatu difficillima &  
cur \* 67. b.  
Fotus in membri luxatione \* 955. b.  
v. Subluxatio.  
*Lybænes* † 524. b. ejus causæ, prognos. cura  
† 525. a.  
*Lycium* ejus usus. 586. a.  
*Lympha* alia glandularum conglobatarum, alia  
conglomeratarum \* 189. a.

Ex lymphæ & sanguine dependet totius corpo-  
ris sanitas † 311. b.  
Lymphæ usus. 83. b.  
Lymphæ vitium, natura † 590. a.  
Lymphæ vitiosa generatio, ejusque curatio,  
† 674. a. b.  
Lymphæ vitiosa distributio † 675. a.  
Lymphæ separatio in glandulis & motus im-  
peditus f. læsus 83. b. † 674. a. † 690. b.  
Lymphæ fluxus in coryza † 687. b.  
Lympham saliam acrem &c. temperans emul-  
sio \* 645. a.  
Lymphæ extravasatio, asciten inducens,  
† 180. b.  
Lymphæ salivæ defectus sitim inferens  
\* 129. b.  
Lymphæ affectibus conducentia \* 231. a.  
*Lymphatica febris* † 304. b.  
Lymphaticæ febres glandularum conglomer.  
† 306. b. v. febris lymphatica.  
*Lymphatica vasa* unde oriuntur 82. a.  
*Lyncis* lapis cui usui in medicina 731. b.  
*Lyngodes febris* † 288. b.  
*Lysimachia*, ejus præparata & usus 476. b.  
*Lythargyrium*, ejus usus 791. b.

## M.

*Macere* imprægnatus potus in diarrhœa \* 143. a.  
*Machina Boyssiana* \* 757. a. seqq.  
*Macies* ejusque causa &c. † 494. a. \* 829. b.  
† 648. a. Diagnos. † 398. a. Prognosis  
† 400. b. Cura † 401. a.  
Macies infantum † 1102. b.  
Macies ex lienteria curata † 120. a.  
Macies à Veneris exercitio nimio \* 828. a.  
Maciem conciliantia † 414. b. quomodo in-  
ducenda \* 832. a.  
*Macilentorum* consideratio \* 822. a.,  
*Macis* v. Nux Moschata.  
*Macule* in cruribus asclepticorum lethales † 694. a.  
Maculæ cutis † 527. b. seqq.  
Maculæ efflorescentes in febr. \* 203. b.  
Maculæ in febr. mal. † 319. b.  
Maculæ in febre petechiali, scorbutica &c.  
† 338. b. seqq.  
Maculæ Hepaticæ, v. Hepaticæ maculæ.  
Maculæ ab incubo in cute relicte, † 211. b.  
† 214. b.  
Maculæ à Lue Venerea † 456. a.  
Maculis manuum conveniens lotio \* 656. b.  
Maculæ oculi cura † 721. a. † 722. b.  
Maculæ pestilenciales † 360. b. † 361. b.  
Macularum in pede cura † 378. b.  
Maculæ scorbuticorum † 483. a. † 485. b.  
Macularum scorbuticarum cura † 505. b.  
Maculæ in variolis † 347. b. seqq.  
vid. Navi.  
*Madrepore* \* 448. a.  
*Magen-Drücken*. † 81. a. Consultatio \* 137. a.  
*Magen-Rüchlein*. \* 636. b.  
*Magens-Verderbung*. \* 119. b.  
*Magica incantatio*, vid. fascinum, incantatio.  
*Magisterium* quid. 839. b.  
Magisteriorum compositio & usus 265. a. b.  
856. b.  
Magisteriorum abusus & noxa \* 238. b.  
*Magnesia Glata*. 344. a.  
vid. Vitriolum.

*Magnus*

## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Magnetis* cuius usus in Medicina 735. b.  
*Magnetis* in ferrum vis locomotiva \* 555. a.  
*Magnetum* in cura magnetica quadruplex differentia \* 81. b.  
*Magnetica* cura dentium doloris † 755. a.  
*Magnetica* cura hydropis † 442. a. &c. &c.  
*Magnetica* cura icteri † 454. a.  
*Magnetica* cura vulnere, --  
v. Sympathetica cura, transplantatio.  
*Magnitudo* partium corporis unde dimetienda \* 819. b.  
*Majorana*, ejus præparata & usus 477. a.  
*Mala Limonia*. Vid. Limonium.  
*Malabarrum*, cuius usus. 477. b.  
*Malacia* quid † 34. b. Pars affecta † 35. a. Causæ † 36. a. Signa, prognos, cura † 37. a. b. v. Pica.  
*Malignitas* in corpore quomodo fiat, † 325. a.  
Malignitatis præsentia unde dignoscatur \* 232. b. \* 243. a.  
Malignitas morborum, venenorum, in quo consistat \* 154. a.  
*Maligna* febres, v. febres malignæ.  
Maligni morbi jejunos facilius afficiunt † 363. b.  
Maligni veneni correctio in quo consistat \* 248. b. v. pestis.  
*Malva*, ejus differentia, præparata & usus. 477. b.  
*Malus Cydonia*. vid. Cydon.  
*Malus Persica*. vid. Persica.  
*Mamma* mirabilis juvenis \* 355. b.  
Mammarum consensus cum utero \* 179. a.  
Mammæ quando infans admoventus † 3061. b.  
Mammarum vitia † 1049. a.  
Mammarum cancer, cum causa, prognosi, cura † 1058. a. b.  
Mammarum cancer quomodo tractandus \* 64. b.  
De Mammarum cancro casus & observatio, \* 352. a.  
Mammarum erysipelas † 1056. a.  
Mammarum Erysipelas. Casus & observatio, \* 352. a.  
Mammarum fistulæ † 1055. a.  
Mammarum flacciditas abortus signum † 1012. b.  
Mammarum inflammatio † 1055. b.  
Mammarum scirrhus † 1056. b.  
Mammarum serophuli & strumæ † 1057. b.  
Mammarum tumor à lactis vitio \* 332. b.  
De mammarum tumore à lacte casus & obs. \* 339. b. v. Papillæ.  
*Manati* Cuius usus in Medicina 693. b.  
*Mandragora*, ejus differentia, præparata & usus. 478. a.  
**Mangold.** 399. a.  
**Wild Mangold.** 398. a.  
*Mania* qualis affectus † 877. b. ejus furor, robur, frigoris tolerantia ibid. vigiliæ ibid. audacia † 878. a. differentia † 878. a. † 880. causæ † 878. b. Diagnos, prognos † 880. a. b. Cura † 881. a. seqq.  
De mania casus & observ. \* 418. b.  
Mania ex epilepsia habituali \* 298. b.  
Mania ex colica † 161. b.  
Mania melancholicorum \* 107. a. v. furor.  
Maniæ ex philtro cura. † 896. b.  
Maniacorum differentia à phreneticis &c. † 878. a. † 880. b.  
Maniacorum immersio in aquam frigidam \* 107. b.  
Maniacis an conferat chirurgia transfusoria \* 106. b. v. deliria.  
*Manna*, ejus præparata & usus. 640. a.  
Mannæ ꝑ. Vid. ꝑ.  
**Mannes Treue.** 444. a.  
*Manus impositio* in Col. hypoch. grata &c. \* 170. b. \* 175. b.  
Manuum extensio sursum gravidis nocet † 995. a.  
Manus extensio sursum abortum concilians † 1011. b.  
Manuum consideratio in febr. mal. † 331. b.  
Manus titillationes, subfultus &c. in febr. mal. † 327. b.  
Manuum calor in lue Venerea † 456. a.  
Manuum fistulæ in lue Gall. † 474. b.  
Manuum lotiones \* 656. a.  
Manuum maculæ, pustulæ &c. vid. maculæ, pustulæ.  
Manuum nigredo † 530. a.  
*Manustuprationis* noxa † 898. b. † 910. a. † 912. b.  
Manustupratio gonorrhœam virul. concilians \* 312. a.  
**Mægespor** 448. b.  
*Marasmodi Marasmus* † 310. b. † 313. b.  
*Marasita* argentea, vid. Bismuthum.  
*Mare.* Maris Deus Neptunus \* 446. a.  
*Marga* ejus differentia & usus. 712. b.  
*Margaritarum* genesis. 729. a.  
Margaritarum differentia. 729. a.  
Margaritarum usus. 729. a.  
Circa Margaritas Chymicorum operationes quid valeant. 729. b.  
*Marina* tria curiosa \* 697. a.  
*Maritatorum noviter* tabes dorsalis \* 818. a.  
*Marmariga* Hippocrati quid † 718. b.  
*Marrubium* album, ejus præparata & usus. 478. b.  
*Mars* est causa æquabilis terræ verticitalis ad polum 755. b.  
♂ durities unde. 755. b.  
Martis vires & usus multiplex \* 79. a.  
♂ solvens menstruum debet esse acidum. 757. a. ejus præparata & usus. 301. a. b.  
Quæ remedia ex eo sufficiunt. 967. a.  
Mars per se adstringit, per accidens aperit † 183. a.  
♂ ♂ acidum quid & ejus usus. 756. a.  
♂ ♂ præparatio. 758. a.  
♂ & ♀ examen. 341. b.  
*Martialia* medicamenta quæ, eorum parandi ratio. 756. b. — 760.  
♂ alium medicamentorum usus. 756. a.  
Martialia subeunt vices acidularum naturalium \* 184. a.  
Martialia crudiora vel in majori dosi exhibita delicatioribus non conveniunt \* 126. a.  
Martialium usus in delir. melanch. † 875. a. usus in ictero † 450. a. usus in mensium suppressione 933. a. b.  
Obstructionibus quantum conferant Martialia. 178. b.  
Martialium usus in peste † 371. a.  
Ulus in scorbut. & mal. hypoch. † 496. b.  
*Marum* cuius usus. 479. a.  
**Masern** v. variolæ.

# INDEX UNIVERSALIS

- Maslach* Turcarum \* 810. b.
- Maßlieben.** 398. a.
- Massa panis.* \* 631. b.
- Mastdarms ausgehen** / v. Ani procidentia.
- Masticatio* quid. 51. a.
- Masticatio laesa, & musculorum ei inservientium vitia † 47. a.
- Mastiche*, ejus præparatio & usus 586. a.
- Mastoides musculus* convulsio & rigor † 802. b.
- Mater.* Ejus imaginatio probat ideas habere directorium in generando. 43. a.
- Matris horror, imaginatio &c. partui nocens, \* 117. b.
- Mater Perlarum*, vid. Perlz.
- Matris tennis* inflammatio † 586. a.
- Materia* affectiones primariæ quæ. 2. b.
- Materiæ Medicæ tria regna. 368. a.
- vid. Medic.
- Materia Casterii subtilis. 12. a.
- Materiæ subtilis existentia nondum probata \* 740. b.
- Mathematica* fundamenta in praxi observabilia. † 2. b.
- Matricaria*, ejus præparata & usus. 479. b.
- Maurici* caducus † 963. a.
- Mattigkeit** / virium prostratio, ejusque differ. &c. † 386. b.
- Matrantia* † 4. a.
- Mauer's Pfeffer.** 558. b.
- Maul's Beer.** 525. b.
- Mäuse's Dorn.** 520. b. 526. a.
- Mäuse's Gebärm.** 384. a.
- Mäuse's Werden.** 395. b.
- Maxillarum* vitia. † 48. b.
- Vitia ex dentibus † 50. b.
- Maxilla contracta in morib. convuls. \* 184. a.
- Maxillæ luxatæ repositio \* 70. b.
- Maxillæ tumor in odontalgia † 755. b.
- Mäyen's Blümlein.** 474. a.
- Mayer.** 401. b.
- Mechoacanina*, ejus præparata & usus. 629. a.
- Meconium* quid † 704. b.
- Meconii remotio \* 544. b.
- Meconii retentio † 1064. a. cura † 1064. b.
- Meconii retentio quas noxas det infanti, \* 528. b.
- Meconium prodians ante fecum quid signet † 1063. b.
- Medendi* methodus \* 668. b. v. Praxis.
- Mediastini* motus in respiratione \* 732. b.
- Mediastini inflammatio † 561. a. † 565. a.
- Medica Praxis*, vid. Praxis.
- Medicæ scholæ antiquæ tres celebriores. 28. a. b.
- Medicæ sectæ quæ & quot. 31. a.
- Medicamenta* ut profunt, ita sinistrè administrata obstant & nocent \* 844. a.
- Medicamentorum præparandorum finis. 326. a. b. seq.
- Medicamentorum facultates † 2. b. & inde nati effectus ex quibus principiis deducendi † 3. a. eorum varietas & differentia; unde hæc dijudicanda † 3. a. quomodo vires suas in corpore ejusque partibus exerant. † 4. b.
- Medicamenta jam dum assumpta quâ ratione vim medicamentosam acquirere dicantur. 149. a.
- Medicamentorum operandi ratio. 27. a. b. \* 806. b.
- Medicamenta quædam operantur virtuali facultatum diffusionc \* 489. a.
- Medicamentorum diversarum operationes unde. 145. b. seq.
- Medicamentorum variatio secundum operandi rationem \* 488. b.
- Medicamentorum vis, & spiritus archeumque afficiendi modus \* 461. a.
- Medicamentorum alteratio in primis viis. \* 486. b.
- Medicamenta acidum absorbentia sunt primaria. 27. a.
- Medicamentis temperatis, quantum possibile, insistito Medicus \* 136. a.
- Observanda in Medicamentorum præscriptione \* 625. b.
- In medicamentorum præscriptione fallere licet medicum ægri imaginationem \* 629. a.
- Medicamenta in dosi etiam non excedentia in delicatioribus alvum proritant, &c. \* 160. a. b.
- Medicamentorum correctio artificialis \* 846. a. vid. Remedia.
- Medicamentosus lapis*, ejusque compositio 1019. b.
- Medicata aquæ* quomodo cognoscendæ 714. a.
- Medicina* quid dicatur & unde. 31. a.
- Medicinæ facies antiqua. 28. a.
- Medicina quo sensu possit dici ars conjecturalis. 31. b.
- Medicina est adhuc incerta & quare. 31. b. seq.
- Medicina imperfecta quâ theoriam \* 839. a.
- Medicina hodie valde exculta \* 841. a. seq.
- Anus in medicina refellunt practicos \* 839. a.
- Medicina tota in tribus capitibus consistit, \* 714. a.
- Medicinæ Authores qui? 28. a.
- Medicinæ bini oculi sunt Chymia & Anatomia. 33. a.
- Medicina quo sensu dicatur optima, si nulla utamur. 145. a. b.
- Medicina artium omnium præstantissima rectè dicitur 34. a.
- Medicinæ facies à tempore Hippocratis ad nostra. 30. a.
- Medicinæ studium à diebus Hippocratis neglectum \* 839. a.
- Medicinæ facies apud Barbaros. 29. b.
- Medicina antiqua qualis. 368. a.
- Medicinæ secta antiquissima est Empyrica. 32. a. ejus affectus ibid.
- Medicinæ secta dogmatica 32. b.
- ejus authores & affectus. ibid.
- Secta Medicinæ hodierna est Spagyrico-dogmatica dicenda. 33. a.
- Necessitas est causa Medicinæ impulsiva. 27. b.
- Medicinæ fundamentum est Experientia & Ratio. 33. a.
- Experientia est causa Medicinæ proxima. 27. b.
- Medicinæ finis est duplex. 33. b.
- Medicinæ subjectum an sit solum corpus hominis vivens. 33. b.
- Medicinæ partes tres principales, 34. b.
- Medi-



## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Medicinæ candidati cum Galeno errare malunt, quam cum aliis verumdicere \* 841. a  
 In medicina nonnunquam sunt miracula, \* 749. a  
 Medicinam quilibet vult exercere \* 679. b  
 Medicinæ promotionem intendentes Societates hodiè \* 841. a  
*Medicina practica* vulgaris est in quamplurimis adhuc manca, ex duplici causa † 1. a. \* 78. a. circa quid defectus ille versetur † 1. b. vulgaris praxeos varietas ratione methodi & remedium † 2. a. super chymica & mechanica fundamenta praxis medica fulcienda † 2. b  
*Medicinales* Terræ quæ. 913. b  
*Medicus* naturæ minister \* 144. b. † 291. b  
 Medicus experientiæ rationem adiungit \* 668. a  
 Medicus rationalis postponitur sæpe agyrtæ, \* 680. a  
 Cur interdum anus aut empiricus melius curet eo \* 78. a  
 Medici boni & veri notæ ac characteres, \* 671. b  
 Medicus quis felix, quis fortunatus dicendus. 144. b. \* 813. b.  
 Medici officium. 33. b. 240. b. sq. quando dicatur legitime sanare. 144. a  
 Medicus quibus instructus esse debeat \* 844. a  
 In Medicum vel medicamentum fiducia ægri quomodo potest dici curare morbum. 131. a  
 Medici quæsitæ ex ægro juxta Hippocratem 139. a.  
 Medici practici insigniores † 16. b  
*Meditatio* melancholicorum † 864. a  
*Medulla lapidis* † 666. a  
*Medulla spinalis*, v. Spinalis medulla.  
*Meer: Kobl.* 634. a  
*Meer: Moos.* 430. b  
*Meer: Retti.* 391. b  
*Meer: Winde.* 634. a  
*Meer: Zwiemel.* 540. a  
*Mel*, ejus præparata & usus. 698. a  
*Melancholia* quid † 863. b  
 Melancholiæ constitutio qualis † 867. b. sqq.  
 Melancholia veteribus quid dictum † 444. b  
 Melancholia veterum recentioribus dicitur succus acidus. 76. a  
 Melancholicus succus veterum in stomacho † 40. a  
 Melancholicus succus qualis \* 517. b  
 Melancholia & mania in radice non differ. † 878. b. sqq. \* 107. a  
 Melancholiæ duplex fieri modus \* 107. a v. delirium.  
 Melancholicorum morborum nidus & fomes † 864. b  
 Melancholici humoris bursa an lien † 443. b  
 Melancholiæ diuturnitas unde dependeat † 107. b  
 De Melancholia casus & obs. \* 418. a  
 Melancholiæ curæ ridiculæ \* 107. b  
 Digestiva potio in affectu melanchol. \* 640. b  
 Melancholiæ ex cachexia muliebri cura † 962. b  
 Melancholica deliria, v. deliria melancholica.  
 Melancholia hypochondriaca † 864. b  
 De Melancholia hypochondriaca, casus & observatio. \* 378. a. \* 415. a. \* 345. b  
 Melancholici affectus in peste salutes † 361. b  
 Melancholia uterina † 961. a.  
*Melancholicus* quis † 863. b. \* 309. b  
 Melancholicus inæstus, venationis amans, cantans \* 107. a  
 Melancholicus morosus † 879. a  
 Melancholicorum diæta † 874. a  
 Melancholicis an conerac Chirurgia transfusoria \* 106. b.  
*Melanteria* quid & cui usui 790. b  
*Melicerides* quid, earum causa, prognosis & cura \* 29. a. sqq.  
*Melilotus* ejus differ. præparata & usus 479. b  
*Melissa*, ejus præparata & usus. 480. b  
*Mellita* in morbis fugienda † 105. a  
 Mellita acidum augent † 7. a  
 Mellitorum usus in phthi si † 401. b  
*Melo*, ejus præparata & usus. 481. b  
 Melonum noxa \* 128. b  
*Membrarum* systema † 25. a  
 Membrarum consideratio † 701. a  
 Membrarum connexio & conspiratio \* 239. b  
 Membranz an doloris sensum præstent \* 289. a  
 Membrarum inflammatio † 561. a  
 Membranz auditoriæ vitia † 735. a. † 740. a  
 Membrarum cerebri inflammatio † 586. a  
 Membranz oculorum, quomodo tollendæ † 722. a  
*Membranosi* generis mirabilis connexio & consensus \* 573. a  
 Membranosis partibus conducentia † 4. b  
*Membrum* unum præ altero est debilius † 181. a  
 Membra ponderosiora, tarda, v. vitium prostratio.  
 Membrorum immobilitas ex Sinoviz coagulatione \* 77. a  
 Membrorum amputatio s. separatio, v. amputatio.  
 Membrorum tremor & tensio in peste † 378. b  
*Memoria* à quo dependere videatur. 102. b  
 Memoria læsio † 850. b. ejus causæ † 851. a.  
 Subjectorum diversitas † 852. b. Diagnos. Prognosis, cura † 853. a  
*Meninges* cerebri an in coryza vellicentur \* 227. b  
 Meningum vulnera quomodo tractanda \* 51. b  
*Mens* ead. semper manet † 855. a  
 Mentis operationum diversitas unde. 103. b  
 Mentis sedes, diaphragma, juxta veteres † 586. a  
 Mentis perturbatio † 864. a  
 Mens mundi \* 741. b  
*Menses* pro subjecti natura nunc citius nunc tardius fluunt \* 127. b  
 Mensium fluxus an salutaris \* 109. a  
 Mensium vitia unde radicentur † 90. b  
 Mensium fluxus in peste † 363. a  
 Mensium fluxus depravatus † 942. b  
 Mensium fluxus erraticus & inordinatus, cum causa, prognosi, cura † 946. a  
 Mensium fluxus nimius ejusque causæ † 937. a. b. diagnosi, prognosi † 938. b. Cura † 939. a. sqq.  
 De Mensium fluxu nimio casus & observatio. \* 432. b  
 Electuar. contra nimium mensium fluxum \* 635. a  
 Emplastrum sub nimio mensium fluxu \* 658. b  
 Mensium difficultas † 942. b. ejus causæ, diagnosi, † 943. a. Prognosis, cura † 943. b  
Con-

# INDEX UNIVERSALIS

- Consultatio de Mensium difficultate \* 317. a  
 Mensium emanatio s. suppressio ejusque causæ  
 † 926. a. b. est vel naturalis vel præternaturalis † 926. a. Diagnofis † 928. a. Symptomata & dolores † 928. b. Signa demonstrantia an mensium emanatio sit ab ingravidatione, vel alia causa an dentur, & quæ illa † 929. a. b. Prognofis † 930. a. Cura † 930. b. cura emanationis ob refrigerationem extremorum vel graviozem animi affectum † 936. a  
 Mensium naturalis emanatio fequentibus hæmorrhoidibus cæcis dolentibus \* 164. a  
 De mensium emanatione casus & obf. \* 403. a  
 Menfes cur deficient in cacochymicis \* 105. b. seq.  
 Mensium defectus melancholiam concilians \* 107. a  
 De mensium suppressione, cas. & obf. \* 375. b. \* 400. a. \* 433. b.  
 Menfes pellentia † 4. a. † 5. a  
 Totus ad promovendos menfes \* 655. a.  
 Lotionum ufus in mensium suppressione \* 718. b  
 Mensium decoloratio, ejus causæ, cura † 945. a. b.  
 Mensium effluxus per loca aliena † 946. b. ejus causæ & cura † 947. a  
 Mensium icter, ejusque causæ † 945. b. Cura † 946. a  
 Mensium paucitas, ejus causæ, Prognofis, cura † 936. a. † 944. a. b.  
 Mensium stillicidium † 944. b. ejus causæ, Diagnofis, Prognofis, cura † 945. a. v. Menstruatio, Menstruus fluxus.  
*Menstrua* quotuplicia. 260. b. 261. a  
 Menstrua quomodo agant. 262. b  
 Menstruum universale na detur 263. a. b. seq.  
 Menstrua animalia. 262. b  
 Menstrua mineralia & vegetabilia. 262. b  
 Menstrua falina sunt duplicia. 263. a  
 Menstrua infipida; menstruorum varietas, in quo confistat † 642. b  
 Menstruorum fapor gustu & lingua malè dijudicatur † 642. b  
 Menstruorum vis unde dependeat \* 517. b  
 Menstrua difsolventia debent eife homogenea cum rebus difsolvendis † 642. b  
*Menstruationem* nunquam palæ † 931. a. aut bis terve faltem, ibid.  
 In Menstruatione diuturniore consideranda \* 320. b  
 Menstruatæ quamdiu funt mulieres, tamdiu etiam funt habiles ad generandum. 112. a  
 Menstruationis defectus compensatus fluxu hæmorrhoidum † 142. b  
 Menstruatio feбри petechiali fupervenient \* 250. b  
*Menstruus* sanguinis fluxus in viris obfervatus. 110. b.  
 Menstrui fluxus materia qualis sanguis. 111. a  
 Menstruum ante fluxum & post mulieres cur funt falaciores. 111. b  
 Menstruus sanguinis fluxus in mulieribus quomodo variat 110. a  
 Menstrui fluoris vicia † 926. a. seqq.  
 Menstrui fluxus symptomata & accidentia. 111. a. b.  
 Menstruantium dolores unde \* 290. a  
 Menstruis instantibus cur sanguis est turgidior? 111. b.  
 Menstrui suppressio palpirationis cordis causa † 381. b.  
 Menstruo paratum philtrum, ejusque cura † 896. b.  
*Mentha*, ejus differ. præparata & ufus. 482. a.  
*Mengelwurz*. 470. b.  
*Mercurialis*, ejus differ. præparata & ufus. 483. a.  
*Mercurium* quid, quotuplex, ejus præparata & ufus 293. b. 767. b. 768. a. -- 777. a. 889. b.  
 ☿ Chymicus quid. 299. a.  
 ☿ cur promptè ☉ se jungit, difficulter autem vel plane non aliis metallis. 261. a  
 Mercurius benedictus Philosophorum \* 453. a  
 Mercurii correctio & virtutes \* 846. a  
 ☿ depuratio quomodo instituenda. 890. a  
 Mercurius diaphoreticus Helmont, cui ufui † 5. b.  
 Mercurius diaphoreticus Paracelsi seu Helmonti quid? magni æstimatur \* 79. b.  
 Mercurii dulcis ufus purgatorius † 21. b.  
 Mercurius dulcis sæpius sublimatus revera fit diureticus \* 778. b.  
 ☿ manna quid & quomodo parandus. 926. b.  
 Mercurius vitæ. 335. b. 886. a.  
 Mercurius vivus & Mercurius corporum quomodo convenient aut differant. 767. b.  
 Mercurii ufus falutaris in quam plurimis affectibus \* 241. a  
 Mercurii retentio, & læfio intestinorum &c. per eum † 101. b  
 Mercurialium unguentorum præcipuum ingrediens † 462. b.  
 Mercurialia ad epilepsiam difponentia † 808. b  
 Mercurius à feбри præfervans † 251. a.  
 Mercurialia nocent fcorbuticis † 492. b.  
 Mercurii ufus in morbis venereis, correctio dulcis \* 314. b.  
*Mefenterii* structura † 556. a. Situs † 558. a.  
 Mefenterium est minus fenfile \* 237. b  
 Mefenterii confensus cum cute \* 572. b  
 Mefenterii abfcelfus † 556. a. ejus causæ & Diagnofis † 557. b. Prognofis & cura † 558. a. b. Symptomata † 558. a.  
 Mefenterii abfcelfus febrim lentam concilians \* 237. b.  
 Mefenterii in abfcelfibus decocta \* 653. a  
 Mefentericus dolor † 156. a. † 159. † 170. b.  
 Mefenterii & glandularum ejus obftructio, & fcirrhus † 122. a. † 180. b. seqq.  
 Obftructio hæc unde † 90. b.  
 Mefenterii glandulæ obftructæ in infantibus † 1104. b.  
 Mefenterium obftructum atrophiam inducens † 394. b.  
 Mefenterii inflammatio † 556. a  
 Mefenterii vulnera an lethalia \* 36. b.  
*Mefpis* ejus præparata & ufus. 483. a. b.  
*Metalla* licet funt corpora compacta, ex fluido tamen originem trahunt. 738. a.  
 Metallorum incunabula in aëre quoq; \* 521. b.  
 Ad Metallorum generationem quid conferant Aftra 741. a.  
 Metalla ut generationi & augmentationi, ita & corruptioni funt obnoxia. 737. b.  
 Metallo-

## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Metallorum** generandi modus. 299. b.  
**Metalla** in quo convenient & differant. 300. a. b. 739. b. 740. a.  
**Metalla** sunt vel fixa sive matura, vel immatura; dura vel mollia. 300. a.  
**Metallorum** proprietates quæ. 739. b.  
**Metallorum** Adjuncta nocivaque. 740. b.  
**Metallum** perfectum est aurum, ejusque probatio. 740. a.  
**Metallorum** acidum unde demonstrandum. 739. a.  
**Metallorum** coagulatio unde. 738. b.  
**Metallorum** Diabolus. vid. **Z**.  
**Metalla** quâ ratione reddantur potabilia. 301. a.  
**Metallorum** recrementa quid. 790. a.  
**Metallorum** reductio in primam materiam an procedat. 743. b.  
**Metallorum**  $\Theta$ ia arte chymica prolecta quid valeant. 743. a.  
**Metallorum** semen quid. 738. b. 740. b.  
**Metallorum** solutio à  $\Psi$  quomodo fiat. 744. a.  
**Metallorum** solutio à  $\Theta$ ibus alcalibus quomodo fiat. 744. b.  
**Metallorum** transmutatio in aurum & argentum. \* 772. a. est nulla 328. b. seq.  
**Metallorum** Ufus 741. b.  
**Metallarii** asthmatici \* 197. a.  
**Metallifossores** phthisici † 397. b.  
**Metallieum** gas naturæ sulphuræ, fossiles inquinans † 192. a.  
**Metastasis** 10. b. seq.  
     **Metastasis** pleuritis à parte sinistra in dextram \* 276. b.  
     **Metastasis** podagræ \* 293. b. seq.  
**Mech / eröffnender.** \* 652. a.  
**Methodica secta** in medicina Origo. 29. a.  
**Methodus medendi** † 2. b. quid 143. b. quotuplex 144. b.  
**Metus** vis in peste † 359. a. sq. v. pavor.  
     **Metus** syncopen concilians † 389. a.  
     **Metus** panicus ad humorem melancholicum disponens &c. \* 95. b. v. Timor.  
**Meum**, ejus præparata & usus 484. a.  
**Mezerium**, s. laureola, s. daphnoides, ejus præparata & usus 630. a. 874. a.  
**Miasmata** massam sanguineam turbantia † 242. b.  
     **Miasmata** pestilentialia † 359. a.  
**Microcosmus** quatenus dicatur homo \* 117. a.  
     **Micro-** & **macrocosmi** analogia Paracelsi \* 126. b.  
     **Microcosmi** operationes per macrocosmum definiunt Hermetici † 40. a.  
**Microscopii** insignis usus \* 792. b.  
**Mistio** pultacea † 647. b.  
**Mistum cruentum** † 651. b. ejus causa † 652. a. divisio ibid. **Diagnosis** † 653. a. **Prognosis** † 653. b. **Cura** † 654. a.  
     De mictu cruento calus & obs. \* 359. a.  
     **Mictus** cruentus in peste † 363. a.  
     **Mictus** purulentus † 652. b.  
     **Injectio** in mictu cruento & purulento \* 661. a. v. **Urina**.  
**Milch; Stärck; Ruhe; &c. Milch** \* 644. b.  
**Milch; Sieber** † 1044. b.  
**Miliaris febris** † 343. a. vid. **Febris miliaris**.  
**Milium** ejus præparata & usus. 484. b.  
**Milum** egregiè nutrit \* 827. b.  
**Milum** scilicet, ejus præparata & usus 485. a.  
**Millefolium**, ejus præparata & usus. 485. b.  
**Millepedum** usus in asthmate † 207. b.  
**Milzarella** Italorum species galiopsidis † 183. b.  
**Milz; Beschwerung** † 478. a. \* 683. a.  
**Milz; Braut.** 436. a. 537. b.  
**Milz; Stechen.** \* 684. b.  
**Mineralium** acidum s. acor unde 12. a. 247. b.  
     **Fermentatio** & **putrefactio** an in mineralibus præcedant. 360. a.  
     **Fermentatio** mineralium quid dicatur. 360. b.  
     **Putrefactio** mineralium quid dicatur. 360. b.  
     **Sal** mineralia quotuplicia. 256. a. b.  
     **Spiritus** urinosus ex aliquibus solummodò mineralibus eclipticis. 13. b.  
**Minima corpora** sensibus externis non percipiuntur \* 792. b.  
**Minimorum** extensio sæpè maxima \* 803. a.  
     E minimis maxima, \* 788. a. sqq.  
**Misi** quid, & usus ejus medicus 790. b.  
**Mista.** Principia proxima materialia & constitutiva mistorum quæ 9. b.  
**Mistel.** 517. a.  
**Mistio** medicamentorum \* 631. a.  
**Misturas** præscribendi modus \* 639. b.  
     **Misturarum** differentia duplex \* 643. a.  
     **Mistura** emulsionibus cognata quæ? \* 645. a.  
     **Mistura** simplex. 898. b.  
**Mit; Esser** † 1103. a. \* 453. b.  
     **Observatio** de iis \* 837. a.  
**Mithridati** ingrediens opium \* 572. a.  
     **Mithridati** usus in peste † 371. b. &c.  
**Mixtura**, v. **Mistura**.  
**Mönchs; Kappe** 551. a.  
**Mæror** prosternens appetitum \* 122. a.  
     **Mæror** Melancholicorum † 864. a. \* 107. a.  
     **Mæror** tabem concilians † 394. b. v. **tristitia**.  
**Mæstia**, v. **tristitia**, **mæror**.  
**Mola** † 988. a. b. an etiam virgines & viduæ molas ferant † 988. b. differentiarum earum ibid. sqq. causa † 989. b. exempla † 990. a.  
     **Diagnosis** † 991. a. distinctio à vera gravidatione † 991. a. **Prognosis** † 992. a. **Cura** † 992. b.  
     **Mola** uterum irritans \* 327. b.  
**Momordica**, ejus præparata & usus. 486. a.  
**Mond; Kalb / Mond; Kind** † 989. a.  
**Mondsüchtige / qui** † 710. a.  
**Monstrosus partus** ejusque causa, † 958. a.  
**Morbus** quid? 118. a.  
     **Morborum**, imprimis chronicorum, ortus † 3. b. \* 519. a.  
     **Morbi** non oriuntur ex alimentis præcisè, sed ex individui dispositione † 634. b.  
     **Morborum** generatio ex mente Hippocratis. 125. a.  
     **Magnorum** morborum parva initia \* 789. a. seqq.  
     **Ufus** hujus doctrinæ \* 808. b.  
     **Morborum** origines cur subinde invicem confundantur † 701. a.  
     **In omni morbo** primo spiritus considerandi \* 238. a.  
     **In omnibus morbis** est motus spirituum inordinatus \* 201. b.



# INDEX UNIVERSALIS

- Omnium morborum fundamentum sunt spiritus \* 797. b  
 Quinque capita circa quemvis morbum p. n. ordine pertractandum observanda † 2. b  
 Morborum productrices, subjectum &c. \* 810. b. sq.  
 Morbi subjectum est vel inhaesionis vel radicationis 118. b  
 Morborum subjectum principale est spiritus & sanguis 118. b  
 Morbi subjectum est totum corpus & singulae ejus partes 118. a. b  
 Morborum corporis nostri existentium causa & rectio. 27. a  
 Morborum causa quotuplices 119. a. b  
 Morborum causa proxima efficiens formalis est spiritus inlitus & influus. 130. b. sq.  
 Morbi causa proxima non ex mole aestimanda. 129. a  
 In morbis internis quam plurimis, quasi sponte natura enatis duplex causarum habenda est ratio \* 296. b  
 Causa morbi sublata tollitur effectus & symptomata † 2. a. saepe vix circa radicem morborum versantur practici, sed vel circa causam occasionalem vel productum morbum \* 78. a. (v. Curatio.)  
 Morborum productio & exacerbatio per influxum astralem \* 785. a  
 Morbosum productum in praxi vulgari saepe habetur pro causa morbi † 182. b.  
 Morbus & productum morbosum quomodo distinguenda. 129. b. sq.  
 Morborum consensus † 26. a.  
 Morborum differentiae. 131. b  
 Morborum gradus unde dependeant. 138. b  
 Morbi signum quid. 139. a  
 Morborum diagnosi & fiendi ratio unde petenda 139. a. † 2. b. \* 78. a  
 Morbi magnitudo unde cognoscatur \* 220. b  
 Morbi indicationes à Medico observandae \* 669. a  
 Morborum praeservatio ex Hippocrate. 142. b  
 Attendenda in morbo † 28. a  
 Cur multi morbi incurabiles habeantur à Medico 181. a. † 1. b. \* 78. a  
 Natura non statim molitur in principio morbi, sed in statu excretionis \* 248. a  
 Morborum exercitus indies auctior, unde \* 847. a  
 In quorum morbis tempus, natura, habitus, aetasque congruit, leviori periculo versantur, quam si nihil horum congruat \* 220. b  
 Morbus quomodo fiat contagiosus † 320. b  
 Morborum communicatio per ideas terminales brutorum \* 799. b  
 Minimum peccatum infert morbum maximum \* 335. a  
 Inclinatorio & dispositio ad hunc vel illum morbum unde † 242. b  
 Morbi ratione naturae aut temperamentis alii dicuntur naturae cognati & familiares, alii minus \* 220. b  
 Morbi consanguineos licet dissitos simul affligentes † 359. b.  
 Morborum malignitas in quo consistat \* 154. a.  
 Morbos sanandi methodus \* 668. b.  
 Morbi omnes vitae insidiantur, & remedia vitam & ejus radices vim conservantia, quosvis morbos curabunt \* 79. b.  
 Morborum Curae sympatheticae & transplantatoriae 182. a. b. seq.  
 Morborum recidiva unde † 534. a.  
 Morbi infantum praecipui, eorum causa & origo, cura † 1061. a. † 1062. b. † 1070. b. † 1071. a † 1072. a. \* 526. a. b. \* 528. b. \* 535. a. \* 544. b. sqq. ibi alia volatilia primatum obtinent \* 546. a. Quae porro conducant ibid. b. Conveniens hic sulphur ex scoris antimon. \* 80. a.  
 Morbi virili sexui proprii † 897. a. seqq. v. affectus, contagium, aeger status.  
 Morbus acutus nullus est hereditarius \* 111. b  
 Morbis acutis purgantia nocent † 108. a.  
 Morbis acutis convalescentes cur tamdiu debiles \* 238. a. b.  
 v. acuti morbi. Febres acutae.  
 Morbi aetatum. 143. a.  
 Morborum archealium conditio & Cura 181. b. seq.  
 Morbus castrensis & ejus cura † 338. a  
 Morbi Chronici unde 243. a. b. † 90. a. Eorum origo prima & radix † 182. b. \* 105. a. duo in his affectibus distinguenda, radix & productum morbosum \* 105. a.  
 Chronicorum morborum apud veteres duo fontes † 181. a.  
 Chronicorum morborum initia parva \* 804. b  
 Chronicorum affectuum Cura. 243. b.  
 Medicamentorum in Morbis Chronicis basis † 182. b. optima remedia quae \* 105. b  
 Decoctorum usus in affectibus chronicis \* 653. a  
 Morbis chronicis conducit infusio \* 502. a.  
 Nodulus alterativus & laxativus in morbo chronicis vernali tempore usurpandus \* 647. b  
 Pilulae in chronicis febribus contra aetum \* 639. a  
 Morbi Conformationis & eorum Cura. 135. a 178. a. b.  
 Morbi compositionis, intemperiei, organicae formae &c. \* 101. a.  
 Morbus dicitur vel per essentiam, vel per consensum. 119. a.  
 Morbus per Consensum quis. 137. a.  
 Morbi epidemici. 136. b.  
 Morbus Gallicus, v. lues Venerea.  
 Morbi hereditarii qui 137. \* 111. b  
 Hereditariorum affectuum communicatio unde dependeat 90. b.  
 Hereditariis in morbis an conducatur infusio \* 509. a.  
 Morbi mali moris s. maligni qui 138. \* 245. b  
 v. malignus Morbus.  
 Morbus regius per febres Ictero superveniens † 252. b.  
 Morbi Spirituum, vid. Spiritus.  
 Morborum Unitatis solutae causa & Cura. 178. b. seq.  
 Morbilla † 344. b. † 1102. a.  
 Morbillorum infantum radicata origo \* 540. a  
 cur. \* 551. b.  
 De Morbillis casus & obs. \* 340. a. b. \* 381. b \* 411. b. \* 422. a. b.  
 Morbilli ignei † 343. a.  
 Morbillorum febres † 244. b

Emul-

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Emulsio in statu morbillorum \* 644. b.  
 Contra morbillos pulvis \* 633. a.  
 Ab iis relicta gangrena faciei curata \* 76. b.  
 v. Variolæ.  
*Morbosa fermenta* considerata \* 802. b.  
 Morbosorum fermentorum diversitas; 136.  
 b. seq.  
*Mordax* dolor † 745. b. † 750. a.  
*Mores* sequuntur temperamentum corporis \* 309. b.  
 Mores mutantur à morbis \* 92. b.  
 Mores diversi juvenum, senum &c. unde  
 \* 92. b.  
 Mores & morbi brutorum per ideas commu-  
 nicati hominibus \* 799. b.  
*Morofitas* melancholicorum † 779. a.  
*Mors* subita non semper ex apoplexia † 238. b.  
 Mortis causa in impedita respiratione \* 750. a.  
 \* 756. b.  
*Morsuli* quid? eorumque præscribendi modus  
 \* 636. b. & compositio 243. b.  
*Morsus* omnis habet quoddam virus \* 39. b.  
 \* 48. a. \* 460. a. \* 473. a.  
 Morsus irati hominis est venenatus \* 800. b.  
 Morsu venenari aut irati animalis indicium  
 vulnus, ejus diagnosi, prognosis,  
 cura † 884. b. \* 48. a. b.  
 Morsu animalis communicata rabies &c.  
 \* 799. b.  
 Morsus à cane rabido, & inde nata rabies  
 † 856. a.  
 Mortuus ab urso \* 359. b.  
*Mortificatio* partis s. gangrena \* 75. a. \* 78. a.  
*Morus*, ejus differentia, præparata & usus, 486. b.  
*Moschardina* quid? 861. b.  
*Moschata* & macis, ejus præparata & usus, 487. a.  
 v. nux moschata.  
*Moschius*, s. Moschi Capreolus, cujus usus in Medi-  
 cina 677. a.  
*Moschus* & ejus laudes † 384. b.  
*Motor* secundus quid dicatur. 20. b. seqq. v. mo-  
 vens.  
*Motus* quoruplex. 16. b.  
 Materia est subjectum motus. 17. a.  
 Motus causa efficiens, quæ & unde. 12. a.  
 20. b.  
 Motus partium determinatus unde 107. a.  
 Motus determinatio unde cognoscenda.  
 17. a. b.  
 Motus corporis, v. actiones.  
 Motus corporis unde \* 90. a.  
 Motus nimius corporis lipothymiam indu-  
 cens † 389. a.  
 Motus corporis nimius tabem concilians  
 † 395. a.  
 Motus violentus gravidis noxius † 995. a.  
 Motus violentior abortum inferens † 1011. b.  
 Motus vehementior cur respirationem diffici-  
 liorem reddat † 195. a.  
 Motus nimius sanguinem attenuans † 239.  
 b.  
 Motus spirituum demonstratus \* 793. b.  
 sq.  
 Motus spirituum læsiones † 700. a. b.  
 Motus animalis, s. spontaneus. 101. b.  
 Motus elasticus quid 16. b. & unde. ibid.  
 Motus intestinalis quoruplex 17. b.  
 Motus localis quoruplex. 17. b.  
 Motus peristalticus quid 105. a. cur dicatur  
 involuntarius. ibid.
- Motus peristaltici inversio in intest. † 96. b.  
 sq.  
 Motus cessatio subitanea \* 181. b.  
 Motus partium corporis quando cesset,  
 \* 114. b. v. sensus.  
 Motus stellarum \* 439. a. \* 442. b.  
*Movendi* virtus unde \* 782. b.  
*Movens* datur triplex. 20. a.  
 Movens primum est Deus. 20. b. v. motor.  
*Mucago* oris in asthma. \* 196. a.  
*Mucidis* inest occultum acidum \* 1. a.  
*Mucilagines* egregie nutriunt \* 827. b.  
*Mucus* in apoplexia, catarrho suffocativo &c.  
 † 239. b.  
 Mucus in coryza unde \* 228. a.  
 Mucum in faucium & tonsillarum inflamma-  
 tione tollentia † 546. a.  
 Mucum resolutiva & excernentia in febr.  
 lenta † 308. b.  
 Mucum intestinalium abstergentia † 122. a. b.  
 Muci acidi & viscosi infantum cura † 1073. a.  
 Mucus in tussi † 225. b. sqq. † 231. a.  
 Mucus ex spina \* 228. a.  
 Muci defectus exempla. † 46. b.  
 Muci viscosi in faucium cavitate hærentis in  
 febr. contin. lymphat. cura \* 236. b.  
*Mùlthin* in Haaren. † 532. b.  
*Mulseribus* conducens infusionum usus \* 509. b.  
 v. femina  
*Mulus*, Mula, cujus usus in Medicina. 678. a.  
*Mulsa medicata* parandi ratio \* 651. b.  
*Multiplicatio* affectuum \* 117. a.  
*Murina* quid † 893. b.  
 Mumie conservativum præcipuum myrrha  
 \* 44. b.  
 Mumia spiritalis quid 183. a.  
 Mumialis conspiratio & confermentatio in  
 consanguineis † 359. b.  
 R. Mumie Crollii 910. a.  
*Mùndstappe*. 489. b.  
*Mùndsaule*. † 53. b.  
*Mundificantra* ulcerum quæ \* 56. b. \* 57. b. \* 58. a.  
 Eorum gradus & proprietates, ibid. utendi  
 modus \* 58. b.  
*Mundus* quid \* 742. a.  
 quo anni tempore conditus \* 443. a.  
 Mundi principia elementa tria \* 740. b. ani-  
 ma, spiritus & mens. \* 741. b.  
 Mundi spiritus quid 246. b.  
 Mundi infinitudo eludicatur \* 740. b.  
*Murmenti* pinguedo \* 822. a.  
*Murmura* alvi † 155. a.  
 Murmura abdominis in hepatis inflammat.  
 \* 282. a.  
 v. abdomen.  
*Mus*, cujus usus in Medicina. 678. a.  
*Mus Alpinus*, cujus usus in Medicina 678. a.  
*Musca* cujus usus in Medicina. 707. b.  
 Muscæ ante oculos versantes † 718. b.  
 Muscarum captura in epilepsia † 809. a.  
 Muscarum venatio in febr. mal. † 327. b.  
*Musculus* quid? 101. a.  
 Musculorum systema † 25. a.  
 Musculi structura rhomboidea 105. b.  
 Musculi motus quomodo fiat. 105. b. seqq.  
 Musculorum movendi vis \* 782. b.  
 Musculorum actiones † 821. b.  
 Musculus omnis agit sui contractione ex in-  
 terno principio orta \* 716. a. Partibus  
 rum

# INDEX UNIVERSALIS

- tum structura tum loco, tum mobilitate respectiva differentibus, utrinque affixus est, trahitque versus partem immobiliorum \* 726. b. alia asserta de musculis, ibid.
- Musculorum contractio an fiat per effervescentiam à sale acri nitroso \* 761. a.
- Musculorum inflammatio † 561. a.
- Musculorum tonus quomodo lædatur † 33. b.
- Musculorum officium in respiratione \* 725. a.
- Musculorum abdominis motus in respiratione \* 720. a.
- Musculorum thoracem moventium consideratio \* 726. a.
- Musculus temporalis*, v. *temporalis musculus*.
- Muscus*, ejus differentia, præparata & usus, 488. b.
- Muscam amans melancholicus* \* 107. a.
- Muscum delirium* † 891. b.
- Mustela*, cujus usus in Medicina. 695. a.
- Mustum*. Ejus gas inebrians & suffocans † 192. a.
- Musti fermentatio, 347. a. b. seq. \* 83. a. seqq.
- Musti separatio à fœcibus \* 126. b.
- Mutterkraut*. 462. b. 479. b.
- Mutter-Nelken*. 410. b.
- Mutterpflaster*. \* 664. b.
- Mutter Schwellung der Kindbetterinnen*. † 1041. a.
- Mutus*, v. *vox*.
- Myopia* quid † 718. b.
- Myrmecia* quales tumores, earumque cura \* 30. b.
- Myrobalani*, eorum præparata & usus. 630. a.
- Myrrha*, ejus præparata & usus. 587. b.
- Myrrha mumie præcipuum præservativum est, & corruptionem arceat \* 44. b.
- Myrrhæ usus in affectibus lymphæ \* 131. b.
- usus in peste † 366. a.
- usus in variolis & morbill. † 351. b.
- Myrtillus*, ejus præparata & usus. 489. a.
- N.**
- N**abelwurm † 1095. b.
- Nachtschatten*. 545. b.
- Nackende Magd*. 627. b.
- Nadel-Kerffel*. 415. b.
- Navorum* curatio in variol. & morbill. † 354. b. v. *macula*.
- Napellus*, ejus præparata & usus. 489. b.
- Napus* ejus usus. 490. a.
- Narcosis* an citra præternaturalem humorum corporis per externam inspirationem &c. alterationem, ex causis internis generari possit † 710. b.
- Narcosin tollentia \* 813. b.
- Narcotica* omnia sunt sulphurea \* 813. a.
- Narcoticorum vis inebrians \* 810. b.
- Narcotica vis succorum corporis † 711. b.
- Narcotica remedia † 713. a.
- Narcoticorum correctio per alcalia \* 130. b.
- Narcoticorum usus in sistendo dolore partium † 747. a.
- usus in epilepsia † 813. a.
- usus in phrenitide † 861. a.
- Narden-Saamen* (Schwarz) 495. a.
- Nares*. Cur animalia, licet pulmonibus inspirato ab aëre dispanis, si os naresque illis obturentur, omnibus nihilominus vitæ sigillis confestim priventur, ac penitus denique moriantur \* 764. b. \* 765. a.
- Narium meatus ad temperandum inspiratam aërem \* 199. a.
- Membrana narium, tubulique † 687. b.
- Narium membrana sternutatoriorum abusu minus sensibilis facta † 216. b.
- Narium abscessus † 792. b.
- Narium catarrhus, v. *Coryza*.
- Narium convulsio † 805. a.
- Narium excoriatio, rubor, exulceratio ob coryzam † 687. a.
- Narium hæmorrhagiæ, v. hæmorrhagiæ.
- Narium defensio in morbill. & variol. † 356. b.
- Denarium obstructione casus & observatio \* 352. b.
- Linimentum contra narium obstructionem \* 663. a.
- Narium obstructio in infantibus cum cura † 1097. b.
- Narium Polypus v. *Polypus*.
- Narium stillicidium in coryza \* 227. b.
- Narium ulcera à lue Gallica † 474. b.
- Narren-Pulver* † 875. b.
- Nasturtium*, ejus differ. præparata & usus. 490. a.
- Nasus* corrugatus in febr. mal. \* 246. a.
- Nasi torrura † 48. a.
- Nasus affectus in podagra † 773. a.
- Natterwurzel*. 401. a.
- Natterjunge*. 498. a.
- Natura* in quo consistat. 143. b. sq.
- semper & ubique geometrizat † 1. b.
- ludens variis formis \* 449. a.
- Naturarum diversitas in diversis individuis \* 118. a.
- Naturæ minister medicus † 192. b.
- Naturâ vitiosè agente quid faciendum Medico † 252. a.
- Naturæ conservatio & restauratio 79. b.
- Nil magis contra naturam est quam dolor \* 171. b.
- v. *ars*, *constitutio*.
- Naturalem facultatem* concernentia † 5. b.
- Naturalium rerum* ortus, progressus & interitus unde deducendus. 181. a. b.
- Naturalis scientia*, v. *scientia*.
- Navigatio submarina* Cornelii Drebelii \* 766. a.
- Nausea* quid? † 70. a. seqq. differentia ejus † 70. b. seqq. subjectum, causæ † 71. a. b. cura † 74. b. sqq. si ab assumpto medicamento † 78. a.
- Nausea in morbis contagiosis † 320. b.
- Nausea signum suscepti contagii \* 245. a.
- Nausea in inflamm. hepatis † 575. b.
- Nausea sine manifesta causa in peste † 361. a.
- Nausea ciborum, ejus causæ, cura † 39. a. b.
- Nauseam ciborum tollens † 92. a.
- Nausea & fastidium ciborum in gravidis, ejus causa, prognosis, cura † 1000. a.
- Denausea foeminae casus & obs. \* 368. a.
- Nausea felis &c. unde \* 117. a.
- v. *fastidium*.
- Neapolitanus morbus*, v. *lues Venerea*.
- Nebula* cura in variol. & morbill. † 356. a.



# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

*Necrosis* quid? \* 75. a.  
*Nelcken. Garten-Nelcken.* 410. a.  
*Mutter-Nelcken.* 410. b.  
*Nepeta* cujus usus. 491. b.  
*Nephritis* ex asparagiflu § 634. b.  
*Nephriticorum* symptomata \* 189. b.  
*Nephritidis* cura præservativa \* 292. a.  
*Nephriticus* dolor § 156. a. § 167. b.  
§ 170. b. \* 178. b.  
*Nephritici* doloris distinctio à colica  
§ 161. a.  
*Consultatio* de nephritide \* 288. a.  
*De dolore nephritico* casus & obs. \* 346. b.  
\* 383. a.  
*De nephritico affectu gravidæ* casus & obs.  
\* 434. a.  
*De dolore nephritico scorbutico* casus & ob-  
servatio \* 398. b. \* 399. a.  
*Nephritici* dolores in scorbutico quomodo cu-  
randi § 496. a. § 507. b.  
*De nephritico dolore notho* casus est obser-  
vatio \* 361. b.  
*Nephritis* falsò pro tali habita in pleuritido  
§ 565. a.  
*Emulsio nephritico-Cathartica* \* 644. b.  
*Nephritidi* an proficua infusio \* 509. a.  
*Linimentum* in nephritico dolore \* 663. a.  
*Pulvis anti-nephriticus.* 950. a.  
pro nephriticis doloribus semicupium  
\* 656. b.  
*Nephritica* R. D. Sulzbergeri. 933. b.  
v. *Renum* inflammatio, renum calculus.  
*Nephriticus Lapis* cujus usus in Med. 724. b.  
*Nephriticum lignum,* ejus præparata & usus.  
491. b.  
*Neptunus* maris deus \* 446. a.  
*Nervi* quid § 804. a.  
*Nervosi* systematis consideratio § 25. a.  
§ 701. a. ejus sensibilitas § 26. a.  
*Nervorum* systema veteribus incognitum  
\* 173. a.  
*structura* mirabilis, plus minus delicata  
§ 25. a. \* 179. a.  
*Nervorum,* præsertim intercostalis, mirabilis  
textura \* 181. a. b.  
*Systema nervosum* in aliis plus, in aliis minus  
sensibile, & à remediis facilius nunc, nunc  
difficilius afficiuntur \* 118. b.  
*Nervi* per se indeterminati sunt ad sensum vel  
acutum vel obtusum præstandum \* 189. a.  
*Nervæ* partes in mulieribus sensiliores &  
subtiliores § 26. a.  
*Nervearum* partium nutrimentum, basis,  
§ 25. a. \* 110. a.  
*Nervorum* motus. 106. a. b.  
*Nervorum* vis motoria \* 781. b.  
*Motus* omnis genuinum organon est fibra  
nervea. 124. b. sq.  
*Nervorum* consensus invicem § 26. a.  
*Nervosum* genus comparitur subinde cum  
stomacho \* 137. b.  
*Nervorum* consensus cum luna § 701. a.  
*Nervæ* compages cutis \* 561. a.  
*Nervosarum* fibrillarum ramificatio varia  
§ 26. a.  
*Nervosarum* partium læsiones exiguæ  
\* 896. a.  
*Nervæ* partes affectæ difficiliter curantur à  
chirurgo, quàm sanguinæ \* 1. b.

*Nervi* affecti palpitatio cordis causa  
§ 382. a.  
*Nervorum* in fracturis dislocatio & contusio  
quomodo curanda \* 74. a.  
*Nervorum* convulsiones § 805. b. sqq.  
*Nervis* inimica § 4. b.  
*Nervis* inimicissimum est frigus & acidum  
§ 124. a. \* 172. b.  
*Nervis* dicata § 4. b. \* 80. a.  
*Nervis* amica calida, \* 172. b.  
*Nervorum* in affectibus scorbuticis decoctum  
\* 653. b.  
*Nervorum* vulnera, cum prognosi & cura  
\* 50. a.  
Sunt cautè tractanda & cur § 50. a. \* 53. b.  
*Nervi optici* vitia § 729. b.  
*Nessel/ v. Heyter-Nessel.*  
*Nicotiana,* ejus differentia, præparata & usus. 492. a.  
874. b.  
*Nicotianæ* usus in asthma § 205. b.  
ex nicotiana pilulæ \* 639. b. v. *Tabac-*  
*cum.*  
*Nidiosa* maximè lædunt ventriculum. \* 129. a.  
*Nigella,* ejus differentia, præparata & usus.  
495. a.  
*Nigellastrum* cujus usus. 495. b.  
*Nigredo cutis* ejusque cura § 530. a.  
*Nitrum,* ejus præparata & usus. 258. a. b. sq. 796. a.  
--800. 942. a.  
*Nitri* optima præparatio. 335. b.  
*Nitri* ☉ ☽ osum unde. 248. b.  
*Nitri* virtus castrativa & in mania § 882. b.  
☉ solutio quibus modis fiat. 746. b.  
*Nitri* usus in peste § 364. a. sqq. § 371. a.  
*Nitrum* Nivis, vid. Nix.  
*Spiritus nitri* rectificati modus præparandi  
§ 169. b.  
*Nitri vitriolati* virtutes \* 834. b.  
*Nix* an pro menstruo interserviat. 261. b.  
*Nivis* nitrum an detur. 713. a.  
*Noctambuli* considerati § 709. b. sqq.  
*Noctambuli* an naturaliter seu involuntariò,  
an verò pro arbitrio animali agant \* 722. a.  
*Noctua* cujus usus in Medicina. 689. b.  
*Nodi.* Eorum cura chirurgica \* 23. a.  
*Nodulos* præscribendi formulæ \* 647. b.  
*Nox* morbos quosdam intendit \* 228. b.  
*Noxium* aliud, aliud venenatum \* 461. b.  
*Nubecula* oculi consideratio § 722. b. infantum  
§ 724. b.  
*Nucleus* pomi in asperam arteriam illapsus § 397. a.  
*Nucleus* nucis avell. in pulmones lapsus  
§ 397. a.  
*Nudatio* corporis poros occludens \* 124. b.  
*Nummularia* cujus usus. 495. b.  
*Nuncius insperatus* lipothym. excitans § 388. b.  
*Nuptorum* noviter fasciatio § 917. a. § 919. b.  
*Nutrimetum* conservat corpus § 28. a. & vitans  
\* 818. a.  
Ex quo nutrimur, ex eo constamus \* 796. a.  
*Nutrimetum* corporis duplex \* 110. a.  
\* 823. b.  
*Nutrimetum* nostrum in vegetabilibus est  
substantia gummosa, in animalibus escu-  
lentis gelatina, 121. b.  
*Nutrimetum* quomodo ex fluido in solidum  
abeat \* 826. b.

# INDEX UNIVERSALIS

- Quodnam sit agens, quod ex eodem nutrimento chyloso os, tendines, cerebrum, membranas &c. fabricet \* 90. b.
- Nutrientia † 315. b.
- Nutrimetum nervearum partium † 15. a.
- Nutriti vitium atrophiam inferens. † 394. a.
- v. alimentum.
- Nutrita remedia quæ dicantur 855. a.
- Nutritum in inunctionibus quid \* 662. b.
- Nutritio quid \* 819. a.
- Nutritio est continuata generatio. 12. b. seq.
- Nutritiois modus. 46. b.
- Nutritio quomodo perficiatur. 37. b.
- Nutritiois tria requisita \* 90. b.
- Nutritiois ratio Hippocr. \* 519. a.
- Nutritio partium solidarum quomodo fiat. 47. b.
- Nutritivam vim habentes cibi \* 827. a.
- Nutritioem promoventes causæ \* 823. a.
- Nutritio non conducit infusio \* 504. b.
- Nutritio læsa ejusque cura † 394. a. seqq. † 416. a.
- Nutritio aqua † 412. a. v. Corpulentia nimia.
- Nutritio nimia quomodo obviandum \* 829. b.
- Nutritio fœtus in utero \* 752. a. b. per umbilicum † 1065. b.
- Nutritiois infantum historia \* 525. a.
- Nutritio infantum, quæ & qualis † 1065. b.
- Nutritio fœtus cum lacte \* 525. a. pulte \* 526. a.
- Nutriti succi abundantia &c. \* 823. a.
- Nutrix. Earum lac examinatum † 1062. a.
- Nutricum vitia infantibus ominosa † 1065. seqq.
- Nux moschata. Ejus usus in cruditate nidorosa \* 131. a. v. Moschata.
- Nyctalopia, qualis affectus † 718. a. ejus causæ & cura † 733. a.
- Nymphaea, ejus præparata & usus. 496. a.
- O.**
- O**bauditio in febr. mal. † 327. a.
- Obauditionis prognos &c. † 735. b.
- Oberbeine / quales tumores, eorum causæ, cura chirurgica \* 28. a.
- Obei cur hæmorrhagiæ obnoxii † 608. b. v. Corpulentia nimia, pinguis.
- Objecta sensus moventia † 702. a.
- Objecta externa fortius afficiunt spiritus animales \* 298. a.
- Oblivionis causæ † 851. b.
- Obliviositas somnolentorum † 711. a.
- Oblutescentia † 218. b.
- Obstericis officium circa puerperas. † 1006. a. in fecunditæ retentione † 1028. b.
- Obstericum cautelæ in partu instantes † 1008. b. seqq. † 1015. difficili † 1016. b. † 1019. † 1020. b.
- Obstericum officium circa partum recens editum † 1061. a.
- Obstructiones non sunt radix morbi, sed saltem pro ductum morbosum. 136. a.
- Obstructiones sunt ignorantie asyla. 135. b.
- Obstructiones non planè negandæ, sed abusus tantum tollendus † 182. a.
- Obstructio colica alvi † 161. b. † 166. a.
- Obstructionum in febr. mal. cura † 332. a.
- Obstructio stuporem & tumorem partium inducens \* 281. b.
- Obstructio viscerum † 90. b. v. viscera.
- Obstructionibus conducentia medicamenta. † 183. a. b.
- Occallescentia in orificiis ulcerum sinuorum unde \* 55. b. v. callus.
- Oculæ qualitates hodie non attenduntur † 3. a.
- Uchsenzungen (wilde) 404. a.
- Oceani fertilitas \* 446. a.
- Oculorum morbilis unde † 590. a.
- Oculi glandula major † 589. b.
- Oculorum vasculum excretorium ad nares tendens † 596. b.
- Oculorum contorsio in epilepsia unde \* 301. a.
- Fotus in oculorum contusione aut livore \* 655. a.
- Oculorum dolores cum prognosi & curat † 756. b. compressivus dolor, (das Erüffen.) † 757. b.
- De oculi dolore casus & obs. \* 396. b.
- Casus & observ. de oculorum dolore in febre tertiana intermit. scorbutica \* 381. a.
- Oculorum dolor in bulbis epilepticus † 809. a.
- Emplastrum in gravi oculorum dolore ex syncipitis dolore \* 658. b.
- Oculorum affectus in febr. mal. † 351. b.
- Oculorum frictio nociva † 731. a.
- Oculorum inflammatio † 588. a.
- Collyrium contra oculorum inflammationem \* 642. b.
- Oculi festucæ, paleæ, scobis illapsu læsi cura † 597. b.
- Oculorum pallor & tumor in cachexia \* 273. a.
- Cataplasma contra dolorem & percussionem oculorum \* 658. a.
- Oculorum protrusio in hydrocephalo † 696. b.
- Oculorum affectus in peste † 360. b.
- Oculorum spasmus † 47. b.
- Oculorum pathemata in variolis \* 257. b.
- Oculorum hebetudo ex variolis, cancri. milis, aromatibus &c. † 730. b.
- Oculorum præservatio in variol. & morbill. † 355. a.
- Oculorum hebetudo in vertigine † 796. b. sq.
- Pulvis ad oculorum Unguem \* 635. b.
- Oculis inimica † 4. b.
- Oculorum affectibus sternutatoria sunt inimica, non errhina † 217. b.
- Oculus, v. ophthalmica, collyrium, visus.
- Odontagra † 773. a.
- Ejus causæ † 752. a. Diagnos, prognos, cura † 753. a. seqq. magnetica cura † 755. a.
- Odontalgia casus & obs. \* 362. a.
- Linimentum contra odontalgiam cum hemi-crania \* 663. b.
- Linimentum in odontalgia cum phlegosi erysipelacea \* 663. b.
- Pilulæ in odontalgia externa usurpatæ \* 639. b.
- Odontalgia gravidarum curatio † 1002. a.
- Odermenge. 381. a.
- Odor quomodo fiat. 98. a.
- Oderatus v. olfactus, ozæna.
- Odores in quo consistant. 361. a.
- Odoris definitio. 99. a.

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Odoris** primum organum. 99. a. b.  
**Odorum** miranda diffusio \* 803. b.  
**Odoris** sagacitas homini communicata à cane. \* 799. b.  
**Odor** corporis, cibi, potus foetidus in peste † 361. a.  
**Odores** foetidi in peste utiles † 365. a.  
**Odores** fortes gravidis vitandi † 994. a.  
**Odores** fugaces unde. 99. a.  
**Odor** gratus l. ingratus quomodo fiat. 99. b.  
**Odores** graveolentes, s. foetores unde. 99. a.  
**Odor** gravis syncopes & lipothymiae causa † 388. b.  
**Odor** fortis, gravis abortus causa † 1011. a. v. spirituosus, oleosus.  
**Odorum** vis medica \* 489. b.  
**Odorum** vis in delicatioribus subjectis † 968. a.  
**Odoris** vis in excitandis variis symptomatib. \* 567. b.  
**Odores** passionem hystericam inducentes † 964. a. b.  
**Odores** cæci fermentorum \* 325. a.  
**Odor** felis &c. nauseosus unde \* 325. a.  
**Odor** genituræ alliciens \* 325. a.  
**Odor** Moichi &c. mulieribus cur gravis \* 117. b.  
**Odores** plantarum activæ sunt partes \* 795. a.  
**Odore** efficacia simplicium non dijudicanda \* 846. a.  
**Odor** succorum varians unde \* 151. a.  
**Odoriteræ** pilulæ externæ applici \* 639. b.  
**Odoratus** v. olfactus, ozæna.  
**Oedema** quid, ejus ortus, Prognosis, cura chirurg. \* 21. b.  
**Oedematosi** & ulcerosi pedes \* 349. b. \* 355. a.  
**Oedematofus** tumor ex luxatione inflammata. \* 68. b. ex fractura ossis \* 71. a.  
**Oedematosi** pedum tumoris casus & obf. \* 375. b. \* 376. a.  
**v. pedum** tumor \* 368. a.  
**Oehlbaum.** 496. b.  
**Oesophagi** læsio † 70. a.  
**Oesophagi** vulnerum lethalitas \* 36. a.  
**Oestrum** venereum brutorum, mulierum † 956. a.  
**Officinales** pulveres quid valeant. 861. a.  
**Liquores** officinales quid. 830. b.  
**Rotulæ** ac tabulæ officinales quæ sufficere possunt. 861. a.  
**Ohnmacht.** \* 786. a.  
**quale** symptoma. \* 181. b.  
**Ohrenschwüre.** \* 17. a.  
**Ohrenwang.** † 758. a.  
**Olea, oliva,** inde præparata & usus. 496. b.  
**Olea** quid sint \* 795. a.  
**Eorum** parandorum & destillandorum modus. 819. a.  
**Olea** destillata quid? \* 562. a.  
**Olea** destillata, cujus usus. 866. b.  
**Olea** destillata empyreumatica, quomodo deponant foetorem † 24. a.  
**o** expressa, ea parandi modus. 824. a.  
**Olea** per infusionem & decoctionem. 830. b.  
**Oleo** Heraclino & ballamino multum præstitit Rulandus \* 79. b.  
**Oleum** ignis Veneris Helmontii cui usui † 5. b.  
**o** ex lingis extracta quid. 369. b.  
**Olei** olivarum vis vomitoria rejecta † 11. a.  
**Oleo** Veneris multum tribuitur \* 70. b.  
**Oleum** tartari, philosophorum, saponisve potenter resolvit, tumores duros discutit & emollit \* 24. b.  
**Olenia** fortiter in convulsivis affectibus non omnibus conveniunt † 384. a.  
**Oleosus.** is inest occultum acidum \* 1. a. propter quod vulneribus & partibus nerveis sunt inimica \* 40. b.  
**Oleosus** spirituosus non omnes ferre possunt † 390. b.  
**Oleosorum** usus in morbis infantum \* 546. b.  
**Oleosorum** seminum vis nutritiva \* 827. b.  
**Oleositatem** minuentia & augmentantia † 8. a.  
**Olfactus** tripliciter læditur † 789. a.  
**Olfactus** imminutus aut abolitus ejusque causæ † 789. b. Diagnofis, prognofis, cura † 790. a. b. cur Itali hoc sensu ferè careant † 790. a. v. odoratus.  
**Olor,** ejus usus in Medicina. 689. b.  
**Omenti** consensus cum cute \* 572. b.  
**Omentum** intestinis substratum prolapsum † 172. a.  
**Omenti** descensus in hernia \* 185. a.  
**Omenti** tumores † 560. b.  
**Omenti** vulnera sunt per se lethalia \* 36. b.  
**Omphacium** cujus usus. 589. a.  
**Omphalosele** † 472. b.  
**Ononis,** ejus præparata & usus. 497. b.  
**Operationes** determinantes idæ \* 470. b.  
**Operationes** animales, v. Animales operationes.  
**Ophioleffum,** ejus præparata & usus. 498. a.  
**Ophthalmia** † 4. b. † 721. a. seqq.  
**Ejus** differentia, subjectum, causæ † 588. a. b. tres ejus gradus † 589. a. quatuor ejus tempora distinguenda † 590. b. Diagnofis, prognofis † 591. a. Cura ibid. b.  
**Opium,** ejus præparatio & usus. 589. b.  
**Opium** quale remedium. 180. b. seqq.  
**Opium** sapor amarulentus \* 568. a.  
**Opium** operandi modus in quo consistat 181. a.  
**Opium** inebrians \* 810. a.  
**Opium** quomodo somnum inducat \* 564. a.  
**Rarè** opium solum pro sudorifero adhibendum \* 571. b.  
**Quomodo** opium sanguinem transmutet, & cutim ad sudorem disponat \* 561. b.  
**Opio** cur Turcæ in magna dosi tutò utantur \* 814. b.  
**Anodynus** liquor ex opio. 997. b.  
**Opium** castratio & correctio \* 563. b. \* 568. seqq.  
**Opium** optima correctio \* 496. b.  
**Opium** correctio per alcali. 337. a.  
**Opium** correcti usus. 255. b.  
**Opium** vires & usus † 5. a. \* 79. a.  
**usus** insignis in variis affectibus † 108. b.  
**Opium** vomitum provocat, secessum & urinam promover, lochiorum fluxum adjuvat &c. \* 568. a.  
**Opium** usus in affectib. lymphæ, catarrhis \* 231. b.  
**Opiata** quæ, & eorum præscribendi modus \* 634. b.  
**Opiata** necrotica dicta, cur; quomodo legitime administranda, ne gangrænam intestinis inducant \* 158. b.  
**qua** ratione & modo in spiritibus agant opiatæ \* 567. a.



# INDEX UNIVERSALIS

- Opii vis diaphoretica** \* 554. a. virtutes aliae \* 556. a. sqq. vis sudorifera \* 559. a.  
**Odoriter opiorum vis** \* 567. a.  
**Opiatorum correctio** 255. a.  
**Opiata purgantibus & vomitoriis mista** \* 139. a.  
**Opiata ubi profunt vel nocent** 962. b.  
**Opiata abortus causa** † 1011. b.  
**Opiatorum usus in abdominis doloribus** \* 172. a.  
**usus in agrypnia** † 705. a.  
**usus in arthrit. & podagra** † 778. a.  
**usus in asthma** † 203. b.  
**usus in calculo rerum** † 640. a.  
**usus in catarrhis** † 683. a. † 684. a.  
**usus in cephalalg.** † 767. a.  
**usus in chlorosi &c.** \* 326. a.  
**usus in clysmat. ad colic. convuls.** \* 182. b.  
**usus in delirio melanch.** † 874. a.  
**usus in epilepsia** † 813. a.  
**usus in febribus** † 254. a. † 270. b. † 279. b.  
**usus in febr. ardentibus** † 296. b.  
**usus in febr. mal.** † 330. b. \* 247. b.  
**usus in gravidis** † 298. a. \* 145. b.  
**usus in haemorrhagiis** † 612. b.  
**usus in hydropse** † 431. b.  
**usus in mania** † 883. a.  
**usus in mensium fluxu nimio, vel suppressio-**  
**ne** † 939. b. &c.  
**usus in ophthalm.** † 593. b.  
**usus in phrenitide** † 861. a. † 862. a.  
**usus in pleuritide** † 569. a.  
**usus in pleuritide notha** † 574. b.  
**usus in variol. & morbill.** † 350. b.  
**vis in sistendo vomitu &c. & propinandi ra-**  
**tio duplex** \* 154. b.  
**Opisthotonos quid** † 802. a. b.  
**Opopanax, ejus usus.** 594. a.  
**Oppositio corporum coelestium** \* 439. a.  
**Orand/ kleiner Orand.** 390. a.  
**Orbes caelestes** \* 441. b.  
**Orbiculi quid?** \* 636. a.  
**Orchis, ejus differentia, preparata & usus.**  
 536. a.  
**Organica forma, vid. forma organica.**  
**Orgasmus unde dictus, & quid propriè significat**  
 \* 576. a. humorum ibid. in menstruatione  
 muliebri &c. \* 576. b.  
**Orificium stomachi laesum** † 70. a. b.  
**Orificii stomach. differ. dolor** † 82. a.  
**ei vel minima laesio lethalis** † 82. b. v. oeso-  
 phagus, stomachus, ventriculus.  
**Origanum, ejus differentia, preparata & usus.**  
 498. h.  
**Originem attributionum corporibus respectivorum,**  
**sed tot distinctas entitates malè referi-**  
**mus** \* 555. a.  
**Orthopnoea affectus** † 193. b.  
**De orthopnoea casus & observ.** \* 346. a.  
**Orthopnoea levis juncta inflationi stomachi**  
 \* 132. b.  
**Ortus maximorum è principiis minimis** \* 738. a.  
**Orvittana** \* 634. b.  
**Os. Oris amaror. v. amaror.**  
**Oris ablutiones post pastum** \* 643. a.  
**Ore aperto non dormiendum** \* 199. a.  
**Oris distorsio ex paralyti, convulsione** † 845. a.  
**Oris hiatus ex oscitatione** † 48. b.  
**Oris oclusio in motibus convuls.** \* 184. a.  
**Oris & narium obturatio, v. nares.**  
**Oris scorbuti cura** † 503. a.  
**Contra scorbutum oris mixtura** \* 643. a.  
 v. Scorbutus oris.  
**Oris tortura, v. spasmus cynicus.**  
**Oris ulcerum à lue Gallica cura** † 474. a.  
**Oris exulcerati sub salivationis cursu in lue**  
**Venerea cura** † 464. a.  
**Oris ulcera scorbutica** † 505. b.  
**Oscitantium oris hiatus** † 48. b.  
**Oscula an contagiosa** † 457. a.  
**Ossa animalium & eorum usus.** † 132. b.  
**Ossa ut suo loco naturali & receptaculo debi-**  
**to retineantur, duo requiruntur** \* 66. b.  
**ossis immobilitas ex sinoviae coagulo**  
 \* 67. a.  
**Ossium caries in lue venerea** † 455. b. † 475. a.  
 v. caries.  
**Ossium fractura, v. fractura.**  
**Os sacrum. Dropax contra dolores circa os sacrum**  
 \* 665. a.  
**Ossa sepiæ, vid. sepiæ.**  
**Osteocolla cujus usus in Medicina.** 735. b.  
**Ostocopus dolor** † 745. b. † 750. b.  
**Ostracoderma quæ** 855. b.  
**Ostrea, cujus usus in Medicina** 695. b. 911. b.  
**Ostrearum usus in Hectica** † 317. a.  
**Otalgia considerata** † 759. a. v. Aures.  
**Ovale foramen ejusque oclusio** \* 750. a. b.  
**Ovarium muliebre** † 948. a.  
**Ovis cujus usus in Medicina.** 678. a.  
**Ovipara & vivipara quomodo differant.** 110. a.  
**Ovorum examen.** 349. b.  
**Ovorum vitalitas** \* 768. b. sq.  
**Ovi fecunditas unde** \* 89. b.  
**Ovum maternum fetus generandi prima sta-**  
**mina in se complectitur** 112. b.  
**Ova uterina fecundans spiritus** \* 320. a.  
**Ovi uterini fecunditas impedita** † 990. a. b.  
**Ovi uterini primæ conceptionis rejectio ex**  
**casu ab alto** † 1013. a.  
**Ovorum tam viviparorum, quam oviparorum**  
**consideratio** \* 790. a.  
**Ova in oviparis & viviparis quomodo diffe-**  
**rant.** 113. b.  
**Ovi albumen quid.** 108. b.  
**Ovi cicatrix.** 113. a.  
**Ovi vitellum quid.** 108. b.  
**Ovi vitellum præstat multum in dissolvendis**  
**corporibus** \* 159. b.  
**Ova quomodo sterilia reddantur** † 990. b.  
**Ova hyponemia s. subventanea** † 988. b.  
**Noxa ex ovis frixis** \* 128. b.  
**Oxymelita unde ita dicta, & quibus proficua** \* 651. b.  
**Oxymellis virtutes** \* 138. b.  
**Oxymella præstant syrupis** † 205. b.  
**Oxymelita præscribendi ratio** \* 651. b.  
**Oxymel diureticum laxativum** \* 652. a.  
**Oxysal quid.** 859. b.  
**Ozæna atque odoratus depravatus** † 792. b. utrius-  
 que pars affecta, causa, prognosis & cura  
 † 793. a. b.  
**De ozæna casus & observ.** \* 362. a.  
**Mistura contra ozænam** \* 642. b.

P.

**Palati ossa in lue venerea carie affecta** † 475. a.  
 Palati

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Palati ulcus à lue Gallica* † 474. a.  
v. fauces
- Palliativa cura* febrium &c. in quo consistat \* 101. b.
- Pallor virginum*, † 95 8. 2.
- Palma*, ejus præparata & usus. 499. a.
- Palmenbaum*. 499. a.
- Palpebrarum coalitus*, casus & observatio \* 361. b.  
Palpebrarum durities & asperitas in ophthalmia † 590. b.  
Palpebrarum paralytis † 719. a.  
Palpebrarum affectus in variol. & morbill. † 366. a.
- Palpitatio arteriarum*, v. arteriæ.
- Palpitatio cordis* † 379. a. b. ejus pars affecta & causa † 380. a. Differentia à cordis tremore † 379. b. seq. Diagnol. & symptomata † 382. b. Prognosis & cura † 383. a. seqq. De cordis palpitatione casus & observat. \* 404. b.  
Cordis palpitationis ex cachexia muliebri cura † 962. b.  
Palpitatio diaphragmatis in pleuritide \* 565. a.  
Cordis palpitatio gravidarum cum cura † 1002. b.  
Cordis palpitationis & anxietatum cura in peste † 378. a.  
Cordis palpitatio in pleuritide \* 178. a.  
Cordis palpitatione laborantibus non confert chirurgia transfusoria \* 105. a.
- Panacea*. 151. b. seqq. quid. 866. b. an dari possit † 79. b. qualis & quæ 79. b. ex quo regno investiganda \* 79. b.
- Panacea Glauberi* ejus compositio. 918. a. (v. universalia)
- Pancreatis conglomeratio* † 306. b.  
Pancreatis consensus cum cute \* 572. b.  
Pancreatis obstructio † 181. a.  
Pancreaticus succus elaboratus in pancreate. 76. a.  
Succi pancreatici & fellei effervescencia vitiosa † 90. a.  
Pancreaticus dolor lumbaris † 156. a.  
Pancreatis inflammatio, tumores scirrhusi &c. † 560. a.  
Pancreatis vulnera per se lethalia \* 36. b.
- Pandæon* \* 631. b.
- Panis præparatio*. 323. a. b.  
Panis quo sensu alimentorum theriaca dicitur. 121. a.  
Panis vis nutritiva \* 519. b. \* 827. a.  
Panis quatenus acidum auget † 7. a.  
Panis abhorrentia à matre picante \* 117. b.  
Panis usus in peste † 368. a.  
Spiritus panis. 319. a.  
Panis recentis olfactus præstantia † 392. b.
- Pannus oculi* consideratus † 719. a. b.
- Pannus* ejusque cura chirurgica. \* 19. a.
- Papaver*, ejus differentia, præparata & usus 334. b. 499. a.
- Papillarum defectus* † 1059. b.  
Papillarum fissurae † 1059. b.
- Pappel*. 512. b.
- Paracelsus* theoricam cognitionem non adeptus \* 845. a.  
Paracelsisticæ medicinae fundam. \* 512. b.
- Paracentesis in empyemate* † 606. a.  
Paracentesis in hydrope † 436. b.
- Paracentesis pectoris in hydrope* † 698. b.  
Paracentesis usus in pleuritide \* 280. b.
- Paracynanche* † 538. b.
- Paradies-Holz*. 380. a.
- Paradisigrana* 407. b.
- Paralytis* qualis affectus † 841. a. subjectum ejus & symptomata † 842. a. Causæ † 842. a. Diagnol. † 844. b. prognol. † 845. a. cura † 845. b.  
Paralyseos differ. ab epilepsia † 809. a.  
Paralytis ex apoplexia † 830. b. 818. a.  
De paralyti crurum casus & obs. \* 406. b.  
Paralytis faciei diff. à spasmo cynico. † 845. a.  
Paralytis scorbutica † 484. a.  
Paralyseos scorbuticæ cura † 513. a.  
Paralytis in variolis &c. † 357. b.  
Balneum in Paralyti \* 657. a.  
Decoctum in Paralyti \* 651. a.  
Hydromel paralyticum \* 651. b.  
Infusum ad affectus paralyticos externe usurpandum \* 654. a.  
Infusus pro dispositione paralytica \* 656. b.
- Paraphimosis*, ejus causæ, cura † 924. a. b.
- Paraphrenitis*, qualis affectus † 561. a. 565. a.
- Paraphrasine*, qualis affectus † 561. a. † 855. a.
- Paraplegia*, paraplexia qualis affectus † 824. b.  
Paraplegiæ differ. à Paralyti † 841. b. ejus causæ, † 838. a. b. fiendi modus † 839. a. prognol. & tres gradus † 838. b. cura † 839. b.
- Parasynanche* † 538. b.
- Paresis* Paralyseos species † 841. b.  
Pareses ex colica † 161. b.  
Pareses ex dolore scorbutico &c. † 159. b.  
Pareses cura † 846. a.
- Parietaria*, ejus præparata & usus. 500. b.
- Paris Herba*, ejus præparata & usus 501. a.
- Paronychia* cujus usus. 501. a.
- Paronychia digitorum*, ejus causæ & cura chirurgica \* 19. a. b. pollicum pedis. \* 20. a.
- Parotidum ortus* \* 17. a. cura \* 17. b.  
Parotidum conglomeratio † 306. b.  
Parotidum in peste cura † 374. a.  
Parotidum puncturæ in peste † 361. a.
- Partes affectæ* in omni morbo consideranda \* 119. a.
- Partium fluidarum cum solidis conspiratio* \* 95. a.  
Partes organicae & non-organicae. 35. b. seqq.  
Partes solidæ quibus modis morbidæ fiunt. 134. a.  
Partium solidarum morbi quomodo affligant \* 100. b.  
Pro partium solidarum viribus restitendis sanguinis transfusio nil valet \* 100. a.  
Externas partes curandi ratio \* 808. a.
- Particulae* evaporantes è corporibus, eorumque contagium \* 805. a.
- Particularum simplicia* constituentium textura, & quæ & quales illæ &c. † 3. a.
- Particularia remedia*, v. Remedia particularia.
- Parturientium regimen* † 1008. a.  
Parturientium dolores quid † 1008. b. \* 178. b.  
dolores unde † 156. a. \* 290. a.  
Parturientium dolores nostri. † 1015. b. causæ, diagnol. † 1016. a. b.

# INDEX UNIVERSALIS

- Obstetricis officium hoc casu † 1016. b. discrimen à doloribus veris ibid. prognos & cura † 1017. a.
- Partus** quid? † 1008. a.
- Partus causa 116. a. b. seq.
- Ordinarium partus tempus 116. a. b. sq. \* 321. a.
- tempus verum quomodo indagandum. 116. b.
- Partus octimestris an legitimus 116. b.
- Partui impressa à matre idiosyncrasia \* 117. a.
- Partus regimen † 1008. a.
- Partui vicinarum uterus consideratus † 1008. a.
- Partus instans qt. ex aquæ uteri effluxu dignoscendus † 1006. b.
- Partus difficilis, ejus causæ † 1017. a. b. Diagnos † 1018. b. tres circumstantiæ partum difficilem reddentes † 1019. a. Prognosis † 1019. b. Cura † 1020. a.
- De partu difficili casus & observ. \* 371. b.
- Partui difficili proficua sternutatio † 216. a. pro facilitando partu senicupium \* 656. a.
- Partus difficultas ex aquæ fluxu cessante quomodo sublevanda † 1007. a.
- Partus situs vitiosus † 1015. a. ejus repositio ibid.
- Symptomata in & circa partum † 1015. b.
- Obstetricum officium circa partum jam editum † 1061. a.
- Dolores post partum, eorumque causæ † 1038. a. Diagnos, prognos, cura † 1037. a. b.
- Dolores post partum cum suppressione urinæ in lochiorum retentione \* 327. a.
- De doloribus post partum casus & observ. \* 434. a.
- Post partum purgatio, v. purgatio.
- Partus læsiones † 1009. b.
- Partus verus cum mola † 989. b.
- Partus immaturus, v. Abortus.
- Partus post mortem matris editus \* 769. a. v. fetus.
- Passer vulgaris** & Troglodytes ejus usus in Medicina. 689. b.
- Passionis** hystericæ & epilepsiæ arcta connexio † 809. b.
- Passio. hystERICA juncta Herniæ inguinali s. bubonocèle \* 184. b.
- v. HystERICA passio.
- Passio iliaca** quid? quomodo distinguatur ab excretionē retenta † 96. b. Pars affecta & causæ † 97. a. veterum opinio ibid. quatuor species ilei à diversitate causarum differentes † 97. b. periodica, endemia † 98. a. Diagnos, prognos † 98. a. b. ejus quinque gradus † 99. a. cura † 99. a. recidiva præcavenda † 99. b. Symptomatum cura ibid. opiatorum usus hic † 99. b. sq. vitanda † 100. a.
- Passularum** virtutes † 142. a.
- Passularum vis nutritiva \* 827. b.
- Passulanum usus in scorbuto † 495. a.
- Passulæ Corinthiæ † 315. b.
- Passulata** acidum non augent † 7. a.
- Pasta regia** \* 631. b.
- Pastinaca**, ejus differentia, præparata & usus. 501. b.
- Pathologia** unde petenda \* 78. a.
- Pathologia medica Hippocratis \* 514. a.
- πᾶδες, πᾶδες** quid? \* 668. a.
- Pavana** lignum, ejus usus. 501. b.
- Pava** ejus usus in Medicina. 690. a.
- Pavonis stercus laudatum \* 300. a.
- Payeris** vis in gravidis † 1011. b.
- Pavores infantum in somno † 1087. b. Prognosis & cura † 1088. a. \* 552. b.
- Pavores infantum in somno, unde \* 541. a.
- De Pavoribus nocturnis casus & observ. \* 352. b.
- Pavoris nocturni præservativum, puerorum præsertim † 215. b.
- De pavore in somno casus & obs. \* 339. a.
- Pavoris vis in peste † 359. a. sqq. v. Merus, Terror.
- Pectoralia** eorumque compositiones. 1003. a.
- Pectorales aquæ præstantes † 205. b.
- Decoctum pectorale in tussi &c. \* 651. b.
- Hydromel resolvens & incidens pectorale \* 651. b.
- Pectorales Trochisci. 1001. b.
- Pectoris** motus in respiratione \* 724. a. sqq.
- Pectoris dolor flatuosus pleuritidi analogus † 563. b.
- Pectoris hydrops, v. hydrops pectoris.
- Pectoris incalescentia in pleuritide † 565. a.
- Pectoris vulnera quomodo tractanda \* 51. a.
- Pectoris balsamus Benzoe † 235. a.
- Decoctum in affectibus pectoris catarrhalib. \* 651. a.
- pectus affligentis lymphæ falsæ acris emulsio \* 643. a.
- Pedes.** Eorum cum abdomine consensus \* 171. a.
- Pedum calor in lue venerea † 456. a.
- Cam pede conculcatio hypochondrii sinistri \* 368. b.
- Pedibus facta conculcatio epilepsiæ causa \* 301. a.
- De pedum dolore casus & observatio \* 359. a.
- Pedum fissuræ in lue Gall. † 474. b.
- Pedum foetorem tollens lotio \* 656. b.
- Pedum jectigatio infantum † 1075. a.
- Pedum pollices & digiti, v. pollices.
- Pedum tumor in cachexia \* 273. a.
- De pedibus œdematosis & ulcerosis casus & observatio \* 349. b. \* 355. a. \* 368. a. \* 375. b. \* 376. a.
- Pedum refrigeratio colicam hypochondriacam humorosam suscitans cum dolore iliaco \* 169. a.
- Pedum tumor in hydrope † 425. a.
- Pedum tumoris in hydrope cura † 440. b. sqq.
- Pedum tumor in hydrope pectoris lethalis † 698. a. v. Tumor pedum.
- Pedum ulcera quomodo in hydrope curanda † 442. a.
- Pediculus** ejus usus in Medicina. 708. a.
- Pediculorum usus in ictero † 452. a.
- Pediculi ex diarrhœa serosa suppressa † 103. b.
- Pedicularis affectus infantum † 1101. b.
- Linimentum ad pediculos \* 663. b.
- Pediculos** pubis tollens Mercurius \* 314. b.
- Pediluvia** præscribendi ratio \* 656. a.
- Pediluviorum usus in hydrope † 439. a.
- usus in mensibus suppressis † 952. b.
- Pediluvia in phrenitide † 362. b.

Pedi-



# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

**Pedum** ejus luxatio \* 67. b.  
**Pellicula** adnata tunicis oculi corneæ ac uveæ † 728. a.  
**Pellicula** fructuum, v. horæi fructus.  
**Pemphygedæ** febres † 250. a. † 288. a.  
**Penis** caruncula † 468. a.  
**Penis** contractio in incontinentia urinae periculosa † 666. b.  
**Penis** musculorum convulsio † 922. a.  
**Penis** dolor ejusque cura † 925. a. b.  
**Penis** erectio læta † 916. a. sqq.  
**Penis** erectio depravata, contorsio, tumor, fræni vel præputii vitium &c. † 923. b.  
**Penis** erectio aucta † 920. a.  
**Penis** turgescencia & erectio nimia † 921. a.  
**Penis** erectio deficiens † 916. a.  
**Penis** erectio suspensorum &c. † 922. a.  
**Penis** inflammatio ejusque cura † 924. b.  
**Penis** turgescencia post mortem † 922. b.  
**Penis** ulcera gallica externa & interna † 473. b.  
**Penis** ulcera solantia \* 315. a.  
 v. pudenda.  
**Penus** leviathan, vid. leviathan.  
**Peptici** pulveres \* 633. a.  
**Perca** cujus usus in Medicina. 695. b.  
**Percussiones** oculi † 730. a.  
**Perdix** cujus usus in Medicina. 690. b.  
**Perfoliata** ejus præparata & usus. 502. a.  
**Pericardii** motus in respiratione \* 732. b.  
**Pericardii** aqua, hydrops † 380. b. tubercula &c. ibid.  
**Perinei** ruptura in parturientibus, cum Prognosi & cura † 1041. b.  
**Pari** pathetici. v. Aristoteles.  
**Peripneumonia** † 239. a. † 560. b. causæ ejus † 561. b. divisio † 564. a. Diagnosi † 564. a. Prognosis † 565. b. Cura † 567. b.  
**De** Peripneumonia casus & obs. \* 357. b.  
**Peripneumonia** pestilentialis † 358. b.  
**Peritonæi** usus intestinalis, ruptio \* 172. a. \* 185. a.  
**Perlarum** mater quid & quomodo differt a perlis, ejusque usus Medicus. 695. a.  
**Perlata** emulsiones improprie sic dictæ \* 644. b.  
**Perlstraut**. 485. a.  
**Perlmych** qualis emulsio \* 644. b.  
**Persica** Malus, ejus præparata & usus. 502. a.  
**Persicaria** ejus differentia, præparata & usus. 503. a.  
**Persicaria** insignis usus in vulneribus \* 46. a.  
**Perterebratio** est ab acrimonia acida \* 174. b.  
**Pervigilium** v. agrypnia.  
**Pessaria** hodie vix præscribuntur \* 632. a.  
**Pessi**, eorum Compositio. 845. a.  
**Pestis**, Pestilenciales febres, quales & quid † 358. a. Causæ ejus † 359. a. etiam bruta affligens † 360. a. prodromi † 360. a. affligendi modus † 360. a. an semper sit cum febre † 360. a. Symptomata † 360. a. Signa diagnostica & Prognostica † 360. b. † 361. a. differentia † 361. a. Cura præservativa † 363. a. An domus infectæ occludendæ, homines infecti sequestrandi, fugiendum † 363. a. Cura pestis ipsius † 367. b. Symptomatum cura † 372. sqq.

**De** peste ex Terrore sine contagio, casus & observ. \* 421. b.  
**Pestilentzwurzel**. 503. b.  
**Petasis**, ejus præparata & usus. 503. b.  
**Petechiarum** differ. à reliquis cutis efflorescentiis & pulicum moribus † 339. a. † 340. b.  
**Petechiæ** pestilenciales † 360. b. † 361. b.  
**Petechiæ** retropulsæ v. curaneæ excretionem.  
**Petechiarum** in variolis cura \* 256. a.  
 v. febres Petechiales.  
**Petroleum**, Naphtha, & oleum Terræ, quid & ejus usus. 814. a.  
**Petroselinum** ejus differentia præparata & usus. 504. a.  
**Pucedanum**, ejus differentia, præparata & usus. 504. b.  
**Psa**, **fen** Blat. 551. a.  
**Psa**, **fen** Pint. 352. b.  
**Psa**, **fen** Röhrchen. 551. a.  
**Pfeffer** Wasser-pfeffer. 503. a.  
**Pfefferkörner** in peste † 361. b.  
**Pfeissen** auff der Brust \* 189. a.  
**Pfeinig** Kraut. 475. b.  
**Pfingst-Rose**. 509. a.  
**Pfriemen** Kraut. 453. b.  
**Phænomena** naturalia demonstrata \* 793. b.  
**Phagedæna** ulcera quæ, & unde sic dicta, cura eorum chirurgica \* 63. a.  
**Aqua** phagedænica, ejus compositio. 733. a.  
**Phakoides** fungus \* 449. a.  
**Phantasia** quid. 101. b.  
**Phantasia** quomodo fiat † 865. a.  
**Phantasia** obtusa † 853. a.  
 v. imaginatio.  
**Phantasma** melancholicum † 864. a. † 865. a. b.  
**Pharmaca** eorum usus atrophiam inducens † 315. a.  
**Pharmacia** hodie cultior \* 842. a.  
**Pharmacopoliorum** visitatio neglecta \* 680. b.  
**Pharyngu** excoriatio in febr. catarrh. † 306. a.  
**Pharyngis** inflammatio † 538. b.  
**Philoniorum** compositio ap. veteres † 707. a.  
**Philosophandi** ratio in naturalibus per qualitates primas, pluribus suspecta est \* 555. a.  
**Philosophorum Arborum** præparatio. 754. a.  
**Philosophorum lapidis** quid. 329. a. b.  
**Lapis** philosophorum quo sensu dicatur Rāi 293. a.  
**Philtro** quid, eorum divisio, vera an dentur † 892. b. sq. eorum causæ † 893. b. Diagnosi, prognosi, cura † 894. a. b.  
**Philtro** & inde nata dementia, rabies † 852. a. † 856. b.  
**De** Philtro casus & obs. \* 418. a.  
**Philtorum** vis in quo consistat. 183. b.  
**Ex** philtro atrophie remedium \* 827. b.  
**Philtro** manie causa \* 880. a.  
**Phimosi** ejusque causæ † 923. b. Cura † 924. a.  
**Phimosin** à lue gallica l. gonorrh. tollentia † 470. b.  
**Phlebotomia** v. venæsectio.  
**Phlegma** ex fulgine \* 562. a.  
**Phlegmata** parum curat medicus \* 631. b.  
**Phlegmatici** qui \* 310. a.  
**Phlegmatici** cur somnolenti † 711. a.  
**Phlegma**, quid † 532. a.

R

Phlog

# INDEX UNIVERSALIS

- Phlogoses** unde † 245. b.  
**Phlogosin** corrigentia † 8. a.  
**Phlogoses** in cruditatibus nidorosis \* 129. a.  
**Phlogoses** in delir. melanch. tollentia † 877. a. b.  
**Phlogoses** vagæ in flatibus † 68. b.  
**Phlogoses** vagæ in inflat. stom. \* 136. a.  
**Phlogosis** post menses emansioem \* 165. b.  
**Phlogoses** post pastum unde \* 120. a.  
**Epithema** contra phlogosin ex cosmetico \* 642. a.  
v. æstus, inflammatio &c.  
**Phlyæna**, earum causæ, prognos. † 525. b. cura † 526. a.  
**Phlyæna** oculorum, earum causæ, cura † 725. a.  
**Phthiriasis** infantum † 1101. b.  
**Phthistici** ut plurimum asthmatici † 1. 5. a.  
**Phthistici** facile evacuantur † 104. b.  
**Phthisis** ejusque causæ † 396. b. divisio ibid. pars affecta † 397. a. hæreditaria † 397. b. contagiosa † 397. b. aliis morbis superveniens † 397. b. Diagnos. † 398. a. Prognosis † 400. b. quæ pars pulmonum ea afficiatur, unde cognoscendum † 400. b. ejus Tres gradus † 400. b. Cura † 315. b. † 401. a.  
**Phthisis** differt à tabe & atrophia \* 259. a.  
**Symptomatum** phthisicos cura † 408. a.  
**De Phthisi** imminente casus & obl. \* 396. b.  
**De Phthisi** casus & observ. \* 345. a. \* 357. b. \* 362. b. \* 3. 4. a. \* 365. b. \* 386. b.  
**Phthisis** catarrhalis quæ. vulgo dicatur † 399. a. b.  
**Phthisis** minantes febres † 304. a.  
**Phthisis** cum febre hæctica consultatio \* 263. a.  
**Phthisis** infantum † 1102. b.  
**Phthisicos** pulmonalis consideratio & consultatio de ea \* 258. b.  
**Decocta** in phthisi pulmonali \* 653. a.  
**Opii** usus in phthisi \* 570. b.  
**Pilulæ** in phthisi confirmata \* 639. a.  
† v. i. e. diaphragma † 56. a.  
**Phrenesis** } live  
**Phrenitis** } qualis affectus † 586. a. † 857. b. ejus causæ † 587. a. † 857. b. afficiens compressam uxorem † 859. a. differentia istius † 859. a. Diagnos. prognos. cura † 587. a. b. † 860. a. b.  
**Phrenitici** differ. à maniaco † 878. a. † 880. b.  
**Phricodes** febris † 288. b.  
**Phygeton** ejusque cura chirurgica \* 19. a.  
**Phyma**, vocis etymon, ejusque cura Chirurgica \* 19. a.  
**Physica** & Mathesis quomodo convenient aut differant. 26. a.  
**Physica** Peripatetica nutat \* 512. a.  
**Physiologica** doctrinæ fundamentum \* 91. a.  
**Pica**, cujus usus in Medicina. 690. b.  
**Pica**, Picario quid? † 34. b. † 37. a. \* 662. b.  
**Pica** quale delirium † 857. a. Ejus pars affecta † 35. a. † 37. a. causæ † 36. a. Mulieribus imprimis, sed & viris, pueris, brutis interd. obtingit & hæreditaria est † 36. b. iis appetita raro nocent † 37. a. videtur esse melancholice species † 37. a. Signa, Prognosis † 37. a. mulieribus talibus appetitæ res hauri  
facile denegandæ † 37. b. Cura † 37. b. An venesectio conveniat in picantibus gravidis quib. ob mensium suppressionem affectus hic venit † 38. b. foetus ratio hic habenda † 38. b. artificium picantes fallendi † 39. a.  
**Pica** gravidarum, ejus Prognosis, cura † 999. b.  
**Consultatio** de Pica à Scabie retropulsa \* 123. b.  
**Pica** superveniens hæctica † 312. b.  
**Pilaris** morbus infantum † 1103. a. (qq. \* 837. a.  
**Pilorum** defluxus in lue Gall † 456. a.  
**Pilulæ** earum compositio. 844. a.  
**Pilulas** præscribendi ratio \* 637. b.  
**Pilularum** usus \* 637. b.  
**Pilulæ** usuales \* 638. b.  
**Pilularum** ante cibum usus \* 638. a.  
**Pilularum** Glassianarum usus \* 307. b.  
**Pilulæ** podagr. f. arthrit. Veni, Amice, large & Ambula † 778. a.  
**Pilularum** usus externus &c. \* 639. a.  
**Pimpernis** gen. 507. b.  
**Pimpinella** ejus præparata & usus. 504. b.  
**Pinastri** strobilorum usus in catarrh. scorbut. † 684. b.  
**Pinea** nutritiva † 827. b.  
**Pineen.** 505. b.  
**Pineolatum** \* 631. b.  
**Pingue** quid dicatur. 15. seq.  
**Pingvibus** in est occultum acidum \* 1. a.  
**Pingvia** vomitum causantia † 72. a.  
**Pingvedo** quid. \* 822. a.  
**Pingvedo** unde † 648. a.  
**Pingvedinis** excisio \* 836. b.  
**Pingvedo** corporis immutata masticatione solforum tabaci † 647. b. v. corpulentia nimia.  
**Pingvedo** uris, mumentis, gliris tempore brumali \* 822. a. piscium mollior ibid.  
**Pingvescentia** † 315. b.  
**Pinguis** cur unus fiat, alter non, ex eodem alimento \* 835. b.  
**Pingves** cur raro concipiant † 985. a.  
v. obesus.  
**Pinus**, live Pinea & Pinaster, ejus differentia, præparata & usus. 505. a.  
**Piper** ejus differentia, præparata & usus. 505. b.  
**Piperitis** ejus præparata & usus. 334. a. 507. a.  
**Pisa**, eorum folliculi difficilis digestionis \* 142. b.  
**Piscis** cur facile in putredinem abeunt. 358. a.  
**Pissasphaltos** ejus differentia & usus. 594. b.  
**Pistacia**, eorum differentia, præparata & usus. 507. b.  
**Pistaciæ** egregie nutriunt \* 827. b.  
**Pituita** ex capite descensus in catarrho suffocativo, figmentum est † 240. b.  
**Pituitosæ** Cacochymie remedia † 9. a.  
**Pituita** in urina quomodo dignoscatur \* 237. b.  
**Pituita** vitrea in stomacho † 83. a.  
**Pix** ejus usus. 594. b.  
**Placenta** uterina usus \* 56. b.  
**Placenta** uteri sæpius pro molis habita † 992. b. vid. Uterus.  
**Planetarum** conjunctio \* 439. a. seqq. morus proprius ibid. \* 442. b.  
**Cui** Planetarum maxima influendi efficacia tribuenda \* 440. a. \* 445. a. v. stellæ, conjunctio.  
**Plantæ** ortus ex minimis originibus \* 788. a.  
**Plantarum** seminis consideratio \* 789. a.  
**Plantæ**

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Plantarum** quincuplex differentia 311. a. b. seq.  
*Plantæ laxæ* in mari \* 448. a.  
*Plantæ pedum*. Earum tactus sensilior \* 239. a.  
*Plantago* ejus differentia, præparata & usus 118. a.  
**Plethora** quid 122. b.  
*Plethora vera* & respectiva seu apparens † 618. b.  
*Plethora est duplex*, vel ad vires, vel ad vasa 122. a.  
*Plethora ad vasa quomodo curanda* 123. a. b.  
*Plethora imminutio cui utui* † 6 a.  
*Plethora abortus causa* † 1011. a.  
**Pleura** : inflammatio Pleuritis, Pleuropnevmonia † 510. b. differentia horum affectuum † 61. a. causæ † 561. b. divisio † 562. b. Diagnos. † 564. a. Prognosis † 565. b. Cura 67. b.  
*Pleura in regione dorsi*, ubi adnascitur diaphragma, inflammata falsò pro nephritide habita in Pleuritide † 565. a.  
*An pleura sola vel cum pulmonibus afficiatur in pleuritide* \* 2. 6. a.  
**Pleuritis**, ejus Cura † 504. a.  
*Pleuritidis differ. ab inflammatione hepatis* † 55. b.  
*Pleuritidis metastasis* \* 276. b.  
*Pleuritis quomodo finiatur* \* 277. b. \* 292.  
*Pleuritidis recidivantis theoria* \* 276. b.  
*de Pleuritide casus & observ.* \* 349. b. \* 363. a.  
*Consultatio de Pleuritide vera* \* 275. a.  
*Signa Pleuritidis veræ pathognomonica* \* 276. a.  
*Pleuritide in curans priapus cervi vel tauri* † 131. b.  
*Potio anti-pleuritica* \* 640. a.  
*Linimentum contra dolorem pleuriticum* \* 653. a.  
*Pleuritidis in morbo catarrhali cura* \* 230. b.  
*Pleuriticorum febris* † 144. a.  
*Pleuritidis nothæ quadruplex differ.* † 563. a.  
*Pleuritidis nothæ cura* † 574. b.  
*Unguentum in pleuritide notha* \* 666. a.  
*Pleuritica pestis* † 358. b.  
*Pleuritidis verminosa cura* † 574. b.  
*Pleuropnevmonia prognos.* † 565. b.  
*Plica Polonica qualis affectus* † 532. b.  
*Ploratus infantum enormis* † 1075. a.  
*Plumbago ejus usus* 507. a.  
*Plumbæ vasa dysenteriam inferentia* † 124. b.  
*Pneumatocèle*, ejus causæ, diagnosi, prognos., cura † 904. a.  
**Pocula communia** contagiosa † 457. a.  
**Podagra** qualis affectus † 773. a. v. Arthritis.  
*Podagra quatenus feminas afficiat etiâ* † 775. b. an evanchos, pueros, ciconias, ibid.  
*Podagræ metastasis* \* 293. b. sq.  
*Casus & obs. de Podagra* \* 372. a.  
*Podagræ læta diæta* \* 111. b. quatenus curanda \* 112. a.  
*Podagræ recens facile curabilis* \* 293. b. contra eam remedia 505. b.  
*Podagræ crurum dolori conducens balneum* \* 657. b.  
*Podagra dentium* † 752. a.  
*Podagra hereditaria* † 753. a.  
*Podagra juncta stranguriæ* \* 292. a.  
*Podagra/so in Leib getreten* \* 195. b.  
*Podagræ tophi quomodo fiant* \* 112. a.  
*Cataplasma anti-podagræ* \* 658. b.  
*Podagra debilitatos articulos firmans pediluvium* \* 656. b.  
**Podicis** dolor post mensium emanationem naturalem \* 165. b.  
**Podex** interiora versus restrictus † 98. b. \* 140. a. v. anus.  
**Podex** retractus in iliaco affectu \* 170. b.  
**Pæonia** ejus differentia, præparata & usus 509. a.  
*Pæoniæ usus in epilepsia* † 813. b.  
*Polaris terra si esset habitabilis, incolæ vix viverent ultra centum dies* \* 446. b.  
**Polsen** 515. a.  
**Pollices pedum** afficiens Paronychia, ejus causæ, curaque chirurgica \* 20. a.  
**Pollutio nocturna** † 909. a.  
**Polygonatum**, ejus præparata & usus 510. b.  
**Polygonum** ejus usus 510. b.  
**Polypodium** ejus præparata & usus 630. b.  
**Polypus cordis**, ejus palpitacionis causa † 382. a.  
**Polypus narium**, ejus pars affecta, causæ, prognos., cura † 795. a. b.  
**Pomerangen-Aepffel** 394. b.  
**Pomum**, ejus differentia, præparata & usus 511. b.  
*Aqua ex pomis putridis nobile remedium chirurgicum* 358. a.  
**Ponderis** gravioris sublatio abortum inferens † 1011. b.  
**Ponderis** in utero sensus unde \* 328. a.  
**Populus**, ejus usus 512. b.  
**Percorum** remedium ad lepram, varos, & pinguedinem \* 199. b.  
**Pori cutis** eorum occlusio &c. \* 561. a.  
**Pororum** occlusio quomodo contingat \* 124. b. v. cutis.  
**Pororum** occlusio sub bruma \* 227. a.  
**Pororum** occlusio in hydrope † 439. b.  
**Pororum** angustia unde \* 4. a.  
**Pororum** obstructio febr. &c. causa † 249. a.  
**Pori marini** \* 448. a.  
**Porositas corporum** \* 748. b.  
**Porrigo**, ejus causæ & cura † 531. a.  
**Porrus**, ejusque usus 512. b.  
**Portulaca**, ejus differentia, præparata & usus 512. b.  
**Potandi** sobrietas olim \* 809. a.  
**Potatores vini** cur hæmorrhagiis obnoxii † 608. b.  
**Potentiarum Hippocraticarum** proportio & temperatura quomodo turbetur in succis corporis \* 521. a.  
**Potiones**, earum compositio 834. b.  
**Potiones medicatas** præscribendi ratio & usus 639. b.  
**Potiones particulares** præscribendi ratio \* 640. a.  
**Potio ordinaria** \* 639. b.  
**Potus** virtutes consideratæ \* 510. a.  
**Potus medicatos** præscribendi ratio \* 649. a.  
**Potus ex primis viis ad vias urinarias iter** 81. a.



# INDEX UNIVERSALIS

- Potus in ea forma redditus; qua ingestus † 118. b.
- Potus febricitantium † 254. b.
- Potus in febribus an liberalior concedendus † 293. b.
- Potus spirituosus usus in peste † 364. a.
- Potus pleuriticorum † 569. a.
- Potus frigidus, post nimiam incalescentiam tabem inducens † 395. b.
- Potus v. cibus, alimentum, bibere, dixta, frigida, suis.
- Practici* ultra vulgatam & ordinariam praxin excellentes † 1. b. † 26. b.
- Praxis medica* circa individua versatur \* 117. a.
- Medicinæ Practicæ* primordium ab herbis \* 247. a.
- Practicus habitus* in medicina ut acquirendus \* 117. a.
- Praxis Generalis* † 27. a. sqq.
- Specialis † 28. sqq.
- Practica generalia* concernentia † 5. b.
- Praxis* duabus ex causis dubia redditur & difficilis \* 117. a. v. Cura.
- Præcos* medicæ universale malum 853. a.
- In *Praxi* ad duas facultates corporis humani respiciendum † 5. b.
- In *praxi* methodus medendi aliquando invertenda † 164. a.
- Praxis medica* extraordinaria quæ & ejus differentia duplex † 2. a. \* 78. a. sqq. ultra vulgarem praxin excellendi duplex medium \* 78. b. quomodo reformanda & exaltanda praxis ordinaria † 2. a. \* 79. a. quatuor præcognita necessaria medico ad rite praxin aggrediendam † 2. b. (v. Cura, Medicina practica, Theoria.)
- Præcipitantia* † 3. b. \* 131. b.
- Præcipitantium* virtus † 251. b.
- Præcipitantium* in medicinam introductio; abundantia, scopus \* 576. a. quibus autoribus primitus ac maxime introducta \* 578. b. *Præcipitantia* ex regno animali, vegetabili; minerali \* 579. a. b. *Præparata* horum & composita \* 580. a. b. Quo respectu à veteribus exhibita \* 580. b. occasione chymicæ magis exulta, à modernis in therapevlin introducta \* 581. a. eorum natura; usus operandi modus \* 578. a. \* 581. a. sqq. operantur in genere acidum p. n. corrigendo † 588. b. unde potius invertebant, item attemperantia, aut saturantia, absorbentia &c. dicenda † 589. a. b. sqq. adeoque acidi istius respectu universaliora sunt alterantia \* 590. a. sed quid de bile \* 590. b. Late diffusus horum remedium usus \* 592. a. eorum legitima administrandi methodus \* 594. a. tam externè, quàm internè \* 594. b. Perverso abusu multum nocent \* 595. b. speciatim recidivas prioris aut generationem novi morbi inferunt \* 597. a. quod confirmant exempla ex regno vegetabili \* 598. a. ex regno animali \* 601. a. ex regno minerali \* 601. b. Cautela pro legitimo usu; rite sunt præparanda \* 604. a. non saturata ab acidis \* 603. b. non tamen quævis per acida præparatio rejicienda \* 605. a. sed saltem nimia saturatio \* 605. b. moderata dosi exhibenda \* 607. a. debitus selectus instituendus \* 607. b. Isque vel respectu remedii \* 607. b. vel respectu ægri \* 609. b. ordo debitus observandus \* 611. a. conveniente tempore usurpanda \* 611. b. Præmissis primas vias mundificantibus \* 612. b. Idque ut plurimum, sed non semper \* 613. a. in acutorum incremento & statu \* 613. b. in intermittentibus ante paroxysmos \* 614. a. ventriculo vacuo \* 614. b. subjungantur purgantia \* 614. b. fluidis concitior motus conciliandus \* 615. a. Quot & quibus modis \* 616. a. Aliis remediis socianda \* 616. b. Purgantibus \* 616. b. Sudoriferis \* 617. b. Anodynis \* 618. b. Sed rite correctis \* 619. b. Denique appropriatis \* 620. a.
- Præcipitata*, eorum compositio & usus 839. b.
- Præcipitatio* quid 18. b. 19. b. 263. b. quotuplex 19. b. sq. 264. a. b.
- Præcipitationis* ratio 265. a. b. sq.
- Præcipitatio* in utroque pharmaceutico quid notet \* 131. b.
- Præcipitatione* facta separatio \* 126. b.
- Salia sunt causa efficiens præcipitationis 202.
- Præcipitationes* cum spiritu urinæ & solutione Saturni 330. b.
- Præcipitatio Chymica* quid & quotuplex \* 581. a. Ejusdem fundamenta mechanica \* 581. a. *Præcipitatio* in fluidis nostris in statu sano & ægro \* 582. a. b. De artificiali per medicamenta questio \* 583. a. Quæ vix locum habet in cura morborum \* 583. a. Triplex casuum differentia in quibus in usum vocatur \* 583. b. In prima eorum non præcipitatio, sed unio locum habet \* 584. a. Erroris hujus origo \* 584. b.
- Præcipitatio humorum* malè opponitur ebullitioni, fermentationi seu turgescenzæ aut effervescentiæ eorum &c. \* 585. a. sed nulla attemperatio, ibid. Erroris hujus origo \* 586. a.
- Præcordiorum* nomine quid veniat \* 572. b.
- Præcordiorum* consensus cum cute \* 572. b.
- Præcordiorum* angustia; casus & obs. \* 337. b.
- Præcordiorum angustia* in febr. lymphat. \* 234. a.
- Præcordiorum angustia* in febr. mal. \* 246. a.
- Præcordiorum angustia* hypochondriac. scorbuticor. &c. \* 202. a.
- Præcordiorum* anxietatis cura in morbill. & variol. † 353. a.
- Præcordiorum* anxietatis cura in peste † 378. b.
- Præcordiorum* anxietates in stomachi inflatione \* 133. a.
- Præcordiorum* angustia in tussi stom. ferina humida \* 200. b.
- v. Angustia, Anxietates.
- Præcordiorum dolor convulsivus*; casus & observatio \* 338. a.
- Præcordiorum dolor* in tertiana mal. \* 207. a.
- Præcordiorum* infantum inflatio unde \* 537. a.
- Prædictiones* Astrologorum minimè sunt contemnendæ \* 445. b.
- Prægnantibus* nocent Purgantia, v. gravida, purgantia.
- Præparata* cur præ crudis expetantur 149. b.

Eorum

## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Eorum compositiones & usus 835. b. lqq.  
 Præparationis medicam. finis \* 844. a.  
 Præputii vitia † 923. b.  
 De præputii fissura & Tumore casus & observatio \* 374. a.  
 Præputii tumor in gonorrhœa gallica † 470. b.  
 Præscriptio formularum \* 621. a. lqq. \* 631. b.  
 Præservativa curæ in quo consistant † 328. b.  
 Præstigium v. Incantatio, fascinum &c.  
 Priapismus qualis convulsio † 802. b. † 921. a.  
 ejus causæ, diagnosi, prognos, cura † 922. a. b.  
 Priapus, scortorum Patronus † 922. a.  
 Priapus quid † 132. b.  
 Priapus Cervi & bovis ejus usus § 11. b.  
 Primarium viarum vitia in febr. † 250. b.  
 Primula veris, ejus differentia, præparata & usus § 13. b.  
 Primum Ens ♀. vid. ♀.  
 Primum mobile; ejus motus \* 439. a.  
 Principia activa & passiva quæ dicantur 16. a.  
 Producta morbosa v. morbus.  
 Prognosis 142. a. b. † 2. b.  
 in omni casu resolvendo necessaria \* 119. a.  
 Tria in Prognosi attendenda \* 129. b.  
 Prolapsioni obest obesitas \* 829. a.  
 Proprietas individuorum connata, acquisita \* 117. a. idealis, materialis ibid. b. v. Idiosyncrasia.  
 Prostatarum tumor † 907. b.  
 Prostatarum tumor, ichuriam inducens † 657. b.  
 Prostatarum glandularum corrosio & exulceratio in gonorrh. † 468. a. \* 313. a.  
 Pruna seu carbunculus \* 17. b.  
 Prunella, ejus differentia, præparata & usus § 13. b.  
 Prunella ejusque cura † 544. b.  
 Prunella febrilis 286. a. ejus cura † 301. b.  
 Mistura contra Prunellam febrium acutarum \* 642. b.  
 Prunellæ in peste cura † 378. b.  
 Prunus, ejus differentia, præparata & usus § 14. a.  
 Pruritus ani v. ani pruritus.  
 Pruritus genitalium muliebr. † 954. a.  
 Pruritus in scabie, ejus causæ, diagnosi, prognos, cura † 521. b. \* 124. a.  
 Pruritus scorbutici cura † 506. a.  
 Pruriginosus dolor † 745. b.  
 Psora v. Lepra.  
 Psorodermis † 590. b.  
 Psyllium ejus usus 631. a.  
 Psittacus ejus usus § 15. a.  
 Psittacus mistura \* 642. b.  
 Pterygion † 719. b.  
 Præparata quomodo præscribendæ \* 652. a. v. hordeata.  
 Pryalismus in lue venerea \* 115. b.  
 in variol. & morbill. † 355. a. v. salivatio.  
 Pubis gravidarum dolor cum cura † 1002. a.  
 Pudendorum excoriatio in partu † 1040. b.  
 Pudendi labiorum fissuræ in parturientibus † 1041. a. v. labia.  
 Pudendorum hydrops † 984. b.  
 Pudendorum hydrops in gravidis cum cura † 1008. a.  
 Pudendorum muliebrum pustulæ, pruritus † 954. a.
- Pudendorum tumor parturientium † 1041. a.  
 Pudendorum verrucæ quomodo tollendæ \* 31. a. v. vulva, penis.  
 Pudor erectionem penis impediens † 916. b.  
 Pullorum gallinaceorum exclusio impedita † 950. b.  
 Pullorum gallinaceorum carnes egregie nutriunt \* 827. b.  
 Puerperarum regimen † 1026. a.  
 Puerperæ febris \* 434. b. \* 350. a. \* 352. a.  
 Puerperarum vires resciciens † 392. b.  
 Puerperarum peste correptarum prognos † 363. a.  
 Puerperâ mortuâ quomodo fœtus salvandus † 1023. b.  
 Pulegium ejus præparata & usus § 15. a.  
 Pulicem morsus cum Petechiis non confundendæ † 339. a.  
 Pulmonalis venæ cartilago durior † 380. b.  
 Pulmonaria ejus differentia, præparata & usus § 15. b.  
 Pulmonarium vasorum obstructio quibus signis cognoscatur † 382. b.  
 Pulmonum structura & motus in respiratione \* 732. b.  
 Pulmones an in inspiratione se ipsos expandant, an ab aëre dilatentur 71. a. b. lq.  
 Tria ad legitimum pulmonum motum & aëris reciprocationem facientia † 199. a.  
 Pulmonum sensus obtusus \* 228. a.  
 Pulmonum cum testibus consensus † 697. b.  
 Pulmonum reticularis plexus \* 196. b.  
 Pulmonum excrementa variorum morborum genitricæ \* 194. b.  
 Pulmonum vitia in asthma \* 196. a.  
 Pulmonum strictura in asthma † 198. b.  
 Pulmones coryza an affligat \* 229. a.  
 Pulmonum hydropis prognos † 698. a.  
 Pulmonum inflammatio † 561. a.  
 Pulmonum obstructio † 181. b.  
 Pulmonum ulcus in hæmoptysi \* 284. a.  
 Pulmonum vasculi erosio seu diabrosis in hæmoptysi \* 283. b.  
 Pulmonum ulcera phthiseos causa † 397. a.  
 Pulmonum ulcera, phthisis \* 258. b. \* 261. b.  
 Pulmones cur in phthisi primariò afficiantur \* 263. b.  
 Pulmonum vomica † 397. a.  
 Pulmonum vulneris lethalitas \* 362. a. quomodo illud tractandum \* 51. a.  
 Pulmonum læsiones restituens decoctum \* 651. b.  
 Pulmonibus inimica † 4. b.  
 Pulmonis fœtus in utero consideratio \* 751. b.  
 Pulparum medicatarum præscribendi ratio \* 657. b.  
 Pulparum usus in bolis \* 634.  
 Pulsatio ex impedito motu sangu. † 181. b.  
 Pulsatio cordis, artierum, v. cordis, artierum palpitatio.  
 Pulsatorius dolor † 745. b. † 750. a.  
 Pulsifrons cordis motus cur adeò necessarius pro vita animalium \* 771. b.  
 Pulsionis & tractionis differ. \* 740. a.  
 Pulsus quid declaret 145. a. b.  
 Pulsus est quintuplicis differentie 68. a.  
 Pulsus est à sanguine ex corde cum impetu in arterias expulso 67. b. lq.  
 Pulsus quot numerentur horæ spatio \* 761. b.  
 Pulsus

# INDEX UNIVERSALIS

- Pulsus** frequentior in numero sub inspirationis actu, sub expiratione tardior \* 765. b.
- Pulsus** parvus, rarus, debilis, myurus, vermicularis † 386. a. lqq.
- Pulsus** serratus quis \* 276. a.
- Pulsus** quare non datur venis 68. a.
- Pulsus** venæ cavæ unde est 68. a.
- Pulsus** læsus cum cura † 379. a. lqq.
- Pulsus** intermittens in variis affectibus \* 278. a.
- Pulsus** intermissio quando non adeo periculosa 14. a.
- Pulsus** ægri ob nimios dolores intermittens medicum non deterrere debet \* 157. b.
- Pulsus** in cardialgiâ &c. consideratio \* 198. b.
- Pulsus** celerior, sed debilior in colica, &c. \* 171. a.
- Pulsus** conditio in empyemate † 601. a.
- Pulsus** consideratio in febris &c. 243. a. b. † 249. a. \* 203. a.
- Pulsus** conditio in febr. mal. † 318. a. lqq. † 326. b. \* 250. a.
- Pulsus** consideratio in febr. mal. petch. \* 245. b.
- Pulsus** conditio in inflammatione hepatis † 54. a. † 565. a. † 575. b.
- Pulsus** consideratio in hepatis inflamm. cum febre symptomatic. \* 282. a.
- Pulsus** hypochondriacorum † 480. b. † 484.
- Pulsus** maniacorum qualis † 879. a.
- Pulsus** nephriticorum † 637. a.
- Pulsus** conditio in peste † 360. b.
- Pulsus** prognosticon in peste † 362. b.
- Pulsus** conditio in pleuritide † 564. a. † 565. a. \* 276. a. \* 278. a.
- Pulsus** sæpe fallit indicantes de læsa sanguinis crasi † 242. a.
- Pulsus** amatorius an. detur † 892. a.
- Pulsus** infantum \* 526. a.
- Pultes** v. Pulpa.
- Pultis** infanti porrigendæ vitia † 1070. a. in præparatione \* 534. b. in usurpatione \* 335. a. correctio † 1070. b. \* 546. a.
- Pulveres.** Eorum externus usus & præscribendi modus \* 627. b. \* 632. a. \* 633. b. eorum compositiones & usus 835. b. lqq.
- Pulveres** saccharo non lavandi \* 131. b.
- Pulveris** pyrii mira extensio 803. b.
- Pulveris** pyrii usus in peste † 364. a. lqq.
- Pulvere** pyrio factæ ambustionis cura \* 65. b.
- Pulveris** sympathetici usus in gonorrhœa Gallica † 470. a.
- Pulveris** Sympathetici usus in nimio fluxu mensium † 942. a.
- Pulvisculi** ante oculos versantes † 718. b.
- Pumex** cujus usus in Medicina 736. a.
- Punctiones** in locis bubonum, fonticulis &c. in peste † 361. a.
- Punctionis** dolor sursum ascendens in colica \* 170. b.
- Punctorius** dolor † 745. a. † 750. a.
- Punctorius** sensus est ab acrimonia acida \* 174. b.
- Punctum** saliens vigore vitali præditum \* 89. b.
- Punctura** à vespiis, araneis &c. quomodo curanda \* 48. a. lqq.
- Papilla** vitia † 731. a.
- Purgantia** † 5. a. Eorum examen 338. b.
- Purgantium** differ. à vomitoris \* 139. a.
- Purgantia** quomodo fiant vomitoria & contra 161. a. lqq. \* 139. a.
- Purgantia** quando fiant diuretica aut diaphoretica 255. b. lqq.
- Purgantium** operandi modus 862. a.
- Purgantia** an putrefaciendo & colliquefaciendō massam sanguineam agant 363. b.
- Purgantibus** qualis distinctio adhibenda 162. b. lqq.
- In** subjecto purgando quid considerandum 161. a.
- Purgantia** quæ venenositatem habeant occultam 614. b.
- Purgantium** venenositas quomodo cortigenda \* 130. b. 255. b. 614. b. lqq.
- Purgantia** quæ sufficiunt 615. b. 869. a.
- Purgantia** præscribendi modus \* 627. b. \* 649. b. eorum compositio 877. a. 881. a.
- An** vera dentur purgantia † 14. a. eorum abundantia & selectus † 14. b. modus usurpandi † 15. a.
- Purgantia** quoties debeant evacuare 615. a.
- Purgantia** per alvum † 13. b. eorum operatio † 14. a.
- Purgantium** in diversis subjectis vis diversa unde 254. b.
- De** purgantibus resinosis observatio \* 130. a.
- Purgantia** opiatia mista, ne intendatur dolor \* 139. a.
- Purgantia** an clysteribus addenda \* 659. b.
- Purgantium** usus in abdominis doloribus \* 172. a.
- usus** in angina † 544. a.
- usus** in apoplexia † 837. b.
- usus** in arthrit. & podagra † 778. a.
- Purgantia** an asthmaticis propinanda † 202. b.
- Purgantium** usus ante balneum \* 715. a.
- usus** in chlorosi cum vomitu & tetano capitis \* 326. b.
- usus** in colic. convuls. \* 182. b.
- usus** in delirio melanch. † 873. b.
- Purgantium** abusus in diarrhœa, morbisque acutis † 108. a.
- Purgantium** usus in epilepsia † 812. a.
- usus** in epilepsia habituali \* 299. a.
- Purgationum** usus in febr. interm. \* 305. a.
- Purgationes** in febr. mal. nullius usus † 332. a.
- Purgantia** gravidis seu prægnantibus an propinanda 881. b. † 995. b.
- Purgationum** usus in ictero † 449. b.
- Quomodo** infantes purgandi † 1074. a. \* 547. a.
- Purgationum** usus in hæmorrhg. † 612. b.
- usus** in hydrope † 431. a.
- usus** in malo hypochondr. & scorbut. † 491. a.
- Purgantia** hysterics parum proficua \* 158. a.
- Purgantium** usus in lepra † 523. b.
- usus** in lue venerea † 466. b.
- usus** in affectibus lymphæ \* 231. b.
- usus** in mania † 881. b.
- usus** in mensibus nimis † 939. a.
- usus** in mensibus suppressis † 931. b.
- usus** in obesitate † 833. a.
- usus** in peste † 364. a. † 369. a.
- usus** in petchia 341. b.



## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- usus in phthisi, atrophia, tace † 401. b.  
 usus in pleuritide † 568. b.  
 usus in rabie & hydrophobia † 890. a.  
 Purgans bolus \* 634. b.  
 Electuaria purgantia \* 635. a.  
 Purgantes emulsiones \* 645. a.  
 Infusum purgans \* 648. a.  
 Infusum purgans ex senna pro delicatulis \* 648. b.  
 Pilulæ purgantes catholicæ \* 637. b.  
 Purgantium pilularum compositiones quæ sufficiunt. 862. a.  
 Purgans Potio. 875. a.  
 Purgans absque torminibus pulvis \* 632. b.  
 Rotulæ purgantes pro delicatis & pueris \* 636. b.  
 Purgans unguentum externum. 883. a.  
 Purgantia vulnerum quid \* 56. b.  
 v. alvi prostratio, evacuantia.  
**Purgationes** sunt artificiales diarrhœæ \* 142. a.  
 Purgatio quotuplex. 158. b.  
 Purgationis modus. 614. a.  
 Purgatio Sympathetica mediante stercore proprio quomodo fiat. 884. a.  
 Purgationes tantum nocent, quantum profunt \* 638. a.  
 Purgationi quomodo supervenit diaphoresis vel diuresis. 163. b.  
 Purgationis usus & abusus. 159. b.  
 Purgationem nimiam sistentia \* 135. a. stimulum ei addentia \* 135. b.  
 Purgationes per acida infringuntur, sedantur, impediuntur \* 142. a.  
 Purgationis locus, intestina † 13. b. an etiam vasa mesaraica † 14. a.  
 Purgatione evacuanda materia qualis † 63. a. sq.  
 Purgatione excretarum sordium varietas unde. 163. b. sq.  
 Purgatio gravidarum † 997. b. † 998. a.  
 Purgatio post partum infantis non sufficienter facta \* 361. b. omissa \* 365. b.  
 Purgatio in variolis & morbillis † 349. b.  
 Purgatio alvi ex pilulis plantis pedum illitis \* 171. a. v. hypercathartis.  
**Purgieret** auch wieder den Scharbock \* 649. b. aufferlich mahl ibid.  
**Purpura** ex lactis coagulatione post potionem sudoriferam \* 334. b.  
 Purpura puerperarum. † 1047. b.  
 Cur infantes recens nati subinde tertio aut quarto die purpura affligantur † 1063. b.  
 Purpura scorbuticorum cum cura † 506. a.  
 Purpura retropulsa v. Cutaneæ excretiones.  
 De Purpura casus & observatio \* 364. b. \* 370. b. \* 422. b. \* 423. a.  
 De Purpura cum diarrhœa, casus & observatio \* 423. a.  
 De Purpura alba casus & obs. \* 339. a. \* 352. a. \* 371. a. b.  
 De Purpura rubra casus & observatio \* 354. b.  
 v. Febris purpurata.  
**Purulenta** materia hærens in corpore extra vias urinarias, nunquam cognoscitur ex urina \* 778. b.  
**Pus**. Ejus genesis \* 108. b.  
 Pus & sanies, quid? \* 57. a.  
 Pus à sanie differt \* 180. b.  
 Pus omne falsum est \* 232. a.  
 Pus cut album \* 151. b.  
 Pus nunquam fit sine febre lenta † 310. a.  
 Pus quomoda à genitura in urina distinguenda &c. \* 237. b.  
 Puris evomitio in empyemate † 606. a.  
 Puris exspitio per os in abcessu mesenterii \* 242. a.  
 Puris cum sanguine mistio suffocationem inferens \* 240. a.  
 Pus oculorum † 725. a.  
 Puris in pleuritide excretio \* 280. a.  
 Puris rejectio non semper ex pulmonibus † 400. a.  
 Pus in scabie unde \* 124. a.  
 Puris in variolis conditio \* 252. a.  
 v. Sanies.  
**Pustula** cutis ob applicata gummata conducentia † 687. a.  
 Pustulæ faciei v. achoræ, savi.  
 Pustulis manuum conveniens lotio \* 656. b.  
 Pustulæ oculorum consideratæ † 725. a.  
 Pustulæ pudendorum uterique † 954. a. † 955. a.  
 Pustulæ in febr. mal. † 319. b.  
 Pustularum in febr. petechial. retrocessio quomodo fiat † 340. a.  
 Pustulæ in lue venerea † 455. b. † 472. b.  
 Pustulæ pestilenciales † 360. b. † 361. b.  
 Pustularum pestilentialium cura † 374. a. &c.  
 Pustulæ in variolis &c. \* 251. b. † 347. sqq.  
 Pustulæ albae ab ignis ambustione, nigrae ab urinosis \* 65. a.  
 Pustulæ, albae, nigrae &c. in scabie unde \* 124. a.  
 Pustulæ miliares febriles \* 234. a.  
**Putredinis** differ. à fermentatione \* 128. b.  
 Putredo, causa foetoris \* 153. b.  
 Putredo in corpore considerata \* 239. a.  
 Putredo in corpore quomodo gignatur † 325. a.  
 Putredinis in sangv. signum † 324. a.  
 Putredo in febribus veterum an locum habeat † 248. b.  
 a Putredine præservandi spirituum vis \* 797. a.  
 Putredinem inhibens decoctum \* 653. a.  
 Putredinem arcet myrrha \* 44. b.  
**Putrefactio** quid. 19. a.  
**Pylorus** quid? † 70. a.  
 Pylori convulsio † 70. a.  
 Pylori laxitas & ejus cura † 118. a. sqq.  
 Pylori scirrhus † 71. b.  
**Pyrethrum** ejus præparata & usus. 516. a.  
**Pyrela** ejus differentia, præparata & usus. 516. b.  
**Pyrotechnia** laudata \* 845. a. sq.  
**Pyrra** ejus differentia, præparata & usus. 516. b.

Q

- Quadratura** \* 499. a.  
**Qualitas** quid? 24. b.  
 Qualitatis nomine facilitatem sive agendi facultatem intelligimus \* 555. a.  
 Qualitates sine subjecto non subsistunt \* 747. a.  
 Qualitates tales in corporibus deprehendere non licet, quales ipsis ordinario affingimus \* 555. a.  
 Qualitates mutatae sequuntur texturam particularum minimarum mutaram \* 101. b.  
 Qualitas

# INDEX UNIVERSALIS

- Opii vis diaphoretica** \* 554. a. virtutes alie  
\* 556. a. sqq. vis sudorifera \* 559. a.  
**Odorifera opiorum vis** \* 567. a.  
**Opiatorum correctio** 255. a.  
**Opiata purgantibus & vomitoriis mista**  
\* 139. a.  
**Opiata ubi profunt vel nocent**, 962. b.  
**Opiata abortus causa** † 1011. b.  
**Opiatorum usus in abdominis doloribus**  
\* 172. a.  
**usus in agrypnia** † 705. a.  
**usus in arthrit. & podagra** † 778. a.  
**usus in asthma** † 103. b.  
**usus in calculo rerum** † 640. a.  
**usus in catarrhis** † 683. a. † 684. a.  
**usus in cephalalg.** † 767. a.  
**usus in chlorosi &c.** \* 326. a.  
**usus in clysmat. ad colic. convuls.** \* 182. b.  
**usus in delirio melanch.** † 874. a.  
**usus in epilepsia** † 813. a.  
**usus in febris** † 254. a. † 270. b. † 279. b.  
**usus in febr. ardentibus** † 296. b.  
**usus in febr. mal.** † 330. b. \* 247. b.  
**usus in gravidis** † 998. a. \* 145. b.  
**usus in hæmorrhagiis** † 612. b.  
**usus in hydropse** † 431. b.  
**usus in mania** † 883. a.  
**usus in mensium fluxu nimio, vel suppressione** † 939. b. &c.  
**usus in ophthalm.** † 593. b.  
**usus in phrenitide** † 861. a. † 862. a.  
**usus in pleuritide** † 569. a.  
**usus in pleuritide notha** † 574. b.  
**usus in variol. & morbill.** † 350. b.  
**vis in sistendo vomitu &c. & propinandiratio duplex** \* 154. b.  
**Opisthotonos** quid † 802. a. b.  
**Opopanax**, ejus usus. 594. a.  
**Oppositio corporum celestium** \* 439. a.  
**Orand/ Kleiner Orand.** 390. a.  
**Orbes caelestes** \* 441. b.  
**Orbiculi** quid? \* 636. a.  
**Orchis**, ejus differentia, præparata & usus. 536. a.  
**Organica forma**, vid. forma organica.  
**Orgasmus** unde dictus, & quid propriè significat  
\* 576. a. humorum ibid. in menstruatione muliebri &c. \* 576. b.  
**Orificium stomachi læsum** † 70. a. b.  
**Orificii stomach. differ. dolor** † 82. a.  
**ei vel minima læsio lethalis** † 82. b. v. œsophagus, stomachus, ventriculus.  
**Origanum**, ejus differentia, præparata & usus. 498. b.  
**Originem attributionum corporibus respectivorum, sed tot distinctas entitates malè referimus** \* 555. a.  
**Orthopnœia affectus** † 193. b.  
**De orthopnœia casus & observ.** \* 346. a.  
**Orthopnœia levis juncta inflationi stomachi**  
\* 132. b.  
**Ortus maximorum è principiis minimis** \* 738. a.  
**Orvietana** \* 634. b.  
**Os.** Oris amarus. v. amarus.  
**Oris ablutiones post pastum** \* 643. a.  
**Ore aperto non dormiendum** \* 199. a.  
**Oris distortio ex paralyfi, convulsione** † 845. a.  
**Oris hiatus ex oscitatione** † 48. b.  
**Oris occlusio in motibus convuls.** \* 184. a.  
**Oris & narium obturatio, v. nares.**  
**Oris scorbuti cura** † 503. a.  
**Contra scorbutum oris mixtura** \* 643. a.  
v. Scorbutus oris.  
**Oris tortura, v. spasmus cynicus.**  
**Oris ulcerum à lue Gallica cura** † 474. a.  
**Oris exulcerati sub salivationis cursu in lue Venerea cura** † 464. a.  
**Oris ulcera scorbutica** † 505. b.  
**Oscitantium oris hiatus** † 48. b.  
**Oscula an contagiosa** † 457. a.  
**Ossa animalium & eorum usus.** † 132. b.  
**Ossa aut suo loco naturali & receptaculo debito retineantur, duo requiruntur** \* 66. b.  
**ossis immobilitas ex linovix coagulo**  
\* 67. a.  
**Ossium caries in lue venerea** † 455. b. † 475. a.  
v. caries.  
**Ossium fractura, v. fractura.**  
**Os sacrum.** Dropax contra dolores circa os sacrum  
\* 665. a.  
**Ossa sepia**, vid. sepia.  
**Osteocolla** cujus usus in Medicina. 735. b.  
**Ostocopus dolor** † 745. b. † 750. b.  
**Ostracoderma** quæ 855. b.  
**Ostrea**, cujus usus in Medicina 695. b. 911. b.  
**Ostrearum usus in Hæctica** † 317. a.  
**Otalgia considerata** † 758. a. v. Aures.  
**Ovale foramen ejusque occlusio** \* 750. a. b.  
**Ovarium muliebri** † 948. a.  
**Ovis** cujus usus in Medicina. 678. a.  
**Ovipara & vivipara quomodo differant.** 110. a.  
**Ovorum examen.** 349. b.  
**Ovorum vitalitas** \* 768. b. sq.  
**Ovi sæcunditas unde** \* 89. b.  
**Ovum maternum sætus generandi primastamina in se complectitur** 112. b.  
**Ova uterina sæcundans spiritus** \* 320. a.  
**Ovi uterini sæcunditas impedita** † 990. a. b.  
**Ovi uterini primæ conceptionis rejectio ex casu ab alto** † 1013. a.  
**Ovorum tam viviparorum, quam oviparorum consideratio** \* 790. a.  
**Ova in oviparis & viviparis quomodo differant.** 113. b.  
**Ovi albumen quid.** 108. b.  
**Ovi cicatricula.** 113. a.  
**Ovi vitellum quid.** 108. b.  
**Ovi vitellum præstat multum in dissolvendis corporibus** \* 159. b.  
**Ova quomodo sterilia reddantur** † 990. b.  
**Ova hyponemia s. subventanea** † 988. b.  
**Noxa ex ovis fixis** \* 128. b.  
**Oxymelita unde ita dicta, & quibus proficua** \* 651. b.  
**Oxymellis virtutes** \* 138. b.  
**Oxymella præstant syrupis** † 205. b.  
**Oxymelita præscribendi ratio** \* 651. b.  
**Oxymel diureticum laxativum** \* 651. a.  
**Oxyfal** quid. 859. b.  
**Ozana atque odoratus depravatus** † 791. b. utriusque pars affecta, causæ, prognosis & cura  
† 793. a. b.  
**De ozana casus & observ.** \* 362. a.  
**Mistura contra ozanam** \* 641. b.

P.

**P**leonien/ 509. a.  
**Palati ossa in lue venerea carie affecta** † 475. a.  
Palati

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Palati ulcus à lue Gallica † 474. a.  
v. fauces
- Palliativa* cura febrium &c. in quo consistat  
\* 101. b.
- Pallor virginum*, † 958. a.
- Palma*, ejus præparata & usus. 499. a.
- Palmenbaum*. 499. a.
- Palpebrarum* coalitus, casus & observatio \* 361. b.  
Palpebrarum durities & alperitas in ophthalmia † 590. b.  
Palpebrarum paralytis † 719. a.  
Palpebrarum affectus in variol. & morbill.  
† 366. a.
- Palpitatio arteriarum*, v. arteriarum.
- Palpitatio cordis* † 379. a. b. ejus pars affecta & causa † 380. a. Differentia à cordis tremore  
† 379. b. sq. Diagnos. & symptomata  
† 382. b. Prognosis & cura † 383. a. sqq.  
De cordis palpitatione casus & observat.  
\* 404. b.  
Cordis palpitationis ex cachexia muliebri cura  
† 962. b.  
Palpitatio diaphragmatis in pleuritide  
\* 565. a.  
Cordis palpitatio gravidarum cum cura  
† 1002. b.  
Cordis palpitationis & anxietatum cura in  
peste † 378. a.  
Cordis palpitatio in pleuritide \* 278. a.  
Cordis palpitatione laborantibus non confert  
chirurgia transfusoria \* 105. a.
- Panacea*, 151. b. seqq. quid. 866. b. an dari possit  
† 79. b. qualis & quæ 79. b. ex quo regno  
investiganda \* 79. b.
- Panacea Glauberi* ejus compositio. 918. a.  
(v. universalis)
- Pancreatis* conglomeratio † 306. b.  
Pancreatis consensus cum cute \* 572. b.  
Pancreatis obstructio † 181. a.  
Pancreaticus succus elaboratus in pancreate.  
76. a.  
Succi pancreatici & fellei effervescencia vitiosa  
† 90. a.  
Pancreaticus dolor lumbaris † 156. a.  
Pancreatis inflammatio, tumores scirrhosi &c.  
† 560. a.  
Pancreatis vulnera per se lethalia \* 36. b.
- Pandæon* \* 631. b.
- Panis* præparatio. 323. a. b.  
Panis quo sensu alimentorum theriaca dicitur.  
121. a.  
Panis vis nutritiva \* 519. b. \* 827. a.  
Panis quatenus acidum auget † 7. a.  
Panis abhorrentia à matre picante \* 117. b.  
Panis usus in peste † 368. a.  
Spiritus panis. 329. a.  
Panis recentis olfactus præstantia † 392. b.
- Pannus oculi* consideratus † 719. a. b.
- Pannus* ejusque cura chirurgica. \* 19. a.
- Papaver*, ejus differentia, præparata & usus 334. b.  
499. a.
- Papillarum* defectus † 1059. b.  
Papillarum fissura † 1059. b.
- Pappel*. 512. b.
- Paracelsus* theoreticam cognitionem non adeptus  
\* 845. a.  
Paracelsisticae medicinae fundam. \* 512. b.
- Paracentesis* in empyemate † 606. a.  
Paracentesis in hydrope † 436. b.
- Paracentesis pectoris in hydrope † 698. b.  
Paracentesis usus in pleuritide \* 280. b.
- Paracynanche* † 538. b.
- Paradies-Holz*. 380. a.
- Paradisigrana* 407. b.
- Paralytis* qualis affectus † 841. a. subjectum ejus &  
symptomata † 842. a. Causæ † 842. a.  
Diagnos. † 844. b. prognos. † 845. a.  
cura † 845. b.
- Paralyseos differ. ab epilepsia † 809. a.  
Paralytis ex apoplexia † 830. b. 818. a.  
De paralyti crurum casus & obs. \* 406. b.
- Paralytis faciei diff. à spasm. cynico. † 845. a.
- Paralytis scorbutica † 484. a.
- Paralyseos scorbuticae cura † 513. a.
- Paralytis in variolis &c. † 357. b.
- Balneum in Paralyti \* 657. a.
- Decoctum in Paralyti \* 651. a.
- Hydromel paralyticum \* 651. b.
- Infusum ad affectus paralyticos externe usurpandum \* 654. a.
- Inseclus pro dispositione paralytica \* 656. b.
- Paraphimosis*, ejus causæ, cura † 924. a. b.
- Paraphrenitis*, qualis affectus † 561. a. 565. a.
- Paraphrasyne*, qualis affectus † 561. a. † 855. a.
- Paraplegia*, *paraplexia* qualis affectus † 824. b.
- Paraplegiæ differ. à Paralyti † 841. b.  
ejus causæ, † 838. a. b. fiendi modus † 839. a.  
prognosis & tres gradus † 838. b. cura  
† 839. b.
- Parasynanche* † 538. b.
- Paresis* Paralyseos species † 841. b.
- Paresis ex colica † 161. b.
- Paresis ex dolore scorbutico &c. † 159. b.
- Pareseos cura † 846. a.
- Parietaria*, ejus præparata & usus. 500. b.
- Paris Herba*, ejus præparata & usus 501. a.
- Paronychia* cujus usus. 501. a.
- Paronychia digitorum*, ejus causæ & cura chirurgica  
\* 19. a. b. pollicum pedis. \* 20. a.
- Parotidum* ortus \* 17. a. cura \* 17. b.
- Parotidum conglomeratio † 306. b.
- Parotidum in peste cura † 374. a.
- Parotidum puncturæ in peste † 561. a.
- Partes* affecta in omni morbo considerata \* 119. a.
- Partium fluidarum cum solidis conspiratio  
\* 95. a.
- Partes organicæ & non-organicæ. 35. b. seq.
- Partes solidæ quibus modis morbidæ fiunt.  
134. a.
- Partium solidarum morbi quomodo affligant  
\* 100. b.
- Pro partium solidarum viribus restituendis  
sanguinis transfusio nil valet \* 100. a.
- Externas partes curandi ratio \* 808. a.
- Particula* evaporantes è corporibus, eorumque contagium \* 805. a.
- Particularum simplicia constituentium textura, & quæ & quales illæ &c.  
† 3. a.
- Particularia* remedia, v. Remedia particularia.
- Parturientium* regimen † 1008. a.
- Parturientium dolores quid † 1008. b.  
\* 178. b.
- dolores unde † 156. a. \* 290. a.
- Parturientium dolores nostri. † 1015. b.  
causæ, diagnos. † 1016. a. b.



# INDEX UNIVERSALIS

- Obstetricis officium hoc casu** † 1016. b. discrimen à doloribus veris ibid. prognosis & cura † 1017. a.
- Partus** quid? † 1008. a.
- Partus causa** 116. a. b. seq.
- Ordinarium partus tempus** 116. a. b. sq. \* 321. a.
- tempus verum quomodo indagandum.** 116. b.
- Partus octimestris an legitimus** 116. b.
- Partui impressa à matre idiosyncrasia** \* 117. a.
- Partus regimen** † 1008. a.
- Partui vicinarum uterus consideratus** † 1008. a.
- Partus instans qt. ex aquæ uteri effluxu dignoscendus** † 1006. b.
- Partus difficilis, ejus causæ** † 1017. a. b. **Diagnosis** † 1018. b. tres circumstantiæ partum difficilem reddentes † 1019. a. **Prognosis** † 1019. b. **Cura** † 1019. a.
- De partu difficili casus & observ.** \* 371. b.
- Partui difficili proficua sternutatio** † 116. a.
- pro facilitando partu senucupium** \* 656. a.
- Partus difficultas ex aquæ fluxu cessante quomodo sublevanda** † 1007. a.
- Partus situs vitiosus** † 1015. a. ejus repositio ibid.
- Symptomata in & circa partum** † 1015. b.
- Obstetricum officium circa partum jam editum** † 1061. a.
- Dolores post partum, eorumque causæ** † 1038. a. **Diagnosis, prognosis, cura** † 1037. a. b.
- Dolores post partum cum suppressione urinæ in lochiorum retentione** \* 327. a.
- De doloribus post partum casus & observ.** \* 434. a.
- Post partum purgatio, v. purgatio.**
- Partus læsiones** † 1009. b.
- Partus verus cum mola** † 989. b.
- Partus imminutus, v. Abortus.**
- Partus post mortem in matris editus** \* 769. a. v. fetus.
- Passer vulgaris & Troglorites** ejus usus in Medicina. 689. b.
- Passionis hystericæ & epilepsiæ arcta connexio** † 809. b.
- Passio hystERICA juncta Herniæ inguinali s. bubonocèle** \* 184. b.
- v. HystERICA passio.**
- Passio iliaca** quid? quomodo distinguatur ab excretionē retenta † 96. b. Pars affecta & causæ † 97. a. veterum opinio ibid. quatuor species ilei à diversitate causarum differentes † 97. b. periodica, endemia † 98. a. **Diagnosis, prognosis** † 98. a. b. ejus quinque gradus † 99. a. **cura** † 99. a. recidiva præcavenda † 99. b. **Symptomatum cura** ibid. opiatorum usus hic † 99. b. sq. vitanda † 100. a.
- Passularum virtutes** † 142. a.
- Passulatum vis nutritiva** \* 827. b.
- Passulanum usus in scorbuto** † 495. a.
- Passulæ Corinthiæ** † 315. b.
- Passulata acidum non augent** † 7. a.
- Pasta regia** \* 631. b.
- Pastinaca, ejus differentia, præparata & usus.** 501. b.
- Pathologia unde petenda** \* 78. a.
- Pathologia medica Hippocratis** \* 514. a.
- πάθος, πάθημα** quid? \* 668. a.
- Pavana lignum, ejus usus.** 501. b.
- Pavo** ejus usus in Medicina. 690. a.
- Pavonis stercus laudatum** \* 300. a.
- Pavoris vis in gravidis** † 1011. b.
- Pavores infantum in somno** † 1087. b. **Prognosis & cura** † 1088. a. \* 552. b.
- Pavores infantum in somno, unde** \* 541. a.
- De Pavoribus nocturnis casus & observ.** \* 352. b.
- Pavoris nocturni præservativum, puerorum præsertim** † 115. b.
- De pavorē in somno casus & obs.** \* 339. a.
- Pavoris vis in peste** † 359. a. sqq. v. Merus, Terror.
- Pectoralia eorumque compositiones.** 1003. a.
- Pectorales aquæ præstantes** † 105. b.
- Decoctum pectorale in tussi &c.** \* 651. b.
- Hydromel resolvens & incidens pectorale** \* 651. b.
- Pectorales Trochisci.** 1001. b.
- Pectoris motus in respiratione** \* 724. a. sqq.
- Pectoris dolor flatuosus pleuritidi analogus** † 563. b.
- Pectoris hydrops, v. hydrops pectoris.**
- Pectoris incallescencia in pleuritide** † 565. a.
- Pectoris vulnera quomodo tractanda** \* 51. a.
- Pectoris balsamus Benzoe** † 235. a.
- Decoctum in affectibus pectoris catarrhalib.** \* 651. a.
- pectus affligentis lymphæ falsæ acris emulsio** \* 643. a.
- Pedes. Eorum cum abdomine consensus** \* 171. a.
- Pedum calor in lue venerea** † 456. a.
- Cam pede conculcatio hypochondrii sinistri** \* 368. b.
- Pedibus facta conculcatio epilepsiæ causa** \* 301. a.
- De pedum dolore casus & observatio** \* 359. a.
- Pedum fissuræ in lue Gall.** † 474. b.
- Pedum factorem tollens lorio** \* 656. b.
- Pedum jectigatio infantum** † 1075. a.
- Pedum pollices & digiti, v. pollices.**
- Pedum tumor in cachexia** \* 273. a.
- De pedibus cedematosis & ulcerosis casus & observatio** \* 349. b. \* 355. a. \* 368. a. \* 375. b. \* 376. a.
- Pedum refrigeratio colicam hypochondriacam humorosam suscitans cum dolore iliaco** \* 169. a.
- Pedum tumor in hydropē** † 425. a.
- Pedum tumoris in hydropē cura** † 440. b. sqq.
- Pedum tumor in hydropē pectoris lethalis** † 698. a. v. Tumor pedum.
- Pedum ulcera quomodo in hydropē curanda** † 442. a.
- Pediculus ejus usus in Medicina.** 708. a.
- Pediculorum usus in ictero** † 452. a.
- Pediculi ex diarrhæa serosa suppressa** † 103. b.
- Pedicularis affectus infantum** † 1101. b.
- Linimentum ad pediculos** \* 663. b.
- Pediculos pubis tollens Mercurius** \* 314. b.
- Pediluvia præscribendi ratio** \* 656. a.
- Pediluviorum usus in hydropē** † 439. a.
- usus in mensibus suppressis** † 932. b.
- Pediluvia in phrenitide** † 862. b.

Pedi-

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

*Pedium* ejus luxatio \* 67. b.  
*Pellicula* adnata tunicis oculi corneæ ac uveæ † 728. a.  
*Pellicula* fructuum, v. horæi fructus.  
*Pemphygeda* fibræ † 250. a. † 288. a.  
*Penis* caruncula † 468. a.  
*Penis* contractio in incontinentia urinæ periculosa † 666. b.  
*Penis* musculorum convulsio † 922. a.  
*Penis* dolor ejusque cura † 925. a. b.  
*Penis* erectio læta † 916. a. sqq.  
*Penis* erectio depravata, contorsio, tumor, fræni vel præputii vitium &c. † 923. b.  
*Penis* erectio aucta † 920. a.  
*Penis* turgescencia & erectio nimia † 921. a.  
*Penis* erectio deficiens † 916. a.  
*Penis* erectio suspensorum &c. † 922. a.  
*Penis* inflammatio ejusque cura † 924. b.  
*Penis* turgescencia post mortem † 922. b.  
*Penis* ulcera gallica externa & interna † 473. b.  
*Penis* ulcera solantia \* 315. a.  
v. pudenda.  
*Penis* leviathan, vid. leviathan.  
*Peptici* pulveres \* 633. a.  
*Perca* cujus usus in Medicina 695. b.  
*Percussiones* oculi † 730. a.  
*Perdix* cujus usus in Medicina 690. b.  
*Perfoliata* ejus præparata & usus. 502. a.  
*Pericardii* motus in respiratione \* 732. b.  
*Pericardii* aqua, hydrops † 380. b. tubercula &c. ibid.  
*Perinci* ruptura in parturientibus, cum Prognosi & cura † 1041. b.  
*Peri* pathotici. v. Aristoteles.  
*Peripnevmonia* † 239. a. † 560. b. causæ ejus † 561. b. divisio † 564. a. Diagnosi † 564. a. Prognosis † 565. b. Cura † 567. b.  
De Peripnevmonia casus & obs. \* 357. b.  
*Peripnevmonia* pestilentialis † 358. b.  
*Peritonæi* usus intestinalis, ruptio \* 172. a. \* 185. a.  
*Perlarum* mater quid & quomodo differt a perlis, ejusque usus Medicus. 695. a.  
*Perlata* emulsiones improprie sic dictæ \* 644. b.  
*Perlarum* 485. a.  
*Perlinsch* qualis emulsio \* 644. b.  
*Persica* Malus, ejus præparata & usus. 502. a.  
*Persicaria* ejus differentia, præparata & usus. 503. a.  
*Persicaria* insignis usus in vulneribus \* 46. a.  
*Perterebratio* est ab acrimonia acida \* 174. b.  
*Pervigilium* v. agrypnia.  
*Pessaria* hodie vix præscribuntur \* 632. a.  
*Pessi*, eorum Compositio. 845. a.  
*Pestis*, Pestilentialis febres, quales & quid † 358. a. Causæ ejus † 359. a. etiam bruta affligens † 360. a. prodromi † 360. a. affligendi modus † 360. a. an semper sit cum febre † 360. a. Symptomata † 360. a. Signa diagnostica & Prognostica † 360. b. † 361. a. differentia † 361. a. Cura præservativa † 363. a. An domus infectæ ocludendæ, homines infecti sequestrandi, fugiendum † 363. a. Cura pestis ipsius † 367. b. Symptomatum cura † 372. sqq.

De peste ex Terrore sine contagio, casus & observ. \* 421. b.  
*Pestilentia* murgel. 503. b.  
*Petasis*, ejus præparata & usus. 503. b.  
*Petechiarum* differ. à reliquis cutis efflorescentiis & pulicum moribus † 339. a. † 340. b.  
*Petechiæ* pestilenciales † 360. b. † 361. b.  
*Petechiæ* retropulsæ v. cutaneæ excretiones.  
*Petechiarum* in variolis cura \* 256. a.  
v. febres Petechiales.  
*Petroleum*, Naphtha, & oleum Terræ, quid & ejus usus. 814. a.  
*Petroselinum* ejus differentia præparata & usus. 504. a.  
*Pucedanum*, ejus differentia, præparata & usus. 504. b.  
*Psaissen-Blat*. 551. a.  
*Psaissen-Pint*. 392. b.  
*Psaissen-Röhrchen*. 551. a.  
*Pseffer-Wasser-pseffer*. 503. a.  
*Pseffer-Rörner* in peste † 361. b.  
*Pseiffen* auf der Brust \* 189. a.  
*Pfenning-Kraut*. 475. b.  
*Pflingst-Rose*. 509. a.  
*Pfriemen-Kraut*. 453. b.  
*Phænomena* naturalia demonstrata \* 793. b.  
*Phagedæna* ulcera quæ, & unde sic dicta, cura eorum chirurgica \* 63. a.  
Aqua phagedænica, ejus compositio. 733. a.  
*Phalloides* fungus \* 449. a.  
*Phantasia* quid. 101. b.  
*Phantasia* quomodo fiat † 865. a.  
*Phantasia* obtusa † 853. a.  
v. imaginatio.  
*Phantasma* melancholicum † 864. a. † 865. a. b.  
*Pharmaca* eorum usus atrophiam inducens † 315. a.  
*Pharmacia* hodie cultior \* 842. a.  
*Pharmacopoli*orum visitatio neglecta \* 680. b.  
*Pharyngu* excoriatio in febr. catarrh. † 306. a.  
*Pharyngis* inflammatio † 538. b.  
*Philoniorum* compositio ap. veteres † 707. a.  
*Philosophandi* ratio in naturalibus per qualitates primas, pluribus suspecta est \* 555. a.  
*Philosophorum Arboris* præparatio. 754. a.  
*Philosophorum lapidis* quid. 329. a. b.  
Lapis philosophorum quo sensu dicatur Rati. 293. a.  
*Philtro* quid, eorum divisio, vera an dentur † 892. b. sq. eorum causæ † 893. b. Diagnosi, prognosi, cura † 894. a. b.  
*Philtro* & inde nata dementia, rabies † 852. a. † 856. b.  
De Philtro casus & obs. \* 418. a.  
*Philtro*rum vis in quo consistat. 183. b.  
Ex philtro atrophie remedium \* 827. b.  
*Philtro* manie causa \* 880. a.  
*Phimosi* ejusque causæ † 923. b. Cura † 924. a.  
*Phimosin* à lue gallica l. gonorrh. collentia † 470. b.  
*Phlebotomia* v. venæsectio.  
*Phlegma* ex fulgine \* 562. a.  
*Phlegmata* parum curat medicus \* 631. b.  
*Phlegmatici* qui \* 310. a.  
*Phlegmatici* cur somnolenti † 711. a.  
*Phlegmon*, quid † 532. a.

R

Phlegm

# INDEX UNIVERSALIS

- Phlogos* unde † 245. b.  
*Phlogosin* corrigentia † 8. a.  
*Phlogoses* in cruditatibus nidorosis \* 129. a.  
*Phlogoses* in delir. melanch. tollentia † 877. a. b.  
*Phlogoses* vagæ in flatibus † 68. b.  
*Phlogoses* vagæ in inflat. stom. \* 136. a.  
*Phlogosis* post mensem emanationem \* 165. b.  
*Phlogoses* post pastum unde \* 120. a.  
*Epithema* contra phlogosin ex cosmetico \* 642. a.  
v. ætus, inflammatio &c.  
*Phlyæna*, earum causæ, prognos. † 525. b. cura † 526. a.  
*Phlyænae* oculorum, earum causæ, cura † 725. a.  
*Phthiriasis* infantum † 1101. b.  
*Phthifici* ut plurimum asthmatici † 1. 5. a.  
*Phthifici* faciliè evacuantur † 104. b.  
*Phthisis* ejusque causæ † 396. b. divisio ibid. pars affecta † 397. a. hæreditaria † 397. b. contagiosa † 398. b. alius morbis superveniens † 397. b. Diagnos. † 398. a. Prognosis † 400. b. quæ pars pulmonum ea afficiatur, unde. cognoscendum † 400. b. ejus Tres gradus † 400. b. Cura † 315. b. † 401. a.  
*Phthisis* differt à tæbe & atrophia \* 259. a.  
Symptomatum phthiseos cura † 408. a.  
De Phthisi imminente casus & obi. \* 396. b.  
De Phthisi casus & observ. \* 345. a. \* 357. b. \* 362. b. \* 3. 4. a. \* 365. b. \* 386. b.  
*Phthisis* catarrhalis quæ. vulgo dicatur † 399. a. b.  
*Phthisin* minantes febres † 304. a.  
*Phthisis* cum febre hæctica consultatio \* 263. a.  
*Phthisis* infantum † 1102. b.  
*Phthiseos* pulmonalis consideratio & consultatio de ea \* 158. b.  
Decocta in phthisi pulmonali \* 653. a.  
Opii usus in phthisi \* 570. b.  
Pilulæ in phthisi confirmata \* 639. a.  
† *Phrenes* i. e. diaphragma † 576. a.  
*Phrenesis* } sive  
*Phrenitis* } qualis affectus † 886. a. † 857. b. ejus causæ † 887. a. † 857. b. afficiens compressam uxorem † 859. a. differentia istius † 859. a. Diagnos. prognos. cura † 887. a. b. † 860. a. b.  
*Phrenitici* differ. à maniaco † 878. a. † 880. b.  
*Phricodes* febris † 288. b.  
*Phrygion* ejusque cura chirurgica \* 19. a.  
*Phyma*, vocis etymon, ejusque cura Chirurgica \* 19. a.  
*Physica* & *Mathesis* quomodo convenient aut differant. 26. a.  
*Physica* Peripatetica nutat \* 512. a.  
*Physiologica* doctrinæ fundamentum \* 91. a.  
*Pica*, ejus usus in Medicina. 690. b.  
*Pica*, *Picatio* quid? † 34. b. † 37. a. \* 662. b.  
*Pica* quale delirium † 857. a. Ejus pars affecta † 35. a. † 37. a. causæ † 36. a. Mulieribus imprimis, sed & viris, pueris, brutis interd. obtingit & hæreditaria est † 36. b. iis appetita raro nocent † 37. a. videtur esse melancholiæ species † 37. a. Signa, Prognosis † 37. a. mulieribus talibus appetitæ res hauri  
faciliè denegandæ † 37. b. Cura † 37. b. An venesectio conveniat in picantibus gravidis quib. ob mensum suppressionem affectus hic venit † 38. b. foetus ratio hic habenda † 38. b. artificium picantes fallendi † 39. a.  
*Pica* gravidarum, ejus Prognosis, cura † 999. b.  
Consultatio de *Pica* à Scabie retropulsa \* 123. b.  
*Pica* superveniens hæctica † 112. b.  
*Pilari* morbus infantum † 1103. a. seqq. \* 837. a.  
*Pilorum* defluxus in lue Gall † 456. a.  
*Pilula* earum compositio. 844. a.  
*Pilulas* præscribendi ratio \* 637. b.  
*Pilularum* usus \* 637. b.  
*Pilulæ* usuales \* 638. b.  
*Pilularum* ante cibum usus \* 638. a.  
*Pilularum* Glassianarum usus \* 307. b.  
*Pilulæ* podagr. s. arthrit. Veni, Amice, sarge & Ambula † 778. a.  
*Pilularum* usus externus &c. \* 639. a.  
*Pimperisifigen*. 507. b.  
*Pimpinella* ejus præparata & usus. 504. b.  
*Pinastri strobilorum* usus in catarrh. scorbut. † 684. b.  
*Pinea* nutritivæ † 827. b.  
*Pineen*. 505. b.  
*Pineolatum* \* 631. b.  
*Pingue* quid dicatur. 15. seqq.  
*Pingvibus* in est occultum acidum \* 2. a.  
*Pingvia* vomitum causantia † 71. a.  
*Pingvedo* quid. \* 822. a.  
*Pingvedo* unde † 648. a.  
*Pingvedinis* excisio \* 836. b.  
*Pingvedo* corporis immutata masticatione foliorum tabaci † 647. b. v. corpulentia nimia.  
*Pingvedo* uris, murmenti, gliris tempore brumali \* 822. a. piscium mollior ibid.  
*Pingvescentia* † 315. b.  
*Pingvis* cur unius fiat, alter non, ex eodem alimento \* 835. b.  
*Pingves* cur raro concipiant † 985. a. v. obesus.  
*Pinus*, sive *Pineæ* & *Pinaster*, ejus differentia, præparata & usus. 505. a.  
*Piper* ejus differentia, præparata & usus. 505. b.  
*Piperitis* ejus præparata & usus. 334. a. 507. a.  
*Pisa*, eorum folliculi difficilis digestionis \* 142. b.  
*Piscis* cur faciliè in putredinem abeunt. 358. a.  
*Pissasphaltos* ejus differentia & usus. 594. b.  
*Pistacia*, eorum differentia, præparata & usus. 507. b.  
*Pistacia* egregiè nutriunt \* 827. b.  
*Pituita* ex capite descensus in catarrho suffocativo, figmentum est † 240. b.  
*Pituitosæ* Cacochymia remedia † 9. a.  
*Pituita* in urina quomodo dignoscatur \* 237. b.  
*Pituita* vitrea in stomacho † 83. a.  
*Pix* ejus usus. 504. b.  
*Placenta* uterina usus \* 56. b.  
*Placenta* uteri sæpius promolis habita † 992. b. vid. Uterus.  
*Planetarum* conjunctio \* 439. a. seqq. motus proprius ibid. \* 442. b.  
Cui Planetarum maxima influendi efficacia tribuenda \* 440. a. \* 445. a. v. stellæ, conjunctio.  
*Plantæ* ortus ex minimis originibus \* 788. a.  
*Plantarum* seminis consideratio \* 789. a.  
*Plantæ*



# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Plantarum** quintuplex differentia 321. a. b. seq.  
**Plantæ** laxæ in mari \* 448. a.  
**Plantæ pedum.** Eorum tactus lenilior \* 229. a.  
**Plantago** ejus differentia, præparata & usus 68. a.  
**Plethora** quid 122. b.  
**Plethora** vera & respectiva seu apparens † 618. b.  
**Plethora** est duplex, vel ad vires, vel ad vasa 122. a.  
**Plethora** ad vasa quomodo curanda 123. a. b.  
**Plethora** imminutio cui utui † 6. a.  
**Plethora** abortus causa † 1011. a.  
**Pleura** inflammatio Pleuritis, Pleuropneumonia † 510. b. differentia horum affectuum † 61. a. causæ † 561. b. divisio † 562. b. Diagnofis † 564. a. Prognofis † 565. b. Cura 67. b.  
**Pleura** in regione dorsi, ubi adnascitur diaphragma, inflammata falsò pro nephritide habita in Pleuritide † 565. a.  
**An** pleura sola vel cum pulmonibus afficiatur in pleuritide \* 2. 6. a.  
**Pleuritis**, ejus Cura 501. a.  
**Pleuritis** differ. ab inflammatione hepatis † 55. b.  
**Pleuritidis** metastasis \* 276. b.  
**Pleuritis** quomodo finitur \* 277. b. \* 292.  
**Pleuritidis** recidivæ theoria \* 276. b.  
**de** Pleuritide casus & observ. \* 349. b. \* 353. a.  
**Consultatio** de Pleuritide vera \* 275. a.  
**Signa** Pleuritidis veræ pathognomonica \* 276. a.  
**Pleuritidem** curans priapus cervi vel tauri † 131. b.  
**Potio** anti-pleuritica \* 640. a.  
**Linimentum** contra dolorem pleuriticum \* 63. a.  
**Pleuritidis** in morbo catathali cura \* 239. b.  
**Pleuriticorum** febris † 144. a.  
**Pleuritidis** nothæ quadruplex differ. † 563. a.  
**Pleuritidis** nothæ cura † 574. b.  
**Unguentum** in pleuritide notha \* 666. a.  
**Pleuritica** pestis † 358. b.  
**Pleuritidis** verminosa cura † 574. b.  
**Pleuropneumonia** prognofis † 565. b.  
**Plica Polonica** qualis affectus † 532. b.  
**Ploratus** infantum enormis † 1075. a.  
**Plumbago** ejus usus 509. a.  
**Plumbæ** vasa dysenteriam inferentia † 124. b.  
**Pneumatocèle**, ejus causæ, diagnofis, prognofis, cura † 904. a.  
**Pocula communia** contagiosa † 457. a.  
**Podagra** qualis affectus † 773. a. v. Arthritis.  
**Podagra** quatenus sceminas afficiat etiâ † 775. b. an evanchoſ, pueros, ciconias, ibid.  
**Podagræ** metastasis \* 293. b. sq.  
**Casus & obſ.** de Podagra \* 372. a.  
**Podagræ** lætea diæta \* 111. b. quatenus curanda \* 112. a.  
**Podagræ** recens facile curabilis \* 293. b. contra eam remedia 505. b.  
**Podagricæ** crurum dolori conducens balneum \* 657. b.  
**Podagra** dentium † 752. a.  
**Podagra** hereditaria † 752. a.  
**Podagra juncta** stranguriæ \* 291. a.  
**Podagra/ſo** in Leib getreten \* 195. b.  
**Podagrici** topi quomodo fiant \* 112. a.  
**Cataplaſma** anti-podagricum \* 658. b.  
**Podagra** debilitatos articulos firmans pediluvium \* 656. b.  
**Podis** dolor poſt menſium emanſionem naturalem \* 165. b.  
**Podex** interiora verſus reſtriſtus † 98. b. \* 140. a. v. anus.  
**Podex** retractus in iliaco affectu \* 170. b.  
**Pæonia** ejus differentia, præparata & uſus 509. a.  
**Pæoniæ** uſus in epileſia † 813. b.  
**Polaris terra** ſi eſſet habitabilis, incolæ vix viverent ultra centum dies \* 446. b.  
**Poley** 515. a.  
**Pollices** pedum afficiens Paronychia, ejus cauſæ, curaque chirurgica \* 20. a.  
**Pollutio nocturna** † 909. a.  
**Polygonatum**, ejus præparata & uſus 510. b.  
**Polygonum** ejus uſus 510. b.  
**Polypodium** ejus præparata & uſus 630. b.  
**Polypus** cordis, ejus palſitationis cauſa † 381. a.  
**Polypus** narium, ejus pars affecta, cauſæ, prognofis, cura † 795. a. b.  
**Pomerangen-Aepffel** 394. b.  
**Pomum**, ejus differentia, præparata & uſus 511. b.  
**Aqua** ex pomis putridis nobile remedium chirurgicum 358. a.  
**Ponderis** gravioris ſublatio abortum inferens † 1011. b.  
**Ponderis** in utero ſenſus unde \* 328. a.  
**Populus**, ejus uſus 512. b.  
**Porcorum** remedium ad lepram, varos, & pinguedinem \* 199. b.  
**Pori** cutis eorum occluſio &c. \* 561. a.  
**Pororum** occluſio quomodo contingat \* 124. b. v. cutis.  
**Pororum** occluſio ſub bruma \* 227. a.  
**Pororum** occluſio in hydrope † 439. b.  
**Pororum** anguſtia unde \* 4. a.  
**Pororum** obſtructio febr. &c. cauſa † 149. a.  
**Pori marini** \* 448. a.  
**Porofitas** corporum \* 748. b.  
**Porrigo**, ejus cauſæ & cura † 531. a.  
**Porrus**, ejusque uſus 512. b.  
**Portulaca**, ejus differentia, præparata & uſus 512. b.  
**Potandi** ſobrietas olim \* 809. a.  
**Potatores** vini cur hæmorrhagiis obnoxii † 608. b.  
**Potentiarum** Hippocraticarum proportio & temperatura quomodo turbetur in ſuccis corporis \* 521. a.  
**Potiones**, earum compoſitio 834. b.  
**Potiones** medicatas præſcribendi ratio & uſus 639. b.  
**Potiones** particulares præſcribendi ratio \* 640. a.  
**Potio ordinaria** \* 639. b.  
**Potus** virtutes conſideratæ \* 510. a.  
**Potus** medicatos præſcribendi ratio \* 649. a.  
**Potus** ex primis viis ad vias urinarias iter 81. a.

# INDEX UNIVERSALIS

- Potus in ea forma redditus, qua ingestus † 118. b.
- Potus febricitantium † 254. b.
- Potus in febris an liberalior concedendus † 293. b.
- Potus spirituosus usus in peste † 364. a.
- Potus pleuriticorum † 569. a.
- Potus frigidus, post nimiam incalescentiam tabem inducens † 395. b.
- Potus v. cibus, alimentum, bibere, diæta, frigida, sitis.
- Practici* ultra vulgatam & ordinariam praxin excellentes † 1. b. † 26. b.
- Praxis medica* circa individua versatur \* 117. a.
- Medicinæ Practicæ* primordium ab herbis \* 847. a.
- Practicus habitus* in medicina ut acquirendus \* 117. a.
- Praxis Generalis* † 27. a. sqq.
- Specialis † 28. sqq.
- Practica generalis* concernentia † 5. b.
- Praxis* duabus ex causis dubia redditur & difficilis \* 117. a. v. Cura.
- Præcos* medicæ universale malum 853. a.
- In *Praxi* ad duas facultates corporis humani respiciendum † 5. b.
- In *praxi* methodus medendi aliquando invertenda † 164. a.
- Praxis medica* extraordinaria quæ & ejus differentia duplex † 2. a. \* 78. a. sqq. ultra vulgarem praxin excellendi duplex medium \* 78. b. quomodo reformanda & exaltanda praxis ordinaria † 2. a. \* 79. a. quatuor præcognita necessaria medico ad ritè praxin aggrediendam † 2. b. (v. Cura, Medicina practica, Theoria.)
- Præcipitantia* † 3. b. \* 131. b.
- Præcipitantium* virtus † 251. b.
- Præcipitantium* in medicinam introductio; abundantia, scopus \* 576. a. quibus autoribus primitus ac maxime introducta \* 578. b. *Præcipitantia* ex regno animali, vegetabili; minerali \* 579. a. b. *Præparata* horum & composita \* 580. a. b. Quo respectu à veteribus exhibita \* 580. b. occasione chymicæ magis exculsa, à modernis in therapevlin introducta \* 581. a. eorum natura, usus, operandi modus \* 578. a. \* 581. a. sqq. operantur in genere acidum p. n. corrigendo † 588. b. unde potius invertentia, item attemperantia, aut saturantia, absorbentia &c. dicenda † 589. a. b. sqq. adeoque acidi istius respectu universaliora sunt alterantia \* 590. a. sed quid de bile \* 590. b. Late diffusus horum remediorum usus \* 592. a. eorum legitima administrandi methodus \* 594. a. tam externè, quàm internè \* 594. b. Perverso abusu multum nocent \* 595. b. speciatim recidivas prioris aut generationem novi morbi inferunt \* 597. a. quod confirmant exempla ex regno vegetabili \* 598. a. ex regno animali \* 601. a. ex regno minerali \* 601. b. Cautela pro legitimo usu; ritè sunt præparanda \* 604. a. non saturata ab acidis \* 603. b. non tamen quævis per acida præparatio rejicienda \* 605. a. sed saltem nimia saturatio \* 605. b. moderata dosi exhibenda \* 607. a. debitus selectus instituendus \* 607. b. Isque vel respectu remedii \* 607. b. vel respectu ægri \* 609. b. ordo debitus observandus \* 611. a. conveniente tempore usurpanda \* 612. b. Præmissis primas vias mundificantibus \* 612. b. Idque ut plurimum, sed non semper \* 613. a. in acutorum incremento & statu \* 613. b. in intermittentibus ante paroxysmos \* 614. a. ventriculo vacuo \* 614. b. subjungantur purgantia \* 614. b. fluidis concitator motus conciliandus \* 615. a. Quot & quibus modis \* 616. a. Aliis remediis socianda \* 616. b. Purgantibus \* 616. b. Sudoriferis \* 617. b. Anodynis \* 618. b. Sed ritè correctis \* 619. b. Denique appropriatis \* 620. a.
- Præcipitata*, eorum compositio & usus 839. b.
- Præcipitatio* quid 18. b. 19. b. 263. b. quoruplex 19. b. sq. 264. a. b.
- Præcipitationis* ratio 265. a. b. sq.
- Præcipitatio* in utq. pharmaceutico quid notat \* 131. b.
- Præcipitatione* facta separatio \* 126. b.
- Salia sunt causa efficiens præcipitationis 20. a.
- Præcipitationes* cum spiritu urinæ & solutione Saturni 330. b.
- Præcipitatio Chymica* quid & quoruplex \* 581. a. Ejusdem fundamenta mechanica \* 581. a. *Præcipitatio* in fluidis nostris in statu sano & ægro \* 582. a. b. De artificiali per medicamenta questio \* 583. a. Quæ vix locum habet in cura morborum \* 583. a. Triplex casuum differentia in quibus in usum vocatur \* 583. b. In prima eorum non præcipitatio, sed unio locum habet \* 584. a. Erroris hujus origo \* 584. b.
- Præcipitatio humorum* malè opponitur ebullitioni, fermentationi seu turgescentiæ aut effervescentiæ eorum &c. \* 585. a. sed nulla attemperatio, ibid. Erroris hujus origo \* 586. a.
- Præcordiorum* nomine quid veniat \* 572. b.
- Præcordiorum* consensus cum cute \* 572. b.
- Præcordiorum* angustia; casus & obs. \* 337. b.
- Præcordiorum angustia* in febr. lymphat. \* 234. a.
- Præcordiorum angustia* in febr. mal. \* 245. a.
- Præcordiorum angustia* hypochondriac. scorbuticor. &c. \* 202. a.
- Præcordiorum* anxietatis cura in morbill. & variol. † 353. a.
- Præcordiorum* anxietatis cura in peste † 378. b.
- Præcordiorum* anxietates in stomachi inflatione \* 133. a.
- Præcordiorum* angustia in tussi stom. ferina humida \* 200. b.
- v. Angustia, Anxietates.
- Præcordiorum dolor* convulsivus; casus & observatio \* 338. a.
- Præcordiorum dolor* in tertiana mal. \* 207. a.
- Præcordiorum* infantum inflatio unde \* 537. a.
- Prædictiones* Astrologorum minimè sunt contemnendæ \* 445. b.
- Pregnantibus* nocent Purgantia, v. gravida, purgantia.
- Præparata* cur præ crudis expetantur 149. b.

Eorum

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Eorum compositiones & usus 835. b. sqq.  
 Preparatio medicam. finis \* 844. a.  
*Præputii* vitia † 923. b.  
 De præputii fissura & Tumore casus & observatio \* 374. a.  
*Præputii* tumor in gonorrhœa gallica † 470. b.  
*Præscriptio formularum* \* 621. a. 199. \* 631. b.  
*Præservativa* curæ in quo consistant † 328. b.  
*Præstigium* v. Incantatio, fascinum &c.  
*Priapismus* qualis convulsio. † 802. b. † 921. a.  
 ejus causæ, diagnosi, prognos, cura † 922. a. b.  
*Priapus*, scortorum Patronus † 922. a.  
*Priapus* quid † 132. b.  
*Priapus* Cervi & bovis ejus usus § 11. b.  
*Primarium* vitium in febr. † 250. b.  
*Primula* veris, ejus differentia, præparata & usus § 13. b.  
*Primum* Ens ♀. vid. ♀.  
*Primum* mobile; ejus motus \* 439. a.  
*Principia* activa & passiva quæ dicantur 16. a.  
*Producta* morbosa v. morbus.  
*Prognosis* 142. a. b. † 2. b.  
 in omni casu resolvendo necessaria \* 119. a.  
 Tria in Prognosi attendenda \* 129. b.  
*Prostitutioni* obest obesitas \* 829. a.  
*Proprietas* individuorum connata, acquisita \* 117. a. idealis, materialis ibid. b. v. Idiosyncrasia.  
*Prostatarum* tumor † 907. b.  
*Prostatarum* tumor, ichuriam inducens † 657. b.  
*Prostatarum* glandularum corrosio & exulceratio in gonorrh. † 48. a. \* 313. a.  
*Pruna* seu carbunculus \* 17. b.  
*Prunella*, ejus differentia, præparata & usus § 13. b.  
*Prunella* ejusque cura † 544. b.  
*Prunella* febrilis 286. a. ejus cura † 301. b.  
*Mistura* contra Prunellam febrium acutatum \* 642. b.  
*Prunellæ* in peste cura † 378. b.  
*Prunus*, ejus differentia, præparata & usus § 14. a.  
*Pruritus* ani v. ani pruritus.  
*Pruritus* genitalium muliebr. † 954. a.  
*Pruritus* in scabie, ejus causæ, diagnosi, prognos, cura † 521. b. \* 124. a.  
*Pruritus* scorbutici cura † 506. a.  
*Pruriginosus* dolor † 745. b.  
*Psora* v. Lepra.  
*Ψωρα* † 590. b.  
*Psyllium* ejus usus 631. a.  
*Psalmica* ejus usus § 15. a.  
*Psalmica* mistura \* 642. b.  
*Πιπύριον* † 719. b.  
*Pisana* quomodo præscribendæ \* 651. a. v. hordeata.  
*Ptyalismus* in lue venerea \* 115. b.  
 in variol. & morbill. † 355. a. v. salivario.  
*Pubis gravidarum* dolor cum cura † 1002. a.  
*Pudendorum* excoriatio in partu † 1040. b.  
*Pudendi* labiorum fissura in parturientibus † 1041. a. v. labia.  
*Pudendorum* hydrops † 984. b.  
*Pudendorum* hydrops in gravidis cum cura † 1008. a.  
*Pudendorum* muliebrum pustulæ, pruritus † 954. a.  
*Pudendorum* tumor parturientium † 1041. a.  
*Pudendorum* verrucæ quomodo tollendæ \* 31. a. v. vulva, penis.  
*Pudor* erectionem penis impediens † 916. b.  
*Pullorum* gallinaceorum exclusio impedita † 95. o. b.  
*Pullorum* gallinaceorum carnes egregie nutriunt \* 827. b.  
*Puerperarum* regimen † 1026. a.  
*Puerperæ* febris \* 434. b. \* 350. a. \* 352. a.  
*Puerperarum* vires reficiens † 392. b.  
*Puerperarum* peste correptarum prognos † 363. a.  
*Puerperâ* mortuâ quomodo fœtus salvandus † 1023. b.  
*Pulegium* ejus præparata & usus § 15. a.  
*Pulicum* morsus cum Petechiis non confundendæ † 339. a.  
*Pulmonalis* venæ cartilago durior † 380. b.  
*Pulmonaria* ejus differentia, præparata & usus § 15. b.  
*Pulmonarium* vasorum obstructio quibus signis cognoscatur † 382. b.  
*Pulmonum* structura & motus in respiratione \* 731. b.  
*Pulmones* an in inspiratione se ipsos expandant, an ab aëre dilatentur 71. a. b. sq.  
 Tria ad legitimum pulmonum motum & aëris reciprocationem facientia † 199. a.  
*Pulmonum* sensus obtusus \* 228. a.  
*Pulmonum* cum testibus consensus † 697. b.  
*Pulmonum* reticularis plexus \* 196. b.  
*Pulmonum* excrementa variorum morborum genitricæ \* 194. b.  
*Pulmonum* vitia in asthma \* 196. a.  
*Pulmonum* strictura in asthma † 198. b.  
*Pulmones* coryza an affligat \* 229. a.  
*Pulmonum* hydropis prognos † 698. a.  
*Pulmonum* inflammatio † 561. a.  
*Pulmonum* obstructio † 181. b.  
*Pulmonum* ulcus in hæmoptysi \* 284. a.  
*Pulmonum* vasculi erosio seu diabrosis in hæmoptysi \* 283. b.  
*Pulmonum* ulcera phthiseos causa † 397. a.  
*Pulmonum* ulcera, phthisis \* 258. b. \* 261. b.  
*Pulmones* cur in phthisi primariò afficiantur \* 263. b.  
*Pulmonum* vomica † 397. a.  
*Pulmonum* vulneris lethalitas \* 36. a. quomodo illud tractandum \* 51. a.  
*Pulmonum* læsiones restituens decoctum \* 651. b.  
*Pulmonibus* inimica † 4. b.  
*Pulmonis* fœtus in utero consideratio \* 751. b.  
*Pulparum* medicatarum præscribendi ratio \* 657. b.  
*Pulparum* usus in bolis \* 634.  
*Pulsatio* ex impedito motu sangu. † 181. b.  
*Pulsatio* cordis, artierarum, v. cordis, artierarum palpitatio.  
*Pulsatorius* dolor † 745. b. † 750. a.  
*Pulsifcus* cordis motus cur adeò necessarius pro vita animalium \* 771. b.  
*Pulsio* & tractionis differ. \* 740. a.  
*Pulsus* quid declaret 141. a. b.  
*Pulsus* est quintuplicis differentie 68. a.  
*Pulsus* est a sanguine ex corde cum impetu in arteriâ expulso 67. b. sq.  
*Pulsus* quot numerentur horæ spatio \* 761. b.  
*Pulsus*



# INDEX UNIVERSALIS

- Pulsus** frequentior in numero sub inspirationis actu, sub expiratione tardior \* 765. b.
- Pulsus** parvus, rarus, debilis, myurus, vermicularis † 386. a. lqq.
- Pulsus** serratus quis \* 276. a.
- Pulsus** quare non datur venis 68. a.
- Pulsus** venæ cavæ unde est 68. a.
- Pulsus** læsus cum cura † 379. a. lqq.
- Pulsus** intermittens in variis affectibus \* 278. a.
- Pulsus** intermissio quando non adeo periculosa 14. a.
- Pulsus** ægri ob nimios dolores intermittens medicum non detertere debet \* 157. b.
- Pulsus** in cardialgiâ &c. consideratio \* 138. b.
- Pulsus** celerior, sed debilior in colica, &c. \* 171. a.
- Pulsus** conditio in empyemate † 602. a.
- Pulsus** consideratio in febris &c. 243. a. b. † 249. a. \* 203. a.
- Pulsus** conditio, in febr. mal. † 318. a. lqq. † 326. b. \* 250. a.
- Pulsus** consideratio in febr. mal. petch. \* 245. b.
- Pulsus** conditio in inflammatione hepatis † 54. a. † 565. a. † 575. b.
- Pulsus** consideratio in hepatis inflamm. cum febre symptomatic. \* 282. a.
- Pulsus** hypochondriacorum † 480. b. † 484.
- Pulsus** maniacorum qualis † 879. a.
- Pulsus** nephriticorum † 637. a.
- Pulsus** conditio in peste † 360. b.
- Pulsus** prognosticon in peste † 362. b.
- Pulsus** conditio in pleuritide † 564. a. † 565. a. \* 276. a. \* 278. a.
- Pulsus** sæpe fallit indicantes de læsa sanguinis crasi † 242. a.
- Pulsus** amatorius an detur † 892. a.
- Pulsus** infantum \* 526. a.
- Pulses** v. Pulpa.
- Pultis** infanti porrigendæ vitia † 1070. a. in præparatione \* 534. b. in usurpatione \* 335. a. correctio † 1070. b. \* 546. a.
- Pulveres.** Eorum externus usus & præscribendi modus \* 627. b. \* 632. a. \* 633. b. eorum compositiones & usus 835. b. lqq.
- Pulveres** saccharo non lavandi \* 131. b.
- Pulveris** pyri mira extensio 803. b.
- Pulveris** pyri usus in peste † 364. a. lqq.
- Pulvere** pyrio factæ ambustionis cura \* 65. b.
- Pulveris** sympathetici usus in gonorrhœa Gallica † 470. a.
- Pulveris** Sympathetici usus in nimio fluxu mensium † 942. a.
- Pulvisculi** ante oculos versantes † 718. b.
- Pumex** cujus usus in Medicina 736. a.
- Punctiones** in locis bubonum, fonticulis &c. in peste † 361. a.
- Punctionis** dolor sursum ascendens in colica \* 170. b.
- Punctorius** dolor † 745. a. † 750. a.
- Punctorius** sensus est ab acrimonia acida \* 174. b.
- Punctum** saliens vigore vitali præditum \* 89. b.
- Punctura** à vespiis, araneis &c. quomodo curanda \* 48. a. lq.
- Pupilla** vitia † 731. a.
- Purgantia** † 5. a. Eorum examen 338. b.
- Purgantium** differ. à vomitoris \* 139. a.
- Purgantia** quomodo fiant vomitoria & contra 161. a. lq. \* 139. a.
- Purgantia** quando fiant diuretica aut diaphoretica 255. b. lqq.
- Purgantium** operandi modus 862. a.
- Purgantia** an putrefaciendo & colliquefaciendō massam sanguineam agant 363. b.
- in Purgantibus** qualis distinctio adhibenda 162. b. lq.
- In** subjecto purgando quid considerandum 163. a.
- Purgantia** quæ venenositatem habeant occultam 614. b.
- Purgantium** venenositas quomodo corrigenda \* 130. b. 255. b. 614. b. lqq.
- Purgantia** quæ sufficiunt 615. b. 869. a.
- Purgantia** præscribendi modus \* 627. b. \* 649. b. eorum compositio 877. a. 881.
- An** vera dentur purgantia † 14. a. eorum abundantia & selectus † 14. b. modus usurpandi † 15. a.
- Purgantia** quovis debeant evacuare 615. a.
- Purgantia** per alvum † 13. b. eorum operatio † 14. a.
- Purgantium** in diversis subjectis vis diversa unde 254. b.
- De purgantibus** resinosis observatio \* 130. a.
- Purgantia** opiatia mista, ne intendatur dolor \* 139. a.
- Purgantia** an clysteribus addenda \* 659. b.
- Purgantium** usus in abdominis doloribus \* 172. a.
- usus** in angina † 544. a.
- usus** in apoplexia † 837. b.
- usus** in arthrit. & podagra † 778. a.
- Purgantia** an asthmaticis propinanda † 102. b.
- Purgantium** usus ante balneum \* 715. a.
- usus** in chlorosi cum vomitu & tetano capitis \* 326. b.
- usus** in colic. convuls. \* 182. b.
- usus** in delirio melanch. † 873. b.
- Purgantium** abusus in diarrhœa, morbisque acutis † 108. a.
- Purgantium** usus in epilepsia † 812. a.
- usus** in epilepsia habituali \* 299. a.
- Purgationum** usus in febr. interm. \* 205. a.
- Purgationes** in febr. mal. nullius usus † 332. a.
- Purgantia** gravidis seu prægnantibus an propinanda 881. b. † 995. b.
- Purgationum** usus in ictero † 449. b.
- Quomodo** infantes purgandi † 1074. a. \* 547. a.
- Purgationum** usus in hæmorrhag. † 612. b.
- usus** in hydrope † 431. a.
- usus** in malo hypochondr. & scorbut. † 491. a.
- Purgantia** hysteriis parum proficua \* 158. a.
- Purgantium** usus in lepra † 523. b.
- usus** in lue venerea † 466. b.
- usus** in affectibus lymphæ \* 231. b.
- usus** in mania † 881. b.
- usus** in mensibus nimis † 939. a.
- usus** in mensibus suppressis † 931. b.
- usus** in obesitate † 833. a.
- usus** in peste † 364. a. † 369. a.
- usus** in petchiis 341. b.

## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- usus in phthisi, atrophia, tace † 401. b.  
 usus in pleuritide † 568. b.  
 usus in rabie & hydrophobia † 890. a.  
 Purgans bolus \* 634. b.  
 Electuaria purgantia \* 635. a.  
 Purgantes emulsiones \* 645. a.  
 Infusum purgans \* 648. a.  
 Infusum purgans ex senna pro delicatulis \* 648. b.  
 Pilulæ purgantes catholicæ \* 637. b.  
 Purgantium pilularum compositiones quæ sufficiunt. 862. a.  
 Purgans Potio. 875. a.  
 Purgans absque torminibus pulvis \* 632. b.  
 Rotulæ purgantes pro delicatis & pueris \* 636. b.  
 Purgans unguentum externum. 883. a.  
 Purgantia vulnerum quid \* 56. b.  
 v. alvi proratio, evacuantia.  
**Purgationes** sunt artificiales diarrhææ \* 142. a.  
 Purgatio quatuorplex. 158. b.  
 Purgationis modus. 614. a.  
 Purgatio Sympathetica mediante stercore proprio quomodo fiat. 884. a.  
 Purgationes tantum nocent, quantum profunt \* 638. a.  
 Purgationi quomodo supervenit diaphoresis vel diuresis. 163. b.  
 Purgationis usus & abusus. 159. b.  
 Purgationem nimiam sistentia \* 135. a. stimulum ei addentia \* 135. b.  
 Purgationes per acida infringuntur, sedantur, impediuntur \* 142. a.  
 Purgationis locus, intestina † 13. b. an etiam vasa mesaraica † 14. a.  
 Purgatione evacuanda materia qualis 163. a. lq.  
 Purgatione excretarum sordium varietas unde. 163. b. lq.  
 Purgatio gravidarum † 997. b. † 998. a.  
 Purgatio post partum infantis non sufficienter facta. \* 361. b. omissa \* 365. b.  
 Purgatio in variolis & morbillis † 349. b.  
 Purgatio alvi ex pilulis plantis pedum illitis \* 171. a. v. hypercatharsis.  
**Purgier** a. x. l. wieder den Scharbock \* 649. b. aufsetzlich inahlbid.  
**Purpura** ex lactis coagulatione post potionem sudoriferam \* 334. b.  
 Purpura puerperarum. † 1047. b.  
 Cur infantes recens nati subinde tertio aut quarto die purpura affligantur † 1063. b.  
 Purpura scorbuticorum cum cura † 506. a.  
 Purpura retropulsa v. Cutaneæ excretiones.  
 De Purpura casus & observatio \* 364. b. \* 370. b. \* 421. b. \* 423. a.  
 De Purpura cum diarrhæa, casus & observ. \* 423. a.  
 De Purpura alba casus & obs. \* 339. a. \* 352. a. \* 371. a. b.  
 De Purpura rubra casus & observ. \* 354. b.  
 v. Febris purpurata.  
**Purulenda** materia hærens in corpore extra vias urinarias, nunquam cognoscitur ex urina \* 778. b.  
**Pus.** Ejus genesis \* 108. b.  
 Pus & sanies, quid? \* 57. a.  
 Pus à sanie differt \* 180. b.  
 Pus omne falsum est \* 238. a.  
 Pus cur album \* 151. b.  
 Pus nunquam fit sine febre lenta † 310. a.  
 Pus quomoda à genitura in urina distinguenda &c. \* 237. b.  
 Puris evomitio in empyemate † 606. a.  
 Puris exspuitio per os in abcessu mesenterii \* 242. a.  
 Puris cum sanguine mistio suffocationem inferens \* 240. a.  
 Pus oculorum † 725. a.  
 Puris in pleuritide excretio \* 280. a.  
 Puris rejectio non semper ex pulmonibus † 400. a.  
 Pus in scabie unde \* 124. a.  
 Puris in variolis conditio \* 152. a.  
 v. Sanies.  
**Pustula** cutis ob applicata gummata conducentia † 687. a.  
 Pustulæ faciei v. achores, savi.  
 Pustulis manuum conveniens lotio \* 656. b.  
 Pustulæ oculorum consideratæ † 725. a.  
 Pustulæ pudendorum uterique † 954. a. † 955. a.  
 Pustulæ in febr. mal. † 319. b.  
 Pustularum in febr. petechial. retrocessio quomodo fiat † 340. a.  
 Pustulæ in lue venerea † 455. b. † 472. b.  
 Pustulæ pestilenciales † 360. b. † 361. b.  
 Pustularum pestilentialium cura † 374. a. &c.  
 Pustulæ in variolis &c. \* 251. b. † 347. lqq.  
 Pustulæ albae ab ignis ambustione, nigrae ab urinosis \* 65. a.  
 Pustulæ, albae, nigrae &c. in scabie unde \* 124. a.  
 Pustulæ miliares febriles \* 234. a.  
**Putredinis** differ. à fermentatione \* 128. b.  
 Putredo, causa foetoris \* 153. b.  
 Putredo in corpore considerata \* 239. a.  
 Putredo in corpore quomodo gignatur † 325. a.  
 Putredinis in sangv. signum † 324. a.  
 Putredo in febribus veterum an locum habeat † 248. b.  
 a Putredine præservandi spirituum vis \* 797. a.  
 Putredinem inhibens decoctum \* 653. a.  
 Putredinem arcet myrrha \* 44. b.  
**Putrefactio** quid. 19. a.  
**Pylorus** quid? † 70. a.  
 Pylori convulsio † 70. a.  
 Pylori laxitas & ejus cura † 118. a. lqq.  
 Pylori scirrhus † 71. b.  
**Pyrethrum** ejus præparata & usus. 516. a.  
**Pyrela** ejus differentia, præparata & usus. 516. b.  
**Pyrotechnia** laudata \* 845. a. lq.  
**Pyra** ejus differentia, præparata & usus. 516. b.

Q

- Quadratura** \* 439. a.  
**Qualitatis** quid? 24. b.  
 Qualitatis nomine facilitatem sive agendi facultatem intelligimus \* 555. a.  
 Qualitates sine subiecto non subsistunt \* 747. a.  
 Qualitates tales in corporibus deprehendere non licet, quales ipsis ordinario assignamus \* 555. a.  
 Qualitates mutatae sequuntur texturam particularem minimarum mutata \* 105. b.  
 Qualitates

# INDEX UNIVERSALIS

Qualitates quatuor Hippocratis & Aristotelis \* 511. b.  
 Qualitates elementares primæ explosæ \* 815. b.  
 Ad qualitates manifestas omnia reducere velle infanz opus est \* 555. a.  
 Qualitates occultæ asyllum ignorantiz † 181. a.  
 Quartana v. febris quartana.  
 Quæcken-Grass. § 10. b.  
 Quendel. § 42. b.  
 Welscher-Römischer-Quendel. § 53. b.  
 Quercu, ejus præparata & usus. § 17. a.  
 Pilulæ foliorum quercus & excrementum quercus fungosum. § 36. b.  
 Quies impingvat \* 827. b.  
 Agris conducit † 255. b.  
 Quinque folium ejusque usus. § 17. a.  
 Quintarum essentialium præparatio † 184. a.

R.

Rabidi canis urina, saliva considerata \* 800. a.  
 Rabidi canes, feles, galli, lupi, equi, &c. † 884. b.  
 Rabidi hominis morsus † 885. a.  
 Rabin qualis affectus † 884. b. ejus communicatio per salivam, vestes &c. † 885. a. b.  
 Rabiei communicatio per ideas \* 799. b.  
 Symptoma ejus † 885. b. alia notabilia † 885. b. lqq. Causæ † 886. b. Diagnos. † 887. a. Prognosis † 888. a. Cura † 888. a.  
 Rabies canina considerata † 884. b. lqq.  
 Rabies felina, a morsu canis &c. † 856. a.  
 Raden. 495. b.  
 Radiorum visualium impeditus per pupillam ingressus † 719. a.  
 Radix morborum † 1. b. † 2. b.  
 Radix Rhodia, vid. Rhodia.  
 Räucher-Pulver \* 634. a.  
 Ramus ductus epatici &c. v. hepaticus ductus &c.  
 Ramus iliacus cruralis v. cruralis ramus iliacus.  
 Rana aquatica, cujus usus in Medicina 695. b.  
 Ranarum usus hæcticus † 317. a.  
 Ranunculus ejus differentia, præparata & usus. § 18. a.  
 Ranunculus viridis cujus usus in Medicina. 678. b.  
 Rapa & Rapum, ejus præparata & usus § 19. a.  
 Raparum usus in Herniis \* 187. a.  
 Raphanus ejus differentia, præparata & usus. § 18. b.  
 Raphani rufficani vis vomitoria † 11. a.  
 Raserey. † 877. b.  
 Rationalium operationum læsiones † 850. b.  
 Ratio imminuta & abolita † 850. b.  
 Raucedo quomodo contingat † 220. b. ejus pars affecta, causæ † 220. b. Differentia ibid.  
 Prognosis & cura † 221. b.  
 Raucedo catarrhi species † 679. b.  
 De Raucedine casus & observ. \* 350. a.  
 Raucedo in catarrhali febre epidemica unde \* 226. b.  
 Raucedo in colica † 161. b.  
 Raucedo in peste † 362. b.  
 De raucedine ex fumo Tabaci casus & observatio \* 362. b.  
 Raucedo in venæ lue † 456. a.

Raude / triebende Raude † 525. a.  
 Raupen-Raue \* 449. a.  
 Recepta v. Formulæ.  
 Recidivarum triplex causa † 534. a.  
 Recidivæ ex victu largiori † 296. b.  
 Reconvalescentia spes unde concipienda \* 118.  
 Recrementa v. excrementa  
 Recrudescencia ulcerum unde † 534. a. b.  
 Re-elementatio \* 830. a.  
 Refectiva † 391. b.  
 Refrigerans Julepi \* 643. b.  
 Regionis temperata concursus ad corpulentiam \* 827. a.  
 Regnorum trium simplicia unde definienda † 3. a.  
 Reimblumen. 549. a.  
 Reinsarren. § 50. b.  
 Weiße Reinsarren. § 51. a.  
 Reissen in Gliedern † 509. b.  
 Reissen der Kinder im Leibe † 1075. a.  
 Reichstein \* 838. b.  
 Rejuvenescencia senum an possibilis \* 98. a.  
 Relollæ Paracelsi principia quid significant. 125. a.  
 Relollæ qualitates Helmontistarum \* 512. b.  
 Remedium quid. 146. a.  
 Remediorum divisio. 147. a.  
 Remediorum operandi modus. 140. b.  
 Remediorum efficacia varia unde \* 118. a. v. medicamentum.  
 Remedia parva magnorum morborum \* 806.  
 Remedia plurima longo usu experta dantur, quorum ratio haud æque certa \* 845. a.  
 Remedia inefficacia quæ & quo sensu dicantur. 855. a.  
 Remediorum vires nativæ qua ratione per Chymiam immutantur. 150. a. b.  
 In Remediorum compositione ad quæ attendendum. 151. a.  
 Remediorum abundantia & luxuria \* 616. a. b.  
 Remediorum defectus in medicina practica vulgari † 1. \* 78. a. specificorum & universalium usus \* 78. b. \* 79. a.  
 Omnia tentanda prius, quàm ad remedia generosiora abeamus \* 497. b.  
 Remedia optima quæ non secreta \* 678. b.  
 Subordinatio remediorum specificorum in febr. \* 205. a. usus ibid.  
 Remedia abomina bilia quæ. 855. a.  
 Remediorum lavigatio quomodo fiat. 856. a.  
 Exoticis remediis nimium non est tribuendum. 854. a.  
 Remediorum internorum in ventriculo immutatio qualis. 148. b.  
 Remedia martialia. vid. 07.  
 Remedia nutrita. vid. nutritæ.  
 Remedia purgantia quomodo operantur. 159. b. lq. 163. a.  
 Remedia resolventia cujus naturæ. 227. a.  
 Remedia. Specifica. vid. Specifica.  
 Inter Remedia sudorifera opium refertur antesignanum \* 556. a.  
 Remediorum sudoriferorum usus. 170. a. b. lq.  
 Vernacula remedia, quo pauciora adhibentur, eò meliora. 854. b.  
 Universalium remediorum usus \* 78. b. quæ dicantur \* 79. a. defectus † 1. a. v. Panacea.



## MATERIARUM PRAECIPUARUM:

- Remedia uſta, vid. uſta. Medicamenta.**
- Renum ſubſtantia,** 79. b.
- Renum officium,** 79. a.
- Renum conſenſus cum univerſis abdominis viſceribus \*** 179. a.
- Renibus amica** † 4. b. † 5. a.
- Renum abſtergens ſerum lactis** † 646. a.
- Renum calculus** ejusque cauſa † 631. b. eſt plerumque hæreditarium malum † 634. b. generandi modus & renaſcentia † 632. a. † 635. a. **Diagnosis & Symptomata** † 635. a. ſeq. **Prognosis** † 637. a. **Periodus, quam obſervat** † 637. b. **Cura** † 637. b. ſeqq. **cura præſervatoria** † 645. b.
- Renum calculus quomodo differat à nephritide** † 580. a.
- v. Nephritica.
- Renum dolor, v. Nephriticus dolor.**
- Renum fervor in gonorrhœa unde \*** 313. b.
- Renum imbecillitas veterum** † 652. a.
- Renum inflammatio & exulceratio, ejusque cauſa** † 579. b. **Diagnosis, Prognosis & cura** † 580. a. b.
- Decocta in Renum exulceratione \*** 653. a.
- In Renum exulceratione decoctum vulnerarium \*** 650. b.
- Renis ſinistri inflammatio quomodo differat ab inflammatione lienis** † 579. a.
- Renum obſtructione** † 181. b.
- Renum phlogoti & aſtui conveniens potus medicatus \*** 649. b.
- Renum ulcus ejusque cauſa cum diagnosi** † 581. b.
- Prognosis & cura** † 582. a.
- Renum vulnera an lethalia \*** 37. a.
- Reptilium venenoſitas \*** 461. a.
- Res non naturales ſex** 120. a. \* 714. b.
- variant e a ſin ſanguinis \* 79. b.
- quo ſenſum morborum Cauſa 179. b.
- Res p. n. quo ſenſu morborum Cauſa.** 180. a.
- Refina** quid. 26. b. 568. b. \* 562. a.
- Refina Copal, ejus uſus.** 581. a.
- Purgantium Refinae varia mala producentia \*** 158. a.
- Refinae purgantium copioſiores & moleſtiores faciunt purgationes \*** 130. a.
- Refinarum purgantium reſolutio \*** 130. a. \* 299. a.
- Reſolventia** † 4. b.
- Reſolvens Hydromel peſtorale \*** 651. b.
- Reſolventia potenter olea tartar, Philoſ. ſaponisve. &c.** \* 24. b.
- Respirationis onomatologia & Pragmatologia \*** 721. a. **Definitio \*** 721. b. bipartita, **Inſpiratione, Exſpiratione \*** 722. a. **Principia univerſa \*** 722. b. **Instrumenta & organa \*** 723. b. **Thoracis ſtructura in reſpiratione attendenda ejusque motus \*** 724. a. **Respirationis materia ær \*** 737. a. **cur ær inſpirando pulmones ſubeat \*** 738. b. **Loca, ad quæ ær in reſpirantibus pertingit \*** 743. b. **an membrana pulmones inveſtiens ærem in thoracis cavitatem ſub reſpiratione ordinaria transmittat \*** 748. b. (v. ær) **intercluſa an mortis cauſa \*** 751. a. **Respirationis humanæ uſus** 716. ſeq. \* 756. b. **reſpiratio ſub aqua \*** 766. b. **nexus Circulationis Sanguinis cum reſpiratione arctiſſimus \*** 768. a.
- Respiratio qualis motus dicendus.** 105. a.
- Respirationis poſſimum organon diaphragma, & ejus lætio in Hepatis inflamm.** \* 281. b.
- Respiratio prima multum habet in reſeſſu \*** 526. b.
- Respiratio abolita** † 189. a.
- Respiratio depravata** † 193. b.
- Respiratio difficilis in cachexia \*** 273. a.
- Respiratio difficilis in colica \*** 170. b.
- Respiratio difficilis ex convulſione muſculorum laryngis. \*** 189. a.
- Respirationis difficultas in febr. mal.** † 319. b.
- Anhelofa reſpiratio in inflat. ſtom.** \* 134. a.
- Respiratio difficilis in hydrope** † 439. b.
- Respiratio difficilis hypochondriacorum.** † 480. a.
- Respirationis difficultas in inflammatione hepatis** † 575. b.
- Respiratio difficilis mulierum** † 963. a.
- Respiratio difficilis poſt mentium emanſionem naturalem \*** 165. b.
- Respiratio difficilis in peripneumonia** † 564. b.
- Respirationis læſio in ſcorbuto** † 483. b.
- Respirationis difficilis in ſcorbuto cura** † 515. a.
- De Reſpiratione difficili ex tuſſi ſtom. cauſa & obſ.** \* 367. b.
- Respirationis conditio in pleuritide vera \*** 276. a.
- Respiratio inæqualis in pleuritide** † 565. a.
- Respiratio fœtus in utero \*** 749. b. v. fœtus.
- Respirationis uſus fœtus in utero \*** 753. b.
- Respiratio interrupta, ſuſpenſa, perversa in tuſſi infantum** † 224. a.
- Republica.** Earum mutationes ab aſtris prædictæ \* 445. b.
- Reſtauratio Naturæ, v. Natura.**
- Retropulſarum excretionum expulſio \*** 126. b.
- Rettych.** 518. b.
- Reviuſcentia animalium, & ſubmerſorum &c.** \* 768. b. ſeq.
- Revulſio veterum quid ? \*** 166. a.
- Revulſio eſt univerſalis & particularis** † 6. a.
- quid** † 6. b.
- Revulſio ſanguinis cui uſui** † 6. a.
- Rhabarbarum, ejus præparata & uſus.** 631. a.
- Rhabarbarum Monachorum cujus uſus.** 632. a.
- Rhabarbari uſus in iſtero** † 452. b.
- virtus laxativa & anodyna** † 135. b.
- uſus purgatorius** † 19. b.
- ejus duplex ſubſtantia ibid.**
- Rhagades in lue venerea** † 456. a.
- manuum ac pedum in lue Gall.** † 474. b.
- Rhapomicum, ejus differentia, præparata & uſus.** 520. a.
- Rheumatismi** † 679. b.
- Rheumatismi ſcorbutici** † 509. b.
- Rhinoceros cujus uſus in Medicina** 678. b.
- Rhodia Radix, ejus præparata & uſus** 519. b.
- Rhodum lignum, ejus præparata & uſus** 520. a.
- Rhodius.** Ejus ſcripta † 28. a.
- Rhumelis instrumentum loco peſſorum vaginæ uterinæ intrudendum \*** 327. a.
- Rhus cujus uſus** 520. b.
- Ribes, ejus differentia, præparata & uſus.** 521. a.

Ricinum

# INDEX UNIVERSALIS

*Ricinus* ejus differentia, præparata & usus. 632. b.  
*Ridicula* deliria † 356. b.  
*Rigiditas* Balneum in rigiditate \* 657. a.  
*Rigores* unde \* 573. a.  
 Rigor febrilis † 246. a. \* 234. a. quid \* 202. a.  
*Roma* abdominis gravidarum † 1005. b.  
*Rindes* Aug. 398. a.  
*Ringel* Blum. 406. a.  
*Rimus* epilepticus † 803. b.  
 Ritus melancholicorum † 864. b. \* 107. a.  
 Ritus ad pleuritidem disponens † 562. b.  
 Ritus Sardonius qualis convulsio † 802. b.  
 Ritus urinae incontinentiam concilians † 664. b.  
*Ritter* Eporn. 401. b.  
*Rob* usus hodiernus \* 634. b.  
*Roborantia*, vid. Confortantia.  
*Robur* unde \* 519. a.  
 Robur majus cur in Rustico, viris &c. quam mulieribus &c. \* 118. b.  
 Robur maniacorum † 877. b.  
*Robustior* constitutio quæ \* 215. b.  
*Röckeln* der asthmaticorum † 126. b.  
 Röckeln in tussi † 227. a.  
*Rodens* dolor † 745. b. † 750. a.  
*Rorella*, v. Ros.  
*Röckeln* † 343. a.  
 Ros majalis quid præstet. 713. a.  
 Ros Solis. Rorella, ejus præparata & usus. 523. a.  
 Rosa ejus differentia, præparata & usus. 521. a.  
*Rosmarinus* \* 246. a.  
 Rosmarinus, v. Erytipelas.  
 Rosmarinus, vid. gutta Rosacea.  
 Rosmarinus, 438. a.  
 Rosmarinus, 520.  
 Rosen-Wurzel. 519. b.  
*Rosmarinus*, ejus præparata & usus. 524. a.  
*Rossalia*, *Rossana*, qualis febris † 357. b.  
*Potatio* in vertigine † 794. b.  
*Rosula* quid, & quomodo præscribuntur \* 636. a.  
 Rotularum compositio 843. b.  
 Rotulae pro delicatis & pueris purgantes quomodo præscribantur \* 636. b.  
*Rubedo* faciei post mensium emanationem \* 165. b.  
 Rubedinis oculorum cura † 721. a.  
*Rubia*, ejus differentia & usus 525. a.  
*Rubinus*, cujus usus in Medicina. 725. a.  
*Rubores* faciei post pastum unde \* 120. a.  
 Rubor faciei, genarum in pleuritide † 564. b.  
 Rubor inflammationum † 535. a.  
*Rubrica*, ejus usus. 712. b.  
*Rubus*, ejus differentia, præparata & usus. 525. b.  
*Ructus* & eorum cura † 65. b. diff. ructuum † 66. b.  
 Ructus tetri ex cruditate nidiorosa \* 129. a.  
 Ructus ex frictione † 67. a.  
 Ructus post nauseam † 70. b.  
 Ructus in stomachi inflatione &c. \* 133. b.  
*Rudolphi* II. Cephalico-cordiacum † 391. b.  
*Rugæ* ventris puerperarum † 1044. a.  
*Ruhr*/rothe und weisse. † 126. b. † 156. b.  
*Ruhr*-Wurzel. 554. b.  
*Rübe*/Zaun-Wicht-Rübe. 617. b.  
 Zucker-Rübigen. 545. a.  
*Rüben*-Oehl. 519. b.  
*Rupicapra*, cujus usus in Medicina. 654. b.  
*Ruprecht*-Kraut. 435. a.  
*Ruscus*, ejus præparata & usus. 526. a.  
*Rustici* cur taro crassi & obesi † 394. b.

*Ruta*, ejus differentia, præparata & usus 526. b.  
 Rutæ usus in peste † 375. b.  
*Rutamuraria*, ejus usus. 527. b.  
 Rutæ, quid † 589. b.

## S.

*Sabina*, ejus differentia præparata & usus. 528. a.  
 Sabinæ præstans usus in potionibus vulnerariis \* 46. b.  
*Saccharata* acidum augent † 7. a.  
 Saccharatorum usus in phthisi † 401. b.  
*Saccharum* quid, ejus præparata & usus. 597. a.  
 Saccharum est concretum tartarico-salinum. 256. a.  
 Sacchari usus noxius \* 637. a.  
 Sacchari abusus in pulveribus \* 131. b.  
 Saccharum fugiendum in omnibus morbis † 205. a.  
*Saccharum Saturni* quomodo solvatur \* 315. b.  
*Sacculi*, eorum usus. 845. b.  
 Sacculos præscribendi ratio \* 655. b.  
*Sagittaria* canum. \* 805. b.  
 Sagacitas communicata per ideas semini. \* 799. b.  
*Sagapenum*, ejus præparata & usus 599. a.  
*Saginata* considerata \* 824. b.  
*Sal* quid & quotuplex. 246. b. seq.  
 Sal quid Hippocrati dicatur. 246. b.  
 Salium varietas \* 516. b. eorum potentia ex quo radicaliter dependeat \* 517. a. mutua salium in se actionis ratio \* 517. a.  
 Salia duo fundamentalia \* 516. b.  
 Salia essentialia quid. 859. b.  
 Salia particulae inter activas primatum obtinent. 11. a.  
 Salia quomodo fiant causa fermentationis, putrefactionis, effervescenz &c. 18. a. b.  
 Salia cum aquosis magnam habent convenientiam, cum oleosis autem seu sulphureis inimicitiam. 256. b.  
 Sal commune quid, ejus differentia, præparata & usus. 256. b. seq. 792. a. — 794.  
 Sal commune quotuplex. 256. a.  
 Salium proprietates \* 490. b.  
 Salium liquabilitas. 859. a.  
 Salia quomodo specificanda. 859. a.  
 Sal naturæ corporis H. seminale in statu s. n. auctor sanitatis, in statu p. n. morborum. 21. b.  
 Salium vitia in succis corporis animalis † 241. a.  
 Salia quomodo in corpore peccant \* 804. b.  
 v. acidum, acris &c.  
 Salia chymica quotuplicia, eorum compositio & usus 838. a.  
 Salium acidorum vegetabilium vis in transmutando. 248. a.  
 Sal commune universale. vid. Sal.  
 Salia Alcalia quæ dicantur. 249. a. b.  
 Salium alcalifactorum natura \* 131. b.  
 Sal ammon. purificatio. 930. b.  
 Salia animalium, vid. Animal.  
 Sal diaphor. vid. diaphor.  
 Sal fixum quid. 247. b.  
 Salia fixa abundant in Vegetabilibus, in animalibus vel mineralibus autem sunt rariora. 248. b.  
 Salia fixa Vegetabilium quo sensu possunt ex oleis deduci. 248. b.

Stof.

## MATERIARUM PRÆCIPUARUM:

- ☉ fossile f. Gemmæ in quo convenit vel differt à ☉ communi. 794. b.  
 ☉ Gemmæ quid, ejus usus & præparata. 258. a.  
 ex ☉ gemmæ balsamum efficiendi modus. 794. b.  
 ☉ marini usus & fiendi modus. 256. b.  
 Sal Martis compositum \* 126. a.  
 Menstrua ☉ina. 262. a.  
 ☉ mirabile Glauberi, ejus compositio. 865. a.  
 ☉ tertium sive falsum unde. 249. a.  
 ☉ ☉sum tertium emergit ex ☉do & ☉oso. 14. b.  
 ☉ ☉sum facillè potest sociari ☉do & alcali. 15. b.  
 ☉is ☉si tertii fiendi modus. 15. b.  
 ☉ ☉sum quoduplex. 249. a.  
 ☉ ☉sum est triplex. 15. a.  
 Salia sicca quomodo reddant spiritum humidum. 256. a.  
 Salia theriacalia quæ. 908. b.  
 Sal tartari vegetabilium corrector universalis \* 845. a.  
 Salia vegetabilium, vid. vegetab.  
 Sal volatile quid. 247. b.  
 Salium volatilium usus polychrestus quomodo probatur. 226. a.  
 Salia volatilium cæteris medicamentis sunt potentiora \* 490. b.  
 Salia volatilium in cura morborum infantilium primatum obtinent \* 546. a.  
 Salium volatilium aromaticorum præpar. & usus \* 633. a.  
 ☉ volatile fuliginis, vid. fuligo.  
 Salia volatilium è lignis &c. \* 562. a.  
 ☉ volatile oleosum. 335. b.  
 Saliam volatilium oleosorum usus † 5. a.  
 Sal volatile oleosum & acre minuentia & augmentantia † 8. a.  
 Sal ☉æ, vid. Urina.  
 Sal volatile urinæ multi usus \* 79. a.  
 Sal urinosum quid. 247. b.  
 Salia ☉osa fixa volatilium sunt tantum artificialia. 14. a. b.  
*Salacitas nimia*, ejus causæ, diagnosi, prognosis, cura † 920. a. b.  
 Salacitas mulierum † 954. a.  
 Salacitas vitæ brevis causa \* 89. b.  
*Salinarum facultatum* Hippocratica assertio \* 514. a.  
 Salinarum particularum primatus in simplicibus † 3. a.  
 Salina natura spirituum in animalibus \* 796. a.  
 Salinus spiritus elutus in stomacho † 40. a.  
*Salivæ origo* est à glandulis salivalibus. 52. a.  
 Saliva naturaliter ferè insipida \* 515. b.  
 Salivæ ratio semper habenda in vitiis stomachi † 312. b.  
 Saliva quem habeat usum. 51. b. seq.  
 Saliva deglutiri solita, quid conferat alimentis digerendis. 57. a.  
 Salivæ vis fermentativa \* 84. b.  
 Salivæ vitia in siti corrigenda quomodo † 45. b. defectus † 46. b.  
 Salivalis lymphæ defectus, ad sitim disponens \* 129. b.  
 Salivæ exspitio in contagio † 321. a.  
 Saliva viscida in febr. lymphat. \* 233. b.  
 Salivæ exspitio in peste † 364. a.  
 Salivæ visciditas in variol. & morbil. † 355. a.  
 Salivæ usus medicus. 52. a.  
 Salivæ infantum effusio largior \* 542. b.  
 Saliva canis rabidi \* 800. a.  
*Salivationes* particulares quid & quomodo conferant. 172. a. b.  
 Salivationis universalis mediante ☉ origo 171. a. usus ib.  
 In Salivatione ☉ adhibendi modus. 171. b.  
 In Salivatione ☉ii operandi modus. 172. a.  
 Salivationis fœtor cadaverosus quid indicet \* 830. b.  
 Salivationis usus in apoplex. † 838. a.  
 Salivationis usus in corpulentia nimia \* 829. b.  
 Salivationis usus in epilepsia † 812. a.  
 Salivatio in hydrope † 436. b.  
 Salivatio infantum \* 189. b.  
 Salivatio maniacorum † 882. a.  
 Salivationis usus in affectibus podagr. † 784. b.  
 Salivationis usus in furditate † 739. a.  
 Salivationis usus in lue venerea † 459. b. \* 115. b. \* 316. a.  
 Salivationis in lue venerea modus triplex \* 316. a. Symptomatum cura ibid. b.  
 In nimia salivatione gargar. \* 661. a.  
 Salivationem adjuvantes pilulæ, pro externo usu \* 639. b.  
*Salix*, ejus usus. 528. b.  
*Salmuthi* scripta † 28. a.  
*Salsedo* spirituum \* 811. b.  
*Saltatio* abortus causa † 1011. a.  
 peripnevmoniam inducens † 561. b.  
*Salus* deorsum gravidis nocet † 995. a.  
*Salvælla* sectio in manu in passionibus hæmorrhoidalibus an quid in recessu habeat \* 167. b.  
*Salubris status* fundamentum \* 489. b.  
*Salvia*, ejus præparata & usus. 529. a.  
*Salus proximi* prima medici lex \* 677. b.  
*Sambucus*, ejus præparata & usus. 529. b.  
 Sambuci vires † 334. b.  
 Sambuci Cortex, ejus usus. 874. b.  
 Sambuci julorum usus vomitorius † 11. a.  
 Sambuci usus in peste † 370. b.  
*Sandaracha* Arabum, Græcorum, cui usui \* 835. a.  
*Sanguificatio* quid. 62. b.  
 an à corde vel ipso sanguine peragatur. 39. b. seq.  
 Sanguificatio quomodo absolvatur. 63. a. b. seq. in fœtu 64. a.  
 Sanguificatio quomodo læditur. 65. a. † 241. a.  
*Sanguinea partes* affectæ facilius curantur à chirurgo, quam nerveæ \* 1. b.  
*Sanguinei* qui \* 309. b.  
*Sanguis*. Ejus vera materia. 66. b.  
 In sanguine quæ consideranda \* 94. a.  
 Massæ sanguineæ status in quo consistat. \* 118. a.  
 Crasis sanguinis est duplex. 65. b.  
 Sanguinis crasis per totam vitam immutabilis \* 93. b.  
 Sanguinis crasis læsa † 241. a. seqq.  
 Sanguinis crasis unde vitietur † 427. a.  
 Quilibet singularem & sibi peculiarem obtinet massam sanguineam † 241. a.  
 unde hæ crases, syncrasis, idio syncrasis & proprietates dependant. ibid.  
 Idiosyncrasis sanguinis specialis probata \* 92. a. v. Crasis.  
 Ex sanguine & lymphâ dependet corporis totius sanitas † 311. b.



# INDEX UNIVERSALIS

Sanguinis aciditas & oleum \* 143. b.  
 Sanguinis acrimonia unde \* 110. b. commodius per dietam corrigitur \* 110. b.  
 Calor in sanguine unde. 39. a.  
 Mutua conspiratio massæ sangv. & viscerum \* 94. a. quænam harum partium alteri præmineat. ibid.  
 Naturæ institutum circa sanguinem \* 96. a.  
 Sanguinis usus multiplex \* 95. a.  
 Sanguinis distinctioni venosum & arteriosum † 103. b.  
 Sanguis arteriosus quomodo differt à venoso. 68. a. b.  
 Sanguine venosò arteriosò factò, unde subita ejus exaltatio. 64. b.  
 Sanguinis tinctura † 444. b.  
 Sanguinis rubedo unde \* 152. a.  
 Massæ sangvineæ depuratio \* 127. a.  
 Sanguis quale nutrimentum \* 110. a.  
 Sanguis quâ ratione partes corporis nutriat. 69. a. b.  
 Sanguis quomodo vitæ principium dicendus. 56. b.  
 Sanguis vitæ thesaurus, & ejus excretiones, menstruatione excepta, sunt præternaturales \* 109. a.  
 Sanguis quomodo origo spirituum vitalium dicendus. 38. b.  
 Sanguinis præsentia non est vitæ fundamentum, sed ejus spiritualiscentia \* 110. a.  
 Sanguinis varietas ratio ætatis. 143. a. b.  
 Sanguis relictis vasibus corporis cor primariò occupet partes corporis \* 166. a.  
 Sanguinis abundantia, & nimia fluxilitas † 668. b.  
 Sanguinis ætulum refectum est ephema polychæntum \* 641. a.  
 Sanguinis alteratio unde \* 112. a.  
 Sanguinis attenuatio à nimio motu, & coagulatio à potu frigido † 229. b.  
 Sanguinis ad cerebrum iter. 86. b.  
 circulatorius sanguinis modus an veteribus cognitus \* 85. a.  
 Sanguinis circulatio cujus est usus. 68. b.  
 Sanguinis circulationis nexus ætissimus cum respiratione \* 768. a.  
 Sanguinis circulationem accelerans & immutans V. S. † 240. a.  
 Sanguinis circulationem promovens spiritus. \* 320. a.  
 Sanguis ad motum circularem ineptus & grumescens est duplici modo † 533. b.  
 Anxietas ex impedito sangv. circulo \* 134. a.  
 Sanguinis circulatio fœtus in utero \* 753. a. b. vid. fœtus.  
 Sanguinis coagulatio, & fluiditas, excepti à spiritali tali vel tali \* 153. a.  
 Sanguinis coagulum solventia \* 498. a.  
 Sanguis venâ sectâ non congrumescens, malus † 324. a.  
 Sanguinem congrumatum resolvens † 240. b. † 603. a. \* 287. a.  
 Sanguis an corpulentæ causa \* 823. b. \* 824. a.  
 Sanguinis diarrhœa † 104. a.  
 Sanguinis extravasatio in peculiarem corporis cavitatem † 599. b. quatum tres præcipuæ † 600. b.

Sanguis extravasatus & congruatus cum cerebro compressione an lethaliatem inferat \* 27. b.  
 Sanguinis fermentatio, volatilisatio in spiritus, restauratio per chilum, depuratio, ebullitio, effervescencia † 248. b.  
 Sanguinis debitam fermentationem restituit infusio \* 499. b.  
 Judicium de sanguine ex intestinis profluente in dysenteria \* 157. b. item ex naribus ibid.  
 Sanguinis extravasati signa diagnostica, quo loco stabuletur sanguis extravasatus, congruatus, corruptus † 600. b. seq.  
 Sanguinis varii ex corpore effluxus. 153. a. b.  
 Sanguinis fermentatio læsa † 241. a. ejus Diagn. Prognosis, cura † 242. a. b.  
 Sanguinis incallescencia in febr. \* 204. a.  
 Sanguinis missionis effectus duplex, indicium, † 6. a.  
 Sanguinis emissio quæcunque in febribus noxia \* 103. a.  
 Sanguinis motus duplex, circulans totius massæ seu localis & intestinus, seu fermentativus particularum † 5. b. † 6. b.  
 Observanda medico circa circulatorium motum † 5. b.  
 Sanguinis motus per corpus 67. a.  
 motus per pulmones 70. a.  
 motus in fœtu. 70. a.  
 extra vasa motus † 607. b.  
 Sanguinis motus & rapus ad aures † 740. b.  
 Sanguinis motus ad cerebrum quomodo aperitur † 828. b.  
 Sanguinis ad renes appulsus † 625. a.  
 Sanguinis motus ad corporis circumferentiam læsus † 699. a. b.  
 Sanguinis motus impeditus ob respirationem impeditam \* 189. a.  
 Sanguinis ex corde in partes motus læsus † 379. a. seqq.  
 Sanguinis vitis in phthisi, unde cognoscenda † 398. b.  
 Sanguinis profluvium, v. hæmorrhagia.  
 Sanguis in varicibus apertis quomodo sistendus \* 34. b.  
 Sanguis loturæ carniū similis in uteri irritatione \* 328. a.  
 Sanguinis excretiones unde † 141. a.  
 Sanguinis excretio nimia atrophiam inducens † 395. a.  
 Sanguinis excretiones in cholera \* 153. a.  
 Sanguinis dejectiones in febr. mal. † 327. b.  
 Sanguinis rejeçtio non semper ex pulmonibus † 400. a.  
 Sanguinis ex partibus refluxus vitiatas † 532. a.  
 Sanguinis secretus in inflammatione hepatis † 575. b.  
 Sanguinis spumofitas unde \* 744. b.  
 Sanguinis sputum † 620. b. pars affectat causa, Diagn. † 621. a. b. differentia † 621. b. Prognosis † 622. b. Cura † 622. b.  
 De sanguinis sputo casus & obs. \* 341. a. v. sputum.  
 Sanguinis stagnatio, emissio, &c. † 6. a.  
 Sanguinis in parte quadam stagnatio † 532. a.  
 Sanguinis stagnatio in pulmonibus &c. † 249. a. venæ sectione impedita † 240. a.

## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Sanguinis stagnatio multorum morborum causa* \* 108. a.
- Sanguinis & aëris* † 238. b. *eius causa* † 239. b.
- Diagnosis, Prognosis, cura* † 240. a. b.
- Sanguinis suffusio, v. Suffusio.*
- Sanguinis transfusio, v. Transfusoria chirurgia.*
- Sanguinis vitia morbosa an Transfusio corrigat* \* 99. a.
- Sanguinis transudatio per vasorum tunicas an detur* † 608. a.
- Sanguinis vomitus, v. vomitus.*
- Sanguini conducentia* † 4. b.
- Sanguinem attenuantia & fluidum reddentia* \* 143. b. † 240. a. † 241. b.
- Sanguinis dileratiam temperantia, eundemque renovantia* † 315. b.
- Sanguinem sistentia remedia* \* 49. a. \* 286. b. in amputatione membri \* 77. b.
- Sanguis draconis.* 344. a. *cujus usus.* 599. b.
- Sanguinis draconis adulteratio quomodo cognoscenda* \* 159. a.
- Sanguis Hirci, vid. Hircus.*
- Sanguis humanus examinatus* 348. a.
- Sanguinis humani usus in epilepsia* † 815. a.
- Sanguinis humani haustus noxius* \* 113. a.
- Sanguisorba, ejus præparata & usus.* 532. a.
- Sanicula, ejus præparata & usus.* 532. b.
- Saniei generis* \* 108. b.
- Sanies & pus sunt effectus tantum & productum ulceris* \* 56. b.
- Saniei differentia à pure* \* 180. b. vid. pus.
- Sanitas quid.* 118. a.
- Sanitatis fundamentum & unde dependeat.* † 79. b. † 311. b. \* 90. a. \* 489. b.
- Sanitatis Conservatio ex Hippocrate.* 142. b.
- Sanus status quomodo cum ægro conspiret.* \* 95. b.
- Sanitatis studium quod.* \* 818. a.
- Sanitatis læsio unde* \* 519. a.
- Santalum lignum, ejus præparata & usus.* 533. a.
- Santonicum, ejus præparata & usus.* 533. b.
- Sapa vomitoria* † 12. a.
- Saphena apertio in hæmorrhoid. cæcis dolentibus &c.* \* 166. a.
- Sapphirus, ejus usus in Medicina.* 725. a.
- Sapientia hominis ab aëre* \* 782. a.
- Cingulum sapientie seu Mercuriale Rulandi,* \* 271. b.
- Saponaria, ejus præparata & usus.* 534. a.
- Saponis oleum præparandi modus ad usum colicum* † 171. b.
- Saporis consideratio in sensu Hippocratico* \* 514. a. seqq.
- Sapores sunt milleformes* \* 180. a.
- Saporum diversitas & differentia unde* 100. a. b. \* 82. a. \* 490. a.
- Sapores male judicantur lingua & gustu* † 642. b.
- Sapore simplicium efficacia male judicatur* \* 346. a.
- Sapores ingrati ex crudis. nidorosa* \* 129. a.
- Sapor ex ulcere pulmonum, oris* † 397. b.
- Sapor dulcis in ore hæticorum phthysicorum,* \* 164. b. \* 167. b.
- Sapores falsi in corpore* \* 514. a.
- Sapor succorum varians unde* \* 151. a.
- Sarcocolla, † 906. b. ejus causa, diagnosis, prognosis, cura* † 907. a. b. seqq.
- Sarcomatis affectus, causa, cura Chirurg.* \* 28. a. b.
- Sarcocolla, ejus usus.* 599. b.
- Sarcotica quæ in vulneribus* \* 44. a. in ulceribus \* 57. a. balsamica, facientia & cicatrisantia tantum gradualiter differunt \* 57. b.
- Sarsaparilla, ejus præparata & usus.* 534. b.
- Sassafras Lignum, ejus præparata & usus.* 534. b.
- Saturantia, præcipitantia* \* 589. a. v. Absorbentia, præcipitantia.
- Satureja, ejus præparata & usus.* 535. b.
- Saurina ubi prolixi l. noceant.* 1010. b.
- Emplastrum Saturninum Catholicorum.* 1011. b.
- Saturnus chirurgorum patronus* † 244. a.
- Chirurgie hodiernæ quarta columna* \* 666. b.
- Saturni operatio, præparata & usus.* 300. a. b. 305. b. seqq.
- Saturni usus antipestilentialis* † 371. a. &c.
- Satyriasis quid, unde dicta &c.* † 920. b. qualis convulsio † 802. b.
- Satyriasis mulierum* † 954. a.
- Satyriasmus qualis affectus &c.* † 522. a.
- Saxys usus veneris* † 900. b. vid. Orchis.
- Sau-Brod.* 437. a.
- Sauss. Spiritus. Sauss. pillen* \* 813. b. \* 816. b.
- Sausen und Brausen der Ohren.* † 739. a.
- Saxifraga, ejus differentia & usus.* 536. b.
- Scabiei consideratio* \* 123. b. v. Cutanex affectiones.
- Scabiei qualitas* \* 314. b.
- eius subjectum, divisio, Diagnosis, Prognosis, cura* † 518. a. seqq.
- Scabies cur contagiosa.* \* 54. b.
- De Scabie casus & observ.* \* 437. b.
- Scabies tempore pestis salutaris* † 361. b.
- Scabiosa cachexia ad hydropem inclinans* \* 266. a. \* 269. a.
- Scabiei ferina & ad lepram tendentis cura* \* 272. a.
- Epithema in scabie ferina* \* 641. a.
- Pilula contra Scabiem ferinam* \* 638. a.
- De scabie fœda casus & observ.* \* 337. a.
- Scabies Gallica* † 455. b.
- Scabies Gallica quomodo curanda* † 477. a. b.
- Scabies genitalium muliebr.* † 955. a.
- Scabiei maculas in manu & pustulas tollens lotio* \* 656. b.
- Pruritus scabiei, ejus causa, Diagnosis, Prognosis, cura* † 521. b.
- Scabies quomodo retropellatur* \* 124. b.
- Scabiei retropulsæ cura* \* 272. a.
- Scabiei retropulsæ symptomata* † 245. a.
- Symptomata tam periculosa in scabie retropulsæ unde* \* 125. a.
- Scabies suppressa asthma inducens* † 109. a. † 103. a.
- Scabies retropulsæ, picam inducens* \* 123. b.
- Scabiosis nil conducit sangu. transfusio* \* 114. b.
- Balneum in scabie* \* 656. a.
- Lotionum usus in scabie* \* 718. b.
- Unguentum contra scabiem* \* 663. b.
- Scabiosa, ejus differentia, præparata & usus.* 537. a.
- Scammonium, ejus præparata & usus.* 641. b.
- Scammoni correctio per alcali.* 337. a.
- Scammomi usus in crudis. nidor.* \* 110. b.

# INDEX UNIVERSALIS

*Scammonii* usus purgatorius † 20. a.  
operandi modus ibid.  
*Scapularum* consideratio \* 714. b.  
*Scapularum* dolor ex cardialgia † 82. b.  
*Scarabaeus Cornutus*, Pilularis, & unctuosus cuius usus in Medicina 708. a.  
*Scarificationes* cui usus † 6. a.  
    Usus in apoplexia † 834. a.  
    Usus in arthrit. † 778. b.  
    Usus in Cephalalg. † 768. b.  
    Usus in faucium inflammationibus † 543. a.  
*Scarificatio* crurum in hydropse † 457. b.  
*Scarificationum* usus in lepra † 524. a.  
    Usus in mensibus suppressis † 933. a.  
    Usus in obesitate \* 836. a.  
    Usus in palpit. cordis † 384. a.  
    Usus in tabie à mortu animalis venen. † 891. b. v. Cucurbitulae.  
*Scarlatina* febris, v. febris Scarlatina.  
*Scelagyris* Plinii † 478. a.  
*Schaaff-Garbe*. 485. b.  
*Schaaff-Zusten*. \* 225. a.  
*Schaaffs-Blattern*. † 345. b.  
*Scharbocks-Araut*. 419. b.  
*Scharbocks-Träncke*. v. Scorbutus.  
*Scharlach*. *Garben-Scharlach*. 462. b.  
*Scharlach-Fieber*. † 337. b.  
*Schart*. 543. a.  
*Scheißwurz*. 617. b.  
*Schierling*. 424. b.  
*Schimmel* unde \* 84. b.  
*Schlaffung*. 438. a.  
*Schlag*. qualis affectus † 824. b.  
*Schleen*. 277. b.  
*Schleen-Dorn*. 514. a.  
*Schlig-Bruch* in vulnere scelopetorum \* 47. a.  
    in fractura ossium \* 70. b.  
*Schlüssel-Zümmel*, *Peter-Schlüssel*. 513. b.  
*Schlüssel-Blum*. 513. b.  
*Schmack*. 520. b.  
*Schmarzen* der Kinder an der Brust. † 1092. a.  
*Schnupffen* ejusque cura † 687. a.  
    Ob er gesund \* 228. a.  
*Schöllkraut* (großes) 418. a.  
*Schananthum* cuius usus. 537. b.  
*Schola Salernitana* origo. 30. a.  
*Schooff*. Die Geburt senckt sich nach dem Schooffe. † 1008. a.  
*Schwämmchen* / aphthae, earumque cura \* 549. b.  
*Schwämme* auff der Kinder Zungen † 1025. b.  
*Schwalbenwurz*. 418. a.  
*Schwarzdorn*. 277. b.  
*Schweiß-Tränck*. \* 652. b.  
*Schwere Noth* oder Gebrechen. \* 980. a.  
*Schwere Noth* innerlich oder im Leibe † 389. a.  
    † 804. a. \* 181. b.  
*Schwere Noth* äußerlich ausbricht. † 804. a.  
    \* 181. b.  
*Schwere Noth* des Kindes. vid. Epilepsia infantum.  
*Schwindel-Kraut*. 441. a.  
*Schwinden* cum cura † 344. b.  
*Schwindelsucht*. † 324. a.  
    Schwindelsüchtig Darm-Fieber. † 304. a.  
*Schwindung* der Glieder. † 394. a.  
*Scimus naturalis* promovenda ergo infirma loca.

*Scimus* cuius usus in Medicina 709. a.  
*Scintillationes* in visu laeso † 718. a.  
*Scorbis* quid, ejus sedes, causa, differentia, Prognosis, cura chirurgico-medica \* 24. a.  
    leqq. facile in cancerum abis, quomodo tunc obviandum \* 25. a.  
*Scirrhi* unde nascantur † 182. a.  
*Scirrhus* mammarum † 1056. b.  
*Scelopetorum* subura, an in his etiam arder solent & calor cum globo parti laesa communicatur \* 47. a. eorum cura \* 47. a. quid si superveniant dolores ossium in profundo \* 47. b. quid si suspicio huius ossium ibid.  
*Scelopendrium*, ejus differentia, preparata & usus. 537. b.  
*Scorbuti* consideratio † 478. a. ejus causa † 481. b. ejus multiplicatio per contagium † 482. b. disponentes ad eum causa † 485. b. Differentia & divisio † 486. b. Diagnos. & Prognosis † 487. a. b. Cura † 489. a. leqq.  
De Scorbuto casus & observ. \* 355. a. \* 375. b. \* 376. a. \* 384. b. \* 383. b. † 385. b. \* 403. b. \* 406. b. 430. b.  
De Scorbuto termin. \* 364. a. \* 368. a.  
*Scorbutici* doloris differentia † 156. a. † 159. b. cura † 168. b.  
Casus & Observatio de Scorbuticis doloribus 391. a.  
*Scorbutici* doloris artuum \* 359. b.  
Infusum ad dolores fixos scorbuticos artuum \* 654. a.  
*Scorbutica* febris, v. febris scorbutica.  
*Scorbutus* febrem colligativam inducens † 287. b.  
*Scorbuticorum* palpitatio cordis &c. † 381. b. leqq.  
Anti-Scorbutica quae 951. a.  
Balneum in scorbuticis affectibus \* 657. a.  
*Scorbuticis* non confert chirurgia transfusio \* 103. a.  
Anti-scorbuticum decoctum \* 651. a. \* 653. b.  
*Scorbuticorum* digesta lactea \* 652. a.  
*Scorbuto* medetur infusio \* 504. a. \* 647. b.  
Mixture anti-scorbutica. 443. b. \* 641. a.  
Potio in doloribus Scorbuticis \* 306. b.  
Contra scorbutum potio purgans \* 649. b.  
*Scorbutico* dolori crurum conducens balneum \* 657. b.  
*Scorbuti* gingivarum prognos. † 488. b.  
*Scorbutus* oris † 32. a. leqq.  
Contra scorbutum oris gargarismus \* 660. b.  
Unguentum contra scorbutum oris \* 664. a. vid. oris scorbutum.  
*Scorbutum*, ejus preparata & usus. 538. a.  
*Scorpio* cuius usus in Medicina 709. a.  
*Scorpi* ictus quater venenatus \* 801. a.  
*Scorpionum* punctura inflicta vulnus \* 49. a.  
*Scorpionum* se horum multis ictibus transigunt \* 493. b.  
*Scorpioides* fructus. \* 449. a.  
*Scorpiura*, ejus preparata & usus. 538. b.  
*Scorpiura* quid † 794. a.  
*Scorpiura*, ejus preparata & usus. 538. b.  
*Scorpiura* quid † 794. a.  
*Scorpiura* quid † 794. a.  
*Scorpiura* quid † 794. a.



## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

*Screatus* in tussi † 126. a.  
*Scrophula*. Earum causa, locus affectus, differentia, cura chirurgica \* 21. b. seqq.  
*Scrophulae* mammarum † 1057. b.  
*Scrophularia*, ejus præparata & usus. 539. a.  
*Scrotum* † 172. b. Scrotalis hernia ibid. & seq.  
 Scroti apertio in hydrope † 437. a.  
 Scroti gangraena ab ejus apertione in hydrope † 437. b.  
 Scroti hernia infantum † 1084. b.  
 Scroti tumor ejusque cura † 903. a. Suppuratio ibid.  
 Scroti tumores herniosi † 904. a.  
 Scroti tumor in hydrope † 426. a. cura † 440. b.  
 Scroti tumor aquosus infantum † 1085. b.  
 Scroti ulcerum in hydrope cura † 442. a.  
 Cataplasma in scroti pruritu, & rosione sensibili \* 658. b.  
 Scroti sphacelati in variolis separatio & restitutio \* 78. a.  
 ad Scroti Tumorem Cataplasma 445. b.  
 Fetus pro scroto intestinis repleto \* 655. b.  
*Scutum* quid? \* 632. a.  
 Scuta præscribendi ratio \* 664. b.  
*Scylla*, ejus præparata & usus. 540. a.  
*Sebesten*, ejus præparata & usus. 540. b.  
*Secale*, ejus præparata & usus. 541. a.  
*Secessus* copiosi ob prostratam vim animalem in systemate nervoso \* 134. b.  
 Secellum promovens opium \* 568. a.  
*Secreta* (v. singularia) quid. \* 667. a.  
*Secundina* quid. 115. a.  
 Secundinae post abortum excretio † 1015. a.  
 Secundinarum tarda separatio uterum irritans \* 328. a.  
 Secundinae retentio ejusque causa † 1028. a. b. ejus causa † 1028. b. Diagnos. prognos. † 1029. a. Cura † 1029. b.  
 Secundinarum retentioni proficua sternutatio † 216. b.  
 Secundinas recentes comitans febris lenta † 310. a.  
 Secundinae humanae usus anti - epilepticus † 815. a.  
*Sedentaria vita* anorexiam inducens \* 122. a.  
 Sedentaria vita maciei causa \* 829. b.  
*Sedes* promovens opium \* 568. a.  
*Sedum*, ejus præparata & usus. 541. a.  
 Sedi minoris usus vomitorius † 11. a.  
*See, Blume*. 496. a.  
*Segetes* abortum potendens † 1012. a.  
*Saffen, Kraut*. 534. a.  
*Seminalis* vis in quo consistit. 23. a.  
 Seminales virtutes rerum ignis acidum invertit, resolvit \* 113. a.  
 Seminalium idearum natura \* 799. b.  
 Seminale vitæ principium in sanguine \* 79. b.  
*Semen* quid? 107. b.  
 Semen triplex differentia. 323. a.  
 Semina quoad producta chymica quomodo differant. 371. a.  
 Seminis vis vitalis \* 90. a.  
 Seminis spiritus concentratus \* 90. b. \* 91. a.  
 Semen oleosorum vis nutritiva \* 827. b.  
 Semina plantarum considerata \* 789. a. b.  
 Semen vegetabilium vitalitas \* 769. a.

Semina quatuor calida majora in colica apprimè conducunt † 168. b.  
*Seminis* animalium consideratio \* 789. a. b.  
 Seminis animalium spirituositas \* 795. b.  
 Seminis officina sunt testes. 107. b.  
 Seminis defectus & insufficientia † 897. a. ejus causa ibid. Diagnos. Prognos. † 899. a. b. Cura † 899. b. (v. genitura.)  
 Semen genitale augmentans lac muliebre \* 927. b.  
 Seminis emissio citra coitum in viris & mulieribus † 909. a. b.  
 Semen mulierum an detur. 108. b.  
 Semen muliebre an in testibus elaboretur † 948. a.  
 Seminis virilis materia. 108. b.  
 Seminis virilis concursus ad conceptionem \* 790. b.  
 Semen virile totum corpus muliebre alterat. 112. b.  
 Seminis virilis laesa generatio † 897. a.  
*Semina* præscribendi ratio \* 656. a.  
 Semicupiorum usus in mentibus suppressis † 932. b.  
*Senecio*, ejus Usus. 542. b.  
*Senectus* quo sensu morbus dicenda. 118. b.  
*Senes* cur agrippi † 703. b.  
 Senibus juveniles vires restituens transfusio \* 97. a.  
 Electuar. pro senibus in metu apoplexiæ \* 635. b.  
**Senff / Wege: Senff oder wilder Senff.**  
 444. a.  
 Roether Senff. 544. a.  
 Weisser Senff. 544. a.  
*Senna*, ejus præparata & usus. 633. a.  
 Sennæ Alexandrinæ foliorum usus purgatorius † 16. a. Vis operandi & modus utendi † 16. b.  
 Sennatorum usus in crudelitate nidorosa \* 131. a.  
*Sennertius* & ejus scripta † 27. a.  
 Sensatio externa quomodo fiat. 90. a. b. seq.  
 Sensatio externa an consistat in motu. 92. b.  
 Sensibilis constitutio quæ \* 215. b.  
 Sensibilitatem nervosi systematis nimiam sistens † 26. b. imminutam corrigentia ibid.  
 Sensus quid dicatur. 16. a. b.  
 Sensuum operationes unde \* 90. a.  
 Sensus communis quid. 102. b.  
 Sensus instrumentum † 26. a. externi, interni ibid.  
 Sensus externorum constitutio † 901. a.  
 Sensus externi quot. 91. b. 93. a.  
 Sensus externi quo sensu plures quam quæque possint dici. 92. a.  
 Sensus externi perceptioni naturalium non semper æque sufficiens \* 792. b.  
 Sensus internorum varietas unde. 103. a.  
 Sensus internorum operationes ab Animatione rationalis operationibus intellectualibus cur sint inseparabiles. 103. b. seq.

# INDEX UNIVERSALIS

- Sensus interni** cur adeo cognitu difficiles. 102. a.  
**Sensuum internorum** corporum unde † 833. a.  
**Sensus laesiones** † 700. a. b.  
**Sensus externi & eorum organa** quomodo laedantur † 718. a. † 798. a.  
**Sensus cessatio** subitanea \* 181. b.  
**Sensus & motus** deletus in quibusdam membris, l. toto corpore, capite l. reliquis salvis † 824. b.  
**Sensuum hebetudo** unde † 387. b.  
**Sensuum defectus** v. lipothymia.  
**Sensuum interitus** unde \* 90. a.  
**Sensuum organa** laesa hydrocephalo † 696. b.  
**Sensuum stupor** subitaneus † 219. b.  
**Sentiendi virtus** unde \* 782. b.  
**Separatio ex liquido** duplex \* 126. b.  
**Separationis & coctionis** consideratio \* 247. a.  
**Separatio membrorum**, v. amputatio.  
**Sepia** cujus usus in Medicina 697. a.  
**Ossa Sepia**. 354. a.  
**Sermo**, v. vox.  
**Serosa Cacoehymia** remedia † 9. a.  
**Serpens** cujus usus in Medicina. 679. a.  
**Serpentum venenositas** \* 461. a.  
**Serpentis morsus**, v. Morsus.  
**Serpigo** † 524. b. ejus causa, prognosis, cura † 525. a.  
**Serpiginis infantum** cura \* 272. a.  
**Serpigines** luis Gallicae quomodo curentur † 477. b.  
**Serpillum**, ejus preparata & usus. 542. b.  
**Serratula** cujus usus. 543. a.  
**Serum sanguinis vehiculum** † 612. b.  
**Seri lactis** usus in febr. † 299. a.  
**Serum falsum ulceris** unde \* 284. b.  
**Serum suppressum** asthmaticos reddens † 195. a.  
**Seri vitia** in ictero † 444. b.  
**Seri crasis & transcolatio** laesa † 427. a.  
**Seri acrimoniam** in hydropo temperantia † 439. a.  
**Sesumum**, ejus preparata & usus. 543. a.  
**Seseli**, ejus differentia & usus. 543. a.  
**Setaceorum** usus in epilepsia. † 812. a.  
**Usus in ophthalm.** † 593. a.  
**Usus in vertigine** † 799. a.  
**Seuren**. \* 838. b.  
**Sentilis** \* 439. a.  
**Sicca simplicia** quae dicantur † 3. b.  
**Siccum**, v. calidum.  
**Siccus fetus** quid \* 654. b.  
**Sidera** v. Stellae, sydera.  
**Sideratio cerebri** † 586. a.  
**Siderum mimes** in peste † 361. b.  
**Sideritis** cujus usus. 543. b.  
**Sieberi Zelo**. 476. a.  
**Sis** quales pulveres \* 633. b.  
**Siegmars Wurz**. 381. b.  
**Sigillata Terra** Silehaca, ejus preparata & usus. 711. b.  
**Sigillata Terra** Tinctura. 914. a.  
**Signa morborum** † 2. b.  
**Signaturae herbarum** mendas \* 841. a.  
**Silber / gewachsenen härte**; **Dpilofum**, ejus usus Medicus 733. a.  
**Silex** cujus usus in Medicina. 736. a.  
**Silique**, ejus differentia, preparata & usus. 543. b.  
**Similitudo**, v. analogia \* 227. a.  
**Simplicium cognitio** qualis esse debeat \* 845. a.  
**Simplicium cognitio** Medico necessaria \* 845. a.  
**Simplicium cognitio** quomodo acquirenda \* 846. a.  
**Simplicium vires & proprietates** unde definienda † 3. a. seqq. \* 846. a.  
**Simplicium solis ac soli** mutatione vires eodem sub schemate mutabiles \* 846. a.  
**Remedia simplicia** cruda quo sensu praestare dicuntur Compositis & preparatis. 130. b. seqq.  
**Remediorum simplicium Venenositas** in quo consistat. 149. b. seqq.  
**Simplicium lotio** quid. 855. a.  
**Simplicium texture** mutatio artificialis \* 846. a.  
**Sinapi**, ejus preparata & usus 350. b. 544. a.  
**Sinapismus** quid, conficiendi modus & usus. 834. b.  
**Sinn Grün**. 560. a.  
**Singularia** quid \* 667. a. differentia ab aliis remediis. ibid. eorum natura & requisita \* 671. a. b. respectus ad suum indicans \* 672. a. eorum inventor an praecise esse debeat medicus \* 672. b. Chymia occasione eorum valde excolitur \* 674. a. quodlibet singulare a suo indicante speciali indicetur \* 674. b. Chymicus singularia praeparat, sed qui singularia praeparat, non statim est chymicus \* 675. a. fraudes sub nomine singularium latentes \* 675. b. nimia curiositate inveniendis singularibus, negligitur rationalis methodus medendi ut plurimum \* 675. b. Singularium praestantia arrogantes reddit sciolos & contemptum parit rationali medico \* 676. b. an singularia reticere & secum sepelienda nemini communicare Christianae charitati consonum \* 677. a. b. ea quilibet jactans \* 679. b.  
**Singularet**. 382. a.  
**Singultus**, qualis affectus † 208. b. ejus formale in quo consistat † 209. a. b. Causae ibid. exempla singultus vehementioris † 210. a. Diagnos. Prognosis, ibid. cura † 210. b. Singultus quomodo fiat \* 134. b. De singultu casus & observ. \* 414. b. Singultus quasi vomendi conatus transiens \* 368. a.  
**Singultuosa febris** † 288. b.  
**Singultus infantum** ejusque cura † 1080. a. \* 337. b. cura \* 549. b.  
**Singultus in inflammatione hepatis** † 575. b. † 577. a.  
**Singultus in peste** † 362. a. prognos. ejus 362. b.  
**Singultus in stomachi inflatione** &c. \* 133. a.  
**Singultum tollens** medicam. Mynsichtii † 77. b.  
**Sinovia** quid † 69. b. † 410. a. \* 33. a.  
**Sinovia** ejus Prognosis & cura \* 53. a.  
**Sinovia vitium in arthritide** † 246. b.  
**Sinusa alba** unde \* 55. a. eorum diagnosi, prognos. cura \* 61. a. b. ejus coagulatio in ossis luxatione \* 67. a. \* 69. b.  
**Sinus** qualis tumor \* 5. b.  
**Sinus pudoris** prolapsus † 975. a.  
**Sirena**, observatio \* 838. a.  
**Sitronum & sitronum infantum** cura \* 533. b. v. Comedones.  
**Siro**

## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Sironum** differ. à crinonibus † 1103. a.  
**Sisarum** ejusque usus. 545. a.  
**Sitis** nimia ejusque gradus † 42. a. Pars affecta † 42. b. Causæ 59. b. † 43. a. \* 84. b. Differentia, signa & Prognosis † 43. b. cum sonitu delabens, in febris &c. 43. b. Cura † 44. a. seqq. Quid si omni manè vel intense laborantes & æstuentes torqueat † 46. a.  
**Sitis** quando affligat \* 155. b. positiva probatur 50. b.  
**Sitis** convenit cum fame in puncto sensationis, differt ab illa in causa sensationis, 50. a.  
**De siti** casus & observ. \* 353. a.  
**Sitis** defectus cum Prognosi & cura † 46. b.  
**Sitis** depravata fastidio & ejus cura † 46. b.  
**Sitis** in cachexia unde \* 273. a.  
**Sitis** in cholera &c. \* 150. b.  
**Situm** in cholera &c. compescentia \* 155. b.  
**Sitis** in chylosi laesa ex crudis, nidorosa \* 129. b.  
**Sitis** in febris unde \* 202. a. cura \* 205. b. † 254. ab. † 293. b.  
**Sitis** in febr. malign. † 318. b. † 337. a.  
**Sitis** in febr. mal. petech. \* 245. b.  
**Sitis** clamorosa in tertiana mal. \* 206. b.  
**Sitis** in hernia \* 187. b.  
**De siti** infantis casus & observ. \* 363. b.  
**Siticulosus** infans ex lienteria nutritis † 118. b.  
**Sitis** in inflamm. hepatis † 575. b.  
**Sitis** in hepatis inflamm. cum febris symptom. matica \* 281. b.  
**Sitis** in hydropse cura † 439. b.  
**De siti** matutina somnæ casus & observ. \* 368. a.  
**Sitis** in peste † 360. a. cura † 377. a.  
**Sitis** in pleuritide † 564. b.  
**Sitis** scorbuticorum sedanda quomodo † 517. b.  
**Situm** corrigentia † 8. a.  
**Julepus** in nimio siti tertianæ \* 643. b.  
**Situm** vulneratorum sedans \* 45. a. **Situm** in febre vulneraria resingventia \* 54. a.  
**Σιλησφοθαμία** † 590. b.  
**Smaragdus** ejus usus in Medicina. 725. a. \* 155. a.  
**Sobrietas** svadetur \* 818. a.  
**Sobrietas** in bibendo olim \* 809. a.  
**Societates** ad promovendam scientiam naturalem & medicinam \* 841. a.  
**Soda** juncta chylosi, ex cruditate nidorosa orta, \* 128. a. seqq.  
**Præstantissimum** remedium contra Sodam \* 637. a.  
**Morsuli** contra Sodam \* 637. a. v. stomachi ardor, ardor ventriculi.  
**Solanum**, ejus differ. præparata & usus 545. b.  
**Sol** quomodo omnia animat \* 91. a.  
**Sol** nunquam oritur, nec occidit \* 446. b.  
**Solis** aspectus tunicam retinam oculi lædunt † 730. b.  
**Sol f. aurum**; ejus insignis usus \* 79. b. v. Aurum.  
**Soldanella** ejus usus. 634. a.  
**Solida partes**, v. partes solidæ.  
**Solitudinis** amantes melancholici † 867. a.  
**Solutio** quid. 19. a. b. 263. b.  
**Solutio** chymica & Extractio quomodo differ. 260. b.  
**Solutionum** ratio unde dependeat \* 517. b.  
**Commer. Sprossen / Sletten** † 527. b.  
**Somnambuli**, v. noctambuli.  
**Somnia horrida** in asthma humido stomachali \* 194. a.  
**Præservatio à Somniis** turbulentis † 215. b.  
**Somnia venerea**, horrenda &c. quomodo fiant † 857. a.  
**Somnia venerea & in incubo** unde † 214. a.  
**Somniantes** considerati † 709. b.  
**Somniantium** actiones \* 722. a.  
**Somnolqui** an naturaliter seu involuntariò, an verò pro arbitrio animali agentibus annu-merandi \* 722. a.  
**Somnolentia** in peste. † 360. b. † 376. a.  
**Somnolentia** ex torpore spirituum anima- lium † 829. b.  
**Somnus** quid † 701. b.  
**Somnus** causantia \* 814. a.  
**Somnus** in medicina arcanum supra omnes gemmas & lapides pretiosos audit \* 556. a.  
**Somnus** impingvat \* 827. b.  
**Somnus** omnes fluxiones, excepto sudore si- rit \* 556. a.  
**Somnus** meridianus tibiis contractis palpi- rationis cordis causa † 382. a.  
**Somnus** ore aperto nocet \* 199. a. & incum- bendo dorso ibid. b.  
**Somnus** minus cur svavis vesperi largius & serius canantibus \* 204. b.  
**Somnus** ab agris nunquam arcendus † 255. b.  
**Somno** catentes † 704. a. v. Hypnotica, agry- phia.  
**Somnus** parvus melancholicorum † 864. b.  
**Somnus** interturbatus post cœnam largiorem † 81. b.  
**Somnus** nimius † 707. a. ejus differ. & divisio &c. ibid. b. seqq.  
**Somnus** in peste arcendus † 368. a. v. so- por.  
**Linimentum** somniferum \* 663. a.  
**Somnum** concilians nitr. vitriol. \* 834. b.  
**Sonitus** (Pfeiffen) ex aëre in bronchis incarcerato \* 189. a.  
**Sonitus aurium**, v. aurium Sonitus.  
**Sonitus** in difficili respir. &c. \* 189. a.  
**Commen. Kind** † 989. a.  
**Commen. Wendel** / 423. b.  
**Sonus** quid 96. b.  
**Sonus** in auribus quomodo fiat † 739. b.  
**Sonus** formatio beneficio aëris 748. b.  
**Sonus** harmonicus unde. 97. b.  
**Sonus** vocis diversus unde † 220. a.  
**Sophia** chirurgorum, ejus usus. 546. b.  
**Sophienfraut**. 546. b.  
**Sopor** in peste prognosis † 362. b. v. somnus.  
**Sorbus**, ejus differentia, præparata & usus. 546. b.  
**Sors** quid, ejusque usus. 790. b.  
**Sotirella parva Augustanorum** † 754. a.  
**Spagyrica artis** finis \* 645. b.



# INDEX UNIVERSALIS

- Medicinæ secta Spagyrica.** 32. b. ejus affectus *Spina* febrem inducens & alia symptomata † 249.  
16. v. Chymia.
- Spanadrapum** quid &c. \* 662. b.  
*σπαναδράπιον* † 821. a.
- Spasmus.** *Spasmodum* divisio & differ. † 804. a.  
Spasmi differ. ab epilepsia † 809. a.  
Spasmos excitans varios spiritus \* 320. a.  
Spasmus cynicus & tortura oris † 47. a. † 802. b. ejus causæ † 47. b. Prognosis & cura † 48. a.  
Spasmi Cynici differentia à paralyfi faciei † 845. a.  
Casus & obs. de spasma extremorum \* 380. a.  
Spasmi fibrarum unde \* 277. a.  
Spasmus flatulentus quid † 819. b.  
Spasmi gravidarum cura † 1005. b.  
Spasmi intest. norum cura \* 186. b.  
Spasmus partium unde \* 289. b.  
Spasmos coercentia \* 291. b. v. Convul-  
sio.
- Spatula** foetida, ejus usus † 47. a.  
**Species** earumque compositiones & usus 835. b. seqq.
- Specifica** † 3. a. † 4. a. quid \* 667. a.  
remedia quo sensu dicantur specifica. 855. a.  
Specificorum remediorum usus \* 78. b. quæ dicantur \* 79. a. eorum præstantia \* 79. a. defectus & paucitas † 1. \* 616. b. eorum vires unde † 3. a.  
Particularium specificorum remediorum usus \* 78. b.  
Specifica empiricè magis quàm dogmaticè administramus \* 180. a.  
Specificorum subordinatio in febr. \* 205. b. usus. ibid.
- Specifici stomachici Poteris** virtutes \* 79. b.  
**Speichelswurtel.** † 16. a.
- Sperma ceti.** Ejus historia physica \* 697. a. Quid sit 814. a. \* 697. a. an sit semen balæna-  
rum \* 698. a. an sit ambra species \* 698. b. an Halosanthos veterum \* 699. a. Est pinguedo animalis \* 699. a. origo ejus vera \* 699. b. ejus præparatio \* 700. b. adulteratio \* 701. b. Generatio \* 701. b. Usus medicus varius \* 702. b. seqq. Tem-  
peramentum \* 702. b. Usus miscellaneus 814. a. \* 707. a. utendi modus & dosi \* 707. b.
- Spermatice partes** earumque nutrimentum \* 110. a.
- Sphacelus** quid? Ejus causæ \* 75. a. diagnosi & prognosis \* 75. b. differt à gangræna \* 75. a. partis affectæ fœtor & putredoun-  
de \* 75. b. Cura chirurgica \* 76. a. ampu-  
tatio membri sphacelati \* 77. a.  
Sphacelus in peste † 362. a.  
Sphacelus in variol. &c. † 357. b.
- Sphincteris** velicæ vitia † 657. a. † 664. a. † 667. a. b.
- σφυγμὴ κλωιδῆς* † 802. a.  
**Spica**, ejus differ. præparata & usus † 47. a.  
**Epicanard.** † 47. a.
- Spinæ** infixæ inflammatio \* 276. b.  
**Spina** mucum producens \* 228. b.  
**Spinæ** dorsi structura \* 724. b.  
**Spina insectoria**, ejus præparata & usus 634. a.  
**Spinachia**, ejus usus. † 548. a.  
**Spinalis medulla** consideratio † 701. a.  
**Spinalis medullæ** vulnera qt. lethalia \* 372. b.  
**Spirituosa oleosa** non omnes ferre possunt. † 390. b. v. odor.  
**Spiritus** vox diversimodè accepta \* 811. a.  
Spiritus sunt sol microcosmi \* 227. a.  
Spirituum generatio & ortus \* 811. b.  
Spirituum in animalibus natura Sino-vo-  
latis oleosa s. sulphurea \* 796. a. \* 811. b.  
Spirituum materia 37. a.  
Spirituum divisio. 37. b.  
Spirituum varietas qualis & unde. 175. a.  
Spirituum modus operandi \* 783. a. b.  
Spirituum morbi. 173. b. seqq.  
Spirituum vitæ non possunt definiri, & quæ-  
re 174. b.  
Spiritus quibus modis ægrotent. 131. b. seqq.  
In spiritus quæ remedia agant & quomodo. 174. a. seqq.  
In spiritu medela magna camphoræ præ-  
stantia. 175. a.  
Spiritus morborum subjectum \* 811. a.  
Spiritus sunt morbi & curationis potissima causa. 174. a.  
Spirituum motus inordinatus in omnibus morbis \* 201. b.  
Spirituum vitiatum motus morborum causa \* 791. b.  
Spiritus irritantes causæ in morbis \* 238.  
Spiritus sunt fundamentum omnium mor-  
borum † 797. b. eorum morbi in quanti-  
tate &c. \* 797. b.  
Spirituum perpetui & nimii influxus causæ † 702. a. objecta eos irritantia. ibid.  
Spirituum motorum positiva demonstratio. \* 793. b.  
Spirituum motus efferatus, explosivus \* 180. a.  
Spiritus nimis agitati ac incalcescentes in in-  
flamam quandam abripiantur \* 797. a.  
Calor dependet à spiritibus. 39. a.  
Spirituum defectus quis incurabilis. 178. a.  
Spiritus exhaustis reddimur debiles \* 245. b.  
Spirituum restauratio & auctio \* 796. a.  
Spirituum constitutio in nutritionis negotio \* 826. b.  
Spirituum vis in condiendis ac à putredine servandis corporibus \* 797. a.  
Spiritus animales † 25. a.  
Spiritus animalis genesis & distributio. 87. a. seqq.  
Spirituum animalium generatio & distribu-  
tio læsa † 700. a.

Spiris

# MATERIARUM PRAECIPUARUM:

- Spirituum animalium** diversitas unde 88. b.  
**Spirituum animalium** necessitas \* 749. b.  
**Spirituum animalium** usus. 88. b.  
**Spiritus animales, vitales, virium** fundamentum † 322. b.  
**Spirituum animalium** motus 88. a. b.  
**Spirituum animalium** nimius & inordinatus motus in partes externas † 802. a. causa † 805. a.  
**Spirituum animalium** defectus † 394. b.  
**Spirituum animalium** motus cur deficiat in apoplexia † 827. b.  
 à **spiritibus animalibus** ingeniorum diversitas. 89.  
**Spiritus animalis** insui per se indeterminati sunt ad sensum acutum vel obtusum præstandum \* 289. a.  
**Spirituum animalium** influxus abolitus † 824. a.  
**Spirituum** influorum irritatio in febr. † 249. b.  
**Spirituum animalium** coagulatio † 717. b.  
**Spiritus animales** quid conferant ad vigilias 89. a. b.  
**Spiritus animales** qua ratione causa somni existant. 89. a. b.  
**Spiritus** genitalis consideratio \* 91. a.  
**Spiritus** vitalis in semine \* 90. a.  
**Spiritus** sanguinis peregrinus \* 103. a.  
**Spiritus** elater sanguinis, &c. \* 320. a.  
**Spiritus** sylvestres in corpore \* 181. a.  
**Spiritus** vitalis generis. 87. b.  
**Spiritus** vitalis influus, infusus \* 90. b.  
**Spiritus** mundi \* 741. b. v. Mundus.  
**Spiritus** universalis omnia animans \* 91.  
**Spirituum** chimica preparatio \* 562. a. eorum parandi modus. 821. a.  
**Spirituum** aromaticorum usus & præpar. \* 633. a.  
 ~ carminativus, vid. carminativa.  
 ~ fuliginis, vid. fuligo.  
**Spiritus** liquidi quid. 860. a.  
**Spiritus** panis, vid. Panis.  
**Spiritus** salis Ammoniaci in quamplurimis affectibus optimus \* 79. a. \* 813. b. \* 814. b.  
 ~ ☉.c. usus in affectibus ab ☉.do. 254. a.  
 ~ ☉.c. anisatus 344. a. vid. ☉.c.  
**Spiritus** Sini aromatici 336. b.  
**Spiritus** salinus esurius & vitriolicus stomachi, Hermeticorum † 40. a.  
 ~ theriacalis, ejus compositio. 898. a. b.  
**Spiritus** vegetabilium, vid. vegetabilia.  
 V ejus variae præparat ones. 316. a. b.  
**Spiritus** vini abusus noxius † 287. a.  
**Spiß-Pocken** † 345. b.  
**Splitter** v. festuca.  
**Splen**, (v. lien) | Ejus pathemata varia \* 297. a. b.  
 De splenis vitia casus & obs. \* 375. a.  
 De spleneticis affectibus casus & obs. \* 402. a. \* 427. a.  
**Splenicus** dolor distinguendus à colica \* 169. b.  
**Consultatio** de febre quartana splenetica \* 211. b.  
**Splenis** accusatio in malo hypoch. \* 683. a.  
**Spleni** falso adscribuntur symptomata in hypochondrio sinistro † 91. b.  
**Consultatio** de suffocatione hypochondriaco-splenetica \* 317. a.  
**Splenis** vitia curata in melanchol. † 877. b.  
**Splenicus** nervus spasmo affectus palpitatio cordis causa † 381. b.  
**Splenetici** salivatores † 46. b.  
**Splenis** affectibus conducens emplastrum de ranis Vigonis \* 299. a.  
**Empl.** pro splene dolente, tumido &c. \* 664. b.  
**Splendor** quid. 94. b.  
**Splendores** in visu laeso † 718. a.  
**Spongiolapi** cujus usus in Medicina 736. b. |  
**Sponsorum** fascinatio † 917. a. † 919. b.  
**Spring-Saamen-Kraut.** 396. a.  
**Spulwürmer** v. Lumbrici.  
**Spuma** generis \* 284. a.  
**Spumæ** in apoplexia prognosis † 832. a.  
**Spuma** oris in asthm. \* 196. a.  
**Spuma** epilepticorum † 808. b.  
**Spuma** strangulorum, catarrho suffocativo &c. laborantium † 239. a.  
**Spurum** an sit pus, anviscida materia, quomodo probandum † 400. a.  
**Sputi** defectus exempla † 46. b.  
**Sputum** cruentum in em. ymate † 805. b. seq.  
**Sputum** phthificorum contagiosum † 398. a.  
**Sputi** in phthisi cura † 408. b.  
**Sputum** cruentum in pleuritide † 564. b.  
**Sputi** rejectio in pleuritide \* 277. b.  
**Sputi** rejectio in Pleuropneumonia † 565. b.  
**Sputi** saneyinei in tussi cura † 236. a.  
**Sputum** in variolis & morbill. † 355. a. v. Sanguinis sputum.  
**Squama** in scabie unde \* 124. a.  
**Squamaria**, cujus usus 548. b.  
**Squinantia** qualis affectus † 538. b.  
**Staar**; schwarzer/ grüner/ weißer/ reisser/ unreisser/ Milch-Staar † 725. b. † 29. b. Glasse.  
**Ragen-Staar** † 728. a.  
**Stärc-Julep** \* 643. b.  
**Stärc-Tranc**/anhaltender \* 650. a.  
**Stagnatio humorum** morbosa, causa variorum tumorum \* 3. a. Unde contingat \* 3. b. quomodo tollatur \* 4. b.  
**Stagnatio sanguinis** † 181. b. † 532. a. v. sanguis.  
**Stannum**, *stapner*, quo sensu metallorum dicatur Diabolus. 924. a. \* 197. a.  
**St** & Jovis generis, ejus divisio, præparata medica & eorum usus. 308. a. b. seq. 762. b. 765. b. seqq.

# INDEX UNIVERSALIS

- S & Z** quomodo conveniant & differant. *Etderflus* † 236. a.  
 763. b.  
*Staphis agria*, ejus usus. 548. b.  
*Stasis* sanguinis † 238. b.  
*Steatoma* unde, ejus causa, prognos, cura \* 29. a.  
 seqq.  
*Steg-Merseburgische Küben*. 490. a.  
*Steinbruch*. 536. b.  
 rother 447. b.  
*Steinflie*. 479. b.  
*Steinmarf*. † 666. a.  
*Steinposten* † 345. b.  
*Steinfaamen*. 485. a.  
*Stellarum* conjunctio \* 439. a. seqq. motus proprius  
 ibid.  
*Stellarum* configuratio \* 439. a. v. *Planeta*,  
 motus.  
*Stellarum* influxus \* 444. b. vires nunc ma-  
 jores, nunc minores \* 444. b. v. *Astra*.  
*Stercora* varia ex eod. cibo, pro variis animalibus,  
 unde \* 825. a.  
*Stercoris* humani usus in peste † 371. a.  
*Stercoris* suilli usus in forma cataplasmat.  
 \* 658. b.  
*Stercoris* vaccini usus in forma emplastri \*  
 658. b. v. excrementa.  
*Sterilitas* ejusque causæ † 984. b. Diagnos, signaq;  
 an in viro vel femina causa lateat † 985. b.  
 Prognos & cura † 986. a.  
*Sterilitas* ob appetitus venerei defectum  
 † 953. a.  
*Sterilitatis* in viris causæ † 898. b.  
*Sterni* consideratio \* 724. b.  
*Sterni* dolores versus costas notias † 81. a.  
*Sterni* dolor in pleuritide † 565. a.  
*Sternutatio* quid † 805. a.  
 ejus pars affecta, forma † 216. a. causæ &  
 fundamentum ibid. b. Cur Itali minus ster-  
 nutent † 216. b. Cerebrum hic est insona  
 † 217. a. ejecta per eam unde † 217. a. pro-  
 moventia eam † 217. a. mulieribus præ-  
 sertim parturientibus & in secundinis re-  
 tentis proficua &c. † 216. b. seqq. mo-  
 tus est singultui contrarius † 217. b. ejus  
 Diagnos & Prognos † 217. b. Cura  
 † 218. a.  
*Sternutatio* abortus causa † 1011. b.  
*Sternutatio* cæcitatem inducens † 730. a.  
*Sternutationes* ex coryza † 687. a.  
*Sternutationis* prognos in peste † 362. b.  
*Sternutatio* ad pleuritidem disponens † 562. b.  
*Sternutatoria* quid \* 632. a.  
*Sternutatoriorum* compositio † 715. b.  
*Sternutatoria* olfactum lædunt † 790. a.  
*Sternutatorii* pulveres † 689. b. \* 633. b.  
*Sternutatorium* D. D. Langii. 873. b.  
*Sternutatoriorum* usus in apopl. \* 304. a.  
 usus in epilepsia † 812. a.  
 usus in epiphora † 596. a.  
 usus in vertigine † 799. a.  
*Stertor* unde \* 199. b.  
 quomodo contingat \* 189. b.  
*Stertor* in apoplexia † 831. b. † 832. b.  
*Stertor* faucium asthmaticorum † 196. b.  
*Stigmata* in peste quid signent † 361. b.  
*Stachas*, ejus differentiz, præparata & usus  
 548. b.
- Stoliditas* senum unde † 550. b. v. *fatuitas*.  
*Stomacace* veterum † 478. a.  
 Misturæ contra stomacacen \* 643. a.  
*Stomachus* quæ maxime appetat, quæ minimè  
 \* 129. a.  
*Stomachi* conspiratio cum liene † 82. a.  
*Stomachi* acidum esurinum † 105. b.  
*Stomachus* quomodo variè alteret remedia  
 \* 118. a.  
*Stomachi* orificium maxime sensibile & pri-  
 ma pars sensilis \* 133. b. \* 137. a. in pri-  
 mis sinistrum \* 137. a.  
 v. orificium, œsophagus.  
*Stomachi* vitia & earum cura † 28. b. seqq.  
 In stomachi vitio semper habenda ratio sali-  
 væ † 312. b.  
*Stomachi* ardor unde † 245. b. v. ardor, so-  
 da.  
*Stomachi* vitia atrophiam inferentia † 396.  
 a.  
*Stomachi* orificium quomodo afficiatur in  
 Colic. \* 181. a. v. *ventriculus*.  
*Stomachi* convulsio † 70. a. † 804. b.  
*Stomachi* digestio & concoctio læsa \* 119.  
 b.  
*Stomachi* distensio † 67. a.  
*Stomachi* dolores compressionesve & sym-  
 ptomata † 81. a.  
*Stomachi* flatus, v. filatus stomachi.  
*Stomachi* inflammatio & abscessus, ejus cau-  
 sæ, diagnos, Prognos † 551. b. Cura  
 † 552. a. seqq.  
*Inflatio* stomachi cum asthma & cardio-  
 giæ \* 132. b.  
*Stomachi* laxitatis medela † 120. b.  
*Stomachi* vitia in Petechiis † 342. a. b.  
*Stomachalis* phthisicos signa † 398. b.  
*Stomachi* syncope † 389. a.  
*Stomachi* affectus in tertiana mal. \* 207. a.  
*Stomachodica* † 4. b. \* 132. a.  
*Stomachalia* quæ sufficiant. 957. b.  
*Balsamum* stomachale, ejus compositio,  
 958. b.  
*Electuarium* stomachale \* 635. b.  
*Emplastrum* stomachale \* 664. b.  
*Stomachales* morsuli \* 637. a.  
*Sacculus* pro stomacho \* 655. b.  
*Stomachales* leuti, foci, linimenta &c. \*  
 139. a.  
*Storax*, v. *styrax*.  
*Storchschnabel*. 455. a.  
*Strangulatio* † 189. a.  
 Strangulationis effectus † 239. a.  
*Strangulatus* merinus \* 317. b.  
*Stranguria* quale vitium † 667. b. ejus causæ, dia-  
 gnos, prognos † 668. a. b. Cura † 669. a.  
 seqq.  
 Consultatio de stranguria cum Podagra \*  
 292. a.  
 Stranguria in gravidis † 1005. a.  
 De stranguria gravidæ casus & obs. \* 434. a.  
*Struma* (v. *scrophulæ*) de struma casus & observ. \*  
 347. a. & b.  
*Strumæ* mammarum † 1057. b.

*Strumbio*



## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Struthio* cuius usus in Medicina. 690. b.  
*Studia* nimis disponunt ad febres, &c. \* 204. a.  
*Studia* mali hypoch. autores † 482. a.  
*Studia* intentiora melancholiam inducentia \* 107. a.  
*Stupha* quid \* 708. b.  
*Stuphas* præscribendi ratio \* 657. a.  
*Stuhlzwang* qualis affectus † 138. b.  
*Stupefactoria* vis vini, musti, carbonum &c. † 710. b.  
*Stupiditas* † 850. b. ejus causæ † 851. a.  
*Stupiditatis* naturalis prognos. † 853. a.  
*Stupor* quid? † 841. a.  
*Stupor* & dolor auris cum ejus atrophia ex lapsa corallina sphaerula † 838. b.  
*Stupor* corporis v. *ataxia*.  
*Stupor* membrorum, ejus prognos. & cura † 742. b.  
*Partis stupor* in inflammatione & obstructione \* 281. b.  
*Stupor sensuum* subitaneus † 219. b.  
*Stypticus liquor*. 353. a. b.  
*Styrax* S. *Storax Calamita*, ejus præparata & usus. 600. b.  
*Styrax liquidus*, cuius usus. 601. a.  
*Suberb* Arabum † 709. b.  
*Subjectum* morbi in omni casu considerandum \* 119. a.  
*Subjectum* inhaesionis & radicationis morborum † 2. b.  
*Subluxatio*; de eâ casus & obs. \* 373. b.  
*Subluxatio* infantum † 1102. a. b.  
*Subluxatio* vertebrarum dorso \* 335. a. Symptomatica \* 335. b.  
y. *Luxatio*.  
*Submersio* † 189. b.  
*Submersorum* reviviscentia \* 769. a.  
*Subtilissima* sensuum externorum perceptionem fugiunt \* 792. b.  
*Suces corporis*. Eorum color, Sapor, odor \* 151. a. alteratio ibid.  
*Succorum* corporis crasis non adeo perspecta \* 180. a.  
*Succus Melancholicus* quid? \* 153. a.  
*Succi officinales* triplices. 865. b.  
*Succus Pancreaticus* corrigit chylum. 50. a.  
*Succi vegetabilium* quomodo asservandi, ne fermentent \* 126. b.  
Eos parandi modus 823. a. b.  
*Succinum*. 339. a.  
quid & unde, ejus præparata & usus. 812. a. 814.  
*Succini* usus in peste † 365. b.  
*Oleum succini* & ejus correctio propter scortorem † 815. a.  
*Succini* Salvolat & ejus depuratio \* 132. a.  
*Succisa* ejus usus. 549. a.  
*Succolata*, S. *Chocolata* ejus præparata & usus. 600. a.  
*Sucherwurzel*. 436. a.  
*Sudamina*, eorum causæ, cura † 526. a. b.  
*Sudantes* multum cur parum mingunt. 70. b.  
*Sudatoria balnea* præscribendi ratio \* 657. a.  
*Sudor* quomodo fiat † 23. b.  
*Sudoris* transmissio per cutem \* 561. b.  
*Sudor* unde. 85. a.  
*Sudor* an ex interioribus visceribus prorumpat. 86. b.  
*Sudor* an sit excrementum naturale. 85. b.  
*Sudoris* excreta qualia † 257. a. artificialia, criticus † 247. b.  
*Sudoris* & urinæ conspiratio \* 565. b.  
*Sudoris* plus. 86. a.  
*Sudor* an hyeme parcius corpori contingat \* 227. a.  
*Sudor* variis modis proleclus, & quomodo evanescat \* 565. a.  
De sudore casus & obs. \* 337. a.  
De sudore nocturno casus & observ. \* 349. b.  
*Sudor Anglicus* † 288. a.  
*Sudor* in anxietate præcordiorum † 81. b.  
*Sudores* per balnea \* 710. a. \* 711. a. b. \* 715. b.  
*Sudores* colliquativi, glutinosi † 286. b. † 288. a.  
*Sudor* ex opio; ex somno &c. \* 564. a.  
*Sudorem* suppressens opium \* 568. a.  
*Sudor* deficiens, cum cura † 699. b.  
*Sudor* depravatus cum cura † 699. b.  
*Sudorum* usus in alijs fluxibus † 142. a.  
*Sudor* nimius ejusque cura † 699. a.  
*Sudor* febrilis quid &c. \* 202. b.  
*Sudor* in febr. maligna † 319. b.  
*Sudor* universalis post febres salutaris \* 240. a.  
*Sudor* criticus in febr. acut. † 292. a.  
*Sudor* bonus in febr. Petech. mal. \* 247. b.  
*Portio analeptica* sub & post sudorem in febr. a. cur. \* 640. b.  
*Sudores frigidi* in cholera \* 150. a.  
*Sudoris* in mania prognos. † 881. a.  
*Sudor* obesitatem tollens \* 829. b.  
*Sudores* particulares circa caput & frontem periculosi, præsertim subfrigidi & glutinosi \* 247. a.  
*Sudores hæcticorum, phthysicorum nocturni* \* 570. a.  
*Sudor* in lecto \* 712. a.  
*Sudor* circa frontem & tempora post mensum emanationem naturalem \* 165. b.  
*Sudor* in peste † 361. a. seq.  
*Sudoris* prognos. in peste † 363. a.  
*Sudorum* nimiorum in peste cura † 377. b.  
*Sudores* nocturni scorbuticorum † 483. a.  
*Sudoris* in phenitide prognos. † 800. a.  
*Pilulæ* contra sudorem nocturnum in phthysi &c. \* 639. a.  
*Sudor* nocturnus in pleuritide curatus \* 297. a.  
*Sudores pomeridiani* \* 368. a.  
*Sudor* puerperis proficius † 1044. b.  
*Sudoris* spontanei profluvium consideratum \* 559. b.  
*Sudores* tabidorum & phthysicorum † 400. b.  
*Sudores frigidi* circa frontem invomitu nimio \* 135. a.  
*Sudor* frigidus in uteri affectibus \* 328. a.  
*Sudorifera*. 169. b. † 5. a. † 23. b.  
*Sudorifera* præscribendi modus \* 617. b.  
*Remediorum sudoriferorum* operandi modus. 170. a. b.  
*Sudorifera* an simpliciter curent affectus cutaneos \* 127. a.  
*Sudorem* excitans sulphur ex scoriiis antimon. \* 80. a.  
*Sudorifera* vis opii \* 559. a.  
Pro sudorifero raro opio utendum solo \* 571. b.  
*Sudoriferis* quibus in casibus opium sociandum \* 572. a.

# INDEX UNIVERSALIS

- Sudoriferorum usus in apoplexia** † 834. a. † 83. b.
- Sudorifera asthmaticis proficua** † 203. a.
- Sudoriferorum usus in balneo** \* 715. b.
- usus in epilepsi** † 812. a.
- usus in febribus** † 253. b.
- usus in febr. mal.** † 329. b.
- usus in hydropse** † 435. b.
- usus in inflammationibus** † 536. a.
- usus in lepra** † 523. b.
- usus in lue venerea** † 459. b.
- usus in peste** † 367. b. † 369. b.
- usus in Petechiis** † 340. b.
- usus in propinatis phlebotomis** † 895. b.
- usus in pleuritide** † 518. b.
- Sudorifera decocta hodie frequentius exterius usurpata, eorumque parandi ratio** \* 652. a. diæta tunc observanda ibid.
- Sudoriferum decoctum Zvelfferi primarium** \* 652. b. secundarium ibid.
- Mistura theriacalis sudorifera** \* 640.
- Pilula sudorifera anodyna** \* 639. a.
- Suffragium** 455. b.
- Suffragium** \* 34. a.
- Suffragium in balneo** \* 57. a.
- Suffragium s. balnea sicca particularia** \* 712. b.
- Suffragium in peste salutares** † 365. a.
- Suffocatio à viâ interclusa** † 189. a. Diagnofis, prognofis, cura † 170. a. b.
- Ex gas variarum rerum** † 190. b. Qua ratione talia gas s. tumi exhalantes tam subito jugulent † 191. a. quomodo hic gas inspiratus sanguinem in pulmonibus atque spiratima-les alteret † 192. a. ejus cura † 192. a.
- Convulfiva ejusque caufæ** † 192. b. ejus diagnofis, prognofis, cura † 193. a.
- Suffocationis in angina metui quomodo obviandum** † 548. b.
- Suffocatorum in aqua reftitutio** \* 79. a.
- Suffocativus catarrhus v. Catarrhus fuffocativus.**
- Suffocatio hypochondriaca in colica virorum** \* 179. b.
- Confultatio de Suffocatione hypochondriaca fplenetica** \* 317. a.
- Suffocatio hysterica v. hysterica fuffocatio.**
- Suffocatio infantis in utero quomodo contingat** \* 756. b.
- Suffocatio ex fanguinis ftagnatione** † 6. a.
- Suffocatio ex fanguinis coagulo ob porum frigida &c.** † 239. b.
- Suffocatio in variol. & morbill.** † 355. a.
- Suffocatio uteri v. Hysterica paffio.**
- Suffufio quid** † 532. a.
- Suffufio oculi** † 725. b.
- Suffufiones fanguinis, earumque caufæ,** \* 11. b. cura \* 12. a.
- Sugillationum caufæ & cura** \* 11. b. 12. a. f. q.
- Sugillatio oculi confiderata** † 722. b.
- Suilla rabies** † 856. b.
- Sulphur quid, ejus differentia, præparata & ufus.** 8. a. 275. b. 279. b. 807. a.
- Anima chymicis Sulphur vocatur.** 738. b.
- Sulphureum Principium vitæ** \* 9. b.
- Sulphurea natura fpirituum in animalibus** \* 796. b.
- Omnia fuphura narcotifin poffident** \* 815. a.
- Sulphura mineralium & metallicorum fixata cui ufui** † 5. a.
- Sulphuris ufus in peste** † 364. a. f. q. † 371. a.
- Sulph. purificatio.** 928. b.
- Sulphura antimonii cui ufui** † 5. b.
- Sulphuris extorcoris antimonii in lignis ufus** \* 80. a.
- Sulph. Balfamus, ejus ufus.** 29. b.
- Sulph. chymicum quid.** 299. a.
- Emplaftrum Diaphanis, ejus compositio.** 930. a.
- Sulph. Granatorum.** vid. Granati.
- Sulph. hepar ejus præparatio.** 929. b.
- Sulphuris odoris & fuffitus virtutes** † 328. b.
- Menftrua Sulphurea & oleofa.** 262. a.
- Sulphuris Tinctura, ejus compositio.** 929. b.
- Tinctura Sulphuris volatilis.** 329. b.
- Sulphuri Veneni multum tribuitur** \* 79. b. it. Ois & vitrioli ibid.
- Sulphur vitrioli fixum cui ufui** † 5. b.
- Superciliorum constitutio in morbo Gall.** † 456. a.
- Superciliaris dolor periodicus** † 757. b.
- Superfatio** † 98. a. † 951. a. quomodo potest contingere. 109. b.
- Superpurgatio v. Hypercatharsis.**
- Suppositoria, eorum compositio.** 844. b.
- Suppositoria non præferuntur** \* 632. a.
- Suppositoriorum ufus in alvi retentione** † 95. b.
- ufus in apoplexia** † 833. a.
- Suppositoriorum loco applicati globuli mofch.** \* 632. a.
- Suppurantia remedia quæ dicantur** † 4. a. \* 9. a. b. ubi locum habeant, & cur adhibenda ibid. a. qualia requirantur ibid. b. jucundiora & minus molefta quæ ibid. b. forma iis utendi \* 10. a.
- Suppurationes quomodo contingant** † 182. a. \* 5. b. quid \* 57. a.
- Suppurationum caufæ** † 534. b. f. q.
- Quomodo chirurgus eam adjuvare debeat** \* 5. b.
- Suppuratio ab icteffuum cum fymptomatibus** \* 240. b.
- Suppuratio in hepatide** † 56. b.
- Suppuratio in inflammatione hepatis** † 575. b.
- Suppuratio oculorum** † 725. a.
- Suppurationes in pleuritide** † 565. b. † 573. a. \* 277. b. cura \* 279. a. b.
- Suturæ abceffus in hepatide** † 576. b.
- Surditas ejusque caufæ** † 733. b. Diagnofis, prognofis † 735. b. Cura † 736. a. † 738. a. obfervanda in applicatione remediorum.
- Surditas intervinit oculi loco aurium, & loquelam poffunt intelligere ex motu labiorum & linguæ** † 736. a.
- Surditas in febr. mal.** † 327. a.
- Surditas in lue Gall.** † 456. a.
- Suæ cuius ufus in Medicina.** 680. a.
- Suifensorum fensus ac motus cur tam subito pereant** \* 90. a.
- Sufficiofi melancholici** † 864. b.
- Sutura labiorum vulueris** \* 43. a.
- Syderum motus à motu Ois derivandus.** 17. b. 7. 9. dera.
- Sylvius & ejus fcripta** † 16. b.
- Sympathetica Cura; tria circa illam confideranda** \* 80. a. \* 81. b.
- Sympatheticum pulvis ad vulnèra fananda** \* 46. a. v. Magnetica cura, transplantatio.
- Sympathetica purgatio.** vid. purgatio.
- Sympathia quâ ratione contingat.** 38. a. b.
- Sympathia Græcorum quid?** \* 566. a.
- Symphitum, ejus differ., præparata & ufus.** 549. a.
- Symptomata quoduplicia.** 138.
- Symptomata graviora.** 180. b.

Sympto-

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

**Symptomata** tria in praxi frequentius occurrentia \* 181. b.  
**Symptoma** omne est symptoma actionis læsæ \* 778. b.  
**Symptomata** evanescent sublata morborum radice \* 78. b. interdum symptomata à posteriori curantur, radice intacta relicta † 1. b. \* 78. b.  
**Symptomaticæ** febres † 244. b.  
**Symptomaticæ** febres acutæ † 303. b.  
**Symptomata** in hypochondrio sinistro falso ascribuntur spleni † 91. b.  
**Syncope** † 338. b.  
**Syncope** lunaris eclipsis dicta † 826. a. ejus different. † 386. a. b. appellationis ratio † 386. b. syncopizantium vita media ibid. b. causæ hujus affectus † 387. a. Stomachi syncope † 389. a. diagn. & prognos. † 389. b. cura † 390. a. Resuscitatio syncopizantium † 389. b.  
**Syncope** affinis apoplexiæ \* 302. a.  
**Syncope** cardiaca † 238. b.  
**Syncope** cardiacæ differ. ab apoplexiâ † 831. b.  
**Syncope** metus ex cardialgia † 84. b.  
**Syncope** febres † 309. a.  
**Syncope** gravidarum cum cura † 1001. b.  
**Syncope** in peste cura † 378. a. \*  
**Syncope** suffocans † 192. b.  
**Infusionis** usus in syncope \* 497. b.  
**Synclipsis** in dolore emplastrum \* 658. b.  
**Synensis** 10. b. sq.  
**Syndromæ** seu combinatio symptomatum; in eâ primaria imprimis attendenda \* 179. a.  
**Synocha** † 22. b. Eius subjectum † 249. b.  
**Synocha** quare dolores insigniores comitans † 310. b.  
**Syphilis** qualis affectus apud veteres † 455. a.  
**Syrupi** magistraliter non præscribuntur \* 631. b. eorum compositio & usus 835. a. 863. a.  
**Syrupi** usus in bolis \* 634. b.  
**Syrupus** de spina Cervina, ejus usus 875. b. v. Spina Cervina.  
**Systole** quid 67. b.  
**Systole & Diastole** in respirando \* 747. b.

## T.

**Tabaci** folia masticata crassitiem & pinguedinem immutancia † 647. b. \* 830. a.  
**Tabacum** agrypniam inducens † 703. a.  
**Tabaci** usus anticatarrhalis † 68. b.  
**Tabaci** usus vomitorius triplex † 10. b. ejus veneni correctio † 10. b.  
**Tabaci** abusus febrem colliquativam inducens † 287. b.  
**Tabaci** abusus phthisin inducens † 397. b.  
**Clyster** ex tabaco consideratum \* 659. b. v. Nicotiana.  
**Tabella** quid? quomodo præscribenda \* 636. b.  
**Tabes** ejusque causæ &c. 394. a. quomodo contingat \* 110. a. quomodo differat à phthisi \* 259. a. Eius diagnosi † 398. a. prognos. † 400. b. cura † 401. a. sqq.  
**Tabes** affectis nil confert sanguinis transfusio \* 110. a.  
**Tabes** dorsalis unde † 394. b. † 395. b.  
**Tabes** dorsalis noviter maritatorum unde \* 828. a.  
**Dispositio** ad Tabem in infantib. † 1101. b.

**Tabes** à lue Gallica † 456. a. ejus cura † 477. a. v. Phthisis.  
**Tabifica** febres † 310. a.  
**Tacamahaca**, ejus præparata & usus 601. a.  
**Tactilis** qualitas quid 101. a.  
**Tactus** vestigia in cute \* 561. a.  
**Tactus** organon sunt papillæ nervæ pyramides 101. a. b.  
**Tactus** diversitas unde 101. a. b.  
**Tactus** dolorificus 101. b.  
**Tactus** sensilior in vola manuum; plantis pedum, hypochondriis in quo consistat \* 239. a.  
**Tactus** læsio † 742. b. tactus subjectum &c. † 743. a. sqq.  
**Tactus** in virgine deficiens ob chlorosin; salvo motu in toto corpore † 959. b.  
**Tadscheifraut** 404. a.  
**Tage und Nacht** 500. b.  
**Talcum** cujus usus in Medicina 736. b.  
**Talpa** cujus usus in Medicina 631. a. v. testudo.  
**Tamarindi** eorum præparata & usus 655. a.  
**Tamariscus** ejus præparata & usus 550. a.  
**Tanacetum**, ejus differ. præparata & usus 550. b.  
**Tapsus barbatus** † 139. b.  
**Tarantismus** & ejus cura † 856. a. effectus istius vari unde \* 815. b.  
**Taraxacum**, ejus præparata & usus 551. a.  
**Tarax.** quid † 589. a.  
**Tarditas membrorum**, v. virium prostratio.  
**Tartarus** quid; ejus generatio, differentia, præparata & usus 318. a. b. sq. 601. b.  
**Tartarus chalybeatus** ejus usus 931. b. compositio 932. a.  
**Tartarus emeticus** † 12. b. est filius seu privignus quasi vini † 12. b.  
**Tartarus microcosmicus** Paracelsitarum \* 517. b.  
**Tartarus Patacelsi** quid 127. b.  
**Tartarus tartarificatus** ejus compositio 933. a.  
**Tartari tinctura** ejus compositio 933. b.  
**Tartarus vitriolatus** & ejus usus 251. a. b.  
**Tartarus vitriolatus** ejus compositio 932. b.  
**Tartarus vitriolatus Tacchenianus** 339. a.  
**Tausendblat** 985. b.  
**Tausend Guldentrain** 412. a.  
**Tausendforn** 461. a.  
**Tausend. Schönchen** 398. a.  
**Taxus** cujus usus 552. a. 681. a.  
**Telephia ulcera** quæ? eorumque curatio Chirurgica \* 63. a.  
**Epithema** ad telephia ulcera \* 642. a.  
**Telescopii** insignis usus \* 792. b.  
**Temperamentum** quid 175. b. \* 513. a.  
**Temperamenta** sunt diversa, & hujus diversitatis ratio 40. b. sqq.  
**Temperamenta** quatuor considerata \* 815. b.  
**Temperamenta** tot, quorundam individua \* 309. b.  
**Temperamentorum** punctum omne deducendum ex statu massæ sanguineæ \* 118. a.  
**Temperamentum**, vitale, elementale \* 92. b.  
**Temperamentorum** virialium doctrina explosa † 242. b.  
**Ut** temperamentum, ita mores \* 309. b.  
**Temperamenta** mutantur a morbis \* 92. b.  
**Temperantia** † 4. a.  
**Temperantium** vis † 251. b.  
**Clyster** temperans \* 600. a.  
**Temperata** remedia ulceris quid? 56. b. sq.  
**Temperatura** læsæ origo \* 519. a.

Y 4

Temperatura



# INDEX UNIVERSALIS

- Tempestates aëris* an astralis influxus variis larvis deformare queat \* 785. a. & morbos inferre ibid.
- Tempora* eorum tensiones † 804. b.
- Temporalis musculi* convulsio & Paralysis † 47. a.
- Temporalis musculi* vulnera an lethalia \* 37. b.
- Temulentia*; vocis consideratio \* 810. a. excluditur hac voce ebrietas ab aqua, cerevisia, lacte, rebus Narcoticis \* 810. a. definitio & differentia † 810. b. causa \* 812. b. herbae alcalinae temulentiam infringentes \* 813. b. oleosa item & amygdalina \* 815. a. praecaventia alia, ibid. 199. signa diagnostica \* 815. b. diversi ejus effectus unde \* 815. b. vitanda \* 816. a. remedia potiora \* 816. b. v. ebrietas.
- Tendinum* systema † 25. b.
- Tendinum* concursus ad motum \* 782. b.
- Tendinum* in fracturis contorsio & dislocatio ut curanda \* 74. a.
- Tendinum* vulnera quomodo tractanda \* 50. b. \* 3. b. distensio & laceratio ex luxatione \* 67. b.
- Tenebricosa vertigo* \* 794. a.
- Tenerior constitutio* quæ \* 215. b.
- Tenesmus*, ejus subjectum, causa, differ. † 138. b. diagnosi, prognos, cura † 139. a. b.
- Tenesmus* calculorum † 3. b.
- Tenesmus* in calculo vesicae † 662. a.
- Tenesmus* infantum, cum causa, prognosi † 1082. b. cura † 1083. a.
- De *Tenesmo* infantis casus & observ. \* 353. b.
- Tenesmus* ex medicamentis \* 160. b.
- Tenesmus* abortum portendens † 1012. a.
- Fetus* ad tenesum \* 655. a.
- Tensiones* abdominis, hypochondr. &c. † 804. a.
- Tensiones* epilepticae † 809. b.
- Tensionis* membrorum cura in peste † 378. b.
- Tensus dolor* † 746. a. † 550. b.
- Terebinthina* præparatio 935. b.
- Therebinthinae* laus \* 662. a.
- Therebinthinae* usus in asthma † 207. a.
- Terebinthina* Cypria & vulgaris, ejus præparatio & usus 595. a.
- Terebrans dolor* † 745. b. † 750. a.
- Termintha* † 526. a.
- Terra* definitio 6. b.
- Terræ* motus pestilentialis † 359. b.
- Terræ Medicinales*, vid. Medicina.
- Terratum* ulus Medicus 711. a.
- Terræ* in sensu Medico quomodo distinguantur 710. a.
- Terra* qualis expetitur pro usu Medico 710. a.
- Terræ* quid cum Mineralibus commune habent, 10. b.
- Terræ* quid per Chymiam ex illis possit separari 710. b.
- Terra* Catechu quid & ejus usus 815. a.
- Terra* Japonica ejus usus 712. a.
- Terra* limosa an cum illa ferri generatio institui possit 710. a.
- Terra* sancta quid Chymicis dicatur 886. b.
- Terra* sigillata, v. Sigillata terra.
- Terrorum* abusus & noxa \* 238. b.
- Terrestrium* ulus in morbis infant. \* 547. a.
- Terroris* vis \* 95. b.
- Terror* choleram concilians \* 149. a.
- Terror* ad Colic. convuls. disponens \* 180. b.
- Terror* nocet gravidis † 995. b. † 1011.
- Terror* lacrimam alterans \* 350. a.
- Terror* matris parvi nocens \* 117. b.
- Terroris* vis in peste † 359. a. † 361. a.
- Terror* sanguinis stagnationem & asthma inducens † 195. b.
- Terror* syncopen inducens † 388. b.
- Terrores* nocturnos cohibet Smaragdus \* 155. a. v. Pavor.
- Tertianaria* cujus usus 552. a.
- Tessella* quid \* 636. a.
- Testa ovorum* lithontripr. † 645. a.
- Testes*. *Testiculi*. Eorum consensus cum capite \* 179. a.
- Testium* & pulmonum consensus † 697. b.
- Testium* laxior & flaccidior structura † 898. b.
- Testiculi* situs præternaturalis † 173. a.
- Testium* defectus, situs mutatus, retractio, occultatio &c. † 899. a. † 902. b.
- Testiculi* retractio in nephritide unde \* 290. a.
- Testium* structura muliebrium 109. a. † 948. a.
- Testium* hernia flatulenta † 903. b. Hydrocele 94. a.
- Testium* inflammatio, & tumor, ejus causa, diagnosi, prognos, cura † 902. a. b.
- Testium* inflammatio in morbo gall. † 456. a.
- Testium* vim genitalem imminuentia † 921. a.
- Excisio* testium in sarcocoele &c. † 907. b. in hydrocele † 905. b.
- Testiculorum* spasmus in nephritide † 636. b.
- Testium* scirrhus † 905. b. ejus causa, diagnosi, prognos, cura † 906. a.
- Testium* torpor & languor unde † 898. a.
- De *testis* tumore casus & observ. \* 411. b. \* 417. a.
- Testudo* cujus usus in Medicina 697. a.
- Testudinum* ulus hædicus † 317. a.
- Testudo*, talpa seu lupia, qualis tumor, ejusque cura chirurgica \* 30. a.
- Tetanus* quid † 802. a. b.
- Tetanus* capitis cum vomitu inveterato matutino in chlorosi incipiente \* 521. b.
- Tetanus* totius corporis ex colica † 161. b.
- Tenuinum* cujus usus 553. b.
- Texturae* simplicium mutatio artificialis \* 241. a.
- Thee* ejus præparata & usus 552. a.
- Thee* cui agrypniam conciliet † 703. b.
- Thee* usus antiscorbuticus † 500. a.
- Thee* ingenio læso medetur \* 843. a.
- Thee* usus in confortanda memoria † 854. b.
- Theoria Medica* multis obnoxia defectibus \* 78. a. ejus exaltatio † 2. a. \* 79. a. circa eam observanda † 2. b.
- Therapoeica* quid 143. b.
- Theriaca* ejus compositio 902. a. qualis mixtura † 334. a. \* 624. a. b.
- Theriace* ingrediens opium \* 572. a.
- Theriace* virtutes \* 138. b.
- Theriace* laus in diarrhoea † 109. a.
- Theriace* usus in febr. † 279. b.
- Theriace* usus in febr. mal. \* 247. b.
- Theriacalium* ulus in peste † 371. b. &c.
- Theriacales aquæ* in peste † 364. a.
- Therma* unde oriuntur 718. a.
- Thermarum* varietas unde 179. a.
- Thermarum* efficacia \* 79. a.
- Thermarum* balnea \* 712. b.

Therma

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

**Thermæ** quibus proficiunt vel noceant: 719. b.  
**Thermarum** utendi modus. 720. a.  
**Thermarum** usus contra obesitatem \* 835. a.  
**Therma artificialis** quomodo paranda 720. b.  
**Thlapi** ejus præparata & usus. 553. a.  
**Thoracis** structura & motus in respiratione \* 724. a.  
**Thoracis** apertio in empyemate † 603. a.  
**Thoracis** convulsio ex sternutatione † 805. a.  
**Thoracis** partium internarum inflammationes † 560. b.  
**Thoracici** ductus vulnera an lethalia \* 36. b.  
**Thymus** ejus usus. 608. a.  
**Thymus** cuius usus in Medicina. 697. b.  
**Thymi** in pudendis \* 31. a.  
**Thymia** cuius usus. 554. a.  
**Thym. Seide.** 626. a.  
**Thymus** ejus usus. 553. b.  
**Tibia contracta** in somno palpitacionis cordis causa † 382. a.  
**Detibiz** exostosi casus & obf. \* 400. b.  
**Tibiarum** ulcera sponte enascentia \* 284. b. sq.  
**Tilia** ejus præparata & usus. 554. a.  
**Timor** abortus causa † 1011. b.  
**Timor** melancholicorum delirantium † 864. b.  
**Timor** syncopen concilians † 387. a. v. **Me-  
tus.**  
**Tinctura** quid. 193. a. 829. b. \* 452. a.  
**Tinctura** Animonii genuinæ multum tribuitur \* 79. b.  
**Tinctura** antimonii Valentini cui usui † 5. b.  
**Tinctura** bezoardica. 899. a.  
**Tinctura** Hollatica virtutes † 459. b.  
**Tinctura** lili Paracelsi magni æstimata \* 79. b.  
**Tinctura** Solares legitimæ cui usui † 5. b.  
**Tinctura** tartari vid. tartarus.  
**Tinctura** 8. vid. 8.  
**Tinctura** vitrioli Martii Zvvelfferi \* 126. a. v. color.  
**Tinea capiti**; casus & obf. \* 437. a.  
**Tinearum** causa † 346. a.  
**Tinea capillorum** cura † 552. a.  
**Tinea infantum**, sive lumbrici lani infantum † 1093. a.  
 a. cum causa, prognosi & cura † 1097. b. sqq. \* 53. a. \* 550. b.  
 De **Tinea** infantis casus & obf. \* 434. b.  
**Tinea** infantum resistens lotio \* 657. a.  
**Tinea** cuius usus in Medicina 697. b.  
**Tinea** usus in ictero † 454. a.  
**Tinnitus** aurium in lue vener. † 456. a.  
 quomodo tollendus † 477. b.  
**Tinnitus** aurium in vertigine † 794. b.  
 v. aurium sonitus.  
**Tinillationem** præ cæteris in corpore humano sentientia tria loca \* 239. a.  
**Tobusche** † 877. b.  
**Tonica** convulsæ † 802. a.  
**Tonitru** quid. 723. a.  
**Tonsillarum** inflammatio † 538. b. cura † 544. a.  
 In tonsillarum inflammat. gargarismus \* 660. a. b.  
**Tonsillarum** suppuracionis cura † 547. b.  
**Tonsillarum** tumores discutientia † 547. a.  
**Tonum** quid † 802. a.  
**Tophi** ab arthritide &c. † 777. a. eorum cura † 782. a.  
**Tophi** à lue venerea quomodo curandi † 476. a.  
**Tophi** prodagrici unde \* 111. a.

**Tormenta**, Eorum explosio in peste † 364. a.  
**Tormentill.** 554. b.  
**Tormentilla**, ejus præparata & usus. 554. b.  
**Tormina** convulsiva \* 181. b.  
**Tormina** ventris à Diarrhoea † 112. a.  
 v. abdomen, alvus, intestina, venter.  
**Tormina** infantum, eorum causa & cura † 1075. a. sqq. \* 536. a. \* 548. a.  
 De **Torminibus** infantis casus & obf. \* 383. b. \* 365. b.  
**Spermatis** ceti usus in tortminibus infantum \* 704. a.  
**Torpedo** piscis torporem inferens † 844. a.  
**Torpor** † 15. a.  
**Torporem** causantia \* 814. a.  
**Torpor** in lue venerea † 455. b.  
**Tortura** oris, v. spasmus Cynicus.  
**Tractionis** & pulsionis differ. \* 740. a.  
**Tractiones** in epilepsia † 809. b.  
**Tranche** eorumque præscriptio \* 649. b.  
**Tragacantha** ejus usus. 609. a.  
**Tragea** quid? \* 633. a. dosi \* 633. a.  
**Tragea** delicatior \* 633. b.  
**Tragea** grossæ earum compositio & usus. 861. b.  
**Tragopogon**, ejus usus. 555. a.  
**Transcolatione** facta separatio \* 126. b.  
**Transfusio** chirurgica ortus, inventio, occasio, progressus, experimenta \* 85. a. sq. an veteribus cognita \* 86. b. triplex ejus differentia, modus &c. \* 86. b. Finis. I. corpus rationes suadentes \* 87. a. consideranda ad ejus examen & applicationem, & quæ noxia saluberrime sunt \* 89. b. ejus usus & abusus \* 96. a. est possibilis, sed contra naturæ institutum ibid. extra sanitatis dispendium & extra vitæ periculum vix potest applicari \* 97. a. ad longævitatē & rejuvenescētiā, & vires restaurandas &c. fecit \* 97. a. an per eam magnetismus seu consentus & conspiratio mutua possit inter duos propter mutuum sanguinis commercium introducti \* 98. a. Pro viris sanguinis morbois corrigendis ratiōis, idque emolumento non adeo insigni locum habere videtur \* 99. a. activa, passiva alteratio ex inde \* 99. b. Pro viris partium solidarum restituendis nil valet \* 100. b. In febrium cura nullus ejus est locus \* 101. b.  
**Tempus**, quo instituuntur \* 104. a.  
**Transfusoria** chirurgiā nil confert Hypochondriacis, cachecticis, scorbuticis, ictericis, cordisque palpitacione laborantibus \* 105. a.  
 An confert **Melancholicis** & **Maniacis** \* 106. b. nil confert in Inflammationibus, indeque natis abscessibus & exulcerationibus partium \* 108. a. Hemorrhagiis nimis obnoxii præ aliis conducit \* 109. a. an h. valeat consequentia à brutis ad hominem \* 109. b. nil confert contabescētiis & atrophia correptis \* 110. a. nec arthriticis \* 111. a. parum conducit epilepticis \* 112. b. nil juvat scabiosos, leprosos, lue Venereæ affectos \* 114. b.  
**Transmutatio** materiæ in aliam v. y. aquæ in plantam, non potest determinari. 22. b.  
**Transplantatio** quid \* 80. a. sq. v. **Magnetica** cura  
**Transplantatoria** cura doloris dentium † 755.  
**Transpirabilis** est totum corpus \* 181. a.  
**Transpiratio** an simpliciter fiat à calore \* 217. a. an hyemali tempore minor ibid.

# INDEX UNIVERSALIS

- Transpirationis insensibilis \* 805.  
 Transpiratio insensibilis quid. 84. a.  
 Transpirationis insensibilis fiendi modus. 84. a. b.  
 Transpirationis insensibilis usus. 86. a.  
 Transpiratio assumptorum insensibilis \* 745. a.  
 Transpiratio facta in utero paucissima \* 743. b.  
 Transpirationis infantum oclusio † 1064. b. quam noxia \* 529. a.  
 Quomodo promovenda † 1065. a. \* 545. a.  
 Transpiratio prohibita febres introducens † 249. a.  
 Transpiratio insensibilis deficientes est causa Anasarcae. 84. b.  
 Trauben-Kraut. 422. b.  
 Tremor in cholera \* 150. b.  
 Tremor convulsivus qualis affectus, ejusque causa † 802. a. † 821. a. Diagnos. prognos. † 822. b. Cura † 823. a.  
 Tremor cordis † 379. b. ejus pars affecta, causa † 380. a. differentia ab ejus palpitatione † 379. b. sq. Diagnos. † 382. b. Prognos. † 383. a. Cura † 383. a. b. sqq.  
 Tremor manuum & pedum in epilepsia unde \* 301. a.  
 Tremor in febribus quid, unde &c. \* 202. a.  
 Tremor post mensium emanationem naturalem 165. b.  
 Tremor in paralyti bonum signum † 845. a.  
 Tremoris membrorum in peste cura † 378. b.  
 Trepanatio in cranio fracto vel fiso \* 52. b.  
 Trepanationis usus in cephalalgia à luc Gall. † 477. b.  
 Trepanatio in delirio melancholico † 873. a.  
 Trepanatio capitis in empyemate † 603. a.  
 Trepanatio maniacorum † 881. b.  
 Trichomanes cujus usus. 555. b.  
 Trifolium aquaticum, ejus preparata & usus. 555. b.  
 Trigonum \* 432. a.  
 Triplicitatum doctrina astron \* 441. a. b.  
 Tristitia abortus causa † 1011. b.  
 In epilepsia habituali unde \* 278. a.  
 Cur se exferat in stomacho \* 137. a. b.  
 Syncopen inferens † 388. b.  
 Tabem concilians † 394. b.  
 v. moror.  
 Triticum, ejus preparata & usus. 555. b.  
 Tritici vis nutrienda \* 827. b.  
 Tritus inunctionum \* 662. b.  
 Trochisci eorum compositio. 845. a.  
 Trochiscorum loco, pilularum usus externus \* 639. a.  
 Trochisci magistralles rari usus \* 631. b.  
 Trochiscorum de Carabe perstantia \* 160. a.  
 Troglitis passer, ejusque usus medicus 689. b.  
 Trutta, cujus usus in Medicina 694. a.  
 Tubera Cervina vid. Cervus.  
 Tubercula cordis & pericardii † 380. b.  
 Tubercula in febre mal. † 319. b.  
 Tubercula ex luc Gallica † 472. b.  
 Tubulimartini \* 448. a.  
 Tubulus Urinarius v. Urinarius tubulus.  
 Tubulus uterinus. vid. uterus.  
 Tulpis scripta † 28. a.  
 Tumiditas partium carnosarum à calore ducto \* 744. b.  
 Tumor in genere quid \* 1. b.  
 differt ab abscessu & excrecentia \* 37. a.  
 ejus causa \* 3. a.  
 lapides, crines, pediculi &c. in non omnibus \* 3. a.  
 quomodo fiant stagnatione \* 3. a.  
 ejus cura \* 4. b. lqq.  
 Apertio tumoris si vel sponte natura vel arte, & quomodo \* 5. b.  
 remedium tumoribus applicandorum triplex classis \* 6. a.  
 diaphoretica tumoribus applicandi modus \* 8. b.  
 Tumor sequitur dolorem † 45. a.  
 Tumor partis in inflammatione & obstru-  
 ctione \* 281. b.  
 De tumoribus partium castus & ob-  
 stru. 155. a.  
 Emplastrum contra tumores \* 632. b.  
 Tumores recidivantes eorumque causa, ef-  
 fectus, cura medica chirurg. \* 29. b. lqq.  
 Tumor abdominis v. abdomen.  
 Tumor in abscessu mesenterii \* 237. b.  
 Tumor in arthritide unde \* 305. a. b.  
 Tumores cistici unde \* 3. b. \* 16. a.  
 Tumor crurum v. Crurum tumor.  
 Tumores Gallici morbi † 436. a. † 471. a. lqq.  
 Decoctum in tumoribus glandularum &c. \* 657. a.  
 Tumores hydropicorum repressio † 442. b.  
 Tumor inflammatorius † 335. a.  
 Tumores ex lymphæ vicio, s. serosi, eorum pro-  
 gnosis & cura \* 21. a.  
 Tumor œdematosus & serosus unde \* 3. a. v.  
 œdematosus tumor.  
 Cataplasma contra tumores serosos \* 638. b.  
 Tumor pedum œdematosus in cachexia scabi-  
 osa \* 268. a. eorum generatio sub morbi  
 cursu ibid. b.  
 Tumores pestilenciales † 360. b. lqq.  
 Tumores sanguinei, eorumque causa, Pro-  
 gnosis, diagnosi, cura \* 10. a.  
 Tumor ex stagnatione sanguinis &c. † 181. b.  
 Tumores vasorum sanguineorum \* 32. b.  
 Tumores sanguinei, serosi, in podagra &c. \* 268. b.  
 Tumorum scorbuticorum cura † 517. b.  
 Tumores testium † 902. a. lqq. v. testes.  
 Tumor testis œdematosus in gonorrhœa vim-  
 lenta \* 311. a.  
 Cataplasma ad tumorem testis ex contusione  
 \* 58. a.  
 Epithema contra tumorem testis inflama-  
 torium cum insigni dolore & ardore \* 642. a.  
 Tumores post variolas &c. † 357. b.  
 Tunica oculi considerata † 719. b.  
 Tunica corneæ vitæ † 722. b.  
 Tunica retinæ lesiones † 730. a.  
 Turbit mineralis ejus usus. 891. a.  
 Minerale Crollii & ejus usus † 11. a.  
 Turgescentia symptomatice in febre. † 253. b.  
 Turgescentiæ humorum non præcipitatio, sed  
 nudæ temperatio opponenda \* 585. a.  
 Turpethum ejus differ. preparata & usus. 634. b.  
 Turcar cujus usus in Medicina. 690. b.  
 Turandarum usus in vulneribus & paradi raris  
 43. b. \* 51. a.  
 Turundæ per os rejectæ; cur hodie filis alligen-  
 tur † 226. b.  
 Tussis febris unde dicitur † 250. a.  
 Tussilage ejus preparata & usus. 336. b.



# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

**Tussis** quid, quomodo fiat, ejus causæ \* 198. b.  
 † 223. b. differentia, ibid. & seqq. Pars af-  
 fecta † 24. b. Metallifossorum † 225. a.  
 an destillet materia ex capite in laryngem  
 ibid. † 227. a. per os in tussi humida eje-  
 cta an ex pulmonibus † 226. a. Signa an  
 humida sit, ex pectore, stomacho aut nervis  
 † 227. a. catarrhalis † 227. b. sq. cur talis  
 nocturno tempore magis affligat † 228. b.  
 Tussis infantum Quinta dicta Parisiis, ibid.  
 prognos. † 229. a. cura † 229. b. seqq.  
 De tussi casus & observationes \* 346. b. \*  
 349. b. \* 352. b. \* 365. b. \* 374. b. \* 464. a.  
 Tussim mirè levat succus iaphani † 205. a.  
 Tussi prodest sperma ceri \* 706. b.  
 Tussis abortus causa † 1011. b.  
 Tussis urinae in continentiam inducens † 664. b.  
 De tussi ex aquæ fortis odore casus & obs. \*  
 435. a.  
 An ex stomacho tussis oriri possit \* 199. a.  
 Tussis asthmaticorum † 196. b.  
 Tussis catarrhalis † 279. b.  
 De tussi chronica pertinaci casus & observat.  
 \* 345. b. \* 354. b.  
 De tussi chronica puellæ casus & obs. \* 361. a.  
 De tussi convulsiva casus & obs. \* 414. b.  
 Tussis in coryza an à pulmonibus \* 228. a.  
 Tussis in empyemate † 61. b.  
 Casus & observ. de Tussi Epidemica \* 373. a.  
 Tussis in febr. cura \* 206. a.  
 Tussis ferina † 236. a.  
 Pilulæ in tussi ferina nocturna ex lymphæ acro-  
 ri \* 639. a.  
 Decoctum in tussi à frigore externo \* 651. b.  
 Tussis gravidarum cum curatione † 1003. a.  
 De tussi humida pectorali, casus & observ. \*  
 329. a. \* 398. b.  
 Tussis infantum † 1095. b. ejus causæ, dia-  
 gnosis, prognos. cura † 1096. a. b. \* 517. b.  
 \* 549. b.  
 De Tussi infantis casus & obs. \* 347. b. \* 363. b.  
 De tussi pectorali cas. & obs. \* 401. a.  
 Tussis phthisicorum pulmonalis, stomacha-  
 lis † 400. a.  
 Tussis phthisicæ cura † 408. a.  
 Pilulæ in tussi ex phthisi \* 639. a.  
 Tussis in pleuritide † 564. b. 565. a. in pleu-  
 ritide vera \* 276. a.  
 Tusses sicæ unde \* 226. a. phthisin post se  
 relinquunt \* 226. a.  
 De Tussi sicca casus & observ. \* 330. a.  
 Tussis sicca in coryza magis affligens, cur \*  
 228. b.  
 Tussis sicca sive acida in inflammatione hepa-  
 tis † 575. b.  
 Rosulæ contra tussim siccam nocturn. \* 636. a.  
 Tussis sicca stomachalis \* 199. a.  
 De tussi stomachali casus & observat. \* 367. b.  
 \* 387. b. \* 405. a.  
 De tussi stomachali contumaci casus & observa-  
 tiones \* 367. b.  
 De tussi stomachali ferina humida consultatio  
 \* 198. a. seqq.  
 Tussis in variolis & morbillis \* 252. b. ejus  
 cura † 353. b.  
**Tutis** ejusque usus 791. b.  
**Tympanitis** ex colica † 161.  
**Tympanitidi** occurrens spir. nitr. † 169. b.  
**Tympanum.** Ejus lationes † 735. a.

**Tympani** latio in tinnitu aut, † 739. b.  
**Tympani** excretio † 78. a.  
**Typhodes** febris † 288. a.  
**Typhodia** † 707. a. seqq.  
**Typhodia** † 707. a. seqq.  
**Tyrombus** difficultas sunt explicanda † 2. b.  
 V.  
**Vacca** quid conferat ad Medicinam 647. b.  
**Vacuum** an detur \* 738. a. \* 740. b. \* 741. a.  
**St. Valtens** Krankheit \* 780. a.  
**Vagina** uteri substantia porosa, membranoso-glan-  
 dulosa † 249. b.  
**Vaginæ** uterinæ angustia, ejus causa, cura †  
 974. a. b.  
**Vaginæ** uterinæ latio post partum \* 328. b.  
**Vaginæ** uteri ulcera Gallica † 473. b.  
**Instrumentum** Rhumelii loco pectorum vaginæ  
 uteri intrudendum \* 327. a.  
**Vagitus** infantis in utero dubius \* 753. b.  
**Valere** est demum vivere \* 818. a.  
**Valeriana** ejus præparata & usus 556. b.  
**Valeudinarium** infantile \* 524. a.  
**Valeudini** contraria tria \* 810. b.  
**Vannus**, in balneo \* 713. a.  
**Vapores** differ. à flatibus † 66. a.  
**Vaporum** è corporibus consideratio \* 805. a.  
**Vaporum** ascensus ad cor in Col. &c. † 181. a.  
**Vaporis** male olentis in ventriculum ascensio \*  
 140. b.  
**Vapores** in balneo Laconico excitandi modus  
 \* 657. a.  
**Vapores** pestilenciales † 359. b. v. gas, halitus,  
**Vapores** foris quid \* 654. b.  
**Vappescentia** unde \* 84. b.  
**Vari** Scorbutici † 484. a.  
**Varices** \* 32. b. quid 33. b. earum causæ, dia-  
 gnosis, prognos. cura \* 34. a. b. Tumoris  
 & exulcerationis earum cura \* 34. b.  
**Varices** gravidarum, cum cura † 1008. a.  
**Varices** in venis † 386. a.  
**Varuosa** hernia, ejus diagnosi, prognos. cura †  
 908. a. b.  
**Variola** & morbilli † 34. b. an necessario & se-  
 mel tantum affligant † 544. a. læpe ferus  
 cum illis ex utero egreduntur ibid. Infantes  
 præsertim is corripuntur † 45. a. quo-  
 modo differant variola à morbillis † 345. a.  
 † 346. b. symptomata ibid. Tempus ebul-  
 litionis & expulsionis † 345. b. Malignitas  
 † 345. b. Multiplicitas & divisio. † 345. b.  
 Pars affecta † 346. a. causæ 346. a. morbus  
 afficiunt continguineos etiam distitos †  
 346. a. etiam scabiolos afficiunt † 346. b.  
 An etiam veteribus Græcis cognita † 346. b.  
 Varietas ratione rerum non natura-  
 lium, ætatis, nationum &c. † 346. b. in al-  
 tera parte morbilli, in altera variolis affi-  
 cta † 347. a. Diagnos. † 347. a. Prognos-  
 is † 347. b. Tempus eventus, quatenus in-  
 testiciant, sunt infectæ inpr. oculis, alia diu-  
 terna mala sæpe inducunt † 349. a. Cura †  
 349. a. Dieta † 351. a. Præservatio † 351. b.  
 Symptomatum cura † 353. a. Symptomata  
 post eruptionem, eorumque cura † 354. a.  
 \* 257. a. seqq. Retrocessus, cicatrices & so-  
 vez † 354. a. maculæ & Navi † 354. b. ne  
 faciem obideant variol. † 354. b. &c. &c.  
 2 2 Variolæ



# INDEX UNIVERSALIS

Spiritus Vegetabilium ubi sunt 109.  
 8 6. a.  
 et Vegetabilium facilius transmutantur  
 dus 389. a.  
 effluuii quibz 421. b.  
 emulsi / Veneficis / 421. b.  
 407. b.  
 Vena (V. arteria) periculis 421. b.  
 le 85. a.  
 Venarum obstructio 118. b.  
 Venarum ruptio in pueris 118. b.  
 Venarum & arteriarum, videri, et  
 gnosis & cura 119. a.  
 Venarum lacer. & Vasa lacer.  
 Vena portæ quâ ratione aratur 119. b.  
 na scissis cui osi 119. b. 119. b.  
 Vena scissio quâ ratione aratur 119. b.  
 Vena scissionis locus pro vna arteria  
 averfionis 154. a. 154. a.  
 Vena scissionis celebranda tempus 154. a.  
 An delectus venarum in venarum scissio  
 dus 16. a.  
 Venæsectione emitti sanguis 16. a.  
 Venæsectione emitti sanguis in pueris  
 mittat 155. a. b.  
 Venæsectionis vices in corpore quid obest 155. a.  
 Venæsectionis loco possunt emitti  
 bitula scissificatæ, hircudines, locustæ  
 156. a. b.  
 Venæsectionem ineptam sequitur contritio  
 brachii 180. a.  
 Cataplasma contra tumorem brachii  
 la vena in V. S. 45. b. a.  
 Hæmorrhagia ex venæsectione  
 49. b.  
 Venæsectionis usus in præcordiis  
 1012. a. 1013. a.  
 Venæsectionem ineptam sequitur  
 35. b.  
 Venæsectionis usus in Angina 174. b.  
 usus in asphyxia 174. b.  
 usus in arthritide, podagra &c. 177. b.  
 178. b. 180. a.  
 usus in asthma 180. b.  
 usus in affectu catarrhalibus &c. 181. b.  
 usus in catarrho suffocativo 180. a.  
 usus in cephalalgia 187. b.  
 usus in chlorosi cum vomitu & pituita cap.  
 326. b.  
 Venæsectio an in cholera conveniat 181. b.  
 usus in delirio melancholico 181. b.  
 usus in epilepsia 182. b.  
 Venæsectionis usus & abusus in  
 187. a. 187. b.  
 usus in febribus, præsertim  
 187. b.  
 usus in febre. mal. 187. a.  
 Venæsectio gravidarum 187. a.  
 usus in hæmoptysi 187. a.  
 usus in hæmorrhagiâ 187. a.  
 usus in hæmorrhagiâ uteri 187. a.  
 Venæsectio in hæmorrhoidibus  
 tus est status 187. a.  
 peris &c. 187. a. 187. a.  
 Ejus usus in 187. a.  
 usus in 187. a.  
 187. a.



## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- usus in lue venerea † 466. a.  
 usus in mania † 881. b.  
 usus in mensibus nimis † 939. b.  
 usus in mensum suppressione † 932. a.  
 usus in obesitate \* 836. a.  
 usus in ophthalmia † 592. a.  
 usus in palpitatione cordis † 383. b.  
 usus in Petechiis † 340. b.  
 usus in phrenitide † 861. a. b.  
 usus in plethora ad vires 123. a.  
 Venæsectionis usus in pleuritide † 567. b. \*  
 279. b.  
 Venæsectio an conducat scabiosis &c. \*  
 127. b.  
 Ejus usus in scorbuto & mal. hypoch. †  
 489. b.  
 an illa in stomachi inflat. &c. conducat \*  
 136. a.  
 an in variolis & morbillis † 350. a.  
 Venæsectionis usus in vertigine † 799. a.  
*Venas Baar.* 379. b.  
*Venationis* amans melancholicus \* 107. a.  
*Veneficium* pestem inducens † 360. a.  
 v. fascinatio, incantatio.  
*Venenorum* & venenatorum consideratio \* 800. b.  
 Venenorum natura & essentia in quo consi-  
 stat \* 461. a.  
 Veneni malignitas in quo consistat \* 154. a.  
 eirefistentia ibid. corrigentia ibid.  
 Venerorum per alexipharmaca correctio \*  
 248. b.  
 Venenorum correctio in non-venena \* 846. a.  
 Venena vegetabilium corrigunt alcalia †  
 130. b.  
 Venena præparata evadunt non venena \*  
 461. b.  
 Venena quomodo inficiant † 325. a.  
 Venena quomodo operentur \* 154. a.  
 Venenum inebriativum Helmont. † 711. a.  
 Venena in corpore recepta cur tamdiu latere  
 possint \* 800. a.  
 Veneni contagium communicatum per sali-  
 vam, vestes &c. † 885. a.  
 Veneni vis in excitandis lipothymiis † 388. a.  
 Veneni attractio per panem † 368. a.  
 Venenorum assumptorum per os cura \*  
 808. a.  
 Venenum animalium in quo consistat †  
 885. a.  
 Venent animatorum vis operativa an in con-  
 tagio materiali consistat, an in imagine cu-  
 jusdam affectus \* 154. b.  
 Venena animalium non potu aut esu, sed vul-  
 nere nocent \* 487. b.  
 Venenorum ab animalibus communicatorum  
 cura \* 808. a.  
 Venena viperarum, bufonum &c. corporis in-  
 tumescientiam conciliantia \* 821. a. b.  
 Venenis obviantia † 5. a. v. Philtrum.  
 Venenatum aliud est, aliud noxium \* 461. b.  
 Venenatis armis, globulo, morsu animalis  
 &c. inflictum vulnus \* 48. a. b.  
 Venenatorum animalium morsus cum cura †  
 884. b.  
 Morsus ab animali venenato & inde nata ra-  
 bies \* 856. a.  
 Venenata animalis mortua nullo modo sunt  
 venenata \* 466. b.  
 Venenosa contagia, v. contagia.  
 Venenosum quodlibet corpus naturale esse,  
 falsum \* 461. a.  
*Venerca lues*, v. in Venus.  
*Venter.* Ejus dolores † 88. b.  
 dolores in inflamm. hepatis † 576. a.  
 dolor in pleuritide † 565. a.  
 inflatio in Mesenterii abscessu † 556. b.  
 v. flatus stomachi.  
 Ventris Rugæ puerperarum † 1044. a.  
 Ventris tormina gravidarum † 1000. b. eo-  
 rum cura † 1001. a.  
 Ventris tormina infantum † 158. b. † 164. b.  
 Ventris tumor in Hepatitide † 576. b. sqq.  
 v. alvus, abdomen &c.  
*Ventriculus* quo sensu sanitatis & morborum limen  
 dicendus 124. a.  
 Ventriculi consensus cum cerebro † 701. a.  
 consensus cum cute, & aliis partibus membra-  
 naceis \* 572. b.  
 Ventriculi fermentum pro varietate animalium  
 variat. 56. a.  
 fermentum est acidum. 55. a.  
 Ventriculus amara maximè lædunt \* 129. a.  
 Ventriculus musculosus facit homines rumi-  
 nare cibos. 51. b.  
 Ventriculus duplex in avibus ibid.  
 Ventriculus quadruplex in quibusdam ani-  
 malibus ibid.  
 Ventriculi abscessus cura † 553. a.  
 In ventriculi æstu bolus alterans \* 634. b.  
 v. ardor.  
 Epithema pro ventriculo in cholera \* 641. b.  
 Ventriculi dolores & scirrhus † 83. b. pun-  
 ctorius † 87. a.  
 Ventriculi inflammatio † 87. b.  
 Rotulæ contra inflationem ventriculi \* 636.  
 a. v. flatus stomachi.  
 Ventriculi intemperies frigida \* 513. b.  
 Ventriculi inversio † 121. a.  
 Consultatio de spasmō orificii superioris ven-  
 triculi à fungis \* 137. a.  
 Ventriculi ulcus curatum † 118. b.  
 Ventriculi vulnere lethalitas \* 36. a.  
 De ventriculi vulnere casus & obs. \* 424. b.  
 Cataplasma in ventriculi variis symptomati-  
 bus \* 658. b.  
 Sacculus pro ventriculo \* 655. b. v. Stoma-  
 chus.  
*Ventus* consideratus \* 746. a.  
*Venus* nata ex maris spuma \* 446. b.  
 Orgasmus venereus s. aura genitalis sub puber-  
 tatis annis masculos & foeminas immu-  
 tans \* 324. b.  
 Veneris usus insignis \* 79. b.  
 Venereus appetitus auctus † 954. a.  
 Venereum appetitum nimium compescencia  
 † 898. a. † 921. a. v. Coitus.  
 Venerci appetitus defectus, ejusque causæ, dia-  
 gnosis, prognosis, cura † 953. a. sqq.  
 Venerem roborantia † 918. a. sqq.  
 Venerem stimulantia † 922. b.  
 Venus flagris excitata † 909. b. \* 917. a.  
 Venerem excitans lac muliebre \* 827. b.  
 Venerea vis spermatis ceti \* 702. b.  
 Veneris abusus noxius † 898. b.  
 Venus nimia vitam brevem reddit \* 89. b.  
a a Venus



# INDEX UNIVERSALIS

- Venus oculis infesta* † 730. b.  
*Venus agrypniam concilians* † 703. a.  
*Venerco in actu convulsio* † 802. b.  
*Veneris exercitium gravidis vitandum* † 995. a.  
*Venerca exercitia nimia tabem inducentia* † 395. b.  
*Venus imminuta corpulentia* † 828. a.  
     v. genitura, Salacitas &c.  
*Venerca lues triplici modo se propagans* \* 312. b.  
     De lue venerca casus & obs. \* 342. b.  
     Luis venerca in grvida cura † 465. b.  
     Balnei fumidi ulus in venerca lue \* 711. a. sudorem promoventia \* 716. a.  
     Infusionis usus in lue venerca \* 505. b.  
     v. Lues Venerca.  
*Venus*, vid. Cuprum.  
     Primum ens veneris. 334. b. seq.  
*Verbascum*, ejus præparata & usus. 557. a.  
     Verbalci usus in tenesmo † 139. b.  
*Verbena*, ejus præparata & usus. 558. a.  
*Verbera*. De iis casus & obs. \* 343. b. \* 368. b.  
*Verbrechen*. Verbera. Deus \* 335. a.  
*Vergift mein nicht*. 396. a.  
*Vermes intestinorum*, triplicis differentia † 153. a. eorum causa ibid. Diagnofis † 153. b. cautela, ne intestinula lumbricorum cum eorum fœtura confundantur ibid. a. sunt interd. fatis longi ibid. a. erosio ani exinde † 154. a. Prognofis † 154. a. eorum fuga malum signum ibid. Cura † 154. a. seq. Pueris maximè sunt familiares & scorbuticis ibid. a. b.  
     De Vermibus casus & obs. \* 339. a. \* 340. b.  
     Vermes an inducere queant appetentiam caninam † 40. b.  
*Laxativus bolus contra vermes* \* 634. a.  
     v. Lumbrici, crinones &c.  
     Putredinis Consequens in animalibus vermes; in Vegetabilibus situs unde 364. b.  
*Vermes aurium* † 758. a. Muscæ ingressæ & vermiculi ibid. † 760. a.  
*Vermes cordis*, pericardii † 380. b.  
*Vermium in dentibus generatio* † 752. a. b. cura † 756. a.  
     Contra Vermes Infantum ▽ hermetica. 1016. b.  
     Vermes ad Pleuritidem disponentes † 562. b.  
*Vermiculi in sanguine febricitantium quid designent*. 916. a. b.  
     Vermes syncopen inferentes † 388. b.  
     Vermis umbilicalis infantum, ejus Diagnofis, cura † 1095. a. b.  
*Vermicularis*, ejus præparata & usus 558. b.  
     Vermicularis usus vomitorius † 11. a.  
*Verminatio in morbis malign. &c.* † 322. a.  
*Vermiosa pleuritis* cura † 575. a.  
*Vernacula, remedia*, vid. Remedia.  
*Vernum tempus non levem humorum motum in corpore excitat* \* 147. b.  
     Verno tempore cur obefiores simus \* 827. a.  
*Vernunft-Kraut*. 386. b. † 876. b. † 882. b.  
*Veronica* ejus diff. præparata & usus 559. a.  
*Verstopfung des kleinen Gedrers* † 478. a.  
*Verruca*, qualis tumor, earumque cura † 387. a. \* 30. b.  
     Verruca in Gallico morbo † 456. a. † 473. a.  
     Verruca linguæ curata \* 28. b.  
     Verrucarum pensilium cura \* 31. a.  
     Verrucæ excrefcen-tia cordis &c. † 380. b.  
*Vertebra*. De earum luxatione casus & obs. \* 341. a.  
     Vertebrarum dorsi contorfio † 82. b.  
     Vertebrarum dorsi contorfionem comitantia symptomata \* 133. b.  
     Dorsi vertebrarum contorfio asthma inferens † 197. b.  
     Dolor circa vertebrae dorsi in cardialgia \* 137. b.  
     Consultatio de subluxatione vertebrarum dorsi \* 334. b.  
     Vertebrarum dorsi vulnus non lethale \* 37. a. b.  
     Vertebrae colli intra & dorsi inflitum vulnus an lethale \* 37. b.  
*Vertex*. Epithema contra verticis pertinacem dolorem \* 641. b.  
*Vertigo* qualis affectus; triplex ejus gradus, pars affecta † 794. a. b. Causæ † 795. a. seqq. fiendi modus 796. b. † 797. a. Diagnofis, prognofis, cura † 798. a. b.  
     De Vertigine casus & observ. \* 345. b. \* 417. b. \* 437. b.  
     Infusionis usus in Vertigine \* 499. a.  
*Werwerffen des trächtigen Viehes* † 1010. a.  
*Vesica* quare non irritetur ab urina intus contenta. 80. a.  
     Vesicalibus affectibus conducentia \* 296. a.  
     Vesicæ abfcessus prognofis † 583. b.  
     Vesicæ calculus, ejusque origo † 661. b. Diagnofis, prognofis, cura † 662. a. b.  
     Vesicæ colli, cervicis, vitæ † 657. a.  
     Vesicæ cervicis læfio in partu \* 328. b.  
     Vesicæ excretio læfa † 656. a.  
     Injeftio in vesicam exulceratam \* 661. a.  
     Vesicæ urinarie inflammatio, ejusque causæ, Diagnofis, prognofis, cura † 583. a. b.  
     Vesicæ paralytica † 656. a. Vermes, ulcera vesicæ † 656. b. structura ibid. a.  
     Vesicæ ulcus, ejus diagnofis, prognofis, cura † 584. a.  
     Vesicæ vulnera num lethalia \* 37. a.  
*Vesicatoria* 157. a.  
     peculiarem non constituunt formulam \* 662. a.  
     amplam vesicam excitantia, quid fignent † 362. a.  
     Vesicatoriorum usus in apoplexia † 834. a. \* 304. b.  
         usus in asthma † 208. b.  
         usus in affectib. catarrh. † 683. b.  
         usus in cephalalg. † 768. b.  
         usus in delirio melanch. † 873. a. b.  
         usus in febr. 271. a.  
         usus in febr. interm. \* 206. a.  
         usus in febr. mal. † 332. b.  
         usus in oculorum affectibus † 502. a. † 721. a.  
         usus in Petechiis † 341. a.  
         usus in phrenitide † 862. b.  
         usus in podagra † 782. a.  
         usus in tophis Gallicis † 477. a.  
         usus in vertig. † 799. a.  
*Vesicula* aquæ turgidæ viscerum † 691. a.  
     Vesiculæ crurum in hydrop. † 437. b.  
     Vesicula fellis, v. bilis.

Vesicu-

# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Vesiculæ elatæ* in Hypoch. dextr. in inflam-  
mat. hepatis † 576. a.
- Vesiculæ pestilenciales* † 360. b. † 361. b.
- Vesparum* puncturæ cum earum cura \* 48. a.
- Vesperi* cuius usus in Medicina 690. b.
- Vesperinum* tempus quibusd. morbis infestius \*  
228. b.
- Vestimenta* contagium propagantia † 457. a.
- Vestes phthysicorum* propagant malum in ge-  
stantes eas † 398. a.
- Vestimentorum* purgatio in peste † 365. a.
- Veternus* consideratus † 709. b.
- Venta* consilium in uteri hæmorrh. insufficiens \*  
322. a.
- Vibices* in peste † 362. a.
- Vicia*, ejus usus. § 59. b.
- Victorialis* cuius usus 560. a.
- Videntes* noctu † 719. a.
- An quod non videmus, non existat, nec cor-  
poreum sit \* 792. a.
- Vigilandi* impotentia diff. à nimio somno † 707. b.
- Vigilia* quid † 701. b.
- Vigilæ* in delitio &c. † 858. a.
- Vigiliæ* gravidarum † 1040. b.
- Vigiliæ* gravidis non conducunt † 995. a.
- Vigiliæ* nimix infantum, cum prognosi &  
cura † 1087. a.
- Vigiliæ* maniacorum † 877. a.
- Vigiliarum* in peste prognosis † 362. b. cura  
† 375. a.
- Vigiliarum* cura in variol. & morbill. † 353. b.  
v. agrypnia.
- Vinaceorum* infestus regimen \* 656. b.
- Vinca peruviana*, ejus præparata & usus. 560. a.
- Vincetoxicum*, ejus præparata & usus. 560. a.
- Vini* examen. 355. a.
- Vinum* quid, ejus genesis, perfectio ex musto,  
degeneratio, usus & abusus, it. præparata  
ex eo. 315. b. seq. 610. a. --- 614. a.
- Vini* vis inebriativa & partes constituentes \*  
812. a.
- Vina* maximè inebriantia quæ \* 813. b.
- Vini* acidum an ebrios reddat \* 813. b.
- Vini* aciditas quantum noceat. 121. b.
- Vinum* qd. acidum auget † 7. a.
- Vini* aciditas & calor mitigatur ab alcali la-  
pillorum cancrinorum \* 39. a.
- Vini* vis nutritiva juxta Hippocr. \* 520. a.
- Vini* fermentatio \* 83. a. seqq.
- Vinorum* duratio longior, brevior unde \*  
215. b.
- Vini* usus in arthritide † 775. b.
- Vina* calculum & parcin inducentia † 633.  
a. b.
- Vinum* convulsiones inducens † 808. b.
- Vini* usus in diarrhæa an prohibendus † 108. b.
- Vinum* febricitantibus an noceat, † 244. a.  
† 245. a. † 254. b. \* 205. a.
- Vini* usus sobrius in gravidis † 995. a.
- Vinum* fortum pellit † 1010. b.
- Vini* usus in peste † 364. a.  
usus in Petechiis † 341. b.
- Vini* abusus phthysin concilians † 397. b.
- Vini* usus in variolis & morbillis noxius †  
351. b.
- Avino* abstinentes olim \* 809. a.
- Vina* medicata præscribendi ratio \* 631. b. \*  
648. b. \* 649. a.
- Vinum absinthiacum* \* 649. a.
- Vinum cerasum* choleram inducens \* 149. a.
- Vinum Hadriani* Papæ † 685. a.
- Vinum Hippocraticum* \* 648. b.
- Vinum Hippocratis* in peste † 371. a.
- Vinum passulatum* † 315. b.
- Vini* Quinta essentia † 391. b.
- Vini* spiritus minus inebrians \* 814. a.
- Viola* purpurea, ejus præparata & usus. 560. b.
- Vipera* cuius usus in Medicina. 681. a.
- Viperina* Corona quid 909. b.
- Viperæ* usus in medicina † 334. b.  
ex ea remedia. 907. b. seq.
- Viperarum* usus in peste † 370. b.
- Viperæ* morsus est venenatus \* 48. a. \* 460. a.  
\* 800. b. Symptomata cū comitantia \* 461.  
b. Autorum de veneno viperino sententia  
\* 462. b. *Vipera* mortua nullo modo est  
venenata \* 465. a. *Vipera* tota est alexite-  
ria, nec nisi laccata, est venenata \* 468. a.  
*Vipera* irritata, & ad iram provocata con-  
cepto furore morsum infert venenatum \*  
469. a.
- Viperini* morsus signa diagnostica & progno-  
stica \* 473. b. methodus medendi \* 48. b.  
\* 474. b. seqq.
- Vir* bonus & civis bonus non differunt \* 446. b.
- Viri* admissio læsa in muliere † 974. a. seqq. v.  
virilis, virilitas.
- Vires* & spiritus pari passu ambulant \* 245. b.
- Virium* fundamentum † 323. b.
- Virium* conservatio ratione ætatum quomo-  
do instituenda 143. b.
- Virium* prostratio ejusque differ. † 386. a. b.  
causæ † 387. a. Diagnosi, prognosi †  
389. b. cura † 390. a.
- Vires* non semper per alimenta, &c. restitui-  
untur \* 109. b.
- Vires* restaurans sangv. transfusio \* 97. a.
- Virium* prostratio in cholera \* 150. b.
- Vires* in febr. mal. restaurantia † 330. a.
- Virium* lapsui ex hæmorrhagia conducit  
Transfusio sangv. \* 109. a.
- Virium* prostratio in peste † 360. b. † 362. b.
- Virium* prostrationis cura in variol. & mor-  
bill. † 354. a.
- Virga aurea*, ejus præparata & usus 565. b.
- Virginea* febris. † 309. b.
- Virgines adultiores* cur minus secundæ † 985. b.  
*Virgines* adultæ cur difficilius pariant †  
1019. b.
- Virginum* color pallidus † 958. a.
- Virgula*, v. penis.
- Viridis* color unde \* 152. b.
- Virilis* sexui proprii morbi † 897. a. seqq.
- Virilitas* quomodo tollatur † 898. a. b.
- Vis* locomotiva Magnetis ferri \* 555. a.
- Viscera* malè planetis comparantur \* 227. a.
- Visceribus* sangvis activè an quid conferat \*  
100. b.
- Viscerum* vitæ robur ex sangvine \* 227. a.
- Mutua* conspiratio viscerum & massæ  
sanguinea \* 94. a.
- Vis* us unum præ altero est robustius, servi-  
dus &c. † 181. a.
- Viscerum* temperies vitalis unde dependeat \*  
513. a.
- Antipraxia* viscerum † 181. a.

aa a

Viscerum

# INDEX UNIVERSALIS

Viscerum morbi quomodo assilant \* 100. b.  
 Viscerum exalteratio in pthisi unde cognoscenda † 399. a.  
 Viscerum intemperies inæqualis an detur \* 113. b.  
 Obstructionis viscerum tres canales † 151. b.  
 Viscerum obstructio in hydropse ut curanda † 439. a.  
 Viscerum tumor in hypochondri. † 480. a.  
 Viscerum vitia in eruditæ acida &c. \* 105. a.  
 Viscerum vitia in morbis chronicis † 90. b.  
 Viscerum abdominis consensus cum cerebro † 701. a.  
 Viscerum abdominis consensus cum renibus \* 179. a.  
 Viscerum abdominis obstructio † 181. a.  
 Viscerum laxitati convenit puerum † 120. a.  
 Viscerum mundificantia & consolidantia \* 653. a.  
 v. Intestina, alvus &c.  
*Visida cacochymia cura* † 9. a.  
*Visciditas in stomacho* † 81. a.  
*Visciditatem intestinum obstergentia* † 122. b.  
*Viscorum inguinalis usus in epilepsia* \* 300. a.  
*Viso quomodo peragatur* 93. b. 95. b.  
 Visio cur sit simplex, cum tamen oculus sit duplex. 96. a.  
 Visio geminata ex colica † 161. b.  
 Visio, senum qualis affectus † 718. b.  
*Visu quid.* 93. a.  
 Visus laciones † 718. a.  
 Visus imbecillitas † 730. b. † 732. a.  
 Visus imminutus † 733. a.  
 Visus abolitus † 719. a. v. Oculi.  
*Vita in quo consistat.* 25. b. 118. a.  
 Vita quid rectè dicatur \* 118. a.  
 Vitalem facultatem concernentia † 5. b.  
 Vitale principium in animalibus \* 89. b. 191. b.  
 Vita non est in partibus solidis, sed fluidis. 36. b.  
 Vitæ radix est spiritus & sanguis. 118. a. b. 79. b. \* 89. b. \* 246. b.  
 Vis vitalis dependens à semine \* 79. b. \* 90. a.  
 Vitalis spiritus vel influus vel insitus \* 90. b.  
 Pro vita necessarius cordis pulsificus motus \* 771. b.  
 Vita non fundatur in sanguinis præsentia, sed ejus spiritus absentia \* 110. a.  
 Oculus vitæ cibum in aere \* 57. b. Respirationis necessitas ad vitam ibid.  
 Vitales particule in aere an dentur. \* 766. a. b.  
 Vitæ terminus ex spirituum crassi deducti potest 44. a.  
 Vitæ privatio an ob impeditam respirationem \* 750. a. \* 756. b.  
 Animalia sensibus vitæ indicis penitus privata, quæque ab æris sola in machinam, quovismodo evacuatam, duntaxat resuscitari non possunt, non sunt ultra omnem vitalia signa rursus edendi & vitam resumendi sperni redacta \* 768. b.  
 Vitæ humanæ miseria \* 126. b.  
 Vitæ longæ vel brevis, sanæ vel ægræ fundamentum \* 79. b. \* 90. a. \* 91. b. \* 97. b.  
 Vitæ prolongatio & terminus ejus an obtineri possit per remedia nature \* 92. b.  
 Vitæ longæ conciliandus meli \* 425. a.

Vitæ longæ per transmutationem promota \* 97. a.  
 Vitæ longiora impedimenta \* 89. b.  
 Vitæ brevitas ex generationis & salubritatis præcipitantis \* 89. b.  
 Vitæ brevior ex obelitis \* 829. a.  
 Vita media synopizantium, insectarum &c. † 386. b.  
*Viti, ejus præparatio & usus.* 562. a.  
*Vitrioli, ejus generis differentia, præparatio & usus.* 269. a. usque 274. a. 301. a. b. seq. 802. a. 806.  
 Vitrioli generatio in terra. 269. a. b.  
 Oli diversi colores unde 267. b.  
 Oalum artificiale. 267. b.  
 Olacea remedia cujus notæ. 887. b.  
 Vitrioli, & vitriolorum vitæ \* 834. b.  
 Vitriola ad pthysin disposita † 397. b.  
 Vitrioli colcothar, vulnerarium magni usus \* 44. b. \* 46. a. maximus ejus usus \* 79. b.  
 Vitrioli. 969. b.  
 Vitrioli sal vomitorium rejectum † 13. b.  
 Vitriolum veneris magni æstimator \* 79. b.  
*Vitulus, cujus usus in Medicina.* 683. a.  
*Vivere quid sit.* 128. a.  
*Vivipara, v. ovipara.*  
 Generatio viviparorum quomodo incipiat & absolvatur. 109. a. b. seqq.  
 Ulcera in genere considerata, eorumque causæ \* 54. a. cachecticorum sunt vitæ curabiles \* 54. b. Ulcerum differentia \* 55. a. nervosorum partium difficilior curantur \* 55. a. sanguineorum partium facilius, ibid. in glandulosis locis contumaciore, magis dolorosa ac controsiva \* 55. a. articularum quando periculosa ibid. acor lymphæ exitum & ulcus ferè immedicabile & ceteris recidivans constituit \* 55. a. ulceris sinuosi, cavernosi causæ \* 55. b. Ulcus fistulosum unde \* 55. b. ejus occasio unde ibid. plus minus diuturna aut maligna quando? \* 55. b. recidiva & generatio novi ulceris quæ contingat \* 55. b. ulceris ordinaria adjuncta, & fermenti ejus acidi producta \* 55. b. labia ulceris sicca & citius sordes mali omnis sunt \* 56. a. Prognosis & ejus fundamenta ex tribus circumstantiis \* 56. a. Cura chirurgica \* 56. a. seqq. ulcerum remedia externa vulgo quatuor capitulis comprehenduntur \* 57. b. mundificantium ulcera utendi modus \* 58. b. Quid si ulcera reddantur arida \* 59. b. Signa, quod vitium non sit in nervis, sed in succo chyloso \* 285. b. quomodo tunc cura sit instituenda. ibid.  
 Ulcera sponte enascentia considerata \* 284. b.  
 Ulcera spontanea in affectu scorbi. † 383. b.  
 Ulcera æthusa, hæmorrhoidum, phlegmonum conciliantia \* 284. b.  
 Ulcera cancrum, v. cancrosum ulcera.  
 Ulcera capitis, remedia ab epilepsia liberantia † 81. a.  
 Ulcera quæ sunt contagiosa, & cur \* 54. b.  
 Ulcera de quibus phagedæna, v. dysphlogistica, v. phlegmonosa ulcera.  
 Epithelium ulcera dysphlogistica \* 642. a.  
 Ulcera quæ sunt contagiosa, & cur \* 54. b.  
 Ulcera quæ sunt contagiosa, & cur \* 54. b.



# MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- De ulceribus narium casus & observ. \* [362. a.](#)  
 Ulcera pestilentialia † [360. b.](#)  
 Ulceris in pleuritide mundificatio & consolidatio \* [280. b.](#)  
 Ulcus recidivans, non consolidativum, novum gignens unde \* [284. a.](#)  
 Ulcerum recrudescencia unde † [334. a. b.](#)  
 Ulcerum scorbuticorum cura † [517. b.](#)  
 Ulcera scorbutica oris † [505. a. b.](#)  
 Ulcera serpentia \* [63. b.](#) \* [64. b.](#)  
 Ulcera sinuosa, v. sinuosa ulcera, fistula.  
 Ulcera sordida, putrida & corrosiva, eorum causa, cura \* [62. a. b.](#)  
 Epithema ad ulcera telephia \* [642. a.](#)  
 Ulcera variolarum & c. † [357. b.](#)  
 Ulceribus an conveniunt acida \* [40. b.](#)  
 Ulceribus acida & vinum nocent † [244. a.](#) † [245. a.](#)  
 Ulceribus conveniens decoctum \* [651. a.](#)  
 Infectionum in ulcera ratio \* [661. a.](#)  
 v. exulceratio, pus.  
*Ulcuscula* infantum in capite & c. † [1099. b.](#)  
*Ulmaria*, ejus præparata & usus [566. a.](#)  
*Umbilici* apertio in [hydrope](#) † [436. b.](#)  
 Umbilicalis dolor unde † [156. b.](#)  
 Dolores circa regionem umbilicalem \* [140. a.](#)  
 Umbilicalis funiculi circa collum partus circumvolutus † [1018. a.](#)  
 Umbilici situs † [172. b.](#) umbilicalis Hernia ibid.  
 Umbilicales herniæ infantum † [1084. b.](#)  
 Umbilici inflammatio non confundenda cum inflammatione mesenterii † [557. b.](#)  
 Umbilici inflammatio in infantibus, cum causa, prognosi, cura † [1082. a. b.](#)  
 Umbilicalis ligamenti ruptura vel præcisio lethalis \* [36. b.](#)  
 Umbilici prominentia infantum † [1081. b.](#) prognosis & cura † [1082. b.](#)  
 Umbilici intorsum retractio, distensio, durities † [157. a.](#) † [159. b.](#)  
 Umbilicalis vermis, v. vermis umbilicalis.  
*Umschläge* \* [641. a.](#)  
*Umschlag* in exulcerationibus humidis \* [654. b.](#)  
*Unciones*, v. Inunctiones.  
*Unguis* inest occultum acidum \* [1. a.](#)  
 Ungarische Krankheit † [338. a.](#)  
 Ungenanntes oder der Wurm am Finger / ejus causa, cura chirurgica \* [19. a. b.](#)  
*Unguenta* præscribendi modus \* [663. b.](#)  
 eorum compositio [849. a.](#) -- [852.](#)  
 compositio plerumque erronea \* [665. a.](#)  
 Ungventorum utendi modus \* [662. a.](#) Basis & ingredientia ibid.  
 Unguenta chirurgorum. [970. b.](#)  
 Ungventum fuscum Wurzii ingrediens [colcothar vitriol.](#) \* [44. b.](#) v. Inunctio.  
*Ungvis oculi* consideratio † [719. a.](#) seq.  
 Contra ungvem oculor. pulvis \* [633. b.](#)  
*Ungula oculi* † [719. a. b.](#)  
 Unheilsame Haut haben \* [38. a.](#)  
*Unicornu*, ejus usus in Medicina [683. a.](#)  
 Unicornu fossile quid. [914. b.](#)  
 fossile ejus usus in Medicina [737. b.](#)  
 Unicornu minerale ejus compositio [868. a.](#)  
*Universalia remedia* † [5. a.](#)  
 Remediorum universalium operandi modus [152. b.](#)  
 Universale medicorum præcipuum quod \* [13. b.](#)  
 Unrichtig gehen der Schwangern † [1010. a.](#)
- Unsinigkeit † [877. b.](#)  
 Unterföhlig werden † [535. b.](#)  
 Unterwachsen der Kinder † [1104. b.](#)  
 Vogel-Beer. [547. a.](#)  
 Vogel-Kraut. [384. a.](#) [386. b.](#)  
*Vola manuum* tactus sensilior \* [239. a.](#)  
*Volatile* quomodo peccat in corpore \* [804. b.](#)  
 Volatiliu decocta quomodo paranda \* [651. a.](#)  
*Volatilisationis* in corpore causa \* [746. a.](#)  
*Volatilitas* spirituum \* [2. a. b.](#)  
*Volulus* † [97. a. b.](#)  
*Vomica* veteribus quid? quid modernis? † [600. a.](#)  
 ruptionis tempus † [601. b.](#)  
 Vomica pulmonum † [397.](#)  
 Vomica pulmonum in asthma. \* [196. a.](#)  
*Vomitoria*. [883. a.](#) [887. b.](#)  
 Vomitoria potiora † [10. a.](#)  
 Acetum, s. Aqua vomitoria quo paranda [957. a.](#)  
 Vomitoriis mista opiata \* [139. a.](#)  
 Vomitoriorum differ. à Purgantibus \* [139. a.](#)  
 Vomitoria quomodo simul purgent \* [139. a.](#)  
 Vomitoria quædam rejecta † [10. b.](#) seqq.  
 Cautela circa vomitoria \* [118. b.](#)  
 Vomitoria quibus noceant † [13. b.](#)  
 Vomitoriorum usus in angina † [543. b.](#)  
 usus in apoplex. habituali \* [304. a.](#)  
 usus in asthma † [201. b.](#)  
 usus in chronicis affectibus \* [116. b.](#)  
 usus in delirio melanch. † [864. a.](#) † [873. b.](#)  
 usus in diarrhæa \* [144. a.](#)  
 usus in febr. † [253. b.](#)  
 usus in febr. interm. \* [205. a.](#)  
 usus in febr. mal. † [329. a.](#)  
 Vomitoria gravidis an propinanda † [997. b.](#)  
 Vomitoriorum usus in hydrope † [431. a.](#)  
 Vomitoria pro infantibus [883. a.](#) † [1073. b.](#)  
 Vomitoriorum usus in lue venerea † [466. a.](#)  
 usus in mania † [882. a.](#)  
 usus in peste † [369. b.](#)  
 usus in Petechiis † [340. b.](#)  
 usus in phlitis † [894. b.](#) seqq.  
 usus in phthisi, tabe, atrophia † [401. a.](#)  
 usus in Pleuritide † [568. b.](#)  
 usus in scorbuto & mal. hypoch. † [490. b.](#)  
 usus in tussi † [231. b.](#)  
 v. emeticum.  
*Vomitus* quomodo fiat [158. b.](#) seq. quid † [70. a.](#)  
 diff. ejus † [70. b.](#) sq. subjectum causa, † [71. a. b.](#) mirabilia rejecta per vomitum † [72. a.](#)  
 seminarum frequentior † [72. b.](#) spontanei salutares † [72. b.](#) menstrui, lethales & c. [72. b.](#) sq. rejecta per vomitum † [73. a.](#)  
 Diagnosi † [73. b.](#) Prognosi † [74. a.](#) Cura † [74. b.](#) fecum alvi & ano injectorum vomitio † [74. b.](#) vomitum artificialem sistentia † [77. b.](#) si ab assumpto medicam. † [78. a.](#)  
 Vomitam facit & diaphor. vid. [8.](#)  
 Vomitum provocans opium \* [568. a.](#)  
 Vomitum excitans sulphur ex scoris antimonii \* [80. a.](#)  
 Vomitus ex medicamentis in dosi non excedentibus \* [160. a.](#)  
 Cautela vomiturientib. & c. necessaria \* [154. b.](#)  
 De vomitu casus & obs. \* [337. b.](#) \* [340. b.](#) \* [353. a.](#) \* [378. b.](#)  
 Vomendi conatus inanis \* [368. a.](#)  
 Vomitus in quibusd. subjectis frustraneus & noxius ob tres præcipue rationes \* [134. b.](#)  
 Vomitus usus in apoplexia † [833. a.](#) † [834. a.](#)  
 b b Vomiti-



# INDEX UNIVERSALIS

- Vomitus bilis in inflammat. hepatis † [525. b.](#)  
 Vomitus usus in cephalalg. † [767. b.](#)  
 In vomitu consummaci semper videndum, an  
 scirrhus &c. in stomacho aut circa pyloro-  
 rum hæreat \* [224. a.](#)  
 Vomitus ex cruditate nidorosa \* [130. a.](#)  
 Vomitus difficilem adjuvantia † [13. b.](#)  
 Vomitus dysentericorum \* [157. a.](#)  
 an dysentericis conducatur \* [160. b.](#)  
 Vomitus apprimè conducit in empyemate †  
[605. b.](#)  
 Vomitus usus in epilepsia habituali \* [299. a.](#)  
 Vomitus in febr. uade \* [202. a.](#)  
 Vomitus in febr. mal. † [338. a.](#)  
 Epithema in vomitu febrium malignarum  
 &c. \* [641. b.](#)  
 Vomitus gravidarum ejusque cura † [998. b.](#)  
 Vomitus usus in ictero † [449. b.](#)  
 Vomitus infantum, ejus causæ † [1078. a. b.](#)  
 \* [537. a.](#) Diagnofis, prognofis, cura † [1079.](#)  
 a. feqq. \* [549. a.](#)  
 Vomitus inveteratus matutinus cum tetano  
 capitis, chorefi incipiente \* [523. b.](#)  
 Vomitus nephriticorum unde \* [290. a.](#)  
 Vomitus nimium lententia \* [135. a.](#)  
 In vomitu nimio bolus \* [634. a.](#)  
 Vomitiones in peripnevmonia † [564. b.](#)  
 Vomitus in peste \* [360. b.](#) prognofis † [377.](#)  
 b. cura † [377. a.](#)  
 Vomitus scorbutici cura † [515. b.](#)  
 Vomitus stercorum, v. Passio iliaca.  
 Vomitus in variol. & morbill. cura † [353. a.](#)  
 \* [257. a.](#)  
 Vomitus cruentus ejusque causæ † [74. b.](#) † [78.](#)  
 a. Diagnofis, Prognofis, cura † [79. a.](#) feqq.  
 non omnis vomitus materiæ nigricantis  
 & cruentus † [79. a.](#) differt. à vomitu atræ  
 bilis † [79. a.](#)  
 De Vomitu cruento casus & obf. \* [435. b.](#)  
**Voracitas** post febres intermittentes disponit ad  
 febr. lymphaticam \* [234. b.](#)  
 melancholicorum † [868. b.](#)  
 Voracitatis infomnia ex pelle animalis, hulo  
 dicti † [856. b.](#)  
 v. Appetentia canina, dicta.  
**Vox** articulata quomodo fiat [97. a.](#) † [220. a.](#)  
 Vocis vitia † [218. a.](#)  
 Vocis defectus, v. aphonia, loquela, sonus.  
**Urethra** vitia † [657. a.](#)  
**Urina** quid, ejus fapor duplex; est vel sanguinis,  
 vel potus [79. a.](#) † [625. a.](#)  
 Urinæ contenta. [139. b.](#) feq.  
 Urina acris salsa est [80. b.](#) \* [313. a.](#)  
 Urina est duplex: potus & sanguinis [80. b.](#)  
 † [242. a.](#)  
 Urina potus. [80. b.](#) feq.  
 Urina sanguinis quid? quando colligenda  
 \* [214. b.](#)  
 Urinarum triplex differentia [241. b.](#)  
 Urinæ varietas unde [80. a. b.](#)  
 Urina ex clyfteris usu violacci odoris \* [159. b.](#)  
 Urinæ dulcedo in diabete † [647.](#) † [649. a. \\*](#)  
[830. b.](#)  
 Urinæ & sudoris conspiratio \* [565. b.](#)  
 Urinæ alteratio, putredo, fætor, arenulæ &c.  
 calculum generantia [140. b.](#) [225. b.](#) † [634.](#)  
 a.  
 Urinæ fætor quid significet. [245. b.](#)  
 Urinæ fætor unde. [245. a. b.](#)  
 Urina foetida in febribus æutis exitialis. [245.](#)  
 b.  
 Urinæ sedimentum unde [66. b.](#) feq.  
 Urina in ftatu f. n. qualis [80. a.](#)  
 Urinarum cruditas quam habeat causam.  
[236. a.](#)  
 Urinæ crudæ causa quo sensu fit Chylus.  
[244. b.](#)  
 Urina tenuis [242. b.](#) [244. b.](#) feq.  
 Urina tenuis, pallida, cruda, orta à digestionē  
 vitiata \* [122. a.](#)  
 Urina turbida continet latens acidum [81. b.](#)  
 Urina pinguis & oleaginosa † [313. b.](#) † [651. a.](#)  
 ejus cura † [651. b.](#)  
 Urina largior hieme quàm æstate \* [227. a.](#)  
 Urinarum perspicuitas & varia tinctura f. co-  
 lor unde [139. b.](#) [225. a.](#) [243. b.](#) feq. [245. a. \\*](#)  
[152. a.](#)  
 Urinæ sal mirificam colorum potestatem po-  
 tentiā in se continet \* [457. a.](#)  
 Urinæ rutilantis, turbidæ, consideratio \*  
[215. a.](#)  
 Urinæ rubedo à salina rubedine diff. à cruenta  
 † [653. a.](#)  
 Urina cruenta, v. Mictus cruentus.  
 Urina pallida in colica \* [171. a.](#)  
 Urinæ motus [79. b.](#)  
 Urina significat statum coctionis [140. a. \\*](#)  
[247. a.](#)  
 Urinæ Coctio in quo consistat. [238. a. b.](#)  
 Urinarum coctio quam habeat causam  
[236. b.](#)  
 in Urinæ coctione quid conferat acidum & al-  
 cali [238. a.](#)  
 Urinæ signa quo sensu certa dicenda [235. a.](#)  
 ex urina judicium [141. a.](#)  
 Urinæ inspectio ubi & quando necessaria  
[238. b.](#) feq. [243. a.](#)  
 In Urinæ inspectione quæ consideranda  
[139. b.](#)  
 Urinæ inspectio quid juvet ibid.  
 Quomodo in Urina distinguenda pus, genitu-  
 ra, succus chylosus f. pituita \* [237. b.](#)  
 Urina & judicium de ejus inspectione in læsa  
 sanguinis crasi † [242. a.](#)  
 Urinæ nubecula quid significet \* [215. a.](#)  
 Urinæ excretio quomodo fiat [80. a.](#)  
 Urinæ excretio depravata † [667. a.](#)  
 Urinæ secretio imminuta vel abolita † [625. a.](#)  
 Urinæ excretio aucta † [646. b.](#) † [663. b.](#)  
 Urinæ excretio critica [235. b.](#) feq.  
 Urinæ excretio datur in fœtu [166. a.](#)  
 Urinæ in renibus secretio [80. a.](#)  
 Urinæ in renibus secretio læsa † [625. a.](#) † [651. a.](#)  
 Urinæ parca excretio in cachexia & imminen-  
 te hydrope \* [273. a.](#)  
 Urinæ parciore excretio in scabiosa cachexia  
 &c. \* [268. a.](#)  
 Urinæ excretio obesitati conducit \* [829. b.](#) †  
 Urina quomodo supprimatur \* [565. b.](#)  
 Casus & observatio de Urinæ suppressione \*  
[371. a.](#)  
 Urinæ suppressio in calculo unde \* [290. a.](#)  
 Urinæ suppressio in gravidis, cum cura †  
[1005. a.](#)  
 Urinæ suppressio cum dolore post partum in  
 lochiorum retentione \* [327. a.](#)  
 Urinæ suppressionis in peste cura † [778. a.](#)  
 Urinæ suppressæ in phrenitide cura † [863. b.](#)  
 Urinæ suppressio puerperarum † [1043. b.](#)

Cata;



## MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

- Cataplasma in Urinæ suppressione puerperæ \* 658. a.  
 Emulsio in suppressione Urinæ \* 644. b.  
 Urinæ Anasarca laborantium quales & quare 226. a. b.  
 Urinæ conditio in calculo renum † 636. a.  
 Urinā reddita esculenta, potulenta, nondum penitus digesta & alterata † 648. b. seq.  
 Urinæ conditio in delirio melanch. † 873. b.  
 Urinæ conditio in empyemate † 602. a.  
 Urinæ conditio in febribus &c. † 245. a. † 247. a.  
 Urinæ signa diagnostica & prognostica in febr. † 249. a.  
 Urina in febribus clara, cruda dicitur \* 214. b.  
 Urinarum in febribus tinctura 228. b. 233. b.  
 Urinæ qualitates in febr. ardentib. † 291. a.  
 Urinæ in febribus lymph. constitutio \* 234. a.  
 Urinæ conditio in febr. mal. † 319. a. † 327. a.  
 Urinæ conditio in hepatide † 576. b.  
 Urinæ consideratio in hepatis inflamm. \* 282. a.  
 Urinæ hydropicorum consideratio † 424. a.  
 Urina hypochondr. considerata † 480. b.  
 Urinæ icterici examen † 447. a. † 448. b.  
 Urinæ malignarum sanorum humillimæ \* 215. b.  
 Urina peste correptorum † 360. a.  
 Urinæ prognos in peste † 262. b.  
 Urina prognos in phrenitide † 587. a.  
 Urina Scorbuticorum † 483. a. \* 180. a.  
 Urina in variolis † 347. a. b. † 348. b.  
 Urinam ciens decoctum \* 651. a.  
 Urinam promovens opium \* 568. a.  
 Urinæ canis rabidi consideratio \* 800. a.  
 Urinæ incontinentia † 663. b. ejus pars affecta & causæ † 664. a. Diagnos, prognos, cura † 665. a. b. seqq.  
 Urinæ incontinentia infantum cum cura † 1084. a. b.  
 Urinæ incontinentia puerperarum, cum prognos, & cura † 1043. a.  
 v. Diuretica, Mictus.  
*Urinarum* vix † 648. b.  
 Urinarii meatus vitia † 657. a.  
 Urinarii meatus caruncula † 468. a.  
 Urinarii tubuli vulnus an lethale \* 37. a.  
*Urinatorum* constitutio amphibiorum instar \* 255. a.  
*Urinasum* corrigentia † 4. a. † 5. a.  
*Ursus*, cujus usus in Medicina. 683. b.  
 Ursi pinguedo tempore brumali \* 822. a.  
 ab eo factum vulnus \* 359. b.  
*Urtica*, ejus præparata & usus. 566. a.  
 Urtica mortua s. Galeopsis ejus præparata & usus 566. b.  
*Usnea* cranii hum. usus † 132. b.  
*Usia* Remedia quæ sufficiunt, 855. b.  
*Ustiones*, v. cauteria.  
*Uteri* substantia membranoso-glandulosa † 949. b.  
 Uteri consensus cum mammis \* 179. a.  
 Placenta Uterina 114. b. seq.  
 Uteri placentæ habentur sæpè pro molis † 992. b.  
 Tubulus uterinus, ejus usus. 910. b.  
 Uteri vagina, v. vagina  
 Uteri constitutio in gravidis & partui vicinis. 1008. a.  
 Uteri crassities gestationis tempore, unde. 116. a.  
 Uteri repositio † 977. a.  
 Uteri descensus † 976. b.  
 Uteri passiones in diarrhœa \* 143. a. b.  
 Uterina epilepsia, v. epilepsia.  
 Uteri excrecentiæ, gangrænæ † 975. a. seqq.  
 Uteri extractio violenta cum secundinis † 975. a.  
 Uteri fluxus † 947. b.  
 Uteri hæmorrhagia; consultatio \* 310. b.  
 De Uteri hæmorrhagia casus & obs. \* 432. b.  
 an in Uteri hæmorrh. vetulæ consilium tutò adhibitum sit \* 322. a. v. hæmorrhagia.  
 Uteri hydrops s. tumor aquosus, ejusque causæ † 982. b. Differentia triplex ibid. Diagnos, prognos, cura † 983. a. b.  
 Uterialcensus in hyster. passione \* 179. b.  
 Uteri inflammatio, ejus causæ, diagnos † 978. b. Prognos, cura † 979. a.  
 Uteri inflammatio cum gangrænâ à partu † 1042. a.  
 Uteri inflatio, ejusque causæ † 980. a. b. Diagnos, Prognos, differentia à conceptione vera, Cura. † 981. a. b.  
 Uteri intemperies frigida & humida, inundatio, conformatio vitiosa † 985. b.  
 Uteri irritationis variæ causæ \* 321. a.  
 Uteri irritatio ad abortum † 1010. a. b.  
 Uteri irritatio in lochiorum retentione &c. \* 327. b.  
 Uteri procidentia ejusque causæ † 975. a. b. sit duobus modis † 975. a. b. Diagnos † 976. a. Prognos † 976. b. gradus duo † 976. a. differentia ibid. b. Cura, ibid. b.  
 Uteri pustulæ † 954. a. pruritus ibid.  
 Uteri scyrrhus † 979. a.  
 Uteri stillicidium † 944. b.  
 Uteri strangulatus, ascensio, caducus, asthma † 963. a.  
 Uteri suffocatio puerperarum, cum causa & diagnosi † 1039. b. cura † 1040. a.  
 v. Hysterica passio.  
 De Uteri tumore hydropico casus & obs. \* 432. a.  
 Uteri ejusque vaginæ ulcera † 979. a. ejus causæ, diagnos, prognos, cura † 979. a.  
 Uteri & ejus vaginæ ulcera Gallica † 473. b.  
 Uteri vulnera an lethalia \* 37. a.  
 Affectus totius corporis, vitio Uteri mulieribus obtingentes † 958. a. seqq.  
*Uterina* s. uterum roborantia † 4. b. † 1014. b.  
 Uterina quæ sufficiunt. 958. b.  
 Uterinæ aquæ, v. aqua.  
 Uterinum egregium, galanga † 169. b.  
 Uterinus pulvis D. D. Michaelis, ejus præparatio. 962. b.  
*Uva comessa* diarrhœam inducentes \* 142. a.  
 Uvarum Pelliculæ difficilis digestionis \* 142. b.  
*Vulnera in genere* quid, eorum differentia diagnos, Prognos ejusque triplex fundamentum \* 35. a. b. partibus profundius latentibus inflatorum cognitio ex quintuplici fonte \* 35. a. distinctio inter vulnera sanabilia vel insanabilia & lethalia, vel minus ib. b. de lethaliitate judicat primariò medicus \* 35. b. quæ lethalia & cur \* 35. b. Autores de vulnorum prognos & lethaliitate scribentes \* 38. a. Vulnorum cura chirurgica † 38. a. seqq. Vulnorum deterioratio vel ab alterato & mutato balsamo naturali, vel ab injuria externa, præprimis aeris &c. \* 38. b. \* 40. a. ordinaria vulnera mendi methodus Galeni à Majaro &c. nonnihil



# INDEX UNIVERSALIS MATERIARUM PRÆCIPUARUM.

*Nil immutata* \* 39. a. Cur vulnera raro reli-  
*ganda* \* 39. a. Acor & venenum, item halitus  
vulneribus nocent \* 39. a. b. Instrumentum  
vulnerans variè laedit \* 40. a. Vulnera hujus  
vel illius membri, prout aer pro climatum ra-  
tione variat in uno loco facilius curantur, in  
alio difficiliora \* 40. a.  
Cur chirurgi non promiscuè omnes admittant,  
ut inspiciant ligationes vulnerum \* 40. a. radii  
lunares is nocent ib. Remedia vulneraria ex-  
terna \* 40. b. interna & eorum præstantia \*  
41. a. methodus chirurgorum vulgaris curandi  
vulnera rejicitur \* 41. a. b. Balsama Peruviani  
usus insignis \* 41. b. Sarcoticorum, digestivo-  
rum s. suppurantium usus \* 41. b. balsamico-  
rum vulneri dicatorum natura \* 42. a. hetero-  
genea ex vulnere extrahendi ratio \* 42. a. b.  
fasciarum usus \* 43. a. & Turundarum \* 43. b.  
labiorum vulneris futura & combinatio per  
gluten \* 43. a. cicatricum post consolidatio-  
nem ratio \* 44. a. corruptionem vulnerum ar-  
centia \* 44. b. Quid sitis urgeat? \* 45. a. Quid  
in æstu & phlogosi febrili \* 45. b. Cura intra bi-  
duum \* 46. a. Cura sympath. & in distans \* 46. a.  
Vulnerum symptoma eorumque cura \* 52. b.  
Inflammatio & erysipelas \* 52. b. caro luxu-  
rians, dolores, sinovia, convulsiopartium vul-  
neratarum, febres \* 53. a. b.  
Vulneribus acida & vinum an nocet 253. b. † 244.  
a. \* 39. a. \* 40. b.  
Vulnerum recentium medela, 119. b.  
De vulnere ab ursa inflictio casus & obs. \* 359. b.  
Vulneris ab animali venenato & rabido inflicti  
cura † 890. b.  
Vulnera capitis, v. capitis vulnera.  
Vulnus cum contusione, v. contusio. Cum scelo-  
peto, v. scelopeti vulnus &c.  
Vulnera empyematosa conciliantia † 600. a.  
Vulnera maligna & venenata, eorum diagnosi,  
prognosis, cura \* 48. a. b.  
Vulnera mulierum q. facile deteriorantur \* 38. b.  
Vulnera nervorum, tendinum &c. v. Nervorum  
vulnera.  
Vulnera pectoris pulmonum, v. pectoris vulne-  
ra &c.  
Vulnera venarum, arteriarum, pectoris &c. v.  
vena, arteria, pectus &c.  
Cataplasma contra vulnera \* 658. a.  
Injectionum in vulnera ratio \* 661. a.  
*Vulneraria*. 970. a. † 4. a.  
Vulneraria remedia quid? † 38. a. \* 44. a. sunt  
multivaria \* 44. b. eorum usus multiplex \*  
45. a. selectus cum judicio in iis instituen-  
dus \* 45. b. delectus potionum vulnerariarum  
pro partium læsarum ratione \* 46. a. decoctum  
vulnerarium transudans per vulnus thoracis  
(utrique parti inflicto) & odorem spirans  
\* 46. b.  
Vulnerariorum Compositiones. 1020. a. b.  
Vulneraria quæ sufficiunt. 1012. b.  
Balsamum vulnerarium catholicum, ejus  
compositio. 1015. b.  
Vulnerarium decoctum, internè & externè u-  
surpandum \* 650. a.  
Emplastrum vulnerarium, ejus compositio.  
1015. b.  
Potio vulneraria. 940. a.  
*Vulneraria* febres cum earum cura † 244. a. † 303. b.  
† 310. a.  
*Vulpes* ejus usus in Medicina. 684. a.  
*Vulva* ruptura in parturientibus, cum prognosi &  
cura † 1041. b.

De vulvæ dolore casus & observ. \* 364. a.  
v. uterus, pudenda, &c.

*Vulva*, exulcerata, ejusque cura † 550. b.  
Uvulæ inflammatio † 538. b.  
Uvulæ laxatio in lue vener. † 456. a.  
Uvulæ prolapsus cura † 551. a.  
*Vulvaria*, ejus præparata & usus. 567. a.

W.

*Waldmeister*. 442. b.  
*Wald-Winde*. 407. b.  
*Wall-Wurzel*. 549. a.  
*Wasser-Blut*. 503. a.  
*Wasser-Kneipen* † 1017. b.  
*Wasser-Wegerich*. 509. a.  
*Wassersich* / *springen in parturiendo* † 1009.  
*Weg-Lorn*. 634. a.  
*Wegerich*. 508. a.  
*Wegwart*. 423. b.  
*Wehen/rechte Wehen/wilde Wehen* † 1008. b. seqq.  
*Falsche Wehen* † 1016. a.  
*Falsche Wehen post partum* † 1036. b.  
*Wehe sich gethan haben* † 82. b. \* 335. a.  
*Wehe thun/ cum asthma* † 197. b.  
*Wehe thun casus & obs.* \* 373. b.  
*Weherhun der Kinder* † 1102. a.  
*Weichlichkeit form ums Derg* † 389. a.  
*Weiderich*. 476. b.  
*Weiß-Wurzel*. 511. a.  
*Wermuth*. 735. b.  
*Wiesen-Kummel*. 409. b.  
*Wilde-Wanß Pitalz*, ear. usus. 868. b.  
*Wild-Flensch in vulneribus* † 53. a.  
*Willsius practicus & ejus scripta* † 26. b.  
*Wind-Bocken*. † 345. b.  
*Winter-Grün*. 516. b.  
*Winter-Hirze*. 443. a.  
*Winter-Kresse*. 443. a.  
*Wohl. Nicht wohl gehen der Schwangern* † 1010. a.  
*Wohlgerath*. 438. b.  
*Woll-Kraut*. 557. a.  
*Wunder-Baum*. 632. b.  
*Wund-Gaber/ ut curandæ* † 303. b. \* 71. a.  
*Wund-Holz* 451. a.  
*Wund-Kraut* 430. b.  
*Wurzel-Deft*. 428. a.  
*Wurm am Finger/ ejus causa, & cura chirurg.* \* 19.  
a. b. schlaffender Wurm. † 525. a.  
*Wurm-Kraut*. 550. b.  
*Wurm-Saamen*. 533. b.

X.

*Xenecthon Helmontii quid* † 363. b. † 367. a.  
*Xenecton pestis* \* 489. b.  
*ξερσθαιμία* † 590. b.

Y.

*γδωα* † 526. a.  
*γροχουα, γροχουα* † 725. b.

Z.

*Zapfen- fallen &c.* † 550. b. seqq.  
*Zapfen-Kraut* 567. a.  
*Zedoaria*, ejus præparata & usus 567. a.  
*Zehnwurm* † 1095. b.  
*Zehnwürme* † 1103. a. \* 543. b.  
*Zehnwurzel*. 332. b. † 311. a.  
*Zephyrus humidus in nostris climatibus* \* 225. b.  
*Zertheilender Brand* \* 651. a.  
*Ziege / v. Galtz*.  
*Zincum*, ejus præparata & usus 701. a.  
*Zingiber*, ejus præparata & usus. 567. b.  
*Zittermahle* † 524. b.  
*Zodiaci signa in quatuor classes distributa* \* 441. a.  
*Zona* usus in colica convuls. \* 181. b.  
*Zoothya non sunt animalia &c.* \* 446. b.  
*Zucker-Wurzel*. 545. a.  
*Zupfen in epilepsia* † 809. b.  
*Zwirbel* 413. b.

F I N I S.







